



FONDO PIZZOFALCONE



NAZIONALE

B. Prov.

XVI

53

NAPOLI

BIBLIOTECA

VITT. EM. II

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XXVII



Calchettio

Calchettio

Num.° d'ordine

32

B. Rev.

XVI

53

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout
l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT,
premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.*

THE
LIBRARY

PAR ORDRE DE
LE MINISTRE

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

646228

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

BOTANIQUE,

PAR M. LAMARCK, de l'Institut de France ;

*CONTINUÉE par J. L. M. POIRET, Professeur d'Histoire naturelle, de
plusieurs Sociétés savantes et littéraires.*

SUPPLÉMENT, TOME I.



A PARIS,

Chez H. AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, n°. 6.

M. DCCCX.

ENCLOSURE

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

STATEMENT, TOME I



100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

AVERTISSEMENT.

Pour se faire une idée du grand nombre de plantes découvertes depuis l'époque de la publication des premiers volumes de cet ouvrage par M. de Lamarck, il suffit de jeter un coup-d'œil sur les *Species Plantarum* les plus récents. Lorsque le premier volume a paru, il n'existoit que le *Species* de Linné en deux volumes in-8°, porté ensuite à quatre par Reichard, et récemment à neuf par Willdenow, qui n'a encore rien donné sur la classe, aujourd'hui très-étendue, de la cryptogamie. Vahl, peu avant sa mort prématurée, avoit entrepris un *Species* bien autrement volumineux. Les deux volumes qu'il a publiés ne renferment guère que trois cents pages du premier volume de Willdenow.

Ce seul exposé suffit pour faire concevoir la nécessité d'un Supplément pour cette partie intéressante de l'*Encyclopédie*, surtout pour les deux et trois premiers volumes. Le premier est aujourd'hui tellement au dessous de l'état actuel de la science, qu'il se trouve plus que doublé par les additions. Il convient néanmoins de rassurer contre l'appréhension d'un Supplément trop considérable, et l'on doit faire attention que les quatre ou cinq derniers volumes, publiés depuis quelques années sans interruption, n'exigeront que peu d'augmentation, contenant déjà, outre les plantes décrites par les botanistes les plus modernes, beaucoup d'espèces inédites, que possèdent dans leur riche collection M.M. de Lamarck, Jussieu, Desfontaines, etc., à l'amitié desquels

Botanique. Supplément. Tome I.

a

j'en dois la communication , ainsi qu'à plusieurs savans botanistes et voyageurs. Pour resserrer ce travail le plus possible , je ne donnerai que la synonymie rigoureusement nécessaire , et je supprimerai , pour les genres nombreux en espèces , beaucoup d'observations , en renvoyant aux auteurs qui en ont traité spécialement dans de savantes monographies.

Outre les avantages que présente ce Supplément par le tableau de toutes nos richesses végétales , j'y ai ajouté tout ce que la *physiologie végétale* présente aujourd'hui de plus intéressant , d'après les belles observations de MM. Mirbel , Corréa , Richard , Decandolle , etc. J'ai tâché aussi d'abrégier les recherches pour trouver une plante sous les différens noms qu'elle a reçus. En conséquence , les noms vulgaires , triviaux , ceux de pays , etc. que M. de Lamarck avoit réservés pour la fin de l'ouvrage , dans une table particulière , seront insérés dans le corps même de ce Supplément , ainsi que tous les noms latins des genres conservés ou non , renvoyant , pour les uns et les autres , au nom français sous lequel ils sont décrits : d'où il suit qu'avant de consulter un genre , même dans le corps de l'ouvrage , il faudra toujours le chercher dans ce Supplément sous le nom qu'il porte en latin. On saura par ce moyen s'il a été conservé ou supprimé , le nom qu'il porte en français , ou bien , en cas de suppression , le genre auquel il aura été réuni. J'ai eu soin également d'annoncer à chaque genre les espèces transportées dans un autre , et les raisons de ce changement. Aux espèces déjà décrites , j'ai ajouté la synonymie des auteurs modernes , surtout de ceux qui ont réuni à leurs descriptions de bonnes figures ou des observations particulières. Les erreurs , les doubles emplois ont été rectifiés le plus possible , quoique je n'ose me flatter de pouvoir toujours les éviter dans un travail d'une aussi vaste étendue. Enfin , l'ouvrage sera terminé par des tables analytiques , qui offriront les genres sous leurs noms latins

AVERTISSEMENT.

et français, placés d'après l'ordre des familles naturelles et le système sexuel de Linné.

La partie du travail de M. de Lamarck dans cet ouvrage, quoiqu'elle la moins étendue, n'en a pas été la moins pénible. Il a fallu toute la sagacité et les connoissances de ce célèbre et infatigable naturaliste pour y mettre cette exactitude qu'il eût été trop heureux pour moi de pouvoir imiter. A l'époque où M. de Lamarck a commencé ce travail, il n'avoit pas les mêmes secours que nous avons aujourd'hui. Un grand nombre d'herbiers qu'il a visités, ne contenoient que des plantes sans noms, placées confusément, ou bien des individus tronqués, mal choisis. Il lui a fallu mettre en ordre tous ces végétaux exotiques, les rapprocher par familles, en déterminer les genres et les espèces, travail qu'il a si heureusement exécuté, que presque toutes ces espèces, vérifiées depuis sur des figures ou sur des individus plus complets, ont confirmé ses observations. Il a fait connoître le premier beaucoup de plantes des deux Indes et du Cap de Bonne-Espérance, recueillies par Commerson, Sonnerat, etc., et trop souvent ces mêmes plantes ont été présentées sans synonymie et sous d'autres noms par des auteurs plus modernes, qui étoient à portée de consulter l'ouvrage de M. de Lamarck, et même les plantes qui avoient servi de type à ses descriptions. Si donc l'on calcule le nombre de plantes connues à l'époque de la publication des premiers volumes de cet ouvrage, on reconnoitra sans peine qu'alors M. de Lamarck avoit déjà beaucoup étendu nos connoissances en botanique, et éclairé notre jugement par d'excellentes observations sur les réformes à établir dans un grand nombre de genres et d'espèces. J'ai tâché de suivre d'aussi près qu'il m'a été possible cette marche tracée par le génie ; mais, plus réservé pour les réformes, je me suis borné souvent à des observations moins décidées, plus convenables à mes forces. Quoi qu'il en soit, j'ose croire que ce travail ne sera pas sans

utilité pour la science, et qu'outre le grand nombre d'espèces nouvelles qu'il contient, on trouvera, sur celles qui sont connues, des recherches intéressantes, et des observations critiques sur ce qui appartient à la philosophie de la science.

Je devois publier à la tête de ce volume un discours préliminaire sur l'ÉTAT ACTUEL DE LA BOTANIQUE; mais des circonstances particulières nous obligent de renvoyer ce discours à la fin de ce volume. Nous prévenons en conséquence de ne point faire relier cette première partie, afin de pouvoir placer convenablement le discours préliminaire.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE

SUR l'état actuel de la Botanique, sur les causes qui ont contribué à ses progrès, et sur celles qui peuvent les retarder ou les accélérer.

DEPUIS que l'étude des plantes a cessé d'être celle des herbes médicinales, et que le charlatanisme a perdu cet empire qu'il usurpoit dans la plus aimable des sciences, la botanique a fait, en peu d'années, plus de progrès qu'elle n'en avoit fait pendant plusieurs siècles. Tournefort avoit ouvert la carrière : Linné l'a parcourue à pas de géant : il a tracé de nouvelles routes ; il en a rendu l'accès agréable, facile, les a toutes éclairées du feu de son génie, et n'a cessé, pendant toute sa vie, de travailler à la construction de ce vaste édifice, élevé aux progrès des sciences naturelles, le composant de tout ce que l'Univers produit de plus brillant dans ses trois règnes. Saisissant l'ensemble de cette science, écartant les obstacles qui en atténoient les progrès, il osa, jeune encore, entreprendre la réforme, et presque en devenir le créateur. Chacun connoît ses nombreux ouvrages, qu'on ne peut comparer, pour l'invention, le génie et la précision, qu'à ceux du célèbre Aristote. Après avoir posé les bases de la science dans son *Fundamentum botanices* et son *Philosophia botanica*, il réduisit ses principes en pratique, en publiant un *Species Plantarum*. Peu auparavant il avoit fait paroître un *Genera*, dans lequel chaque genre étoit caractérisé par toutes les parties de la fructification ; mais il reconnut ensuite qu'il devoit extraire de ces caractères généraux ceux qui distinguoient plus particulièrement un genre d'un autre ; il créa des classes pour les plantes, sous le nom de *système sexuel*, production qui annonce autant de profondeur dans les idées, que de chaleur et de brillant dans l'imagination. Quel que soit le sort de ce dernier travail, qui a, comme toutes les méthodes artificielles, ses avantages et ses inconvénients, la réforme établie par Linné dans la nomenclature des espèces, chacune

Botanique. Supplément. Tome I.

d'elles, réduite à deux noms, sera toujours une des bases immuables de la science ; elle a soumis, entraîné tous les esprits, et nous ne craignons pas de dire que c'est à cette idée lumineuse que la science doit une partie de ses progrès ; idée qui a été également introduite depuis dans les autres sciences, dans la chimie, la minéralogie, la médecine, l'anatomie, etc.

Linné avoit construit un cadre qu'il ne s'agissoit plus que de remplir. C'est alors qu'on vit naître cette noble émulation qui transporta dans les différentes parties du Monde, les nombreux élèves du professeur suédois. Une immense quantité de plantes jusqu'alors inconnues furent le fruit de leurs infatigables recherches. Plus les découvertes se multiplioient, plus l'étude de la botanique étoit cultivée. On vit partout les naturalistes les plus distingués s'attacher aux douceurs de la vie domestique, abandonner leur patrie pour satisfaire, dans des climats lointains, une passion impérieuse qui leur faisoit oublier les fatigues et les dangers de cette pénible carrière. Beaucoup d'entre eux devinrent les victimes de leur zèle, sans qu'il fût ralenti dans ceux qui leur survécurent. Ce fut alors que la science s'avança rapidement vers la perfection. En peu de tems, les genres établis par Linné furent plus que doubles, les espèces multipliées presque à l'infini. Alors on vit paroître des Flores de tous les pays, des catalogues très-étendus d'espèces nouvelles, des monographies intéressantes. La plupart de ces ouvrages furent accompagnés de bonnes figures : l'on y joignit, ce que l'on avoit trop négligé auparavant, des détails importants sur les parties les plus essentielles de la fructification. Le nombre des genres et des espèces s'accrut tellement, qu'il fut impossible à l'esprit le plus actif d'en suivre la

progression, et de saisir dans tous ses détails l'ensemble de cette vaste science.

Au milieu de cette accumulation de richesses, de bons esprits concurent que, pour en jouir avec plus d'avantage, il falloit se diviser le travail, et que, vouloir l'embrasser dans toutes ses parties, c'étoit renoncer à des détails, minutieux en apparence, mais nécessaires pour la perfection de la science. Cette idée, une des plus heureuses peut-être qui aient été produites, donna une marche nouvelle à l'étude des plantes. Au lieu de se perdre dans l'immensité d'un travail général, les botanistes crurent qu'il seroit bien plus utile de le partager. En conséquence, les uns s'attachèrent particulièrement à l'étude d'une famille; les autres, à la monographie des genres nombreux en espèces. Plusieurs de ces genres avoient été très-négligés ou s'étoient accrus d'une manière monstrueuse, en y rapportant beaucoup d'espèces nouvelles qui n'y convenoient que très-imparfaitement. Il falloit donc une révision scrupuleuse; elle fut exécutée pour plusieurs genres. Le succès de ce travail encouragea les recherches, et l'on vit avec surprise de grandes familles, à peine connues, sortir du chaos dans lequel elles étoient ensevelies, que Linné lui-même n'avoit pu qu'indiquer, entraîné ailleurs par l'immensité de son travail.

Ce fut particulièrement dans l'étude des plantes cryptogames, que l'on reconnut les avantages de ce nouveau plan. Ces plantes étoient restées méconnues ou négligées à cause de leur petitesse et de leur obscurité; néanmoins la plupart d'entr'elles, placées sur les limites du règne animal et végétal, devoient être d'un grand intérêt aux yeux de l'observateur. On ne tarda pas à s'en apercevoir, et l'on reconnut que la Nature n'étoit pas moins admirable dans les productions qui échappent presque à nos sens, que dans celles qui nous frappent par leur grandeur, leur élégance et leur beauté.

Micheli s'étoit occupé avec succès d'un grand travail sur la famille des *champignons*. Depuis lui, Schæffer, Bolton, Gleditsch et plusieurs autres s'étoient livrés au même tra-

vail. Bulliard, devenu en quelque sorte habitant des bois, le continua avec une grande activité. Après lui, MM. Paulet, Toddo, Hoffman, Bartsch, Decandolle, Palisot de Beauvois, et surtout Petsoon, étendirent de plus en plus des recherches auxquelles Bulliard avoit été arraché par une mort prématurée. Des plantes parasites, qui ne se présentent sur les feuilles et les tiges des autres végétaux que comme des taches, des piqûres, des points presque imperceptibles, vinrent prendre une place provisoire dans cette grande famille, et offrirent aux observateurs des phénomènes particuliers; elles furent distribuées, comme les autres, en genres et en espèces.

Les mousses ne formoient que trois grands genres dans les ouvrages de Linné, et quelques autres moins nombreux en espèces. Ces plantes avoient été l'objet du travail de Dillen, de Micheli, de Necker, de Weiss, de Weber. Soumises à l'examen d'Hedwig, elles prirent un caractère tout différent, quoique le voile qui cache leur fructification soit encore bien peu transparent. Aux travaux de cet infatigable observateur succédèrent ceux de MM. Bridel et Palisot de Beauvois. Ce dernier surtout a présenté sur les mousses beaucoup d'observations neuves, et une distribution particulière qui doit en rendre l'étude plus facile.

Nous avons sur les fougères des maréciaux très-étendus, un excellent ouvrage de Plumier sur celles de l'Amérique, accompagné de belles gravures; mais il nous manquoit de bonnes divisions: c'étoit un travail presque neuf, dont M. Swartz s'est emparé. Nous lui devons une monographie intéressante sur cette famille, dans laquelle il a établi beaucoup de genres nouveaux, d'après des caractères de fructification qui avoient échappé aux premiers observateurs. M. Smith avoit déjà introduit des réformes très-utiles dans cette famille.

Il en fut de même des *lichens*, d'abord réunis par Linné en un seul genre; ils devinrent depuis le type d'une nouvelle famille, sur laquelle Acharius nous a donné un ouvrage très-étendu. Hoffman, Dickson et beaucoup

d'autres ont également contribué à la perfection de ce travail.

L'étude des plantes marines, si difficiles à suivre dans les eaux de l'Océan, paroissent devoir échapper aux observations : cependant Ollis, Gmelin, Turner, Draparnaud, Stackhouse, etc. ont été les chercher jusques dans leurs retraites, et nous en ont donné de bonnes descriptions avec figures. MM. Palisor de Beauvois et Decandolle nous ont fourni des généralités sur cette nouvelle famille. M. Lamouroux a préparé un travail complet, dont il a déjà fait connoître la disposition et les principaux genres dans des Mémoires particuliers et par la livraison d'un premier fascicule. Ces essais nous annoncent tout ce que nous pouvons espérer de cet habile et actif observateur.

Au milieu de ces grands travaux, une des familles les plus importantes, celle des graminées, paroissioit presque oubliée. A la vérité, on avoit isolément rectifié plusieurs genres : Koeler, Host et plusieurs autres y ont fait des changemens avantageux ; mais il falloit une réforme générale, des divisions plus naturelles, un nouvel examen des parties de la fructification, enfin une monographie complète. M. Palisor de Beauvois vient d'entreprendre ce travail important. Le Mémoire qu'il a présenté à ce sujet à l'Institut, et les notes qu'il a bien voulu nous communiquer, annoncent que nous ne tarderons pas à jouir de ses savantes recherches.

Ainsi le zèle ardent des botanistes les plus distingués étendoit de plus en plus les limites d'une science qui n'en connoît pas d'autres que celles de l'Univers. Les voyages nous procuroient des Flores de tous les pays, qu'il faut bien distinguer de ces nombreux catalogues auxquels on a donné également le nom de *Flores*, et qui ne sont, la plupart, que la répétition d'un certain nombre d'espèces connues, qu'on sait se trouver dans le pays où on les indique. Quelques-uns, à la vérité, contiennent des observations particulières et des espèces neuves ou peu connues ; ils méritent, à ce titre, d'être distingués, et l'on ne regardera jamais comme des ouvrages sans utilité les *Plantes de la Suisse*, par Haller ; celles

d'Allemagne, par Hoffman, Roth, etc. ; celles d'Autriche, par Jacquin ; de Berlin, par Willdenow ; d'Angleterre, par Smith, Curtis, Hudson, etc. ; la *Flora française* de MM. de Lamarck et Decandolle ; les *Plantes des environs de Paris*, par Tournefort et Vailant, etc. ; mais les Flores qui ont particulièrement étendu l'empire de la science, et qu'on peut regarder comme des modèles dans ce genre de travail, sont la *Flora du mont Atlas* de M. Desfontaines ; les *Plantes de la Nouvelle-Hollande et de Syrie* de M. de Labillardière ; celles de la Guiane d'Aublet ; de la Sibérie, par Gmelin et Pallas ; la *Flora du Pérou* de Ruiz et Pavon ; d'Oware et de Benin de M. Palisor de Beauvois ; la *Flora danoise*, celle de la Suède, de la Laponie, par Linné ; les *Plantes équinoxiales* de MM. Humboldt et Bonpland ; celles de l'Amérique septentrionale, par Michaud ; les arbres des mêmes contrées, par Michaud fils ; les plantes des îles d'Afrique, par M. du Petit-Thouars ; du Japon, par Thunberg ; de la Cochinchine, par Loureiro, etc. D'autres ont figuré et décrit les plantes cultivées dans des jardins, tant publics que particuliers. Ainsi Linné, qui a donné l'exemple de ces différens travaux, a publié les plantes du Jardin de Clifflott, de celui d'Upsal ; Dillen, l'*Hortus elthamensis* ; Aiton, l'*Hortus kewensis* ; Ventenat, les plantes du Jardin de la Malmaison et de celui de Cels ; Andrew, Curtis, la plupart des plantes cultivées en Angleterre ; Jacquin, celles de Schoenbrun ; nous avons les plantes grasses, par M. Decandolle ; les lilacées par le même, dessinées par M. Redouté, routes décrites et figurées d'après des individus cultivés. Ces ouvrages et beaucoup d'autres ne laissent presque rien à désirer, soit pour l'exécution et l'exactitude des figures, soit pour la fidélité des descriptions.

Nous possédons encore, sous le nom de *Fascicule*, de *Choix*, d'*Annales*, de *Dissertations*, de *Catalogue*, etc. un grand nombre d'excellens ouvrages, source féconde de richesses et d'observations, telles que les *Icones Plantarum rariorum* de Cavanilles ; ses *Dissertations sur les malvées* ; les *Observa-*

tions botaniques de Thunberg et de Jacquin; les Plantes du Corollaire de Tournefort, par M. Desfontaines; les Annales de Botanique de Roemer et Usteri; le Choix des Plantes de Ventenat; le Reliquia Kampferiana de Banks; divers Fascicules de Lheritier; les Observations botaniques de Retz; le Symbole et les Églogues de Vahl; les Illustrations de Gouan; les Plantes rares ou peu connues de la France, figurées par Decandolle, etc.; mais un des ouvrages le plus marquant, le plus utile, le mieux conçu est celui de M. de Lamarck, sous le titre d'Illustrations des Genres, contenant neuf centuries de gravures, qui font partie des planches de l'Encyclopédie par ordre de matières. Tous les genres connus à l'époque de sa publication y sont figurés avec des détails très-étendus sur les caractères particuliers à chaque genre, avec une ou plusieurs espèces souvent nouvelles ou peu connues, destinées à servir d'exemple.

Tandis qu'un grand nombre de naturalistes s'occupaient, par des analyses scrupuleuses, par l'exactitude des descriptions et des figures, à faire connoître les plantes qu'ils avoient découvertes, tant dans leurs excursions que dans les voyages de long cours, d'autres, concentrés dans leur cabinet, consacraient tous leurs momens à des recherches non moins intéressantes sur l'anatomie et la physiologie des végétaux, ainsi que sur le meilleur mode de classification. Ces savans sentent très bien que l'examen des parties extérieures des plantes étoit insuffisant pour fixer les principes fondamentaux de la science; qu'ils resteroient toujours douteux tant que les caractères établis sur cette partie ne seroient pas confirmés par la connoissance des organes intérieurs, surtout des plus essentiels, de ceux qui, par leur forme, leur nature, leur position, etc. établissent la différence d'une plante à une autre. Il importoit de connoître l'influence que ces organes avoient sur les autres parties de la plante, et les causes qui en formoient la différence.

On avoit déjà, sur l'anatomie des plantes, sur leur accroissement et leur développement,

des idées générales, fruit des observations de Grew, Malpighi, Duhamel, etc. Ces observations furent depuis modifiées, étendues, plus développées, rectifiées ou confirmées par plusieurs autres savans, comme je le dirai plus bas.

On rettenoit dans les grands végétaux ligneux, dans les plantes herbacées, les mêmes principes, le même mode d'accroissement; mais on avoit observé dans les uns des particularités qui n'existoient pas dans les autres. On voulut connoître la cause de cette différence : on la trouva dans les semences. On remarqua avec étonnement, que les unes n'avoient qu'un seul cotylédon, et que les autres (les plus nombreuses) en avoient deux. Cette découverte fournit deux grandes coupes naturelles, et les plantes qui appartenoient à l'une ou à l'autre offrirent dans toutes leurs parties, tant externes qu'internes, des différences constantes très-remarquables. Cette intéressante théorie a été étendue et confirmée par M. Desfontaines dans une suite de belles observations, d'autant plus lumineuses, qu'elles n'ont pas besoin, pour être vérifiées, du secours du microscope, avec lequel trop souvent chacun ne voit que ce qu'il veut voir. C'étoit sur de semblables observations que le célèbre Bernard de Jussieu avoir jeté les fondemens d'une méthode naturelle, que M. Laurent de Jussieu son neveu a si sagement développée, et qu'il s'attache tous les jours à perfectionner. Les méthodes artificielles, dont on reconnoissoit l'utilité, rebutoient néanmoins tous les bons esprits, qui ne pouvoient se déterminer à rapprocher des plantes qui n'avoient de rapport entre elles que dans le nombre de leurs étamines, de leurs styles ou dans la forme de leur corolle, et qui d'ailleurs se trouvoient, par ces divisions arbitraires, très-éloignées de celles desquelles elles se rapprochoient le plus par une foule d'autres caractères. Dès-lors il fut prouvé que la perfection de la science dépendoit de celle de la méthode naturelle. Les plantes furent donc réunies par familles, et les familles placées à la suite les unes des autres, selon leurs rapports plus ou moins étendus.

Ce dernier travail laisse encore sans doute beaucoup à désirer. Un grand nombre de familles ne forme que des groupes isolés : d'autres sont composées de genres qui n'attendent, pour en sortir, que de nouvelles observations : d'autres enfin n'ont pas encore reçu de place bien déterminée. On conçoit que la fin de ce travail ne peut être que le fruit d'un très-grand nombre de recherches, d'observations dirigées vers le même but.

Tel étoit à peu près l'état de la science lorsque Gærtner publia son bel ouvrage sur les fruits et les semences. Dans l'examen détaillé qu'il en donne, il fait connoître plusieurs parties négligées ou méconnues par Linné ; parties d'autant plus essentielles, qu'elles tiennent aux organes les plus importants des plantes, aux semences, à l'embryon ; qu'elles fournissent un plus grand nombre de caractères principaux et de points de comparaison ; en un mot, plus de degrés d'affinité ou de différence entre les familles, les genres, entre une plante et une autre plante : d'où il est résulté qu'à la description de chaque genre établi par Linné sur les considérations du calice, de la corolle, des étamines, du pistil et du péricarpe, on peut aujourd'hui ajouter d'autres considérations, tirées de la forme des semences, de leurs réguemens, de leur périsperme, de leur embryon : la nature, la position de ce dernier, la forme des cotylédons, et plusieurs autres caractères, tendent ces détails complets. M. de Jussieu a fait sentir, dans son *Genera Plantarum*, combien, d'un autre côté, il étoit intéressant, dans une foule de circonstances, de bien observer la position des étamines, qui n'a été indiquée par Linné que pour quelques unes de ses classes, l'icosandrie, la polyandrie, la gynandrie. D'autres savans poussaient avec activité ce beau travail. M. Gærtner fils continue celui de son père. M. Corréa a publié sur cet objet plusieurs Mémoires qui en font désirer la continuation. M. du Petit-Thouars a eu trouver, dans une suite d'observations qui lui sont propres, sur le développement des bourgeons, etc. des faits contradictoires avec des principes qu'on croyoit suffisamment établis,

qu'il soumet à un nouvel examen, et qui méritent, de la part des physiologistes, une attention toute particulière. M. Richard s'occupe, depuis un grand nombre d'années, de l'analyse complète de toutes les parties des semences. Ses nombreuses et intéressantes recherches ajouteront sans doute un grand degré de perfection à une science uniquement fondée sur l'observation. D'un autre côté, M. Mirbel a déjà répandu une grande lumière sur les organes des végétaux, sur leur développement et leurs fonctions respectives. Il est parvenu, après une suite d'observations, à établir ce principe comme base de toute sa théorie ; savoir : *que la masse entière d'une plante est un tissu cellulaire, dont les loges diffèrent par leurs formes et leurs dimensions.* Des savans étrangers, tels que MM. Hedwig, Link, Rudolphi, Sprengel, Bilderdyk et autres, ont publié de très-bonnes observations sur le même objet.

Ces travaux, ainsi que l'établissement des familles naturelles, détermineront enfin les véritables principes sur lesquels il convient d'appuyer l'étude des plantes ; ils nous guideront encore dans l'établissement des genres et des espèces ; mais après avoir présenté rapidement l'état actuel de la science, je dois dire aussi les abus qui s'y sont introduits, et qui peuvent en retarder la marche. Mon but n'est point ici de m'ériger en critique, mais d'écarter tout ce qui peut multiplier ou propager l'erreur, ajouter aux difficultés, et parsemer d'épines la route qui conduit à l'étude des plantes. Qu'il me soit permis de rappeler d'abord quelques-unes des observations que j'ai déjà présentées à la tête du cinquième volume de cet ouvrage (pages 4 et suiv.), sur l'établissement des genres et des espèces, et auxquelles je renvoie le lecteur.

Ainsi la science marchoit à grands pas vers la perfection lorsqu'elle fut arrêtée dans sa marche rapide par une nuée de *nomenclateurs*, les uns de bonne foi et fort instruits, les autres très-ignorans sur le véritable but de la science, quoiqu'ils s'annonçassent pour en être les réformateurs ; ils firent de la *nomenclature* le principal objet de leur travail. Pleins

de confiance dans leurs idées, ils crurent pouvoir arbitrairement changer le nom des plantes dès qu'il ne leur convenoit pas, les uns sans pouvoir en donner aucune raison, les autres d'après des principes qu'ils s'étoient formés à eux-mêmes, et souvent sur les prétextes les plus légers. Or, en fait de principes, comme chacun a les siens, chacun aussi a cru avoir le même droit, et ne pas l'exercer eût été, aux yeux de l'amour-propre, adopter l'opinion des autres, tandis qu'il est si doux d'avoir la sienne. On a respecté assez long-tems les noms donnés par Linné, quoique cette réserve n'ait pas été générale; mais ceux employés par les botanistes qui ont écrit après lui, par les naturalistes voyageurs, en un mot par tous ceux qui ont fait la découverte de nouvelles espèces, ont la plupart été rejetés. En ne pouvant pas ôter à son auteur l'honneur de la découverte d'une nouvelle plante, du moins il semble qu'on l'affaiblisse par le changement de nom : misérable subtilité de l'amour-propre, qui réussit assez bien dans des ouvrages généraux, plus connus, plus usuels que les ouvrages partiels dont ils se composent ! C'est ainsi que presque tous les noms, tant génériques que spécifiques, donnés par Aublet aux plantes de la Guiane, ont été supprimés par Schreber et autres, sans autre motif plausible que celui, sans doute, d'être cités de préférence. C'est ainsi que tous les jours, dès qu'un auteur fait connoître une espèce nouvelle, le premier qui écrit après lui, s'emparant de l'espèce, lui donne un autre nom; mais bientôt le réformateur est réformé à son tour. Je pourrais en citer mille exemples; mais il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur la synonymie placée dans cet ouvrage à la tête de chaque espèce.

Je ne conçois pas comment des auteurs, infiniment estimables d'ailleurs, ont pu se laisser entraîner par cet abus si nuisible à la science, et donner l'exemple d'une innovation qui fait presque le seul mérite d'une foule de compilateurs, dont les travaux, en réunissant en un seul corps les découvertes éparées dans des feuilles périodiques et autres, serviroient infiniment à faire connoître

les progrès de la science s'ils n'y jetoient, au contraire, le plus grand désordre par leurs prétendues réformes. J'en demande pardon à plusieurs hommes célèbres; mais je ne peux m'empêcher de m'élever contre un pareil abus, qui finira par écraser la science sous les mots. En effet, qu'arrive-t-il lorsque l'on change le nom d'une plante ? Il faut de toute nécessité rappeler le premier, autrement on introduiroit comme nouvelle, dans le catalogue des espèces, une plante déjà connue. Bientôt au premier réformateur en succède un autre, et dès-lors voilà une plante signalée sous trois, quatre, cinq noms et plus : j'en connois qui en ont jusqu'à huit ou dix. N'est-ce pas surcharger péniblement la mémoire d'une nomenclature fatigante, sans rien ajouter à nos connoissances ? Le moyen de se reconnoître au milieu de cette éternelle et rebutante synonymie ! Lequel de ces noms adopter ? Chacun en cela se conduit arbitrairement, et l'on ne peut guère faire autrement, à moins de revenir au premier nom établi; mais toujours faudra-t-il connoître ceux qui y ont été ajoutés quand on voudra consulter les ouvrages postérieurs.

A ce premier inconvénient, comme s'il n'étoit pas suffisant, on en a ajouté un autre qui achève la confusion. Souvent on supprime le nom donné à une plante, et ensuite on le reprend pour le donner à une autre. Des étres coalisés pour dégoûter de l'étude tous les gens raisonnables, ne pourroient pas s'y prendre plus adroitement pour réussir complètement. En effet, si je cite, par exemple, le *dombeya*, on ne manquera pas de me demander si je veux parler du *dombeya* de Lamarck, qui est l'*araucaria* Juss.; du *dombeya* de Cavanilles, qui se rapporte à quelques espèces de *pentapetes* de Linné; du *dombeya* de Lhéritier, qui est le *turretia* de Dombey, etc. Cette explication suffit pour celui qui ne cherche que le nom d'une plante; mais s'il s'agit de donner un travail sur les genres, il faut que l'auteur se décide pour adopter un de ces *dombeya*, à moins qu'il ne préfère les rejeter tous, comme il arrive pour trancher la difficulté, et établir de nouveaux noms plutôt pour sa commodité

que pour celle du lecteur, ainsi que l'a fait Salisbury en donnant le nom de *columnnea* au *dombeya* Lam. Dans le cas où un auteur se détermine à conserver un *dombeya*, lequel va-t-il prendre ? Le voilà jeté dans une discussion absolument étrangère à la science, et chacun aura encore une opinion différente : l'on voudra conserver le nom de Lhéritier, comme le premier auteur ; mais le genre pour lequel il l'emploie, avoit déjà été nommé *tourretia* dans les manuscrits de Dombey, connu par plusieurs botanistes, et Lhéritier, qui possédoit ces manuscrits, ne pouvoit pas l'ignorer. D'ailleurs, Fongeroix de Bandatou l'avoit publié dans les *Mémoires de l'Académie des sciences*, 1784. Pourquoi priver le savant M. de la Tourrette d'un hommage qui lui étoit rendu par son ami ? Un autre trouvera plus raisonnable d'adopter le *dombeya* de Lamarck, comme s'appliquant à un genre sans nom, et que Molina, qui avoit découvert la plante, avoit confondue très-mal-à-propos avec les pins ; mais alors il faut supprimer le nom *aracaria*, employé par Jussieu, qui admettoit les *dombeya* de Cavanilles, etc. On peut dire la même chose de l'*aubletia* et de beaucoup d'autres genres. Je n'éréndrai pas plus loin cette dissertation, qui, comme l'on voit, entraîne dans des longueurs, dans des incertitudes, et amène presque autant d'opinions différentes qu'il y a d'auteurs. Il me suffit d'en faire sentir les inconvénients, et de prévenir que la même discussion se représentera pour quelques centaines de genres.

J'avoue que, lorsqu'un nom a été employé pour un genre mal établi ou déjà connu sous une autre dénomination, ce nom, sans emploi, redevient libre. Pourquoi, dira-t-on, ne s'en servirait-on pas de nouveau, surtout si ce nom est celui d'un savant distingué, auquel on veut rendre hommage ? Faut-il qu'il en soit privé, parce que son nom aura été déjà gauchement employé ? J'avoue que cet hommage, si simple, si pur quand il n'est pas profané par l'adulation, souvent la seule récompense des longs et pénibles travaux, ne doit pas être refusé au savant modeste,

dont toute une nation jouit des bienfaits sans en connoître l'auteur ; mais du moins ces noms ne doivent pas être hasardés pour des genres douteux ou qui portent déjà un autre nom. Quant aux noms indifférens, ils ne devoient jamais être rappelés lorsqu'ils ont été adoptés pour des genres que l'on croit devoir supprimer, encore moins les reprendre successivement pour cinq ou six genres. J'en ai fait voir l'inconvénient dans l'exemple que j'ai cité pour le *dombeya*.

Une des principales causes du changement des noms, quand il est raisonné, est de les avoir rendus significatifs. Quand ils sont établis sur un faux caractère, comme il est arrivé quelquefois, ils doivent être nécessairement supprimés, et c'est presque le seul cas. Quand les caractères qu'ils expriment, sont communs à plusieurs autres genres, on doit les conserver dès qu'ils sont établis ; mais il faut, le plus possible, éviter de les employer primitivement, à moins qu'on ne soit bien assuré que le caractère qu'ils annoncent, ne convient et ne conviendra à aucune autre plante : chose impossible, tant que l'on ne connoitra pas toutes les plantes qui existent à la surface du Globe.

L'établissement des noms est d'une si grande importance pour faciliter l'étude d'une science, et nous mettre à portée de communiquer nos observations et nos idées avec clarté et précision, qu'il mérite une attention toute particulière, et ne doit pas être livré à l'arbitraire. Nous venons de voir combien le changement, dans la nomination des plantes, jette de désordre et d'embarras dans l'étude de la botanique. Cette innovation s'est introduite avec la même fureur dans les termes destinés à faire connoître les différentes parties ou les organes des plantes : il est de ces parties qui n'étoient point connues des Anciens ; d'autres que l'on découvre tous les jours ; d'autres enfin, qui portoient des noms obscurs, douteux ou d'une signification erronée. Il est évident qu'il falloit changer ces derniers, et en créer pour les parties nouvellement découvertes. Rien de mieux si on s'en étoit tenu là ; mais quand une fois l'amour

de la réforme devient dominant, quand on y attache sans restriction une trop grande importance, dès-lors, s'emparant de ces esprits légers, peu judicieux, il les emporte au-delà des bornes : c'est ce qui est arrivé pour la botanique. Les novateurs ont fait ici ce qu'ils avoient déjà fait pour le nom des plantes ; ils ont donné aux parties des plantes, des noms différens de ceux qu'elles portoient depuis long-tems, et leur travail s'est borné, ou à des distinctions subtiles, ou à substituer un nom à un autre, sans présenter une idée neuve. Par exemple, Linné avoit donné à la queue ou au support des feuilles le nom de *pétiole* ; à celui des fleurs, le nom de *péduncule*, et de *pédicelle* aux pédoncules partiels, nom qui a été également employé pour les supports des folioles. On a encore dit qu'un fruit, un ovaire étoit *pédicellé* quand il étoit supporté dans le calice par un pédicelle particulier. Il me paroît que cette expression étoit suffisamment entendue ; mais on a cru, vu sa situation dans le calice et son caractère particulier, devoir lui donner le nom scientifique de *thécaphore*, dont on distingue deux espèces : la première, lorsqu'il est produit par le rétrécissement de la partie inférieure du pistil, porte le nom de *basigyne*, comme dans le *lychnis* et l'euphorbe ; la seconde, lorsqu'il n'est qu'un prolongement du pédoncule, portant plusieurs ovaires, se nomme *polyphore*, comme dans les renoncules : c'est un polyphore succulent, qui, dit-on, forme le fruit de la fraise. On l'avoit regardé comme un réceptacle, et il me semble qu'alors on s'entendoit un peu mieux, avec moins de subtilité.

Mon objet n'étant pas et ne pouvant être de parcourir ainsi la liste des noms nouveaux donnés, ou à des parties déjà connues, ou à des modifications peu importantes de ces mêmes parties, qui pouvoient être exprimées aussi bien par une épithète, sans changement de nom, je me bornerai à faire remarquer qu'ouvre l'obscurité et l'embarras que cette nomenclature, souvent barbare, jette dans l'étude, elle la tend trop minutieuse, et substitue souvent des idées systématiques à la

place de celles que nous donneroit la seule inspection des plantes lorsque notre esprit n'est occupé par aucun préjugé ; car il est à remarquer que ces noms assignés à chaque partie des plantes sont la plupart établis d'après les systèmes et les opinions que chacun s'est formés, et qu'ils y tiennent par leur sens et leur étymologie ; de sorte qu'ils ne peuvent être adoptés par ceux qui ont une opinion différente, à qui par conséquent il faut des noms différens.

Les noms nouveaux ne doivent être établis que pour des organes nouvellement découverts, qui ont des fonctions particulières bien distinctes, bien vérifiées ; mais si ces organes ne sont que des modifications d'un autre déjà connu, il sera toujours suffisant de l'exprimer par une épithète, et non par un nom particulier. Combien, d'après ce principe, n'aurois-je point à dire, si je portois une sévère critique sur tous ces noms nouveaux, imaginés depuis un certain nombre d'années pour des organes connus depuis des siècles ! Quel dédale lorsqu'il s'agit de pénétrer dans cette obscure nomenclature, d'assigner le sens convenable à chaque expression, et surtout d'en faire une application générale à tous les êtres de la végétation !

J'ai dit plus haut que les nombreux ouvrages publiés depuis un certain nombre d'années sur les différentes parties de la botanique, en avoient considérablement étendu le domaine ; je dois dire aussi qu'on auroit pu rendre ces ouvrages bien plus utiles s'ils eussent été mieux combinés, si nous avoient été travaillés sur un plan uniforme, tendant au même but, et surtout rendus d'une acquisition plus facile en écartant ce luxe de gravures et de typographie qui les porte à un prix auquel ne peut atteindre la fortune ordinairement assez médiocre de ceux qui cultivent les sciences. Quelle somme effrayante ne faudroit-il pas réunir pour acquérir les plus importants de ces ouvrages, tels que les différens *Fascicules* de L'abrévié, les beaux et nombreux ouvrages de Jacquin, le *Jardin de la Malmaison*, les *Liliacées de Redouté*, les *Plantes grasses de Decandolle*, la *Flore danoise*, les *Icones rarioris*

de

de Cavanilles, la *Flore du Pérou*, celle de Portugal, qui commence à paraître, etc., etc., ouvrages néanmoins dont ne peuvent se passer ceux qui se livrent à l'étude complète des végétaux; Du moins ces ouvrages ne renferment, la plupart, que des plantes nouvelles, rares ou peu connus; mais employer le burin des artistes et la presse des imprimeurs pour ne donner que ce qui est déjà connu, c'est une superfluité qui, si elle ne nuit pas aux progrès de la science, ne lui est d'ailleurs d'aucune utilité: c'est une perte réelle en cuivre, en papier, en argent, qui pouvoient être employés plus fructueusement pour le progrès des sciences. De pareils ouvrages ne sont ordinairement que des spéculations mercantiles, dans lesquelles tout est calculé pour le profit, rien pour la science. On dupe le public pour un instant, qui ne tarde pas à revenir de son erreur, et à faire le sacrifice de ses avances pour les premières livraisons, dont il ne prévoit pas la fin.

C'est bien pire encore lorsqu'empruntant le nom d'un homme qui a eu en son temps de la célébrité, on donne, sous ce nom et sous le titre de *nouvelle édition*, un ouvrage qui n'est point le sien, et dont on se borne tout au plus à citer quelques passages: telle est en particulier la nouvelle édition des *Arbres et Arbustes* de Duhamel, qui n'en porte que le titre, ouvrage sans plan déterminé, pas même celui de Duhamel, l'ordre alphabétique, dans lequel on trouve un grand nombre de gravures parfaitement inutiles. Quel homme, en effet, aura besoin de recourir aux belles images de l'éditeur Michel pour apprendre à distinguer un chêne, un hêtre, un noisetier, un lilas, ainsi que les noyers, les pommiers, enfin les cerisiers, dont on nous a gratifiés, pour notre argent, de dix-sept planches, dans la crainte que nous ne confondions le bigarreau avec la cerise, la guigne avec la montmorency? Les mêmes précautions ont été prises pour l'olivier d'Europe, dont les variétés ont produit huit planches; pour le figuier domestique, qu'on a cependant borné à sept planches, comme si le palais ne valoit pas beau-

Botanique. Supplément. Tome I.

coup mieux que les plus belles gravures pour distinguer toutes ces variétés. Roisier l'a bien fait, dira-t-on: raison de plus pour ne le pas faire. Quant au texte, on ne peut, en général, lui faire d'autre reproche que de porter un faux titre; il n'est point de Duhamel, mais bien des savans qui ont coopéré à cette édition: on y trouve de très-bonnes observations. Sans doute il eût été conçu avec plus d'ordre et de sagesse si l'éditeur n'eût pas voulu trop souvent diriger la plume des gens instruits qui ont eu la faiblesse d'employer leurs connoissances à la rédaction de cet ouvrage interminable. Duhamel avoit donné le modèle d'un bon ouvrage. Qui pouvoit mieux l'exécuter que M. Desfontaines, qui, en deux volumes in 8°. d'un prix très-médiocre, a su renfermer tout ce qu'il nous importe le plus de connoître sur les *arbres et arbrisseaux* qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de la France.

En rendant compte des progrès qu'a faits la botanique depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas cru devoir me taire sur les abus qui se sont introduits dans plusieurs ouvrages publiés sur cette partie de l'histoire naturelle, sur le charlatanisme de quelques spéculations mercantiles, auxquelles les savans devoient refuser leur plume, sur l'introduction d'une nomenclature arbitraire et sur ce luxe typographique, qui rend la science inaccessible à tous ceux que la fortune n'a point favorisés de ses dons.

Il ne suffit donc pas d'écrire, et même de bien écrire sur une science, surtout en histoire naturelle: il faut encore que les ouvrages soient tellement combinés, qu'ils puissent être utiles à un plus grand nombre de personnes; qu'ils soient d'une acquisition peu dispendieuse, d'un format commode; qu'ils contiennent plutôt des additions faites à la science, que des répétitions de ce qui est déjà connu. Au reste, il est essentiel de distinguer deux sortes d'ouvrages: les uns classiques, les autres d'érudition et de détail. Les premiers composent le tableau méthodique, soit des genres, soit des espèces, ainsi que les *Flores* particulières à chaque contrée, etc. Ces sortes

d'ouvrages ne doivent présenter les plantes qu'avec une phrase spécifique, une synonymie choisie, une très-courte description lorsqu'elle est nécessaire, quelques observations particulières, peu ou point de gravures, mais l'indication de celles qui existent dans d'autres ouvrages : ce sont des espèces de catalogues raisonnés, l'inventaire de nos richesses, alimentés par les nouvelles découvertes, et qu'il faut refaire au bout de quelques années.

Il n'en est pas ainsi des grands ouvrages publiés avec figures, et qui présentent ou doivent présenter tout ce qu'il est intéressant de connoître sur chaque espèce de plantes, des descriptions plus étendues, des dissertations historiques, littéraires ou critiques sur leurs caractères, sur leurs rapports avec d'autres plantes, sur l'époque de leur découverte, sur leur culture, leur germination, leurs propriétés économiques ou médicales, leur naturalisation, etc. : telle est en particulier l'*Histoire des Plantes* de J. Bauhin, ouvrage unique, étonnant par son érudition, souvent un peu trop diffus, qu'on n'a pas encore imité, qui cependant pourroit servir de modèle, avec les corrections convenables, et en élaguant toutes ces longues recettes de médecine, sur lesquelles on ne peut être trop réservé.

De ces observations je conclus que les ouvrages classiques sont aujourd'hui à peu près ce qu'ils doivent être ; qu'ils doivent acquérir tous les jours plus de perfection par les observations particulières qui en rectifient les erreurs, les doubles emplois presque inévitables dans ces sortes d'ouvrages, faute d'avoir sous les yeux toutes les plantes qui s'y trouvent mentionnées : cependant un ouvrage essentiel qui nous manque, et qui, plus que tout autre, nous feroit apprécier les caractères génériques, c'est un *Species* distribué d'après la méthode naturelle. Pussions-nous l'obtenir un jour du célèbre professeur qui a tant contribué à la perfection de cette méthode !

Quant aux grands ouvrages enrichis de figures et publiés avec luxe, il faut qu'ils restent tels qu'ils sont, avec leurs erreurs, leurs défauts, souvent sans être terminés. En sup-

posant même qu'ils le soient, et qu'ils aient toute la perfection dont ils sont susceptibles, ils n'en sont pas moins des ouvrages isolés, sans ensemble, faute d'avoir été faits sur un plan uniforme, souvent répétant ce que d'autres ont déjà dit, ou donnant la figure de plantes qui ont été déjà plusieurs fois représentées. Cette opération est même quelquefois nécessaire, surtout lorsque l'on veut compléter un travail sur un genre, sur une famille, sur la Flore d'un pays, etc. : tels sont les liacées, les astragales, les *geranium*, les malvacées, les plantes grasses, etc. On reconnoît évidemment que les auteurs de ces beaux ouvrages auroient en partie manqué leur but s'ils eussent renvoyé le lecteur aux gravures déjà faites, et qu'ils se fussent bornés à figurer les plantes qui ne l'avoient pas encore été. Il n'en est pas moins vrai que, sous bien des rapports, c'est multiplier à grands frais la répétition des mêmes plantes, tandis que, d'un autre côté, ces ouvrages, au bout de quelques années, susceptibles de beaucoup d'augmentations, restent alors bien au dessous de la science, et qu'ils laissent beaucoup à désirer.

En réfléchissant sur ce genre de travail, j'ai reconnu qu'il eût été facile d'éviter tous ces inconvénients, de rendre ces sortes de travaux d'une utilité plus générale et d'une facile acquisition, avec les moyens de les perfectionner à volonté ; qu'il ne falloit pour cela que rattacher tous ces ouvrages à un plan général, et que s'ils eussent été, dès le principe, dirigés de la manière dont je vais l'indiquer, et à laquelle il est encore facile de revenir, il ne s'agiroit plus aujourd'hui que d'ajouter à ce qui a été fait.

Tant qu'on se livrera à la passion de publier sur la botanique des ouvrages de luxe, ils seront presque toujours ruineux pour les éditeurs, par les avances effrayantes qu'ils exigent, nuls pour un grand nombre de savaux, qui ne peuvent y mettre le haut prix auquel ils sont portés. On évitera ces deux inconvénients par une combinaison très-simple, et bien plus utile pour la science.

1°. Il faut renoncer à donner aucun ou-

vrage de luxe, à moins qu'il ne soit destiné pour les artistes ou les amateurs de belles gravures. Des dessins faits au simple trait, mais qui représenteroient chaque plante avec une fidélité scrupuleuse, accompagnés de détails sur les parties de la fructification, seroient suffisans : ajoutons un format commode, qui ne soit ni trop grand pour éviter la trop forte consommation de papier, ni trop petit, de manière à gêner le développement des plantes un peu grandes. L'in-4.° paroît devoir remplir cet objet.

2.°. Chaque planche ne doit offrir qu'une seule plante avec sa description sur un feuillet séparé. Si cependant, pour épargner la dépense, l'on jugeoit à propos de placer plusieurs plantes sur la même planche, il faudroit alors les choisir tellement rapprochées, qu'elles ne puissent être éloignées les unes des autres, quel que soit le système ou la méthode que l'on adopte. D'ailleurs, comme l'agrément du coup-d'œil doit être sacrifié à l'utilité générale, la planche qui offriroit plusieurs plantes pourroit être disposée de manière que chacune de ces plantes ait son cadre à part, à peu près comme celles de Barrélier; ce qui procureroit la facilité de les séparer à ceux qui croiroient devoir les faire passer dans une autre division.

3.°. Chaque planche avec sa description (c'est ici le point le plus essentiel, duquel dépend tout le succès et l'avantage de cette entreprise), chaque planche se vendroit isolément, au prix le plus bas possible.

4.°. Pour mettre dans cet ouvrage un ordre convenable, et tel que les acquéreurs puissent jouir dès les premières livraisons, on ne s'occupoit d'abord qu'à donner les genres, choisissant pour chacun d'eux l'espèce qui en offriroit tous les caractères sans aucune exception. Par ce moyen on posséderoit un *Genera* complet, et autant d'espèces qu'il existe de genres. C'est le plan que M. de Lamarck a si heureusement exécuté dans ses *Illustrations des Genres*.

5.°. Les livraisons successives des genres seroient dirigées de manière à contenir de petits groupes isolés, et combinés, de telle

sorte qu'ils formeroient autant d'ouvrages partiels, qui viendroient se rattacher à l'ouvrage général. Ainsi, par exemple, si l'on prend d'abord le système sexuel de Linné, et qu'on donne la gravure d'un genre pris dans chaque classe, on aura environ vingt-cinq gravures. Comme on peut choisir parmi les genres, on aura soin de le faire de manière à ce qu'ils répondent à autant de familles différentes dans l'ordre naturel; et lorsque l'on viendra à ce dernier, on aura déjà vingt-cinq gravures d'avance. Si l'on se propose de suivre ce travail pour les genres des plantes des environs de Paris, ayant eu soin que chacun des genres gravés réponde à un de ceux qui se trouvent dans la Flore de Paris, on se trouvera déjà en avance de cent genres; et en ajoutant ceux qui manquent, on pourra dès-lors offrir trois ouvrages particuliers; savoir : vingt-cinq gravures pour l'intelligence du système sexuel; cent pour celle de la méthode naturelle, et environ quatre cents pour la Flore de Paris. Celui qui posséderoit cette dernière collection, jouiroit en même tems de l'avantage des deux autres. On conçoit, sans que j'en dise davantage, comment on pourroit parvenir, par suite de cette combinaison, à donner successivement tous les genres connus.

Parvenu à fournir la totalité des genres, travail, comme je l'ai déjà dit, exécuté en entier par M. de Lamarck pour l'*Encyclopédie*, on passera aux espèces, et l'on suivra le même ordre que celui qui vient d'être exposé pour les genres. Les groupes seroient encore plus faciles à isoler par le moyen des monographies, auxquelles on ajouteroit, sans aucun embarras, routes les espèces nouvelles à mesure qu'on en feroit la découverte.

Les avantages, ainsi que le succès de ce grand travail, se trouvent donc assurés par ces deux conditions essentielles : 1.°. par la vente isolée ou par groupes des gravures avec leur description; 2.°. par l'ordre des livraisons, qui formeroient autant d'ouvrages séparés et complets, plus ou moins étendus, mais qui, dirigées vers le même but, rendroient toutes au complément d'un ouvrage

général; ouvrage interminable à la vérité, et qui n'auroit d'autres bornes que celles des découvertes, mais qui, à tel point qu'on le prenne, seroit toujours infiniment utile, et pourroit être à volonté suspendu, continué, sans être obligé de revenir sur ce qui auroit été fait.

Il suit de ces considérations, que cet ouvrage, d'une facile acquisition, multiplieroit à peu de frais les moyens d'instruction. Sans doute l'emplette en totalité formeroit par la suite une forte dépense; mais outre qu'elle n'est pas nécessaire pour ceux qui n'embrassent point la science dans toutes ses parties, combien de gens dépensent beaucoup plus pour acquérir la plupart des ouvrages nouveaux que l'on publie tous les jours avec luxe, et qui, sans rien diminuer de leur mérite particulier, ne se rattachent au grand édifice de la science, considérée dans son ensemble, que comme des pierres mal taillées. D'ailleurs, je ne peux trop le répéter, cet ouvrage, qu'on peut acquérir en aussi petites parties qu'on le desire, offre la plus grande facilité, même aux moins fortunés. En se bornant à une Flore particulière, aux seuls genres d'une Flore, ou, si l'on veut, aux plus difficiles d'entre eux, la dépense devient très-légère pour l'acquéreur; elle ne monteroit que proportionnellement à ses connoissances dans l'étude des végétaux. Quel avantage de pouvoir se procurer, ou des monographies isolées, ou compléter les espèces d'un même genre, les genres d'une même famille! de placer, si l'on veut, dans les herbiers, au défaut des plantes qui y manquent, les gravures qui les représentent, ou enfin de borner ses dépenses aux seules espèces difficiles à rencontrer ou à distinguer! Je suppose que l'on soit déjà possesseur d'un certain nombre de bons ouvrages sur la botanique, et que l'on veuille éviter la répétition des gravures d'une même plante: en formant un catalogue de celles que l'on possède, on pourra se borner à l'acquisition de celles qui manquent.

Avec quel plaisir le moins fortuné formoit de petites économies pour acquérir de temps en temps quelques-unes des plantes qu'il

est le plus desirieux de posséder! La somme la plus modique suffiroit pour satisfaire à une partie de ses desirs: une dépense faite partiellement et à volonté n'épouvante pas, ne gêne pas, et se trouve à la longue très-considérable. Voilà pourquoi un grand nombre d'ouvrages, distribués par livraisons, ont souvent plus de succès, que s'ils étoient vendus d'abord en totalité. L'avantage est ici bien supérieur, puisque chaque livraison peut former un ensemble, presque un ouvrage que l'on peut restreindre ou étendre à volonté.

Je ne me suis guère arrêté jusqu'ici qu'aux moyens d'exécuter une entreprise qui paroît effrayante au premier aspect, mais qui devient, comme on l'a vu, facile dans ses détails; je vais exposer maintenant les avantages qui en résulteroient pour les progrès des sciences naturelles.

1°. On a reconnu depuis quelque temps, avec beaucoup de raison, que la meilleure description, quelque exacte qu'elle puisse être, étoit souvent insuffisante pour beaucoup d'espèces, surtout pour celles qui sont très-rapprochées; qu'il falloit y ajouter de bonnes figures, dont l'utilité, quand elles sont très-fidèles, étoit d'abrégé beaucoup les descriptions, de faire supprimer tout ce que l'œil pouvoit saisir, et d'empêcher de confondre une plante avec une autre: aussi ne reconnoit-on guère aujourd'hui de plantes comme bien déterminées, que celles qui sont figurées, à moins qu'elles n'offrent des caractères bien tranchés. Tout ce que l'on publie actuellement de nouveau en botanique, monographies, flores particulières, etc., est presque toujours accompagné de figures; mais celles-ci étant éparées dans un grand nombre d'ouvrages, combien ne faut-il pas souvent en consulter pour les espèces d'un seul genre! Quel avantage de pouvoir les réunir à peu de frais!

2°. Il est impossible en histoire naturelle, comme dans toutes les sciences d'observation, d'avoir rien de complet. Une nouvelle découverte vient se joindre à la découverte la plus moderne: une observation en détruit, en modifie une antécédente moins

exacte. À peine un ouvrage est-il publié, que déjà il a besoin de corrections, de suppléments. On ne peut éviter cet inconvénient que par le plan que je viens d'exposer. Comme chaque gravure est isolée, ainsi que sa description, qu'elle se vend séparément, s'il s'introduit quelque erreur, soit dans le texte, soit dans les figures, il ne s'agira, pour la faire disparaître, que de corriger ou de remplacer une figure par une autre, de réimprimer un ou deux feuillets. Cet ouvrage réunirait donc éminemment, et bien au-delà, les avantages des éditions stéréotypes.

3°. Cette entreprise procurerait aux voyageurs une grande facilité pour publier leurs collections, pourvu qu'ils voulussent se prêter au plan général de l'ouvrage. Il suffirait pour cela d'adopter le même format, de tenir séparées la description et la gravure de chaque plante. On aurait un ouvrage particulier, dont en même temps chaque plante isolée viendrait prendre sa place dans l'ouvrage général. Tous ceux qui posséderaient des espèces nouvelles et inédites, trouveraient la même facilité pour les publier. C'est ainsi que l'on verroit se rattacher au même ouvrage toutes ces espèces isolées, éparées dans un grand nombre de journaux, de feuilles périodiques, où elles se perdent et s'oublient à la longue par la difficulté de les y trouver. Pour obtenir ce grand succès, il suffirait de commencer : le premier cadre une fois dressé, le travail, je n'en doute pas, irait rapidement. Les avantages de cette entreprise seroient bientôt appréciés. Qu'on se rappelle des progrès qu'a faits la botanique lorsque Linné eut imaginé de séparer les genres, et de distinguer les espèces par des noms génériques et spécifiques; il avoit, par ce moyen ingénieux, établi des cases disposées dans un ordre tel, que la plante inconnue trouvait, presque sans difficulté, la place qu'elle devoit occuper. Ses successeurs, travaillant sur le même plan, n'ont fait qu'ajouter de nouvelles pierres à l'édifice dont il avoit jeté le fondement. Quoi qu'il soit aujourd'hui élevé à une hauteur étonnante, il ne pourra être terminé que lorsque l'on sera assuré qu'il n'y aura plus de dé-

couvertes à faire dans le règne végétal; mais si chacun eût voulu bâtir à sa mode sans se rattacher au plan donné, où en seroit aujourd'hui l'édifice? Si l'on eût suivi, pour la publication des nouvelles découvertes, accompagnée de gravures, le mode que je propose aujourd'hui, avec des dépenses peut-être très-inférieures, cet ouvrage auroit maintenant le même avantage que ceux de Linné : il suffirait d'ajouter, d'après l'ordre établi, seulement ce qui n'est pas connu, au lieu de ces répétitions éternelles de plantes plusieurs fois gravées. Toute plante une fois entrée dans cette collection, et par conséquent bien connue, offrirait un moyen sûr d'éviter les doubles emplois, inconvénient que l'on éprouve fréquemment lorsque l'on veut compater une plante à décrire avec une autre qui l'a déjà été, mais sans bonne figure. Il arrive, ou que l'on confond en une seule deux espèces distinctes, ou que l'on donne pour deux plantes différentes celles qui doivent être réunies sous la même espèce.

4°. L'utilité de cet ouvrage ne seroit point bornée aux botanistes proprement dits; elle s'étendrait encore à toutes les ramifications de cette science, à l'agriculture, à la médecine et aux arts. Par le moyen de la vente isolée des gravures, le pharmacien se procurerait une collection de plantes usuelles; l'agriculteur, celles qui peuvent entrer dans les bosquets, dans les pépinières, dans les prairies, etc. Ceux qui se livrent aux arts économiques y trouveroient les plantes tinctoriales, alimentaires, celles qui fournissent les huiles, les gommés, les résines, etc.; ce qui formeroit à volonté autant de collections séparées.

Je ne m'étendrai pas davantage sur l'entreprise dont je viens d'esquisser le plan; j'en ai dit assez pour faire comprendre combien elle seroit utile, et bien moins difficile à exécuter qu'on pourroit le croire.

L'essentiel est de commencer. Serait-on rebuté par une mise de fond trop forte et des rentrées trop lentes? Si l'on m'a bien compris, si je me suis suffisamment expliqué, cette crainte ne peut avoir lieu. De quoi s'a-

gir-il? De vendre isolément chaque gravure; de mettre un tel ordre dans leur publication, que vingt-cinq, cinquante, cent gravures, etc. offrent autant de groupes ou d'ouvrages séparés, étant d'ailleurs dirigés de manière à former, avec le tems, un ouvrage général, qu'il ne faut pas comparer à ces entreprises qui restent presque sans succès si elles ne sont point achevées, et qui laissent dans l'incertitude de leur continuation l'acquéreur des premières livraisons.

J'ose avancer, en attendant, que les *Illustrations des Genres* publiées par M. de La-

marck, et le complément de ce Dictionnaire, seront long-tems le recueil le plus utile pour tous ceux qui voudront se livrer à l'étude générale des plantes, et qu'il n'existe jusqu'alors aucun ouvrage qui puisse lui être comparé. Sans doute il n'est pas sans défauts; mais j'ose croire que tout savant impartial, en les faisant connoître, saura, d'un autre côté, apprécier les peines et les recherches incalculables qu'il en a coûté pour conduire cet ouvrage à sa fin. Si j'ai erré, c'est souvent d'après d'autres, n'étant pas toujours dans la possibilité de vérifier leurs observations.

SUPPLÉMENT.

A B A



ABALON. *Abalum.* (Adanf. Fam. des Pl. vol. 2. pag. 47.) C'est le même genre que l'*helonias* Linn. (Voyez *HELONIAS*, vol. 4.)

ABAMA. (Adanf. Fam. des Pl.) M. Adanson avoit fait, avec raison, un genre particulier, sous le nom d'*abama*, de l'*anthericum offifragum* Linn. Des auteurs plus modernes, en convenant de la nécessité de cette réforme, y ont substitué le nom de *narthecium*, adopté dans cet ouvrage pour l'*anthericum calyculatum*, autre genre qui ne devoit pas être confondu avec les *anthericum* Linn.

M. Decandolle, dans la *Flore française*, a employé le nom d'*abama* au lieu de celui de *narthecium* pour l'*anthericum offifragum*, dont il justifie l'emploi. « Le nom d'*abama*, dit-il, donné à ce genre par M. Adanson, doit être préféré à celui de *narthecium*, 1°. parce que le *narthecium* des auteurs modernes n'est point celui de Théophraste, lequel est un ombellifère; 2°. parce que ce nom a été appliqué tantôt à ce genre, tantôt à celui de la tofieldie (*narthecium calyculatum*, vol. 4. pag. 431), souvent à l'un & à l'autre à la fois. »

Le caractère de l'*abama* est d'avoir :

Un calice persistant, à six divisions égales; six étamines; les filamens lanugineux; un ovaire pyramidal, surmonté d'un style court & de trois stigmates; une capsule à trois loges, à trois valves séparées par des cloisons; des semences nombreuses, attachées au fond de la capsule, ovales-oblongues, recouvertes d'une membrane qui se prolonge, à l'une & l'autre extrémité, en un appendice filiforme, trois fois plus long que la graine: l'embryon est droit, placé à la base d'un périsperme corné, dans l'axe même de la graine.

Observations. Ce genre a les étamines barbuës comme les *anthericum*, la fleur blanche comme les phalagères, & les feuilles en glaive comme la tofieldie (*narthecium* Dict.). Il diffère des *anthericum* par son ovaire pyramidal, son embryon droit, son périgone (calice) & les étamines persistantes; des phalagères, par ses étamines velues & persistantes, son ovaire pyramidal; des tofieldies (*narthécies*), par ses étamines velues, par l'absence d'un petit involucre, & par les cloisons que portent les valves de la capsule. Il se distingue de tous ces genres par les appendices de ses graines. (Decand.)

Botanique. Supplément. Tome I.

ESPÈCE.

ABAMA des marais. *Abama offifraga.*

Abama foliis ensiformibus; floribus laxè spicatis, subsessilibus. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 171. n°. 1852.

Narthecium anthericoides. Hope, Plant. rar. cent. 2. — Moerh. Eph. Nov. Cur. Nat. 1742. p. 389. tab. 5.

Anthericum offifragum. Linn.

(Voyez *ANTHÉRIC* des marais, n°. 6.)

ABANDION. *Abandium.* (Adanf. Fam. des Pl. vol. 2. pag. 54.) (Voyez *BULBOCODE*.)

ABAPUS. (Adanf. Fam. des Pl. vol. 2. pag. 57.) (Voyez *GETHYLIDE*.) Le nom de *gethyllis* Linn. appartenant au poireau, d'après Théophraste, M. Adanson y a substitué celui d'*abapus*.

ABATIA. MM. Ruiz & Pavon, dans la *Flore du Pérou*, ont établi ce genre pour des arbrisseaux de ce pays, dont les feuilles sont simples, entières, & les fleurs disposées en grappes presque terminales. Ils lui assignent pour caractère essentiel :

Un calice coloré, à quatre divisions; une corolle nulle, remplacée par plusieurs filamens qui en tiennent lieu, & qui sont insérés sous l'ovaire; des étamines nombreuses; un seul style; un stigmate simple; une capsule à une loge, à deux valves; un réceptacle linéaire & central, décurrent sur chaque valve, supportant des semences nombreuses, striées.

On distingue deux espèces d'*abatia*, sur lesquelles nous n'avons encore que très-peu de détails.

1. **ABATIA** à feuilles ridées. *Abatia rugosa.*

Abatia foliis oblongo-lanceolatis, rugosis; racemis terminalibus. Syst. veget. Flor. per. pag. 136.

Arbrisseau de quinze à dix-huit pieds de haut, qui croît sur les collines froides, au Pérou. Ses feuilles sont simples, oblongues, lancéolées, ridées; ses fleurs disposées en grappes terminales. h

2. **ABATIA** à petites fleurs. *Abatia parviflora.*

Abatia foliis lanceolato-oblongis, acutis, planis; racemis ex dichotomiâ. Syst. veget. Flor. per. l. c.

A

Ses tiges sont hautes de dix à douze pieds, rameuses, garnies de feuilles lancéolées, oblongues, planes, lisses, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes, situées dans l'aisselle des rameaux supérieurs. Cet arbrisseau croît au Pérou. Ses feuilles, ainsi que celles de l'espèce précédente, fournissent une couleur noire. *h*

ABERÈME. *Aberema*. Aubl. Cette plante doit être réunie aux *uvuria*. (Voyez CANANG, Suppl. & non le mot JERICOUX que M. de Lamarck n'a pas employé.)

ABIES. (Voyez SAPIN.)

ABLANIA. (Voyez ABLANIER.)

ABLANIER. *Ablania*. Aubl. & Lam. III. tab. 479. C'est le *trichocarpus laurifolia*. Schreb. Gen. & Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1214.

ABOLA. Adanf. C'est le genre *cinna*. Linn.

ABRASIN. (*Dryandra cordata*. Thunb. Flot. jap. tab. 27.) (Voyez DRIANDRE.)

ABROMA. (Voyez AMBROME.)

ABRONIA. Juss. (Voyez TRICRATE.)

ABROTANUM. Tourm. (Voyez ARMOISE.)

ABSINTHE. (Voyez ARMOISE.)

ABSINTHE bâtarde, nom que porte, à Saint-Domingue, le *parthenium hysseraphorus* Linn. (Voyez PARTHÈNE.)

ABSINTHE de montagne. La plante ainsi nommée à Saint-Domingue paroît être une espèce d'ambroisie, suivant le médecin Desportes, qui l'indique comme un bon résolutif dans les tumeurs, les fluxions & les rhumatismes. C'est peut-être la même plante que la précédente. (Juss.)

ABULFALI. Genre d'Adanson. C'est le *thymbra spicata* Linn.

ABUMON. Adanf. C'est le *erinum africanum* Linn., l'*Agapanthus* de Lhérit., vulgairement la tubéreuse bleue.

ABUTA. Aubl. (Voyez MÉHISPERME *abura*, n°. 19.)

ABUTILON. *Sida*. Ce genre, considérablement augmenté surtout par Cavanilles, a été di-

visé, par ce même savant, en trois antres, d'après la considération du fruit, réservant pour les *sida* ceux qui sont composés de plusieurs capsules monospermes ou polyspermes, disposées orbiculairement, renvoyant au genre *anada* ceux qui n'offrent qu'une seule capsule à plusieurs loges monospermes, & au genre *paleva* ceux à plusieurs capsules monospermes, qui ne s'ouvrent point & qui sont agglomérées ou comme amoncelées dans le calice persistant. Il faut donc retrancher des *sida*, le *sida cristata* Linn. (abutilon du Mexique, n°. 31), & le placer parmi les *anada*. Cavanilles a encore réuni aux *sida* le genre *napas*, qui n'en diffère que par ses fleurs souvent diques.

Observations. Les *sida* ont des feuilles alternes, pétiolées, accompagnées de deux stipules à la base des pétioles. La diversité de leurs formes a fourni le caractère de plusieurs subdivisions adoptées par Willdenow. Elles sont 1°. les unes étroites, lancéolées, oblongues ou ovales; 2°. les autres rétrécies en coin à leur base; 3°. d'autres en cœur, très-entières; 4°. d'autres en cœur, dentées; les pédoncules uniflores (c'est le plus grand nombre); 5°. mêmes feuilles, les pédoncules supportant plusieurs fleurs presque en grappes; 6°. enfin, des feuilles en cœur, à trois pointes ou anguleuses à leur base. Ces divisions, dans ce genre devenu très-nombreux, donnent plus de facilité pour distinguer les espèces, quoique les coupes soient très-irrégulières. M. de Lamarck a établi deux subdivisions, d'après le nombre des capsules, renfermant dans la première, les espèces dont les fruits sont composés de cinq capsules & plus, & dans la seconde celles dont les fruits ont dix capsules & plus.

Cavanilles ayant eu un bien plus grand nombre d'espèces à décrire, a multiplié ses subdivisions, dont les principales sont également appuyées sur la considération du fruit. Il partage d'abord ce genre en deux grandes coupes, d'après le nombre des semences dans chaque capsule: il distingue en conséquence, 1°. les capsules à une seule semence; 2°. celles à trois semences. Chaque coupe est de nouveau divisée d'après le nombre des capsules; 1°. de cinq à sept capsules; 2°. de sept à dix; 3°. de dix à trente. Considérant ensuite les feuilles dans les proportions de leur grandeur, il distingue, 1°. celles dont la longueur est égale à la largeur ou un peu plus grande, mais jamais double; 2°. celles dont la longueur est le double & plus de la largeur. Quoique ces coupes soient plus artificielles que naturelles, cependant Cavanilles, d'après l'examen d'un très-grand nombre d'espèces, a essayé d'établir quelques principes généraux, dont il a vu peu d'exceptions; c'est ainsi que, dans les espèces dont les fruits ne contiennent pas au-delà de dix capsules monospermes, il a remarqué que la corolle avoit ses pétales échancrés en deux lobes inégaux, l'un plus alongé & souvent aigu,

l'autre plus large & plus court; mais lorsque les fruits ont plus de dix capsules monospermes, ou lorsque les capsules contiennent plusieurs semences, alors les pétales sont entiers, crénelés ou à peine échancrés. Les capsules varient quant au nombre des semences; elles en contiennent deux à trois, quelquefois deux par avortement dans celles qui doivent en avoir trois. Le nombre des capsules est presque toujours impair dans les fruits, jamais au dessous de cinq. Les capsules monospermes vont jusqu'à dix, très-rarement à trente; celles à plusieurs semences vont de cinq à trente & plus. Les fruits à capsules monospermes sont renfermés dans le calice, & plus courts que lui. C'est le contraire pour les capsules polyspermes. Ces principes n'offrent jusqu'alors que très-peu d'exceptions.

Il est à remarquer que le pédoncule des fleurs est muni vers son sommet, un peu au dessous du calice, d'un anneau assez saillant dans quelques espèces, semblable à une articulation; remplacé, dans d'autres, par une ligne circulaire, d'où vient l'expression de *pédoncule articulé* ou *annulaire*, employée par Cavanilles. C'est, dans les deux cas, une véritable articulation; c'est le point où les fruits, & même les fleurs, se détachent du pédoncule.

Le nombre des styles est égal à celui des capsules; mais ces styles, rarement libres, sont plus ordinairement adhérents en tube autour de l'ovaire, à leur partie inférieure. Les filaments des étamines sont réunis en un seul corps tubulé, adhérent par sa base avec la corolle. Ce tube porte, à son sommet, des anthères presque globuleuses.

Les espèces nombreuses qui doivent être ajoutées à ce genre, m'ont déterminé à les présenter dans l'ordre adopté par Cavanilles, & à reprendre celles déjà citées dans cet ouvrage, mais bornant à les indiquer seulement par leur numéro, à moins qu'il ne faille y joindre quelques nouvelles observations. J'ai négligé les subdivisions établies d'après les formes ou les proportions de grandeur & de largeur des feuilles, comme offrant trop de variétés & d'incertitude.

Si l'on en excepte une seule espèce, le *Sida abutilon* qui croît en Europe, toutes les autres sont exotiques; originaires de l'Amérique ou des Indes orientales, quelques-unes d'Afrique, mais elles offrent l'avantage de pouvoir s'acclimater facilement parmi nous & d'exiger peu de soins. Il leur faut une bonne terre & une exposition au soleil. Leurs fleurs sont belles, d'un jaune plus ou moins foncé, rarement blanches; deux ou trois espèces sont des violettes ou purpurines. Les abutilons font agréables par leur port, par la beauté de leurs feuilles douces au toucher & coroneuses. Le nom de *Sida* est celui d'une ville en Béotie.

Quelques espèces de *Sida* ont été séparées de ce

genre, & réunies, par Cavanilles, en un genre particulier. (Voyez ANODE.)

ESPÈCES.

§. 1^{re}. Capsules à une seule semence.

* Cinq capsules.

1. ABUTILON nain. *Sida pusilla*. Cavan.

Sida foliis subrotundo-ellipticis, dentatis, glabris; pedunculis petiolo longioribus, solitariis; capsulis muticis, caule prostrato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 739.

Sida pusilla, caule fruticoso, reclinato, minimo; foliis ellipticis, dentatis, glabris. Cavan. Dissert. botan. t. pag. 6. tab. 1. fig. 4, & Dissert. 5. tab. 127. fig. 1.

§. Eadem, foliis minoribus, acutis.

Petite plante, haute d'environ trois pouces, dont les tiges sont ligneuses, cylindriques, couvertes de petits poils ouverts en étoile, chargées de feuilles alternes, petites, arrondies, presque elliptiques, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, accompagnées, à la base des pétioles, de deux petites stipules droites, subulées, capillaires. Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules droits, simples, plus longs que les pétioles. Les calices sont aigus à leur base, divisés, jusque vers leur milieu, en cinq découpures lancéolées. La corolle est jaune; le fruit renfermé dans le calice, composé de cinq capsules sans arête à leur sommet. La variété β a les feuilles plus petites, aiguës, semblables à celles du *melochia fupina* Linn., surtout à la figure de Plukenet, Almag. 131. fig. 4.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à l'île Mahé, où elle a été recueillie par Comberfon. H (V. f. in herb. Jaf.)

2. ABUTILON plumeux. *Sida plumosa*. Cavan.

Sida foliis ovatis, dentatis, retusis; floribus terminalibus, glomeratis; foliolis longis, linearibus, longè ciliatis, cancellatis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 7. tab. 12. fig. 4.

Malachra (plumosa), capsulis pedunculatis, polyphyllis, multifloris; foliis indivisis, ellipticis, dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 770. n°. 6.

Malachra plumosa. Desfouff. Encyclop. vol. 3. pag. 686. n°. 6.

De la même racine s'élèvent plusieurs tiges rameuses, hautes d'un demi-pied, munies de poils couchés. Les feuilles sont alternes, pétioles, ovales, entières, dentées vers leur sommet, obtuses, légèrement velues, accompagnées, à la base des pétioles, de deux stipules capillaires,

très-aiguës. Les fleurs sont médiocrement pétiolées, agglomérées à l'extrémité des tiges & des rameaux, entourées d'une sorte d'involucre de folioles inégales, les unes semblables aux feuilles, d'autres beaucoup plus étroites, quelques-unes presque filiformes, ciliées, plumeuses. Le calice est divisé, jusque vers sa moitié, en cinq découpures lancéolées, ciliées. La corolle est jaune; le fruit renfermé dans le calice, composé de capsules arrondies & fins arête à leur sommet.

Cette plante croît au Brésil, où elle a été recueillie par Commerçon. (*Descript. ex Cavan.*) Les folioles qui accompagnent les fleurs ne forment pas un véritable involucre, tel que celui des *malakras*; & cette plante ayant d'ailleurs tous les autres caractères des *sida*, il me semble qu'on doit la conserver dans ce genre.

3. ABUTILON à feuilles de véronique. *Sida veronicaefolia*. Lam.

Sida caule hirsuto; foliis cordatis, acutis, inaequaliter dentatis; pedunculis longissimis, suberectis, pilosis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 3. & Dissert. 5. pag. 274. tab. 127. fig. 3. — Lam. Dict. vol. 1. n°. 11.

Sida humilis, var. γ . Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. n°. 31.

Ses fruits sont renfermés dans le calice, composés de cinq capsules terminées chacune par deux pointes aiguës; ce qui distingue particulièrement cette espèce du *sida humilis*. Le calice est rétréci, aigu à sa base, divisé, jusqu'à sa moitié, en cinq découpures lancéolées. La corolle est blanche; les capsules, au nombre de cinq, terminées par deux pointes.

4. ABUTILON à tige basse. *Sida humilis*. Cavan.

Sida caule fruticosa, scabro; foliis cordatis, crenatis, orbiculatis, vill. fr. Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 177. tab. 134. fig. 1.

Sida (humilis), foliis subrotundo cordatis, supra pilosis, serratis; pedunculis subsistariis, petiolo longioribus; capsulis mucis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. n°. 31.

Ses tiges sont droites, à peine hautes de six pouces, brunes, rudes au toucher, très-rameuses à leur base; les rameaux étalés horizontalement, garnis de feuilles alternes, petites, en cœur, presque de la longueur des pétioles, un peu orbiculaires, acuminées à leur sommet, velues, crénelées à leur contour; les stipules étalées, subulées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues sur des pédoncules droits, plus longs que les feuilles. Le calice est pentagone, à cinq découpures. La corolle est jaune, étalée, un peu plus

grande que le calice; les pétales en cœur renversé; le tube des étamines court, terminé par des filamens très-courts, soutenant des anthères fort petites, jaunâtres, en forme de rein. L'ovaire est à cinq côtes, surmonté de cinq styles; les stigmates rougeâtres, globuleux. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de cinq capsules obtuses, à une seule semence.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

5. ABUTILON uniloculaire. *Sida unilocularis*. Lhérit.

Sida foliis rotundato-cordatis, dentatis, rugosis; seminibus semistillatis. Lhérit. Stip. Nov. 1. pag. 117 bis, tab. 56 bis.

Sida hamilis, var. α . Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. n°. 31.

Sida (pilosa), foliis subrotundis, cordatis, serratis, supra pilosis; seminibus scrobis. Retz. Obs. bot. 1. pag. 23.

Ses tiges sont hautes de deux pieds, rudes, pileuses, à rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, ovales, arrondies, en cœur, acuminées, ridées, velues, dentées en scie, à nervures saillantes, rougeâtres; accompagnées de stipules velues, subulées, étalées. Les fleurs sont solitaires, axillaires, quelquefois deux, portées sur des pédoncules filiformes, de la longueur des pétioles. La corolle est jaune, un peu plus grande que le calice; les pétales échancrés obliquement à leur sommet; le calice campanulé, à cinq découpures velues, lancéolées, aiguës. L'ovaire est arrondi, pentagone, surmonté d'un style filiforme, à cinq divisions étalées; les stigmates rougeâtres, en tête. Le fruit est composé de cinq capsules membraneuses, monoépètes, lesquelles, considérées comme cinq arilles par Lhéritier, semblent alors constituer un fruit capsulaire, à une seule loge.

Cette plante a été recueillie par Commerçon dans les Indes orientales, à l'île Maurice. O (*V. f.*)

6. ABUTILON rampant. *Sida repens*. Cavan.

Sida caule filiformi, longo, prostrato; foliis cordatis, crenatis, utrinque hispida; pedunculis anisotris. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 7. tab. 1. fig. 2.

Sida repens, foliis subrotundo-cordatis, dentatis, utrinque hispida; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; caule filiformi, prostrato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 745. n°. 32.

Cette plante a ses tiges couchées, mais point radicales, rameuses, cylindriques, allongées, presque filiformes, hérissées de poils cendrés, garnies de feuilles longuement pétiolées, ovales, un peu arrondies, munies de poils à leurs deux

faces, échancrées en cœur à leur base, dentées à leur contour, aiguës, un peu rudes; les stipules subulées, étalées.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, droits, filiformes, annulaires, plus longs que les pétioles, terminés par une seule fleur. Le calice est ovale, pentagone, à cinq découpures ciliées à leurs bords; la corolle jaune; les pétales marqués à leur base de quelques lignes purpurines. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq capsules monospermes, terminées par deux pointes. Cette espèce varie dans les découpures du calice, qui quelquefois ne sont point ciliées, & dans ses capsules dépourvues de pointes.

Cette plante croît au Pérou, & surtout aux environs de Lima, dans les lieux ombragés. Elle a été recueillie par MM. Jof. de Jusieu & Dombey. (*Descript. ex Cavan.*)

7. ABUTILON à feuilles de lierre. *Sida hederifolia*. Cavan.

Sida caule nodoso, radicante; foliis cordatis, obtusè crenatis, subhirsutis; capsulis corniculatis erectis, longis, humatis. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 8. n°. 5. tab. 9. fig. 3.

Sida hederifolia, foliis subrotundo-cordatis, obtusis, repandis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis biseriatis; caule prostrato, repente. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 758. n°. 73.

Malva hederifolia terrestris folio & caule, capsulis bifurcatis. Plum. Spec. 2, & Icon. 169. fig. 3.

Ses tiges sont grêles, rampantes, noueuses, alongées, très-glabres, poussant de petites racines à chaque nœud, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles longuement pétiolées, un peu arrondies, échancrées en cœur, légèrement pileuses, obtuses à leur sommet, finées ou à crénelures lâches à leur contour; les nervures fines, distantes, presque simples, un peu rameuses vers leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par de longs pédoncules simples, uniflores, souvent plus longs que les pétioles. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures ovales, lancéolées, aiguës; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice; les pétales irrégulièrement échancrés au sommet. Le fruit, beaucoup plus petit que le calice, est acuminé, composé de cinq capsules à deux filons, terminées par deux pointes droites, alongées, munies de quelques poils en crochet.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue, où elle a été recueillie par Plumier. (*Descript. ex Cavan.*)

8. ABUTILON à tige radicante. *Sida radicans*. Cavan.

Sida caule repente, furculis radicanibus; foliis cordato-acutis, pilosis, acutatis; dentibus in festam terminatis. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 8. n°. 6.

Sida radicans, foliis subrotundo-cordatis, acutis, ciliato-dentatis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis muticis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 755. n°. 62.

Nelu-vaga. Rheed, Hort. Malab. vol. 10. pag. 137. tab. 67.

Cette plante pousse des tiges rampantes, alongées, hérissées de poils blanchâtres; elles produisent des rejetons nombreux, cylindriques, étalés, munis de petites racines fibreuses. Les feuilles sont pétiolées, alternes, en cœur, un peu arrondies, molles, pileuses, aiguës à leur sommet, dentées à leur contour; les dentelures grandes, terminées chacune par un poil fuyant.

Les fleurs sont petites, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, plus longs que les pétioles. Le calice est divisé en cinq découpures ovales, très-aiguës. La corolle est traversée de veines blanchâtres; les étamines placées à l'extrémité d'un tube alongé; les anthers d'un jaune de safran. L'ovaire est arrondi; il lui succède un fruit composé de cinq capsules placées circulairement, monospermes, dépourvues de pointes à leur sommet.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Rheed.*)

9. ABUTILON à feuilles de mûrier. *Sida morifolia*. Cavan.

Sida foliis subrotundo-acutis, cordatis, lato-crenatis; crenulis acuminatis; pedunculis annulatis, petiolo paulo majoribus; calicibus pilosis. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 9. tab. 1. fig. 1.

Althea morifolia India occidentalis, ad foliorum finem capsulis singularibus, parvis. Pluken. Almag. pag. 25, & Phytogr. tab. 132. fig. 51.?

Sida humilis, var. β . Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. n°. 31.

Ses tiges sont droites, grêles, hautes d'environ deux pieds, ramuleuses, cylindriques, presque glabres; les rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, assez grandes, ovales, en cœur, un peu arrondies, aiguës à leur sommet, légèrement pileuses à leurs deux faces, crénelées à leurs bords; les crénelures élargies, très-aiguës; les pétioles un peu plus courts que les feuilles, accompagnés à leur base de deux stipules étalées, courtes, lézardées.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle

des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, droits, légèrement pileux, un peu plus longs que les pétioles. Le calice est ovale, hérissé de poils, divisé en cinq découpures ovales, aiguës. La corolle est jaune, un peu plus grande que le calice; le fruit globuleux, renfermé dans le calice, composé de cinq capsules terminées par deux pointes courtes.

Cette plante croît à l'île-de-France, où Commerson l'a observée. (*Descript. ex Cavan.*)

10. ABUTILON de l'île Bourbon. *Sida borbonica*.

Sida caule erecto, ramoso, hirsuto; foliis cordatis, subrotundo-ovatis, dentatis; floribus solitariis, axillaribus; pedunculis petiolo paulo longioribus. Cavan. *Dillert. bot. 1. pag. 9. tab. 10. fig. 2.*

Sida borbonica, foliis subrotundo-cordatis, ovatis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis baccatis, apice calice longioribus. Willd. *Spec. Plant. vol. 3. pag. 714. n. 60.*

Cette plante a ses tiges hérissées, droites, rameuses, hautes d'environ deux pieds; les rameaux garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, un peu arrondies, échancrées en cœur à leur base, presque glabres, dentées à leur contour, acuminées à leur sommet, soutenues par des pétioles hispides, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, supportées par des pédoncules simples, presque histormes, hérissées, plus longues que les pétioles. Le calice est ovale, divisé, jusqu'à la moitié, en cinq découpures terminées en dents aiguës; la corolle jaune; les pétales rétrécis à leur sommet, obliquement échançrés; les échançures inégales. L'ovaire est globuleux; le tube des étamines supportant à son sommet des anthères petites, feibles. Le fruit est renfermé dans le calice; il est composé de cinq capsules à doubles pointes, plus longues que le calice.

Cette plante a été recueillie à l'île Bourbon par Commerson. (*Descript. ex Cavan.*)

11. ABUTILON à grand calice. *Sida calicina*. Cavan.

Sida foliis cordatis, crenatis; calice magno, quinquepartito; corollis magnis, patentibus. Cavan. *Dill. bot. 1. pag. 9. tab. 8. fig. 2.*

Sida calicina, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, repando-dentatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis multatis, pyriformibus. Willd. *Spec. Plant. vol. 3. pag. 747. n. 39.*

Son port & ses tiges sont les mêmes que dans le *Sida borbonica*; mais les feuilles ont de larges crénelures obtuses, inégales; elles sont ovales, en

cœur à leur base, acuminées à leur sommet, soutenues par des pétioles plus courts que les feuilles, accompagnées de deux stipules latérales, aiguës, redoublées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, supportées par des pédoncules simples, droits, géniculés, presque une fois plus longs que les pétioles. Le calice est grand, divisé profondément en cinq découpures oblongues, lancéolées, aiguës. La corolle est grande, étalée, de couleur jaune; il lui succède un fruit renfermé dans le calice, composé de cinq capsules monospermes, en forme de poire, sans pointes.

Cette plante croît à l'île Bourbon, où elle a été découverte par Commerson. (*Descript. ex Cavan.*)

12. ABUTILON pileux. *Sida pilosa*. Cavan.

Sida caule piloso, ramoso; foliis crenatis, inferioribus cordatis, subrotundis, parvis, reliquis cordato-ovatis; pedunculis longis, geniculatis, pilosis. Cavan. *Dillert. bot. 1. pag. 9. tab. 1. fig. 8.*

Sida pilosa, foliis ovato-cordatis, obtusis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis baccatis, calice brevioribus. Willd. *Spec. Plant. vol. 3. pag. 756. n. 61.*

g. *Eadem, caulibus pedunculisque glabris.*

Cette plante est hérissée, sur toutes les parties, de poils nombreux. Ses tiges sont grêles, droites, rameuses, hautes d'environ deux pieds; les rameaux alternes, garnis de feuilles pétioles, crénelées à leur contour, un peu molles, velues; les inférieures plus petites, arrondies, en cœur; les autres ovales, plus grandes, échancrées en cœur à leur base; les stipules petites, étalées, tubulées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, placées sur le côté des rameaux, soutenues par des pédoncules plus longs que les pétioles, hérissés, uniflores. Le calice est petit, globuleux, à cinq laces, à cinq découpures aiguës à leur sommet. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de cinq capsules terminées par deux pointes.

Cette plante a été observée à Saint-Domingue par M. Desportes; à quelq'endroit elle est presque entièrement glabre. (*Descript. ex Cavan.*)

13. ABUTILON à tiges nombreuses. *Sida multicaulis*. Cavan.

Sida caulibus tenuibus, tomento-consensibus; foliis subrotundo-cordatis, dentatis, pulverulentis, villosis. Cavan. *Dillert. botan. 1. pag. 10. tab. 1. fig. 6.*

Sida multicaulis, foliis subrotundo-cordatis, acutis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo duplo

longioribus; capsulis muticis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 735. n°. 64.

Il s'élève de la même racine plusieurs tiges grêles, rameux, hautes de deux pieds, blanchâtres & tomenteuses, garnies de feuilles alternes, ovales, arrondies, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, dentées en scie, velues & presque tomenteuses, pulvérolentes à leurs deux faces; les pétioles velus, accompagnés à leur base de deux stipules très-étalées, courtes, presque capillaires.

Les fleurs sont latérales, placées, le long des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, beaucoup plus longs que les pétioles, pileux, géniculés, réfléchis à leurs articulations. Le calice est petit, à cinq fices; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice. Le fruit est beaucoup plus petit que le calice qui le renferme, composé de cinq capsules petites, obusées, dépourvues de pointes à leur sommet.

Cette plante croît sur les côtes du Malabar. (*V. f. in herb. Juss.*)

14. ABUTILON de Java. *Sida javensis.* Cavan.

Sida caule reclinato, subglabro; foliis cordatis, acutis, subobovato-crenatis. Cavan. Dict. bot. 1. pag. 10. tab. 7. fig. 5.

Sida javensis, foliis subrotundo-cordatis, dentatis, trinerviatis; pedunculis foliariis, axillaribus, petiolo longioribus; capsulis bicuspidatis, caule reclinato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 765. n°. 88.

Ses racines produisent plusieurs tiges foibles, inclinées, presque glabres, rameuses, longues d'un pied, garnies de feuilles distantes, pétioles, ovales, en cœur, presque aussi longues que larges, acuminées, crénelées à leurs bords, quelquefois à deux ou trois lobes aigus, peu prononcés; glabres ou à peine pileuses; les pétioles un peu plus courts que les feuilles, munis, à leur base, de deux stipules fort petites, capillaires, arquées, redressées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules plus longs que les pétioles, uniflores, géniculés. Le calice est ovale, divisé en cinq découpures lanceolées, aiguës à leur sommet; la corolle jaune; le fruit légèrement globuleux, renfermé dans le calice, composé de cinq capsules terminées par deux pointes.

Cette plante croît à l'île de Java, où elle a été découverte par Commerçon. (*Descript. ex Cav.*)

15. ABUTILON pyramidal. *Sida pyramidata.* Cavan.

Sida foliis cordatis, subrotundis, magnis, den-

tatis; panicula terminali, florulis numerosis. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 11. tab. 1. fig. 10, & Dissert. 6. pag. 549. tab. 194. fig. 1.

Sida pyramidata, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, serratis; pedunculis corymbois, bipaniculatis; capsulis biaristatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 759. n°. 77.

Abutilon palustre, spicae florum pyramidatae, flore parvo, exalido. Desp. Herb.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de deux pieds; les rameaux alternes, garnis de feuilles pétioles, ovales, échancrées en cœur, un peu arrondies, assez grandes, dentées à leur contour, acuminées; les pétioles presque aussi longs que les feuilles, excepté les supérieures; munis de deux stipules petites, droites, subulées.

Les fleurs sont petites, situées à l'extrémité des rameaux; les inférieures axillaires; les supérieures nues, formant par leur ensemble une panicule terminale, feuillée; chaque fleur soutenue par un pédoncule court, filiforme, accompagné, à sa base, d'une petite bractée subulée. Le calice est globuleux, à cinq faces, fort petit; la corolle jaunâtre, étalée, à peine plus longue que le calice. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq capsules terminées par deux pointes.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (*V. f. in herb. Desfont.*)

16. ABUTILON bivalve. *Sida bivalvis.* Cavan.

Sida foliis cordatis, orbiculato-acuminatis, tomentosis; floribus subsessilibus; fructu pentagono, depressio, glabro, patenti. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 13. tab. 11. fig. 3.

Sida bivalvis, foliis ovato-cordatis, acuminatis, crenatis, tomentosis; pedunculis foliariis, petiolo brevioribus; calicibus aristato-acuminatis; capsulis coherentibus, bidentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 745. n°. 33.

Cette plante est chargée, sur toutes ses parties, d'un duvet tomenteux. Ses tiges sont cylindriques, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, pétioles, ovales, acuminées, arrondies & échancrées en cœur à leur base, crénelées à leur contour, tomenteuses, un peu blanchâtres; les pétioles infiniment plus courts aux feuilles supérieures, accompagnés de deux stipules étalées, velues, subulées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par des pédoncules simples, très-courts, bien moins longs que les pétioles. Le calice est divisé assez profondément en cinq découpures allongées, très-aiguës, acuminées, presque aristées, très-ouvertes à la maturité des fruits; la corolle jaune, étalée, à peine de la longueur du calice; les pé-

tales entiers, obtus. Le fruit est renfermé dans le calice, à cinq angles, composé de cinq capsules tellement adhérentes qu'on pourroit, au premier aspect, les considérer comme ne formant qu'une seule capsule à cinq loges monospermes; chaque capsule s'ouvre en deux valves obtuses, à peine bidentées.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (V. f. in herb. Juss.)

17. *ABUTILON verticillé. Sida verticillata.* Cavan.

Sida caule piloso; foliis cordatis, acuminatis, crenatis; floribus subverticillatis, sessilibus. Cavan. Differt. bot. t. pag. 13. tab. 1. fig. 12.

Sida verticillata, foliis ovato-cordatis, acuminatis, dentatis; floribus subsessilibus, aggregatis, verticillatis; capsulis submuticis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 718. n° 74.

Cette espèce a ses tiges pileuses, droites, cylindriques, garnies de feuilles alternes, distantes, ovales, échancrées en cœur, acuminées, dentées à leurs bords; les pétioles deux fois plus courts que les feuilles; les stipules très-courtes, capillaires, étalées. Les fleurs sont presque sessiles, axillaires, ramassées par paquets presque en verticilles. Le calice se divise en cinq découpures pileuses, aiguës. Les fruits sont composés de cinq capsules presque mutiques, monospermes.

Cette plante croît au Brésil, sur les bords du Rio-Janeiro, où elle a été découverte par Commerson. (V. f. in herb. Juss.)

18. *ABUTILON odorant. Sida fragrans.* L'hérit.

Sida foliis imbricato-cordatis, rotundatis, ligulato-acuminatis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo brevioribus. L'hérit. Stirp. Nov. vol. 1. pag. 111. tab. 53.

Sida (fragrans), foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, crenatis, hirsuto-viscosis; pedunculis solitariis, petiolo brevioribus; capsulis biseptatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 743. n° 18.

Cette plante est odorante, velue, légèrement visqueuse. Ses tiges sont droites, cylindriques, velues, rameuses, presque ligneuses; les rameaux alternes, verdâtres, visqueux, garnis de feuilles pétioles, alternes, presque imbriquées, ovales, en cœur, presque rondes, dentées, acuminées, molles, velues, d'un vert-gai, très-étalées, souvent pendantes, amples, de la même longueur que les pétioles; les stipules subulées, arquées, velues.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules droits, filiformes, velus, articulés dans leur milieu. Le calice se divise en cinq

découpures oblongues, acuminées, velues, étalées, longues de six lignes. La corolle est jaune, un peu campanulée; les pétales un peu arrondis, cunéiformes & velus à leur base, une fois plus longs que le calice; les anthères réniformes, pédicellées; l'ovaire pentagone, velu; le style plus long que les étamines; à cinq découpures; les stigmates en tête. Le fruit consiste en cinq capsules velues, monospermes, à deux pointes étacées; les semences solitaires, arrondies, un peu pubescentes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (V. Descrip. ex L'hérit.)

19. *ABUTILON élégant. Sida arguta.* Swartz.

Sida foliis cordatis, serratis, apice attenuatis; caule virgato; pedunculis axillaribus, filiformibus, unifloris. Swartz. Prodr. pag. 101. & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1205. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 759. n° 63.

Sida (glabra), foliis cordatis, serratis, acuminatis, glabris; caule ramoso; pedunculis axillaribus, unifloris. Mill. Dict. n° 14.

Molwinda abutilifolia, acuminato; floribus parvis, luteis, ex alio foliorum; semine bidentate. Houtt.

Arbuste dont les tiges sont ligneuses, un peu grimpantes, foibles, cylindriques, rameuses; les rameaux étalés, très-longs, effilés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, ovales, en cœur, longuement rétrécies à leur sommet, inégalement dentées en fcie à leurs bords, glabres à leurs deux faces; les pétioles filiformes, de la longueur des feuilles; les stipules subulées, appliquées contre les tiges.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules simples, filiformes, plus courts que les feuilles. Le calice est pentagone, à cinq découpures droites, membraneuses, ovales, aiguës, persillantes; la corolle jaune; les pétales ovales, un peu sinués à leurs bords; les étamines monadelphiques; cinq styles étalés, autant de stigmates obus. Les capsules sont glabres, au nombre de cinq, monospermes, terminées par deux pointes.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Jamaïque, aux lieux arides, parmi les broussailles. (V. Descrip. ex Swartz.)

20. *ABUTILON des buissons. Sida dumosa.* Swartz.

Sida foliis cordatis, ovatis, acuminatis, serratis, utrinque glabris; floribus paniculatis. Swartz. Prodr. pag. 101. & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1209. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n° 79.

Ses tiges sont droites, ligneuses, lisses, cylindriques, rameuses; les rameaux alternes, étalés, alongés; les feuilles pétiolées, ovales, en cœur, largement acuminées, veinées, nerveuses, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, longues d'environ deux pouces; les pétioles cylindriques, pubescens, de la longueur des feuilles, accompagnés, à leur base, de deux stipules subulées.

Les fleurs sont nombreuses, ramassées, médiocrement pedicellées, réunies en une panicule terminale, droite, rameuse; les ramifications alternes, cylindriques, étalées. Le calice est pubescent, pentagone à sa base, à cinq découpures étalées, ovales, aiguës; la corolle d'un jaune pâle; les pétales ovales, obliques, onguculés à leur base; cinq à six styles; les ligamens obus. Les capsules font au nombre de cinq, quelquefois six, monopermes, hérisées de petits poils blanchâtres, terminées par une pointe subulée.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. *h* (Desf. ex Vahl.)

21. ABUTILON jaunâtre. *Sida flavescens*. Cavan.

Sida foliis ovato-cordatis, ovatis, inaequaliter dentatis; pedunculis geminatis, subspicatis, petiolo brevioribus; capsulis acutis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 755. n°. 61.

« *Sida* (prostrata), caule prostrato, foliis cordatis, latis, crenatis, tomentosis, flavescens; floribus flavis, geminis; capsulis muticis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 13. tab. 13. fig. 3.

β. *Sida* (flavescens), foliis cordatis, oblongis, crenatis, tomentosis, flavescens; floribus rubescens; geminis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 14. tab. 13. fig. 2.

Il est très-probable que ces deux plantes ne font que varier l'une de l'autre. La première a ses tiges couchées, dures, presque ligneuses, cylindriques, légèrement pubescentes, longues d'environ un pied, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, en cœur, obuses, crénelées à leur sommet, tomentées à leurs deux faces, un peu jaunâtres, nerveuses, réticulées, munies, à la base de leur pétiole, de deux stipules droites, subulées. Les fleurs naissent solitaires ou deux à deux dans l'aisselle des feuilles, sur des pédoncules courts, épais, géniculés, cylindriques, veus, simples, de la longueur des pétioles. Le calice est velu, globuleux, à cinq faces, un peu enflé, divisé en cinq découpures profondes, ovales, veinées. La corolle est jaunée, un peu plus longue que le calice. Le fruit contient cinq capsules un peu arrondies, aiguës à leur sommet, renfermées dans le calice.

La variété β diffère de la précédente par les Botanique. Supplément. Tome I.

tiges droites ou redressées. Les feuilles sont plus allongées, échanquées en cœur à leur base, ovales-oblongues, crénelées, tomentées, jaunâtres; les fleurs sont un peu rougeâtres, & les capsules sont quelquefois au nombre de six.

Cette plante a été recueillie, ainsi que sa variété, par Commerçon, sur les rochers, à Montevideo. *h* (V. f. in herb. Desfont.)

22. ABUTILON à feuilles de lin. *Sida linifolia*.

Sida foliis linearibus, hirsutis, integerrimis; floribus corymboso-spicatis, spicis terminalibus. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 14. tab. 2. fig. 1.

Sida linifolia, foliis linearibus, integerrimis; racemis terminalibus, capsulis submuticis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 734. n°. 1.

Malva hirsuta, gramineo folio. Barret. France-équinox. pag. 72. — Aubl. Guian. vol. 2. pag. 704.

Malva linariaefolia, flore albo. Jof. de Juss. Herb.

β. *Eadem, caule simpliciter, gracili; racemo terminali*.

Ses tiges sont ligneuses, hautes de deux pieds, rameuses, cylindriques, velues, garnies de feuilles alternes, très-peu pétiolées, linéaires, fort étroites, longues de trois pouces & plus, entières à leurs bords, pileuses à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, à nervures peu saillantes; les pétioles velus, accompagnés de deux stipules droites, subulées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une grappe ou une foule d'épi droit, pubescent; les pédoncules & pédicelles géniculés, uniflores, munis à leur base de petites bractées très-courtes. Le calice est anguleux, couvert de poils blanchâtres, anguleux, à cinq découpures lancéolées; la corolle blanche; le fruit renfermé dans le calice, à cinq capsules à peine aiguës. Dans la variété β, les tiges sont simples, hautes de trois pieds & plus, g. éles, terminées par une grappe de fleurs.

Cette plante croît à Cayenne & au Pérou. *h* (V. f. in herb. Desfont.)

23. ABUTILON à feuilles étroites. *Sida angustifolia*. Lam.

Sida foliis angustis, oblongis, serratis; axillis subsinopis; trium spinularum medio major. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 14. tab. 2. fig. 2, & Diff. 2. pag. 48.

Sida angustifolia, foliis linearibus, dentatis, subulatis glaucis, subtomentosis, nudis, subspinosissimis. Lherit. Stirp. Nov. vol. 1. pag. 89. tab. 12.

Sida angustifolia, foliis linearibus-lanceolatis, den-

tatis; pedunculis subsiliariis, axillaribus; capsulis bicuspidatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 734. n°. 2.

Sida angustifolia, foliis angustis, oblongis, serratis; axillis subsimplicibus, trium spinularum media majori. Murr. Syst. veg. edit. 14. pag. 621.

Sida (ulmifolia), foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus linearibus, omnibus serratis; capsulis bicuspidatis. Retz. Obs. bot. 3. pag. 37.

Sida angustifolia. Lam. Dict. vol. 1. n°. 1.

Ses feuilles sont molles, douces au toucher, elles varient dans leur longueur, & sont d'autant plus étroites, qu'elles se rapprochent davantage du sommet des rameaux. Les fleurs contiennent seize étamines. Les anthères sont petites, arrondies, soutenues par des filaments courts, fixés à l'extrémité du tube. L'ovaire est orbiculaire, à cinq filons; cinq styles à peine connexes à leur base, de couleur purpurine, autant de stigmates globuleux. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de cinq capsules, terminées chacune par deux pointes presque épineuses; les semences un peu triangulaires, noires. (Voyez Dict. n°. 1.)

24. ABUTILON à feuilles aiguës. *Sida acuta.* Cavan.

Sida foliis anguste lanceolatis, dentatis, inferius integris; floribus subsiliariis, foliariis. Cavan. Diss. bot. 1. pag. 15. tab. 2. fig. 3.

Sida acuta, foliis linearibus lanceolatis, dentatis; pedunculis subsiliariis, axillaribus; capsulis bicuspidatis, stipulis lanceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 735. n°. 3.

Sida foliis lanceolatis, serratis; stipulis sericeis; floribus axillaribus, foliariis. Baill. Ind. 147.

Althaa coromandeliana, angustis, prolongis foliis; semine biconi. Plukenet, Mantiss. 10. tab. 324. fig. 2.

Silogium longifolium. Rumph. Amb. 6. pag. 43. tab. 18. fig. 2.

Tiffin parva. Rheed. Malab. vol. 10. pag. 105. tab. 53.

Très-rapprochée de l'espèce précédente, celle-ci en diffère cependant par ses tiges, qui s'élèvent à la hauteur de quatre & six pieds. Les racines sont très-longues, diffuses à arracher; les feuilles à peine pétiolées, plus aiguës, aucune apparence d'échues dans les axilles. Les stipules sont lanceolées & non setacées, plus longues que les pétioles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à Java, dans l'île d'Amboine. (F. J.)

25. ABUTILON blanc. *Sida alba.* Linn.

Sida foliis cordatis, subrotundis; stipulis setaceis, axillis subsimplicibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 960. Non Cavan.

Sida foliis oblongo-cordatis, rotundato-obtusis, dentatis; pedunculis petiolo equalibus, capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 737. n°. 71.

Althaa rostrata, coromandelensis, pimpinella majoris folio subrotundo, semine biconi. Pluk. Amag. pag. 26. tab. 9. fig. 3.

Sida alba. Lam. Dict. 1. n°. 3.

La plante que M. Cavanilles a nommée *Sida alba*, ne doit pas être confondue avec celle-ci. On la trouvera mentionnée sous le nom d'*Abutilon des Canaries*. (Voyez pour celle-ci l'ABUTILON BLANC, Dict. n°. 7.)

26. ABUTILON épineux. *Sida spinosa.* Linn.

Sida foliis ovato-cordatis, serratis; stipulis sericeis, axillis subsimplicibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 961. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 11. tab. 1. fig. 9. — Swartz, Obs. 257. — Vahl, Symbol. 2. pag. 78.

Sida spinosa, foliis ovato-lanceolatis, obsoletis cordatis, dentatis; pedunculis subsiliariis, axillaribus; axillis subsimplicibus; stipulis setaceis; pedunculo longioribus; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 336. n°. 6.

Sida (spinosa), caule petalo; axillis subsimplicibus; foliis longiuscule petiolatis, cordato-ovalibus vel oblongis; floribus pusillis, breviuscule petiolatis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 43.

Sida foliis cordato-ovatis, serratis; capsulis quinis, bicuspidatis. Hort. Cliff. 346.

Stewartia (corymboides), foliis ovatis, serratis, subtus villosis. Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 126.

Ma'va erecta, minor, carpinifolia; flore luteo; seminebus singulis, simplicibus acaule longiori dentatis. Sloan, Catal. 56. litt. 3. pag. 218.

Alcea carpinifolia, americana, frutescens, flosculis luteis, semine duplè rostrato. Commel. Hort. 1. pag. 3. tab. 2.

Althaa virginiana, biens, pimpinella majoris acutioris folio, flosculis minimis, luteis. Pluk. Alm. pag. 25. tab. 9. fig. 6.

Sida spinosa. Lam. Dict. vol. 1. n°. 2.

Ses fleurs sont jaunes; les pétales étalés, à deux lobes peu profonds à leur sommet, inégaux; l'un des deux plus long, plus aigu; les anthères arroyées, placées à l'extrémité du tube des filaments; l'ovaire orbiculaire, à cinq filons; le style simple, à cinq découpures; les stigmates en tête; les lani-

renfermés dans le calice, contenant cinq capicules à deux pointes. (Voyez les autres détails à l'article ABUTILON épineux, n°. 2.) On cultive cette plante au Jardin des Plantes de Paris.

27. ABUTILON ligneux. *Sida frutescens*. Cavan.

Sida foliis ovato-oblongis, serratis, subius albicantibus; pedunculis erectis, unifloris, folio duplo minaribus. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 11. tab. 10. fig. 1.

Sida frutescens, foliis ovato-oblongis, serratis; pedunculis unifloris, axillaribus; capsulis biseriatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 736. n°. 7.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, rameuses, hautes de quatre pieds, un peu comprimées & légèrement pubescentes à leur partie supérieure, d'un brun-foncé, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales-oblongues, bombreuses, rétrécies à leur base, à peine aiguës à leur sommet, légèrement pubescentes, presque glabres, dentées en scie, accompagnées à leur base de stipules droites, capillaires.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, géniculés, une fois plus longs que les pétioles. Le calice est anguleux, de forme pyramidale, à cinq découpures planes, aiguës; la corolle jaune, peu ouverte; les pétales échancrés au sommet en deux lobes inégaux; un ovaire globuleux, surmonté de cinq styles & d'autant de stigmates en tête. Le fruit est contenu dans le calice, composé de cinq capicules à deux pointes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

28. ABUTILON bicolore. *Sida bicolor*. Cavan.

Sida caule frutesco, erecto; ramis parvis; foliis lanceolatis, vix acuminatis, serratis; floribus axillaribus, solitariis. Cavan. Icon. Bar. vol. 4. pag. 6. tab. 311.

Ses tiges sont cylindriques, hautes de deux pieds, d'un vert tirant sur le violet, divisées en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, très-acuminées, dentées en scie, entières à leur base, les supérieures longues de deux à trois pouces; les pétioles beaucoup plus courts que les feuilles, accompagnés de deux stipules tubulées, caduques.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules droits, longs d'un pouce. Le calice est divisé en cinq découpures colorées, aiguës; la corolle rougeâtre en dehors, d'un jaune-foncé en dedans; les pétales étalés, rétrécis à leur base, un peu échancrés inégalement à leur sommet; les anthères ovales, pédicellées; l'ovaire

globuleux, à cinq faces peu marquées; cinq styles réfléchis, plus longs que les étamines; les stigmates globuleux. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq capicules monoépérmes, mutiques; les semences réniformes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne; elle fleurit au mois d'octobre dans le Jardin de Madrid. (Description ex Cavan.)

29. ABUTILON échancré. *Sida emarginata*. Willd.

Sida foliis ovato-lanceolatis, cordatis, dentatis, apice truncatis, retusis; pedunculis priuslo duplo brevioribus, capsulis biseriatis. Willd. Sp. ex. Plant. vol. 3. pag. 757. n°. 70.

Sida (truncata), foliis cordato-oblongis, retusis, serratis; stipulis serratis, nodis subversipinnis. L'herit. Stirp. Nov. 1. pag. 107. tab. 51.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, sur une tige droite, cylindrique, un peu ligneuse, divisée en rameaux très-étalés, souvent munis de trois petites épines à leurs nœuds. Les feuilles sont ovales-oblongues, en cœur, tronquées à leur sommet, un peu idées, dentées à leur contour, vertes, glabres à leur face supérieure, un peu pubescentes en dessous, longues de trois pouces & plus, soutenues par des pétioles presque de moitié plus courts que les feuilles; les stipules droites, tubulées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, les pédoncules filiformes, articulés à leur sommet, plus courts que les pétioles; le calice pubescent, campanulé, à cinq découpures étalées, lancéolées, aiguës; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice; les pétales oblongs, triangulaires, tronqués obliquement à leur sommet, à échancrure inégale, un peu pubescents; les anthères réniformes, pédicellées; l'ovaire velu, pentagone; un style à cinq découpures réfléchies; les stigmates jaunâtres, en tête. Le fruit est composé de cinq capicules monoépérmes, renfermés dans le calice, bruns, velus, à deux cornes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (V.)

30. ABUTILON couché. *Sida lupina*. L'herit.

Sida foliis fibratundis cordatis, obtusifolius, crenatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis biseriatis, caule procumbente. Willd. n. Spec. Plant. vol. 3. pag. 756. n°. 67.

Sida (lupina), foliis cordato-ovatis, crenatis; caulis filiformibus, prostratis. L'herit. Stirp. Nov. 1. pag. 109. tab. 51.

Sida (procumbens), foliis cordatis, ovato-fibratundis, serratis, villosis; caulis procumbentibus.

Swartz, Prodr. pag. 102, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1211.

Sida (ovata), caule prostrato, ramofo; foliis ovatis, cordatis, crenatis; floribus axillaribus, foliariis, pedunculatis. Cavan. Dissert. 6. pag. 350. tab. 196. fig. 2.

Cette plante a le port d'une véronique. Ses tiges sont couchées, cylindriques, très-rameuses, un peu ligneuses à leur base; les rameaux étalés, alongés, presque filiformes, un peu hérissés vers leur sommet; les feuilles petites, alternes, distantes, ovales, un peu arrondies, en cœur, presqu'obtusées, pubescentes, blanchâtres en dessous; les pétioles pubescens, plus longs que les feuilles; les stipules subulées, étalées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires; les pédoncules filiformes, un peu pubescens, plus courts que les feuilles; le calice campanulé, blanchâtre, à cinq angles, à cinq découpures ovales-lancéolées, aiguës; la corolle d'un jaune-pâle, à peine plus longue que le calice; les pétales en cœur, sinués, un peu échancrés; les anthères réniformes; l'ovaire pentagone; cinq styles adhérens par leur base. Le fruit est composé de cinq capsules monospermes, terminées par deux cornes divergentes, plus longues que le calice.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. & (V. f.)

31. ABUTILON à feuilles d'orme. *Sida ulmifolia*. Cavan.

Sida foliis cordato-oblongis, longè acuminatis, crenatis; capsularum rostris elongatis, humatis. Cav. Dissert. botan. 1. pag. 15. tab. 2. fig. 4.

Sida ulmifolia, foliis ovato-cordatis, acuminatis, crenatis; pedunculis foliariis, petiolo subaequalibus; capsulis rostratis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 745. n°. 34.

Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, hautes de deux pieds, garnies de feuilles pétiolées, ovales, échancrées en cœur à leur base, rétrécies à leur sommet en une longue pointe, crénelées à leur contour, glabres à leurs deux faces, une fois plus longues que leur pétiole, accompagnées par leur base de deux stipules droites, subulées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, geniculés, à peine plus longs que les pétioles. Le calice est ovale, à cinq faces, à cinq découpures; il renferme un fruit à cinq capsules, qui se terminent chacune par une pointe allongée, courbée en hampe.

Cette espèce croît à l'île de Saint-Domingue. (Descript. ex Cavan.)

32. ABUTILON piquant. *Sida urens*. Linn.

Sida foliis cordatis, acuminatis, serratis, hispida; pedunculis multifloris, axillaribus & terminalibus. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 15. tab. 2. fig. 7.

Sida urens, foliis cordatis, serratis, hispida; pedunculis multifloris, glomeratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 422. n°. 66. — Murr. Comment. Goett. vol. 3. pag. 75. tab. 5. — Swartz, Observ. botan. 261.

Sida urens, foliis ovato-cordatis, acuminatis, dentatis; pedunculis axillaribus, multifloris, glomeratis; capsulis mucicis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 759. n°. 75.

Sida urticata, foliis cordatis, serratis; floribus capitatis, pedunculis communibus alaribus. Brown, Jam. pag. 280.

Althaea spicata, beronica folio villosa; spica brevior & laxa. Sloan, Catal. pag. 97. Hist. 2. pag. 44.

Non *sida urens* Lam., quæ est pavonia urens. Cavan.

La description que M. de Lamarck a donnée du *sida urens* (ABUTILON à poils piquans, n°. 17), en doit point le rapporter à cette espèce de Linné, mais au pavonia urens Cavan. (Voyez PAVON piquant, vol. 5, n°. 8.) Celle dont il s'agit ici a des tiges droites, cylindriques, hautes de deux pieds; des feuilles entières & non anguleuses, longuement pétiolées, ovales, acuminées, dentées à leur contour, couvertes de poils roides, de même que les tiges, les pétioles, les pédoncules & les calices; les stipules étalées, setacées.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes courtes, peu garnies; une fleur solitaire, pédunculée à la base de chaque grappe. Le calice est pentagone, divisé en cinq découpures pileuses, terminées par une pointe courte. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq capsules à peine aiguës.

Cette plante croît à la Jamaïque. &

33. ABUTILON glutineux. *Sida glutinosa*. Cav.

Sida caule tomentoso, glutinoso; foliis magnis, cordatis, oblongis, acuminatis, subius tomentosis, superioribus parvis; capsulis biaristatis, aristis calice longioribus. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 16. tab. 2. fig. 8.

Sida glutinosa, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, dentatis; pedunculis geminatis, subulosis, petiolo longioribus; capsulis biaristatis, aristis calice longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. 37.

Sida racemosa, foliis crenatis, villosis, cordatis; racemis axillaribus, multifloris. Buem. Flor. lud. 2

Ses tiges sont droites, cylindriques, couvertes d'un duvet glumineux, hautes de deux pieds & plus; les rameaux nombreux, paniculés, garnis de feuilles alternes, diluantes, longuement pétioles, assez grandes, ovales, en cœur, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leurs bords, tomenteuses à leur face inférieure; les feuilles supérieures beaucoup plus étroites & plus petites; les pétioles cylindriques, munis à leur base de deux stipules petites, sétacées, étalées.

Les pédoncules sont ordinairement, comme dans le *Sida arens*, au nombre de deux dans chaque aisselle, capillaires, drois, alongés, géniculés, simples & uniflores; quelquefois l'un des deux porte deux ou à peine trois fleurs pédicellées. Le calice est globuleux, légèrement anguleux, divisé en cinq découpures très aiguës à leur sommet. Le fruit est renfermé dans le calice; il est composé de cinq capsules; chacune d'elles surmontée de deux pointes alongées.

Cette plante croît à Saint-Domingue. Commerson l'a également observée à l'Île-de-France. (V. f.)

34. ABUTILON paniculé. *Sida paniculata*.

Sida foliis cordato-oblongis, acuminatis, serratis, subtus tomentosis; pedunculis capillaribus, longissimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 962. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 401. — Lhérit. Stirp. 1. pag. 412. — Cavan. Diss. bot. 1. pag. 16. tab. 12 fig. 5.

Sida paniculata, foliis cordato-ovatis, acuminatis, serratis, hirsutiusculis; floribus paniculatis; pedunculis longissimis, capillaribus. Swartz, Obs. bot. pag. 159.

Sida paniculata, foliis ovato-cordatis, dentatis; racemis paniculatis, capsulis hirsutis. Var. α . Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n°. 78.

Sida foliis cordato-acuminatis; pedunculis longis, tenuissimis, capillaribus, alaribus; inferioribus simplicibus, superioribus ramosis. Brown, Jam. p. 280.

Sida paniculata. Lam. Dict. vol. 1. n°. 13. *Delcous Plukenetii* synonymon.

Ses tiges sont gûtes, simples, pubescentes, hautes de deux pieds, légèrement rameuses & paniculées à leur sommet, garnies de feuilles ovales, en cœur, pubescentes en dessous, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur contour, veinées à 3 ou 5 ou 7 nervures faillantes; les pétioles légèrement tomenteux; les stipules subulés, plus longues que les pétioles.

Les fleurs font axillaires, & forment par leur ensemble une panicule grêle, alongée. Les pédoncules sortent ordinairement au nombre de deux de chaque aisselle, l'un presque simple, uniflore;

l'autre rameux, plus alongé, garni de quatre à six fleurs & plus, pédicellées. Ces pédoncules, tant communs que partiels, sont longs, étalés, capillaires, presque glabres, accompagnés à leur base de très-petites bractées courtes, aiguës. Le calice est ovale, presque globuleux, à cinq divisions ovales, aiguës; la corolle jaune, simple; elle renferme cinq styles, auxquels succèdent des fruits globuleux, de la grandeur du calice, contenant cinq capsules à deux petites pointes à peine sensibles.

Cette plante croît à la Jamaïque & au Pérou. (V. f.)

35. ABUTILON à pédoncules capillaires. *Sida capillaris*. Cavan.

Sida foliis cordato-oblongis, tomentosis; pedunculis longissimis, capillaribus; corollis minimis, maculatis, subreflexis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 10. tab. 1. fig. 7, & Dissert. 5. pag. 274.

Sida (atro-sanguinea), foliis cordatis, acutis, serratis, utrinque villosis; pedunculis antheris, foliariis, capillaribus; caul. fruticoso. Jacq. Collect. vol. 1. pag. 49, & Icon. Rar. vol. 1. tab. 136.

Sida paniculata, var. β . Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n°. 78.

Quoique cette plante réunisse une partie des caractères du *Sida paniculata*, elle en diffère par son port, par ses fleurs foliaires & non paniculées, par sa corolle, &c. Ses tiges sont droites, ligneuses, tomenteuses, hautes d'environ deux pieds & plus, garnies de feuilles ovales, en cœur, velues à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, dentées en scie à leur contour, assez grandes; les supérieures plus & bien moins pétioles; les stipules droites, sétacées.

Les fleurs sont foliaires, situées dans l'aisselle des feuilles, portées sur de longs pédoncules simples, capillaires, alongés, géniculés. Le calice est petit, globuleux; la corolle fort petite, réfléchie en dehors, divisée en cinq pétales d'un jaune foncé, tachetés de noir à leur base; le tube des étamines grêle, alongé, velu à sa partie supérieure; les styles rougeâtres, au nombre de cinq; les stigmates velus, en forme de tête. Le fruit, plus court que le calice, est composé de cinq capsules, à deux pointes chacune.

Cette plante croît au Brésil & au Pérou. (V. f.)

36. ABUTILON visqueux. *Sida viscosa*. Linn.

Sida foliis cordatis, crenatis, tomentosis; floribus subsessilibus; capsulis septemlocularibus, rotundis, depressis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 401. — Swartz, Observ. bot. pag. 159. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 17.

Sida (viscosa), foliis ovato-cordatis, acuminatis, tenuissimè serratis, tomentoso-viscosi, pilosis, pedunculis subsistatis, petiolo longioribus; capsulis mucicis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 746. n°. 37.

Sida viscosa s. u. *villosa*, foliis cordatis, acuminatis; petiolis longis; pedunculis tenuibus, foliatis. Brown, Jam. pag. 280.

Althea populifolia, villosa, leviter serrata. Sloan, Jam. 98. Hist. 1. pag. 222. tab. 139. fig. 4.

Sida viscosa. Lam. Dict. vol. 1. n°. 10. Non Lhérit.

C'est un arbrisseau dont les tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds, divisées en rameaux étalés. Les fleurs sont jaunes. Les fruits renferment sept capsules comprimées latéralement, obtuses à leur sommet. M. Poiteau l'a recueillie à Saint-Domingue. (V. f.) Toure la plante est visqueuse, & répand une odeur forte.

37. ABUTILON de la Jamaïque. *Sida jamaicensis*. Linn.

Sida foliis ovatis, serratis, tomentosis; floribus axillaribus, subsedunculatis; seminibus quinis, bicornibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 961. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 401. — Swartz, Obf. bot. pag. 218. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 17. tab. 2. fig. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 737. n°. 9. — Lam. Dict. vol. 1.

Sida humilior, foliis ovatis, serratis, distichè stis; petiolis & pedunculis brevibus; ramulis floriferis foliolatis, alaribus. Brown, Jam. 280.

Abutilon à feuilles d'orme. Lam. n°. 9.

Ses tiges sont hautes de deux pieds; ses feuilles ovales, aiguës; les stipules droites, lancéolées; les fleurs axillaires, presque sessiles; le calice globuleux; les fruits renfermés dans le calice, composés de cinq capsules terminées par deux pointes aiguës.

38. ABUTILON à fleurs agglomérées. *Sida glomerata*. Cavan.

Sida foliis ovato-lanceolatis, dentatis, subsessilibus; floribus conglomeratis, sessilibus. Cavan. Dissert. bot. pag. 18. tab. 2. fig. 6.

Sida glomerata, foliis ovato-lanceolatis, serratis; floribus subquinis, axillaribus, subsessilibus; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 738. n°. 11.

Æ. *Eadem, foliis majoribus, capsulis mucicis*.

Cette espèce s'élève à la hauteur d'environ un pied, sur une tige droite, simple, tomenteuse. Les feuilles sont ovales-lancéolées, à peine pétiolées, dentées en scie, tomenteuses; les stipules

droites, lancéolées. Les fleurs sont sessiles ou presque sessiles, réunies au nombre de cinq à six par paquets dans l'aisselle des feuilles. Le calice est cilie; la corolle jaune; le fruit composé de cinq capsules à deux pointes. La variété β a les feuilles plus grandes, & les capsules presque obuses.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (V. f. in herb. Juss.)

39. ABUTILON à coiffe. *Sida calyptata*. Cavan.

Sida caule herbaceo, glabro; foliis cordatis, ovato-lanceolatis, oblongis, dentatis; floribus solitariis, seminibus calyptatis. Cavan. Dissert. 1. pag. 57. n°. 93. & Dissert. 5. pag. 276. tab. 133. fig. 1.

Sida (nutans), foliis cordatis, acutis, dentatis; capsulis depressis, multilocularibus; loculamentis introrsum appendiculatis. Lhérit. Stip. Nov. 1. pag. 119. tab. 57 bis.

Sida nutans, foliis oblongo-cordatis, acutis, dentatis; pedunculis subgeminatis, petiolo longioribus; floriferis nutantibus, capsulis obusis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 754. n°. 59.

Ses tiges sont droites, glabres, herbacées, cylindriques, hautes de plus de trois pieds, divisées en rameaux redressés; les feuilles distantes, pétiolées, ovales-lancéolées, en forme de cœur, oblongues, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur contour; les pétioles plus courts que les feuilles, accompagnés à leur base de deux stipules droites, capillaires.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, quelquefois geminés, très-longs, redressés, capillaires, géniculés, uniflores, inclinés au moment de la floraison. Le calice est globuleux, à cinq découpures élargies, aiguës; la corolle d'un jaune de soufre-foncé, étalée, une fois plus longue que le calice; les pétales inégalement échanclés; les étamines s'étendant à l'extrémité du tube des filaments; les anthères arrondies. Le style est globuleux, filiforme, surmonté de dix stigmates. Le fruit est presque rond, comprimé, à dix cannelures, un peu plus long que le calice, composé de dix capsules obuses, monospermes; les semences presque ovales, comprimées, placées au fond des capsules, recouvertes d'une sorte de coiffe arquée, lancéolée, munie de chaque côté de dents saillantes, s'étalant lorsque les capsules s'ouvrent. Ce caractère se retrouve dans le *Sida occidentalis*.

Cette plante croit aux environs de Lima, dans les lieux sablonneux, où elle a été découverte par Dombey. ☉ ? (D. script. ex Cavan.)

40. ABUTILON à feuilles d'aune. *Sida alnifolia*. Linn.

Sida foliis serratis, subvillosis, inferioribus rotun-

dentis, cordatis; mediis ellipticis, f. superioribus lanceolatis. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 12. tab. 1. fig. 13. — Dillen. &c.

Sida alnifolia, foliis orbiculatis, serratis, plicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. n° 4.

Sida alnifolia; foliis subrotundo-obovatis, dentatis, basi integerrimis; pedunculis plurius, axillaribus, folio brevioribus; capsulis bicornibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 741. n° 21.

Sida alnifolia. Lam. Dict. 1° 5.

Ses feuilles inférieures sont arrondies, en cœur; celles du milieu elliptiques, les supérieures lancéolées; les stipules droites, subulées, légèrement ciliées; les fleurs semblables à celles de l'abutilon épineux. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq à sept capsules terminées par deux pointes. (Voyez ABUTILON à feuilles d'aune, n° 5.)

* * Capsules au nombre de sept à dix.

41. ABUTILON à feuilles de chaire. *Sida carpinifolia.* Linn.

Sida fruticosa, foliis bifidis, ovato-lanceolatis, serratis; serraturis aristatis, umbellis axillaribus. Linn. f. Suppl. pag. 307. — Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 135. & Col. &c. vol. 1. pag. 38. — Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 274. tab. 134. fig. 1, & Dissert. 1. pag. 21.

Sida carpinifolia, foliis ovato-oblongis, subaplicatis; serratis; pedunculis axillaribus, squamuliferis; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 737. n° 8.

Sida (planiculata), foliis ovato-lanceolatis, serratis; caule compresso, floribus subsessilibus. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 24. tab. 3. fig. 11. (Junior planta.)

Sida jamaicensis, var. β, carpinifolia. Lam. Dict. vol. 1. pag. 4. n° 9.

Cette plante paroît tenir le milieu entre le *Sida jamaicensis* & le *Sida glomerata*; elle est bien distincte de ces deux espèces par son port & par ses capsules plus nombreuses. Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes d'un à deux pieds & par ses rameaux étalés, diffus, comprimés, légèrement pileux, sur deux rangs opposés, garnis de feuilles médiocrement pétioles, placées sur deux rangs, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, fixement & un peu inégalement dentées en scie, veinées; chaque dentelure terminée par un petit poil rude; les stipules droites, subulées, connées, plus longues que les pétioles.

Les fleurs, rarement solitaires, sont disposées trois à cinq ensemble, dans l'aisselle des feuilles, en forme de petites ombelles pileuses, de la longueur des pétioles. Leur calice est glabre, la co-

rolle jaune. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de huit capsules selon Linné: j'en ai compté jusqu'à neuf, toutes terminées par deux pointes un peu divergentes. Le *Sida planiculata* de Cavanilles est la même plante, mais plus jeune.

Cette plante croît à l'île de Madère, à Saint-Domingue. h (V. f.)

42. ABUTILON à feuilles émoussées. *Sida retusa.* Linn.

Sida foliis canaliculatis, retusis, serratis, subulis tomentosis. Linn. Spec. vol. 2. n° 6. — Cav. Dissert. bot. 1. pag. 18. tab. 3. fig. 4, & Dissert. 5. p. 274. tab. 131. fig. 2.

Sida retusa, foliis obovatis, apice dentatis, retusis, subulis tomentosis; pedunculis solitariis, folio longioribus; capsulis muticis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 740. n° 10. — Rumph. & Pluken.

Sida retusa. Lam. Dict. vol. 1. n° 6.

Ses feuilles sont accompagnées, à leur base, de deux petites stipules droites, subulées. Le calice est anguleux; il renferme un fruit composé de neuf capsules dépourvues de pointes. (Voyez ABUTILON à feuilles émoussées.)

43. ABUTILON à fleurs nombreuses. *Sida multiflora.* Cavan.

Sida foliis ovatis, dentatis, tomentosis; floribus numerosis, pedunculis petiolo longioribus. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 18. tab. 3. fig. 3.

Sida multiflora, foliis ovato-cordatis, obtusiusculis, dentatis, tomentosis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 746. n° 35.

Ses tiges sont cylindriques & tomenteuses; les feuilles légèrement pétioles, ovales, un peu en cœur, médiocrement obtuses, dentées en scie, tomenteuses, accompagnées de stipules droites, subulées, velues. Les fleurs sont solitaires, axillaires, nombreuses, situées vers l'extrémité des rameaux, rapprochées & supportées par des pédoncules velus, uniflores, un peu plus longs que les pétioles. Le calice est un peu globuleux, anguleux, à cinq découpures lancéolées; la corolle jaune; le fruit renfermé dans le calice, composé de neuf capsules à deux pointes alongées. Ces pointes forment, par leur rapprochement, un tableau remarquable.

Cette espèce croît au Brésil, où elle a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

44. ABUTILON à feuilles en cœur. *Sida cordifolia.* Linn.

Sida foliis cordatis, subangulatis, serratis, villosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 661. — Cavan.

Differt. bot. 1. pag. 19. tab. 3. fig. 2. — Dillen. & Pluken.

Sida cordifolia, foliis ovatis, cordatis, dentatis, subangulatis, obtusifolius; pedunculis foliariis, petiolo paulo brevioribus; capsulis biseriatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 758. n°. 72.

Sida cordifolia. Lam. Dict. n°. 16.

Ses feuilles sont quelquefois médiocrement anguleuses, plus souvent simples, dentées en scie; les stipules droites, pileuses, sétacées; les pédoncules axillaires, redressés, géniculés; le calice à cinq faces, à dix ftries; les pétales médiocrement étalés, à deux lobes courts, inégaux. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de dix capsules à deux pointes, rapprochées en faisceau. (Voyez ABUTILON à feuilles en cœur, n°. 16.)

45. ABUTILON herbacé. *Sida herbacea.* Cavan.

Sida caule erecto, piloso, ramoso; foliis subcordatis, erenato-dentatis; pedunculis petiolo paulo brevioribus; capsulis novem, biseriatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 19. tab. 13. fig. 1.

Sida herbacea, foliis oblongis, acutis, dentatis, basi cordatis; pedunculis foliariis, petiolo paulo brevioribus; capsulis biaristatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 757. n°. 69.

Cette espèce est toute couverte de poils mous. Ses tiges sont pileuses, cylindriques, rameuses; ses feuilles longuement pétioles, ovales-oblongues, échancrées en cœur à leur base, un peu aiguës, crénelées & dentées à leur contour, pileuses; les stipules droites, capillaires; les fleurs solitaires, axillaires, supportées par des pédoncules un peu plus courts que les pétioles. Le calice est à cinq angles, divisé jusqu'à sa moitié en cinq découpures; la corolle jaune; le fruit globuleux, renfermé dans le calice, composé de neuf capsules à deux pointes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

46. ABUTILON à poils luisants. *Sida micans.* Cavan.

Sida foliis subcordatis, ovato-lanceolatis, dentatis, tomento mollissimo micantibus; calicibus globosis, decem angulatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 19. tab. 3. fig. 1.

Sida micans, foliis ovatis, obtusis, serratis, tomentosis, nitidis; pedunculis foliariis, petiolo multo longioribus; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 759. n°. 16.

Ses tiges sont droites, rameuses, tomenteuses, hautes de deux pieds & plus; ses feuilles ovales-lanceolées, légèrement échancrées en cœur à leur base, dentées à leur contour, obtuses, un peu ti-

dées, couvertes de poils tomenteux & luisants; les pétioles une fois plus courts que les feuilles, munis à leur base de deux stipules subulées, atquées, redressées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules simples, géniculés, velus, un peu plus longs que les pétioles. Le calice est globuleux, à dix angles, tomenteux, divisé, jusque vers sa moitié, en cinq découpures à peine aiguës; la corolle jaune, ouverte. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de neuf capsules terminées par deux pointes.

Cette plante croît naturellement à l'île de Saint-Domingue. (V. f. in herb. Juss.)

47. ABUTILON tacheté. *Sida maculata.* Cavan.

Sida foliis ovatis, serratis, tomentosis; floribus fricatis, terminalibus; corollis maculatis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 20. tab. 3. fig. 7.

Sida maculata, foliis ovatis, obtusis, serratis, tomentosis; pedunculis axillaribus, apice caulis racemosis, capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 758. n°. 12.

Cette plante a des tiges dures, ligneuses, tomenteuses, garnies de feuilles ternes, pétioles; les inférieures orbiculaires; les supérieures ovales, obtuses, presque tronquées à leur sommet, avec une pointe dans son milieu, tomenteuses, dentées en scie à leur contour; les pétioles bien plus courts que les feuilles, accompagnés à leur base de deux stipules droites, subulées, tomenteuses.

Ses fleurs sont solitaires, axillaires, disposées, à l'extrémité des rameaux, en forme d'un épi lâche, soutenues par des pédoncules géniculés, à peine plus longs que les pétioles. Le calice est veu, à cinq faces, à cinq découpures aiguës; la corolle grande, étalée, jaunâtre, marquée, dans son centre, de cinq taches rougeâtres. Le fruit est renfermé dans le calice; il est composé de neuf capsules à deux pointes.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (V. f. in herb. Juss.)

48. ABUTILON à feuilles rondes. *Sida rotundifolia.* Lam.

Sida foliis subcordatis, subrotundis, erenatis, tomentosis; capsularum rostris fasciculatis, hirsutis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 20. tab. 3. fig. 6.

Sida rotundifolia, foliis subrotundo-ovatis, cordatis, obtusis, dentatis; pedunculis foliariis, petiolo multo longioribus; capsulis biaristatis, aristis calice longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 756. n°. 66.

Sida rotundifolia. Lam. Dict. 1. n°. 15.

Les

Les feuilles sont accompagnées, à leur base, de stipules droites, subulées; les fleurs solitaires, axillaires; les pédoncules droits, géniculés, plus longs que les pétales. Le calice est sphérique, strié, contenant le fruit composé de neuf capsules à deux pointes. (*Voyez* ABUTILON à feuilles rondes, n°. 15.)

49. ABUTILON à trois lobes. *Sida triloba*. Cavan.

Sida foliis inferioribus cordato-crenatis; superioribus dentatis, trilobatis; medio lanceolato. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 11. tab. t. fig. 11, & Diff. 5. pag. 174. tab. 131. fig. 1.

Sida triloba, frutibus subscapularibus; foliis cordatis, trilobatis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. pag. 9. tab. 142.

Sida triloba, foliis trilobis, crenatis, lateralibus rotundatis, intermedio acuto. Thunb. Prodr. pag. 117.

Sida triloba, foliis cordatis, dentatis, trilobis; lobo intermedio acuto, longiore; pedunculis axillaribus, foliariis; capsulis mucosis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 764. n°. 92.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, médiocrement velues, hautes d'environ deux pieds; les rameaux grêles, élancés; les feuilles longuement pétiolées, un peu velues, vertes à leurs deux faces; les inférieures ovales-arrondies, entières, échancrées en cœur, crénelées à leur contour; les supérieures divisées plus ou moins profondément en trois lobes, quelquefois cinq; dentées; celui du milieu lancéolé, à peine aigu; les pétioles velus, accompagnés à leur base de petites stipules droites, étalées, ciliées, lancéolées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules simples, droits, très-longs, géniculés, inclinés à leurs articulations, pileux, filiformes. Le calice est glabre, anguleux, pyramidal, s'ouvrant en cinq découpures ovales, un peu aiguës; la corolle blanche, à peine plus longue que le calice; les pétales entiers, arrondis, rétrécis en onglet à leur base; les étamines nombreuses, portées sur des filaments capillaires, au sommet d'un tube court. Le fruit est composé de huit capsules au plus, renfermées dans le calice, obtuses à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

50. ABUTILON à feuilles ternées. *Sida ternata*. Thunb.

Sida foliis ternatis; foliolis lanceolatis, remotis ferratis. Thunb. Prodr. pag. 118. — Linn. Suppl. Botanique. Supplément. Tome I.

pag. 307. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 765. n°. 93. — Lam. Dict. 1. n°. 32.

J'aurais été porté à croire que cette singulière espèce à feuilles ternées n'étoit qu'une variété de la précédente, dont les lobes des feuilles supérieures sont quelquefois rétrécis presque en pétiole à leur base, & paroissent alors offrir trois folioles, si Thunberg ne l'eût point mentionnée, dans le catalogue de ses plantes du Cap de Bonne-Espérance, comme une espèce distincte de la précédente.

51. ABUTILON à feuilles de ricin. *Sida ricinoides*. Lhérit.

Sida foliis quinquelobis, ferratis, acuminatis; arillis biaristatis. Lhérit. Stip. Nov. vol. 1. pag. 115. tab. 55.

Sida ricinoides, foliis subpeltatis, quinquelobis; lobis ovatis, acutis, dentatis, indivisis; pedunculis subanisofloris, capsulis biaristatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 765. n°. 95.

Sida (palmata), foliis palmatis, magnis, quinquangulatis, ferratis; stipulis nullis, floribus subumbellatis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 20. tab. 5. fig. 5.

Cette espèce est remarquable par ses grandes feuilles parfaitement semblables à celles du ricin, à cinq lobes entiers & non sinués comme dans l'espèce suivante. Ses tiges sont droites, rameuses, hautes d'environ trois pieds, pileuses, roussâtres; les feuilles longuement pétiolées, amples, en cœur à leur base, divisées, à leur contour, en cinq lobes inégaux, ovales, acuminés, légèrement velus, d'un vert-gai, plus pâles en dessous, à nervures saillantes; les pétioles velus, cylindriques, dépourvus de stipules.

Les fleurs sont axillaires, solitaires aux feuilles inférieures; dans les feuilles supérieures, une fleur solitaire & une autre à pédoncule rameux & multiflore, foliacé. Ces pédoncules sont filiformes, velus, articulés, plus courts que les feuilles. Le calice est velu, glanduleux, à cinq découpures ouvertes, lancéolées, aiguës. La corolle est d'un pourpre clair, à peine plus longue que le calice; les pétales velus, tronqués obliquement à leur sommet; les anthères portées sur des filaments courts au sommet du tube; l'ovaire conique, à huit faces; le style à huit divisions capillaires, réfléchies à leur sommet; les stigmates petits, en tète. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de huit capsules anguleuses, terminées par deux pointes roides.

Cette plante a été découverte au Pérou par Dombey. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. f.)

52. ABUTILON à feuilles de jatropha. *Sida jatrophaeoides*. Lhérit.

Sida foliis palmatis, peltatis; lucinis lanceolatis, runcinata lobatis. Lhérit. *Silp. Nov.* vol. 1. pag. 117. tab. 56. — Lam. *Illust. Gen.* tab. 578. fig. 1.

Sida jatrophaeoides, foliis subpeltatis, septemlobis palmatis; lobis lanceolatis, acuminatis, pinnatifidis, dentatis; pedunculis multifloris, capsulis subbaccatis. Willden. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 765. n°. 96.

Sida (palmata), *foliis palmatis, peltatis; lucinis lanceolatis, serratis, incisifs*. Jacq. *Icon. Rar.* vol. 3. tab. 547, & *Collect.* 2. pag. 336.

Sida palmata. Cavan. *Differt.* 5. pag. 274. tab. 131. fig. 3.

Cette plante, parfaitement distinguée de la précédente par ses lobes de ses feuilles étroites, profonds, sinués, ondulés à leur contour, pourroit bien cependant n'être qu'une variété de la même espèce, d'autant plus que les parties de la fructification n'offrent que de très-légères différences. Les tiges sont droites, rameuses, hautes de deux pieds, glabres ou légèrement velues; les feuilles grandes, palmées, un peu velues en dessous, orbiculaires, presque peltées; les découpures souvent au nombre de sept, lancéolées, aiguës, dentées en scie, à échancrures arrondies, irrégulières; les pétioles de la longueur des feuilles, velus, avec des taches violettes, dépourvus de stipules.

Les fleurs offrent une sorte de panicule terminale, ramifiée, très-lâche; chaque rameau accompagné d'une petite feuille pétioleuse; les pédoncules droits, de couleur purpurine, velus; souvent un pédoncule simple, uniflore, & un second dans la même aisselle, chargé de plusieurs fleurs. Le calice est velu, à cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle à peine plus longue que le calice; les pétales entiers ou médiocrement échancrés. Le fruit, renfermé dans le calice, est composé de huit capsules monospermes, à deux points qu'elles perdent souvent par la culture.

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle a été découverte par Dombey. O (P. v.)

53. ABUTILON des Indes orientales. *Sida arietalis*. Cavan.

Sida foliis ovato-acutis, aut rhombeis, inferius integris, supra inaequaliter serratis; stipulis oblongis, linearibus; capsulis muticis. Cavan. *Differt. bot.* 1. pag. 21. tab. 11. fig. 1.

Sida orientalis, foliis ovatis, acuminatis, dentatis, glabris; pedunculis unisporis, axillaribus;

capsulis muticis. Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 737. n°. 10.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, cylindriques, garnis de feuilles médiocrement pétioleuses, ovales-lancéolées, glabres à leurs deux faces, inégalement dentées, quelques-unes de forme presque rhomboïdale, entières à leur partie inférieure; les unes obtuses; d'autres aiguës à leur sommet, accompagnées de stipules oblongues, linéaires, au moins aussi longues que les pétioles. Les fleurs sont foliaires, axillaires, soutenues par des pédoncules presque de la longueur des pétioles. La corolle est jaune; le calice anguleux, à cinq découpures, marqué de dix stries à sa base; il prend la forme d'un godet à la maturité des fruits qu'il renferme. Ceux-ci sont composés de neuf à dix capsules obtuses.

Cette plante a été recueillie par M. Sonnetat dans les Indes orientales. (P. f. in herb. Lam.)

54. ABUTILON distillé. *Sida disticha*. Cavan.

Sida foliis distichè alternis, ovato-lanceolatis; floribus axillaribus, foliariis. Cavan. *Icon. Rar.* vol. 5. pag. 12. tab. 452.

Cette espèce a des tiges hautes de deux pieds, cylindriques, divisées en rameaux alternes, légèrement tomenteux, garnis de feuilles alternes, sur deux rangs, ovales-lancéolées, échancrées en cœur, dentées à leur contour, un peu tomenteuses à leurs deux faces; les pétioles plus courts que les feuilles, accompagnés à leur base de deux stipules courtes, subulées, caduques.

Les fleurs sont axillaires, foliaires, soutenues par des pédoncules droits, articulés, longs d'un pouce & plus. Le calice est divisé en cinq découpures ovales, aiguës; la corolle très-ouverte, d'un jaune-foncé, traversée par des veines plus vives; les pétales ovales, recués à leur base; les anthères arrondies, jaunâtres, ainsi que le tube; l'ovaire globuleux, comprimé; le style à douze ou treize découpures capillaires; les stigmates globuleux. Le fruit est un peu plus court que le calice, globuleux, comprimé, composé de douze ou treize capsules monospermes, ovales, aiguës, à une loge, à deux valves; les semences noirâtres, globuleuses, recouvertes par une foliole ovale, crépue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (*Descript. ex Cavan.*)

55. ABUTILON cilié. *Sida ciliaris*. Linn.

Sida foliis ovalibus, retusis, serratis; stipulis linearibus, ciliatis; seminibus muricatis. Linn. *Spec. Plant.* vol. 2. pag. 961. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 401. — Cavan. *Differt. bot.* 1. pag. 21. tab. 3. fig. 9. & *Differt.* 5. par. 275. tab. 27. fig. 2. — Swartz, *Observ.* pag. 257.

Sida ciliaris, foliis lanceolatis, truncatis, basi subcuneatis; stipulis linearibus, ciliatis, flore longioribus; floribus solitariis, subsessilibus; capsulis muticis, muricatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 741. n°. 21.

Malva minor, supina, heterophylla, flore coccineo, seminibus alperis. Sloan, Jam. 96. Hist. 1. pag. 217. tab. 137. fig. 2.

Sida ciliaris. Lam. Dict. vol. 1. n°. 7.

Ses feuilles sont petites, ovales, obtuses; les fleurs d'un jaune un peu rougeâtre. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de cinq à sept, quelquefois huit capsules, d'après Linne; comprimées, hérissées, sans point bien sensible à leur sommet. (*Voyez* ABUTILON cilié, n°. 7.)

56. ABUTILON à petites feuilles. *Sida microphylla*. Cavan.

Sida caule erecto, duro, ramossimo; foliis ovatis, dentatis, parvis; floribus axillaribus, pluribus in caulis & ramorum apicibus. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 22. tab. 12. fig. 2.

Sida microphylla, foliis ellipticis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis bicornibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 739. n°. 15.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, hautes de deux pieds & plus, ramuleuses, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, petites, ovales, presque elliptiques; dentées à leurs bords, obtuses à leur sommet, glabres, accompagnées, à la base des pétioles, de deux stipules fort petites, droites, téraécées.

Les fleurs sont nombreuses, axillaires, pédonculées, situées à l'extrémité des rameaux & des tiges; les pédoncules géniculés, un peu plus longs que les pétioles. Le calice est à cinq faces, divisé, jusque vers la moitié, en cinq découpures très-aiguës à leur sommet; la corolle jaune. Le fruit est renfermé dans le calice, composé de sept capsules terminées par deux pointes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, où elle a été recueillie par M. Sonnerat. & (*V. f. in herb. Lam.*)

57. ABUTILON hérissé. *Sida muricata*. Cav.

Sida foliis lanceolatis, serratis; floribus subsessilibus, capsulis mucronatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 78. tab. 597. fig. 2.

Très-remarquable par ses petites feuilles & par ses capsules hérissées, cette plante a des tiges droites, hautes d'un pied, divisées en rameaux alternes, velus, garnis de feuilles petites, alternes, lancéolées, larges d'une ligne, longues de quatre à

cinq, vertes & glabres à leur face supérieure, couvertes en dessous de poils blanchâtres, aiguës & dentées en scie vers leur sommet; les pétioles de la longueur des feuilles; les stipules feues, velues, un peu plus courtes que les pétioles.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, presque ramassées en tête à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules pileux, filiformes. Le calice est globuleux, à cinq angles, à cinq découpures lancéolées, velues; la corolle d'un jaune foncé, une fois plus longue que le calice, à cinq pétales ovales, oblongs, obtus, rétrécis à leur base; le tube des étamines ventru, plus court que la corolle; l'ovaire globuleux; le style simple, à sept divisions; les stigmates épais. Le fruit est petit, globuleux, plus petit qu'un grain de noivre, composé de sept capsules monospermes, hérissées de petites pointes placées dans des fossettes, terminées par des pointes; les semences brunes, ovales, comprimées, munies d'une petite pointe latérale.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne, proche Chalna. Elle y fleurit au mois d'août. (*Descript. ex Cavan.*)

58. ABUTILON des Canaries. *Sida canariensis*. Willd.

Sida foliis lanceolatis, sublinearibus, dentatis, subglabris; pedunculis solitariis, axillaribus, longioribus foliorum; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 735. n°. 4.

Sida (alba), foliis ovato-oblongis, angustis, serratis, glabris; pedunculis longissimis, erectis; stipulibus purpureis, axillis icarminibus. Cavan. Diff. bot. 1. pag. 22. tab. 3. fig. 8, & Differt. 2. p. 48.

Vulgairement thé des Canaries.

C'est un petit arbruste à tige droite, cylindrique, glabre, rameuse; les rameaux alternes, un peu comprimés vers leur sommet, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, ovales, oblongues, un peu obtuses; les supérieures plus étroites, lineaires, lancéolées, aiguës, dentées en scie à leur contour, vertes, glabres en dessus, blanchâtres, douces & un peu pubescentes en dessous, longues d'un pouce & plus, rétrécies en un pétiole court à leur base, munies de deux petites bractées droites, sétacées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, portées sur des pédoncules simples, filiformes, géniculés, plus longs que les feuilles. Le calice est glabre, verdâtre, anguleux, divisé profondément en cinq découpures planes, un peu élargies, presque rhomboïdales, aiguës. La corolle est blanchâtre, un peu plus longue que le calice; l'ovaire globuleux, marqué de neuf à dix sillons, autant de styles; les stigmates de couleur purpurine; le fruit plus court que le calice, composé de neuf ou dix capsules

brunes, comprimées, anguleuses à leur bord interne, monospermes, terminées par deux points.

Cette plante croît aux îles Canaries. Elle m'a été communiquée par M. Ledru. (V. f.)

Quelques habitants des îles Canaries substituent ses feuilles au thé, qu'ils appellent en effet de ce nom. Elles sont fudoïques, d'une faveur un peu amère, assez agréable. On enlève ces feuilles des tiges avec précaution, & on les met sécher dans un lieu sec, à l'abri du soleil; & pour juger si elles ont perdu toute leur humidité, on les couvre d'un papier, & l'on passe dessus des lames de fer chaud. Dès que le papier ne prend plus d'humidité, ces feuilles sont renfermées dans des vases bien bouchés, sans odeur, pour s'en servir au besoin.

59. ABUTILON à longues stipules. *Sida stipulata*. Cavan.

Sida foliis lanceolatis, dentatis, acutis, pilosis; stipulis longis, linearibus, ciliatis, flore longioribus. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 12. tab. 3. fig. 10.

Sida (lanceolata), foliis lanceolatis, serratis; stipulis linearibus, acutis, nervosis. Retz. Observ. 4. pag. 18.

Sida lanceolata, foliis oblongo-lanceolatis, dentatis, glabrisculis; pedunculis axillaribus, foliariis; capsulis biseptatis; stipulis linearibus, nervosis, pedunculo longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 736. n°. 5.

Cette plante est haute d'environ un pied. Ses tiges, ordinairement coudées à leur partie inférieure, sont droites, cylindriques, dures, rameuses, presque glabres ou légèrement tomenteuses, garnies de feuilles alternes, lancéolées, médiocrement pétioles, oblongues, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, dentées en scie, presque glabres ou un peu pileuses, longues de deux pouces & plus, accompagnées de deux stipules linéaires, ciliées, nerveuses, plus longues que les pétioles; souvent l'une des deux est filiforme.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules courts, simples, à peine plus longs que les pétioles, géniculés vers leur milieu. Le calice est globuleux, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle jaune; le fruit renfermé dans le calice, composé de cinq à sept capsules terminées par deux points.

Cette plante croît à l'île-de-France & dans les Indes orientales. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

60. ABUTILON rhomboïdal. *Sida rhombifolia*. Linn.

Sida foliis lanceolatis, rhomboidibus, serratis.

axillis subspinosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 96t. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 23. tab. 3. fig. 12, & Dissert. 2. p. 48. — Swartz, Obl. 157.

Sida rhombifolia, foliis oblongo-lanceolatis, dentatis, basi cuneiformibus, integerrimis; pedunculis petiolis multo longioribus; capsulis bicornibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 742. n°. 18.

Sida (rhombifolia), foliis lanceolatis-rhomboidibus, serratis, breviter petiolatis; stipulis capillariseptatis, axillis subspinosis, floribus longe pedunculatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 45.

Malva minor, erecta, betanicaefolia; flore laeva; femine duplici, rostro praedita. Sloan, Catal. 96. Hist. 1. pag. 217.

Sida rhombifolia. Lam. Dict. t. n°. 4.

Ses feuilles sont ovales-lancéolées, entières & rétrécies presque en coin à leur partie inférieure, dentées à leur partie supérieure; elles deviennent souvent, à la seconde année de culture, ovales-oblongues, point rhomboïdales. Les stipules sont droites, subulées; les fruits composés de neuf capsules terminées par deux points. (Voyez ABUTILON à feuilles en rhombus, n°. 4.)

61. ABUTILON blanchâtre. *Sida canescens*. Cav.

Sida caule humili, fruticosa; foliis rhomboidibus, subius villosissimis, jussissimis; stipulis setaceis, nigris, erectis. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 23. tab. 8. fig. 3.

Sida canescens, foliis rhombo-ovatis, apice dentatis, subius tomentosis; pedunculis foliis longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 740. n°. 19.

Cette plante s'élève peu. Ses tiges sont à peine longues d'un pied, ligneuses, très-rameuses, pourvus de longues racines perpendiculaires, très dures; les rameaux pendans, garnis de feuilles alternes, à peine pétioles, petites, rhomboïdales, dentées vers leur sommet, glabres en dessus, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les stipules droites, sétacées, noirâtres. Les fleurs sont axillaires, solitaires; les pétioles géniculés, plus longs que les feuilles. Les autres parties n'ont point été observées.

Cette plante croît au Sénégal, où elle a été recueillie par M. Adanson. (V. f. Descript. ex Cav.)

62. ABUTILON du Cap. *Sida capensis*. Cavan.

Sida caule ramossissimo; foliis ovato-lanceolatis, quandoque subrotundo-ovatis, dentatis; stipulis ciliatis, capsulis mucicis. Cavan. Dissert. bot. 1. p. 23. tab. 12. fig. 3, & Dissert. 2. pag. 49.

Sida capensis, foliis ovato-lanceolatis, dentatis; pedunculis foliariis; stipulis linearibus, ciliatis, petiolis longioribus; capsulis mucicis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 739. n°. 14.

Althaa maderaspatana, melochia angustifolia, fructu ex a. s. foliorum pedicelo curvo. Fluker. Alm. pag. 25. tab. 240. fig. 5.

Ses tiges sont droites, rudes, très-dures, très-rameuses, hautes de deux pieds & plus; les rameaux (lancés, redressés, garnis de feuilles presque sessiles, ovales lancéolées, quelquefois un peu arrondies, dentées en scie à leurs bords; les stipules droites, linéaires, élargies, citées, plus longues que les pédoncules. Les fleurs sont axillaires, solitaires, médiocrement pédonculées; le calice à cinq faces pyramidales, à cinq découpures aiguës; la corolle jaune; le fruit presque globuleux, renfermé dans le calice, composé d'environ neuf ou dix capsules obtuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Elle y a été recueillie par M. Sonnetat. (*Descript. ex Cavan.*)

63. ABUTILON subéreux. *Sida suberosa*. Lhérit.

Sida foliis ovatis, subinciso-dentatis; cortice suberoso. Lhérit. Siicp. Nov. t. pag. 113. tab. 54.

Sida (suberosa), foliis ovatis, dentatis, hispidis; pedunculis axillaribus, unifloris, petiolo duplo longioribus; capsulis bicornibus, caule basi suberoso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 758. n°. 13.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, rameuses, velues, hautes d'un à deux pieds, revêtues, principalement à leur base, d'une écorce fendue & presque subéreuse. Les feuilles sont ovales, presque en cœur, dentées, presque incisées, nerveuses, plissées dans leur jeunesse, pâles, velues, un peu pendantes, longues de deux pouces, sur un pouce & demi & plus de large; les pétioles velus, une fois plus courts que les feuilles; les stipules droites, subulées, hérissées, très-caduques.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par des pédoncules droits, articulés, plus longs que les pétioles. Le calice est velu, à cinq découpures ovales, acuminées; la corolle jaunâtre, purpurine vers sa base; les pétales cunéiformes, à deux lobes inégaux, obliques, légèrement sinués; le tube des éramines velu, terminé par des filaments courts, capillaires, supportant des anthères réniformes, à une loge. L'ovaire est conique, tuméfié de neuf styles convins à leur base, jaunâtres à leur sommet; les stigmates en tête, de couleur purpurine. Le fruit est composé de neuf capsules monopermes, ridées & en bosse extérieurement, terminées par deux pointes; les semences brunes, solitaires.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (*Descript. ex Lhérit.*)

64. ABUTILON ailé. *Sida pinnata*. Cavan.

Sida subaulis, foliis imbricatis, pinnatis, infernè tomentosis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 13. tab. 422. fig. 1.

Ses racines sont épaisses & rameuses; les tiges presque nulles; les feuilles nombreuses, imbriquées, à peine longues de six lignes, tomenteuses & blanchâtres en dessous, ailées, composées d'environ sept folioles linéaires, décurrentes sur un pétiole plane, élargi à sa base; les deux folioles inférieures imitant deux stipules subulées.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, axillaires; leur calice ovale, velu, à cinq découpures aiguës; la corolle jaunâtre, à cinq pétales ovales, oblongs, obtus; les anthères rougeâtres, presque sessiles, placées à l'extrémité d'un tube venu à sa base. L'ovaire est globuleux, comprimé, à onze ou treize sillons; le style simple, divisé en autant de parties; les stigmates épais. Le fruit est globuleux, composé de onze à treize capsules monopermes; les semences réniformes.

Cette plante croît au Pérou, au pied du mont Chimborazo. (*Descript. ex Cavan.*)

65. ABUTILON sans tige. *Sida acaulis*. Cavan.

Sida foliis minatis, pinnatis; pinnulis quinque trifidis, tomentosis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 13. tab. 442. fig. 2.

Ses racines ressemblent à celles de l'espèce précédente. Ses feuilles sont toutes radicales, tomenteuses, fort petites, ailées, composées de cinq folioles trifides, obtuses; les stipules, les pétioles & les fleurs comme dans l'espèce précédente. Le calice est tomenteux, à cinq découpures; la corolle jaune, une fois plus longue que le calice; les pétales oblongs, obtus, retirés en onglet à leur base. L'ovaire est globuleux; le style simple; sept stigmates épais & rougeâtres. Le fruit est composé de sept capsules fort petites, mutiques, monopermes.

Cette plante croît au Pérou. (*Descript. ex Cavan.*)

66. ABUTILON à feuilles linéaires. *Sida linearis*. Cavan.

Sida foliis linearibus, ferratis; petioli basi spinosif, floribus solitariis. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 6. tab. 311. fig. 1.

Sous-arbrisseau dont les tiges, droites, peu rameuses, s'élèvent à la hauteur d'un pied & demi, garnies de feuilles glabres, alternes, linéaires, elliptiques, dentées en scie à leur contour, plusieurs fois plus longues que les pétioles; ceux-ci munis à leur base d'une petite épine recourbée; les stipules lancéolées, légèrement pileuses.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, plus courtes

que leur pédoncule. Leur calice est turbiné, pentagone, à cinq dents; la corolle jaune, plus grande que le calice, à peine ouverte; l'ovaire globuleux, comprimé, à dix fillons; dix styles surmontés de stigmates globuleux. Le fruit est composé de dix capsules renfermées dans le calice, mutiques, monospermes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne; elle fleurit au mois d'octobre dans le Jardin de Madrid. ? (*Desfr.* ex *Cavan.*)

67. ABUTILON fétide. *Sida fétida*. Cavan.

Sida foliis subrotundo-cordatis, acutiusculis, dentatis, tomentosis; pedunculis foliariis, petiolo brevioribus; capsulis mactis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 747. n°. 38.

Sida fétida, caule erecto, atropurpureo; foliis ovatis, cordatis, serratis, fétidis. Cavan. Dissert. bot. 6. pag. 349.

Sida (viscosa), foliis cordatis, dentatis; capsulis septemlocularibus, caule viscido. Lherit. Stirp. Nov. pag. 111 bis, tab. 53 bis.

Sida fruticulosa, viscosa & villosa, foliis cordato-acuminatis, superioribus leniter & acutè crenatis; petiolis longis; pedunculis tenuibus, foliariis ad alas. Brown, Jam. pag. 180.

Alcea papuifolia, villosa, leviter ferrata. Sloan, Hist. 122. tab. 139. fig. 4.

Toute la plante est visqueuse, d'une odeur forte & désagréable. Ses tiges sont ligneuses, hautes d'un demi-pied, cylindriques, médiocrement rameuses; les rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles longuement pétioles, ovales, en cœur, acuminées, presque peltées, dentées à leurs bords, tomenteuses, traversées par des nervures purpures, pendantes, longues de deux pouces & plus; les stipules subulées, caduques.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules filiformes, velus, plus courts que les feuilles, articulés à leur sommet. Leur calice est velu, glutineux, à cinq découpures étalées, lancéolées, aiguës; la corolle petite, un peu plus longue que le calice; les pétales arrondis, un peu pubescents en dessous; les anthères réniformes, pédicellées; l'ovaire un peu arrondi; sept à neuf styles capillaires, réfléchis, de la longueur des étamines; les stigmates en tête. Le fruit est composé de sept à neuf capsules monospermes, pubescentes, obtuses, comprimées.

Cette plante croît à la Martinique & à la Jamaïque. ? (*P. f.*)

68. ABUTILON à feuilles de guimauve. *Sida althæfolia*. Lherit.

Sida foliis cordato-ovatis, dentatis, utrinque to-

mentosis; floribus paniculato-conferis. Lherit. Stirp. Nov. 1. pag. 112 bis.

Sida althæfolia, foliis cordatis, subangulatis, obtusis, serrato crenatis, utrinque tomentosis; rostris seminum calice brevioribus. Swartz, Prodr. pag. 101, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1207. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. 56.

Althæa flore lato. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 218. tab. 136. fig. 2.

Cette plante est très-molle, blanchâtre, tomenteuse sur toutes ses parties. Ses tiges sont un peu ligneuses, droites, hautes d'un à deux pieds; les feuilles alternes, presque verticillées, ovales, en cœur, obtusément anguleuses, dentées, aiguës, un peu épaisses; les pétioles étalés, cylindriques, plus courts que les feuilles; les stipules courtes, linéaires, subulées.

Les fleurs sont axillaires, très-rapprochées, formant par leur ensemble une sorte de panicule à l'extrémité des rameaux; les pédoncules réunis deux ou trois, souvent solitaires, à une ou à plusieurs fleurs. Les calices sont légèrement anguleux, à cinq découpures droites, courtes, élargies, aiguës; la corolle jaune; les pétales arrondis, échançrés, un peu ondulés; dix à douze styles plus longs que les filaments, les stigmates bruns, en tête. Le fruit est composé de dix à douze capsules monospermes, à deux pointes courtes.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les campagnes arides. ?

*** Trente capsules environ.

69. ABUTILON à épi. *Sida spicata*. Cavan.

Sida foliis subcordatis, acuminatis; pedunculis petiolo parvo vix longioribus; capsulis penatis, obtusis; floribus spicatis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 24. tab. 8. fig. 1.

Sida spicata, foliis ovatis, cordatis, acutis, dentatis; racemo terminali, nudo; capsulis penatis, cupatis, calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 761. n°. 81.

Abutilon vesicarium, flore lato, majus. Plum. Hist. Mss. tab. 4. pag. 14, & apud Burm. Amer. tab. 2. fig. 1.

Abrisseau dont les rameaux sont très-longs, épais, nombreux, redressés, garnis de feuilles ovales, un peu allongées, légèrement échançrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, dentées, d'un vert-blanchâtre, légèrement velues; les dentelures courtes, distantes; les stipules inconnues.

Les fleurs sont alternes, situées à l'extrémité des rameaux, en une sorte d'épi simple; les inférieures axillaires, les autres nues, soutenues par

des pédoncules géniculés, plus longs que les pétioles. Le calice est glabre, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle jaune, étalée, assez grande; les pétales élargis à leur partie supérieure & crénelés. Le fruit est globuleux, blanchâtre, beaucoup plus grand que le calice, composé d'un grand nombre de capsules comprimées, monospermes; les semences noirâtres, arrondies, aiguës à un de leurs bords.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue, où elle a été découverte par le Père Plumier. (V. *Descript. ex Cavan.*)

70. ABUTILON d'occident. *Sida occidentalis*. Linn.

Sida foliis cordatis, sublobatis; stipulis patentibus; pedunculis petiolo brevioribus; capsulis multocularibus, pendulis, obtusis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 964. — Amer. acad. vol. 4. pag. 325. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 24. tab. 4. fig. 3.

Sida occidentalis, foliis oblongo-cordatis, dentatis, sublobatis; pedunculis foliariis, petiolo brevioribus; capsulis obtusis, globosis, mutatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 749. n°. 45.

Sida occidentalis. Lam. Dict. 1. n°. 23.

Les tiges sont cylindriques, tomenteuses à leur partie supérieure, rameuses; les feuilles inférieures assez grandes, un peu anguleuses; les supérieures distantes, plus petites, bien moins pétioles, point anguleuses, médiocrement dentées; les stipules scarées, courbées, redressées; les pédoncules souvent plus longs que les pétioles, principalement aux feuilles supérieures. Les capsules sont membraneuses, très-minces, transparentes, comprimées, un peu vésiculeuses, monospermes; les semences placées sous une sorte de plumule arquée. (Voyez ABUTILON d'occident, n°. 23.)

71. ABUTILON à feuilles découpées. *Sida multifida*. Cavan.

Sida multifida, caule prostrato; floribus secunda versus terram, seminibus alatis. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 25. tab. 4. fig. 2.

Sida (perispermata), foliis tripartito-pinnatifidis, lobis fissurisque obtusis, arillis membranaceo-appendiculatis. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 119. tab. 57.

Sida perispermata, foliis tripartitis, lacinii linearibus, repando fissatis; floribus subsracemosis, capsulis alatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 765. n°. 94.

Cette plante a des racines fibreuses qui produisent une tige couchée, dichotome, très-rameuse,

garnie de feuilles longuement pétioles, profondément partagées en trois ou quelquefois cinq découpures étroites, linéaires, inégalement sinuées à leurs bords, obtuses à leur sommet, glabres tant en dessus qu'en dessous, accompagnées de stipules petites, lancéolées.

Les fleurs sont les unes solitaires, axillaires; les autres alternes, terminales, sans feuilles, en forme de grappe, toutes tournées vers la terre, supportées par des pédoncules géniculés, à peine aussi longs que les pétioles. Le calice est globuleux, à demi divisé en cinq découpures ciliées, dentelées; la corolle blanche, étalée. Le fruit est orbiculaire, comprimé, plus grand que le calice, composé de vingt-huit capsules ailées, monospermes.

Cette plante croît aux environs de Lima, dans les plaines sablonneuses, où elle a été découverte par Dombey. (V. f.)

72. ABUTILON sans stipules. *Sida exstipularis*. Cavan.

Sida foliis cordatis, acutis, subtomentosis, exstipularis; pedunculis axillaribus, foliariis, unisporis, petiolo brevioribus. Cavan. Dissert. bot. 2. pag. 56. tab. 14. fig. 2.

Sida exstipularis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 31. tab. 7. fig. 3. *Delicatus descriptio.*

Sida exstipularis, foliis ovato-cordatis, acumina-tis; pedunculis foliariis, petiolo brevioribus; capsulis mucosis, calice brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 754. n°. 58.

Cette plante a des tiges hautes, cylindriques, tomenteuses, droites, divisées en rameaux alternes, élancés, garnis de feuilles longuement pétioles, ovales, en cœur, tomenteuses à leurs deux faces, crénelées ou légèrement sinuées à leurs bords, blanchâtres en dessous, très-aiguës à leur sommet, assez grandes; les pétioles pileux, cylindriques, ou moins aussi longs que les feuilles, dépourvus de stipules.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules droits, très-simples, géniculés, deux ou trois fois plus courts que les pétioles. Le calice est péniogone, obtus à sa partie inférieure, divisé, à sa partie supérieure, en cinq découpures étalées, lancéolées, aiguës; la corolle jaune, point tachetée, très-grande, ouverte, longue d'un pouce & demi; les pétales entiers, indigement arrondis à leur sommet; le tube des filaments élargi à sa base, terminé par des étamines nombreuses. L'ovaire est globuleux; le style à plusieurs divisions. Le fruit est tomenteux, presque cylindrique, un peu plus grand que le calice, composé d'environ trente capsules monospermes, courbées à leur sommet.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île Bourbon. *h* (Descript. ex Cavan.)

73. ABUTILON des bois. *Sida filvaica*. Cavan.

Sida caule arborescente; foliis tomentosis, cordatis, longissimè acuminatis; pedunculis binis, axillaribus, unifloris; capsulis monoispermis. Cav. Differt. bot. 2. pag. 56. & Differt. 5. pag. 276. tab. 133. fig. 2. — Lam. Illustr. Gen. tab. 578. fig. 2.

Sida filvaica, foliis ovato-cordatis, acuminatis, crenatis; pedunculis geminatis, petiolo multo longioribus; capsulis mucis, capsitis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 748. n° 42.

Arbrisseau qui s'élève sur une tige droite, haute de dix pieds, très-rameuse; les rameaux pubescents, garnis de feuilles alternes, pétiolées, fort amples, ovales, échancrées en cœur, dentées en scie à leur contour, tomenteuses à leurs deux faces, longuement acuminées; les inférieures plus larges, les supérieures plus étroites, presque lancéolées; les pétioles velus, fort longs, beaucoup plus courts aux feuilles supérieures, accompagnées de stipules droites, lancéolées.

Les fleurs sont réunies deux à deux dans l'aisselle des feuilles supérieures, soutenues par des pédoncules droits, uniflores, géniculés, plus longs que les pétioles. Le calice est oblong, à cinq angles, divisé en cinq découpures larges, acuminées à leur sommet; la corolle d'un jaune de soufre, ample, au moins une fois plus longue que le calice; les anthères réniformes, situées à l'extrémité du tube des filaments; l'ovaire globuleux, tomenteux; les styles nombreux, plus longs que le tube; les stigmates globuleux. Le fruit, renfermé dans le calice, est tomenteux, globuleux, ombilicé, composé de trente à trente-six capsules monoispermes, mutiques, comprimées; les semences aigües à leur base.

Cette plante croît dans les forêts, sur le bord du fleuve Maragnon, au Pérou, où elle a été découverte par Dombey. *h* (Descript. ex Cavan.)

§. II. Capsules à trois semences.

* Cinq capsules.

74. ABUTILON triangulaire. *Sida triquetra*. Linn.

Sida foliis cordatis, subtomentosis; ramis triquetris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 962. — Jacq. Hort. tab. 118. — Cavan. Differt. bot. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 1. — Czern. de Frukt. & Sem. vol. 2. pag. 249. tab. 154 fig. 5.

Sida triquetra, foliis cordatis, acuminatis, serrulatis; pedunculis solitariis; capsulis mucis, truncatis; ramis triquetris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 748. n° 27.

Sida triquetra. Lam. Dict. 1. n° 8.

Il est facile de reconnoître cette espèce à ses tiges triangulaires, cannelées sur leurs trois faces; les stipules courtes, droites, étalées. La corolle est jaune, souvent purpurine à sa base; les découpures du calice étalées, aigües; l'ovaire prismatique, à cinq faces, surmonté de cinq styles un peu connivens à leur base; il leur succède un fruit beaucoup plus grand que le calice, pentagone, composé de cinq capsules glabres, mutiques, à trois semences. (Voyez ABUTILON triangulaire, n° 8.)

75. ABUTILON à feuilles de scammonée. *Sida periplofolia*. Linn.

Sida foliis cordato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, subtus albis; caule paniculato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 962. — Cavan. Differt. bot. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 2. — Swartz, Obs. pag. 160.

Sida erecta, glabra, foliis cordatis, acuminatis, integris, subtus incanis; pedunculis longissimis, tenuissimis. Brown, Jam. pag. 180.

Sida periplofolia, foliis cordato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, subtus tomentosis; pedunculis subdivisis, petiolo longioribus; capsulis aristatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 747. n° 23.

Althea scammonia folio, flosculis albis, rrylanica. Herm. Prodr. 309.

Alcea orientalis, scammonia folio major, floribus albis. Pluken. Almag. pag. 17. tab. 74. fig. 7.

Sida periplofolia. Lam. Dict. 1. n° 14.

Les feuilles sont accompagnées à leur base de deux stipules droites, petites, subulées. La corolle est jaune, point tachetée; le calice petit, globuleux, ainsi que l'ovaire, surmonté de cinq styles; les stigmates recourbés. Le fruit est fort petit, mais plus grand que le calice; il est composé de cinq capsules noirâtres, aigües & luisantes, étalées en étoile, à trois semences, quelquefois deux. (Voyez ABUTILON à feuilles de scammonée, n° 14.)

76. ABUTILON étoilé. *Sida stellata*. Cavan.

Sida foliis subrotundo-cordatis, acutis, integerrimis. Cavan. Differt. bot. 1. pag. 27. tab. 5. fig. 4, & Differt. 6. pag. 349.

Sida periplofolia, var. β. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963.

Sida (nudiflora), foliis cordatis, rotundatis, crenulatis; panicula aphylla. Lhérit. Stirp. Nov. vol. 1. pag. 123. tab. 59 bis.

Sida nudiflora, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, subintegerrimis, subtus tomentosis; panicula terminali.

terminali, racemosa; capsulis mucis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 743. n°. 26.

Abutilon caule hirsuto; flore minore, gilvo. Plum. Hist. Mss. tab. 4. pag. 12.

Abutilon amplifloro folio, caule villosa. Plum. apud Burn. Amer. Spec. 2. Icon. 3.

Cette plante, réunie par Linné à la précédente comme variétés, en diffère par son port, par la forme de ses feuilles, par les capsules dépourvues de pointes. Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, tomenteuses, hautes d'environ quatre pieds; elles se divisent en rameaux élançés, paniculés, nombreux, garnis de feuilles alternes, longuement pétiolées, molles, blanchâtres, principalement en dessous, très-douces au toucher, pubescentes à leur face inférieure, ovales-arrondies, échancrées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, légèrement dentées ou crénelées à leur contour; quelques-unes des supérieures à trois lobes ou à trois pointes; les stipules droites, linéaires, aiguës.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une longue panicule très-lâche, tomenteuse; soutenues par des pédoncules velus, géniculés. Le calice est divisé en cinq découpures un peu aiguës; la corolle d'un jaune-pâle; les pétales étala en étoile, assez grands, un peu arrondis, très-entiers; l'ovaire globuleux, surmonté de cinq styles allongés; les stigmates en tête. Le fruit est presque rond, plus grand que le calice, de forme pentagone, & ouvert en étoile à son sommet; composé de cinq à sept capsules obuses, à trois semences noires.

Cette plante croît dans les prés secs, à Saint-Domingue. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*P. v.*)

77. **ABUTILON à haute tige.** *Sida excelso.* Cavan.

Sida foliis cordato-acuminatis, integris, superne rubescentibus; glabris, siliis villosis, latifolius; floribus paniculatis. Cavan. Dissert. bot. 4. pag. 17. tab. 5. fig. 3.

Sida excelso, foliis cordatis, ovatis, acuminatis, integerrimis, siliis tomentosis; racemis paniculatis, capsulis bidentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 741. n°. 24.

Abutilon, arbor excelsa, tiliifolia & ligno leviflora, vulgo, apud Hispanos, palo de ballas; gallice, bois de radcau. Jof. Just. Herb. peruv.

C'est un grand arbre dont le bois est léger, le tronc droit, les feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, en cœur, très-entières, acuminées à leur sommet, glabres & un peu rougeâtres à leur face supérieure, velues & jaunâtres en dessous.

Botanique, Supplément. Tome 1.

dessous, à trois ou cinq nervures saillantes, longitudinales, avec quelques veinules latérales; les stipules sont petites.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule étalée; les ramifications alternes; chaque fleur pédunculée; les pédoncules géniculés, accompagnés à leur base d'une petite bractée. Le calice est fort petit, divisé en cinq découpures ovales-aiguës. Le fruit, beaucoup plus grand que le calice persistant à sa base, est composé de cinq capsules ouvertes en étoile, semencées par deux dents, renfermant trois semences.

Cette plante croît dans les contrées les plus chaudes du Pérou, où elle a été découverte par M. Joseph de Jussieu. *h* (*P. f. in herb. Juss.*)

78. **ABUTILON à feuilles d'hernandia.** *Sida hernandioides.* Lherit.

Sida foliis cordatis, subpeltatis, acuminatis, subintegris; pedunculis fructiferis prostratis. Lherit. Stip. Nov. 1. pag. 121. tab. 58.

Sida hernandioides, foliis subpeltatis, cordatis, ovatis, acuminatis, subintegerrimis, pubescentibus; pedunculis unifloris, capsulis mucis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 740. n°. 25.

Ses racines sont fibreuses, rameuses; il s'en élève une tige droite, cylindrique, verdâtre, hérissée de poils en étoile, d'abord simple, puis rameuse. Haute d'un pied & demi; les rameaux garnis de feuilles longuement pétiolées, presque pelées, ovales, en cœur, amples, presque entières, pubescentes, acuminées, à peine dentelées, pendantes; les pétioles de la longueur des feuilles; les stipules velues, subulées, horizontales, redressées à leur sommet.

Les fleurs sont rapprochées à l'extrémité des rameaux, axillaires, solitaires; les pédoncules droits, velus, allongés, articulés, munis quelquefois d'une ou de deux bractées avec un bouton de fleurs qui avorte. Le calice, hémisphérique à sa base, se divise en cinq découpures lanceolées, aiguës. La corolle est jaune; les pétales un peu arrondis, un peu échinés à leur sommet, plus longs que le calice; les filaments libres, capillaires, seulement réunis à leur partie inférieure; les anthères réniformes, à une loge; l'ovaire à quatre ou cinq côtes; trois ou cinq styles pinnés, à peine connivens à leur base; les stigmates caprés, pubescents. Le fruit est composé de cinq capsules au plus, plus longues que le calice, ovales, aiguës, renfermant chacune trois semences brunes, arrondies.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (*Descript. ex Lherit.*)

79. **ABUTILON à feuilles molles.** *Sida mollis.* Ortega.

D

Sida foliis cordatis-obovatis, duplicato crenatis; pedunculis uti sex bifloris, longi petiolis; petalis crenatis. Ortega. Querc. pag. 65.

Ses tiges sont épaisses, cylindriques, droites, hautes au moins de quatre pieds, très-pileuses, ainsi que les rameaux; les pétioles & les pédoncules garnis de feuilles alternes, pétiolées, fort amples, molles, vertes, un peu rindes en dessus, pubescentes & blanchâtres en dessous, un peu arrondies, échancrées en cœur, doublement crénelées, aiguës ou acuminées à leur sommet; les pétioles presque de la longueur des semi-lés, munis à leur base de deux stipules droites, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont axillaires, solitaires; les pédoncules allongés, simples, uniflores, rarement biflores. Le calice est cotonneux, blanchâtre, pileux, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle jaune, presque une fois plus longue que le calice; les pétales arrondis, légèrement crénelés. Le fruit est composé de cinq à six capsules brunes, pubescentes, redressées, à deux points courtes, renfermant trois semences presque globuleuses.

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. J. (V. v.)

* * Six capsules.

Ed. ABUTILON rameux. *Sida ramosa*. Cavan.

Sida foliis cordatis, acutis, inaequaliter & profunde dentatis; floribus ramosis; capsulis sex, biseriatis. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 28. tab. 6. fig. 1.

Sida ramosa, foliis ovato-cordatis, inaequaliter dentatis; racemis axillaribus, capsulis biseriatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 760. n°. 8c.

Toute la plante est couverte de poils mous, doux au toucher. Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses; ses feuilles pétiolées, alternes, ovales, en cœur, presque glabres, inégalement & profondément dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet; les stipules droites, linéaires.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires; les pédoncules alternes, uniflores, géminés, munis à leur base d'une petite bractée assez semblable aux stipules. Le calice se divise en cinq découpures acuminées. Le fruit, plus grand que le calice, contient six capsules à deux pointes, à trois semences.

Cette plante a été recueillie au Sénégal par M. Adanson. (V. f. in herb. Juss.)

* * * Capsules de sept à onze.

81. ABUTILON ligneux. *Sida lignosa*. Cavan.

Sida foliis cordatis, crenatis, tomentosis, orbiculato-acuminatis, acuminis prodebo; capsulis septatis ad obo, durissimis. Cavan. Dissert. bot. 1. p. 28. tab. 6. fig. 2.

Sida lignosa, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, crenatis, tomentosis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis mutis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 74. n°. 25.

Ses tiges sont ligneuses, très-dures, rameuses; les rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, un peu arrondies, échancrées en cœur, crénelées à leur contour, tomenteuses, longuement acuminées, fourrées par des pétioles deux fois plus longs que les feuilles, munis à leur base de deux stipules courtes, élargies.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, portées sur des pédoncules simples, droits, géminés, plus longs que les pétioles. Le calice est fort grand, à cinq angles plus ou moins aiguës. La corolle est jaune; les pétales ensés, arrondis, très-ouverts. Le fruit est conique, tronqué à son sommet, un peu plus grand que le calice, composé de sept à huit capsules obtuses, très-dures, à trois semences.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. J. (V. f. in herb. Juss.)

82. ABUTILON à ombelles. *Sida umbellata*. Linn.

Sida foliis cordatis, subangulatis, subcuneatis; floribus umbellatis; capsulis biseriatis, trispermis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 952. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 401. — Jacq. Hort. tab. 56. — Cavan. Dissert. 1. pag. 28. tab. 6. fig. 3, & Dissert. 5. pag. 276. tab. 129. fig. 2.

Sida umbellata, foliis subrotundo-cordatis, dentatis, subangulatis, acutis; pedunculis subquadrifloris, umbellatis, axillaribus; capsulis biseriatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 759. n°. 76.

Sida umbellata. Lam. Dict. 1. n°. 12.

L'ovaire est arrondi, surmonté d'un renfoncement; les styles; les stigmates globuleux; le fruit succède au fruit fort petit, renfermé dans le calice, contenant six à onze capsules à deux pointes, à trois semences. (Voyez ABUTILON à ombelles.)

83. ABUTILON à petites semences. *Sida microsperma*. Cavan.

Sida caule steruoso, ramoso; foliis cordatis, orbiculato-acutis, quinque nervis; fructu vix calice majore, seminibus minimis. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 29. tab. 7. fig. 4.

Sida microsperma, foliis subrotundo-cordatis, cuneatis, subcrenatis; pedunculis subsiliariis, petiolo brev-

vioribus; capsulis brevifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 746. n°. 36.

Ses riges font flexueuses, rameuses, cylindriques, hautes de deux pieds; les feuilles longuement pétiolées, un peu arrondies, échancrées en cœur, obscurément crénelées à leur contour, aiguës à leur sommet, munies de cinq nervures; les stipules courtes, capillaires; le calice globuleux, à cinq angles; la corolle jaune. Le fruit est sphérique, à peine plus grand que le calice, composé d'environ treize capsules, munies, lorsqu'elles s'ouvrent, de deux pointes ciliées; les semences font fort petites.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (*V. f. in herb. Juff.*)

84. ABUTILON de Sonnerat. *Sida sonneratii*. Cavan.

Sida foliis cordatis, crenatis, acutis, tomentosis; pedunculis crassis, geniculatis, erectis, folio duplo longioribus; fructu pilis stellatis ornato. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 29. tab. 6. fig. 4.

Sida sonneratiæ, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, dentatis; pedunculis foliariis, folio longioribus; capsulis truncatis, obtusis, calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. 54.

Alcea affinis indica, abutylon dicta, flore flavo; foliis mollioribus, profunde vinctis; siliculis lanuginosis, anoda zeylanicum. Pluken. Almag. pag. 17. Phytogr. tab. 126. fig. 5.

Cette espèce a des rapports avec le *Sida afonica*; elle en diffère par le nombre de ses capsules. Ses riges sont rougeâtres, velues, rameuses; ses feuilles longuement pétiolées, ovales, en cœur, un peu arrondies, tomenteuses, crénelées à leurs bords, acuminées à leur sommet, assez petites; quelquefois un peu lobées, munies de stipules petites, subulées, rabattues.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par de longs pédoncules velus, géniculés. Le calice est ovale, oblong; ses découpures lancéolées; la corolle jaune; les pétales échancrés. Le fruit est couvert de poils ouverts en étoile, beaucoup plus grand que le calice, composé de neuf capsules obtuses, tronquées, à trois semences.

Cette plante a été recueillie par Sonnerat au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Cavan.*)

85. ABUTILON à fleurs terminales. *Sida terminalis*. Cavan.

Sida foliis cordatis, sublobato-crenatis, tomentosis; cupis longissimo, siccâ terminato. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 29. tab. 6. fig. 6.

Sida terminalis, foliis ovato-lanceolatis, cordatis, dentatis; racemo terminali elongato, bracteato; cap-

ulis muticis, capitatis, calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 761. n°. 82.

Fruticulus pedunculis terminalibus elongatis, multifloris; floribus luteis, calice purpureo; foliis tomentosis, cordatis, crenatis. Commerf. Herb.

Cette belle plante a des riges ligneuses, hautes à peine d'un pied, rameuses, extrêmement tomenteuses; leur partie supérieure se terminant en un long pédoncule nu ou avec une seule feuille, soutenant des fleurs en grappe. Les feuilles sont alternes, longuement pétiolées, ovales-lancéolées, échancrées en cœur, crénelées ou dentées à leur contour, quelquefois un peu lobées, à peine aiguës, couvrées, à leurs deux faces, d'un duvet mou; les stipules courtes, subulées, tomentueuses.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des riges & des rameaux, en une grappe simple, en forme d'épi droit, nu ou muni d'une seule feuille; les pédoncules partiels garnis à leur base d'une petite bractée. Le calice se divise en cinq découpures ovales, peu profondes. La corolle est jaune, purpurine en dehors, beaucoup plus longue que le calice. Le fruit, saillant hors du calice, est composé d'environ neuf capsules obtuses, recouvertes d'un duvet blanchâtre, épais, ressemblant trois semences.

Cette plante a été recueillie par Commerfion à Monte-Video, sur les rochers. (*Descript. ex Cavan.*)

86. ABUTILON à trois pointes. *Sida tricuspidata*. Cavan.

Sida foliis cordatis, subrotundo-tricuspidatis, dentatis, tomento-canefcentibus; calicum laciniis interioribus carinatis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 30. tab. 6. fig. 5.

Sida (crassifolia), foliis cordatis, pedato-nerviis, utrinque tomentosis; pedunculis petiolo equalibus, capsulis calice quinqueungulo vix majoribus. Lhérit. Stirp. Nov. 8. pag. 125. tab. 60.

Sida crassifolia, foliis ovato-cordatis, dentatis, subtricuspidatis; pedunculis foliariis, axillaribus, petiolorum longitudine; capsulis biseriatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 761. n°. 84.

Arbrisseau tomenteux sur toutes ses parties, & d'une odeur forte. Ses riges sont droites, cendrées, cylindriques, rameuses; les rameaux étalés, un peu anguleux, garnis de feuilles longuement pétiolées, ovales, en cœur, acuminées à leur sommet, molles, dentées à leur contour, souvent à trois lobes courts, aiguës; un peu épaisses, tomenteuses & blanchâtres, rabattues, à peine plus longues que les pétiotes; les stipules petites, presque linéaires.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, surportées par des pédoncules tomenteux, de la longueur des pétiols, cylindriques, atténués vers leur sommet. Le calice est à cinq angles, à cinq découpures ovales, subulées, acuminées, étalées, réfléchies à leurs bords; la corolle d'un jaune de soufre; les pétales de la longueur du calice, élargis, légèrement échancrés à leur sommet. L'ovaire est arrondi, toruleux, pubescent, surmonté d'un style filiforme, à demi divisé en neuf ou dix divisions capillaires. Le fruit a la forme d'une poire; il renferme neuf ou dix capsules comprimées, à deux pointes, à trois semences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. (V. f.)

**** Plus de dix capsules.

87. ABUTILON crépu. *Sida crispata*. Linn.

Sida foliis cordatis, crenatis, scabrisculis; capsulis cernuis, inflatis, replevis, crenulatis. Cavan. Dissert. bot. 6. pag. 275. tab. 135. fig. 1.

Sida crispata, foliis cordatis, sublobatis, crenatis, tomentosis; capsulis cernuis, inflatis, multilocularibus, crenatis, repandis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 964. — Cav. Dissert. bot. 1. pag. 30. tab. 7. fig. 1.

Sida crispata, foliis oblongo-cordatis, acuminatis, crenatis, summis sessilibus; pedunculis foliariis, petiolo longioribus, fructibus, deflexis; capsulis inflatis, mucis, undulato-crispis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 747. n°. 40.

Abutilon vestiarium, crispum, floribus melicis, parvis. Dillen. Hort. Eltham. pag. 6. tab. 5. fig. 5.

Abutilon americanum, fructu subrotundo, pendulo; capsulis vesicariis crispis confatis. Mart. Cent. 19. tab. 29.

Abutilon aliud vesicarium. Plum. Icon. 15. tab. 25.

Sida crispata. Lam. Dict. 1. n°. 24.

Sida amplexicaulis. Lam. Dict. 1. n°. 15.

Les feuilles supérieures, portées sur des pétioles très-courts, & qui les font paroître amplexicaules, ont occasionné l'établissement de deux espèces par M. de Lamarck, qui n'en forment qu'une seule, ainsi que l'a observé M. Cavanilles. Les fruits sont composés de douze capsules sans pointe saillante, contenant chacune trois semences glabres, noirâtres, en forme de rein. (Voyez ABUTILON crépu, n°. 24. & ABUTILON amplexicaule, n°. 25, qu'il faut réunir.)

88. ABUTILON d'Asie. *Sida asatica*. Linn.

Sida foliis cordatis, dentatis; pedunculis unifloris,

petiolo longioribus; fructu lanuginoso, calice paulo majore. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 31. tab. 7. fig. 2, & Dissert. 2. pag. 49, & Dissert. 5. pag. 275. tab. 128. fig. 1.

Sida asatica, foliis cordatis, dentatis, indivisis; stipulis reflexis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis multilocularibus, hispidis, calice brevioribus (summis calice majoribus). Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 964, & Anac. acad. vol. 4. pag. 324.

Sida asatica, foliis cordatis, acutis, rugosis; pedunculis petiolo longioribus, capsulis calice vix brevioribus. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 150.

Sida asatica, foliis oblongo-cordatis, dentatis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis acutis, truncatis, calici subaequalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 751. n°. 49.

Abutilon indicum, flore luteo minore. Flor. zeyl. 520.

Sida asatica. Lam. Dict. 1. n°. 26.

Les feuilles sont un peu plus longues que larges; les stipules lancéolées, réfléchies; les pédoncules géniculés, accompagnés très-souvent d'une bractée en forme de petite écaille. Les fruits sont tronqués, très-velus, un peu plus longs que le calice, composés d'environ vingt capsules obtuses, à trois semences. (Voyez ABUTILON d'Asie.)

89. ABUTILON de l'île Maurice. *Sida mauritiana*.

Sida foliis cordatis, rotundatis, ligulato-acuminatis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis calice majoribus. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 129. tab. 62.

Sida (mauritiana), foliis cordatis, acutis, holorisicatis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis multilocularibus, hispidis; calice aequo. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 137, & Mill. Ill. 2. pag. 352.

Sida (mauritiana), foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, dentatis, summis tomentosis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis bispicatis, truncatis, calice longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 749. n°. 44.

Sida (planiflora), foliis cordatis, subrotundo-acuminatis, dentatis, tomentosis; capsulis: m. rostris intio foliatis, postea binis, longis, villosis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 32. tab. 7. fig. 4, & Dissert. 5. pag. 275. tab. 135. fig. 1.

Sida planiflora. Lam. Dict. 1. n°. 29.

Les feuilles sont accompagnées, à leur base, de deux stipules lancéolées, réfléchies. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules géniculés; l'ovaire globeux, velu; les styles nombreux; les stigmates en tête. Le fruit est hémisphérique, plus grand que le calice, composé d'environ vingt-neuf capsules surmontées d'une pointe longue, subulée,

velue, qui en suite se divise en deux; les semences au nombre de trois. (Voyez ABUTILON à fleurs planes, n°. 29.)

90. ABUTILON à feuilles de peuplier. *Sida populifolia*. Cavan.

Sida foliis cordatis, crenatis, fuscis, subrotundis acutis; stipulis spiritalibus, patulis; caule atro rubicante. Cavan. Dissert. bot. 1. p. 32. tab. 7. fig. 9, & Dissert. 5. pag. 175. tab. 128. fig. 2.

Sida (eteros michos), *foliis cordato-retundis, acuminatis, dentatis, subpeltatis; capsularum villorum rostris brevibus*. Cavan. Dissert. bot. 2. pag. 55.

Sida (populifolia), *foliis subrotundo cordatis, acuminatis, inaequaliter repando-dentatis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis acutis, truncatis, calice longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 751. n°. 50.

Sida (beloere), *foliis rotundatis, cordatis, acuminatis, crenatis, mollibus; pedunculis petiolo longioribus, capsulis calice majoribus*. Lherit. Stirp. Nov. 1. pag. 130.

Beloeur malabaricus, fructu gargantilla Lusitanis. Rheed. Hort. Malab. vol. 6. pag. 77. t. b. 45.

Sida populifolia. Lam. Dict. vol. 1. n°. 28.

Un caractère qui rend cette espèce très-remarquable, est d'avoir des stipules éralées, linéaires, qui finissent par se rouler en spirale. Ses fruits sont velus; ils contiennent de onze à dix-neuf capsules surmontées d'une pointe courte, qui se divise en deux à l'époque de l'émission des semences, au nombre de trois. (Voyez ABUTILON à feuilles de peuplier.)

91. ABUTILON hérissé. *Sida hirta*. Lam.

Sida caule hirta, foliis cordatis, subrotundis, dentatis; stipulis horizontalibus, cornum iussu contra petiolum directis; floribus solitariis, maculatis. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 33. tab. 7. fig. 5, & Dissert. 5. pag. 176. tab. 129. fig. 1.

Sida hirta, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, dentatis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis truncatis, acutis, calice brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 751. n°. 51.

Sida (pilosa), *foliis orbiculatis, cordatis, acuminatis; pedunculis petiolo brevioribus; capsulis calici aequalibus, pilosissimis*. Lherit. Stirp. Nov. 1. pag. 130.

Abutylon hirtum. Rumph. Herb. Amb. vol. 4. pag. 29. tab. 10.

Sida hirta. Lam. Dict. vol. 1. n°. 27.

Outre ses tiges, ses pétioles & ses pédoncules

hérissés de poils fins, horizontaux, cette espèce a de plus des stipules ouvertes horizontalement, & appliquées, comme deux cornes, dont la tige; caractères qui la font aisément distinguer. Ses fruits sont composés de quinze à dix-sept capsules tronquées à leur sommet; & peine plus longues que le calice, très-velues, renfermant trois semences. (Voyez ABUTILON hérissé, n°. 27.)

92. ABUTILON pubescent. *Sida pubescens*. Cav.

Sida foliis cordatis, sublobatis, valde tomentosis; pedunculis erectis, hirsutissimis, unifloris; fructu tomentoso, conico truncato. Cavan. Dissert. bot. t. pag. 33. n°. 71.

Sida pubescens, foliis subrotundo cordatis, acuminatis, angulato-dentatis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; capsulis obovatis, truncatis, calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 753. n°. 55.

Cette plante est couverte de poils nombreux, blanchâtres. Ses tiges sont dures, presque ligneuses, ramuscules; les rameaux garnis de feuilles alternes, longuement pétioles, un peu arrondies, presque lobées, échancrées en cœur, acuminées à leur sommet, dentées, légèrement anguleuses à leur sommet, romescentes à leurs deux faces, nerveuses en dessous; les pétioles de la longueur des feuilles, munis à leur base de deux stipules très-velues, un peu arquées, redressées.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules géniculés, plus longs que les pétioles. Le calice est velu, à cinq angles comprimés, à cinq découpures lancéolées, aiguës à leur sommet; la corolle blanchâtre; les pétales très-étalés. Le fruit est un peu plus grand que le calice, conique, tronqué, composé de quinze capsules à deux pointes courtes, à trois semences.

Cette plante croît à l'île de Saint Domingue. (V. f. in herb. Juss.)

93. ABUTILON de l'Inde. *Sida indica*. Linn.

Sida foliis cordatis, sublobatis; stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus; capsulis multilocularibus, scabris, calice longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 964. — Amoen. acad. vol. 4. pag. 324. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 33. tab. 7. fig. 10. — Vahl. Symb. 2. pag. 79.

Sida indica, foliis oblongo-cordatis, obtusiusculis, inaequaliter dentatis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis mucis, globosis-aggregatis, scabris, calice longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 752. n°. 52.

Sida cordifolia. Forsk. Flin. ægypt-arab. pag. 124.

Althæa Theophrasti similis. C. Bauh. Pin. 316.

Abutilon indicum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 950. Icon. — Camer. Hort. 3. tab. 1. — Tournef. Inst. R. Herb. 99. — Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 531. 4. 5. tab. 19. fig. 4.

Sida indica. Lam. Dict. 1. n°. 30.

Ses stipules sont lancéolées, très-ouvertes, réfléchies; les pédoncules geniculés, plus longs que les feuilles; l'ovaire tomenteux, cannelé, globuleux, formé de treize à quinze styles; les stigmates iphéaniques; les fruits composés de treize à quinze capsules tronquées, à trois semences. (Voyez ABUTILON d'Inde, n°. 30.)

94. ABUTILON velouté. *Sida mollissima*. Cavan.

Sida caule erecto, tomentoso; foliis cordatis, orbiculato-acuminatis, dentatis, mollissimis; floribus solitariis; calice fructifero, decgono, magno. Cavan. Dissert. bot. 2. pag. 49. tab. 14. fig. 1.

Sida mollissima, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, dentatis; pedunculis subfifloris, petiolo brevioribus, solitariis; capsulis bidentatis, truncatis, calici aequilabus.

Sida (cistiflora), foliis cordatis, acuminatis; pedunculis subfifloris, petiolo brevioribus; calicibus quinquepartitis, corollis capsulisque calici subaequilabus. Lhérit. Strp. Nov. 1. pag. 127. tab. 64.

Ses tiges sont tomenteuses, cylindriques, très-rameuses, hautes de quatre à cinq pieds; elles parviennent, dans leur pays natal, à la hauteur de dix pieds. Ses feuilles sont fort amples, très-longuement pétiolées, un peu arrondies, échancrées en cœur, acuminées, dentées à leur contour, très-molles & fort minces, pubescentes; les deux lobes de la base très-rapprochées; les stipules droites, allongées, capillaires, velues, très-cauques.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pédoncules droits, géniculés, plus courts que les pétales, longs d'un pouce & plus. Le calice est à cinq angles saillans à leurs bords, comprimés, à cinq faces, carénés dans leur milieu. Lorsque le calice enveloppe le fruit, il offre dix côtes à sa base, & les angles deviennent obtus, alternativement plus courts. La corolle est d'un jaune de soufre, très-ouverte; les pétales en cœur renversé, à peine plus longs que le calice; l'ovaire globuleux, cannelé, en six styles, autant de stigmates en tête. Le fruit est un peu plus grand que le calice, ovale, tronqué, rétréci & ombilicé à son sommet; il renferme onze capsules velues, à deux dents courtes lorsqu'elles laissent sortir les trois semences.

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou, le long du fleuve Maragnon; elle a été découverte par Dombey. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h. (M. v.)

95. ABUTILON ordinaire. *Sida abutilon*. Linn.

Sida foliis subrotundo-cordatis, indivisis; pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus, corollis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 34, & Dissert. 2. pag. 49.

Sida abutilon, foliis subrotundo cordatis, acuminatis, dentatis, tomentosis; pedunculis solitariis, petiolo brevioribus; capsulis biapertis, truncatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 750. n°. 47.

Abutilon Avicenna. Gært. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 251. tab. 135. fig. 1.

Abutilon foliis tomentosis, cordatis, petiolatis; foliis bicornibus. Haller, Helv. n°. 1075.

Althaa Theophrasti, flore luteo. C. Bauh. Pin. 316.

Althaa altera, sive abutilon. Camer. Epitom. 668. Icon.

Abutilon Theophrasti, flore luteo, quibusdam abutilon. J. Bauh. Hist. 2. pag. 958. Icon.

Sida abutilon. Lam. Dict. 1. n°. 21.

Ses capsules sont au nombre de quinze, noires, velues, tronquées, surmontées de deux pointes. Elles contiennent chacune trois semences. (Voyez ABUTILON ordinaire, n°. 21.)

96. ABUTILON à feuilles obtuses. *Sida obtusa*. Cavan.

Sida foliis subrotundo-cordatis, sublobatis; pedunculis umbellatis, capsulis multilocularibus. Vogel. Cent. Plant. tab. 69. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 34. tab. 9. fig. 2.

Sida obtusa, foliis cordatis, ovatis, obtusis, dentatis, tricuspidatis; pedunculis petiolo longioribus, subquadrifloris, umbellatis; capsulis acutis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 762. n°. 86.

Ses tiges sont droites, anguleuses, rameuses; les feuilles pétiolées, presque rondes, en cœur; à trois pointes ou à trois lobes peu marqués, dentées à leurs bords, obtuses, veinées, légèrement velues; les pétales pendans, anguleux, une fois plus courts que les feuilles; les stipules grandes, latérales, linéaires-lancéolées, ouvertes, acuminées.

Les fleurs sont disposées en une sorte d'ombelle, à l'extrémité d'un pédoncule commun, solitaire, latéral, plus long que le pétales; les pédicelles environ au nombre de cinq, courts, uniflores. Le calice est anguleux, divisé, jusqu'à la moitié, en cinq découpures; la corolle d'un jaune de soufre; les pétales égaux, arrondis, largement & inégalement échancrés; l'ovaire orbiculaire; les stigmates en tête. Le fruit est beaucoup plus grand

que le calice, hémisphérique, un peu arrondi, composé de huit capsules comprimées, à trois angles, acuminées; leur pointe recourbée; elles contiennent trois semences.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Descript. ex Cavan.)

97. ABUTILON à pétales recourbés. *Sida reflexa*. Lam.

Sida foliis subrotundo-cordatis, acutis, tomentosis, obtusis crenatis; corollis magnis, reflexis, coccineis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 36. tab. 7. fig. 7, & Dissert. 2. pag. 54, atque Dissert. 6. pag. 549. tab. 195. fig. 1.

Sida reflexa, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, crenatis, tomentosis; pedunculis foliariis, petiolo longioribus; petalis cuneiformibus, apice dentatis, reflexis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 744. n° 30.

Sida (retrofracta), foliis cordatis, crenatis; petalis resupinatis. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 155. tab. 64.

Sida reflexa. Lam. Dict. 1. n° 20.

Dans cette espèce le remarquable par sa corolle retournée & tout-à-fait rabattue sur le pédoncule. L'ovaire est ovale, filoné, surmonté de douze styles; le fruit est composé de douze capsules à trois semences. (Voyez ABUTILON à pétales recourbés, n° 20.)

98. ABUTILON d'Amérique. *Sida americana*. Linn.

Sida foliis cordatis, oblongis, indivisis; capsulis multilocularibus, torquidine calicis; loculis lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 963. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 749. n° 46. — Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 37. n° 81.

Sida americana. Lam. Dict. 1. n° 21.

Les capsules, au nombre de douze, contiennent chacune trois semences noirâtres. (Voyez ABUTILON d'Amérique.)

99. ABUTILON vésiculeux. *Sida vesicaria*.

Sida foliis cordatis, dentatis, subtrilobis; fructu inflato, capsulis decem pentaspermis. Cavan. Dissert. bot. 2. pag. 55. tab. 14. fig. 3.

Sida vesicaria, foliis ovato-cordatis, dentatis, subtrilobis; pedunculis foliariis, axillaribus, petiolo longioribus; capsulis truncatis, muticis, acuminatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 761. n° 83.

Cette espèce a des tiges droites, presque glabres, un peu purpurines, hautes de trois pieds, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles

fort grandes, pétiolées, ovales, échancrées en cœur, jusqu'à trois lobes ou à trois pointes, acuminées à leur sommet, glabres, très molles, un peu blanchâtres en dessous; les pétioles plus longs que les feuilles, accompagnés de deux stipules étroites, linéaires, d'abord étalées, puis rabattues.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, inclinées avant leur épanouissement, puis redressées, soutenues sur de longs pédoncules droits, geniculés, plus longs que les pétioles. Le calice est ovale, acuminé, pentagone, profondément divisé en cinq découpsures ovales, aiguës, relevées en carène. La corolle est grande, très-nuverte, d'un jaune de soufre; les pétales en cœur renversé, élargis, un peu écharnés à leur sommet, rétrécis à leur base; les anthères supportées par des filaments courts, à l'extrémité du tube; l'ovaire globuleux, filoné, surmonté de dix styles plus longs que les étamines, terminés par des stigmates globuleux. Le fruit est presque sphérique, renflé, ombiliqué à son sommet; il parvient à la grosseur d'une cerise, de forme ovale, plus grand que le calice, formé de dix capsules tronquées avec une petite pointe. Les semences sont au nombre de cinq.

Cette plante croît au Mexique. (Descript. ex Cavan.)

100. ABUTILON à grandes fleurs. *Sida grandiflora*. (N.)

Sida (arborea), foliis orbiculato-cordatis, crenatis, tomentosis; pedunculis geminis, petiolo longioribus; capsulis muticis, truncatis; caule arborescente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 748. n° 43.

Sida (arborea), foliis cordatis, pelatis, crenatis; floribus campanulatis, caule arborescente. Lhérit. Stirp. Nov. 1. pag. 131. tab. 63.

Sida arborea, foliis cordatis, ovatis, acuminatis, crenatis, quinquenerviis, mollissimis tomentosis; pedunculis axillaribus, unifloris. Linn. f. suppl. pag. 307.

Sida arborea. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 36. — Lam. Dict. 1. n° 18.

Sida (peruviana), foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, crenatis, tomentosis; pedunculis axillaribus; unifloris, longis; floribus maximis; stipulis lanceolatis, ciliatis, patulis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 36. tab. 7. fig. 8.

Sida peruviana. Lam. Dict. 1. n° 19.

Il est hors de doute que le *Sida peruviana* est la même plante que le *Sida arborea* de Linné fils. Quelques différences dans le port, occasionnées par la culture, quelques erreurs sur le nombre de capsules les avoient fait prendre pour deux plantes

différentes, mais très-rapprochées. C'est un très-bel arbrut; remarquable par la grandeur de ses fleurs, par la belle forme & la largeur de ses feuilles accompagnées de stipules subulées. Le calice est grand; à cinq larges découpures acuminées; l'ovaire globuleux & velu; le fruit gros, pubescent, velouté, composé de treize à quinze capsules mutiques, tronquées à leur sommet, contenant plusieurs semences en nombre indéterminé, de trois à six. (Voyez ABUTILON du Pérou, n°. 19.)

101. ABUTILON à feuilles de vigne. *Sida vitifolia*.

Sida caule fruticoso; foliis cordatis; lobatis; lobis acuminatis, serratis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 12. tab. 410.

Arbrut haut de quatre à cinq pieds, à rameaux alternes, tomenteux, garnis de feuilles amples, échanquées en cœur, divisées en cinq grands lobes; les deux inférieurs courts, les trois supérieurs longuement acuminés, dentés en scie à leurs bords; le dessus des feuilles ridé, couvert de quelques petites écailles arrondies; le dessous tomenteux, blanchâtre, à cinq nervures rameuses, saillantes; les stipules lancéolées, caduques.

Les fleurs sont grandes, presque disposées en ombelle à l'extrémité des tiges; le pédoncule commun axillaire, foliacé, de la longueur des pétioles; les pédicelles longs de deux pouces, articulés dans leur milieu. Le calice est tomenteux, divisé en cinq découpures ovales, aiguës, la corolle d'un rose-clair; les pétales ovales-oblongs, un peu échanqués à leur sommet, ciliés, rétrécis à leur base; le tube des étamines court, ventru, divisé, à son sommet, en trente filaments capillaires, jaunâtres, plus courts que la corolle, terminés par des anthères arrondies; l'ovaire globuleux, strié, tomenteux; le style simple, à neuf découpures oblongues, linéaires; les stigmates rougeâtres, linéaires, obtus. Le fruit est tronqué, plus grand que le calice, composé de neuf capsules tomenteuses, à deux longues arêtes subuées, six semences réniformes dans chaque capsule.

Cette plante croît au Chili, où elle fleurit au mois de mars. f. (Description ex Cavan.)

102. ABUTILON glauque. *Sida glauca*. Cavan.

Sida caule striato, ramofo; foliis cordatis, orbiculatis, dentatis, tomentosis, glaucis. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 8. n°. 10. tab. 11.

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, cylindriques à leur partie inférieure, profondément cannelées vers leur sommet, rameuses, tomenteuses; les feuilles alternes, longuement pétioles, en cœur, presque orbiculaires, dentées, aiguës, velues & glauques en dessus, tomenteuses & ar-

gentées en dessous, accompagnées de stipules caduques, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pedoncules droits, articulés, plus courts que les pétioles, accompagnés de deux écailles alternes. Leur calice est globuleux, à cinq découpures; la corolle d'un jaune de safran; les pétales plus longs que le calice, obliquement échanqués; le tube des étamines court, conique, divisé en plusieurs filaments; l'ovaire ovale, tronqué, tomenteux; les styles nombreux; les stigmates en tête. Le fruit, à peine plus grand que le calice, est tomenteux, ovale, tronqué, composé de vingt à trente capsules mutiques, à deux valves, renfermant d'une à trois semences noirâtres, réniformes.

Cette plante croît au Sénégal. x. (Description ex Cavan.)

103. ABUTILON effilé. *Sida virgata*. Cavan.

Sida foliis cordatis, ovato-acuminatis, serratis, à petioli apice pendulis; petalis orbiculatis, calice brevioribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 53. tab. 73.

Cette plante a des tiges droites, grêles, rameuses, un peu rudes, hautes d'environ quatre pieds, garnies de feuilles alternes, ovales, en cœur, acuminées, dentées en scie, pendantes du sommet des pétioles, rudes à leurs deux faces; les pétioles plus courts que les feuilles, munis de bractées étroites, presque linéaires, redressées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules simples, articulés, plus longs que les pétioles, hérissés, uniflores. Le calice est à peine pentagone, à cinq découpures aiguës; la corolle un peu plus courte que le calice, de couleur jaune; les pétales orbiculaires, très-entiers; le tube court, terminé par un grand nombre de filaments soutenant des anthères ovales; l'ovaire ovale, cannelé; environ sept styles conviviaux à leur base; les stigmates globuleux. Le fruit est à peine plus long que le calice, globuleux à sa base, composé d'environ sept capsules oblongues, cornues à leur sommet, renfermant trois semences noirâtres, réniformes.

Cette plante croît au Pérou, & se cultive dans le jardin botanique de Madrid. x. (Description ex Cavan.)

104. ABUTILON géant. *Sida gigantea*. Jacq.

Sida foliis subrotundo cordatis, crenatis, acuminato-tricostatis; floribus paniculatis, corollis reflexis. Willd. Spec. Plin. vol. 3. pag. 762. n°. 87.

Sida gigantea, foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, indivisis, vel superne trilobis; calice basi gibbofo, petalis reflexis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. pag. 8. tab. 141.

C'est

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt pieds sur un tronc droit, cylindrique, épais. Les rameaux sont effilés, tomenteux, blanchâtres, garnis de feuilles alternes, en cœur, un peu arrondies, très-amples, molles, crénelées & dentées en scie, tomenteuses à leurs deux faces, ridées en dessous, terminées quelquefois par trois angles acuminés, quelquefois entières; les pétioles hispides, plus longs que les feuilles; les stipules droites, petites, lancéolées, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules courts, épais, tomenteux; le calice à cinq divisions profondes, ovales, aiguës, renfoncées à leur base; la corolle jaune; les pétales arrondis, très-obtus, striés, de la longueur du calice; les anthères d'un jaune-pâle; le style filiforme, à dix découpures conniventes à leur base; les stigmates obtus, verdâtres. Les capsules sont au nombre de dix ou douze, brunes, velues, acuminées, disposées en rond, planes en dessus, contenant plusieurs semences comprimées, brunes, réniformes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. (*Descript. ex Jacq.*)

§. III. Le nombre des capsules & des semences incertain.

105. ABUTILON de Perse. *Sida persica*. Burm.

Sida foliis inferioribus petiolatis, cordatis, acuminatis; superioribus sessilibus, lanceolatis, dentatis; pedunculis solitariis, unifloris. Burm. Flor. Ind. pag. 148. tab. 47. fig. 1. — Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 35. tab. 4. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 748. n°. 41.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, roides, cylindriques, garnis de feuilles alternes, les inférieures fort grandes, pétiolées, élargies, ovales, en cœur, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, luisantes, profondément dentées à leurs bords; les supérieures presque sessiles, étroites, lancéolées, tomenteuses, profondément denticulées, presque pinnatifides à leur base, entières & aiguës vers leur sommet; les stipules fétacées.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, longuement pétiolées, placées vers le sommet des rameaux; les fleurs terminales géminées. Leur calice est pileux; la corolle jaune; les pétales orbiculaires, crénelés, un peu plus longs que le calice. Le fruit est renfermé dans le calice; il contient plusieurs capsules mutiques.

Cette plante croît dans la Perse. (*Descript. ex Cavan.*)

106. ABUTILON à feuilles tronquées. *Sida truncata*. Cavan.

Botanique. Supplément. Tome I.

Sida foliis subovatis, dentatis, rugoso-tomentosis, apice truncatis. Cavan. Dissert. botan. 1. pag. 35. tab. 6. fig. 7.

Sida truncata, foliis subrotundis, cordatis, apice truncato-obtusis, dentatis; pedunculis solitariis, petiolo longioribus; capsulis muticis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 756. n°. 68.

Cette plante a des tiges hautes de deux pieds, rameuses, tomenteuses, garnies de feuilles alternes, petites, pétiolées, un peu arrondies, échancrées en cœur, ridées, tomenteuses, dentées à leur contour, obtuses & presque tronquées à leur sommet; les stipules droites, velues, subulées. Les fleurs sont solitaires, axillaires; le calice presque rond, pentagone; la corolle d'un jaune d'oufre; les pétales arrondis, plus longs que le calice; l'ovaire ovale, à neuf cannelures; neuf styles rougeâtres; neuf capsules obtuses.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (*Descript. ex Cavan.*)

107. ABUTILON bisore. *Sida biflora*. Cavan.

Sida foliis cordatis, magnis, crenatis, tomentosis; acuminato proclatis; inferioribus oblongis, trispidatis; floribus geminis, axillaribus. Cav. Dissert. bot. 1. pag. 37. tab. 9. fig. 1.

Sida biflora, foliis ovato-cordatis, acuminatis; dentatis, trispidatis; pedunculis geminatis, axillaribus, petiolo aequalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 762. n°. 85.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, tomenteuses, divitées en rameaux alternes, garnis de feuilles longuement pétiolées, grandes, ovales, échancrées en cœur, à trois pointes, crénelées, tomenteuses, longuement acuminées; les inférieures plus allongées; les stipules lancéolées, étalées, redressées. Les fleurs sont géminées, axillaires, soutenues par des pédoncules uniflores, géniculés, de la longueur des pétioles. Le calice est grand, ovale, à cinq découpures lancéolées; la corolle ample, de couleur jaune; les pétales ouverts, échancrés; les étamines nombreuses, situées à l'extrémité d'un tube presque aussi long que la corolle; les styles nombreux.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (*Descript. Cavan. ex herb. Juss.*)

108. ABUTILON du Brésil. *Sida brasiliensis*. Cavan.

Sida caule tomentoso; foliis subcordatis, ovato-ocutis, crenatis; crenulis acuminatis; floribus numerosis, parvis, breviter pedunculatis. Cavan. Dissert. bot. 1. pag. 37. n°. 82, & Dissert. 2. pag. 54. tab. 34. fig. 1.

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport

avec le *Sida suberosa* de L'héritier; mais la fructification n'étant pas connue, il est difficile d'affirmer son identité.

Ses tiges sont tomenteuses, cylindriques, rameuses; les feuilles longuement pétiolées, ovales-aiguës, un peu en cœur, tomenteuses, crénelées à leur contour; les crénelures aiguës; les stipules droites, subulées, plus longues que les fleurs à celles-ci sont nombreuses, axillaires, petites, toutes pédicellées; les pédicelles courts, tomenteux, médiocrement géniculés; le calice tomenteux, pentagone, acuminé.

Cette plante a été recueillie au Brésil par Comberfon. (*Descript. ex Cavan. herb. Thouin.*)

109. ABUTILON à feuilles d'albée. *Sida alcaoides*. Mich.

Sida erecta, herbacea, foliis inferioribus triangulari-cordatis, incis; superioribus palmato-mulipatis; corymbo terminali, calicibus hispatis. Mich. Flor. boreal. Amet. vol. 2. pag. 44.

Cette plante a presque le port du *malva alcea*. Ses tiges sont droites, herbacées, garnies de feuilles alternes, pétiolées; les inférieures triangulaires, échanquées en cœur à leur base, incisées à leur contour; les supérieures palmées, à plusieurs divisions. Les fleurs sont disposées en une sorte de corymbe terminal. Le calice est hispide.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au Kentucky & à Tennessee, où elle a été découverte par Michaux. (*Descript. ex Mich.*)

110. ABUTILON phyllanth. *Sida phyllanthos*. Cavan.

Sida foliis crassis, tomentosis, imbricatis, duplicato-tripatis; petiolis floriferis. Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 276, tab. 127. fig. 4.

Sida (phyllanthus), acaulis, foliis ternatis; foliolis sessilibus, tripartitis, coniformibus, integerrimis, indivisis, obtusis; flore solitario; petiolo alato inferto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 767. n°. 99.

Cette singulière espèce a des tiges fusiformes, un peu fibreuses; elle produit des tiges courtes, rameuses, couchées, tapeteuses par l'impression des feuilles tombées, radicales, garnies de feuilles imbriquées & nombreuses, particulièrement vers le sommet des rameaux, pétiolées, deux fois tripartites; les découpures très-profondes, lancéolées, ovales, charnues, tomenteuses, blanchâtres en dessus, roussâtres en dessous, munies de stipules de la longueur des pétioles, insérées sur ces mêmes pétioles, terminées par un appendice obtus.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, placées sur

les pétioles, vers le sommet, entre les stipules. Le calice est ovale, à cinq découpures aiguës; la corolle un peu bleuâtre, beaucoup plus grande que les feuilles; les pétioles échanqués, un peu connivens, velus à leur base. Le tube des étamines s'élève en une colonne. Un peu au dessus de son sommet sont placés des filaments très-courts, ramassés en globe, contenant des anthères réniformes. L'ovaire est conique, entouré de poils tendres; le style simple, à douze divisions vers son sommet; les stigmates oblongs, un peu épais. Le fruit, peu connu, paroît être composé de douze capsules.

Cette plante a été découverte au Pérou par M. Jof. de Jussieu. (*V. f. in herb. Juss.*)

111. ABUTILON à feuilles crépues. *Sida crispifolia*. Cavan.

Sida caule fruticoso; foliis cordatis, ineis-lohatis, inferis tomentosis, superis punctato-festatis; marginibus crispis. Cav. Icon. Rat. vol. 5. pag. 11, tab. 419.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'un demi-pied, divisées en rameaux alternes, garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales, un peu lancéolées, échanquées en cœur, tomenteuses & roussâtres à leur face inférieure, crépues, incisées & lobées à leur contour, vertes en dessus, hérissées de points nombreux, dans lesquels on distingue des poils courts, ouverts en étoile; les pétioles plus courts que les feuilles; les stipules courtes, tomenteuses.

Les fleurs sont axillaires, terminales, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, velus, beaucoup plus longs que les feuilles. Le calice est grand, tomenteux, plus court que la corolle, à cinq découpures lancéolées; les dents crépues; la corolle bleuâtre, rouge en se desséchant; les pétioles arrondis, échanqués, rétrécis en onglet & connivens à leur base avec le tube des étamines: celui-ci est brun, supportant à son sommet une vingtaine de filaments capillaires, terminés par des anthères arrondies. L'ovaire est globuleux, strié; le style simple, plus court que les étamines; environ sept stigmates noirâtres, planes, linéaires, un peu épais; le fruit composé d'autant de capsules mutiques. Le nombre des semences n'est pas connu.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. B

112. ABUTILON hétérophylle. *Sida heterophylla*.

Sida caule herbaceo, foliis radicalibus ovato-fusculatis; caulinis tripartitis; lobis incis, acutis; medio longiore. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 14, tab. 421.

Ses racines sont fusiformes, garnies de quelques fibres; elles produisent des tiges herbacées, cylindriques, longues d'un pied, légèrement tomenteuses, ainsi que toute la plante. Les feuilles radicales sont nombreuses, presque ovales, sinuées, munies de quelques dents, longuement pétiolées; les feuilles caulinaires profondément divisées en trois lobes dentés, incisés, aigus; celui du milieu plus allongé; les pétioles courts; les stipules ovales, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par des pédoncules simples, beaucoup plus longs que les feuilles. Le calice est ovale, tomenteux, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle d'un bleu-clair, trois fois plus grande que le calice; les pétales veinés; le tube des étamines court; les anthères inégales, pédicellées. L'ovaire est globuleux, comprimé, strié; le style simple, court, violet, divisé en treize découpures capillaires; les stigmates obtus. Le fruit n'est pas connu.

Cette plante croît au Chili; elle fleurit au mois de mars. (?) (*Descript. ex Cavan.*)

113. *ABUTILON* à feuilles tridentées. *Sida tridentata*. Cavan.

Sida caule brevissimo, filiformi; foliis ovatis, apice tridentatis; floribus axillaribus, solitariis. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 6. tab. 31a. fig. 2.

Ses tiges sont à peine hautes de trois pouces, tomenteuses, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, tronquées, & divisées à leur sommet en trois dents aiguës, légèrement tomenteuses à leur face inférieure, longues de deux ou trois lignes; les pétioles de la longueur des feuilles; les stipules droites, linéaires, de la longueur des pétioles. Les fleurs sont solitaires, axillaires; la corolle jaune; l'ovaire surmonté de cinq styles. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (*Descript. ex Cavan. Comm. Dupuis.*)

* *Espèces moins connues.*

* *Sida* (*gracilis*), *caule fruticoso, fragili; foliis oblongo-ovatis, sursum angustatis, reflexis; ramulis fasciculatis.* Richard, Act. Soc. Paris, pag. 111. — Pers. Synop. Pl. vol. 2. pag. 243. n°. 33. É. Coënd. 7

* *Sida* (*patula*), *herbacea, patula, flexuosa; foliis brevi-petiolatis, ovatis, subrenatis, multifidis tomentosis; floribus axillaribus, fissilibus.* Pers. Synop. Pl. vol. 2. pag. 243. n°. 16. (*Flores albi.*)

Sida mollis. Richard, Act. Soc. Paris, Ex Anstilis. (?)

ABUTUA. (Loureir. Flor. cochin.) Gentie de plantes de la Cochinchine, décrit par Loureir. Il y rapporte des arbrisseaux à tige grimpante, à feuilles opposées & à fleurs en chatons mâles ou femelles, portés sur des pieds différents. Ces chatons sont noueux par intervalles, & garnis à chaque nœud d'une gaine membraneuse, renfermant, dans les mâles, beaucoup d'étamines; dans les femelles, plusieurs ovaires, terminés par des stigmates à plusieurs divisions, devenant aulant de baies sèches, à une seule semence.

Ce gentie a beaucoup d'affinité avec le *gnatum* Linn. & le *thoa* d'Aublert, & devra peut-être se réunir avec eux en un seul genre; il offre dans la disposition des bouches concentriques de ses tiges & du tissu cellulaire interposé, quelque rapport avec le pareira-brava du Brésil. (*Juss.*)

ACACALIS. Arbrisseau d'Égypte, cité par Dioscoride & ses commentateurs, sur lequel on n'a que des renseignements très-vagues. Selon le regard comme la même plante que le *hermes* du Levant, employé à Constantinople pour les maladies des yeux; mais il ne donne de l'une ni de l'autre aucune description qui puisse les faire reconnaître. (*Juss.*)

ACACIA (*Faux*). *Robinia pseudo-acacia*. Linn. (*Voyez ROBINIER*, n°. 1.)

ACACIA-ROSE. *Robinia hispida*. Linn. (*Voyez ROBINIER*, n°. 4.)

ACACIA. Willd. (*Voyez ACACIES*, n°. 104 & suivans.)

ACACIE. *Mimosa*. Si le petit nombre d'espèces d'acacies cultivées dans nos jardins ou languissantes dans nos serres, les unes sans fleurs, d'autres sans fruits, ont néanmoins assez d'agréments dans leur port, dans la délicatesse & l'élégance de leur feuillage, quelques-unes dans l'odeur suave de leurs fleurs pour être considérées comme un des plus beaux ornemens de ces jardins fastueux, créés par l'industrie humaine au milieu de la plus triste des saisons, combien elles doivent exciter l'admiration du voyageur qui les contemple entre les tropiques, en Amérique ou dans les Indes, où elles le montrent avec le luxe de la plus brillante végétation! Les espèces en sont si nombreuses, qu'on en compte aujourd'hui plus de deux cents. J'ai en avoir à peine mentionné une cinquantaine. C'est un des genres le plus beau par ses formes élégantes & variées, le plus curieux par les phénomènes singuliers qu'il présente, le plus intéressant par les résines & les gommes que four-

E 2

nissent au commerce plusieurs de ses espèces; par la pulpe succulente, sucrée & musquée contenue dans les gouffes de quelques autres; par les bois de construction, qu'elles produisent en abondance.

La différence qui existe entre les fleurs d'un grand nombre d'espèces dans la forme de leur corolle, dans le nombre des étamines, dans le caractère des fruits & des semences, avoient déjà fait sentir la nécessité de partager les *mimosa* en plusieurs genres. Cette réforme est devenue plus nécessaire encore par la découverte des nouvelles espèces, & Willdenow l'a exécutée dans le *Species Plantarum* qu'il publie. J'ai cru devoir adopter ses divisions; mais comme il y auroit, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, quelqueinconvenient à séparer des genres si rapprochés, j'ai présenté de suite toutes ces belles espèces avec les coupes convenables, rejetant à la fin toutes celles dont la fructification ne m'étoit point suffisamment connue.

La dénomination de *mimosa* n'étoit appliquée, dans l'origine, qu'à quelques espèces de ce genre. Tournefort en avoit établi deux; savoir: les *mimosa* & les *acacia*; le premier caractérisé par la forme articulée de ses gouffes; le second, par ces mêmes gouffes non articulées. Linné n'en avoit fait qu'un seul genre, sous le nom de *mimosa*. Ce mot, dérivé du mot latin *mimus*, exprime la singulière propriété qu'ont plusieurs espèces d'exécuter des mouvements en quelque sorte spontanés, & de changer de figure lorsqu'on en approche la main. Le mot *acacia* a été dans tous les tems, parmi les Grecs, le nom vulgaire de l'espèce qui produit la gomme arabique. Ce mot signifie *arbre sans malice*, parce que la piquette de ses épines n'est suivie d'aucun accident fâcheux.

Le bel arbre que l'on nomme vulgairement, parmi nous, *acacia*, n'appartient point du tout à ce genre. Tournefort, en l'appellant *pseudo-acacia*, a donné lieu à cette fautive dénomination. C'est le *robinia pseudo-acacia* de Linné. (Voyez ROBINIER.)

Je terminerai ces observations en faisant remarquer avec Willdenow, que, parmi les genres ou les divisions suivantes, toutes les espèces du *mimosa* & de *schrankia*, quelques-unes parmi les *desmanthus*, sont plus ou moins douées d'irritabilité dans leurs pétioles & leurs feuilles, tandis que les *acacia* & les *inga* en sont privés; que la plupart des gouffes, dans les *inga*, contiennent une pulpe douce, agréable au goût, un peu sucrée; que, dans le plus grand nombre des espèces de ces différents genres, les feuilles sont très-caduques, les pétioles souvent glanduleux, articulés, ainsi que les pédoncules. Il n'existe que très-peu d'espèces herbacées: ce sont de très-grands arbres, des arbrisseaux ou des arbrutes.

§. 1^{er}. INGA. Willd. Dans les fleurs hermaphrodites, calice à cinq dents; corolle tubuleuse, à cinq dents; étamines nombreuses, monadelphes; gouffe à une seule loge; semences pulpeuses ou arillées; point de pistil dans les fleurs mâles.

* Feuilles deux fois géminées.

1. ACACIE à petites feuilles. *Mimosa microphylla*.

Mimosa (inga microphylla), spinis stipularibus, retilis; foliis bigeminis, coriaceis; foliolis subdimidiato-ellipticis, obtusis, retusis; glandula in dichotomia petioli glabris; floribus fasciculatis, paniculatis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1004. n^o. 1.

Inga microphylla. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux flexueux d'un brun-centré, garnis de deux épines droites, épaisses, subulées, presque de la longueur des pétioles. Les feuilles sont alternes, pétioles, deux fois géminées, roides, glabres, luisantes; les folioles elliptiques, entières, obtuses à leur sommet, veinées, réticulées en dessus, glabres, un peu coriaces, longues de quatre lignes & plus; chaque paire de feuilles soutenue par un pédicelle court, glabre, muni, dans sa bifurcation, d'une petite glande.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en une panicule longue de deux pouces, à ramifications presque simples, alternes, soutenant des fleurs fasciculées.

Cette plante a été découverte par MM. Humboldt & Bonpland, en Amérique, dans la province de Cumana. 7

2. ACACIE piquante. *Mimosa pungens*.

Mimosa (inga pungens), spinis stipularibus, brevissimis, retilis; foliis bigeminis; foliolis subdimidiato-obovatis, obtusis, retusis; glandula in dichotomia petioli hirti; panicula simpliciter, elongata, terminali; floribus capitatis, legumine recto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1005. n^o. 2.

Inga pungens. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée, armés d'épines deux à deux, très-courtes, en forme de stipules, droites, subulées. Les feuilles sont pétioles, deux fois géminées; les folioles longues d'un pouce & moins, glabres; oblongues, entières, un peu coriaces, d'un vert-pâle, obtuses, veinées, réticulées à leur face supérieure; les pétioles longs d'un pouce, hérissés, munis, dans leur bifurcation, d'une petite glande.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une grappe simple, paniculée, com-

posée de paquets de fleurs ramassées en têtes pédoncelées. Le fruit est une gousse droite, pubescente avant sa maturité.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *Th* (Descript. ex Willd.)

3. ACACIE douce. *Mimosa dulcis*. Roxb.

Mimosa (inga dulcis), spinis stipularibus, brevissimis, rectis; foliis bigeminis; foliolis subdimidiato-oblongis, obtusis, subretuso-mucronatis; glandula in dichotomia pedunculis hirtis & inter foliola; panicula simpliciter, elongata, terminali; floribus capitatis, legumine torio. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1005. n°. 3.

Mimosa dulcis. Roxb. Coromand. 1. pag. 67. tab. 99.

Cette plante ressemble beaucoup à l'espèce précédente; elle en diffère par ses folioles plus grandes, plus longuement lancéolées; par ses pétioles plus courts, pourvus de trois glandes; enfin, par ses gousses tortillées.

Ses rameaux sont cylindriques, bruns, piquetés de blanc, armés de deux épines très courtes, stipulaires, droites, subulées. Les feuilles sont pétiolées, deux fois geminées; les folioles longues d'un pouce & plus, oblongues, lancéolées, coriaces, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, un peu mucronées; les pétioles hérissés, longs d'un demi-pouce, pourvus d'une glande dans leur bifurcation, & de deux autres à la base des folioles. Les fleurs sont disposées en une grappe paniculée, longue de cinq à six pouces, réunissant des fleurs en tête. Le fruit est une gousse rougeâtre.

Cette plante croît dans les îles Philippines & au Coromandel. *Th* (Descript. ex Willd.)

4. ACACIE lancéolée. *Mimosa lanceolata*.

Mimosa (inga lanceolata), spinis stipularibus, rectis; foliis bigeminis, coriaceis; foliolis subdimidiato-lanceolatis, obtusis, basi glandulosis; glandula in dichotomia petioli glabri; racemis paniculatis, terminatis; legumine torio. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1005. n°. 4.

Inga lanceolata. Humb. & Bonpl.

Grand & bel arbre, qui s'élève à la hauteur de quarante ou cinquante pieds. Ses rameaux sont glabres, flexueux, cylindriques, de couleur brune, piquetés de blanc, armés d'épines droites, subulées, stipulaires, très-fortes. Les feuilles sont pétiolées, deux fois geminées, coriaces, luisantes; les folioles lancéolées, obtuses, longues d'un pouce & demi, veinées, réticulées en dessus, calleuses & glanduleuses à leur base; les pétioles glabres, longs d'un pouce, munis d'une glande dans leur

bifurcation. Les fleurs sont alternes, réunies en grappes paniculées, terminales. Les gousses sont tortillées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *Th* (Descript. ex Willd.)

5. ACACIE ongle de chat. *Mimosa unguis cati*. Linn.

Mimosa (inga unguis cati), spinis stipularibus, rectis; foliis bigeminis; foliolis subrotundo-ellipticis, subdimidiatis, emarginatis; glandula in dichotomia petioli glabri & inter foliola; floribus capitatis, racemo terminali, legumine torio. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1006. n°. 5.

Mimosa unguis cati, spinosa, foliis bigeminis, obtusis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 499.

Mimosa spinosa, foliis bigeminis, obtusis; aculeis rectis. Vahl, Symb. 2. pag. 102.

(Voyez ACACIE ongle de chat, Lam. n°. 29.) Le synonyme de Pluknet, tab. 1. fig. 6, que M. de Lamarck rapporte à cette espèce, paroit y convenir beaucoup mieux qu'à *mimosa microphylla* de Willdenow.

6. ACACIE mielleuse. *Mimosa mellifera*.

Mimosa (inga mellifera), spinis stipularibus, recurvis; foliis bigeminis; foliolis subdimidiato-obovatis; legumine ensiformi, recto. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1006. n°. 6.

Mimosa (mellifera), spinosa, foliis bigeminis, obtusis; aculeis recurvis. Vahl, Symb. 2. p. 103.

Mimosa unguis cati. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 176.

Cette espèce ressemble parfaitement à la précédente par la forme de ses feuilles, mais elles sont beaucoup plus petites; on n'y trouve aucune glande, ni sur les pétioles, ni entre les feuilles. Ses gousses sont comprimées, allongées, aiguës, en forme d'épée.

Cette plante croît dans l'Arabie-Heureuse. *Th*

7. ACACIE à bois rouge. *Mimosa bigemina*. Linn.

Mimosa (inga bigemina), inermis, foliis bigeminis, membranaceis; foliolis oblongo-lanceolatis, acuminateis; glandula in dichotomia petioli glabri, & inter foliola; racemis paniculatis, terminalibus; legumine torio. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1007. n°. 7.

Mimosa (bigemina), inermis, foliis bigeminis, acuminateis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1499.

Mimosa inermis, foliis conjugatis, partialibus subjugis, lanceolato-ellipticis, aequalibus, omnibus oppositis. Vahl, Symb. 2. pag. 103.

Mimosa bigemina. Lam. Diâ. 1. n°. 4.

Ses feuilles sont munies, entre les folioles & dans la bifurcation des folioles, d'une glande fort petite. (Voyez ACACIE à bois rouge, n°. 4.)

8. ACACIE à feuilles de troëne. *Mimosa ligustrina*. Jacq.

Mimosa (inga ligustrina), spinis stipularibus, brevibus, retis; foliis bigeminis; foliolis subdimidiato-oblongis, utrinque obtusis; glandula in dichotomia petioli pubescentis, & inter foliola; racemis axillaribus; legumine teretibus, rectis. Willden. Spec. Plint. vol. 4. pag. 1007. n°. 8.

Mimosa ligustrina. Jacq. Fragn. bot. pag. 29. n°. 99. tab. 32. fig. 5.

Arbuste qui s'élève à la hauteur de quinze pieds, dont les rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée, armés, seulement sur les vieux rameaux, de deux épines courtes, subulées. Les feuilles sont deux fois geminées, pétiolées; les folioles oblongues, glabres à leurs deux faces, obtuses à leurs deux extrémités, veinées, réticulées, longues de deux pouces & plus; les pétioles pubescents, longs d'un pouce & demi, munis, dans leur bifurcation & dans celle des pédicelles, d'une petite glande.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes alternes, simples ou quelquefois composées; elles produisent des gouffes allongées, un peu cylindriques, droites, noueuses; les valves toises après l'émission des semences. Celles-ci sont arrondies, comprimées, noirâtres, luisantes, à moitié recouvertes par une pulpe songueuse.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, à Caracas, aux lieux sablonneux. (Descript. ex Willd.)

9. ACACIE à feuilles de courbail. *Mimosa hymenaeifolia*.

Mimosa (inga hymenaeifolia), spinis stipularibus, minutissimis, retis; foliis bigeminis; foliolis subdimidiato-oblongis, acuminatis, obtusis; glandula in dichotomia petioli glabri & foliorum axillis; racemis paniculatis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1008. n°. 9.

Inga hymenaeifolia. Humboldt & Bonpl.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée, armés de deux épines droites, très-fines, à peine sensibles; les feuilles pétiolées, deux fois geminées; les folioles coriaces, assez semblables à celles du courbail, ovales-oblongues, glabres, luisantes, longues de trois ou quatre pouces, acuminées; leur pointe obtuse; leur pétiole glabre, muni d'une glande dans chaque bifurcation. Les

fleurs sont grandes, alternes, disposées en une panicule terminale.

Cette plante a été découverte dans la Nouvelle-Anjou par MM. Humboldt & Bonpland. (Descript. ex Willd.)

10. ACACIE fétide. *Mimosa fetida*. Jacq.

Mimosa (inga fetida), inermis, foliis bigeminis quadrigeminis; foliolis subdimidiato-oblongis, acutiusculis, subius glaucis; spinis geminis, extrafoliaceis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1008. n°. 10.

Mimosa (fetida), inermis, foliis bigeminis quadrigeminis, spinis subgemellis. Jacquin, Hort. Schoenb. vol. 3. pag. 75. tab. 390.

Cette plante exhale, de toutes ses parties, une odeur forte & désagréable. Ses rameaux sont glabres, cylindriques, liliés, dépourvus d'épines, très-lisses, d'un blanc-cendré, garnis de feuilles alternes, deux, quelquefois quatre fois geminées, composées de folioles ovales, longues d'un pouce & plus, larges de six lignes, vertes en dessus, glauques en dessous, glabres à leurs deux faces, obtuses à leurs deux extrémités, inégalement partagées par la nervure du milieu; les pétioles géminés, munis, à leur sommet, d'une ou de deux petites épines crochues. Les fleurs sont disposées en épis latéraux, situés hors de l'aisselle des feuilles, de couleur verdâtre; deux ou trois épis réunis sur un pédoncule commun.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

11. ACACIE à feuilles de saponaire. *Mimosa saponaria*. Lour.

Mimosa (inga saponaria), inermis, foliis bigeminis pinnatis; foliolis subdimidiato-ovatis, panicula terminali, floribus capitatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1008. n°. 11.

Mimosa (saponaria), inermis, foliis bigeminis pinnatis; panicula terminali. Lour. Flor. cochinc. vol. 2. pag. 802.

Cortex saponarius. Rumph. Herb. Amb. vol. 4. pag. 131. tab. 66.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux étalés, dépourvus d'épines, garnis de feuilles alternes, pétiolées, deux fois geminées ou ailées, composées de folioles pédicellées, ovales, entières, acuminées à leur sommet, partagées un peu inégalement par la nervure du milieu. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, ramifiée en têtes. Son écorce fournit un très-bon savon; elle se vend par les places publiques. Battue dans l'eau, elle y forme une écume: on s'en sert

pour nettoyer le linge, se laver les cheveux & le corps.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine. *h* (*Descript. ex Willd.*)

* * Feuilles trois fois géminées.

12. ACACIE trigémée. *Mimosa tergemina*. Linn.

Mimosa (inga tergemina), *inermis*, *foliis tergeminis*; *foliolis subdimidiato-oblongis*, *obtusis*, *subrotundis*; *petiolis eglandulosis*; *fasciculis florum axillaribus*, *pedunculatis*; *legumine recto*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1009. n°. 12.

Mimosa tergemina, *inermis*, *foliis tergeminis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1499. — Jacquin, Amer. pag. 165. tab. 177. fig. 81.

Mimosa purpurea var. *p*. Lam. Dict. n°. 5.

Il n'y a point de glandes dans la bifurcation des folioles. Les pédoncules sont foliaires, axillaires, supportant, à leur sommet, un paquet de six à huit feuilles sessiles, auxquelles succèdent des gousses droites. (*Voyez* ACACIE à fleurs pourpres, n°. 5.)

13. ACACIE des Caripes. *Mimosa caripensis*.

Mimosa (inga caripensis), *inermis*, *foliis tergeminis*; *foliolis subdimidiato-oblongis*, *utrinque angustatis*, *obtusis*, *resupis*; *petiolis eglandulosis*; *fasciculis florum axillaribus*, *foliariis*, *pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1009. n°. 13.

Inga caripensis. Humb. & Bonpl.

Cet arbrisseau a de très-grands rapports avec l'espèce précédente; mais les folioles sont plus grandes, aiguës à leurs deux extrémités, réticulées, veinées, point glauques en dessous. Ses rameaux sont cendrés, ponctués, verruqueux; ses feuilles pétioles, trois fois géminées, longues d'un pouce & plus, oblongues, obtuses, glabres à leurs deux faces & les pétioles de la longueur de la feuille, dépourvus de glandes. Les pédoncules sont foliaires, axillaires, supportant un paquet de dix à douze fleurs sessiles.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andalousie. *h* (*Descript. ex Willd.*)

14. ACACIE à feuilles échantrées. *Mimosa emarginata*.

Mimosa (inga emarginata), *inermis*, *foliis tergeminis*; *foliolis subdimidiato-obovatis*; *obtusis*, *emarginatis*, *bassifemicaudatis*, *rigidis*, *intermediis majoribus*; *petiolis eglandulosis*; *fasciculis florum axillaribus*, *aggregatis*, *pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1009. n°. 14.

Inga emarginata. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée; les feuilles pétioles, trois fois géminées; les pétioles dépourvus de glandes; les folioles roides, en ovale renversé, très-obtus à leur sommet, arrondies, échantrées, à demi en cœur à leur base, inégales; les deux extérieures longues d'un pouce & plus; les quatre intérieures longues d'environ deux pouces. Les fleurs sont axillaires, sessiles, réunies au nombre de trois ou cinq en un seul paquet, sur un pédoncule commun.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (*Descript. ex Willd.*)

15. ACACIE coriace. *Mimosa coriacea*.

Mimosa (inga coriacea), *inermis*, *foliis tergeminis*; *foliolis subdimidiatis*, *oblongo-lanceolatis*, *acutiusculis*, *intermediis majoribus*; *petiolis eglandulosis*; *fasciculis florum subgeminis*, *axillaribus*, *pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1010. n°. 15.

Inga coriacea. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux bruns & cylindriques, garnis de feuilles alternes, trois fois géminées; les pétioles dépourvus de glandes; les folioles roides, oblongues, lancéolées, coriaces; les quatre intermédiaires longues d'un pouce & demi; les deux extérieures plus courtes, à peine d'un pouce de long. Les pédoncules sont réunis deux ou trois dans l'aisselle des feuilles; ils soutiennent environ douze fleurs sessiles, fasciculées. Il leur succède une goussie plane, droite, linéaire, longue de trois pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (*Descript. ex Willd.*)

16. ACACIE à longues feuilles. *Mimosa longifolia*.

Mimosa (inga longifolia), *foliis tergeminis*; *foliolis aquilatis*, *oblongo-lanceolatis*, *acuminatis*, *basis attenuatis*; *glandula inter foliola terminalia*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1010. n°. 16.

Inga longifolia. Humb. & Bonpl.

Les espèces que nous avons décrites jusqu'à présent avoient toutes leurs folioles également partagées par leur principale nervure, & par conséquent leurs côtés inégaux. Il n'en est pas de même de celle-ci.

Ses rameaux sont cylindriques, d'un brun-cendré; les feuilles pétioles, trois fois géminées; les folioles à côtés presque égaux, oblongues, lancéolées, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, un peu coriaces, luisantes à leur face supérieure; les quatre folioles intermédiaires lon-

gues de quatre à cinq pouces; le pétiole commun muni, à son sommet entre les deux folioles terminales, d'une petite glande sessile. Les fleurs & les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Descript. ex Willd.)

*** Feuilles ailées, pétiole commun, membraneux ou nu.

A. Pétiole ailé ou membraneux.

17. ACACIE à fruits sucrés. *Mimosa inga*. Linn.

Mimosa (inga vera), *inermis*, foliis pinnatis, subquingjugis; foliolis ovato-oblongis, acuminatis, glabris; glandula inter omnia paria; petiolo alato; corollis villosis; leguminibus falcatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1010. n°. 17.

Mimosa (inga), *inermis*, foliis pinnatis, quingjugis; petiolo marginato, articulo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1298.

Arbor siliquosa, brasiliensis, foliis pinnatis, tosta media membranulis extansibus. Sloan, Jam. 154. Hist. 2. pag. 58. tab. 183. fig. t. — Kal, Hist. 1762. — Mer. Sur. tab. 51.

Mimosa inga. Lam. Dict. 1. n°. t.

On distingue, entre chaque paire de folioles, une glande assez grosse, sessile, en coupe. Le calice est tubuleux, à cinq dents droites, pileux; la corolle velue, tubuleuse, à cinq dents; les gouffes pubescentes. (Voyez ACACIE à fruits sucrés, n°. 1.)

18. ACACIE bâtarde. *Mimosa spuria*.

Mimosa (inga spuria), *inermis*, foliis pinnatis, subquingjugis; foliolis oblongis, acuminatis, subciliis tenuissimè pubescentibus; glandula inter omnia paria; petiolo alato; corollis villosis; leguminibus falcatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1011. n°. 18.

Inga spuria. Humb. & Bonpl.

Cette espèce ressemble beaucoup au *mimosa spuria* par son port, par ses gouffes; elle en diffère par ses folioles plus nombreuses, plus étroites, revêtues en dessous d'un léger duvet. Les fleurs sont plus petites.

C'est un arbre fort élevé, dont les rameaux sont garnis de feuilles alternes, pétiolees, ailées, sans impaire, composées de cinq ou six paires de folioles; les supérieures plus grandes, longues de trois pouces; les inférieures de deux, oblongues, acuminées, veinées, luisantes en dessus, légèrement pubescentes en dessous. Les fleurs sont disposées en épis axillaires & terminaux.

Cette plante croît au Brésil, dans la Nouvelle-Andalousie. *h* (Descript. ex Willd.)

19. ACACIE de Cayenne. *Mimosa ingoides*. Rich.

Mimosa (inga ingoides), *inermis*, foliis pinnatis, quadrijugis; foliolis oblongis, acuminatis, subciliis tomentosis; glandula inter omnia paria; petiolo alato; corollis villosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1012. n°. 19.

Mimosa (ingoides), *habitu inga*, foliolis subciliis tomentosis, ovatis; acuminis abrupto, tenui, acuto. Rich. A.2. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. p. 113.

Elle diffère de la précédente par ses feuilles à quatre paires de folioles plus larges, tomenteuses en dessous; les feuilles supérieures, plus grandes; longues de quatre pouces; les inférieures longues de deux pouces, alongées, glabres & luisantes en dessus, avec la nervure du milieu velue; tomenteuses à leur face inférieure, terminées par une pointe courte & obtuse; le pétiole commun, ailé; articulé; une glande sessile, en coupe, fixée entre chaque paire de folioles. Les fleurs sont disposées en grappes terminales. Les jeunes rameaux, ainsi que les pédoncules, les calices & la corolle, sont tomenteux.

Cette plante croît à Cayenne. *h*

20. ACACIE à feuilles de saponier. *Mimosa sapindoides*.

Mimosa (inga sapindoides), *inermis*, foliis pinnatis, subquadrijugis; foliolis oblongis, acuminatis, supra nitidis, subtus scabriusculis; glandula inter omnia paria; petiolo alato; corollis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1012. n°. 20.

Arbre très-haut, dont les rameaux sont hérissés, les feuilles ailées, à trois, quatre ou cinq paires de folioles oblongues, acuminées, glabres & luisantes en dessus, plus pâles en dessous, épaisses, un peu rudes; les supérieures plus grandes, longues de quatre pouces; les inférieures insensiblement plus petites; le pétiole nu à sa partie inférieure, couvert de quelques poils rares, linéaire, ailé entre les folioles; une glande sessile, en godet entre chaque paire de folioles. Les fleurs sont disposées en épis foliaires, axillaires, courts, oblongs, pédonculés; les corolles blanches & glabres; les gouffes glabres, linéaires, longues d'un pied.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (Descript. ex Willd.)

21. ACACIE de Sinémari. *Mimosa suacariensis*.

Mimosa (inga angustifolia), *inermis*, foliis pinnatis, quadri-novemjugis; foliolis lanceolatis, acuminatis,

minatis, utrinque nitidis; glandulâ inter omnia paria; petiolo alato; leguminibus linearibus, planis, glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1012. n°. 21.

Mimosa (linemariensis), foliis pinnatis, trijugis; floribus racemosis, leguminibus, longissimis. Persf. Synops. Plant. vol. 2. pag. 262. n°. 21. — Aubl. Guian. vol. 1. pag. 945.

Inga siliquis longissimis, vulgò pacai. Feuillée, Peruv. vol. 2. pag. 27. tab. 19.

Ses feuilles sont composées de quatre à neuf paires de folioles presque égales, longues de trois ou quatre pouces, lancéolées, luisantes, très-glabres à leurs deux faces, terminées par une longue pointe obtuse; leur pétiole ailé, articulé entre les folioles, munies, dans leurs aisselles, d'une glande sessile & comprimée. Ses gouffes sont planes, sessiles.

La figure de Feuillée ne diffère de cette plante que par les folioles plus petites. Si elle est la même que celle qui vient d'être mentionnée, ce seroit un arbre haut d'environ vingt-cinq à trente pieds, ayant le tronc de la grosseur d'un homme; les fleurs disposées en épis axillaires, sessiles sur le pédoncule commun. Ses gouffes sont pleines d'une pulpe blanchâtre & sucrée.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. H

22. ACACIE blanche. *Mimosa alba*. Swartz.

Mimosa (inga alba), inermis, foliis trijugis; foliolis oblongis, acuminatis, equalibus, glabris, glandulâ inter omnia paria; petiolo alato, spicis ovatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1013. n°. 22.

Mimosa (alba), inermis, foliis pinnatis, trijugis; pinnis equalibus, ovatis, acuminatis; petiolo submarginato, spicis ovatis, floribus monadelphis. Swartz, Prodr. pag. 85, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 976.

Arbuste dont les rameaux sont lisses, anguleux, les plus jeunes flexueux; les feuilles alternes, ailées, composées de trois, rarement quatre paires de folioles presque sessiles, oblongues, acuminées, obliques, entières, assez grandes, glabres à leurs deux faces, veinées, nerveuses; les pétioles anguleux, épaissis à leur base, dilatés à l'insertion des folioles; une glande arrondie, assez grosse, creusée, située entre chaque paire de folioles.

Les fleurs sont axillaires, geminées, réunies par fascicules sur un pédoncule commun, divisé en plusieurs pédicelles formant un épi ovale. Le calice est fort petit, à cinq dents; la corolle verdâtre, tubulée; le limbe élargi, à cinq découpures droites; les filaments réunis en tube, deux ou trois

Botanique, Supplément. Tome I.

fois plus longs que la corolle; les anthères arrondies; un style simple. Le fruit n'a point été observé.

Cette plante croît à Cayenne. H (*Descript. ex Swartz.*)

23. ACACIE à feuilles de casse. *Mimosa quasifolia*.

Mimosa (inga quasifolia), inermis, foliis pinnatis, bijugis; foliolis ovato-oblongis, acuminatis, utrinque nitidis, superioribus majoribus; glandulâ inter omnia paria; petiolo alato, spicis axillaribus, corollis villosis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1013. n°. 23.

Ses rameaux sont glabres, garnis de feuilles ailées, composées de deux paires de folioles ovales, oblongues, acuminées, luisantes, glabres à leurs deux faces; les supérieures longues de trois pouces & plus; les inférieures d'un pouce & demi, ayant dans leurs aisselles une glande sessile, en godet; le pétiole ailé entre 1^{re} & 2^{de} folioles jusqu'à la base, linéaire, presque cuneiforme. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, foliaires, pédonculés; le pédoncule commun couvert de poils rares; la corolle roide, velue.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. H (*Descript. ex Willd.*)

24. ACACIE luisante. *Mimosa nitida*.

Mimosa (inga nitida), inermis, foliis pinnatis, bijugis; foliolis oblongo-lanceolatis, utrinque nitidis, superioribus majoribus; glandulâ inter omnia paria; petiolo alato, spicis axillaribus, corollis villosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1014. n°. 24.

Cette espèce diffère de la précédente par ses folioles beaucoup plus allongées; par ses épis oblongs & non ovales, longuement pédonculés.

Les branches sont cylindriques, ponctuées de blanc; les jeunes rameaux hérissés, garnis de feuilles composées de deux paires de folioles oblongues, lancéolées; les plus jeunes mucronées comme dans l'espèce précédente, luisantes à leurs deux faces, munies en dessus de poils rares, beaucoup plus abondants sur les nervures; les supérieures longues de quatre ou cinq pouces, les inférieures de deux pouces. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, foliaires, longuement pédonculés; la corolle très-roide & velue.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. H (*Descript. ex Willd.*)

25. ACACIE fastueuse. *Mimosa fastuosa*. Jacq.

Mimosa (inga fastuosa), inermis, foliis pinnatis, quadrijugis; foliolis ovato-oblongis, acutis, supra glabris, subtus ferrugineo-hirsutis; glandulâ

pedicellatâ, inter omnia paria; petiolo a'uto, corollâ villosâ. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1014. n°. 25.

Mimosa fistulosa. Jacq. Fragm. botan. pag. 15. tab. 10.

Ses branches sont étalées; ses rameaux velus, couleur de toulie; ses feuilles ailées, composées de quatre ou cinq paires de folioles ovales-oblongues, luisantes en dessus, chargées, principalement sur les nervures, de poils épars, couchés, heissées en dessous de poils nombreux, couleur de rouille; les folioles supérieures longues de quatre pouces; les inférieures de deux pouces ou de deux pouces & demi; le pétiole ailé, glabre en dessus; une & quelquefois deux glandes pédicellées en sa base.

Les fleurs sont disposées en épis dans l'aisselle des feuilles, portées sur un pédoncule commun extrêmement velu. La corolle est également velue & rouge; il lui succède une gouffe linéaire, élargie, comprimée, tortueuse.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Cara. 25. h

26. ACACIE veloutée. *Mimosa velutina.*

Mimosa (inga velutina), inermis, foliis pinnatis, quadrifidis; foliolis ovatis, acutis, utrinque mollioribus p'centibus, supra nitidis; glandula inter omnia paria; petiolo alato, corollâ villosâ. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1014. n°. 26.

Ses tiges se divisent en rameaux obtusément anguleux, couverts d'un duvet épais, ferrugineux garnis de feuilles ailées, composées de quatre paires de folioles larges, ovales, aiguës, chargées à leurs deux faces, particulièrement en dessous, de poils mous, ferrugineux; luisantes en dessus, longues de cinq à six pouces, larges, à leur base, de trois ou quatre pouces, une glande en godet entre les folioles; trois dans les aisselles de la dernière paire; les pétioles ailés. Les fleurs sont disposées en épis solitaires, axillaires, soutenues par un pédoncule commun, très velu, ferrugineux; la corolle rouge & velue.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. h (*Descript. ex Willd.*)

27. ACACIE à grandes feuilles. *Mimosa macrophylla.*

Mimosa (inga macrophylla), foliis pinnatis, bipagis; foliolis ovatis, acutis, glabris, supra nitidis; glandula inter omnia paria; petiolo alato, corollâ villosâ. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1015. n°. 27.

Inga macrophylla. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont quadrangulaires; ses feuilles

composées de deux paires de folioles glabres, ovales, aiguës, touffues, luisantes en dessus, plus pâles en dessous; les supérieures longues de six pouces & plus, & de quatre pouces de large; les inférieures longues de quatre à cinq pouces & de trois de large, garnies sur leurs nervures, à leurs deux faces, de poils épars, blanchâtres; une glande sessile, en godet entre chaque paire de folioles; le pétiole ailé; les épis solitaires, pédonculés, axillaires; la corolle rouge, velue.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h (*Descript. ex Willd.*)

28. ACACIE à feuilles de hêtre. *Mimosa sagittata.* Linn.

Mimosa (inga marginata), inermis, foliis pinnatis, bipagis; foliolis oblongo-lanceolatis, acuminatis, glabris; glandula inter omnia paria; petiolo apice marginato; spicis axillaribus, subquaternis; corollâ glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1015. n°. 28.

Mimosa (sagittata), inermis, foliis pinnatis, bipagis; petiolo marginato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1498.

Mimosa sagittata. Lam. Dict. 1. n°. 2.

Il existe entre chaque paire de folioles une glande sessile, en godet. Les fleurs se pendent une odeur très-faible. (*Voyez ACACIE à feuilles de hêtre.*)

B. Pétiole nu.

29. ACACIE à fruits nouveaux. *Mimosa nodosa.* Linn.

Mimosa (inga nodosa), inermis, foliis pinnatis, bipagis; foliolis ovato-oblongis, inaequaliteris, glabris; glandula inter omnia paria; petiolo linearis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1016. n°. 29.

Mimosa (nodosa), inermis, foliis pinnatis, bipagis; pinnis inferioribus, minoribus; petiolo linearis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1478.

Mimosa nodosa. Lam. Dict. 1. n°. 3.

Les feuilles sont ailées, composées de deux paires de folioles ovales oblongues, les inférieures munies, dans leur aisselle, d'une petite glande; (*Voyez ACACIE à fruits nouveaux, n°. 3.*)

30. ACACIE à corolle foyeuse. *Mimosa sericea.*

Mimosa (inga punctata), inermis, foliis pinnatis, bi-trijugis; foliolis oblongis, acuminatis, nitidis; glandula inter omnia paria; petiolo tereti, frigido, nudo; spicis paniculatis, axillaribus; corollâ sericeo-villosâ. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1016. n°. 30.

Mimosa (sagittifolia), inermis, foliis bijugis trijugis. Jacq. Amer. pag. 264. tab. 164. (*Exclipsis synonymis.*)

Ses rameaux sont glabres, obscurément anguleux, ponctués de blanc ; les feuilles composées de deux ou trois paires de folioles coriaces, oblongues, acuminées, luisantes & d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, couvertes, principalement sur leurs nervures, de poils épars & couchés ; les folioles supérieures longues de quatre pouces ; les inférieures de deux pouces ou deux pouces & demi ; une glande sessile & comprimée entre les aisselles ; les pétioles nus ; cylindriques, pileux.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes oblongues, pédonculées, rarement solitaires, plus souvent au nombre de trois ou quatre sur un pédoncule commun, formant alors une sorte de panicule terminale. La corolle est couverte de poils soyeux.

Cette plante croît dans les forêts de la Martinique & aux environs de Caracas. *H. (Descrip. ex Willd.)*

31. ACACIE brillante. *Mimosa splendens.*

Mimosa (inga splendens), foliis pinnatis, bijugis ; foliolis oblongis, acuminatis, nitidis ; glandula inter omnia paria ; petiolo semitereti, glabro, nudo ; spicis axillaribus, geminatis ; corollis sericeo-villosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1017. n°. 31.

Quoique cette espèce ait le même port que la précédente, elle s'en distingue par des caractères qui lui sont propres, & par la grandeur de toutes les parties.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, verveux ; les feuilles ailées, composées de deux paires de folioles oblongues, acuminées, glabres à leurs deux faces, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous ; les supérieures longues de six pouces ; les inférieures de quatre pouces, pourvues, entre leurs aisselles, d'une glande sessile, en godet ; le pétiole glabre, à demi cylindrique, nu, verruqueux ; deux épis, quelquefois plus, axillaires, pédonculés. La corolle est couverte de poils soyeux.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *H. (Descrip. ex Willd.)*

32. ACACIE éclatante. *Mimosa coruscans.*

Mimosa (inga coruscans), inermis, foliis pinnatis, trijugis ; foliolis oblongis, utrinque attenuatis, nitidis ; glandula inter omnia paria ; petiolo tereti, glabro, nudo ; spicis axillaribus, geminatis ; corollis glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1017. n°. 32.

Inga coruscans. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, médiocrement verruqueux ; ses feuilles composées de trois paires de folioles oblongues, acuminées, rétrécies à leur base, luisantes, d'un vert-foncé, plus pâles en dessous, glabres à leurs deux faces ; les supérieures longues de quatre pouces, les inférieures de deux ; des glandes sessiles, en godet, comprimées entre chaque paire de folioles ; le pétiole commun, nu, glabre, cylindrique. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, geminés, longs de deux pouces & plus ; les corolles glabres.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *H. (Descrip. ex Willd.)*

33. ACACIE élégante. *Mimosa spectabilis.* Vahl.

Mimosa (inga spectabilis), inermis, foliis pinnatis, bijugis ; foliolis ovatis, acutis, glabris, nitidis, basi inaequalibus ; glandula inter omnia paria ; petiolo semitereti, glabro, nudo ; spicis terminalibus, corollis villosis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1017. n°. 33.

Mimosa (spectabilis), inermis, foliis pinnatis, bijugis ; pinnis interioribus minoribus, petiolo lineari, spicis terminalibus. Vahl. A. C. Soc. Hist. Nat. Hist. 2. pag. 219. tab. 10.

Ses rameaux sont légèrement flexueux, glabres, anguleux par trois lignes saillantes, décourcées, partant de la base des pétioles ; revêtus d'une écorce grisâtre, ferrugineuse, ponctuée. Les feuilles sont alternes, pétioles, distantes, composées de deux paires de folioles opposées, presqu'entières, ovales, élargies, membranées, glabres, acuminées, très-entières, luisantes ; les supérieures longues de sept pouces ; les inférieures une fois plus petites. Les fleurs sont disposées en épis terminaux ; les corolles velues.

Cette plante croît dans les contrées les plus chaudes de l'Amérique. On la cultive à l'île de Sainte-Marthe. *H.*

34. ACACIE à feuilles de laurier. *Mimosa laurina.* Swartz.

Mimosa (inga laurina), foliis pinnatis, bijugis ; foliolis obovato-oblongis, acuminatis, nitidis, glabris ; glandula inter omnia paria ; petiolo semitereti, glabro ; spicis axillaribus, subsolitariis ; corollis glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1018. n°. 34.

Mimosa (laurina), inermis, foliis pinnatis, bijugis ; pinnis ovatis, nitidis, subaequalibus ; petiolo lineari-angulato ; spicis axillaribus, solitariis ; floribus monadelphis. Swartz, Prodr. pag. 85, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 978.

Ses tiges sont pourvues de rameaux cylindriques, de couleur cendrée, garnis de feuilles ailées, composées de deux paires de folioles ovales, oblongues, acuminées, glabres à leurs deux faces, luisantes; les supérieures longues d'environ quatre pouces; les inférieures de deux pouces & plus, portant dans leurs aisselles deux glandes sessiles, en godet; le pétiole commun, glabre à demi cylindrique. Les fleurs sont disposées en épis solitaires, rarement geminés, axillaires, longs de deux pouces. Les corolles sont glabres.

Cette plante croît dans l'île de Saint-Christophe. *h* (Description, ex Willd.)

35. ACACIE à feuilles de noyer. *Mimosa juglandifolia*.

Mimosa (inga juglandifolia), *inermis*, *foliis pinnatis*, *tri-quadrifidis*; *foliis oblongis*, *acuminatis*, *basi attenuatis*, *glabris*; *petiolo sessile*, *pubescente*, *nudo*, *glanduloso*; *spinis eribus axillaribus*, *corollis villosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1018. n°. 35.

Cette plante a des rameaux cylindriques, légèrement pubescents, couleur de rouille, garnis de feuilles ailées, composées de trois ou quatre paires de folioles oblongues, acuminées, rétrécies à leur base, glabres en dessus, pubescentes en dessous, sur leurs nervures; les supérieures longues de cinq pouces; les inférieures de trois, dépourvues de glandes; le pétiole commun, nu, ferrugineux, pubescent.

Les fleurs sont situées dans les aisselles des feuilles, vers l'extrémité des rameaux, disposées en deux ou trois épis pédonculés. La corolle est velue: il lui succède une gousse plane, linéaire, longue d'environ sept pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (Description, ex Willd.)

36. ACACIE à feuilles de frêne. *Mimosa fraxinea*.

Mimosa (inga fraxinea), *inermis*, *foliis pinnatis*, *quiquifidis*; *foliis oblongis*, *acuminatis*, *utrinque nitidis*; *glandula inter omnia paria pedicellata*; *pedunculo tereti*, *glabro*, *nudo*; *floribus umbellato-racemosis*, *corollis glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1019. n°. 36.

Ses tiges se divisent en rameaux verruqueux, ponctués, d'un brun-cendré, garnis de feuilles ailées, composées de cinq paires de folioles oblongues, acuminées, un peu rétrécies à leur base, luisantes, glabres à leurs deux faces; la côte du milieu & les principales nervures légèrement pubescentes, vus à la loupe; les glandes sessiles & en godet entre les aisselles des folioles;

les supérieures longues de trois pouces; les inférieures d'un pouce & demi; le pétiole commun pubescent, à demi cylindrique.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux & dans l'aisselle des feuilles supérieures, en épis pédonculés, oblongs, ramifiés, en forme de panicule, longs d'un demi-pouce. Les calices, ainsi que les pédoncules, sont pubescents; la corolle parfaitement glabre.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *h* (Description, ex Willd.)

37. ACACIE inégale. *Mimosa inaequalis*.

Mimosa (inga inaequalis), *inermis*, *foliis pinnatis*, *quadrijugis*; *foliis oblongo-lanceolatis*, *glabris*, *supra nitidis*; *superioribus basi inaequalibus*; *glandula inter paria bina superiora*; *petiolo sessile*, *glabro*, *nudo*; *corollis glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1019. n°. 37.

Inga inaequalis. Humb. & Bonpl.

Ses feuilles sont ailées, composées de quatre paires de folioles oblongues, lanceolées, obtuses, glabres, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous; les deux paires supérieures longues de quatre pouces sur un pouce & demi de large, très-rétrécies au côté supérieur de leur base, arrondies à l'intérieur; les deux paires de folioles inférieures longues de deux ou trois pouces, un peu rétrécies aux deux côtés de leur base; les glandes sessiles, urcéolées seulement entre les deux paires de folioles supérieures; le pétiole commun glabre, à demi cylindrique; les épis courts, un peu alongés, pédonculés; le calice & la corolle glabres.

Cette plante croît en Amérique, sur les bords de l'Orénoque. *h* (Description, ex Willd.)

38. ACACIE de Para. *Mimosa Para*.

Mimosa (inga heterophylla), *inermis*, *foliis pinnatis*, *bijugis geminativis*; *foliis oblongis*, *acuminatis*, *utrinque nitidis*; *glandula inter omnia paria pedicellata*; *pedunculo tereti*, *glabro*, *nudo*; *floribus umbellato-racemosis*, *corollis glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 38.

Ses rameaux sont bruns, cylindriques, ponctués, verruqueux; les feuilles ailées, composées de deux paires de folioles, une seule paire aux feuilles supérieures; les folioles oblongues, fortement acuminées, glabres à leurs deux faces, luisantes, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, portant routes, entre leurs aisselles, des glandes pédicellées, en godet; le pédoncule commun cylindrique à sa partie inférieure, à demi cylindrique vers son sommet, soutenant des fleurs en grappes ombellées, pédonculées. Le calice & la corolle sont glabres.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *h* (*Descript. ex Willd.*)

39. ACACIE à baguettes. *Mimosa virgulosa*. Vahl.

Mimosa inermis, foliis pinnatis, tri seu quinquejugis; foliolis ovatis, nitidis; floribus umbellatis, ramis pubescentibus. (N.)

Mimosa virgulosa, Vahl, Fgl. Decad. 2. tab. 20.

Ses rameaux sont cylindriques, grêles, alongés, pubescens, divisés en un grand nombre d'autres, alternes, très-courts, sans épines, garnis de feuilles ailées, composées de trois à cinq paires de folioles ovales, coriaces, luisantes, sessiles, glabres à leurs deux faces, longues de cinq à six lignes, sur à peine trois lignes de large; les pétioles articulés, comprimés, presque ailés.

Les fleurs sont disposées en ombelles simples, axillaires, situées vers l'extrémité des jeunes rameaux, à peine plus longues que les feuilles. Les pédoncules sont courts, filiformes; les calices très-petits, à cinq dents peu sensibles; la corolle tubulée, au moins quatre fois plus longue que le calice; le limbe partagé en cinq dents droites, aiguës; les filaments nombreux, réunis en un tube grêle, saillant hors de la corolle, terminé à son sommet par une houppe de filets capillaires; les anthères fort petites. Je ne connois point le fruit.

Cette plante croît à l'île de Cayenne. *h* (*V. f. in herb. Desfont.*)

*** Feuilles conjuguées-ailées.

40. ACACIE à gouffes en spirale. *Mimosa cochleata*.

Mimosa (inga cochleata), inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis parialibus trijugis; foliolis ellipticis, acuminatis, nitidis; glandula obscura inter omnia paria; floribus umbellatis; legumine cochleato. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 39.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, d'un brun-cendré, garnis de feuilles conjuguées-ailées; les pinnules partielles composées de trois paires de folioles oblongues, elliptiques, acuminées, aiguës, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, luisantes, d'un vert-foncé en dessus, un peu jaunâtres en dessous, glabres à leurs deux faces; le pétiole commun cylindrique; les partiels à demi cylindriques, tous glabres, munis, entre les folioles & au sommet des divisions, d'un point orbiculaire, glanduleux.

Les fleurs sont disposées en une ombelle solitaire, quelquefois deux, pédonculées; le calice & la corolle glabres. Le fruit consiste en une

gousse toute en coquille de limçon, sinuee à son bord extérieur.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *h* (*Descript. ex Willd.*)

41. ACACIE à feuilles larges. *Mimosa latifolia*. Linn.

Mimosa (inga latifolia), inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis parialibus pentaphyllis; foliolis ovato-oblongis, terminalibus oppositis, lateralibus alternis; floribus umbellatis, lateralibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1021. n°. 40.

Mimosa latifolia. Lam. Dict. 4. n°. 6.

Mimosa (latifolia), inermis, foliis conjugatis; pinnis terminalibus oppositis, lateralibus alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1499.

Les deux folioles terminales sont les seules qui soient opposées dans chaque pinnule; le pétiole n'a point de glandes apparentes; le calice & la corolle sont glabres. (Voyez ACACIE à feuilles larges, n°. 6.)

42. ACACIE à tige fleurie. *Mimosa cauliflora*.

Mimosa (inga cauliflora), inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis trijugis; foliolis oblongis, inaequalibus, terminalibus, basi inaequaliter; glandula inter omnia paria; floribus umbellatis, lateralibus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1021. n°. 41.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais toutes ses folioles sont opposées, & ses fleurs sont beaucoup plus petites.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée; ses feuilles conjuguées, ailées; les pinnules partielles, composées de trois paires de folioles oblongues, acuminées; les deux terminales longues de trois pouces, rétrécies à leur base, au côté intérieur; les autres longues d'environ deux pouces & demi, luisantes, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous; les pétioles à demi cylindriques; une glande comprimée à la division du pétiole & entre les aisselles des folioles. Les fleurs sont disposées en ombelles latérales, médiocrement pédonculées, placées le long des rameaux. Le calice & la corolle sont glabres.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *h* (*Descript. ex Willd.*)

43. ACACIE à fleurs pourpres. *Mimosa purpurea*.

Mimosa (inga purpurea), inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis quadrijugis; foliolis oblongis, obtusis, basi inaequalibus; petiolis glandulosis, capitatibus, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1021. n°. 42.

Mimosa (purpurea), *inermis*, *foliis conjugatis*, *pinnatis*; *pinnis intimis minoribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1500.

Mimosa purpurea. Lam. Dict. t. n°. 5.

Les pétioles font, dans cette espèce, dépourvus de glandes. (Voyez ACACIE à fleurs pourpres.)

44. ACACIE à feuilles obtuses. *Mimosa obtusifolia*.

Mimosa (inga obtusifolia), *inermis*, *foliis conjugato-pinnatis*; *pinnis quadri seu sexjugis*; *foliolis oblongis*, *obtusis*, *mucronatis*, *basi inaequaliter*; *capitulis pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1022. n°. 43.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée; ses feuilles conjuguées, ailées, médiocrement pétioles; les pinnules composées de quatre à six paires de folioles longues de trois lignes, oblongues-arrondies, obtuses, un peu mucronées, rétrécies au côté intérieur de leur base; le côté extérieur arrondi, presque en cœur. Les folioles sont glabres à leurs deux faces, luisantes, légèrement ciliées à leurs bords, veinées, réticulées; les pétioles velus; les fleurs réunies en une petite tête courte, axillaire, pédonculée.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Cumana. *h* (Description. ex Willd.)

45. ACACIE fasciculée. *Mimosa fasciculata*.

Mimosa (inga fasciculata), *inermis*, *foliis conjugato-pinnatis*; *pinnis octo-decjugisve*; *foliolis cuneatis*, *binerviis*; *capitulis pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1022. n°. 44.

Cette espèce, assez semblable à la précédente par son port & par plusieurs autres caractères, s'en distingue par le grand nombre de ses folioles & par leur forme arquée.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur cendrée; les feuilles fasciculées, conjuguées, ailées, composées de huit à dix paires de folioles oblongues, courbées en arc, obtuses, racornées & arrondies au côté intérieur de leur base; en cœur & prolongées au côté extérieur, réticulées, à deux nervures, luisantes, glabres à leurs deux faces, légèrement ciliées à leurs bords; les pétioles velus; les fleurs réunies en têtes solitaires, axillaires, pédonculées; elles produisent des gouffes planes, linéaires, aiguës, rétrécies à leur base, glabres, un peu épaisses à leurs bords.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *h* (Description. ex Willd.)

46. ACACIE de plusieurs couleurs. *Mimosa discolor*.

Mimosa (inga discolor), *inermis*, *foliis conjugato-pinnatis*; *pinnis quinacem seu octodecjugis*; *foliolis linearibus*, *subimbricatis*; *subtus ferrugineis*; *capitulis paucifloris*, *pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1023. n°. 45.

Inga discolor. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont noirâtres, ferrugineux, ponctués de blanc; les feuilles conjuguées, ailées; les pinnules composées de quinze à dix-huit paires de folioles longues d'un demi-pouce; linéaires, un peu aiguës, arrondies, presque en cœur au côté intérieur de leur base, rétrécies au côté extérieur, luisantes, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, un peu ferrugineuses, légèrement pubescentes, quelquefois un peu glabres; les pétioles velus, accompagnés de deux stipules très-courtes, subulées, persistantes, en forme de deux aiguillons, mais très fragiles. Les fleurs sont axillaires, réunies en petites têtes solitaires, pédonculées, peu garnies; les calices velus. La corolle est grande, pubescente, longue d'un pouce.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, sur les bords du fleuve Atabapo. *h* (Description. ex Willd.)

47. ACACIE à feuilles molles. *Mimosa mollissima*.

Mimosa (inga mollissima), *inermis*, *foliis conjugato-pinnatis*; *pinnis quadrijugis*, *subimbricatis*; *corollatis*, *utrinque mollissimè villosis*, *obtusis*; *capitulis pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1023. n°. 46.

Inga mollissima. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux bruns, cylindriques; les plus jeunes pubescents; les feuilles conjuguées, ailées; les pinnules composées de quatre paires de folioles allongées, obtuses, d'environ un pouce de long, arrondies, molles, velues, presque en cœur au côté extérieur de leur base, rétrécies au côté intérieur, couvertes, à leurs deux faces, de poils courts, très-abondans, un peu jaunâtres; les pétioles velus; les fleurs disposées en petites têtes solitaires, axillaires, pédonculées. Elles produisent des gouffes longues de trois pouces, planes, velues, linéaires, épaisses à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Description. ex Willd.)

48. ACACIE à cercles. *Mimosa circinalis*. Linn.

Mimosa (inga circinalis), *spinis stipularibus*, *foliis conjugato-pinnatis*, *pinnis trijugis*; *foliolis ovatis*, *acutis*, *glabris*; *capitulis pedunculatis*, *terminalibus*; *leguminibus spiraliiter tortis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1023. n°. 47.

Mimosa (circularis), aculeata, foliis conjugis, pinnatis; pinnis aequalibus, bipinnis f. inofo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1499.

Mimosa circularis. Lam. Dict. 1. n°. 30.

Cette espèce, si rapprochée de l'acacie ongle de chat par ses épines stipulaires & par ses gouffes allongées, toutes en spirales, en diffère essentiellement par le caractère de ses feuilles. (Voyez ACACIE à cercles, n°. 30.)

***** Feuilles deux fois ailées.

49. ACACIE cotonneuse. *Mimosa pubifera*.

Mimosa (inga cinerea), inermis, foliis bipinnatis; partialibus quinquejugis, propriis subsexjugis; foliis oblongis, ovatis, basi inaequalibus, junioribus, tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1024. n°. 48.

Inga cinerea. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, pubescents; ses feuilles sont deux fois ailées, à cinq paires de pinnules; les pinnules supérieures composées de sept paires de folioles; les inférieures de quatre; les folioles longues d'un demi-pouce à un pouce, ovales, oblongues, obtuses, mucronées, dilatées au côté supérieur de leur base, rétrécies au côté inférieur, glabres & luisantes en dessus, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les fleurs disposées en petites têtes pédonculées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. h (Description ex Willd.)

50. ACACIE saman. *Mimosa saman*. Jacq.

Mimosa (inga saman), inermis, foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis subsexjugis; foliis ovato-oblongis, obtusis; terminalibus inaequalibus, junioribus petiolisque pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1024. n°. 49.

Mimosa saman. Jacq. Fragn. bot. p. 5. tab. 9.

C'est un des arbres les plus forts & les plus élevés de ce genre. Ses feuilles sont deux fois ailées, composées de six paires de pinnules; les pinnules supérieures composées de sept à huit paires de folioles; les inférieures de deux ou trois. Les folioles sont ovales, oblongues, obtuses, toujours glabres & d'un vert gai en dessus, pubescentes en dessous; les folioles supérieures longues de trois pouces; les inférieures d'un demi-pouce; les terminales à côté inégaux; les pétioles pubescents, une glande comprimée & en godet entre toutes les paires de folioles & les pétioles communs. Les fleurs sont réunies en une petite tête globuleuse, axillaire, pédonculée, contenant quatre à six fleurs; elles produisent une gouffe plane, linéaire,

longue de sept à huit pouces, canaliculée à ses deux extrémités.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, à Caracas. h (Description ex Willd.)

51. ACACIE à feuilles de fougère. *Mimosa filicina*.

Mimosa (inga filicina), inermis, foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis multijugis; foliolis linearibus; spici longi pedunculato, natanti. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1025. n°. 50.

Ses rameaux sont cylindriques, de couleur brune, les feuilles deux fois ailées, à dix paires de pinnules; ces dernières composées d'un grand nombre de folioles linéaires, obtuses, un peu mucronées, longues d'environ six lignes, luisantes & d'un vert foncé en dessus, pâles, un peu couleur de rouille en dessous, tronquées au côté intérieur de leur base, arrondies au côté extérieur; les pétioles ferrugineux, pubescents; le pétiole commun cylindrique; les partiels canaliculés. Les fleurs sont disposées en un épi pédonculé, pendant, long d'un pouce & demi; le pédoncule commun comprimé, pubescent, ferrugineux, long de huit pouces.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. h (Description ex Willd.)

52. ACACIE pendante. *Mimosa pendula*.

Mimosa (inga pendula), inermis, foliis bipinnatis, partialibus vigintijugis, propriis multijugis; foliolis linearibus; spici globosi, longi pedunculati, penduli. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1025. n°. 51.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, verruqueux; les feuilles sont deux fois ailées, composées de vingt paires de pinnules, chargées de folioles très-nombreuses, linéaires, aiguës, ciliées principalement vers leur base; les pétioles communs à demi cylindriques, pubescents en dessous; les partiels pubescents; une glande assez grande, comprimée, située au dessus de la base du pétiole.

Les fleurs sont disposées en épis globuleux, longs d'un pouce & plus, rétrécis à leur partie inférieure, pédonculés; le pédoncule commun comprimé, long d'un pied; quatre pédoncules partiels, pendans, longs d'un demi-pied, terminés par un seul épi.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. h (Description ex Willd.)

53. ACACIE à deux globes. *Mimosa biglobosa*. Jacq.

Mimosa (inga biglobosa), inermis, foliis bi-

pinnatis; *spica didymo-biglobosa*, pendula. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1025. n°. 52.

Mimosa (biglobosa), *specis biglobos*, *densissimis*. Jacq. Amer. pag. 267. tab. 179. fig. 37.

Ses branches sont dépourvues d'épines ; ses feuilles deux fois ailées. Ses fleurs sont disposées en épis pendans, de la grosseur d'une poire, étran-glés dans leur milieu, ayant l'apparence de deux épis globuleux placés l'un sur l'autre.

Cette plante croît à la Martinique. *h*

54. ACACIE pécinée. *Mimosa pectinata*.

Mimosa (inga pectinata), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sedecimjugis*, *propiis multijugis*, *linearibus*, *subtus pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1026. n°. 53.

Inga pectinata. Humb. & Bonpl.

Ses feuilles sont deux fois ailées, à seize pin-nules, composées de soixante paires de folioles linéaires, obtuses, mucronées, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, ciliées à leurs bords, pubescentes & de couleur de rouille en dessous, ainsi que les pétioles ; ceux-ci sont cylindriques, longs d'un pied, les pétioles partiels longs de trois pouces & plus. Les fleurs n'ont point été observées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, sur les bords du fleuve Casiquiare. (*Descript. ex Willd.*)

55. ACACIE à fruits ronds. *Mimosa cyclocarpa*. Jacq.

Mimosa (inga cyclocarpa), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus subnovemjugis*, *propiis triginta-jugis*, *exterioribus majoribus* ; *specis globosis*, *pendulatis*, *axillaribus* ; *leguminibus cochleariis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1026. n°. 54.

Mimosa cyclocarpa. Jacq. Etagm. bot. pag. 30. tab. 34. fig. 1.

C'est un très-grand arbre revêtu d'une écorce crevassée, dont les branches & les rameaux sont très-étalés, garnis de feuilles deux fois ailées ; les pinnules au nombre de quatre à neuf paires, composées de vingt à trente paires de folioles ; les extérieures plus grandes, acuminées, tronquées à leur base ; le pétiole commun plus épais vers sa base, portant vers son milieu une glande comprimée.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, pédonculés, en tête, au nombre de deux à quatre ; les pédoncules étalés, filiformes, longs de trois pouces. La corolle est blanche, monopétale, à cinq découpures ; toutes les fleurs monadelphiques & polyandriques. Les fruits sont des gousses

planes, orbiculaires, arrondies, nouzues & sinuées sur leur bord extérieur, à l'endroit des semences. Celles-ci sont enveloppées d'une pulpe grasse, visqueuse, savonneuse. Les naturels s'en servent comme de savon.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Catacas. *h* (*Bredemeyer in Willd.*)

56. ACACIE chevelue. *Mimosa comosa*. Sw.

Mimosa (inga comosa), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus trijugis*, *propiis subdecemjugis* ; *floribus paniculato-corymboseis*, *leguminibus acinaciformibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1026. n°. 55.

Mimosa (comosa), *inermis*, *arborae*, *foliis bipinnatis*, *trijugis* ; *pinnis novem seu decemjugis*, *ovatis*, *basis reclusis* ; *floribus paniculatis*, *monadelphis*. Swartz, Prodr. p. 85, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 980.

Mimosa fruiosa, *creta*, *inermis*, *corticis cinereo* ; *floribus laxo corymbatis* ; *specis plurimis*, *comosis*, *terminalibus* ; *foliis minimis*, *bipinnatis*. Brown, Jam. pag. 253.

Arbrisseau d'un beau port, haut de quinze à vingt pieds, dont les tiges sont foibles, très-rameuses à leur sommet, revêtues d'une écorce blanchâtre, un peu rude ; les rameaux glabres, effilés ; les feuilles deux fois ailées, composées de deux, plus ordinairement de trois paires de pinnules ; neuf ou dix paires de folioles ovales, un peu roides, très-glabres, obtuses à leur sommet, émoussées à leur base, veinées, luisantes en dessus, arrondies à un de leurs bords ; les pétioles glabres ; les pédicell. s cylindriques, percés à leur base par une cavité hérissée à son ouverture, & tenant lieu de glande.

Les fleurs sont disposées en une panicule ou plu-tôt en un corymbe terminal, à rameaux nombreux, cylindriques, ramifiés. Le calice est divisé en trois ou cinq petites dents verdâtres, obtuses ; la corolle est oblongue, blanchâtre, petite, à trois ou cinq dents ; vingt à quarante filamens blanchâtres, capillaires, réunis en tube à leur base, terminés par des anthères arrondies ; l'ovaire oblong, le style capillaire, de la longueur des étamens ; le stigmate simple. Le fruit est une gousse en forme de fable, comprimée, glabre, longue de deux pouces, contenant six à huit semences arrondies, comprimées.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Jamaïque, sur les rochers des montagnes. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

57. ACACIE niopo. *Mimosa niopo*.

Mimosa (inga niopo), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus*

partialibus trigintajugis, propriis septuagintajugis; glandula petiolaris, leguminibus fissuris. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1027. n°. 56.

Inga niopo. Humb. & Bonpl.

Cette plante, que les naturels du pays nomment *niopo*, & qu'ils emploient souvent en place du tabac, est un arbre dont les rameaux sont verruqueux, ponctués; les feuilles deux fois ailées; trente à quarante paires de pinnules, composées chacune de soixante à quatre-vingts paires de folioles linéaires, ciliées, acuminées; les pétioles pubescents; le commun, long d'un demi-pied & plus; les partiels pubescents, longs d'environ un pouce & demi, portant à leur base une glande urcéolée. Les gouffes sont linéaires, acuminées, sinuées, longues de trois à quatre pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, proche Atures. *h* (*Descript. ex Willd.*)

58. ACACIE saffa. *Mimosa saffa.* Bruce.

Mimosa (inga saffa), inermis, foliis bipinnatis, partialibus tri seu quadrijugis; propriis duodecimjugis, oblongo-ovatis; floribus umbellato-paniculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1027. n°. 57.

Saffa. Bruce, Itin. pag. 27. Icon. & Edit. germ. vol. 5. pag. 39. tab. 4 & 5.

Ses tiges font dépourvues d'épines, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétioles, alternes, deux fois ailées, composées de trois ou quatre paires de pinnules, soutenant chacune douze paires de folioles ovales, oblongues. Les fleurs sont disposées en panicules presque ombellées.

Cette plante croît dans l'Abissinie. *h*

59. ACACIE ombellée. *Mimosa umbellata.* Vahl.

Mimosa (inga umbellata), spinosa, foliis conjugato-pinnatis bipinnatisque; partialibus bijugis, propriis subdecemjugis; umbellis pedunculatis, axillaribus; leguminibus spiratibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1027. n°. 58.

Mimosa (umbellata), spinosa, foliis conjugatis bipinnatisque, bijugis; floribus umbellatis, leguminibus spiratibus. Vahl, Symb. 2. pag. 103.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, ponctués; les plus jeunes distans, flexueux, ridés, tuberculeux, armés d'épines droites, stipulaires, obtuses, très-ouvertes. Les feuilles sont une & deux fois ailées, à deux paires de pinnules, composées d'environ dix paires de folioles glabres, oblongues, mucronées, obliques à un des côtés de leur baie; une petite glande entre chaque paire de folioles.

Les fleurs sont réunies, dans les aisselles des Botanique. Supplément. Tome I.

feuilles, au nombre de douze à seize, en forme d'ombelles simples, plus courtes que les feuilles, longues d'un pouce & demi. Le calice est campanule, à cinq dents; la corolle monopétale, une fois plus longue que le calice; les filamens nombreux, très-longs, monadelphes; les gouffes roulées en spirale, pubescentes dans leur jeunesse.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

6. II. MIMOSA. Willd. *Fleurs hermaphrodites; calice à cinq dents; corolle nulle ou à cinq dents; huit étamines; un style; la gouffe divisée par articulations monospermes; point de style dans les fleurs mâles.*

* Feuilles conjuguées, ailées.

60. ACACIE à feuilles de pistachier. *Mimosa pistaciifolia.* Willd.

Mimosa inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis trijugis; foliolis ellipticis, obtusis; glandula inter par terminale. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1028. n°. 1.

Cet arbre est sans épines: ses feuilles sont alternes, conjuguées, ailées; les pinnules composées de trois paires de folioles elliptiques, obtuses, longues d'un pouce, à côtés inégaux, veinées, marquées de trois ou quatre nervures, luisantes, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, glabres à leurs deux faces; les pétioles glabres, canaliculés, traversés par deux lignes pubescentes; une glandule comprimée, urcéolée entre les deux folioles terminales. Le fruit consiste en une gouffe linéaire, sinuée, longue de six à sept pouces, contenant, dans chaque articulation, une semence blanche & osseuse.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (*Descript. ex Willd.*)

61. ACACIE vive. *Mimosa viva.* Linn.

Mimosa inermis, herbacea, foliis conjugato-pinnatis, pinnis quadrijugis, foliolis subrotundis, lomento unarticulato. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1028. n°. 2.

Mimosa viva, inermis, foliis conjugatis, pinnatis; partialibus quadrijugis, subrotundis; caule inermi, herbaceo. Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1500.

Mimosa minima, herbacea, vix tripollicaris; capsulis monospermis, hispidis. Brown, Jam. pag. 254.

Mimosa viva. Lam. Dict. 1. n°. 27.

Cette plante est remarquable par sa petitesse & par ses gouffes monospermes, à une seule articulation, hérissées de poils. (*Voyez ACACIE vive, n°. 27.*)

61. ACACIE chaste. *Mimosa casta*. Linn.

Mimosa caule petiolisque aculeatis; foliis conjugato-pinnatis; pinnae quadrifidis; foliolis oblongis, inaequaliteris, subquadrilobis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1019. n°. 3.

Mimosa casta, aculeata, foliis conjugatis, pinnatis; parvis trifidis, subquadrilobis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1500.

Mimosa foliis conjugatis; foliolis pinnatis; pinnae fenis, subquadrilobis. Hort. Upsal. 145.

Mimosa foliato fenna, spinosa. Benth. Lugd. Bat. 2. pag. 55. — Burm. Flor. Ind. pag. 222.

Mimosa casta. Lam. Dict. n°. 34.

Les deux folioles terminales sont plus petites que les autres. (Voyez ACACIE chaste, n°. 34.)

63. ACACIE foible. *Mimosa debilis*. Willd.

Mimosa caule fragili, aculeato; foliis conjugato-pinnatis; pinnae bifidis; foliolis oblongis, subpinnatis, intimis minimis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 4.

Mimosa debilis. Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont simples, cyindriques, hautes d'un pied & demi ou deux pieds, armées d'aiguillons épars, subulés, en crochets, glabres principalement à la partie inférieure, un peu hérissées au point d'insertion des pétioles, garnies de feuilles longuement pétiolées, c. n. ugnées, ailées, à deux paires de pinnules, composées de folioles longues d'un pouce, en ovale renversé, mucronées, indigées à leur base, couvertes de quelques poils rares, couchés, plus abondans en dessous; le pétiole commun presque glabre; les pétioles pileux; les stipules linéaires, subulées, ciliées. Les fleurs sont réunies en une tête elliptique, longuement pédonculée, axillaire, solitaire, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, proche Caripe. (Voyez *Descript. ex Willd.*)

64. ACACIE blanchâtre. *Mimosa albidia*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis conjugato-pinnatis; pinnae bifidis; foliolis inaequaliteris, acutis, cuneo-pubescens, intimis minimis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 5.

Mimosa albidia. Humb. & Bonpl.

Arbusteau dont les rameaux sont diffus, étalés, cylindriques, armés d'aiguillons & les plus jeunes pubescens; les aiguillons épars, subulés, un peu mucronés; les feuilles conjuguées, ailées, à deux paires de pinnules, composées de folioles allongées, aiguës, longues d'environ un pouce au plus, à côtés inégaux, couvertes de poils blan-

châtres, couchés, très-courts, entrecoués avec les fibres; la foliole interne de chaque pinnule très-petite; les pétioles pubescens, le plus part armés, vers leur base, d'un aiguillon solitaire; les stipules linéaires, subulées, pubescens, ciliées. Les fleurs sont disposées en tête & pédonculées, solitaires ou geminées dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Voyez *Descript. ex Willd.*)

65. ACACIE sensitive. *Mimosa sensitiva*. Linn.

Mimosa caule petiolisque aculeatis; foliis conjugato-pinnatis; foliolis subarmatis-ovatis, acutis, subulatis, intimis minimis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 6.

Mimosa sensitiva. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1501.

Mimosa spinosa, prima, seu brasiliensis, laetifolia; foliolis ovatis. L'yn. Centur. pag. 31. tab. 16. — Trew. Ehet. tab. 95.

Mimosa sensitiva. Lam. Dict. 1. n°. 35.

Ses folioles sont glabres en dessus, pubescens, un peu blanchâtres en dessous, principalement dans leur jeunesse; les fleurs réunies en têtes globuleuses à l'extrémité d'un long pédoncule axillaire. (Voyez ACACIE sensitive, n°. 35.)

66. ACACIE à feuilles rudes. *Mimosa strigosa*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis conjugato-pinnatis; pinnae bifidis; foliolis subdimidiatis, ovato-oblongis, acutis, utrinque strigosis, intimis minimis; ramis petiolisque tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1020. n°. 7.

Ses rameaux sont chargés d'un duvet épais, onctueux de rouille, armés d'aiguillons rares, très-courts. Les feuilles finissent conjuguées, ailées, à deux paires de pinnules composées de folioles ovales-oblongues, aiguës, à côtés inégaux, longues d'un pouce & demi, couvertes, en dessus, de poils couchés & nombreux, plus épais en dessous; la foliole intérieure de chaque pinnule très-petite; les pétioles tomenteux, fins épines. Les fleurs sont disposées en têtes pédonculées, presque geminées, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Voyez *Descript. ex Willd.*)

67. ACACIE de Willdenow. *Mimosa Willdenowii*. Willd.

Mimosa floribunda, caule petiolisque aculeatis; foliis conjugato-pinnatis; foliolis ovato-oblongis, subulatis strigoso-hirsutis, intimis minimis; pa-

miculâ racemosa, terminali. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1031. n°. 8.

Cette plante a des rameaux pubescents, cylindriques, armés d'aiguillons nombreux, recourbés. Ses feuilles sont conjuguées, ailées, à deux paires de pinnules composées de folioles ovales, aiguës, longues d'un pouce, glabres, d'un vert-foncé en dessus, couvertes en dessous de poils rudes & nombreux; la foliole intérieure de chaque pinnule fort petite; les pétioles pubescents, munis, à leur partie inférieure, de quelques aiguillons; ceux des feuilles supérieures nus. Les fleurs sont disposées en têtes pedonculees, presque en grappes, formant, par leur ensemble, une sorte de panicule à l'extrémité des rameaux & des tiges.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (Description ex Willd.)

68. ACACIE pudique (sensitive commune). *Mimosa pudica*. Linn.

Mimosa aculeata, foliis subdigitato-pinnatis; pinnis quaternis, multijugis; caule, petiolis pedunculisque piloso-hispidis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1031. n°. 9.

Mimosa pudica, aculeata, foliis subdigitato-pinnatis, caule hispido. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1501.

Mimosa spinosa, tercia, siliquis parvis, echinatis. Breyn. Centur. 40. tab. 18.

Æschynomene spinosa, flore glabro-albido; siliiculis articulatis, echinatis. Commel. Hort. 1. pag. 57. tab. 19.

Mimosa pudica. Lam. Dict. 1. n°. 36.

Cette plante est très-remarquable par le mouvement d'irritabilité qu'elle éprouve lorsqu'on la touche ou qu'on en approche seulement la main; elle n'est pas la seule, ainsi qu'il a été dit. (Voyez ACACIE pudique, n°. 36.)

69. ACACIE pudibonde. *Mimosa pudibunda*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis subdigitato-pinnatis; pinnis quaternis, multijugis; caule glabro. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1031. n°. 10.

Ses tiges sont dures, glabres, couchées, longues de deux pieds & plus, garnies d'aiguillons lancéolés, courbes en crochets, presque geminés. Les feuilles supérieures sont conjuguées, ailées; les inférieures presque digitées, ailées, à quatre paires de pinnules composées de folioles nombreuses, linéaires, aiguës, couvertes de poils épars, foyeux & couchés; les pétioles nus, pileux. Les fleurs sont disposées en têtes souvent geminées, elliptiques, axillaires, pedonculees.

Cette plante croît au Brésil. *h* (Description ex Willd.)

70. ACACIE à quatre étamines. *Mimosa tetrandra*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis subdigitato-pinnatis; pinnis quaternis, multijugis; ramis pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1032. n°. 11.

Mimosa tetrandra. Humb. & Bonpl.

Cette espèce a des tiges ligneuses, cylindriques, pubescentes vers leur sommet, armées d'aiguillons rares, geminés, stipulaires dans les entrenœuds, vers l'extrémité des tiges. Les feuilles sont presque digitées, ailées, à quatre paires de pinnules, composées de folioles nombreuses, linéaires, aiguës, presque glabres, ciliées à leurs bords par des poils foyeux très-abondans; les pétioles velus.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en têtes oblongues, pedonculees, presque geminées; les étamines au nombre de quatre. Le fruit consiste en une gousse glabre, composée de quatre articulations, entourée de filices foyeux. Les jeunes feuilles, ainsi que les têtes de fleurs, sont d'un blanc-foyeux avant leur développement.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Description ex Willd.)

71. ACACIE à plusieurs digitations. *Mimosa polydactyla*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis subdigitato-pinnatis; pinnis obscuris, multijugis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1033. n°. 12.

Mimosa polydactyla. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux tout hérissés, cylindriques, armés d'aiguillons en crochets; les tiges presque digitées, ailées, à huit paires de pinnules composées de folioles glabres, linéaires, aiguës, foyeuses & ciliées à leurs bords; les pétioles hispides, dépourvus d'épines. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en têtes geminées, elliptiques, pedonculees.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, sur les bords du Fleuve-Noir, proche San-Carlos. *h* (Description ex Willd.)

72. ACACIE tomenteuse. *Mimosa tomentosa*. Willd.

Mimosa inermis, foliis subdigitato-pinnatis; pinnis quaternis, multijugis; foliis tomentosis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1033. n°. 13.

Mimosa tomentosa. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques,

sans épines, couverts de poils très-nombreux, garnis de feuilles presque digitées, ailées, à quatre paires de pinnules composées de plusieurs folioles longues d'un demi-pouce, linéaires, obtuses, chargées, à leurs deux faces, de poils abondants & blanchâtres, ainsi que les pétioles. Les fleurs sont disposées en têtes globuleuses, pédonculées, axillaires, situées à l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, proche Maypure. *h* (*Descript. ex Willd.*)

* * Feuilles deux fois ailées.

73. ACACIE à crochets. *Mimosa hamata*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis septem seu octojugis; pedunculis aculeatis, folio longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1033. n° 14.

Arbre ou arbuscule dont les tiges sont munies de rameaux presque anguleux, pubescents, armés d'épines très-fortes, abondantes, comprimées, courbées en crochet. Les feuilles sont deux fois ailées, à quatre paires de pinnules composées de sept à huit paires de folioles oblongues, mucronées, pubescentes, partagées inégalement par la principale nervure; les pétioles pubescents, épineux.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en têtes globuleuses, pédonculées; les pédoncules pubescents, plus longs que les feuilles, armés d'un ou de deux aiguillons. Les fruits consistent en une gousse longue de deux pouces, à cinq articulations, sinuées, légèrement pubescentes; les articulations entourées d'un filet épineux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

74. ACACIE à larges épines. *Mimosa latispinosa*. Lam.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus decem seu quindecimjugis, propriis decemjugis; aculeis oppositis, ovatis, compressis, inter singula partialia. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1034. n° 15.

Mimosa latispinosa. Lam. Dict. 1. n° 56.

Cette espèce est facile à distinguer par ses épines larges, comprimées, jaunâtres, triangulaires, placées entre chaque pinnule. (Voyez ACACIE à larges épines.)

75. ACACIE à plusieurs épines. *Mimosa polyacantha*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis multijugis; aculeis petioli communis oppositis, triangularibus; lomentis villosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1034. n° 16.

Erget et kron. Bruce, Itin. 5. pag. 35. Icon. & Edit. germ. 5. pag. 46. tab. 7.

Ses rameaux sont cylindriques, garnis de feuilles deux fois ailées; les pinnules au nombre de dix à douze paires, composées de folioles nombreuses, linéaires, obtuses; le pétiole commun armé, entre chaque paire de pinnules, d'aiguillons opposés, triangulaires, aigus; ceux des tiges sont comprimés, épars, recourbés. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, solitaires, pédonculés, de la grosseur d'une cerise: il leur succède des gousses linéaires, flexueuses, velues, longues de trois pouces.

Cette plante a été observée par Bruce dans l'Abissinie. *h* (*Descript. ex Willd.*)

76. ACACIE à demi épineuse. *Mimosa semispinosa*.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis; articulis caulinis, juvenis aculeatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1508. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1034. n° 17.

Mimosa aculeis, ad summam internodiorum confertis; foliis duplicato-pinnatis. Hott. Cliff. 2c8.

Cette espèce n'est encore que très-imparfaitement connue, néanmoins on peut la distinguer à la disposition des aiguillons placés sur les rameaux, à l'extrémité de chaque articulation. Ses feuilles sont deux fois ailées.

Cette plante croît dans l'Amérique. *h*

77. ACACIE paresseuse. *Mimosa pigra*. Linn.

Mimosa aculeata, levis, foliis bipinnatis, oppositis aculeatis; spinâ erectâ inter singula partialia. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1507. — Amoen. acad. vol. 4. pag. 174. — Swartz, Observ. pag. 302. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1035. n° 18. Var. *h*.

Æthynomene foliis acacia latioribus; frondibus longissimos aculeos habentibus. Breyn, Centur. pag. 44. tab. 20.

Mimosa pigra. Lam. Dict. 1. n° 54.

h. *Mimosa* (aspetara), *aculeata, hirta, foliis bipinnatis, oppositis aculeatis; spinâ erectâ inter singula partialia*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1507. — Banks, Reliq. — Houtt. tab. 20.

Mimosa (aspetara), *aculeata, foliis bipinnatis, partialibus octo-duodecimjugisve, propriis multijugis; aculeis oppositis, uncinatis, inter singula partialia; partialium basi spinâ rectâ*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1035. n° 18. Var. *a*.

Mimosa aspetara. Lam. Dict. 1. n° 54. Var. *h*.

Cette espèce varie dans ses tiges & ses rameaux

qui tantôt sont, outre les aiguillons principaux, couverts de petites épines semblables à des poils courts, tantôt elles en sont dépourvues, comme dans la variété «. (Foyez ACACIE paretteuse, n°. 54.)

78. ACACIE endormie. *Mimosa dormiens*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus sex seu septemjugis, propriis multijugis & aculeis oppositis, rectis, inter singula partialia, parti-lumque basifera recta. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1035. n°. 19.

Mimosa dormiens. Humb. & Bonpl.

On distingue cette espèce du *mimosa asperata* par le nombre de ses pinnules & par les aiguillons droits, fort menus, subulés : elle lui ressemble d'ailleurs beaucoup.

Ses tiges sont pubescentes, cylindriques, parsemées d'aiguillons droits, menus, épars, subulés. Les feuilles sont deux fois ailées, à six ou sept paires de pinnules composées de plusieurs folioles linéaires, un peu obtuses, glabres en dessus, pubescentes en dessous ; le pétiole commun pileux, chargé d'aiguillons opposés, droits, subulés ; deux très-longs à la base des pinnules, deux autres plus courts entre chaque pinnule. Les fleurs sont réunies en une tête de la grosseur d'un pois, soutenue par un pédoncule pileux, foliaire, axillaire.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux lieux sablonneux, sur les bords du fleuve Apurè. ♀ (Description, ex Willd.)

79. ACACIE assoupie. *Mimosa somnians*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quadri seu quinquejugis, propriis multijugis & aculeis caulis petiolorumque sparsis, uncinatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1036. n°. 20.

Mimosa somnians. Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont cylindriques, glabres à leur partie inférieure, armées d'aiguillons épars, recourbés, parsemées de poils foyeux à leur partie supérieure, garnies de feuilles deux fois ailées, à quatre ou cinq paires de pinnules, composées de plusieurs paires de folioles linéaires, aiguës, presque glabres, un peu rudes à leurs bords, particulièrement vers leur sommet ; le pétiole commun presque glabre ou parsemé de poils rares & de quelques aiguillons épars, crochus, placés en dessous ; les pédicelles des folioles hispides. Les têtes de fleurs sont foliaires, axillaires, longuement pédonculées ; les pédoncules glabres.

Cette plante croît dans les contrées les plus chaudes de l'Amérique. ♀ (Description, ex Willd.)

80. ACACIE agitée. *Mimosa palpitans*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quinque seu sexjugis, propriis multijugis & petiolis subaculeatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1036. n°. 21.

Mimosa palpitans. Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux effilés, glabres, anguleux, armés d'aiguillons crochus. Les feuilles sont deux fois ailées, à cinq ou six, quelquefois sept paires de pinnules composées d'un grand nombre de folioles linéaires, glabres, fort petites, aiguës ; le pétiole commun hérissé, à sa base, de poils foyeux, épars, & dans son milieu d'un seul aiguillon ; les pétioles partiels hispides.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en têtes solitaires ou géminées, pédonculées ; les pédoncules très-glabres : elles produisent des gouffes longues d'un pouce & demi, linéaires, composées de huit à douze articulations glabres ou parsemées de quelques poils rares, environnées d'un filet scabre, foyeux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. ♀ (Description, ex Willd.)

81. ACACIE basse. *Mimosa humilis*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus triquadrijugis, propriis novem seu tridecimjugis & aculeis rectis, subulatis, petiolorum oppositis & lomentis ovatis, biarticulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1037. n°. 22.

Mimosa humilis. Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont ligneuses à leur base ; les rameaux ascendants, à peine longs d'un pied, cylindriques, rudes, pubescents, hérissés d'aiguillons menus, droits, subulés, très-souvent opposés ; les feuilles deux fois ailées, à trois ou quatre paires de pinnules, composées de neuf à treize paires de folioles linéaires, obtuses, à trois nervures, glabres en dessus, munies en dessous de poils rares, menus, légèrement ciliées à leurs bords ; le pétiole commun rude, pubescent, armé d'aiguillons droits, subulés, opposés ; les pédicelles sans aiguillons, rudes, pubescents.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en têtes globuleuses, pédonculées, géminées, l'une plus courte, l'autre une fois plus longue ; les pédoncules rudes & pubescents ; les gouffes un peu arrondies, presque ovales, à deux articulations, parsemées de poils foyeux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, proche Indos Chaymis. ♀ (Description, ex Willd.)

82. ACACIE hispide. *Mimosa hispida*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, parialibus decemjugis, propriis multijugis, ternariis; petiolis inermibus, hispida. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1037. n°. 23.

Cette espèce a des rapports avec le *mimosa pigra*; elle s'en distingue par ses articulations plus nombreuses, par ses pétioles sans épines, & par plusieurs autres caractères.

Ses rameaux sont cylindriques, rudes, pubescens, chargés d'aiguillons épars, crochus, rares, solitaires. Les feuilles sont deux fois ailées, à dix ou onze paires de pinnules composées d'un grand nombre de folioles linéaires, à trois nervures, couvertes de poils épars, couchés, fort petits; ciliées à leurs bords; le pétiole commun hispide. Les fleurs sont disposées en têtes solitaires, axillaires, pédonculées; les pédoncules hispides. Les gouffes sont longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, planes, linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités, couvertes de poils rudes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. h (Descript. ex Willd.)

83. ACACIE à fourrure. *Mimosa petita*. Willd.

Mimosa aculeata, hispida, foliis bipinnatis, parialibus duodecimjugis, propriis multijugis; aculeo recto, subulato, basi parialium. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1038. n°. 24.

Mimosa petita. Hamb. & Bonpl.

Ses rameaux sont un peu arrondis, pileux, armés d'aiguillons crochus, épars, comprimés; les feuilles deux fois ailées, longues de trois pouces & plus, à douze paires de pinnules composées d'un grand nombre de folioles linéaires, aiguës, à trois nervures, pileuses & ciliées; le pétiole commun très-hispide, muni d'aiguillons; celui de la base des pinnules droit, long, subulé, accompagné souvent d'un autre plus écarté, qui manque quelque fois.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en une tête pédonculée, solitaire, de la grosseur de la cerise sauvage; elles produisent des gouffes linéaires, aiguës, composées de vingt une à vingt-deux articulations couvertes de poils rudes, touffus, d'un jaune-clair, tellement qu'ils ressemblent à une fourrure.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, dans la province de Cumana, sur le bord des rivières. h (Descript. ex Willd.)

84. ACACIE blanchâtre. *Mimosa canescens*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, parialibus octo seu decemjugis, propriis multijugis, trigono-

nis; petiolis aculeatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1038. n°. 25.

Elle ressemble beaucoup au *mimosa hispida*, dont il est facile de la distinguer par les caractères suivants. Ses tiges sont cylindriques, couvertes de poils courts, rudes, épais, couchés; armées d'aiguillons épars & crochus. Les feuilles sont deux fois ailées, composées de huit à dix paires de pinnules, garnies d'un très grand nombre de folioles linéaires, aiguës, chargées, à leurs deux faces, de poils abondans & blanchâtres, plus rudes, plus nombreux, & couchés sur la côte inférieure du milieu; le pétiole commun pubescent & pileux, avec quelques aiguillons épars. Les fleurs sont axillaires, solitaires, pédonculées; les pédoncules pileux, pubescens.

Cette plante croît dans la Guinée. h (Descript. ex Willd.)

85. ACACIE à tige de ronce. *Mimosa rubicaulis*. Lam.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, parialibus quinquejugis, propriis subduodecimjugis, panicula terminali. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1038. n°. 26.

Mimosa odandra. Roxb.

Mimosa spinifluga. Klein, in Litt.

Mimosa rubicaulis. Lam. Dict. 1. n°. 48.

Dans les jeunes pousses, la base des pétioles est munie d'une glande oblongue, qui disparaît dans les plantes plus âgées. (Voyez ACACIE à tige de ronce, n°. 26.)

86. ACACIE mignone. *Mimosa coccinea*. Willd.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, parialibus sexjugis, propriis multijugis, caltratis; glandula petiolaris, depressa; panicula terminali. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1039. n°. 27.

Mimosa saponaria. Roxb.

Ses rameaux sont cylindriques, ponctués, verruqueux, armés d'aiguillons nombreux, crochus; les jeunes branches anguleuses. Les feuilles sont longues de trois à quatre pouces, deux fois ailées, composées de cinq à six paires de pinnules, garnies de folioles nombreuses, linéaires, obtuses, à côtés inégaux, en riantant de couteau, tronquées au côté extérieur de leur base, amincies à l'intérieur, glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords; le pétiole commun armé d'aiguillon, muni, au-dessus de sa base, d'une glande comprimée; les parties pubescens, à demi-cylindriques. Les fleurs sont réunies en têtes globuleuses, pédonculées, forment par leur ensemble une panicule terminale. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (Descript. ex Willd.)

87. ACACIE fluée. *Mimosa fluata*. Lour.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, multijugis; capitulis axillaribus, foliis variis; leguminibus filiculis, caule scandente. Lour. Flor. cochin. vol. 2. n. 862. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1035. n. 28.

Ses tiges sont grimpantes, ligneuses, rameuses, alongées, armées d'aiguillons; les feuilles deux fois ailées, composées de pinnules nombreuses, linéaires, fort petites. Les fleurs sont axillaires, réunies en petites têtes globuleuses, sur des pédoncules allongés & solitaires. Le calice, tant dans les fleurs hermaphrodites que dans les fleurs mâles, est divisé en quatre découpures arrondies: il n'y a point de corolle. Les gouffes sont droites, allongées, comprimées, filueuses, contenant des semences planes & oblongues.

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la Cochinchine. *h* (Descript. ex Lour.)

88. ACACIE à petites têtes. *Mimosa microcephala*. Willd.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, partialibus sedicimjugis, propriis multijugis; racinis solitariis, terminalibus; capitulis aternis, geminatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1040. n. 29.

Mimosa microcephala. Humb. & Bonpl.

Cette plante offre, par son feuillage, l'aspect du mimosa cinereux. Ses rameaux sont rudes, cylindriques, punesceus, dépourvus d'épines, garnis de feuilles deux fois ailées, composées de seize paires de pinnules; les folioles nombreuses, linéaires, sans nervures sensibles, légèrement ciliées à leurs bords; le pétiole commun rude, rubescent; les partiels couverts de long poils rudes.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en grappes filiformes, longues de trois à cinq pouces, garnies, à leur partie inférieure, de feuilles deux fois ailées, à trois ou huit paires de pinnules; les têtes de fleurs de la grosseur d'un grain de moutarde, placées sur de petites grappes courtes, parallèles, deux à deux & alternes; les pédoncules velus, à peu près aussi longs que les têtes. Les gouffes sont longues d'un pouce, linéaires, à cinq ou sept articulations rudes, acuminées, sinuées à leurs deux bords.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, sur les bords de l'Orénoque. *h* (Descript. ex Willd.)

89. ACACIE à deux épis. *Mimosa distachya*. Cavan.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, partialibus propriis quatuorjugis; spicis, aternis, cylindraceis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1040. n. 30.

Mimosa distachya, caule fruticoso, inermi, sulcato; foliis oppositis, foliolis ovatis; junctis spicis axillaribus, geminis. Cavan. Icon. Kar. vol. 3. pag. 43. tab. 255.

Ses tiges sont ligneuses, dépourvues d'épines, cannelées, rameuses, garnies de petites alternes, pétiolées, deux fois ailées, composées de quatre paires de pinnules; chaque pinnule contenant trois ou quatre paires de folioles elliptiques, en ovaire renversé, couvertes, à leurs deux faces, de poils couchés. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en épis gemines, cylindriques, pédoncées, longs d'un pouce. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne. *h* (Descript. ex Cavan.)

90. ACACIE à épis nombreux. *Mimosa polystachia*. Linn.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, circho terminatis, partialibus triquadrijugis, propriis sexjugis; spicis cylindraceis, elongatis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1040. n. 31.

Mimosa polystachia, inermis, foliis bipinnatis, partialibus pinnatifidis sexjugis, oblongis. Linn. Syst. veget. pag. 769. — Jacq. Amer. pag. 265. tab. 183. fig. 95.

1. *Mimosa (entada)*, inermis, foliis bipinnatis, circho terminatis, partialibus bipjugis, propriis quatuorjugis; emarginatis; spicis cylindraceo-fistiformibus, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1041. n. 32.

Mimosa (entada), inermis, foliis bipinnatis, circho terminatis, partialibus quinquajugis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1502. — Flor. zeyl. 219. — Lam. Dict. 1. Var. 1.

Mimosa polystachia. Lam. Dict. 1. n. 7.

Ces deux plantes sont très-approchées, & paroissent bien appartenir à la même espèce. La plante 1. diffère de la première par ses folioles elliptiques, échanquées, réunies en trois ou cinq paires de pinnules. Les épis sont plus étroits, cylindriques, fistiformes. (Voyez ACACIE à épis nombreux, n. 7.)

5. III. SCHRANKIA. Willd. Fleurs hermaphrodites; corolle à cinq dents; corolle à cinq découpures; huit à dix étamines; un style; gouffe à quatre valves; point de pistil dans les fleurs mâles.

91. ACACIE à quatre valves. *Mimosa quadrivalvis*. Linn.

Mimosa (schrankia aculeata), foliis bipinnatis, partialibus trijugis, propriis multijugis; leguminibus acutis, caule tetragono. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1041. n°. 1.

Mimosa (quadrivalvis), aculeata, foliis bipinnatis, caule quadrangulo, aculeis recurvis, leguminibus quadrivalvis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1508. — Less. Itin. 266. n°. 146. — Banks, Reliq. — Houtt. tab. 25.

Mimosa undique aculeata, caule angulato; foliis duplicato-pinnatis, partialibus utrinque ternis. Roy. Lugd. Bat. 471.

Mimosa quadrivalvis. Lam. Dict. 1. n°. 52.

Ses racines sont tubéreuses, ainsi que dans les deux espèces suivantes; les tiges herbacées; les feuilles deux fois ailées; le pétiole commun armé d'aiguillons; les partiels pileux, n'ayant d'aiguillons que vers leur base; les pédoncules, ainsi que les fruits, munis de quelques petits aiguillons. (Voyez ACACIE quadrivalve, n°. 52.)

92. ACACIE à gouffes tétragones. *Mimosa tetragona.*

Mimosa (schrankia hamata), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis multijugis; leguminibus rostrato acuminatis, caule pentagono. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1041. n°. 2.

Schrankia hamata. Humb. & Bonpl.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle s'en distingue par le nombre de ses pinnules, par la forme de ses folioles, par les têtes de fleurs bien moins pédonculées, & par ses gouffes armées d'aiguillons nombreux, & terminées par un bec acuminé.

Ses tiges sont herbacées, pentagones, munies d'aiguillons nombreux, comprimés, crochus; les feuilles deux fois ailées, composées de quatre paires de pinnules, chargées de folioles nombreuses, linéaires, aiguës, rétrécies au côté intérieur de leur base, tronquées à angle aigu à l'extérieur, veinées en dessus, à nervure un peu sillonnée en dessous; le pétiole commun à aiguillons nombreux; les partiels glabres, armés quelquefois d'un ou de deux aiguillons vers leur base. Les fleurs sont disposées en têtes globuleuses, axillaires, très-médiocrement pédonculées; les pédoncules munis d'aiguillons; les gouffes tétragones, à quatre valves; trois rangs d'aiguillons très-rapprochés sur chaque valve.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Description ex Willd.)

93. ACACIE féroce. *Mimosa horridula.* Mich.

Mimosa (schrankia uncinata), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis multijugis; leguminibus acuminatis, caule pentagono. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1043. n°. 3.

Mimosa (horridula), caule herbaceo, diffuso seu procumbente petiolisque uncinatim aculeatis; foliis multijugo-bipinnatis; pedunculis geminis, monocarpis; leguminibus densissime aculeato-echinatis, quadrivalvis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 254.

Mimosa (horridula), petiolis inter pinnaarum paria glandulosis, pinnis multijugis, caule teretibus; leguminibus aculeatis, quadrivalvis. Vent. Choix des Plant. pag. 28. tab. 28.

Mimosa (infla), aculeata, foliis bipinnatis, pinnis incurvis, caule angulato, floribus rubro-purpureis. Walter. Flor. calif. pag. 252.

Cette plante est remarquable par les aiguillons nombreux & crochus qui recouvrent entièrement les gouffes, ainsi que les pédoncules. Ses tiges sont herbacées, cannelées, presque pentagones, armées d'aiguillons nombreux, comprimés, inégaux, d'un jaune-pâle, crochus; les feuilles deux fois ailées, composées de six paires de pinnules opposées; sur chaque pinnule dix à douze paires de folioles linéaires, obtuses, presque sessiles, fort petites, tronquées sur un des côtés de leur base, surmontées d'une glande peu apparente, traversées inégalement par la nervure du milieu; le pétiole commun tétragone, articulé à sa base, glabre, parsemé de petits aiguillons crochus, muni, entre chaque paire de folioles inférieures, d'une glande saillante; des stipules capillaires, de couleur purpure.

Les fleurs sont fort petites, axillaires, solitaires, réunies en une tête globuleuse; des bractées très-courtes, linéaires, d'un pourpre foncé à la base de chaque fleur, très-caduques; les pédoncules glabres, tétragones, plus courts que les feuilles. Le calice est glabre, fort petit, d'un vert-blanchâtre, à cinq dents d'un beau pourpre; cinq pétales de même couleur, lancéolés, aiguës; dix étamines, un style latéral, un stigmate obtus. Les gouffes sont allongées, étroites, un peu cylindriques, creusées de quatre sillons, hérissées d'aiguillons crochus, à une seule loge, à quatre valves opposées deux à deux, inégales, renfermant des semences nombreuses, disposées sur un seul rang, noires, comprimées, de forme presque carrée.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, depuis la Virginie jusque dans la Floride. (V. f.)

5. IV. DESMANTHIUS. Willd. *Fleurs hermaphrodites ; calice à cinq dents ; corolle à cinq divisions ou cinq pétioles ; dix étamines ; un style ; une gouffe à deux valves ; fleurs stériles ; calice à cinq dents ; corolle quelquefois nulle ; dix étamines stériles ; lancéolées , dilatées.*

* Tiges dépourvues d'épines.

94. ACACIE des marais. *Mimosa lacustris*.

Mimosa (desmanthus lacustris), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus trijugis*, *propiis multijugis* ; *spiciis ovatis* ; *pedunculis bracteatis* ; *caule repente*, *tereti*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1044. n°. 1.

Mimosa lacustris. Humb. & Bonpl.

An mimosa aquatica ? Hort. Paris.

Ses tiges sont herbacées, rampantes, cylindriques, dépourvues d'épines, garnies de feuilles alternes, pétioles, deux fois ailées, composées de trois paires de pinnules longues d'un pouce & demi, & de folioles nombreuses, linéaires, obtuses à leurs deux extrémités. Les fleurs sont disposées en un épi ovale, longuement pédonculé, soutenant des fleurs mâles à sa base ; le pédoncule plus long que les feuilles, accompagné de deux ou trois bractées ovales, lancéolées, caduques. Les gouffes sont oblongues, acuminées, contenant de quatre à six semences.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux lieux marécageux. ✕ (*Descript. ex Willd.*)

95. ACACIE nageante. *Mimosa natans*.

Mimosa (desmanthus natans), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus trijugis*, *propiis tredecimjugis* ; *spiciis oblongis*, *interstictis* ; *pedunculo nudo* ; *caule tereti*, *radicante*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1044. n°. 2.

Mimosa (natans), *foliis bipinnatis*, *bi seu trijugis* ; *foliolis tredecimjugis*, *capitulis oblongis* ; *caule flexuoso*, *inferius radicante*. Vahl, Symbol. vol. 3. pag. 102. — Roxb. Corom. 2. pag. 11. tab. 119.

Neptunia (oleracea), *foliis bipinnatis* ; *spiciis brevibus*, *lateralibus*. Loureir. Flor. coch. vol. 2. pag. 804.

Niri-todda-vaddi. Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag. 35. tab. 20.

Elle a de grands rapports avec l'espèce précédente. Ses tiges sont flexueuses, cylindriques, flottantes au dessus des eaux, radicales à leur partie inférieure, souvent calleuses & renflées, garnies de feuilles deux fois ailées, composées de deux ou trois paires de pinnules, longues d'un demi-pouce, garnies chacune de dix à treize paires de

Botanique. Supplément. Tome 1.

folioles linéaires, obtuses à leurs deux extrémités. Les fleurs sont disposées en un épi oblong, interrompu, longuement pédonculé ; les fleurs mâles placées à la base ; les pédoncules nus, une fois plus longs que les feuilles ; les gouffes oblongues, acuminées, contenant six à huit semences.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à la Cochinchine. ○ (*Descript. ex Willd.*)

96. ACACIE à tige triangulaire. *Mimosa triquetra*. Vahl.

Mimosa (desmanthus triquetra), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus bi-tri-jugis* ; *propiis duodecimjugis* ; *spiciis globosis* ; *pedunculo bracteato* ; *caule prostrato*, *superne triquetra*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1045. n°. 3.

Mimosa (triquetra), *inermis*, *procumbens*, *foliis bi-jugis* ; *capitulis subrotundis* ; *coulibus inferne compressis*, *superne triquetris*. Vahl, Symbol. 3. pag. 102.

Mimosa (natans), *inermis*, *procumbens*, *foliis bi-jugis* ; *capitulis subrotundis* ; *floribus decandris* ; *radiculis sterilibus*, *majoribus*. Linn. f. Suppl. pag. 439.

Mimosa orientalis, *non spinosa*, *rarioribus ramis* ; *floribus spicatis*. Pluken. Almag. pag. 252, & Phytogr. tab. 307. fig. 4.

Mimosa prostrata. Lam. Dict. n°. 10. var. β.

La différence qui existe entre cette espèce & les deux précédentes est si faible, qu'elle laisse lieu de soupçonner qu'elles appartiennent à la même plante. Dans celle-ci les fleurs sont ramassées davantage en tête ou en un épi court, un peu globuleux, point interrompu. Ses racines sont ligneuses, ses tiges nombreuses, couchées, comprimées à leur partie inférieure, triangulaires & striées vers leur sommet, longues de quatre à dix pouces. Les feuilles sont deux fois ailées, composées de deux, quelque-fois de trois paires de pinnules, garnies de dix à douze paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leurs bords ; les pédoncules à peu près aussi longs que les feuilles, munis de deux petites bractées caduques. Les gouffes sont oblongues, obtuses, à cinq ou six semences.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ✕

97. ACACIE à fleurs pleines. *Mimosa plena*. Linn.

Mimosa (desmanthus plena), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus tri-quadrijugis* ; *propiis duodecimjugis* ; *spiciis ovatis* ; *pedunculo bracteato* ; *caule prostrato*, *compresso*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1045. n°. 4.

Mimosa (plena), *inermis*, *foliis bipinnatis* ; *spiciis*

11

pentandria, inferioribus plenis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1502. — Hort. Upfal. 145. n°. 3. — Banks, Reliq. Houll. tab. 23.

Mimosa plena. Lam. Dict. 1. n°. 9.

Cette espèce, ainsi que les deux précédentes, est douée de beaucoup d'irritabilité. (Voy. ACACIE à fleurs plines, n°. 9.)

98. ACACIE déprimée. *Mimosa depressa*.

Mimosa (desmanthus depressus), *inermis, foliis bipinnatis, portulicibus bijugis, propriis duodecimjugis; spicis paucifloris, capitatis, decandris; leguminibus linearibus; caule prostrato*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1046. n°. 5.

Desmanthus depressus. Humb. & Bonpl.

Elle se rapproche encore des précédentes par la forme de ses épis & par la figure de ses gouffes ; elle en diffère par plusieurs des caractères suivants.

Ses racines sont ligneuses ; elles produisent plusieurs tiges longues de sept à douze pouces, glabres, étalées, rameuses dès leur base, cylindriques à leur partie inférieure, presque tétragones vers leur sommet, garnies de feuilles deux fois ailées, à deux paires de pinnules, composées de huit à douze paires de folioles linéaires, obtuses. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, peu garnis, pédonculés ; les fleurs mâles placées à la base de l'épi. Le pédoncule est nu, de la longueur des feuilles ou un peu plus long. Le fruit consiste en une gouffe longue d'un pouce & demi, linéaire, acuminée, à plusieurs semences.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Voy. Description. ex Willd.)

99. ACACIE à baguettes. *Mimosa virgata*. Linn.

Mimosa (desmanthus virgatus), *inermis, foliis bipinnatis, portulicibus quadrijugis, propriis duodecimjugis; spicis paucifloris, capitatis, decandris; leguminibus linearibus; caule erecto, angulato*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1047. n°. 7.

Mimosa (virgata), *inermis, foliis bipinnatis; spicis decandris, inferioribus castratis, masculis; caule erecto, angulato*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1502. — Jacq. Hort. tab. 80.

Mimosa americana, pigra, siliculis longis, angustis, ollam oleosis. Pluken. Almag. pag. 552. tab. 307. fig. 3.

Mimosa angustifolia. Lam. Dict. 1. n°. 11.

Mimosa spuria pernambuco, seu mimosa italica. Zann. Hist. 151.

Ses étamines sont au nombre de dix ; ses gouffes

très-étroites, les tiges droites, les rameaux effilés. (Voy. ACACIE à tiges étroites, n°. 11.)

100. ACACIE pernambuc. *Mimosa pernambucana*. Linn.

Mimosa (desmanthus diffusus), *inermis, foliis bipinnatis, portulicibus quadri-jugis; spicis paucifloris, capitatis, pentandris; leguminibus linearibus, caule prostrato*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1046. n°. 6.

Mimosa (pernambucana), *inermis, foliis bipinnatis; spicis cernuis, pentandris, inferioribus castratis; caule decumbente*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1503.

Cette plante paroît devoir être réellement distincte de la précédente par ses tiges couchées ou renversées, par ses fleurs à cinq étamines, par ses feuilles, plus souvent composées de cinq que de quatre pinnules ; elle lui ressemble d'ailleurs par les autres parties. Elle croît en Amérique, dans la Nouvelle-Andalousie. (Voy.)

101. ACACIE ponctuée. *Mimosa punctata*. Linn.

Mimosa (desmanthus punctatus), *inermis, foliis bipinnatis, portulicibus quadri-jugis; spicis paucifloris, capitatis, pentandris; leguminibus linearibus, caule prostrato*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1047. n°. 8.

Mimosa (punctata), *inermis, foliis bipinnatis; spicis erectis; floribus decandris, inferioribus castratis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1502.

Mimosa frutescens, inermis, siliculis compressis, falcatis, umbellatis; pedunculo longissimo. Brown, Jam. pag. 253.

Mimosa punctata. Lam. Dict. 1. n°. 12.

Cette espèce se rapproche beaucoup, par son port, du *mimosa plena*. Ses gouffes sont oblongues, obtuses. (Voy. ACACIE ponctuée, n°. 12.)

★ ★ Tiges armées d'épines.

102. ACACIE cendrée. *Mimosa cinerea*. Linn.

Mimosa (desmanthus cinereus), *spinis solitariis; foliis bipinnatis; portulicibus subovemjgis, propriis multijugis; spicis cylindricis, basi attenuatis, cernuis; leguminibus linearibus, falcatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1048. n°. 9.

Mimosa (cinerea), *spicis solitariis, foliis bipinnatis, floribus falcatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1505. — Roxb. Corom. 2. pag. 39. tab. 174.

Mimosa cinerea. Lam. Dict. 1. n°. 33.

Le fruit consiste en une gouffe plane, linéaire, courbée en faucille, longue d'environ deux pouces. (Voy. ACACIE cendrée, n°. 33.)

103. ACACIE divergente. *Mimosa divergens*.

Mimosa (d. *mananthus divergens*), *spinis foliatis* ; *foliis bipinnatis*, *parvis* ; *odijugis*, *propreis* ; *multifloris* ; *spicis* *cyathicis*, *geminatis*, *pendulis* ; *leguminibus* *contortis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1048. n°. 10.

Mimosa divaricata. Hortulanor.

Ergott-dimmo. Bruce, Itin. 5. pag. 34. Icon. & edit. germ. vol. 5. pag. 45. tab. 6.

Arbuste qui s'élève à la hauteur de six à sept pieds, très-rameux. Les rameaux sont étalés, diffus, cannelés, parsemés de verrues blanchâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, deux fois ailées, composées de six à neuf, plus ordinairement huit paires de pinnules, chargées d'un grand nombre de folioles linéaires, angul. usés à leur base, ciliées à leur contour. Les épines sont droites, ciliées à leur base, quelques-unes, quelquefois geminées. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, pendans, axillaires, cylindriques : il leur succède des gousses linéaires, contournées.

On soupçonne cette plante originaire de l'Abissinie. *h* (*Descript. ex Willd.*)

5. V. ACACIA. Willd. *Fleurs hermaphrodites* ; *calice* à cinq dents ; *corolle* à cinq découpures ou à cinq pétales ; *étamines* de quatre à cent ; un *style* ; une *gousse* bivalve ; *point de style* dans les fleurs mâles.

* Feuilles simples.

104. ACACIE verticillée. *Mimosa verticillata*. Aiton.

Mimosa (*acacia verticillata*), *inermis*, *foliis linearibus*, *macrocaris*, *rigidis*, *pungentibus*, *verticillatis* ; *spicis* *cylindricis*, *foliatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1049. n°. 1.

Mimosa (*verticillata*), *foliis verticillatis*, *linearibus*, *pungentibus*. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. 438. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 30. — Curtis, Magaz. tab. 110.

Ses tiges se divisent en rameaux souples, grêles, parsemés de quelques poils rares dans leur jeunesse, dépourvus d'épines, garnis de feuilles roides, très-étroites, sessiles, piquantes, linéaires-subulées, mucronées à leur sommet, longues de quatre ou cinq lignes, réunies de trois à six, en forme de verticille. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en épis axillaires, foliaires, alternes, rarement opposés, épais, cylindriques, obus, pédonculés, d'un jaune de soufre, longs d'environ un demi-pouce.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. On la cultive dans les jardins botaniques de l'Europe. *h* (*V. f.*)

105. ACACIE à feuilles de genévrier. *Mimosa juniperina*. Ait.

Mimosa (*acacia juniperina*), *foliis linearibus*, *macrocaris*, *rigidis*, *pungentibus*, *alternis*, *confertis* ; *spicis* *globosis*, *foliatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1049. n°. 2.

Mimosa (*ulicifolia*), *inermis*, *foliis asperis*, *linearibus*, *macrocaris*, *stipulatis* ; *foribus* *capitis*. Wendl. Coll. & Plant. pag. 25. tab. 6.

Quinque très-rapprochée de l'espèce précédente, celle-ci en diffère par la disposition de ses feuilles & par la forme de ses épis. Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, pubescens, garnis de feuilles sessiles, alternes, point verticillées, nombreuses, rapprochées, linéaires, très-étroites, roides, piquantes, mucronées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, de la grosseur d'un pois, alternes, axillaires, longuement pédonculés : il leur succède une gousse plane, lancéolée, contenant deux semences.

Cette plante croît à la Nouvelle Hollande. *h* (*V. f.*)

106. ACACIE à feuilles d'if. *Mimosa taxifolia*.

Mimosa (*acacia taxifolia*), *inermis*, *foliis lanceolatis*, *verticillatis*, *ternis* ; *spicis* *subovatis*, *foliatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1050. n°. 3.

Mimosa (*stellata*), *inermis*, *foliis stellatis*, *ternis* ; *capitulis* *ovatis*. Loureir. Flor. coch. vol. 1. pag. 800.

Arbuste dont les tiges s'élèvent à la hauteur de huit à dix pieds, divisées en rameaux ascendants, dépourvus d'épines, garnis de feuilles simples, sessiles, lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, rapprochées trois par trois en verticille. Les fleurs sont polygynes, terminées, de couleur pâle, réunies en tête presque ovale ; le calice & la corolle à quatre divisions ; les étamines au nombre de quatre. Les gousses sont courtes.

Cette plante croît sur les montagnes de la Chine. *h* (*Descript. ex Loureir.*)

107. ACACIE odorante. *Mimosa suaveolens*. Smith.

Mimosa (*acacia suaveolens*), *inermis*, *foliis linearibus*, *basi attenuatis*, *macrocaris* ; *spicis* *globosis*, *racemosis*, *ramis* *triquetris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1050. n°. 4.

Mimosa (*suaveolens*), *foliis linearibus*, *acuminatis*, *radix*, *marginibus* *cartilagineis*, *primord aliis* *pinnatis* ; *ramis* *triquetris*. Smith, A2. Soc. 1. Inn. Lond. vol. 1. pag. 253. — Labillard. Nov. Holl. vol. 2. pag. 87. tab. 236.

Mimosa (obliqua), *inermis*, *petiolis planis*, *lineari-lanceolatis*, *obliquis*, *nudis*, *foliiformibus*; *spicis axillaribus*, *globosis*. Lam. Journ. Hist. Nat. vol. 1. pag. 89. tab. 5.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, alternes, à trois faces, garnis de feuilles linéaires, sessiles, rétrécies à leur base, mucronées à leur sommet, longues d'un pouce & demi ou deux pouces, terminées par une pointe courte, glabres à leurs deux faces, traversées par une seule nervure, entières, épaisses à leurs bords; les premières feuilles deux fois ailées, à l'extrémité d'un pétiole plane. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, situés dans l'aisselle des feuilles, penduculés, formant, par leur ensemble, une petite grappe courbe. Le calice est divisé en quatre ou plus souvent cinq découpures acuminées, ciliées à leur sommet. La corolle est composée de cinq pétales ovales, oblongs; cinquante à soixante étamines. Les gousses sont ovales, rhomboidales ou oblongues, comprimées, à deux loges, à deux valves, contenant environ six semences brunes, oblongues.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. *h* (V. f.)

108. ACACIE à fleurs nombreuses. *Mimosa floribunda*. Vent.

Mimosa (acacia floribunda), *inermis*, *foliis linearibus*, *utrinque attenuatis*, *mucronatis*, *arcuatis*, *frictis*; *floribus interrupte spicatis*; *ramis terribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. n. 5.

Mimosa (floribunda), *foliis sparsis*, *lanceolato-linearibus*, *subulcatis*; *spicis axillaribus*, *longitudine foliorum*; *petalis reflexis*. Vent. Choix de Plantes, pag. 13. tab. 13.

Arbrisseau d'un port élégant, qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, & se divise en rameaux alternes, flexibles, d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles simples, éparées, sessiles, articulées sur un tubercule saillant & persistant après la chute des feuilles; linéaires, lancéolées, un peu courbées en fente, striées, aiguës à leurs deux extrémités, longues de deux ou trois pouces & plus, larges de deux à trois lignes, glabres à leurs deux faces, d'un vert-ciel, blanchâtres & cartilagineuses sur leurs bords; les supérieures insensiblement plus courtes.

Les fleurs sont disposées en épis nombreux, axillaires, piéles, de la longueur des feuilles; sessiles sur l'axe commun, rapprochées deux à deux, presque opposées, hermaphrodites, quelquefois mâles, d'un jaune de soufre, répandant une légère odeur de jasmin, munies de bractées ovales, obtuses, membraneuses, caduques, couleur de toulie. Le calice est campanulé, à quatre

ou cinq dents; la corolle composée de quatre ou cinq pétales ovales, aigus, réfléchis; les étamines nombreuses; les anthères droites, à deux lobes; un style latéral, capillaire, plus long que les étamines; le stigmate simple. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nouvelle-Hollande. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

109. ACACIE à feuilles de lin. *Mimosa linifolia*. Vent.

Mimosa (acacia linifolia), *inermis*, *foliis linearibus*, *basi attenuatis*, *frictis*, *mucronatis*; *spicis globosis*, *pendunculatis*, *racemosis*; *racemis folia subaequantibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. n. 6.

Mimosa (linifolia), *foliis lineari-lanceolatis*, *surcis*; *racemis axillaribus*, *paniculatis*, *longitudine foliorum*. Vent. Hort. Ceis. pag. 2. tab. 2.

Mimosa pinifolia. Hortulanor.

Arbrisseau à tige grêle, divisée en un grand nombre de rameaux glabres, d'un pourpre foncé, souples, étalés, anguleux à leur partie supérieure, garnis de feuilles éparées, sessiles, linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités, un peu ciliées à leur base, terminées par une petite pointe, munies de stipules glabres, d'un vert-foncé; la base des feuilles ciliée, se prolongeant sur les rameaux. Les premières feuilles, dans les jeunes individus, deviennent de vrais pétioles qui se divisent, à leur sommet, en deux côtes, chargées chacune de huit folioles impaires sur deux rangs opposés.

Les fleurs sont axillaires, pédicellées, réunies, sur un pédoncule commun, en une petite grappe de la longueur des feuilles, formant, par leur ensemble, une panicule serrée, feuillée, allongée; ces fleurs sont de la grosseur d'un grain de miller, rapprochées, au nombre de sept à huit, en séries de la forme d'un pois, d'un jaune de soufre, très-odorantes, accompagnées de bractées ovales, aiguës, ciliées à leurs bords. Le calice est très-cour, à cinq divisions; la corolle composée de cinq pétales droits, oblongs, concaves, aigus; les étamines nombreuses; un style capillaire, latéral; un stigmate simple. Les fruits n'ont point encore été observés.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, à Botany-Bay. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

110. ACACIE à feuilles de sapin. *Mimosa abietina*.

Mimosa (acacia abietina), *inermis*, *foliis linearibus*, *basi attenuatis*, *frictis*, *mucronatis*; *spicis*

globosa, pedunculatis, racemosa; racemis folio longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. n°. 7.

Mimosa linearis. Hortulanor.

Elle ressemble beaucoup à l'espèce précédente; mais ses grappes de fruits sont plus épaisses, plus longues que les feuilles; les têtes plus grosses, les feuilles plus courtes. Peut-être les fruits offrent-ils aussi quelques différences s'ils étoient connus. Les rameaux sont anguleux & les feuilles linéaires, rétrécies à leur base, obtuses & mucronées à leur sommet, à peine longues d'un pouce. Les fleurs sont disposées en grappes rapprochées, axillaires, composées de têtes pédicellées, de la grosseur d'une semence de coriandre.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.
b (Description. ex Willd.)

111. ACACIE à rameaux roides. *Mimosa stricta.* Andr.

Mimosa (acacia stricta), inermis, foliis linearilanceolatis, basi attenuatis, obtusis; spicis globosis, axillaribus, pedunculatis, geminatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1052. n°. 8.

Mimosa (stricta), foliis simplicibus, utrinque venosis, linearibus, obtusis; ramis strictissimis; capitulis geminatis, oppositis, ex alis foliorum. Andr. Botan. Repert. pag. 53. tab. 55.

Ses rameaux sont glabres, roides, alternes, anguleux, garnis de feuilles alternes, linéaires, lancéolées, rétrécies à leur base en pétiole, arrondies & obtuses à leur sommet, glabres, veinées à leurs deux faces, longues d'environ deux pouces. Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, réunies en épis globuleux, geminés, pedoncules, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.
b (Description. ex Willd.)

112. ACACIE à longs épis. *Mimosa macrostachya.*

Mimosa (acacia longifolia), inermis, foliis linearibus; lanceolatis, utrinque angustatis, trinerviis, striatis; spicis ex l'aribus, geminatis, cylindraceis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. n°. 9.

Mimosa (longifolia), foliis integris, longissimis, utrinque glabris, obtusis; capitulis geminatis, racemosis, longissimis, oppositis, luteis, subcernuis. Andr. w. Botan. Depoit. pag. 107. tab. 107.

Ses tiges sont droites, les rameaux glabres, cylindriques, anguleux dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, linéaires, lancéolées, longues de deux pouces & plus, médiocrement rétrécies à leurs deux extrémités, principalement à leur base, un peu obtuses à leur sommet, glabres à

leurs deux faces, striées, marquées de trois nervures légèrement mucronées. Les fleurs sont jaunes, festées, opposées, un peu inclinées, disposées en épis axillaires, geminées, à peine pedoncules, longues à peine d'un pouce & demi.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (P. f.)

113. ACACIE glauque. *Mimosa glaucescens.*

Mimosa (acacia glaucescens), inermis, foliis lanceolatis, sulcatis, basi attenuatis, obtusis, subbinerviis, glaucescentibus; spicis axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1051. n°. 10.

Mimosa (binervia), inermis, foliis oblongis, subensiformibus, binerviis, glandulosis, glabris, erectis; inferioribus primis pinnatis; floribus axillaribus, spicatis, luteis. Vendl. Observ. 56.

Ses tiges sont rameuses, dépourvues d'épines, garnies de feuilles alternes, lancéolées, oblongues, un peu courbées en faucille, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, glanduleuses, de couleur presque glauque, striées, obtuses à leur sommet. Les deux inférieures, converties en pétiole, produisent des folioles ailées. Les fleurs sont jaunes, disposées en épis axillaires.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. b

114. ACACIE en faucille. *Mimosa falcata.*

Mimosa (acacia falcata), inermis, foliis oblongis, falcatis, basi attenuatis, acutis, venosis; ramis acutiusculis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1853. n°. 11.

Mimosa (obliqua), inermis, foliis obliquis, ensiformibus, glandulosis, glabris, pinnatis, inferioribus primis pinnatis; floribus axillaribus. Vendl. Observ. 57.

Ses rameaux sont glabres, alternes, dépourvus d'épines, garnis de feuilles oblongues, obliques, courbées en faucille, glanduleuses, longues au moins de trois pouces, étalées, glabres à leurs deux faces, fortement rétrécies à leur base, aigres à leur sommet, veinées des deux côtés, traversées inégalement par la nervure du milieu. Les deux feuilles inférieures, converties en pétiole, produisent plusieurs paires de folioles ailées. Les fleurs sont axillaires.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. b

115. ACACIE à feuilles simples. *Mimosa simplicifolia.* Linn.

Mimosa (acacia simplicifolia), inermis, foliis ovatis, acutis, multinerviis; spicis globosis, peduncu-

Latis; leguminibus falcatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1053. n°. 12.

Mimosa (hispidifolia); *inermis*, *arbores*, *foliis ovatis*, *integerrimis*, *nervosis*, *obtusis*; *spicis globosis*, *pedunculatis*. Linn. f. Suppl. pag. 436.

Mimosa mangium. Forster, Ptoch. n°. 395. (*Exclusa synonymo Rumphii.*)

β. *Mimosa* (acacia mangium), *inermis*, *foliis ovatis*, *acutis*, *oblique venosis*; *leguminibus falcatis*, *ramis triquetris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1053. n°. 13.

Mangium montanum. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 143. tab. 81.

C'est un arbuste fort élégant, dont les tiges sont dépourvues d'épines, revêtues d'une écorce glabre, de couleur cendrée, les rameaux à peine anguleux; garnies de feuilles assez grandes, ovales ou oblongues, planes, très-entières, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, médiocrement pétiolées, sans côte dans leur milieu, munies d'un grand nombre de nervures saillantes, longitudinales; point de stipules. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, fort petits, légèrement pédonculés; il leur succède une gouffe comprimée, courbée en dedans, toruleuse, de la longueur des feuilles.

La plante β, si elle n'est point une espèce différente, en est au moins une variété très-remarquable, ayant des rameaux à trois angles, des feuilles divisées inégalement par une côte longitudinale, munie seulement de trois nervures d'un seul côté.

Cette plante croît dans les îles des Amis, à la Nouvelle-Gédonie, & la variété β aux Moluques. (V. f.)

116. ACACIE à feuilles de myrte. *Mimosa myrtifolia*. Smith.

Mimosa (acacia myrtifolia), *inermis*, *foliis oblongis*, *acuminatis*, *venosis*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *racemosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1054. n°. 14.

Mimosa (myrtifolia), *inermis*, *foliis simplicibus*, *elliptico-lanceolatis*, *obliquis*, *marginibus cartilagineis*, *integerrimis*; *capitulis axillaribus*, *racemosis*; *leguminibus marginibus incrassatis*. Smith, Nov. Holl. pag. 51. tab. 15.

Mimosa foliis ovato-lanceolatis, *obliquis*, *undulatis*, *acuminatis*, *marginibus cartilagineis*; *primordialis pinnatis*. Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 252.

Ses tiges sont dépourvues d'épines; ses rameaux glabres, à deux angles opposés; ses feuilles presque sessiles, oblongues, d'environ un pouce & demi de longueur, rétrécies à leurs deux extré-

mités, en forme de pique, acuminées à leur sommet, entières, cartilagineuses à leurs bords, velutées, glabres à leurs deux faces, partagées inégalement par la côte du milieu. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, de la grosseur d'un grain de poivre, réunis en grappes axillaires, de la longueur des feuilles.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. (Description, ex Willd.)

117. ACACIE en coquille. *Mimosa cochlearis*. Labillard.

Mimosa foliis lanceolatis, *mucronatis*, *nervosis*; *capitulis vix solorum longitudine*, *pedunculatis*; *calicinis folioli cochleariformibus*. Labill. Nov. Holl. vol. 2. pag. 85. tab. 234.

Arbrisseau très-rameux, haut de quatre à six pieds; les rameaux cylindriques; les plus jeunes comprimés, presque triangulaires, légèrement pileux, garnis de feuilles simples, lanceolées, à trois ou quatre nervures, sessiles, alternes, un peu pileuses, mucronées par une pointe roide & touffée; les stipules subulées, caduques.

Les fleurs sont disposées en têtes solitaires, pédonculées, axillaires, un peu plus courtes que les feuilles; chaque fleur accompagnée d'une écaille ovale, caduque. Le calice est divisé en cinq folioles épiques, dilaté, concaves à leur sommet, ciliées à leurs bords; la corolle tubulée, à peine plus longue que le calice, à cinq découpures ovales, courbées en dedans; les étamines nombreuses; les anthères presque orbiculaires, à deux loges. Le fruit est une gouffe linéaire, oblongue, assez droite, acuminée à ses deux extrémités, à une loge, à deux valves, contenant environ huit semences elliptiques, comprimées, rouscâtres.

Cette plante croît dans la terre de Van-Leuwin, où elle a été découverte par M. de Labillardière. (Description, ex Labill.)

118. ACACIE hispide. *Mimosa hispida*. Smith.

Mimosa (acacia hispida), *inermis*, *foliis simplicibus*, *oblongis*, *cuspatis*, *denticulatis*, *scabris*; *spicis globosis*, *hirsutis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1054. n°. 15.

Mimosa (hispida), *foliis simplicibus*, *ellipticis*, *obliquis*, *utrinque marginibus scabris*; *ramulis hispido-pubescentibus*, *capitulis solitariis*. Smith, Nov. Holl. pag. 53. tab. 16.

Ses rameaux sont cylindriques, hérissés de poils courts, garnis de feuilles alternes, sessiles, oblongues, presque en fer de pique, longues d'un demi-pouce & plus, denticulées à leurs bords, partagées inégalement par la côte du milieu, rudes & légèrement hispides à leurs deux faces. Les fleurs

sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en épis solitaires, globuleux, pédonculés, de la grosseur d'un pois : il leur succède des gouffes oblongues, lancéolées, longues d'un demi-pouce, épaisses à leurs bords, renfermant deux semences.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. (*Descript. ex Willd.*)

119. ACACIE hétérophylle. *Mimosa heterophylla*. Lam.

Mimosa (acacia heterophylla), foliis simplicibus bipinnatisque, simplicibus linearibus, falcatis, obtusis, mucronatis, trinerviis, striatis; spicis globosis, pedunculatis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1054. n°. 16.

Mimosa (heterophylla), inermis, foliis bipinnatis, pubescentibus; petiolis omnibus planis, ramulorum sterilibus falcatis, nudis; spicis globosis. Lam. Journ. d'Hist. Nat. vol. 1. pag. 291. tab. 35.

Mimosa heterophylla. Lam. Dict. 1. n°. 28.

Cette espèce, très-distincte du *mimosa simplicifolia*, avec lequel elle a néanmoins de très-grands rapports, a ses tiges de fleurs pédonculées, disposées en grappes axillaires très-courtes. Les pédoncules sont munis, à leur base, de quelques bractées ovales, concaves, aiguës. Les gouffes sont glabres, arquées, comprimées, longues de plus de deux pouces, sur environ trois lignes & demie de larg. ur. (*Voyez ACACIE hétérophylle*, n°. 28.)

120. ACACIE cher. *Mimosa f. ligna*. Labill.

Mimosa foliis linearibus, ternerviis, longissimis; capitulis pedunculatis, valde folio brevioribus. Labill. Nov. Holl. vol. 2. pag. 86. tab. 235.

Arbuste qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, & se divise en branches cylindriques légèrement flexueuses & en rameaux triangulaires, garnis de feuilles linéaires, acuminés à leurs deux extrémités, un peu arqués, sans nervures sensibles, longues de trois à quatre pouces & plus, glabres à leurs deux faces, ainsi que toutes les autres parties de la plante.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule silié, plus court que les feuilles ; les hermaphrodites mêlées avec les mâles, munies à leur base d'une écaille ovale, aiguë, caduque. Leur calice est anguleux, à cinq dents ; la corolle à peine plus longue que le calice, à cinq découpures ovales, oblongues ; les filaments très-nombreux ; les anthères à deux loges. Le fruit consiste en une gouffe linéaire, allongée, comprimée, étroite, sinuée à ses deux bords, aiguë à ses deux extrémités, à une seule loge, à deux valves, renfermant environ dix semences comprimées, elliptiques.

Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans la Nouvelle-Hollande. (*V. f.*)

121. ACACIE sophera. *Mimosa sophera*. Labill.

Mimosa foliis obovato-oblongis, nervosis, primordiatis, pinnatis; spicis geminis, fissilibus; corollâ tetrapetalâ, leguminibus fuscioribus. Labillard. Nov. Holl. vol. 2. pag. 87. tab. 237.

Ses fleurs en épis, & non en tête, le distinguent du *mimosa heterophylla* Lam., & ses fleurs, ainsi que ses fruits, du *mimosa longifolia* Andr.

C'est un arbre qui parvient à la hauteur de vingt-cinq ou trente pieds, sur un tronc d'environ un pied de diamètre. Ses rameaux sont diffus, cylindriques, très-nombreux, garnis de feuilles ovales-oblongues, lancéolées, à deux ou cinq nervures, marquées de points nombreux, vertes ou un peu brunes, rudes à leurs deux faces, à peine pétiolées ; les premières deux fois ailées sur un pétiole commun, linéaire, un peu cylindrique ou foliacé, dilaté à ses deux bords.

Les fleurs sont disposées en épis sessiles, axillaires, souvent geminés, courts, épais ; chaque fleur accompagnée d'une écaille ciliée, presque orbiculaire. Les calices sont partagés en quatre découpures, de moitié plus courts que la corolle ; quatre pétales ovales ; environ trente filaments un peu plus longs que la corolle ; l'ovaire globuleux, un peu pileux. Les gouffes sont flexueuses, un peu cylindriques, presque torseuses, acuminées à leurs deux extrémités, une fois plus longues que les feuilles, à une seule loge, à deux valves, contenant environ huit semences.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-Diemen. (*V. f.*)

* * Feuilles conjuguées, ailées.

122. ACACIE xylocarpe. *Mimosa xylocarpa*. Roxb.

Mimosa (acacia xylocarpa), inermis, foliis conjugato-pinnatis; pinnis quadrangulis; foliulis ovato-oblongis, acutis; spicis globosis, pedunculatis, geminis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1055. n°. 17.

Mimosa xylocarpa. Roxb. Corom. 1. pag. 68. tab. 100.

Ses tiges sont dépourvues d'épines ; ses rameaux alternes, garnis de feuilles conjuguées, ailées ; les pinnules composées de quatre paires de folioles ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet ; les supérieures longues de cinq pouces ; les inférieures de deux. Les fleurs sont disposées en épis pédonculés, axillaires, globuleux, geminés, de la grosseur d'une cerise ; les pédoncules longs de deux pouces & plus ; les

gouffes ovales-oblongues, dures, presque ligneuses, en forme de sabre, longues de trois à quatre pouces, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît dans les Indes orientales, sur les montagnes. *(Descript. ex Willd.)*

123. ACACIE à tire-bouchon. *Mimosa strobilifera*. Lam.

Mimosa (acacia strobilifera), spinis stipularibus; foliis conjugato-pinnatis; pinnis quadri seu sexjugis; legumine tereti, spiraliiter contorto. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1057. n.º 18.

Mimosa strobilifera. Lam. Dict. n.º 31.

Cette espèce est remarquable par ses gouffes allongées, roulées en une spirale serrée, cylindrique, ayant la forme d'un tire-bouchon. (*Voyez* ACACIE tire-bouchon, n.º 31.)

123. ACACIE gommier. *Mimosa gummiifera*.

Mimosa (acacia gummiifera), spinis stipularibus; foliis conjugato-pinnatis; pinnis sexjugis; foliolis linearibus, obtusis; spicis oblongis, axillaribus; legumine submoniliformi, tomentoso. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1056. n.º 19.

Mimosa gummiifera. Brousson. in litt.

Cette plante, très-rapprochée du *mimosa orabica* par ses gouffes, en diffère essentiellement par ses fleurs. On le distingue du *mimosa reticulata* par ses gouffes.

Ses rameaux sont cylindriques, pâles, ponctués de blanc, glabres & rougeâtres dans leur jeunesse, garnis de feuilles conjuguées, ailées; les pinnules composées de six paires de folioles linéaires, obuses, glabres à leurs deux faces; les pétiolos glabres; les parties longs d'un demi-pouce, le commun de deux lignes, accompagnés d'épines stipulaires, geminées, fortes, tubulées, longues d'un demi-pouce. Les fleurs sont disposées en épis oblongs, axillaires, pédonculés: il leur succède des gouffes planes, linéaires, tomenteuses, presque en forme de collier, longues de quatre pouces.

Cette plante a été découverte par M. Broussonet dans l'Afrique septentrionale, proche Mogador. *(Descript. ex Willd.)*

125. ACACIE réticulée. *Mimosa reticulata*. Linn.

Mimosa (acacia reticulata), spinis stipularibus; foliis conjugato-pinnatis; pinnis sex seu novemjugis; foliolis linearibus-oblongis, obtusis, distortis; petiolis glandulosis mucrone terminatis; spicis globosis, pedunculatis, foliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1058. n.º 20.

Mimosa (reticulata), spinis stipularibus; foliis

conjugatis, foliolis sexjugis; petiolis glandulosis aculeoque terminatis. Linn. Mantill. pag. 29.

Mimosa reticulata. Lam. Dict. n.º 32.

Cette espèce diffère de la précédente par la forme de ses gouffes & par la grandeur de ses semences. (*Voyez* ACACIE réticulée.)

126. ACACIE cinéraire. *Mimosa cineraria*. Linn.

Mimosa (acacia cineraria), aculeata, foliis conjugato-pinnatis; pinnis aequalibus, aculeis incurvis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1057. n.º 21.

Mimosa cineraria. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1500.

Mimosa maderaspatana, spinosa, infra accedens cortice cinereo, ramis communi pediculis bimis. Pluk. Almag. pag. 4. tab. 2. fig. 1.

Ses tiges sont de couleur cendrée, armées d'épines courtes, éparées, recourbées, garnies de feuilles conjuguées, ailées; les pinnules composées de plusieurs paires de folioles opposées, presque sessiles, linéaires, obtuses à leur deux extrémités, terminées, à leur sommet, par une petite pointe particulière. Les fleurs & les fruits ne sont point connus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *(Descript. ex fig. Pluken.)*

127. ACACIE à grandes gouffes. *Mimosa scandens*. Linn.

Mimosa (acacia scandens), inermis, foliis conjugato-pinnatis, cirrho terminatis; pinnis quadri, ugi, spicis filiformibus, corollis pentapetalis, caule scandente. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1057. n.º 22.

Mimosa (scandens), inermis, foliis conjugatis, cirrho terminatis; foliolis bijugis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1501. — Swartz, Observ. pag. 389.

Gigalobium scandens, elavieulatum. Brown, Jam. pag. 362.

Lens phaeocoloides. Burm. Zeyl. pag. 139.

Phorolus maximus, perennis, folio decomposito; lobo maximo, contorto. Sloan. Jan. pag. 68.

Arbor filiquosa, juglandis folio, brasiliiana, lobo longissimo, acacia filiqua insar distincto. C. Bauh. Pin. 474.

Subo morina. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 9. tab. 4.

Passetia. Flor. zeyl. 644. — Burm. Ind. 222.

Mimosa scandens. Lam. Dict. 1. n.º 8.

C'est une des espèces les plus remarquables de ce genre par la longueur de ses gouffes, qui ont

de six à huit pieds de long, contenant des semences larges de deux pouces. (Voyez ACACIE à grandes gouffes, n°. 8.)

128. ACACIE de Cumana. *Mimosa cumana*.

Mimosa (acacia cumana), *inermis*, *foliis conjugato-pinnatis*, *pinnis undecimjugis*, *spiciis filiformibus*, *corollis pentapetalis*, *caule erecto*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1058. n°. 23.

Acacia cumanaensis. Humb. & Bonpl.

Quoique cette plante ait le port du *mimosa pallida* & *levigata*, on l'en distingue aisément par le nombre de ses pinnules & la forme de ses glandes.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de vingt pieds. Ses rameaux sont glabres, cylindriques, diffus; ses feuilles conjuguées, ailées, longuement pétiolées; les pinnules composées d'onze paires de folioles glabres, linéaires, obtuses à leurs deux extrémités; les pétioles glabres, portant, entre chaque pinnule, une glande oblongue, sessile, obtuse. Les fleurs sont opposées, à cinq pétales, à dix étamines, disposées en épis axillaires, filiformes, longs de trois pouces.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, dans la province de Cumana. *h* (Descript. ex Willd.)

*** Feuilles deux fois ailées; tiges sans épines; épis filiformes.

129. ACACIE à fleurs nues. *Mimosa nudiflora*. Rich.

Mimosa (acacia nudiflora), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadri seu sexjugis*, *propiis duodecimjugis*, *ellipticis*, *obtusis*; *spiciis axillaribus laterratisbus*, *filiformibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1058. n°. 24.

Mimosa nudiflora. Richard, in litt.

Cet arbre a des rameaux cylindriques, couverts de cicatrices par l'attaché des feuilles; les plus jeunes pubescens; les feuilles alternes, deux fois ailées, composées de quatre ou six paires de pinnules; chaque pinnule d'environ douze paires de folioles elliptiques, longues de quatre lignes, arrondies, obtuses à leur sommet, un peu échinées, glabres à leurs deux faces, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous; les plus jeunes tomenteuses sur la côte du milieu; les pétioles pubescens; une glande plane, comprimée entre chaque paire de pinnules & de folioles. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, filiformes, pédonculés, longs de trois pouces; ces fleurs sont opposées sur chaque épi, distantes, à cinq pétales; il leur succède des gouffes planes.

Cette plante croît dans les îles danoises de l'Amérique. *h*.

Botan. que. Supplément. Tome I.

130. ACACIE graveleuse. *Mimosa muricata*. Linn.

Mimosa (acacia muricata), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquejugis*, *propiis multijugis*, *retusis*; *spiciis cylindraceo-subulatis*, *terminalibus aggregatis*; *ramis verrucosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1058. n°. 25.

Mimosa (muricata), *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquejugis*, *propiis multijugis*, *obtusis* & *caule muricato*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504.

Mimosa muricata. Lam. Dict. n°. 20.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, cylindriques, subulés, agrégés, supportés par de longs pédoncules rameux. (Voyez ACACIE graveleuse, n°. 20.)

131. ACACIE pâle. *Mimosa pallida*.

Mimosa (acacia pallida), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus bijugis*, *propiis duodecimjugis*, *linearibus*, *obtusis*, *pubescentibus*; *spiciis filiformibus*, *foliis multoties longioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1059. n°. 16.

Acacia pallida. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont étalés, cylindriques, couverts de cicatrices; les feuilles deux fois ailées; deux paires de pinnules, composées de douze, quelquefois dix paires de folioles linéaires, obtuses à leurs deux extrémités, parsemées en dessus d'un léger duvet, plus abondant en dessous, ciliées à leurs bords; une glande sessile, urcéolée, entre chaque paire de pinnules; les pétioles pileux. Les fleurs sont opposées, à cinq pétales, disposées en épis filiformes, solitaires, axillaires, longs de trois à quatre pouces, trois fois plus longs que les feuilles.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Descript. ex Willd.)

132. ACACIE lisse. *Mimosa levigata*.

Mimosa (acacia levigata), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus bijugis*, *propiis undecimjugis*, *obtusis*, *glabris*; *spiciis filiformibus*, *foliis longioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1059. n°. 27.

Acacia levigata. Humb. & Bonpl.

Cette espèce diffère de la précédente par ses folioles parfaitement glabres, un peu plus grandes; par ses pétioles preste glabres, par les glandes convexes & non urcéolées.

Ses rameaux sont cylindriques, diffus, couverts de cicatrices; ses feuilles deux fois ailées; deux paires de pinnules composées d'environ neuf, plus souvent onze paires de folioles glabres, linéaires, obtuses à leurs deux extrémités; les pétioles

presque glabres ou parsemés de quelques poils rares. Les fleurs sont opposées, à cinq pétales, disposées en épis axillaires, solitaires, filiformes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *¶ (Descript. ex Willd.)*

133. ACACIE à bec. *Mimosa rostrata*.

Mimosa (acacia rostrata), foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis multijugis; glandula petiolaris; spicis axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1060. n°. 28.

Acacia rostrata. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont glabres, médiocrement cylindriques; ses feuilles deux fois ailées, à six paires de pinnules, composées d'un grand nombre de folioles linéaires, rétrécies & un peu aiguës à leur sommet, anguleuses, tronquées à leur base, glabres à leurs deux faces, inégalement partagées par la nervure du milieu; les pétioles, tant communs que partiels, pileux; une glande urcéolée au-dessus de la base du pétiole commun. Les fruits sont disposés en épi, & consistent en gousses linéaires, longues de deux pouces, planes, un peu sinuées, un peu rudes, obtuses à leur sommet, terminées par une longue pointe élargie, en forme de bec.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *¶ (Descript. ex Willd.)*

134. ACACIE à feuilles étroites. *Mimosa angustifolia.* Lam.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, partialibus quatuor seu quinquejugis, propriis triginta ad quadragesimajugis, minimis, oblongis; spicis racemosis; leguminibus polyspermis. (N.)

Mimosa angustifolia. Lam. Dict. 1. n°. 18.

Son bois s'emploie à Saint-Domingue aux ouvrages de charpente: on s'en sert communément pour faire les poteaux qui soutiennent les édifices. (*Voyez* ACACIE à feuilles étroites, Dict. n°. 18.)

135. ACACIE à feuilles rhomboïdales. *Mimosa rhombifolia.* Persl.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis; foliis majoribus, rhomboïdeis; floribus spicatis. Persl. Synopt. Plant. vol. 2. pag. 263. n°. 62.

Ses tiges sont dépourvues d'épines, garnies de feuilles alternes, pétioles, deux fois ailées, composées de folioles assez grandes, de forme rhomboïdale. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, pédoncules.

Cette plante croît dans l'île de la Trinité. (*Ex herb. Juss.*)

136. ACACIE des sables. *Mimosa arenosa*.

Mimosa (acacia arenosa), inermis, foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis sexdecimjugis, linearibus, acutis; spicis geminatis, filiformibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1060. n°. 29.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, dont les rameaux sont anguleux, pubescens; les feuilles deux fois ailées, à six ou sept paires de pinnules, composées de seize ou vingt-quatre paires de folioles linéaires, aiguës, ciliées à leurs bords; les pétioles blanchâtres & pubescens; des glandes aiguës entre les pinnules. Les fleurs sont disposées en épis geminés, axillaires, filiformes, de la longueur des feuilles ou un peu plus longues; d'environ trois ou quatre pouces de longueur: ces fleurs sont blanches, odorantes, opposées; le calice à quatre ou cinq dents; la corolle à quatre ou cinq découpures; les étamines, au nombre de huit à dix, trois fois plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs du Caracas, sur les rives sablonneuses des fleuves. *¶ (Descript. ex Willd.)*

137. ACACIE à grands lobes. *Mimosa macroloba.*

Mimosa (acacia macroloba), inermis, foliis bipinnatis, partialibus sedecimjugis, propriis multijugis, linearibus, falcatis, acuminatis, basi angulatis; spicis filiformibus, solitariis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 10. n°. 30.

C'est un arbre très-élevé, dont les rameaux sont cylindriques, de la grosseur d'une plume de cygne; les feuilles deux fois ailées, longues d'un demi-pied, composées d'environ seize paires de pinnules; les folioles nombreuses, linéaires, courbées en faucille, acuminées à leur sommet, arrondies & rétrécies à un des côtés de leur base, anguleuses & hastées à l'autre; les pétioles glabres, cylindriques, canaliculés en dessus, marqués de deux lignes chargées de poils courts, d'un jaunepâle. Les fleurs sont sessiles, serrées, à cinq pétales, disposées en épis axillaires, solitaires, longs d'environ cinq pouces; les gousses longues d'un pied ou d'un pied & demi, larges de deux pouces, linéaires, ligneuses, contenant des semences planes, ovales, larges d'un pouce & demi.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. *¶ (Descript. ex Willd.)*

138. ACACIE à fleurs entassées. *Mimosa pulcherrima.*

Mimosa (acacia pulcherrima), inermis, foliis bipinnatis, partialibus tredecimjugis, propriis multijugis, obtusis, subitus pubescentibus; glandula petiolaris convexa; spicis axillaribus, geminatis, filiformibus.

formibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1061. n° 31.

Arbre fort grand, chargé de rameaux cannelés, anguleux, ponctués, garnis de feuilles deux fois ailées, longues d'environ cinq pouces, composées de treize paires de pinnales; les folioles nombreuses, oblongues, linéaires, obtuses, petites, arrondies à leur base, luisantes, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, glabres à leur contour, chargées, à leur face inférieure, de poils courts, nombreux, couchés; le pétiole commun à demi cylindrique, presque glabre; les partiels hérissés; une glande convexe, grande, placée au dessus de la base du pétiole commun. Les fleurs sont très-nombreuses, pédoncées, disposées en épis axillaires, gémées, pédonculés, longs de deux pouces. Le calice est filieux; la corolle divisée en cinq découpures pileuses.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. (Description de Willd.)

139. ACACIE de la Guiane. *Mimosa guianensis*. Aubl.

Mimosa (acacia guianensis), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus* propriis *decemjugis*, *ellipticis*, *obtusis*; *glandula* *petiolaris* *convexa*; *spicis* *filiformibus*; *glomeratis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1061. n° 32.

Mimosa (guianensis), *arborescens*, *inermis*, *floribus* *spicatis*, *albis*; *legumine* *compresso*. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 938. tab. 357. — Lam. Dict. 1. n° 26.

Les pétioles communs portent, un peu au dessus de leur base, une glande convexe. (Voyez ACACIE de la Guiane, n° 26.)

140. ACACIE à épis de tamarix. *Mimosa tamariscina*. Lam.

Mimosa (acacia tamariscina), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus* *vigintijugis*, *propriis* *multijugis*, *imbricatis*; *glandula* *inter* *inferum* & *superiorem* *partialia*; *spicis* *filiformibus*, *terminalibus*, *paniculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1062. n° 33.

Mimosa tamariscina. Lam. Dict. 1. n° 24.

Les pétioles partiels sont pubescents; les glandes urcéolées, situées entre les pinnales inférieures & les dix paires supérieures. (Voyez ACACIE à épis de tamarix, n° 24.) J'ai vu dans l'herbier de M. Desfontaines, un individu de cette plante muni de quelques gouffes comprimées, longues d'un pouce & demi, glabres, munies, à chacune de leurs futures, d'une aile membraneuse. Dans l'espèce suivante cette aile n'existe que sur une seule future. Les graines sont nombreuses, comprimées, brunes, lisses, lenticulaires.

141. ACACIE à fruit ailé. *Mimosa pterocarpa*. Lam.

Mimosa inermis, *foliis bipinnatis*, *partialibus* *vigintijugis* & *ultra*, *propriis* *quingintajugis*; *leguminibus* *subcompressis*, *anticis* *alatis*. (N.)

Mimosa pterocarpa. Lam. Dict. 1. n° 23.

L'examen des fleurs dans cette espèce, qui n'ont point été observées, celui des fruits dans la précédente, pourroient nous faire connoître si ces deux plantes très-rapprochées font véritablement distinctes ou variétés l'une de l'autre. (Voyez ACACIE à fruit ailé, n° 23.) Ses fruits diffèrent de ceux de la précédente, en ce qu'ils n'ont qu'une seule future membraneuse.

142. ACACIE d'Houffon. *Mimosa Houffoni*. Lhérit.

Mimosa (acacia Houffoni), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus* *subsexjugis*, *propriis* *multijugis*; *petiolis* *tomentosis*; *spicis* *terminali*, *interruptis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1062. n° 34.

Mimosa (Houffoni), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *abruptis*, *subsexjugis*; *pinnaulis* *multijugis*; *foliolis* *subconfluentibus*; *racemo* *composito*, *terminali*. Lhérit. Sert. Angl. 30. — Binks, Reliq. Houff. tab. 26.

Gleditsia (inermis), *caule* *interm.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1509. (Excl. synon. DuRoi.)

Acacia americana, *non* *spitosa*, *floribus* *purpureis*; *flaminibus* *longissimis*; *foliis* *planis*, *villosis*; *pinnis* *foliorum* *tenuissimis*. Mill. Icon. 4. tab. 5.

Cette plante, décrite d'abord par Linné sous la nom de *gleditsia inermis*, est un véritable *mimosa* qui se rapproche du *mimosa grandiflora*. Ses tiges n'ont point d'épines; ses feuilles sont deux fois ailées, composées d'environ six paires de pinnales, supportant un grand nombre de folioles très-rapprochées, pileuses en dessous; les pétioles tomenteux. Les fleurs sont semblables à celles du *mimosa grandiflora*, mais plus petites, disposées en épi terminal, interrompu. La corolle est persistante, un peu velue. Les gouffes sont planes, acuminées, rouffissées, tomenteuses; les semences oblongues, comprimées.

Cette plante croît à la Vera-Cruz. (N.)

*** Feuilles deux fois ailées; tiges sans épines; épis globuleux.

143. ACACIE trichode. *Mimosa trichodes*. Jacq.

Mimosa (acacia trichodes), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus* *bi-trijugis*, *propriis* *tri-quingjugis*, *ovatis*, *acutis*; *spicis* *geminis*, *globosis*, *pedunculatis*, *axillaribus*; *antheris* *hirsutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1063. n° 35.

Mimosa (trichodes), *inermis*, *foliis* *bipinnatis*,
I 2

partialibus subtrifidis, propriis à hijugis ad quinquejugis; pinnulis ovatis; capitulis globosis, axillari-bus; floribus monoicis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. pag. 76. tab. 394.

Ses riges se divisent en rameaux cylindriques, verruqueux, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées, à deux ou trois paires de pinnules, composées de deux, trois, quatre ou cinq paires de folioles ovales, aiguës, veinées, glabres à leurs deux faces; les supérieures plus grandes; les pétioles glabres; une glande droite, oblongue, placée entre les pinnules inférieures. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, globuleux, gémés, pédonculés; ils produisent des gouffes longues de trois ou quatre pouces, planes, glabres, luisantes, rétrécies à leurs deux extrémités.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (*Descript. ex Willd.*)

144. ACACIE élevée. *Mimosa procera*. Roxb.

Mimosa (acacia procera), *inermis, foliis bipinnatis, partialibus quadrjugis, propriis quinque seu octojugis; spiciis globosis, terminalibus, paniculatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1063. n.º 36.

Mimosa procera. Roxb. Coromand. vol. 2. pag. 12. tab. 121.

Ses riges sont fort élevées, garnies de rameaux cylindriques, de feuilles amples, deux fois ailées, à quatre paires de pinnules; les inférieures composées de cinq, les supérieures de huit paires de folioles ovales, un peu aiguës, divisées inégalement par la nervure du milieu; le pétiole commun muni à sa base d'une grosse glande comprimée. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, situés à l'extrémité des rameaux, & formant une ample panicle. Les gouffes sont planes, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres, longues de six à sept pouces.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

145. ACACIE musquée. *Mimosa odoratissima*. Linn.

Mimosa (acacia odoratissima), *inermis, foliis bipinnatis, partialibus quadrjugis, propriis decem duodecimjugisve, infimis minusculis; spiciis globosis, terminalibus, paniculatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1064. n.º 37.

Mimosa (odoratissima), *inermis, foliis bipinnatis, quadrjugis, multijugis; foliolis oblongis, obtusis; paniculis virgatis, spiculis globosis.* Linn. f. Suppl. pag. 437. — Vahl, Symb. 3. pag. 102. — Roxb. Corom. 2. pag. 12. tab. 120.

Acacia non spinosa, solum ægyptiaca foliis subius glauca, &c. Pluken. Almag. 3. tab. 351. fig. 4. ?

Mimosa odoratissima. Lam. Dict. 1. n.º. 25.

Les pinnules sont composées de dix à douze paires de folioles; les inférieures très-petites; les pétioles munis, à leur base & vers leur sommet, d'une glande comprimée. (*Voyez ACACIE odorante, n.º. 25*)

146. ACACIE à têtes blanches. *Mimosa leuccephala*. Lam.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, partialibus quatuor seu sexjugis, propriis duodecim seu tredecimjugis, linearibus, subacutis; capitulis axillaribus, geminis, subternis; leguminibus oblongis, planis. (N.)

Mimosa (leuccephala), *inermis, foliis bipinnatis, petiolis glandulosis; foliolis acutis, linearibus, apiculatis; capitulis axillaribus, subternis.* Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 264. n.º 76.

Mimosa leuccephala. Lam. Dict. 1. n.º. 17.

Arbrisseau très-élégant, dont les fleurs, réunies en têtes globuleuses, sont d'un blanc un peu jaunâtre; les anthères d'un jaune-pâle. (*Voyez ACACIE à tête blanche, n.º. 17.*)

147. ACACIE à fruits bordés. *Mimosa marginata*. Lam.

Mimosa subinermis, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis, propriis quindecimjugis, obliquis, platis; glandula inter paria foliorum; leguminibus compressis, marginatis. (N.)

Mimosa (marginata), *inermis, foliis duplicatopinnatis, glaucis; glandulis ad singulum par foliorum; pinnulis obliquis, alternis; capitulis; leguminibus marginatis, reflexis.* Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 264. n.º 75.

Espèce remarquable par ses gouffes d'un jaune-rougeâtre, munies d'un rebord saillant. (*Voyez ACACIE à fruits bordés, n.º. 16.*)

148. ACACIE à feuilles de lycopode. *Mimosa lycopodioides*.

Mimosa inermis, foliis bipinnatis, partialibus trijugis, propriis sextodecimjugis; foliolis imbricatis; spiculis spiniformibus; spiciis ovato-capitatis, subgeminis. (N.)

Mimosa inermis, foliis bipinnatis; foliolis imbricatis, subsessilibus; stipulis à pinnulis, lanceolatis; floribus capitatis, toge pedunculatis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 263. n.º 57.

Acacia lycopodioides. Desfont. Catal. Hort. Par. pag. 182.

Ses tiges & ses rameaux sont dépourvus d'épines, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées, composées de trois paires de pinnules, soutenant

chacune environ trente paires de folioles imbriquées, très serrées, légèrement pubescentes, ayant l'aspect des feuilles d'un lycopode ; accompagnées, à la base des pétioles, de stipules molles, mais sensibles à deux petites épines subulées. Les fleurs sont disposées en épis ovales, globuleux, axillaires, longuement pédonculés, souvent gemmés, surtout dans les aisselles des feuilles supérieures.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est pas connu. *(V. f.)*

149. ACACIE en arbre. *Mimosa arborea*. Swartz.

Mimosa (acacia arborea), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus septemjugis*, *propiis septemjugis*, *dimidiatis*, *acutis*; *stipulis globosis*, *pedunculatis*, *axillariis*; *leguminibus arcuatis*, *contortis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1664. n° 38.

Mimosa (arborea), *inermis*, *foliis bipinnatis*; *pinnis dimidiatis*, *acutis*; *caule arceo*. Linn Spec. Plant. vol. 2. pag. 1503. — Swartz, Obsev. pag. 390.

Mimosa arborea, *corrice cinereo*; *stipulis globosis*; *siliquis internis rubentibus*; *seminibus sphericis*, *atrontibus*. Brown, Jam. 171.

Acacia non spinosa, *jamaicensis*, *foliis lato basi in meta formatis bipinnatis*. Pluken. Aimag. pag. 6. tab. 251. fig. 2.

Acacia arborea, *maxima*, *non spinosa*, *pinnis majoribus*; *flore albo*; *siliquis contortis*, *coarctatis*, *ventricosis*, *elegantiissimis*. Sloan, Jam. 177. Hist. 2. pag. 54. tab. 182. fig. 1. 2.

Mimosa filicifolia. Lam. Dict. t. n° 21.

Ses fleurs axillaires, lactées, ses gousses arquées, contournées, tendues aux articulations, distinguent cette espèce de la suivante. (*Voyez* ACACIE à feuilles de fougère.)

150. ACACIE julibrissin. *Mimosa julibrissin*. Scopol.

Mimosa (acacia julibrissin), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus undecimjugis*, *propiis multijugis*, *dimidiatis*, *acutis*; *stipulis saepe globosis*, *terminalibus*, *aggregatis*; *leguminibus planis*, *membranaceis*, *glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1665. n° 39.

Mimosa (julibrissin), *arborescens*, *foliis bipinnatis*; *pinnis cuneiformibus*, *acuminatis*; *floribus omnibus perfectis*. Scopol. Del. Fl. & Faun. Insul. r. pag. 18. tab. 8. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 440.

Mimosa arborea. Lam. Dict. t. n° 13.

Ses gousses sont plates, lancéolées, sinuées à

leurs deux bords, mais point contournées comme celles de l'espèce précédente. (*Voyez* ACACIE en arbre, Dict. n° 13.)

151. ACACIE nenu. *Mimosa nenu*.

Mimosa (acacia nenu), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus subnovemjugis*, *propiis multijugis*, *dimidiatis*, *acutis*; *stipulis saepe globosis*, *terminalibus*, *aggregatis*; *leguminibus linearibus*, *pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1665. n° 40.

Mimosa arborea. Thunb. Flor. jap. pag. 229. — Barks, Koenig. Ic. tab. 19.

Mimosa speciosa. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 336.

Cette espèce diffère de s deux précédentes par ses gousses linéaires, pubescentes, acuminées, longues d'un pouce & demi. Ses feuilles, deux fois ailées, sont composées d'environ neuf paires de pinnules, chargées d'un grand nombre de folioles aiguës, inégalement partagées par la nervure du milieu. Les épis sont en têtes globuleuses, agrégées, terminales, la base des pétioles munie d'une glande.

Cette plante croît au Japon. *(V.)*

152. ACACIE noirâtre. *Mimosa nigricans*. Labill.

Mimosa inermis, *foliis bipinnatis*, *partialibus tri ad octojugis*, *ex mit sub basi glandulosa*; *capitulis foliatis ad teras*. Labill. Nov. Holl. vol. 2. pag. 88. tab. 158.

Cette plante est un arbuste haut de quatre à six pieds, divisé en rameaux cylindriques, légèrement fléchis, un peu pileux, garnis de feuilles deux fois ailées, noirâtres, à deux paires de pinnules, composées de trois à huit paires de folioles sessiles, elliptiques, glabres à leurs deux faces, obtuses à leurs deux extrémités ; le pétiole commun comprimé, muni, vers son sommet, d'une, rarement de deux glandes concaves, un peu orbiculaires, les stipules subulées.

Les fleurs sont ramassées en têtes axillaires, solitaires ou ternées, pédonculées, de moitié plus courtes que les feuilles, accompagnées d'une petite écaille ovale, caduque. Le calice est à cinq découpures ovales-oblongues, un peu émoussées à leur sommet ; la corolle à cinq divisions réfléchies ; les étamines au nombre de cent cinquante, un peu plus longues que la corolle ; l'ovaire glabre, ovale-oblong. Le fruit est une gousse oblongue, comprimée, d'un roux-clair à ses deux bords, à une loge, à deux valves, contenant environ dix semences elliptiques, roussâtres.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, dans la terre Van-Leuwin. *(V. f.)*

153. ACACIE parée. *Mimosa speciosa*. Jacq.

Mimosa (*acacia speciosa*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadri-quinquejugis*, *pro-
priis septem seu undecimjugis*, *subdimidiatis*, *obtusis*,
glabris; *spicis subcapitatis*, *axillaribus*, *aggregatis*.
Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1066. n°. 41.

Mimosa (*speciosa*), *inermis*, *foliis bipinnatis*,
subquadrjugis; *pinnis subovemjugis*; *foliolis oblon-
gis*, *glabris*; *glandula supra costâ basin*. Jacq. Icon.
Rar. vol. 1. tab. 198, & Coll. & vol. 1. pag. 47.
— Ait. Hort. Kew. vol. 5. pag. 440.

Ses rameaux sont aternes, sans épines, garnis de feuilles pétioles, alternes, deux fois ailées, à quatre ou cinq paires de pinnules composées chacune de sept à onze paires de folioles, un peu inégalement partagées par la nervure du milieu, glabres à leurs deux faces, oblongues, obtuses à leur sommet, munies d'une glande un peu au dessus de la base des pétioles partielles. Les fleurs sont disposées en épis pédonculés, un peu globuleux, axillaires, aggrégés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. h

154. ACACIE de Malabar. *Mimosa lebeck*. Linn.

Mimosa (*acacia lebeck*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadri-quinquejugis*, *propriis multijugis*, *oblongis*, *subdimidiatis*, *acutis*; *spicis subglobosis*, *terminalibus*, *aggregatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1066. n°. 42.

Mimosa (*lebeck*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *quadrijugis*; *pinnis ovali-oblongis*; *floribus monadelphis*, *fasciculatis*; *caule arborico*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1503.

Mimosa foliis pinnatis, *foliolis oblongo-ellipticis*, *pétiolis obclavatis*. Hassk. A.C. Upf. 1750. pag. 9, & Linn. pag. 473.

Mimosa foliolis pollicaribus, *quinque vel octo-
jugis*; *rachibus partialibus bijugis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 177.

Mimosa lebeck. Lam. Dict. 1. n°. 14.

Cette espèce se distingue par ses gouffes plates, quelquefois longues d'un pied, très glabres, d'un jaune-clair. (Voyez ACACIE de Malabar.)

155. ACACIE à odeur de sureau. *Mimosa vaga*. Linn.

Mimosa (*acacia vaga*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus trijugis*, *propriis exsertis*, *trijugis*, *infimis geminatis*; *spicis subglobosis*, *pedunculatis*, *geminatis ternis*, *axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1066. n°. 43.

Mimosa (*vaga*), *inermis*, *foliis bipinnatis*; *pinnis exterioribus majoribus*, *incurvatis*, *pubescentibus*. Linn. Hort. Cliffort. 109.

Arbor siliquosa, *brasiliana*, *siliqua tortuosa*, *fruticosa*, *fraxinella foliis*. Bieyn. Centur. 1. tab. 15. ?

Mimosa vaga. Lam. Dict. 1. n°. 19.

Ses fleurs sont disposées en épis presque globuleux, axillaires, pédonculés, réunis ordinairement deux ou trois ensemble. (Voyez ACACIE à odeur de sureau, n°. 19.)

156. ACACIE à gouffes larges. *Mimosa latifolia*. Linn.

Mimosa (*acacia latifolia*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquejugis*, *propriis decemjugis*, *ellipticis*, *obtusis*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *terminalibus*, *bracteatis*; *leguminibus oblongis*, *utrinque acutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1067. n°. 44.

Mimosa (*latifolia*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquejugis*; *ramis flexuosis*, *gemmis globosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504.

Mimosa latifolia. Lam. Dict. 1. n°. 15.

Ses rameaux sont flexueux; les pétioles garnis, entre les pinules inférieures, d'une glande peu sensible. Les fleurs blanches, en tête, axillaires. (Voyez ACACIE à gouffes larges, n°. 15.)

157. ACACIE jupunba. *Mimosa jupunba*.

Mimosa (*acacia jupunba*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadri-quinquejugis*, *propriis suboctojugis*, *ovatis*, *obtusis*, *subpubescentibus*; *floribus subcapitatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1067. n°. 45.

Ses rameaux sont cylindriques, garnis de feuilles deux fois ailées, à quatre ou cinq paires de pinnules, composées de six ou huit paires de folioles longues d'un demi-pouce, ovales, obtuses, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, blanchâtres & pubescentes en dessous. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, presque en tête, réunies en ombelle.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. h (Descript. ex Willd.)

158. ACACIE velue. *Mimosa villosa*. Swartz.

Mimosa (*acacia villosa*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quinque seu sexjugis*, *propriis subduodecimjugis*, *ovatis*, *villosis*; *spicis globosis*, *paniculatis*, *terminalibus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1067. n°. 46.

Mimosa (*villosa*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *subquinquejugis*; *pinnis ovatis*, *pétiolis villosis*, *racemis terminalibus*, *floribus globosis*, *caule fruticoso*. Swart. Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 982.

Abrusilleau rameux, dépourvu d'épines, haut

d'environ six pieds ; les rameaux velus , cylindriques ; les feuilles deux fois ailées , à cinq ou six paires de pinnules , composées d'environ douze paires de folioles ovales , velues , perries , entières ; les inférieures plus petites ; les pétioles velus , cylindriques , couleur de rouille , longs de deux pouces ; une petite écaille ovale , au lieu de glande , au dessus de la base des pinnules.

Les fleurs sont disposées en grappes droites , terminales , composées d'épis pedoncules , presque verrucilés , ovales , chargés de perries fines blanches , fasciculées , pédicellées. Leur calice est fort petit , à cinq dents ; la corolle trois fois plus grande que le calice ; les filamens nombreux , capillaires ; le style simple ; une gousse courte , plane , hérissée de poils.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Jamaïque , sur les hauteurs. *(Descript. ex Swart.)*

159. ACACIE pubescente. *Mimosa pubescens*. Vent.

Mimosa inermis , subhirsuta , foliis bipinnatis ; pinnis foliolisque decem seu duodecimjugis ; petiolo glanduloso ; floribus capitatis , racemosis. Vent. Hort. Malm. pag. 21. tab. 21.

Mimosa pubigera. Catal. Hort. Paris.

Arbrisseau fort élégant par la délicatesse de son feuillage & par les fleurs dont il est chargé à la fin de l'hiver , dans les terres d'orangerie. Ses tiges sont hautes de quatre à cinq pieds ; les rameaux pubescens , dépourvus d'épines , garnis de feuilles longues de trois pouces , deux fois ailées , composées de dix à douze paires de folioles , souvent beaucoup plus , très-taptruchées , fort petites , longues d'une ligne , larges à peine d'une demi-ligne , légèrement pubescentes ; le pétiole commun privé de glandes. Les fleurs sont disposées en épis nombreux , petits , globuleux , de couleur jaune ; les intérieurs axillaires ; les supérieurs nus , formant par leur ensemble une sorte de panicule terminale.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. *(V. v.)*

160. ACACIE à grappes en tête. *Mimosa botrycephala*. Vent.

Mimosa (acacia discolor) , inermis , foliis bipinnatis , partialibus quinquejugis , propriis subdecimjugis , subius discoloribus ; spiciis globosis , pedunculatis ; racemosis terminalibus & axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1063. n°. 47.

Mimosa (bothrycephala) , petiolo basi glanduloso ; pinnis quinquejugis ; foliis novem seu undecimjugis ; floribus capitatis , capitulis racemosis.

Vent. Hort. Cell. pag. 1. tab. 1.

Mimosa (discolor) , inermis , foliis bipinnatis , sexjugis , bicoloribus ; pinnis acutis , aequalibus ; spiciis axillaribus ; capitulis globosis ; foliis latissimis , planis. Andrew. Repol. Botan. pag. 235. tab. 235. *Mediocris*.

Ses tiges sont cylindriques , rameuses , de couleur cendrée ; les rameaux pubescens & légèrement anguleux à leur partie supérieure , garnis de feuilles deux fois ailées , à cinq paires de pinnules , composées de neuf à treize paires de folioles ovales-oblongues , aiguës , légèrement ciliées à leurs bords , tronquées à un des côtés de leur base , un peu charnues , de couleur purpurine dans leur contour , glabres à leurs deux faces ; le pétiole commun légèrement anguleux , un peu pileux , muni d'une glande concave , accompagné de stipules ovales , caduques , pubescentes.

Les fleurs sont très-odorantes , réunies en têtes sphériques , d'un jaune de soufre , pédicellées , formant , sur un pedoncule commun , des grappes axillaires , simples , presque droites , plus longues que les feuilles ; plusieurs bractées ovales , ciliées , membraneuses , dont cinq sont réunies sous les têtes de fleurs en forme d'involucre. Le calice est très-court , à cinq divisions ; la corolle jaune , à cinq pétales ; les étamines nombreuses ; les filamens monadelphes à leur base. Les gousses sont très-plates , linéaires , oblongues , obtuses à leurs deux extrémités , glabres , de couleur brune , longues de deux pouces & plus , larges de six lignes , contenant plusieurs semences petites , ovales , très-comprimées.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande ; elle est cultivée , depuis plusieurs années , dans quelques jardins de l'Europe. *(V. f.)*

161. ACACIE de Caracas. *Mimosa caracasana*. Jacq.

Mimosa (acacia caracasana) , inermis , foliis bipinnatis , partialibus quinquejugis , propriis multijugis , linearibus , acutisculis ; spiciis globosis , axillaribus , summis terminalibusque ; calicibus margine glandulosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1068. n°. 48.

Mimosa (caracasana) , inermis , foliis bipinnatis , partialibus subquinquejugis , propriis multijugis ; caule glabro , calicibus ad oras glandulosis. Jacq. Icon. Kar. vol. 3. tab. 631. & Collect. v. 4. pag. 142.

Cette espèce est remarquable par ses calices denticulés & glanduleux à leurs bords. Ses tiges sont glabres ; les rameaux cylindriques ; les feuilles alternes , deux fois ailées , à cinq paires de pinnules , composées de dix-sept à vingt-deux paires

de folioles linéaires, un peu obtuses, ciliées à leurs bords, couvertes en dessous de poils couchés; les pétioles pubescens.

Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, réunis au nombre de trois ou quatre, longuement pédonculés. Les étamines sont très-longues, purpurines.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (*Descript. ex Willd.*)

161. ACACIE de Porto-Ricco. *Mimosa portoricensis*, Jacq.

Mimosa (acacia portoricensis), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis, propriis multijugis, linearibus, acutis; spicis globosis, axillaribus, subternis; calicibus margine ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1069. n°. 50.

Mimosa (portoricensis), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus subquinquejugis, propriis multijugis; caule glabro, calicibus ad apicem ciliatis. Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 633, & Collect. vol. 4. pag. 143.

Cette plante a de très-grands rapports avec la précédente; elle en diffère par les rameaux cannelés, par ses folioles un peu plus grandes, beaucoup plus pubescentes & même presque tomenteuses en dessous, blanchâtres & pubescentes à leurs deux faces dans leur jeunesse. Les calices sont ciliés à leurs bords; les filaments blancs & non de couleur putputine.

Cette plante croît à Porto-Ricco, aux lieux montagneux. *h* (*V. f.*)

163. ACACIE quadrangulaire. *Mimosa quadrangularis*.

Mimosa (acacia tetragona), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis, propriis multijugis, linearibus, acutis; spicis globosis, axillaribus, subternis; ramis tetragonis. Willd. Spec. Plant. v. 4. pag. 1069. n°. 50.

Cette acacie diffère de l'acacie de Porto-Ricco par ses rameaux quadrangulaires & par les folioles parfaitement glabres à leurs deux faces. Ses tiges sont droites, hautes d'environ huit pieds, glabres, rameuses. Les feuilles sont deux fois ailées, à cinq ou six paires de pinnules, composées d'environ seize à vingt-neuf paires de folioles linéaires, aiguës; les extérieures plus grandes.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, globuleux, pédonculés, ordinairement réunis trois ensemble. Les filaments sont blancs & très-longues; les gouffes longues de quatre pouces, presque linéaires, obtuses, rétrécies à leur base, épaisses à leurs bords.

Cette plante croît en Amérique, dans la province de Caracas, sur les bords sablonneux du fleuve Guairito. *h* (*Descript. ex Willd.*)

164. ACACIE à rameaux lâches. *Mimosa laxa*.

Mimosa (acacia laxa), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis multijugis, subius glaucis; spicis globosis, pedunculatis, axillaribus; ramis teretibus, divaricatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1069. n°. 51.

Arbuste d'environ quinze pieds de haut, divisé en rameaux alternes, cylindriques, diffus, écartés, de couleur cendrée, garnis de feuilles deux fois ailées, à quatre paires de pinnules, chacune d'elles composées de douze à vingt-quatre paires de folioles linéaires, oblongues, un peu obtuses, inégalement partagées par la principale nervure, rétrécies au côté extérieur de leur base, arrondies à l'intérieur, d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous, glabres à leurs deux faces; les pétioles couverts de poils couleur de rouille. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, axillaires; les filaments de couleur putputine. Les fruits consistent en une gouffe comprimée, longue de quatre pouces, rétrécie à sa base.

Cette plante croît en Amérique, aux environs de Caracas. *h* (*Descript. ex Willd.*)

165. ACACIE diffuse. *Mimosa divaricata*, Jacq.

Mimosa (acacia divaricata), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus sex vel novemjugis, propriis multijugis, glabris; stipulis semiovatis, falcatis; glandula petiolaris; spicis globosis, pedunculatis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1070. n°. 52.

Mimosa (divaricata), *inermis*, foliis bipinnatis, partialibus sex vel novemjugis, propriis quadranguljugis; stipulis dimidiato triangularibus; spicis globosis; floribus monadelphis, polyandris. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. pag. 76. tab. 395.

Ses tiges se divisent en rameaux diffus, cylindriques, ponctués, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées, composées de six à neuf paires de pinnules, chacune d'elles supportant environ quarante paires de folioles linéaires, obtuses, glabres à leurs deux faces; une glande convexe, sessile, placée sous la paire inférieure de pinnule, sur le pétiole commun; de grandes stipules à demi-ovales, presque en faucille, assez semblables à celles de l'acacia larifluga. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, pédonculés, souvent ternés, quelquefois presque en grappes. Ces fleurs ont un grand nombre de filaments continens à leur partie inférieure.

Cette plante croît dans les Indes occidentales. *h*
166. ACACIE

166. ACACIE à panaches. *Mimosa lophantha*. Vent.

Mimosa (*acacia lophantha*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *parialibus novem seu duodecimjugis*, *propreis subviginisjugis*, *lanceolatis*, *aveniis*; *glandula petiolaris*, & *inter binas terminales paritulum*; *spicis oblongis*, *pedunculatis*, *axillaribus*, *geminis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1070. n°. 53.

Mimosa (*dislacha & lophantha*), *petiolis basi interque duas supremas pinnulas glandulosis*; *racemis geminis*, *axillaribus*; *leguminibus articulatis*, *planis*. Vent. Hort. Celf. pag. 20. tab. 20.

Ses tiges sont droites, cylindriques; ses rameaux cannelés, presque lisses, dilatés & comme articulés à leur base, garnis de feuilles deux fois ailées, à sept, neuf, quelquefois douze paires de pinnules, composées de quinze, dix-huit & même vingt-quatre paires de folioles sessiles, oblongues, lancéolées, aiguës, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous; tronquées à un des côtés de leur base, partagées inégalement par la nervure du milieu, glabres à l'un & l'autre faces. Les pétioles pubescents; deux stipules droites, lancéolées, aiguës; une glande oblongue & concave à la base du pétiole commun & entre chacune des deux dernières paires de pinnules.

Les fleurs sont pédonculées, disposées en grappes axillaires, géminées, très-touffues, longues d'environ un pouce & demi, pédonculées; chaque fleur un peu odorante, munie d'une bractée ovale, aiguë, pubescente; le calice à peine pileux, à cinq dents; cinq pétales droits, aigus, un peu pileux en dehors; les étamines nombreuses, réunies à leur base. Les gouffes sont planes, oblongues, finées, rétrécies en pédicule à leur base, obtuses, mucronées à leur sommet, renflées sur leurs bords, à une seule loge, à deux valves, d'un brun marron, contenant environ cinq semences arrondies, légèrement comprimées.

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande, où elle a été découverte par M. Lahaye. (V. v.)

167. ACACIE des Illinois. *Mimosa illinoensis*. Mich.

Mimosa (*acacia brachyloba*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *parialibus oblongis*, *propreis multijugis*, *glandula inter par infimum paritulum*; *spicis globosis*, *foliariis*, *pedunculatis*, *axillaribus*; *leguminibus lanceolatis*, *rebtis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1071. n°. 54.

Mimosa (*illinoensis*), *inermis*, *pumilais*; *caule herbaceo*, *gracili*, *divaricato*; *foliis bipinnatis*; *pinnis quinquepariis*; *capitulis foliariis*, *breviter* Botanique. Supplément. Tome 1.

pedunculatis, *leguminibus paucioribus*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 254.

Mimosa brachyloba. Mühlent. in litt.

Ses tiges sont droites, herbacées, glabres, cannelées, peu clavées, grêles, éraillées, garnies de feuilles deux fois ailées, à cinq ou huit paires de pinnules, composées de seize à vingt-quatre paires de folioles linéaires, aiguës, un peu ciliées à leur base; le pétiole commun canaliculé en dessus & un peu pileux; les autres glabres, portant une glande sessile, comprimée, placée entre la paire de pinnules inférieures. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, de la grosseur d'un pois, solitaires, médiocrement pédonculés. Les gouffes sont rares, droites, lancéolées, longues d'environ six lignes.

Cette plante croît dans les prés, au pays des Illinois. 2.

168. ACACIE glanduleuse. *Mimosa glandulosa*. Mich.

Mimosa (*acacia glandulosa*), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *parialibus duodecimjugis*, *propreis multijugis*; *glandula inter omnia paria paritulum*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *foliariis*, *axillaribus*; *leguminibus foliatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1071. n°. 55.

Mimosa (*glandulosa*), *inermis*, *caule herbaceo*; *foliis multijugis bipinnatis*; *pedunculis foliariis*, *monocephalis*; *leguminibus congestis*, *planis*, *arcuato-falcatis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 254.

Mimosa (*glandulosa*), *petiolis inter pinnarum paria glandulosis*; *floribus capitatis*, *pentandris*; *leguminibus falcatis*. Vent. Choix de Plant. p. 27. tab. 27.

Cette espèce, remarquable par la finesse & le nombre de ses folioles, ainsi que par ses gouffes courtes, rapprochées en tête, courbées en faucille, a des tiges herbacées, glabres, cannelées, anguleuses, hautes d'environ quatre pieds, peu rameuses, garnies de feuilles deux fois ailées, à douze ou vingt paires de pinnules, composées de seize à vingt paires & plus de folioles linéaires, aiguës, planes, purpurines sur l'un des bords, tronquées à un des côtés de leur base, inégalement partagées par la nervure du milieu, munies de stipules peu apparentes; les pétioles glabres, pourvus entre chaque paire de pinnules d'une glande sessile, en goder, d'un pourpre vif.

Les fleurs sont très-petites, réunies en une tête ovale, arrondie, axillaire, solitaire, pédonculée, munie de bractées. Le calice est glabre, tubulé, à cinq dents; cinq pétales verdâtres, concaves, ovales, aigus; cinq étamines saillantes, d'un pourpre-clair; les étamines mobiles, ovales, à

quatre filons, s'ouvrant latéralement. Les gouffes sont nombreuses, rapprochées en tête, planes, longues d'un pouce, grâbles, arquées, pointues à leur sommet, d'un brun-foncé, contenant de trois à six semences glabres, ovales, comprimées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les bords du fleuve Tennesse. *W. (V. f.)*

169. ACACIE décurrense. *Mimosa decurrens*. Donn.

Mimosa (acacia decurrens), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus undecimjugis*, *propiis multijugis*; *petiolis partialibus marginatis*; *glandulâ inter omnia partialia*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1072. n°. 56.

Mimosa decurrens. Donn. Catal. 14.

Ses rameaux sont glabres, cannelés, anguleux; ses feuilles deux fois ailées, à neuf ou onze paires de pinnules, composées de vingt-cinq à trente paires de folioles glabres, linéaires, obtuses; le pétiole commun glabre, à demi cylindrique; les partiels glabres, bordés par une membrane foliacée; une glande oblongue, sessile entre chaque paire de pinnules. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, globuleux, solitaires, pédonculés, quelquefois trois têtes réunies sur un pédoncule commun.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. *W. (Descript. ex Willd.)*

170. ACACIE à feuilles de pétrole. *Mimosa ptericina*.

Mimosa (acacia filicina), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sexjugis*, *propiis multijugis*; *petiolo communi hiruto*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *terminalibus*, *paniculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1072. n°. 57.

Mimosa (filicioides), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sexjugis*, *propiis numerosissimis*, *minimis*, *ciliatis*, *eglandulosis*. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 55. tab. 78.

Ses tiges se divisent en rameaux anguleux, velus, garnis de feuilles doublement ailées, à six ou sept paires de pinnules, composées d'environ cinquante paires de folioles linéaires, un peu obtuses, ciliées à leurs bords; les pétioles communs hérissés de poils étalés. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, terminaux, paniculés; les gouffes sont linéaires, planes, longues d'un pouce & demi ou deux pouces; pileuses, plus épaisses à leurs bords.

Cette plante croît au Mexique. *W. (Descript. ex Willd.)*

171. ACACIE à feuilles menues. *Mimosa parvisolia*.

Mimosa (acacia microphylla), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus viginti-quinquajugis*, *propiis multijugis*, *linearibus*, *tenuissimis*; *glandulâ petiolarî*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *geminatis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1073. n°. 58.

C'est un arbre haut de trente pieds, dont les rameaux sont roides, cylindriques; les plus jeunes pubescens, garnis de feuilles deux fois ailées, à vingt ou vingt-cinq paires de pinnules, composées de folioles très-caduques, au nombre de cinquante ou soixante paires, très-petites, linéaires, aiguës, ciliées à leurs bords; les pétioles pubescens; une grosse glande urcéolée à la base du pétiole commun. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, axillaires, geminés, au moins de la grosseur d'un pois. Les gouffes sont linéaires, longues de neuf pouces, revêtues d'une écorce brune en dehors, rougeâtre en dedans; luisantes, contenant des semences planes, noisettes, luisantes, orbiculaires.

Cette plante croît en Amérique, dans la province de Caracas, sur les collines pierreuses. *W. (Descript. ex Willd.)*

172. ACACIE voyageuse. *Mimosa peregrina*. Linn.

Mimosa (acacia peregrina), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sedecimjugis*, *propiis quadragintajugis*; *glandulâ petiolarî*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *axillaribus*, *ternis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1073. n°. 59.

Mimosa (peregrina), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sedecimjugis*, *propiis quadragintajugis*; *glandulâ basos petiolarî*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504.

Mimosa inermis, *foliis duplicato pinnatis*; *glandulâ ad basin petiolarum*; *silicis ovato-oblongis*, *planis*. Hort. Cliff. 209.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, parsemés de points blancs, garnis de feuilles deux fois ailées, à seize pinnules, composées de quarante à cinquante paires de folioles linéaires, lanecolées, légèrement ciliées à leur contour; les pétioles pubescens; une glande comprimée, sessile, située au dessus de la base du pétiole commun. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, souvent ternés, globuleux, pédonculés, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *W.*

173. ACACIE paniculée. *Mimosa paniculata*.

Mimosa (acacia paniculata), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus virginijugis*, *propriis quadrangulatis*; *glandula petiolaris*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *paniculatis*; *panicula axillaribus*. Willden. Spec. Flint. vol. 4. pag. 1074. n°. 60.

Cette espèce, si rapprochée du *mimosa peregrina* par la longueur & la forme de ses folioles, en diffère essentiellement par la disposition de ses fleurs. Ses rameaux sont cylindriques, striés, pubescens; ses feuilles deux fois ailées, à vingt ou vingt-cinq paires de pinnules, composées de quarante à cinquante paires de folioles linéaires, ciliées; les pétioles pubescens; le pétiole commun long de trois à quatre pouces; les partiels à peine longs d'un demi-pouce; une glande plane, comprimée, sessile, allongée, placée entre la paire inférieure des pinnules. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, de la grosseur d'un grain de poivre, pédonculés, réunis en une panicule terminale, axillaire, longue de deux pouces & plus.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Para. (Descript. ex Willd.)

174. ACACIE à grandes fleurs. *Mimosa grandiflora*. Lhérit.

Mimosa (acacia grandiflora), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus septemdecimjugis*, *propriis quadrangulatis*; *spicis subscapitatis*, *pedunculatis*, *racemosis*, *terminalibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1074. n°. 61.

Mimosa (grandiflora), *inermis*, *foliis abrupte pinnatis*, *multijugis*; *pinnulis multijugis*; *foliolis distinctissimis*; *racemo composito*, *terminali*. Lhérit. Serot. Angl. 30. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 441.

Acacia non spinosa *India orientalis*, *foliis perexiguis*; *virgulis lanugine ferrugineâ villosis*. Pluken. Amalth. pag. 3.

On distingue aisément cette espèce à la grandeur de ses corolles, longues de plus d'un demi-pouce. Ses rameaux sont cylindriques, striés, pubescens, garnis de feuilles deux fois ailées, à dix-sept ou dix-huit paires de pinnules, composées de trente ou quarante paires de folioles linéaires, un peu obtuses, petites, ciliées à leur contour. Les pétioles sont pubescens, dépourvus de glandes; les fleurs disposées en une grappe rameuse, terminale. Les ramifications supportent à leur sommet quatre à cinq fleurs sessiles, presque en tête. Les étamines sont de couleur purpurine, longues d'environ un pouce & demi.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (

175. ACACIE amère. *Mimosa amara*. Roxb.

Mimosa (acacia amara), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus decemjugis*, *propriis multijugis*;

spicis globosis; *pedunculis axillaribus*, *aggregatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1074. n°. 62.

Mimosa amara. Roxb. Coromand. 2. pag. 13. tab. 122.

Ses rameaux sont cylindriques, pubescens, de couleur cendrée; les feuilles deux fois ailées, composées de neuf à dix paires de pinnules, & celles-ci de vingt à vingt-huit paires de folioles linéaires, pubescens, un peu obtuses; les pétioles également pubescens, dépourvus de glandes. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, de la grosseur d'une ciste, réunis au nombre de deux, quatre, cinq ou six dans l'aisselle des feuilles. Les gouffes sont planes, linéaires, aiguës, longues d'environ un demi-pied, tenant fermement les semences.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Descript. ex Willd.)

176. ACACIE glauque. *Mimosa glauca*. Linn.

Mimosa (acacia glauca), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quinque seu sexjugis*, *propriis octodecimjugis*, *disjunctis*; *spicis globosis*, *peanunculatis*, *geminis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1075. n°. 63.

Mimosa (glauca), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus sexjugis*; *pinnis plurimis*, *glandula inter infima*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1504.

Mimosa arborescens, *non spinosa*, *pinnis acacia latioribus*, *inferne glaucis*; *floribus albo*. Breyn. Cent. 1. pag. 73.

Acacia non spinosa, *floribus albo*; *foliorum pinnis latiusculis*, *glabris*; *siliquis longis*, *planis*. Miller, Dict. tab. 4. — Trew. Ehret. tab. 36.

Acacia buxifolia *rotundioribus*; *floribus albis*; *siliqua latâ*, *compressâ*. Catesb. Carol. vol. 2. pag. 42. tab. 42.

Mimosa glauca. Lam. Dict. n°. 22.

Cette espèce se distingue par ses fleurs blanches, à dix étamines, sans corolle. Ses épis sont gros & globuleux; ses gouffes aplaties, tortueuses. (Voyez ACACIE glauque, n°. 22.)

177. ACACIE à deux têtes. *Mimosa biceps*.

Mimosa (acacia biceps), *inermis*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadri seu quinquejugis*, *propriis sedecimjugis*, *lancoatis*, *disjunctis*; *glandula petiolaris*; *spicis globosis*, *axillaribus*, *geminis*, *pedunculatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1075. n°. 64.

Cette plante se rapproche beaucoup de la précédente; elle s'en distingue principalement par une glande aréolée, placée sur le pétiole commun entre la paire inférieure des pinnules. Ses

rameaux sont cylindriques & pubescens; les feuilles deux fois ailées, composées de quatre ou cinq paires de pinnules, chacune garnie de douze à seize paires de folioles distantes, lancéolées, aiguës, ciliées à leurs bords; les pétioles pubescens. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, geminés, de la grosseur d'une cerise; axillaires, pédonculées: il leur succède des gouffes de quatre à cinq pouces de long, linéaires, épaissies à leurs bords, renfermant plusieurs semences.

Cette plante croît au Brésil, dans la province de Pará. *h* (*Descript. ex Willd.*)

178. ACACIE feuillue. *Mimosa frondosa*. Klein.

Mimosa (acacia frondosa), foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis quatuordecimjugis, lanceolatis, distantibus; glandula petiolaris; spicis globosis, axillaribus, foliariis, pedunculatis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1076. n°. 65.

Mimosa frondosa. Klein. in litt.

Peu différente de la précédente, les épis sont solitaires & non geminés; les folioles moins nombreuses; les rameaux cylindriques, pubescens; les feuilles deux fois ailées, à six paires de pinnules, composées de quatorze paires de folioles distantes, lancéolées, aiguës, légèrement pubescentes en dessous, ciliées à leur contour; les pétioles pubescens; une glande urcéolée sur le pétiole commun, entre la paire inférieure des folioles. Les épis sont axillaires, globuleux, de la grosseur d'une cerise; les gouffes linéaires, longues de trois à quatre pouces, planes, polyspermes, un peu sinuées à leur bord extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

**** Feuilles deux fois ailées; tiges munies d'épines ou d'aiguillons; épis alongés.

179. ACACIE à chatons. *Mimosa juliflora*. Sw.

Mimosa (acacia juliflora), spinis stipularibus, geminis; foliis bipinnatis; partialibus bigugis, propriis viginti-gugis; spicis axillaribus, geminis ternis, cylindricis, pendulis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1076. n°. 66.

Mimosa (piliflora), spinis stipularibus, geminis; foliis bigugis, glandula interstinctis; spicis, pendulis, subcylindricis; leguminibus compressis. Swartz, Prodr. pag. 85, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 986.

Mimosa diffusa, spica oblonga; siliculis longioribus, compressis. Brown, Jam. 151.

Arbre d'environ trente pieds, & qui n'est quelquefois qu'un simple arbrisseau de cinq à six pieds de haut, dont l'écorce est ridée, de couleur cendrée; les rameaux très-longs, glabres, verdâtres,

armés d'épines souvent geminées, fortes, redressées, longues de quatre à cinq lignes; les feuilles deux fois ailées, à deux paires de pinnules, composées d'environ vingt paires de folioles glabres, oblongues, étroites, obtuses; les pétioles glabres, cylindriques, un peu anguleux; une glande comprimée, un peu arrondie, solitaire à la base des pinnules.

Les fleurs sont disposées en épis presque cylindriques, longs de deux ou trois pouces, réunis deux ou trois dans les aisselles des feuilles; les pédoncules cylindriques, longs d'un demi-pouce, soutenant des fleurs nombreuses, sessiles, jaunes, rapprochées. Le calice est fort petit, à cinq dents; la corolle une fois plus longue que le calice, à cinq découpures, velue en dedans; huit à dix filaments libres, plus longs que la corolle; l'ovaire oblong & velu; le stigmate tubulé. Les gouffes sont pédicellées, longues de quatre à cinq pouces, glabres, comprimées, de quatre à cinq pouces, contenant plusieurs semences brunes, oblongues, séparées par des cloisons charnues.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Jamaïque, dans les campagnes arides. *h* (*Descript. ex Swartz.*) Les feuilles & même les gouffes, malgré leur saveur douce, passent pour être très-nuisibles & même mortelles aux bestiaux lorsqu'on ne les y a pas accoutumés peu à peu.

180. ACACIE des voleurs. *Mimosa latronum*. Linn. f.

Mimosa (acacia latronum), spinis stipularibus, geminis, connatis; foliis bipinnatis, partialibus quadrigugis, propriis multijugis; spicis subgeminatis, elongatis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1077. n°. 67.

Mimosa (latronum), spicis stipularibus, connatis, divaricatis, teretibus, subulatis; foliis bipinnatis; foliolis quadrigugis; spicis elongatis, pedunculatis, axillaribus, subgeminatis. Linn. f. Suppl. pag. 458.

Mimosa latronum. Lam. Dict. 1. n°. 41.

Les épines dures, très-longues, nombreuses, dont cet arbre se couvre, le rendent très-proprie à faire des haies de défense pour écarter des possessions les déprédateurs & les animaux. (*Voyez ACACIE des voleurs*, n°. 41.)

181. ACACIE du Sénégal. *Mimosa senegal*. Linn.

Mimosa (acacia senegal), spinis stipularibus ternis, intermedia reflexa; foliis bipinnatis, partialibus quinque seu sexjugis, propriis multijugis, spicis axillaribus, cylindricis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1077. n°. 68.

Mimosa (senegal), spinis ternis, intermedia

reflexa; foliis bipinnatis, floribus spicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1506. — Blackw. tab. 345.

Acacia. C. Bauh. Pin. 392. — Alp. Egypt. tab. 15. — Forskh. Egypt. pag. 176. n°. 81.

Mimosa senegalensis. Lam. Dict. 1. n°. 45.

Cet arbre, qui croit au Sénégal, se trouve aussi en Égypte, où Prosper Alpin & Forskhall l'avoient autrefois observé. J'en ai vu des échantillons rapportés du même pays par M. Delille. (Voyez ACACIE du Sénégal, Dict. n°. 45.)

182. ACACIE asak. *Mimosa asak*. Vahl.

Mimosa (acacia asak), spinis stipularibus, ternis, retilis; foliis bipinnatis, partialibus trijugis, propriis quinquejugis; glandulâ inter par infimum partialium. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1077. n°. 69.

Mimosa asak. Vahl, Symbol. 2. pag. 104. — Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 176.

On ne connoît ni les fleurs ni les fruits de cet arbrisseau. Ses tiges sont armées de trois, quelquefois deux épines droites, très ouvertes; les feuilles alternes, deux fois ailées, composées de trois paires de pinnules, & celles-ci de cinq paires de folioles linéaires, obtuses, longues de trois lignes; une glande située entre la dernière paire de pinnules.

Cette plante croit dans l'Arabie-Heureuse. \mathfrak{H}

183. ACACIE cafre. *Mimosa caffra*. Thunb.

Mimosa (acacia caffra), aculeis geminis, stipularibus, incurvis; foliis bipinnatis, partialibus duodecimjugis, propriis multijugis; glandulâ petiolarî; spici cylindricis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1078. n°. 70.

Mimosa (caffra), aculeis binis, oppositis; foliis bipinnatis; pinnulis lanceolatis, glabris; fideis elongatis. Thunb. Prodr. pag. 92.

Ses rameaux sont cylindriques, striés; ses feuilles deux fois ailées, chacune d'elles contenant vingt ou trente paires de folioles glabres, linéaires, obtuses; les pétioles presque glabres; une glande comprimée, située un peu au dessus de la base du pétiole commun. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, pédonculés, cylindriques, longs d'environ deux pouces; ils sont luisants des gouffes planes, linéaires-lancéolées, longues de deux pouces.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. \mathfrak{H}

184. ACACIE étoilée. *Mimosa stellata*. Vahl.

Mimosa (acacia stellata), spiciis geminis, stipularibus; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis duodecimjugis; petiolis subius aculeis ternis,

binis, recurvis, ad singula paria; floribus racemosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1078. n°. 71.

Mimosa (stellata), spinis stipularibus; foliis bipinnatis; petiolis subius aculeis recurvis; floribus racemosis. Vahl, Symbol. vol. 1. pag. 81.

Mimosa (stellata), foliis geminis, pinnatis, novemjugis; spinis stellatis, ternis, duabus apice recurvis. Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 177. n°. 87.

Ses rameaux sont alternes, armés, à la base des feuilles, de deux épines stipulaires, recourbées; les feuilles périodées, deux fois ailées, composées de dix paires de pinnules. Chaque pinnule supporte treize paires de folioles; entre les épines, les pétioles sont munis en dessous, à chaque paire de pinnules, de trois aiguillons, dont deux recourbés, ouverts en étoile. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires.

Cette plante croit dans l'Arabie-Heureuse, sur la montagne de Kurma. \mathfrak{H}

185. ACACIE chundra. *Mimosa chundra*. Roxb.

Mimosa (acacia chundra), aculeis stipularibus, geminis, uncinatis; foliis bipinnatis, partialibus novem seu duodecimjugis, propriis multijugis; glandulâ petiolarî, & inter tria terminalium exteriorum; spici cylindricis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1078. n°. 72.

Mimosa chundra. Roxb.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, armés d'aiguillons stipulaires, geminés, crochus. Les feuilles sont deux fois ailées, à neuf ou treize paires de pinnules, composées de vingt-neuf ou trente-trois paires de folioles glabres, linéaires, obtuses; les pétioles glabres; une glande comprimée, située au dessus de la base du pétiole commun, & entre les trois paires terminales des pinnules. Les fleurs sont disposées en épis droits, cylindriques, geminés, axillaires, longs d'un pouce & demi.

Cette plante croit dans les Indes orientales. \mathfrak{H} (Descript. ex Willd.)

186. ACACIE du cachou. *Mimosa catechu*. Linn. f.

Mimosa (acacia catechu), aculeis geminis, stipularibus, uncinatis; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis multijugis, pubescentibus; glandulâ petiolarî, & inter duo terminalia partialium; spici cylindricis, geminis ternisve, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1079. n°. 73.

Mimosa (catechu), spinis stipularibus; foliis bipinnatis, multijugis; glandulâ partialium singulis; spiciis axillaribus geminis seu ternis, pedunculatis. Linn. f. Suppl. pag. 439. — Roxb. Coromand. 2. pag. 40. tab. 155.

Catechu. Kerr. Medical. Observ. 5. pag. 151. tab. 4.

Mimosa catechu. Lam. Dict. t. n°. 45.

Ses pétioles sont légèrement pubescens, munis, au dessus de leur base & entre les deux dernières paires terminales de pinnules, d'une glande comprimée. Les gouffes contiennent environ cinq à six semences. (Voyez ACACIE cachou, n°. 45.)

187. ACACIE très-épineuse. *Mimosa spinosissima*.

Mimosa (acacia polyacantha), *aculeis geminis, stipularibus, dilatatis; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis multijugis, ciliatis; glandula in apice & basi petioli communis, subhis aculeatis; spicis cylindricis, geminis, axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1079. n°. 74.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, munis de deux aiguillons ovales, comprimés, stipulaires, garnis de feuilles deux fois ailées, composées de neuf à dix paires de pinnules, formant chacune trente à quarante paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leurs bords. Le pétiole commun est armé en dessous d'aiguillons recourbés, foliaires entre chaque paire de pinnules; les pétioles partiels pubescens, privés d'aiguillons; une glande comprimée au dessus de la base & au sommet du pétiole commun. Les fleurs sont disposées en épis axillaires & cylindriques, pédonculés, longs de trois à quatre pouces.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Description ex Willd.)

188. ACACIE porte-corne. *Mimosa cornigera*. Linn.

Mimosa (acacia cornigera), *spinis stipularibus, connatis, compressis; foliis bipinnatis, partialibus sexjugis, propriis vigintijugis, glabris; glandula petiolaris; spicis axillaribus, cylindricis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1080. n°. 75.

Mimosa (cornigera), *spinis stipularibus, geminis, connatis; foliis bipinnatis*. Linn. Hort. Cliff. pag. 208.

Mimosa cornigera. Lam. Dict. 1. n°. 37.

Cette espèce est remarquable par deux longues épines cornées, épaisses, adhérentes par leur base, ressemblant à deux cornes de bœuf. (Voyez ACACIE porte-corne, n°. 37.)

**** Feuilles deux fois ailées; rameaux armés d'épines ou d'aiguillons; épis globuleux.

A. Aiguillons opposés.

189. ACACIE à grosses épines. *Mimosa macrocartha*.

Mimosa (acacia macrocartha), *spinis stipularibus, geminis, lanceolatis, compressis, foliis bipinnatis; foliis bipinnatis, partialibus duodecimjugis, propriis multijugis; glandula in apice & basi petioli communis; spicis globosis, pedunculatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1080. n°. 76.

Acacia macrocartha. Humb. & Bonpl.

Les rameaux sont striés, médiocrement cylindriques; les feuilles deux fois ailées, composées de douze à treize paires de pinnules, formant environ trente paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leur contour; les pétioles pubescens, munis, au dessus de leur base & vers leur sommet, d'une glande comprimée. Les épines sont stipulaires, presque de la longueur des feuilles, piquantes, comprimées, lancéolées, acuminées, ouvertes en angle droit, longues de deux pouces & plus. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, géminées, longuement pédonculées, de la grosseur d'un grain de poivre, formant presque une grappe à l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (H)

190. ACACIE à épines concaves. *Mimosa cochliacantha*.

Mimosa (acacia cochliacantha), *spinis stipularibus, geminis, connatis, ovato-lanceolatis, concavis; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis vigintijugis; glandula in apice & basi petioli communis; spicis globosis, pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1081. n°. 77.

Acacia cochliacantha. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, striés, légèrement pubescens, armés d'épines géminées, stipulaires, adhérentes par leur base, blanches, ovales, lancéolées, acuminées, longues d'un pouce, convexes d'un côté, concaves de l'autre, en forme de coquille. Les feuilles sont deux fois ailées, à dix ou treize paires de pinnules, composées chacune de vingt ou vingt-trois paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leurs bords; les pétioles pubescens, supportant, à leur sommet & entre la paire inférieure des pinnules, une glande comprimée. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, de la grosseur d'un grain de poivre, formant presque une grappe à l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Description ex Willd.)

191. ACACIE à épines d'ivoire. *Mimosa eburnea*. Linn. f.

Mimosa (acacia eburnea), *spinis stipularibus, geminis, connatis; foliis bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis sexjugis; spicis globosis, axillaribus*,

pedunculatis, aggregatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1081. n°. 78.

Mimosa (eburnea), *spinis stipularibus, connatis, divaricatis, teretibus, subulatis, foliis bipinnatis; foliolis sesjugis; spicis globosis, pedunculatis, axillaribus, pluribus*. Linn. f. Suppl. pag. 447.

Mimosa eburnea. Lam. Dict. 1. n°. 40.

Les épines dont les vieilles branches sont chargées, rendent cette plante très-reconnoissable; elles ont la blancheur, le poli, l'éclat de l'ivoire. (Voyez ACACIE à épines d'ivoire, n°. 40.)

192. ACACIE à longues épines. *Mimosa horrida*. Linn.

Mimosa (acacia horrida), *spinis stipularibus geminis, folia subquadratis; foliolis bipinnatis et-trijugisve, parialibus subdecemjugis, glandulis in basi & apice petioli; spicis globosis, pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1082. n°. 79.

Mimosa (horrida), *spinis stipularibus, longitadine foliorum; foliis bipinnatis, parialibus sexjugis, ramis levibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1505. — Walh, Symb. 1. pag. 81.

Mimosa (leucacanthæ), *spinis stipularibus distichis, divaricatis, subulatis, teretibus; foliis bipinnatis, subtrijugis; parialibus à quadrijugis ad decemjugis; cæcis biglandulosis; floribus polyandris, monoicis*. Jacq. Hort. Schoenb. v. 3. p. 75. tab. 393.

Mimosa orfora. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 177. n°. 86.

Acacia maderaspatana, foliis parvis; aculeis à regione binis, prægranatis horrida; cortice cinereo. Pluken. Almag. pag. 3, tab. 121. fig. 4.

Mimosa horrida. Lam. Dict. 1. n°. 38.

Les épines ne sont point, comme celles de l'espèce précédente, adhérentes entr'elles par leur base. (Voyez ACACIE à longues épines, n°. 38.) Forsk. fait mention d'une sorte de maladie vermineuse qui produit des convulsions comme dans l'épilepsie. Les Arabes qui en font usage, se guérissent par les fumigations de la résine & du bois de cette plante. Elles produisent d'abord une sueur fébrile: il sort ensuite de dessous la peau du cou du malade, de petites pustules qui semblent être des têtes de tania. On les brûle avec un fer rouge & le ver meurt & le malade guérit. Ces mêmes habitants prétendent que les feuilles de ce *mimosa*, jetées dans le lait nouvellement trait du chameau, l'empêche, pendant plusieurs jours, de s'agiter & de tourner.

193. ACACIE flexueuse. *Mimosa flexuosa*.

Mimosa (acacia flexuosa), *spinis stipularibus,*

geminis, connatis; foliis bipinnatis, parialibus sedecimjugis, propriis multijugis; glandulis petiolaribus & inter bina paria terminatis parialium; spicis globosis, pedunculatis, subquaternis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1082. n°. 80.

Acacia flexuosa. Humboldt & Bonpl.

Ses rameaux sont cylindriques & flexueux; ses feuilles deux fois ailées, composées de seize paires de pinules, soutenant chacune environ vingt-cinq paires de folioles linéaires, obtuses, légèrement ciliées; le pétiole commun long de quatre pouces, canaliculé en dessus, glabre ou un peu pileux; les pétioles partiels longs d'un pouce; une glande comprimée, un peu au dessus de la base du pétiole commun, & entre les dernières paires de pinules; des épines géminées, axillaires, subulées, brunes, haisantes, longues d'un pouce. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, pédonculés, de la grosseur d'un pois, réunis trois, quatre, cinq ou six dans la même aisselle.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, à Cumana. (Voyez *Descript. ex Willd.*)

194. ACACIE gâtée. *Mimosa leucophaea*. Roxb.

Mimosa (acacia leucophaea), *spinis stipularibus, geminis, connatis; foliis bipinnatis, parialibus sex seu decemjugis, propriis multijugis; glandulis inter bina paria parialium; spicis globosis, pedunculatis, paniculatis*. Willd. Spec. Plant. v. 4. pag. 1083. n°. 81.

Mimosa leucophaea. Roxb. Corom. 2. pag. 27. tab. 150.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, de couleur cendrée, armés d'épines geminées, stipulées, brunes, longues d'un pouce, quelquefois beaucoup plus petites. Les feuilles sont deux fois ailées, composées de six à dix paires de pinules, soutenant chacune vingt paires de folioles linéaires, un peu obtuses, ciliées à leurs bords. Les pétioles légèrement pileux; une glande comprimée entre les pinules terminales. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, de la grosseur d'un grain de poivre, médiocrement pédonculés, formant une panicule terminale. Les gouffes sont planes, linéaires, un peu arquées, longues de quatre à cinq pouces.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Voyez *Descript. ex Willd.*)

195. ACACIE tortueuse. *Mimosa tortuosa*.

Mimosa (acacia tortuosa), *spinis stipularibus, foliis bipinnatis, parialibus bi seu trijugis, propriis sedecimjugis; glandulis petiolaribus & spicis capitatis, solitariis, axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1083. n°. 82.

Mimosa (tortueuse), *spinis stipularibus*; *foliis bipinnatis*, *quadrangulis*; *glandula inter infima*, *primis sedecimjugis*, *spicis globosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 155. — Swartz, Observ. 391.

Mimosa tortueosa. Lam. Dict. t. n°. 39.

Ses épines sont très-fortes, conniventes à leur base, blanches, cylindriques, épaisses, tubulées, longues d'un à deux pouces; les gouffes pubescentes, longues de quatre à cinq pouces, étroites, renflées, un peu torses, polyptermes. (Voyez ACACIE tortueuse, n°. 39.)

196. ACACIE de Farnèse. *Mimosa farnesiana*. Linn.

Mimosa (acacia farnesiana), *spinis stipularibus seaeatis*, *distinctis*; *foliis bipinnatis*, *partialibus quinque seu octojugis*, *proptis multijugis*; *spicis globosis*, *subfistulosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1083. n°. 83.

Mimosa (farnesiana), *spinis stipularibus distinctis*; *foliis bipinnatis*, *partialibus octojugis*; *spicis globosis*, *fistulosis*. Linn. Hort. Upf. 146.

Acacia aegyptiaca. Bartel. Icon. Rar. tab. 1138.

Mimosa farnesiana. Lam. Dict. t. n°. 41.

Les pétioles supportent une glande placée un peu au dessus des folioles. Ses fleurs répandent une odeur suave. Placées entre les vêtements de laine, elles en écartent les teignes. Elles entrent dans la composition des parfums. (Voyez ACACIE de Farnèse. Lam. Dict. t. n°. 41.)

197. ACACIE des Indes. *Mimosa indica*. Hort. Paris.

Mimosa spinis stipularibus, *subulatis*, *distinctis*; *foliis bipinnatis*, *partialibus subredicimjugis*, *proptis multijugis*; *foliis minutissimis*, *linearibus*, *obtusis*. (N.)

Cette espèce se rapproche beaucoup, par son port, de la précédente; mais sa fructification n'est pas encore connue. Les folioles sont beaucoup plus fines, plus non-breues, au moins une fois plus petites. Ses tiges sont divisées en rameaux glabres, rougeâtres, cylindriques, munis de deux épines courtes, tubulées, rougeâtres, très-fines. Les feuilles sont deux fois ailées, composées de douze à treize paires de pinnules, soutenant un très-grand nombre de folioles linéaires, obtuses à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces; les pétioles légèrement pubescents.

Cette plante croît dans les Indes orientales, & se cultive de puis long-temps au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

198. ACACIE des Antilles. *Mimosa Antillarum*. Lam.

Mimosa (acacia parvifolia), *spinis stipularibus*, *foliatis*; *foliis bipinnatis*, *partialibus subnovemjugis*, *proptis multijugis*; *glandula petiolaris*; *spicis globosis*, *foliatis*, *axillaribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1086. n°. 89.

Mimosa (parvifolia), *spinis stipularibus*, *foliatis*, *brevibus*; *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquajugis*, *proptis sedecimjugis*; *glandula supra basin folii*. Swartz, Prodr. 85. — Jacq. Amer. 267. ?

Mimosa (mangensis), *spinis stipularibus*, *distinctis*; *foliis bipinnatis*, *partialibus quinquajugis*, *proptis sedecimjugis*; *glandula supra basin folii*. Swartz, Prodr. 85. — Jacq. Amer. 267. ?

Arbuste dont les branches & les rameaux sont ouverts horizontalement, roides, cylindriques, flexueux, revêtus d'une écorce blanchâtre & cendrée, armés, à leur point d'insertion, d'épines foliaires, presque axillaires, fortes, longues de quatre à cinq lignes; les feuilles sont deux fois ailées, composées d'environ neuf paires de pinnules, soutenant chacune vingt à trente paires de folioles petites, ovales, obtuses, pubescentes, à peine longues de trois lignes; les pétioles pubescents, accompagnés de deux stipules lancéolées, membraneuses, obtuses, caduques, longues de six lignes; une glande foliaire, concave au milieu du pétiole, entre les pinnules.

Les fleurs sont disposées en épis globuleux, axillaires, foliaires, pédonculés. Leur calice est court, à cinq dents; la corolle jaunâtre ou d'un vert blanchâtre, tubulée, trois fois plus longue que le calice; environ vingt filaments monadelphes, pâles, capillaires; le style de la longueur des étamines.

Cette plante croît aux Antilles, sur les rives sablonneuses. (V. Descript. ex Swartz.)

199. ACACIE onguiculée. *Mimosa uncinella*.

Mimosa spinis subsulcatis, *stipularibus*; *foliis bipinnatis*, *partialibus suboctojugis*, *proptis sedecimjugis*; *glandula petiolaris*; *spicis globosis*, *foliatis*, *axillaribus*; *leguminibus compressis*, *falcatis*, *fistulatis*, *suturâ exteriori aculeatis*. (N.)

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, grisâtres, armés, à l'insertion des pinnules, d'épines courtes, crochues, élargies à leur base; garnis de feuilles deux fois ailées, composées d'environ huit paires de pinnules, soutenant chacune de huit à douze paires de folioles fort petites, linéaires, obtuses à leurs deux extrémités, légèrement pubescentes; les pétioles munis d'une glande à leur base.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, pédonculés, globuleux, au moins de moitié plus courts que les feuilles; les pédoncules, ainsi que

les calices, blanchâtres, pubescens; les étamines filantes; les anthères petites, jaunâtres. Les fruits consistent en plusieurs gousses fasciculées, minces, très-plates, étroites, glabres, courbées en faucille, armées, à leur suture extérieure, d'aiguillons comprimés, inégaux, crochus, élargis à leur base, très-aigus, longs de deux ou trois lignes.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. f. in herb. Desf.)

200. ACACIE pédonculée. *Mimosa pedunculata*.

Mimosa (acacia pedunculata), spinis stipularibus, geminis; foliis bipinnatis, parvialibus quinquejugis, propriis sedecimjugis; glandulâ petiolaris; spicis globosis, subgeminis, pedunculatis; foliis subaequantibus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1084. n°. 84.

Cette plante a le port de l'acacia de Farnèse; mais on l'en distingue aisément par ses épis longuement pédonculés. Ses rameaux sont glabres, cylindriques, de couleur brune; ses feuilles deux fois ailées, composées de quatre ou cinq paires de pinnules, soutenant seize paires de folioles glabres, linéaires, obtuses. Les pétioles sont pubescens, accompagnés à leur base de deux épines droites, subulées; une petite glande placée entre la paire de pinnules inférieures. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, quelquefois geminés, de la grosseur d'un pois, soutenus par de longs pédoncules pubescens vers leur base, glabres à leur partie supérieure, presque de la même longueur que les feuilles.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Java. (Descript. ex Willd.)

201. ACACIE à points blancs. *Mimosa atomaria*.

Mimosa (acacia punctata), spinis stipularibus, geminatis; foliis bipinnatis, parvialibus octo seu duodecimjugis; propriis multijugis, ciliatis; glandulâ petiolaris; spicis globosis, pedunculatis, subgeminatis, axillaribus; pedunculis tomentosis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1084. n°. 85.

Acacia punctata. Humb. & Bonpl.

Ses épis pédonculés, les pétioles & les pédoncules tomenteux, les jeunes feuilles blanches & corneuses, distinguent cette espèce du *mimosa farnesiana*. Ses rameaux sont bruns, cylindriques, parsemés de points blancs, munis à la base des pétioles de deux épines subulées. Les feuilles sont deux fois ailées, composées de huit ou douze paires de pinnules, soutenant chacune vingt-cinq ou trente paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leurs bords; une glande fort grosse, ut

Botanique. Supplément. Tome I.

éolée, située à la base du pétiole commun. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, pédonculés, souvent geminés, de la grosseur d'un petit pois.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Descript. ex Willd.)

202. ACACIE arabe. *Mimosa arabica*. Lam.

Mimosa (acacia arabica), spinis stipularibus, geminis; foliis bipinnatis, parvialibus quinquejugis, propriis multijugis; spicis globosis, subternis, axillaribus; pedunculatis; leguminibus moniliformibus, tomentosis. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1085. n°. 86.

Acacia altera, vera, seu spina marcenensis vel arabica; foliis angustioribus; flore albo; filiquâ longa, villosa, plerumque isthmis donata. Pluk. Alm. pag. 3. tab. 251. fig. 1.

Mimosa arabica. Lam. Dict. 1. n°. 44.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec l'acacia d'Égypte, dont elle diffère par son port, par le nombre de ses pinnules & de ses folioles, &c. (Voyez ACACIE arabe, n°. 44.)

203. ACACIE d'Égypte. *Mimosa nilotica*. Linn.

Mimosa (acacia vera), spinis stipularibus, geminis, patentibus; foliis bipinnatis, parvialibus binjugis (quinque seu sexjugis), propriis obovatoemjugis; glandulâ inter singula partialium paria; spicis subgeminis (subfasciculatis), pedunculatis, axillaribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. p. 1085. n°. 87.

Mimosa (nilotica), spinis stipularibus, patentibus; foliis bipinnatis, parvialibus extimis, glandulâ interstiniatis; spicis globosis, pedunculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1506. — Hasselq. Itin. 475. — Blackw. tab. 377.

Acacia vera. J. Bauh. Hist. t. pag. 419. Ic. Bona. — Tournef. Inst. R. Herb. 605. — Vahl. Egypt. tab. 8.

Acacia foliis scorpioidis leguminosa. C. Bauh. Pin. 392. — Pluken. Alm. 3. tab. 123. fig. 1. ?

Mimosa nilotica. Lam. Dict. 1. n°. 43.

Cet arbre parvient à trente pieds de haut: ses feuilles sont composées de deux, mais bien plus souvent de cinq à six paires de pinnules. Les épis de fleurs se trouvent assez souvent réunis au nombre de trois, quatre & plus dans chaque aisselle. (Voyez ACACIE d'Égypte, n°. 43.)

204. ACACIE lustrée. *Mimosa nitida*. Vahl.

Mimosa (acacia nitida), spinis stipularibus, ge-

minis; foliis bipinnatis, partialibus bijugis, propriis subquingjugis; glandula inter singula paria partialium; spicis globosis, pedunculatis, geminis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1086. n°. 88.

Mimosa (nitida), spinosa, foliis bipinnatis, bijugis; glandula inter singula; foliolis quingjugis; spicis globosis, pedunculatis. Vahl, Symb. 2. pag. 103.

Ses tiges se divisent en rameaux dressés, armés de deux épines à la base des pétioles, garnis de feuilles deux fois ailées, composées de deux paires de pinnules, soutenant chacune environ cinq paires de folioles oblongues, d'un vert gai, luisantes à leur face supérieure, plus étroites à leur côté intérieur; le pétiole muni d'une glande entre chaque paire de pinnules. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, geminés, globuleux, pédonculés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h*

205. ACACIE à gouffes obtuses. *Mimosa obtusa.*

Mimosa (acacia obtusa), spinis stipularibus, geminis; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis multijugis; glandula in petioli basi & inter bina paria partialium terminalium; legumine linearicauto, obtuso. Willd. Spec. Plant. vol. 4. p. 1087. n°. 90.

Acacia obtusa. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont bruns, cylindriques; ses feuilles deux fois ailées, composées de douze à dix-sept paires de pinnules, soutenant trente paires de folioles glabres, linéaires, un peu obtuses; les pétioles hérissés de poils en dessus; le pétiole commun long de trois pouces & plus, les partiels de six à huit lignes; une glande située en dessus & à la base du pétiole commun, ainsi qu'entre les deux dernières paires de pinnules. Les gouffes sont planes, linéaires, longues de quatre pouces, un peu arquées, obtuses & arrondies à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, le long du fleuve de l'Orénoque. *h* (*Descript. ex Willd.*)

206. ACACIE de Klein. *Mimosa Kleinii.*

Mimosa (acacia tomentosa), spinis stipularibus, geminis; foliis bipinnatis, partialibus decemjugis, propriis vinctijugis, subius tomentosis; glandula petioli, & inter bina paria extrema partialium; spicis globosis; pedunculis axillaribus, aggregatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1087. n°. 91.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, tomenteux, armés, à la base des pétioles, de deux épines subulées; garnis de feuilles deux fois ailées,

à dix paires de pinnules, composées de vingt ou vingt-cinq paires de folioles linéaires, pâles, obtuses, couvertes en dessous de poils blanchâtres & nombreux; le pétiole tomenteux, canaliculé; des plumes très comprimées, une située à la base du pétiole commun, deux autres entre les dernières paires de pinnules. Les fleurs sont disposées en épis globuleux, de la grosseur d'un pois, pédonculés, réunis deux, trois ou quatre dans l'aisselle des feuilles; les pédoncules sont nombreux, munis de quatre petites bractées souvent presque verticillées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

B. Aiguillons épars; épis filiformes ou globuleux.

207. ACACIE à fleurs menues. *Mimosa tenuiflora.*

Mimosa (acacia tenuiflora), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quingjugis; propriis multijugis, ciliatis; spicis filiformibus, foliorum longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1088. n°. 92.

Ses rameaux sont cylindriques, armés d'aiguillons épars, noirs, recourbés; les feuilles deux fois ailées, composées de quatre à cinq paires de pinnules, soutenant chacune dix à vingt-cinq paires de folioles linéaires, obtuses, ciliées à leur contour; les pétioles pubescents & munis de quelques aiguillons. Les fleurs sont disposées en un épi grêle, filiforme, de la longueur des feuilles; les gouffes longues d'un pouce, minces, membranées, presque lancéolées, contenant de trois à cinq semences.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Caracas. *h* (*Descript. ex Willd.*)

208. ACACIE d'Etienne. *Mimosa stephaniana.* Marsh.

Mimosa (acacia stephaniana), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quingjugis; propriis decemjugis, subius pubescentibus; spicis filiformibus, folio longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1088. n°. 93.

Mimosa (stephaniana), aculeata, foliis bipinnatis, pubescentibus; foliolis ovali-oblongis, basi inaequalibus; spicis simplicibus, elongatis; flaminibus vix corollae longioribus. Marsh. ab Biberst. Catp. 120.

Senna persica, spinosa, foliis exiguis. Burb. Centur. 3. pag. 36. tab. 48. *Mula.*

Siliqua nabathana, ex Persia allata. Breyn. Centur. pag. 55. tab. 56. fig. 4. *Legumen optimum.*

Ses rameaux sont striés, cylindriques, munis

d'aiguillons épars, comprimés, un peu crochus; garnis de feuilles deux fois ailées, composées de quatre à cinq paires de pinnules, soutenant chacune dix à douze paires de folioles oblongues, ovales, partagées inégalement par la nervure du milieu, rétrécies à leur base interne, en coin extérieurement, pubescentes en dessous; les pétioles pubescents, armés d'un ou de deux aiguillons. Les fleurs sont disposées en un épi très-grêle, axillaire, solitaire, pédonculé, long de deux pouces & plus.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Perse.

209. ACACIE caduque. *Mimosa caduca*.

Mimosa (acacia caduca), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *partialibus quadrjugis*; *propiis decemjugis*, *oblongis*, *obtusis*; *subtus hirsutis*; *spicis ovatis*, *pedunculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1089. n°. 94.

Acacia caduca. Humb. & Bonpl.

Quoique dans l'plus grand nombre des espèces de *mimosa* les feuilles soient très-faciles à se détacher, dans celles-ci elles le sont beaucoup plus. Ses rameaux sont bruns, striés, blanchâtres dans leur jeunesse; les feuilles deux fois ailées, à quatre paires de pinnules, composées de dix paires de folioles ovales-oblongues, obtuses, sans nervures sensibles, partagées inégalement, luisantes & d'un vert-foncé en dessus, couvertes en dessous de poils abondans & blanchâtres; les pétioles pubescents; les aiguillons crochus, épars sur les tiges & les rameaux. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, solitaires ou geminés, ovales, pédonculés, longs de quatre lignes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h (Description ex Willd.)

210. ACACIE à gouffes épineuses. *Mimosa acantholoba*.

Mimosa (acacia acantholoba), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *partialibus trijugis*; *propiis decemjugis*, *subtus pubescentibus*; *spicis globosis*, *subsessilibus*, *racemosis*; *leguminibus margine aculeatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1089. n°. 95.

Acacia acantholoba. Humb. & Bonpl.

Ses rameaux sont cylindriques; ses feuilles deux fois ailées, à trois paires de pinnules, composées de dix ou onze paires de folioles linéaires, obtuses, glabres à leur face supérieure, couvertes en dessous de poils couchés; les pétioles pubescents; les aiguillons épars, comprimés, crochus. Les fleurs sont disposées en épis petits, globuleux, presque sessiles, rapprochés en une grappe terminale; les gouffes planes, oblongues, membraneu-

ses, glabres, longues d'un pouce & demi, armées d'aiguillons à leurs bords.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h (Description ex Willd.)

211. ACACIE striée. *Mimosa striata*.

Mimosa (acacia striata), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *partialibus novemjugis*; *propiis sedecimjugis*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *paniculatis*, *terminalibus*; *ramis striatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1089. n°. 96.

Acacia striata. Humb. & Bonpl.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, cannelés, striés, légèrement pubescents, armés d'aiguillons épars, droits, aigus, comprimés, garnis de feuilles deux fois ailées, à neuf paires de pinnules, composées de treize à seize paires de folioles linéaires, obtuses, glabres en dessus, pileuses en dessous, sans nervures sensibles; les pétioles pubescents; les fleurs disposées en épis globuleux, pédonculés, de la grosseur d'un grain de poivre, rapprochés en une panicule terminale. Les gouffes sont linéaires, courbées en faucille, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'un pouce & demi, légèrement pileuses.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h (Description ex Willd.)

212. ACACIE bleuâtre. *Mimosa caesa*. Linn.

Mimosa (acacia caesa), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *partialibus septemjugis*; *propiis sedecimjugis*; *glanulâ petiolaris*; *spicis globosis*, *pedunculatis*, *paniculatis*, *terminalibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1090. n°. 97.

Mimosa (caesa), *aculeata*, *foliis bipinnatis*; *pinnis ovali-oblongis*, *oblique acuminatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1507.

Mimosa caesa. Lam. Dict. t. n°. 50.

Les pétioles communs se terminent par une petite pointe épineuse; ils supportent, au d'flus de leur base, une glande oblongue, remplie d'une liqueur mielleuse. (Voy. ACACIE bleuâtre, n°. 50.)

213. ACACIE à feuilles en aile. *Mimosa pennata*. Linn.

Mimosa (acacia pennata), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *partialibus propriisque multijugis*; *glanulâ petiolaris*; *petiolis communibus* *hujus pedunculatis*; *spicis capitis*; *pedunculatis*; *paniculâ terminali*, *divaricatâ*. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1090. n°. 98.

Mimosa (pennata), *aculeata*, *foliis bipinnatis*, *numerossimis*, *linearibus*, *acutis*; *paniculâ aculeatâ*, *capitulis globosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1507.

Mimosa pennata. Lam. Dict. 1. n°. 51.

Ses pinnules, tant par leur finesse que par leur forme, ont quelque ressemblance avec les barbes d'une plume. (Voyez ACACIE à feuilles en aile, n°. 51.)

214. ACACIE à feuilles mignonnes. *Mimosa tenuifolia*. Linn.

Mimosa (acacia tenuifolia), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus viginti-jugis, pinnis multijugis. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1091. n°. 100.

Mimosa tenuifolia. Linn. Syst. veget. pag. 77. — Lam. Dict. 1. n°. 53.

Cette plante, confondue d'abord avec le *mimosa pennata*, en est très-distincte. (Voyez ACACIE à feuilles menues, n°. 53.)

215. ACACIE à deux nervures. *Mimosa infusa*. Linn.

Mimosa (acacia infusa), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus sexjugis; propriis subduodecimjugis, incurvis; petiolis aculeatis; aculeis stipulis brevioribus; ffricis globosis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1091. n°. 99.

Mimosa (infusa), aculeata, foliis bipinnatis, pinnis incurvis, caule angulato, stipulis aculeis longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1501.

Mimosa infusa. Lam. Dict. 1. n°. 47.

Cette espèce est remarquable par deux nervures longitudinales qui partent de la base de chaque foliole. (Voyez ACACIE à deux nervures, n°. 47.)

216. ACACIE à feuilles de caroubier. *Mimosa ceratonia*. Linn.

Mimosa (acacia ceratonia), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis; propriis trijugis, obovatis, trinerviis; ffricis globosis, pedunculatis, paniculatis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1091. n°. 101.

Mimosa (ceratonia), aculeata, foliis bipinnatis, quinquejugis; partialibus trijugis, pinnis trinerviis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1508.

Mimosa ceratonia. Lam. Dict. 1. n°. 57.

Outre les aiguillons nombreux, situés sur les rameaux & les pétioles communs & partiels, on en remarque aussi quelques-uns sur les péduncules. (Voyez ACACIE à feuilles de caroubier, n°. 57.)

217. ACACIE à feuilles de tamarin. *Mimosa tamarindifolia*. Linn.

Mimosa (acacia tamarindifolia), aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis, propriis quindecimjugis; glandulis petiolaribus; styulis bracteisque cor-

datis; ffricis globosis, pedunculatis, paniculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 1092. n°. 102.

Mimosa (tamarindifolia), aculeata, foliis bipinnatis, quinquejugis; partialibus decemjugis, petiolis communibus trinerviis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1509. — Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. p. 77. tab. 356.

Mimosa tamarindifolia. Lam. Dict. 1. n°. 58.

Le pétiole commun est souvent dépourvu d'aiguillons ou n'en a que deux ou trois distans, fort petits. (Voyez ACACIE à feuilles de tamarin, n°. 58.)

* Espèces moins connues, ou dont la fructification n'a pas été observée.

218. ACACIE à feuilles de lentisque. *Mimosa lentiscifolia*. Hort. Paris.

Mimosa spinosa, foliis bipinnatis, partialibus subsexjugis; propriis subdecemjugis; foliolis subcoriaceis, lucidis, ovatis, mucronatis. (N.)

Mimosa (lentiscifolia), foliis bipinnatis; foliolis majoribus, subcoriaceis, obtusis, ovatis, lucidis. Pers. Synops. Plant. vol. 2. pag. 163. n°. 64.

Mimosa lentiscifolia. Desf. Catal. Hort. Paris. p. 181.

Arbrisseau dont les rameaux sont courts, diffus, presque en buisson, difformes, glabres, nouveaux, un peu canaliculés, munis de petites épines opposées, subulées, garnis de feuilles deux fois ailées, composées d'environ six paires de pinnules, soutenant chacune au moins dix paires de folioles opposées, presque sessiles, ovales, luisantes, un peu coriaces, glabres à leurs deux faces, obtuses à leurs deux extrémités, mucronées à leur sommet, longues de quatre à six lignes, sur deux ou trois de largeur; le pétiole commun glabre, canaliculé en dessus. La fructification n'a pas encore été observée.

Cette plante croît au Mexique; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (V. v.)

219. ACACIE à épines de rosette. *Mimosa rhodacantha*. Hort. Paris.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus subsexjugis; propriis viginti-sexjugis, linearibus, obtusis; petiolis spinosis glandulosisque; aculeis duobus majoribus oppositis, minoribus sparsis. (N.)

Mimosa (rhodacantha), frutescens, aculeata; foliis bipinnatis; pinnulis linearibus, confertis, obtusis, ciliatis; aculeis duobus majoribus oppositis, rectis, minoribus sparsis. Pers. Synops. Plant. vol. 2. pag. 166. n°. 112.

Mimosa rhodacantha. Desf. Hort. Paris. 181.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, garnis d'aiguillons de deux espèces, les uns plus grands, épaïs, courts, oppoés, droits, riges; d'autres épaïs tant sur les jeunes rameaux que sur les pétioles, beaucoup plus petits, crochus, tous acquérant en vieillissant une couleur de tofe. Les feuilles sont alternes, deux fois ailées, composées d'environ six paires de pinnules opposées, distantes, soutenant au moins vingt-six paires de folioles petites, linéaires, très-rapprochées, obtuses, presque glabres; le pétiole commun armé d'aiguillons épaïs, petits, &c de quelques glandes à la partie inférieure.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ne connoit point son lieu natal. h (V. v.)

120. ACACIE farmenteuse. *Mimosa farmentosa*. Hort. Paris.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis, partialibus quinquejugis; propriis quindecim ad viginti jugis, linearibus-oblongis, obtusis, glabris; ramis farmentosis, aculeis sparsis. (N.)

Mimosa (farmentosa), aculeata, foliis bipinnatis; foliis confertis, ovatis, glaberrimis; ramis farmentosis, aculeis sparsis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 266. n°. 113.

Mimosa farmentosa. Desf. Hort. Paris. 181.

Ses tiges se divisent en longs rameaux effilés, grimpans, glabres, striés, légèrement anguleux, armés d'aiguillons épaïs, crochus, fort courts; garnis de feuilles deux fois ailées, à cinq paires de pinnules épaisses, opposées, composées de quinze à vingt paires de folioles linéaires-oblongues, obtuses à leurs deux extrémités, glabres, sans nervures sensibles, d'un vert-gai, inégales à leur base, longues de trois à quatre lignes, à peine larges d'une ligne; le pétiole commun presque filiforme, très-glabre, muni de quelques aiguillons rares, &c d'une petite glande au dessus de sa base & entre les pinnules inférieures.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ne connoit point son lieu natal. h (V. v.)

121. ACACIE à trois nervures. *Mimosa trinervis*. Hort. Paris.

Mimosa aculeata, foliis bipinnatis; foliolis distatis, trinerviis, vixis, mucronulatis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 266. n°. 114.

Mimosa trinervis. Desf. Hort. Paris. 181.

Cette espèce se distingue par ses folioles un peu plus grandes que celles de l'espèce précédente, marquées de trois nervures longitudinales qui partent de la base. Ses rameaux sont armés

d'aiguillons épaïs, crochus. Les feuilles sont deux fois ailées, à folioles nombreuses, linéaires, glabres à leurs deux faces, un peu mucronées à leur sommet.

Cette plante, dont on ignore le lieu natal, est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. h

122. ACACIE de Maroc. *Mimosa mauriceana*. Hort. Paris.

Mimosa spinosa, foliis bipinnatis, partialibus quadrijugis, propriis subviginti jugis; foliolis minimis, subimbricatis; spinis axillaribus, subulatis, rectis. (N.)

Mimosa mauriceana. Desf. Hort. Paris. 181.

Ses rameaux sont glabres, striés, d'un brun-clair, armés d'épines axillaires, grêles, subulées, très-droites, longues à peine de trois lignes; garnis de feuilles deux fois ailées, longues d'un pouce, composées de quatre paires de pinnules, soutenant chacune environ vingt paires de folioles fort petites, très-rapprochées, obtuses, presque glabres; les pétioles légèrement pubescens, point épineux.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

123. ACACIE de Guayaquil. *Mimosa guayaquilensis*. Hort. Paris.

Mimosa spinosa, foliis bipinnatis, partialibus bijugis, propriis tri seu quinquejugis; foliolis ovatis, obtusis, inferioribus minoribus; spinis oppositis. (N.)

Mimosa guayaquilensis. Desf. Hort. Paris. 181.

Cette plante a dans les feuilles l'aspect du *mimosa sativa*. Ses rameaux sont très-trois, cylindriques, piquetés de points blanchâtres, nombreux, armés de deux épines courtes, opposées, stipulacées; garnis de feuilles deux fois ailées, à deux paires de pinnules, composées de trois ou cinq paires de folioles inégales, assez grandes, ovales, glabres à leurs deux faces, d'un vert glauque, entières; les supérieures longues de huit lignes, larges de quatre; les inférieures beaucoup plus petites; les pétioles très-glabres, articulés.

Cette plante croît au Pérou, dans les environs de Guayaquil; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

* Espèces moins connues.

* *Mimosa (pilosulcula), foliis simpliciter pinnatis; foliis bijugis, utrinque pilis adpressis obovatis, amplissimis, coriaceis; capitulis pecunculatis.* Rich. in Act. Soc. Nat. Paris. pag. 113. — Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 261. n°. 16. (E. Cayana.)

* *Mimosa (rubiginosa)*, foliis simpliciter pinnatis; foliis subquinqvejugis, oblongo-ovatis, pubescentibus, acuminatis, petiolo nudo; ramis rubiginosis; pucillis praeinatis, scabris; floribus subspicatis. Rich. in Act. Soc. Nat. Paris. pag. 113. — Pers. Synopf. vol. 2. pag. 261. n°. 18. (É Cayenn.)

* *Mimosa (coriacea)*, foliis bipinnatis, ovatis, coriaceis; floribus umbellatis, pedunculatis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 262. n°. 31. (É Cayenn.)

* *Mimosa (guadelupensis)*, foliis bipinnatis; foliis ovalibus, obliquis, subcoriaceis; capitulis corymbosis. Pers. Synopf. 2. pag. 262. n°. 32. (É Guadelup.)

* *Mimosa (furcata)*, aculeata, foliis conjugatis, divergentibus; pinnulis linearibus. Pers. Synopf. 2. pag. 263. n°. 43. — Desf. Hort. Paris. 80. (É Afric.)

* *Mimosa (coronillifolia)*, aculeata, foliis conjugatis, pinnatis; foliis distantibus, glaucis, suboppressis; caule aculeato. Pers. Synopf. 2. p. 263. n°. 44. — Desf. Hort. Paris. 80.

* *Mimosa (stigmata)*, foliis conjugatis, bipinnatis, obliquis, foliis pilosis; floribus capitatis; leguminibus compressis, stig. fig. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 263. n°. 48. (É Peruvia.)

* *Mimosa (aggregata)*, foliis bipinnatis; foliis distantibus, inferius petiolisque pilosis; pedunculis plurius in ocellis aggregatis. Pers. Synopf. 2. pag. 263. n°. 63. (É Ind.)

* *Mimosa (nursans)*, spinosa, foliis bipinnatis, spinosis; floribus spicatis, decanatis, inferioribus castratis, petalosis. Pers. Synopf. 2. pag. 266. n°. 115. (É Senegal.)

* *Mimosa (aculeaticarpa)*, pilosa, aculeis geminis solitariis; oduncis; foliis bipinnatis; leguminibus falcatis, spuris aculeatis. Orteg. Decad. pag. 134. (É novâ Hispania.)

* *Mimosa (semispinosa)*, aculeata, foliis bipinnatis; oriculis culinis, superius aculeatis. Pers. Synopf. 2. pag. 267. n°. 122. (É Americ.)

ACENA ou ACENA. Ce genre, établi par Linné, admis par les auteurs de la *Flore du Pérou* avec quelques corrections, est évidemment le même que l'*ancistrum* de Forst. & de Linne f. s. Tous deux offrent des fleurs complètes, à moins que l'on ne considère la partie que l'on a nommée *pétale* comme quatre divisions intérieures & alternes du calice; mais même, dans ce cas, il n'y auroit encore d'autres différences entre ces deux genres que celles occasionnées par l'âge, qui fait paroître l'ovaire presque supérieur dans les jeunes fleurs, & inférieur à la maturité des fruits lorsque le

tube du calice agrandi les recouvre en totalité; mais dans les deux cas, l'ovaire est réellement adhérent avec le calice; ce qui fait évanouir la distinction établie entre les *acena* & les *ancistrum*. Quant aux étamines, elles varient de deux à quatre, & quelquefois cinq. Nous conserverons le nom d'*ancistrum*, déjà employé dans cet ouvrage. M. Vahl a cru devoir rappeler le premier, comme plus anciennement connu. (Voyez ANCISTRE.)

ACAJOU à pommes. *Cassipouia pomifera*. Mill. tab. 321.

Acajou occidentalis. Gært. vol. 1. pag. 192. tab. 40. fig. 2.

Acajou. Marcgr. Bras. pag. 95.

Acajou. Pif. Blaf. 18. — Tournef. tab. 435.

Acacardium. Blackw. tab. 369. — Jacq. Amer. 124. tab. 181. fig. 35.

ACALYPHA. (Voyez RICINELLE.)

ACAMETL. Nom mexicain d'une des espèces ou variétés du *mestl*, qui se rapporte au genre *agave*, & qui fournit une liqueur vineuse très utile au Mexique. (Jug.)

ACAPATLI. Nom mexicain de l'*iva frutescens* Linn., connu aussi sous celui de *quinquina* au Mexique.

ACANTHE. *Acanthus*. Ce genre, de la famille du même nom, renferme plusieurs espèces qui n'offrent qu'imparfaitement le caractère essentiel assigné à ce genre par Linné. M. de Just. en a fait trois genres particuliers, dont nous allons exposer les caractères & distribuer les espèces convenablement à ce nouvel ordre.

ACANTHUS. Calice à deux lèvres, à quatre divisions; les deux divisions latérales inférieures, plus courtes; les deux extérieures plus longues, très bractées oblongues, aigues; celle du milieu armée de dents épineuses; une corolle labiée; le tube court, garni de poils; point de lèvre supérieure; une lèvre inférieure très-grande, à trois lobes; quatre étamines didynames; les anthères droites, conniventes, oblongues, velues antérieurement; un stigmate bifide; une capsule ovale, à deux loges, chacune contenant une ou deux semences.

ESPÈCES.

1. **ACANTHE** brancurine. *Acanthus mollis*. Linn.

Acanthus foliis sinuatis, inermibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 891. — Lam. Illustr. tab. 550. — Ludwig. Ed. 126. — Sabbat. Hort. Rom. vol.

1. tab. 13. — Regn. Bot. Ic. — Gært. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 253. tab. 54. fig. 1. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 196. — Desf. Fior. atlant. vol. 2. pag. 62.

Acanthus sativus seu mollis Vieglii. C. Bauh. Pin. 183.

Cardus acanthus seu branca urf. J. Bauh. Hist. 3. pag. 75. Ic. — Blackw. tab. 89.

Acanthus sativus. Tournef. 1. R. R. Herb. 176. — Dodon. Pempt. 719. Ic. — Lobel. Ic. pag. 2. — Ta'ern. Ic. 785. — Dalech. Hist. 1. par. 1443. Ic. — Parkinson. Theat. pag. 992. Ic. — Gerard. Hist. 1147. Ic.

Acanthus. Camer. Epirom. 452. Ic. — Matth. Comm. pag. 499. Ic.

Acanthus leviss. Hort. Eyf. Ælivi. 11. pag. 2. fig. 3.

Acanthus mollis. Rivin. t. tab. 87.

Acanthus vera. Fusch. Hist. pag. 52. Ic.

3. *Acanthus (nigra)*, *foliis sinuatis, inermibus, glabris, lucide virent.* Miller, Dict. n°. 1.

Cette belle plante est célèbre dans l'histoire des beaux-arts. Virgile raconte que la nonrice d'une jeune fille morte à Corinthe, ayant porté les joyaux de cette enfant près de sa tombe, posa le panier sur un pied d'acanthé qui n'étoit pas sorti de terre; de sorte que ses belles feuilles se développant autour du panier, & étant forcées de se courber sous la faiblesse de la tige qui le couvroit, offrirent au sculpteur Calimachos le modèle du chapiteau dont il fit le couronnement des colonnes élégantes de l'ordre nommé *Corinthien*. Les feuilles d'acanthé servent de modèle à divers autres ornemens. Virgile en fait, dans l'*Éclogue*, la botellerie de la robe d'Hélène. (Voyez ACANTHE *brancusina*, n°. 1.)

2. ACANTHE épineuse. *Acanthus spinosus*. Linn.

Acanthus foliis pinnatis, spinosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 891. — Salic. Hort. Rom. vol. 3. tab. 14. — Miller, Dict. n°. 4.

On la distingue de la précédente par les pointes épineuses qui terminent les angles saillans de ses feuilles. (Voyez ACANTHE épineuse, n°. 2.)

3. ACANTHE à feuilles de chardon. *Acanthus cariofolius*. Linn. Suppl.

Acanthus foliis dentato sinuatis, spinosis; spicis floribus radicalibus. Linn. f. Suppl. pag. 254.

La forme des feuilles, les tiges courtes, presque nulles, les calices non épineux, caractérisent cette espèce. (Voyez ACANTHE à feuilles de chardon, n°. 7.)

4. ACANTHE très-épineuse. *Acanthus spinosissimus*. Hort. Paris.

Acanthus foliis laciniato-pinnatifidis, bullatis, spinosissimis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 179.

Acanthus spinosissimus. Desf. Catal. Hort. Paris. pag. 51.

Cette espèce est très-rapprochée de l'*Acanthus spinosus*. Outre ses épines bien plus nombreuses, d'un blanc-jaunâtre, elle a en outre ses feuilles plus profondément laciniées, presque ailées, creusées & rutilées en forme de bullis. Les tiges sont glabres, cylindriques, herbacées, d'un brun-rougeâtre; ses feuilles très-amples; les pinnules distantes, à peine décurrentes, lancéolées, laciniées irrégulièrement; chaque angle & chaque dent terminée par une épine roide, allongée.

Les fleurs sont disposées en un épi droit, terminal, allongé, serré; chaque fleur sessile, assez grande, d'un blanc-jaunâtre, accompagnée d'une bractée ovale, un peu concave, à deux nervures, armée de fortes épines à ses bords; deux ou trois bractées étroites, latérales, subulées, velues; le calice divisé en deux lèvres glabres, entières, inégales; la corolle à une seule lèvre, divisée à son sommet en trois lobes courts, arrondis, égaux; les anthers droites, purpurines, ainsi que le style, très-velues antérieurement.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est pas connu. (V. v.)

5. ACANTHE en arbr. *Acanthus arborescens*.

Acanthus foliis sinuato-dentatis, spinosis, glabris; caule fruticoso. Vahl, Symb. 1. pag. 47.

Acanthus caule arboris; foliis sinuato-dentatis, spinosis. Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 115.

C'est un très-bel arbrisseau, jusqu'à huit pieds, sur qui s'élève à la hauteur de six à huit pieds, sur une tige droite, cylindrique. Les feuilles sont opposées, linéaires-lancéolées, sinuées, ondulées, glabres à leurs deux faces, un peu pubescentes en actions sur leurs nervures; longues de sept à huit pouces, garnies à leur contour de dents très-épines. Les fleurs sont rouges, opposées, sessiles, disposées en épis à l'extrémité des tiges, munies de bractées lanolées, garnies à leurs bords de cils épineux, filiformes, longs d'un demi-pouce; la corolle une fois plus longue que le calice; sa lèvre divisée en cinq lobes inégaux; la capsule ovale, récamée, de la grosseur d'une noisette, contenant deux semences.

Cette plante vit dans l'Arabie Heureuse, où elle a été découverte par Forskhal. (V.)

6. ACANTHE à feuilles lancéolées. *Acanthus Dioscoridis*. Linn.

Acanthus foliis lanceolatis, integerrimis, margine spinosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 891. — Gronov. Orient. 192. — Mill. Dict. n°. 3. (Voyez ACANTHE, n°. 3.)

* DILIVARIA.

Calice à quatre divisions, environné de trois bractées presqu'imbriquées & arrondies, ainsi que les divisions calicinales; corolle lobée; tube court, resserré, fermé par des écailles; quelques dents à la place de la lèvre supérieure; lèvre inférieure très ample, à trois lobes peu sensibiles; un stigmate simple.

7. ACANTHE à feuilles de houx. *Acanthus ilicifolius.* Linn.

Acanthus (dilataria ilicifolia. J.), foliis repandis, dentato-spinosis; caule fruticoso, aculeato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 892. — Miller, Dict. n°. 5.

Acanthus malabaricus, agrifolius folio. Petiv. Sicc. 10, & Gazoph. tab. 94. fig. 15.

Cordus aquaticus seu Indorum dilataria. Commel. Luz. 6. n°. 16.

Cette plante offre dans ses fleurs des caractères qui la distinguent des acanthes. (Voyez ACANTHE, n°. 4.)

8. ACANTHE sans bractées. *Acanthus ebracteatus.* Vahl.

Acanthus (dilataria ebracteata. J.), foliis lanceolato-ellipticis, dentatis; spica terminali; caule fruticoso, inermi; calicibus tetraphyllis. Vahl, Symb. 2. pag. 75. tab. 40.

Acanthus ilicifolius. Loueit. Flot. cochin. pag. 458.

Aquifolium inditum. Rumph. Amb. v. 6. p. 163. tab. 71. fig. 1.

Cette espèce diffère de *Poconthus ilicifolius* par ses tiges sans épines, par ses feuilles plus allongées, rétrécies à leur sommet; par les fleurs beaucoup plus petites.

Ses tiges sont ligneuses, glabres, cylindriques, articulées, rameuses à leur base, hautes de quatre à cinq pieds, dépourvues d'aiguillons, garnies de feuilles opposées, à peine pétioles, lancéolées, elliptiques, glabres, presque luisantes, légèrement sinuées & dentées à leur contour; les dentelures courtes, droites, épineuses dans les vieilles feuilles. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en un épi alongé, très-simple. Le calice est divisé en quatre folioles, les deux extérieures arrondies, plus grandes, concaves; la corolle blanche; la lèvre oblongue, pileuse dans son milieu, très-entière; les étamines purpurines, lanugineuses. Les capsules sont

oblongues, luisantes, terminées par deux pointes, à deux loges, longues d'un pouce, contenant dans chaque loge deux semences dures, oléuses. Les bractées sont presque nulles, très-cadues; elles consistent en une petite foliole courte, non épineuse.

Cette plante croît à la Cochinchine & dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Desfont.)

9. ACANTHE à longues feuilles. *Acanthus longifolius.*

Acanthus (dilataria longifolia), foliis petiolatis, lanceolato-oblongis, integerrimis, subspinosis; spica laxa terminali. (N.)

Ses tiges sont droites, glabres, très-lisses, dépourvues d'épines, cylindriques à leur partie inférieure, un peu comprimées vers leur sommet, tout-à-fait plates & même presque membraneuses à la partie supérieure qui supporte les fleurs. Les feuilles sont opposées, pétioles, coriaces, très-entières, oblongues, lancéolées, sans épines dans leur jeunesse, la plupart acquérant en vieillissant quelques angles peu sensibiles vers leur sommet, terminés chacun par une petite épine courte, ainsi que le sommet. Ces feuilles ont leurs deux faces parfaitement glabres, l'inférieure luisante; veinées, réticulées, longues de six à huit pouces, sur deux pouces & plus de large; la côte du milieu très-saillante en dessous, canaliculée en dessus; les nervures latérales confluentes vers le bord des feuilles; les pétioles striés, longs de six lignes.

Les fleurs sont sessiles, disposées en un épi terminal un peu lâche. Leur calice est très-glabre, composé de folioles presque scarieuses, concaves, obtuses, imbriquées, sans épines. La corolle m'a paru purpurine, à une seule lèvre presque entière, tabassée sur les côtés; les filamens des étamines subulés; les anthères droites, oblongues, purpurines, garnies en avant, dans toute leur longueur, d'une touffe de poils blancs & ferres; le style filiforme.

Cette plante a été recueillie aux Indes orientales par M. de Labillardière. (V. f. in herb. Desfont.)

** BLEPHARIS.

Corolle double; l'intérieur à quatre découpures, dont deux plus grandes; l'extérieur à quatre folioles ciliées; trois bractées plus courtes & ciliées; une corolle lobée; le tube resserré & fermé par des écailles; la lèvre supérieure très-courte, dentelée; l'inférieure très-grande, presqu'à trois lobes; le stigmate simple; une capsule ovale, à deux loges; une ou deux semences dans chaque loge.

10. ACANTHE du Cap. *Acanthus capensis.* Linn. f. Suppl.

Acanthus

Acanthus (blepharis capensis. J.), foliis oblongis, dentatis, spinosis; caule fruticoso, erecto; bracteis spinis simpliciter terminatis. Linn. Supplém. pag. 295.

Blepharis (capensis), foliis lanceolatis, dentato-spinosis; spinis axillaribus, ramosis. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 1. (Voyez ACANTHE du Cap, n°. 8.)

11. ACANTHE fourchue. *Acanthus furcatus*. Linn. Suppl.

Acanthus (blepharis furcata), foliis oblongis, dentato-spinosis; caule fruticoso; bracteis spinis triplici terminatis. Linn. Suppl. pag. 295. (Voyez ACANTHE fourchue, pag. 24.)

12. ACANTHE couchée. *Acanthus procumbens*. Linn. Suppl.

Acanthus (blepharis procumbens. J.), foliis oblongis, serrato-ciliatis; caule procumbente, fruticoso. Linn. f. Suppl. pag. 295. (Voyez ACANTHE couchée, pag. 24.)

13. ACANTHE à feuilles entières. *Acanthus integrifolius*. Linn. Suppl.

Acanthus (blepharis fatuariaefolia. J.), foliis oblongis, integris; caule herbaceo, procumbente. Linn. f. Suppl. pag. 294. *Acanthus integrifolius*.

Blepharis (fatuariaefolia), foliis verticillatis, integrimis, linearibus, inermibus. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 5.

Ses feuilles sont presque verticillées, linéaires, point épineuses, très-entières. (Voyez ACANTHE à feuilles entières, pag. 24.)

14. ACANTHE à feuilles de calament. *Acanthus calaminthaeifolius*. Juss.

Acanthus (blepharis calaminthaeifolia. J.), foliis ovatis, integrimis, spinosis; floribus axillaribus, caule fruticoso. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. p. 180. n°. 4.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, garnies de feuilles opposées, ovales, très-entières, assez semblables à celles du calament, épineuses à leurs bords. Les fleurs sont placées dans l'aisselle des feuilles.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Herb. Juss.)

15. ACANTHE de Madras. *Acanthus maderaspatensis*. Linn.

Acanthus (blepharis boerhaviaefolia. J.), foliis quaternis, floribus axillaribus, calicibus ciliatis. Linn. Syst. veget. pag. 485.

Botanique. Supplément. Tome I.

Blepharis (boerhaviaefolia), foliis quaternis, duobus minoribus ovatis, subdentato-sinuatis; calice barbato. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 6.

Acanthus ciliaris. Burm. Flor. Ind. pag. 130. tab. 42. fig. 2.

Adhatoda maderaspatensis, calice barbato, foliis subius villosis. Petiv. Mus. pag. 23.

Ses feuilles sont médiocrement pétiolées, presque verticillées quatre par quatre, deux plus petites que les autres, ovales, sinuées, légèrement dentées; les calices barbus. (Voyez ACANTHE de Madras, n°. 5.)

16. ACANTHE à fleurs agglomérées. *Acanthus glomeratus*. Lam.

Acanthus (blepharis glomerata. J.), foliis quaternis, angustis, dentato-spinosis; floribus axillaribus, glomeratis; caule fruticoso. (Voyez ACANTHE à pelotons de fleurs, n°. 6.)

17. ACANTHE comestible. *Acanthus edulis*. Forsk.

Acanthus (blepharis edulis. J.), foliis quaternis, linearis-lanceolatis, dentato-spinosis; caule fruticoso. Vahl, Symb. 1. pag. 48.

Acanthus (edulis), foliis lanceolatis, subdentatis; spinis bractisque spinosis. Forsk. Flor. Egypt-arab. pag. 114.

Ruellia (ciliaris), foliis dentatis, ciliatis; floribus oppositis. Linn. Mantiss. pag. 89.

Ruellia (persica), foliis lanceolatis, dentatis, spinulosis; floribus oppositis. Burm. Flor. Ind. pag. 135. tab. 42. fig. 1.

Ses tiges sont droites, ligneuses, ramifiées, garnies de feuilles réunies en verticilles, quatre par quatre, inégales, glabres, lancéolées, presque linéaires, médiocrement dentées, épineuses à leurs bords, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont opposées, disposées en une épi terminal, long d'environ deux pouces, muni de bractées imbriquées, rapprochées, disposées sur quatre rangs; ovales-lancéolées, très-épineuses à leurs bords. La corolle est d'un bleu pâle, de la longueur des bractées. Le calice a trois folioles; les deux latérales subulées, très-entières; la troisième ovale, velue, nerveuse, enveloppant l'ovaire, se rétrécissant à son sommet en une sorte d'écaille oblongue, tridentée. La capsule est glabre, ovale, comprimée, à deux loges; une dent élastique à chaque loge, contenant une semence oblongue, couverte de poils roides.

Cette plante croît dans la Perse & dans l'Arabie heureuse. h Ses feuilles, au rapport de Forskhal,

M

se mangent crues ; elles sont savoureuses, assez agréables.

18. ACANTHE à feuilles de mollugine. *Acanthus molluginifolius*. Juss.

Acanthus (blepharis molluginifolia), foliis quaternis, aequalibus, ovatis, parvis ; caule procumbente, strigoso ; floribus axillaribus, solitariis. Pers. Synop. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 8.

Acanthus (repens), caule repente, hispido ; foliis quaternis, linearibus, integris, subulatis ; floribus axillaribus, solitariis. Vahl, Symb. 2. p. 76.

p. Idem, foliis lanceolatis, integerrimis.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec l'acanthé à feuilles entières ; elle en diffère par ses tiges tout-à-fait rampantes ; elles sont glabres, roides, herbacées, ligneuses à leur base, diffuses, rameuses, cylindriques, garnies de feuilles au nombre de quatre à chaque nœud, assez petites, un peu inégales, ovales, entières, légèrement ciliées à leur contour, glabres à leurs deux faces. Dans la variété *p*, ces feuilles sont étroites, plus allongées, lancéolées, très-entières. Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *γ*

19. ACANTHE à feuilles de linéaire. *Acanthus linearifolius*. Juss.

Acanthus (blepharis linearifolia. J.), foliis linearibus, longissimis, subdentatis ; caule elongato, dichotomo ; floribus inter dichotomiam. Pers. Synop. Plant. vol. 2. pag. 180. n°. 9.

Cette plante a des riges droites, allongées, divisées par dichotomies, garnies de feuilles linéaires, très-longues, légèrement dentées. Les fleurs sont situées dans la bifurcation des tiges. Elle croît au Sénégal. (*Herb. Juss.*)

Observations. On doit avoir reconnu, d'après les caractères de ces trois genres, qu'ils ont entre eux les plus grands rapports ; qu'ils ne diffèrent essentiellement que dans leur calice partagé en deux lèvres, & à quatre divisions inégales dans les acanthes ; à quatre divisions profondes & imbriquées dans les *ailivaria*. Ce calice est double dans les *blepharis* ; l'intérieur & l'extérieur à quatre divisions. On remarque dans chacun de ces genres trois bractées inégales qui enveloppent le calice. La corolle est la même pour tous trois. Son orifice est garni de poils dans les acanthes, fermé par des écailles dans les *ailivaria* & les *blepharis*, qui ont de plus le stigmate simple, divisé en deux lobes dans les acanthes. Les étamines & les capsules ont le même caractère dans les trois genres. Les deux premiers se ressemblent assez dans le port des espèces, ayant les feuilles amples, pinnatifides, plus rarement entières, sinuées, mais garnies d'épines à leur contour, à l'extrémité de leurs angles ; les fleurs disposées en un épi terminal ou axillaire, simple, allongé. Dans les *blepharis* les feuilles sont plus ordinairement simples & verticillées, quatre par quatre ; les fleurs solitaires, axillaires ou terminales ; leurs bractées plutôt ciliées qu'épineuses. Si l'on réunissoit les deux premiers genres, on ne pourroit guère se dispenser d'en séparer ce dernier.

des, plus rarement entières, sinuées, mais garnies d'épines à leur contour, à l'extrémité de leurs angles ; les fleurs disposées en un épi terminal ou axillaire, simple, allongé. Dans les *blepharis* les feuilles sont plus ordinairement simples & verticillées, quatre par quatre ; les fleurs solitaires, axillaires ou terminales ; leurs bractées plutôt ciliées qu'épineuses. Si l'on réunissoit les deux premiers genres, on ne pourroit guère se dispenser d'en séparer ce dernier.

ACANTHES (les), famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle est composée de plusieurs genres qui ont des rapports avec celui de l'acanthé qui s'y trouve compris.

Les plantes renfermées dans cette famille sont des herbes dont les feuilles sont ordinairement opposées, ainsi que les fleurs. Leur calice se divise en plusieurs découpures ; il est persistant & souvent environné de bractées ; la corolle très-ordinairement irrégulière ; les étamines, au nombre de deux ou de quatre, didynames ; le style simple, solitaire ; le stigmate à deux lobes, quelquefois simple. Le fruit consiste en une capsule libre, à deux loges, s'ouvrant avec élasticité en deux valves, dont chacune emporte avec elle la moitié de la cloison, implantée dans le milieu de chaque valve, qu'elle sépare ainsi en deux demi-loges. Des bords de cette demi-cloison sortent des appendices en forme de crochets, auxquels sont attachées des semences sans périsperme. Leur radicule est inférieure, & leurs cotylédons fœtaux.

Cette famille a de très-grands rapports avec celle des péliculaires ; elle en diffère par la structure de leurs fruits, par les valves qui se divisent en deux parties avec élasticité, & en ce que les plantes qui la composent, sont assez généralement plus grandes & plus ligneuses.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont les suivans :

1. Quatre étamines didynames.

Les acanthes.....	<i>Acanthus</i> .
Les <i>ailivaria</i>	<i>Didivaria</i> .
Les <i>blepharis</i>	<i>Blepharis</i> .
Les <i>thunbergia</i>	<i>Thunbergia</i> .
Les barbellières.....	<i>Barleria</i> .
Les ruellies.....	<i>Ruellia</i> .

II. Deux étamines.

Les carmantines.....	<i>Justicia</i> .
Les dianthères.....	<i>Dianthera</i> .

ACANTHUS. (*Voyez* ACANTHE.)

ACARNA, Willd. (*Voyez* QUENOUILLETTE.)

ACÉNA. (Voyez ACANA. Suppl.)

ACER. (Voyez ÉRABLE.)

ACERAS. M. Persoon en a fait une division du genre *Satyrium*. Il y rapporte plusieurs espèces d'*ophras* de Linné, celles qui n'ont point d'épéron distinct. (Voyez OPHRYS & SATYRIUM. Suppl.)

ACHANIA. Sw. Ait. (Voyez MAURISQUE.)

ACHAIOVAN. Prosper Alpin, dans ses *Plantes d'Égypte*, cite, sous ce nom, une herbe qui a le port & les fleurs de la camomille, que l'on emploie dans les obstructions & la jaunisse. Bauhin en fait une matricaire. Il n'en est point fait mention dans Forskhal.

ACHAIOVAN-ABIAT. Autre plante citée par Prosper Alpin, qui croît aux environs du Caire. Sa figure & sa description font croire que c'est la cinéraire maritime, & Bauhin adopte cette opinion. Elle est indiquée comme bonne dans les obstructions & les maladies des femmes. (Juss.)

ACHARIE. *Acharia*. Genre de plantes à fleurs incomplètes, monoïques, établi par Thunberg, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à deux folioles ; une corolle monopétale, velue, à trois découpures ; dans les fleurs mâles, trois étamines insérées sous les lobes de la corolle ; dans les fleurs femelles, un ovaire libre ; un style ; trois stigmates ; une capsule à une seule loge, s'ouvrant en trois valves ; une seule semence globuleuse.

Observations. Il est probable, dit M. de Jussieu, que la corolle de Thunberg n'est qu'un calice accompagné de deux bractées : la situation des étamines semble le prouver. Il faudroit voir la plante pour la rapporter avec certitude à sa famille naturelle. Elle rentrera peut-être dans celle des orties ; mais dans cette supposition, l'existence de la capsule seroit un obstacle à cette réunion, à moins que cette capsule ne soit autre chose que le calice subsistant.

ESPÈCE.

ACHARIE à trois lobes. *Acharia tragodes*. Thunb.

Acharia foliis alternis, trilobis ; pedunculis axillaribus, unifloris. (N.) Lam. Ill. tab. 755.

Acharia tragodes. Thunb. Prodr. pag. 14. Icon. — Willd. Spéc. Plant. vol. 4. pag. 327.

Plante herbacée, dont les tiges sont touffues, très-rameuses, étalées, longues d'un pied, grêles, velues, cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétioolées, divisées la plupart en trois lobes irréguliers, sinués ou dentés ; les dentelures obtuses,

plus ou moins profondes, couvertes d'un léger duvet. Les pédoncules sont solitaires, axillaires, beaucoup plus courts que les pétioles, à une seule fleur pendante. Les fleurs supérieures sont mâles, à trois étamines beaucoup plus courtes que la corolle ; les fleurs inférieures femelles : l'ovaire est libre, petit, ovale, légèrement pubescent : il lui succède une capsule ovale, à trois valves, à une seule loge, renfermant une seule semence globuleuse, inégale à sa surface.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

ACHE. (Voyez PERSIL, n°. 2.)

ACHE d'eau. (Voyez BERLE.)

ACHE de montagne. (Voy. ANGÉLIQUE, n°. 8.) (*Ligusticum levisticum*.)

ACHILLEA. (Voyez ACHILLÉE.)

ACHILLÉE. *Achillea*. Ce genre, de la famille des corymbifères, a des rapports avec les *anthemis* ; il s'en distingue par son caractère essentiel, qui consiste en

Un calice ovale, imbriqué ; cinq à dix demi-fleurs femelles & fertiles, à la circonférence ; des semences nées, placées sur un réceptacle garni de paillettes.

Le plus grand nombre des espèces qui composent ce genre sont remarquables par des fleurs petites, dont les demi-fleurs du centre sont courtes, de couleur jaune ou blanche, quelquefois purpurine, disposées en corymbes rousifs, étalés, assez souvent planes en dessus, d'un aspect agréable. Les achillées forment un genre très-naturel, à feuilles alternes, ailées, plus ou moins finement découpées, quelques-unes simples & dentées (c'étoient les *piarmica* de Tournefort). Il y a plusieurs espèces qui varient, soit par la culture, soit même dans la nature, & dont la détermination offre des difficultés, & ont occasionné quelque confusion dans les auteurs. L'*achillea millefolium* & quelques espèces qui s'en rapprochent, en sont un exemple. Presque toutes ces plantes sont originaires de l'Europe, du Levant, des îles de l'Archipel ; la plupart se trouvent sur les hautes montagnes. On en connoît à peine de l'Amérique. Elles sont presque toutes herbacées, vivaces, plus ou moins odorantes dans toutes leurs parties.

ESPÈCES.

** Les demi-fleurs jaunes.

1. ACHILLÉE visqueuse. *Achillea ageratum*. Linn.

M 2

Achillea foliis lanceolatis, obtusis, acutè serratis.
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264. — Blackw.
tab. 300.

a. *Achillea ageratum, foliis pubescentibus.*

b. *Achillea ageratum, foliis glabris, longioribus.*

Achillea ageratum, foliis oblongis, obtusis, serratis, in petiolum attenuatis, fasciculatis, glabris; corymbo compósito, subaristato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2193. n° 5.

Ageratum foliis serratis. C. Bouch. Pin. 221.

Ageratum plerisque, herbæ julia quibusdam. J. Bauh. Hist. 3. pag. 142. Ic.

Ageratum septentrionalium & anglicum. Lobel. Ic. tab. 489.

Balsamita minor. Dodon. Pempt. 295. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 38. 9. 6. tab. 1. fig. 2. 3.

v. *Ageratum, quæ agerato mesæ cognata, procerior; corymbis ex lato-albicanibus.* Linn. Hort. Cliffort. pag. 413.

Cette plante, recueillie dans son sol natal, a ses tiges droites, les rameaux roides, presque fasciculés, légèrement pubescens à leur partie supérieure; les feuilles courtes, blanchâtres, un peu pubescentes; il en est de même des pédoncules & des calices. Dans la plante cultivée, les rameaux sont souvent plus étalés, moins roides; les feuilles plus grandes, glabres, vertes; les fleurs élabres, moins serrées. (Voyez ACHILLEE, n° 2.)

2. ACHILLEE en faucille. *Achillea falcata.* Linn.

Achillea foliis linearibus, dentatis, obtusis, planis; denticulis crenatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 2194. — Reiz. Obseiv. 2. pag. 25. — Lam. Illustr. tab. 683. fig. 3.

Achillea falcata, foliis pinnatis, retusiusculis, pilosis; pinnis tripartitis, dentatis, transversis, acutè imbricatis; corymbis simplicibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2198. n° 16.

Parmia artemialis, fantolina folio; flore majore. Tournef. Coroll. pag. 37.

Ses feuilles inférieures sont fasciculées; les supérieures alternes, très-étroites, finement ailées; les innules courtes, à trois divisions profondes, blanchâtres & pileuses. (Voyez ACHILLEE, n° 3.)

3. ACHILLEE à feuilles cylindriques. *Achillea serotina* Willd.

Achillea foliis pinnatis, teretibus; corymbis pubescentibus; pinnis transversis, truncatis, acutatis, densè imbricatis; corymbo simplicibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2198. n° 15.

Cette espèce diffère de la précédente par la forme de ses feuilles non pileuses, par le jaune plus clair de ses fleurs. Ses racines sont ligneuses, ramifiées, de la grosseur d'une plume de cygne; elles produisent plusieurs tiges très-simples, hautes d'un pied, blanchâtres & pubescentes. Les feuilles sont fasciculées, longues d'un demi-pouce & plus, étroites, presque cylindriques, couvertes d'un duvet blanchâtre, ailées, à pinnules courtes, tronquées à leur sommet, munies de petites dents aiguës & serrées. Les fleurs sont disposées en un corymbe simple, terminal, de la grandeur de celles de la mille-feuille.

Cette plante croît dans la Galatie. (Descript. ex Willd.) Elle se rapproche beaucoup de l'espèce suivante; elle en diffère par ses demi-fleurs plus petites.

4. ACHILLEE imbriquée. *Achillea imbricata.* Vent.

Achillea foliis teretibus, sexfariam tuberculatis; pedunculis elongatis, unifloris. Vent. Hort. Cliff. pag. 54. tab. 54.

Cette plante paroît tenir le milieu entre les *anthemis* & les *achillea*; elle se rapproche, par ses feuilles, de l'*achillea fastuosa*, dont elle diffère par sa tige moins rameuse, par ses pédoncules à une fleur, par ses demi-fleurs plus nombreux; enfin, par la forme même de ses feuilles. Ses tiges sont droites, presque ligneuses, cylindriques, pubescentes, blanchâtres, hautes d'un pied; ses feuilles alternes, presque simples, cylindriques, héssées à leurs bords de tubercules disposés sur six rangs, couvertes d'un duvet cotonneux. Les tubercules sont de véritables folioles imbriquées, divisées chacune en trois petits lobes ovales, obtus, munis sur leurs bords de cils cartilagineux.

Les tiges & les rameaux se terminent par des pédoncules simples, très-allongés, droits, cylindriques, pubescens, soutenant une fleur assez grande, radiée, d'un jaune-doré, accompagnée de deux ou trois bractées membraneuses, ovales, concaves, aiguës; les écailles calicinales glabres, luisantes, ovales, obtuses; les intérieures plus allongées, relevées en dehors d'une nervure saillante; les demi-fleurs, au nombre de quatorze, femelles & fertiles, ovales, obtus, à trois dents peu apparentes; les semences enveloppées dans une paillette de couleur brune, concave, oblongue, aiguë.

Cette plante a été découverte dans la Perse par MM. Bruguère & Olivier. (V. f.)

5. ACHILLEE fantoline. *Achillea fantolina.* Linn.

Achillea foliis fascicatis, dentatis; denticulis sub-

integra, subulatis, reflexis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264.

Achillea santolina, foliis pinnatis, subtomentosis; pinnis tripartitis, transversis, distantibus; lacinias tridentatis, caule ramoso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2199. n° 18.

Dans cette espèce, qui se rapproche beaucoup de l'*Achillea tenuifolia*, les feuilles ont leurs pinnules distantes, fort petites, point imbriquées, à trois découpures souvent tridentées. (Voyez ACHILLÉE, n° 1.)

6. ACHILLÉE à feuilles menues. *Achillea tenuifolia*. Lam.

Achillea foliis linearibus, dentato-pinnatis, subulbidis; corymbis simplicibus; floribus minimis; caule ramoso, pauciculato. (N.)

Achillea (tenuifolia), foliis pinnatis, subtomentosis, pinnis tripartitis, obtusis, integerrimis, transversis, imbricatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2199. n° 17.

La plante mentionnée par Willdenow paroît offrir quelques différences, qui font douter qu'elle soit la même que celle citée ici par M. de Lamarck. Les feuilles sont tomenteuses, principalement les inférieures; les pinnules à trois divisions profondes, obtuses, très-entières. Les demi-fleurs sont courts & jaunes dans les deux plantes; les fleurs disposées de même. (Voyez ACHILLÉE, n° 11.)

7. ACHILLÉE en corne de cerf. *Achillea coronopifolia*. Willd.

Achillea foliis pubescentibus, pinnatifidis; lacinias lanceolatis, serratis; corymbo compositis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2199. n° 8.

Achillea foliis pinnatifidis, dentatis, glabris. Willd. Ach. pag. 18. n° 9. tab. 1. fig. 2.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi, striées, rameuses, pubescentes, un peu anguleuses, garnies de feuilles sessiles, lancéolées, pinnatifides, glabres à l'œil nu, mais pubescentes vers à la loupe; les découpures lancéolées, dentées en scie; les feuilles radicales presque deux fois pinnatifides. Les fleurs sont disposées en un corymbe raméux; les demi-fleurs de couleur jaune, de la grandeur de ceux de la mille-feuille.

Cette plante croît dans le Levant. (Description, ex Willd.)

8. ACHILLÉE gerberi. *Achillea gerberi*. Willd.

Achillea foliis caulibus pinnatifidis; lacinias integerrimis, radicalibus pinnatifidis; lacinias trifidis; corollis radii vix calice majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2196. n° 10.

Achillea foliis linearibus, pinnatifidis, pubescentibus, petiolatis; foliis incisae, calicibus oblongis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 198. tab. 83. fig. 2.

Cette espèce a ses tiges hautes de trois ou quatre pouces, rameuses, ascendantes, diffuses, légèrement pubescentes; les feuilles radicales & inférieures linéaires, pinnatifides; les découpures petites, oblongues, trifides; les feuilles caulinaires linéaires, pinnatifides; les découpures très-courtes, oblongues, très-entières. Les fleurs sont très-ferrées, disposées en corymbes simples, presque en ombelle, peu garnis; les demi-fleurs environ au nombre de dix, fort petits, à peine plus longs que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Description, ex Willd.)

9. ACHILLÉE pileuse. *Achillea pilosa*. Willd.

Achillea foliis pinnatifidis, subul pilosis; lacinias lanceolatis, infimis bipartitis; corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2196. n° 11.

Achillea foliis pinnatis, subul pilosis; pinnis integris bifidisque. Willd. Ach. pag. 31. n° 19.

Ses tiges sont droites, pubescentes, hautes d'un demi-pied; ses feuilles alternes, distantes, linéaires, à peine longues d'un pouce, pubescentes, pinnatifides, pileuses en dessous; leurs découpures lancéolées, un peu aiguës; les feuilles supérieures entières, les inférieures partagées en deux. Les fleurs sont nombreuses, disposées en un corymbe rameux.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Description, ex Willd.)

10. ACHILLÉE à feuilles de camomille. *Achillea anthemioideae*. Willd.

Achillea foliis pinnatis, pubescentibus; pinnis linearibus, integerrimis, obtusis; inferioribus longioribus; cymis simplicibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2200. n° 19.

Achillea santolina. Hortulano.

Ses tiges sont hautes de six à huit pouces, pubescentes, rameuses, ascendantes, garnies de feuilles alternes, pubescentes, pileuses, ailées, composées de pinnules linéaires, intimement plus longues du sommet à la base; obtuses, très-entières, quelquefois muries, à leur bord supérieur, d'une dent courte, obtuse. Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe simple; les demi-fleurs courts.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive dans quelques jardins de l'Europe. (Description, ex Willd.)

11. ACHILLÉE d'Égypte. *Achillea aegyptiaca*. Linn.

Achillea foliis pinnatis, tomentosis; pinnis subrotundis, obtusè dentatis; corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2203. n°. 24.

Achillea foliis pinnatis; foliolis obtusè lanceolatis, serrato-dentatis. Linn. Hort. Cliff. 413. — Gmel. Itin. ? pag. 178.

Achillea fontanicum, aegyptiacum. C. Bauh. Pin. 136.

Achillea aegyptiacum. Dodon. Pempt. pag. 25. Icon. (Voyez ACHILLEE d'Égypte, n°. 8.)

11. ACHILLEE bipinnée. *Achillea bipinnata.* Linn.

Tenacetum (myriophyllum), foliis bipinnatis, tomentosissimis; pinnulis culinorum dentatis, radicalium integerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2814. n°. 17.

Parmica orientalis, incana, foliis pinnatis, semis-folialis, v. x confusis. Tournef. Cor. 38.

Ses tiges sont droites, striées, un peu pubescentes, légèrement anguleuses; les feuilles planes, allongées, deux fois aîlées, blanchâtres, pubescentes; les folioles petites, ovales, presque arrondies, obtusés, entières; les fleurs disposées en un corymbe terminal, médiocrement ramifié; les calices ovales, à peine pubescens; les écailles ovales, concaves, jaunâtres; les demi-fleurs jaunes, d'une grandeur médiocre. (Voyez ACHILLEE, n°. 7.)

12. ACHILLEE auriculée. *Achillea auriculata.* Willd.

Achillea foliis pinnatis, tomentosis; pinnis oblongis, basi sursum auriculatis, obtusè dentatis, extimis confluentibus; corymbo composito, coarctato; radio calice oviforme. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2203. n°. 25.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied, cylindriques, tomenteuses, garnies de feuilles alternes; les inférieures pétioles, tomenteuses, longues de deux ou trois pouces, ailées, composées de pinnules longues de six lignes, oblongues, auriculées un peu au dessus de leur base, à dentelures obtuses; celles de l'extrémité confluentes; les feuilles supérieures sessiles, longues d'un pouce, pinnatifides; les lobes allongés, presque entiers. Les fleurs sont nombreuses, disposées en corymbes rameux & serrés; les demi-fleurs à peine plus longues que le calice.

Cette plante croît dans le Levant. x (Descript. ex Willd.)

14. ACHILLEE pauciflore. *Achillea pauciflora.* Lam.

Achillea (pauciflora), foliis bipinnatis, tomen-

tosis; pinnis linearibus, integerrimis, obtusis; corymbo subquadrifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2204. n°. 27.

La plante que Willdenow rapporte à celle de M. de Lamarck, offre quelques différences. Ses tiges sont médiocrement ligneuses à leur base; les rameaux très-simples, longs de quatre à six pouces, tomenteux; les feuilles tomenteuses & soyeuses, à pinnules linéaires, obtusés; les fleurs disposées en un corymbe d'environ quatre fleurs assez grandes. Les calices sont tomenteux, hémisphériques.

Cette plante croît dans le Levant & en Espagne; elle varie dans la grandeur. (Voyez ACHILLEE, n°. 9.)

15. ACHILLEE à fleurs d'or. *Achillea aurea.* Lam.

Achillea foliis bipinnatis, tomentosis; pinnis linearilanceolatis, dentatis; corymbo simplici, pedunculis elongatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2205. n°. 28. (Voyez ACHILLEE, n°. 10.)

16. ACHILLEE eupatoire. *Achillea eupatorium.* Willd.

Achillea foliis bipinnatifidis, cano-pubescentibus; laciniis linearilanceolatis, serratis; corymbo composito, globofo; floribus fasciculatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2205. n°. 29.

Achillea villosa, foliis pinnatis; pinnulis planopatientibus, inciso serratis, basiliore, decurrentibus; corymbis convexis, amplissimis; floribus radio destitutis. Mart. hall. ad Bierberlein Casp. pag. 119. n°. 38. (Exclus. synonym. Tournef.)

Parmica orientalis, foliis tenacit; incanis; flore aureo. Buxbaum. Centur. 2. pag. 25. tab. 19. Non Tournef.

Cette espèce paraît se rapprocher beaucoup de la précédente; mais les fleurs sont privées de demi-fleurs, soit qu'ils avortent ou qu'ils se convertissent en fleurs. Les feuilles ressemblent à celles de la saussure; elles sont blanchâtres & pubescentes. Les corymbes sont amples, ramifiés, ramassés en têtes globuleuses.

Cette plante croît sur les bords de la mer Caspienne, dans les sols pierreux & sablonneux.

17. ACHILLEE à fleurs serrées. *Achillea coarctata.*

Achillea (compakta), foliis bipinnatifidis, setaceo-villosis; laciniis lanceolatis, integerrimis; corymbo composito, coarctato; floribus fasciculatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2206. n°. 30. — Non achillea compacta. Lam.

Cette achillee a, comme la précédente, les

Heurs uniquement composées de fleurons. Ses tiges sont heracées, un peu ligneuses à leur base; les rameaux pubescens; les feuilles deux fois aîlées, lancéolées, longues de deux ou trois pouces; couvertes de poils soyeux; les pinnules pinnatifides, longues d'un demi-pouce; les découpages éruées, lancéolées, droites, très-entières, munies quelquefois d'une dent à leurs bords. Les corymbes sont touffus, rameux, composés de beaucoup de fleurs jeunes.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ♀

18. *ACHILLEE pubescens*. *Achillea pubescens*. Linn.

Achillea foliis pinnatis; foliis lanceolatis, incisjs, serratis, subtus lanigeris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264.

Achillea pubescens, foliis bipinnatifidis, pubescentibus; laciniis linearilanceolatis, inaequalibus, acutiusculis; corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2206. n°. 31. (Voyez *ACHILLEE*, n°. 5.)

19. *ACHILLEE à petites fleurs*. *Achillea micrantha*. Willd.

Achillea foliis bipinnatifidis, pubescentibus; laciniis lanceolatis, integerrimis; corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2209. n°. 37.

Achillea foliis pinnatis, pubescentibus; pinnis laciniatis, radio minimo. Willd. Achill. pag. 33. n°. 22. (Exclus. synonym. & descript.)

Millefolium orientale, cretium, lucum. Tournef. Coroll. pag. 37.

Ses tiges sont garnies de feuilles alternes, deux fois aîlées, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, pubescentes, composées de pinnules à trois découpages lancéolées, très-entières. Les fleurs sont d'un jaune-foncé; elles forment un corymbe lâche, ramifié. Le calice est oblong; les demi-fleurons sont petits.

Cette plante croît dans la Cappadoce. ♀ (Descript. ex Willd.)

20. *ACHILLEE cotonneuse*. *Achillea tomentosa*. Linn.

Achillea foliis pinnatis, hirsutis; pinnis linearibus, densatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1264. — Gmel. Itin. vol. 1. pag. 137. tab. 25. fig. 2.

Achillea tomentosa, foliis bipinnatifidis, villosis; pinnis confertissimis; laciniis linearilanceolatis, integerrimis; corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2209. n°. 38.

Achillea foliis hirsutis, pinnatis; pinnis aquilibus, pinnatis; pinnulis integris & trifidis; floribus laetis, umbellatis. Haller, Helv. n°. 106.

Stratiotes millefolia, flavo flore. Clus. Hist. 1. pag. 330. fig. 2.

5. *Eadem, pygmaea, caule humili, simplici*.

Cette plante varie dans sa grandeur. Quelquefois ses tiges acquièrent jusqu'à un pied de haut: on en trouve aux environs de Grenoble, sur les bords de la Drac, une variété dont les tiges sont très-simples, hautes à peine d'un ou de deux pouces. Les feuilles sont beaucoup plus tomenteuses. Cette dernière plante m'a été communiquée par M. de Foucault. (Voyez *ACHILLEE*, n°. 4.)

21. *ACHILLEE à calice cylindrique*. *Achillea cylindrica*.

Achillea (ochroleuca), foliis subbipinnatifidis, pinnis basibus indivisis, laciniis linearilanceolatis, corymbo composito, calicibus cylindricis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2210. n°. 39.

Achillea ochroleuca, caulibus tomentosis, floribus sterilibusque; foliis pinnatifido-pinnatis; pinnis subincisis, basin versus plerumque nullis; corollis ochroleucis. Ehrh. Beitr. vol. 7. pag. 166.

Ses tiges sont tomenteuses; les feuilles pubescentes, aîlées, presque toutes pétioolées, excepté celles du haut, qui sont sessiles. Les pinnules pinnatifides, les inférieures entières; les découpages linéaires, lancéolées, très-entières. Les fleurs sont d'un jaune-foncé, disposées en un corymbe terminal & ramifié. Leur calice est cylindrique.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive dans quelques jardins de l'Europe. ♀ (Descript. ex Willd.)

22. *ACHILLEE à feuilles d'auronne*. *Achillea abrotanifolia*. Linn.

Achillea foliis pinnatis, supra decompositis; laciniis linearibus, distantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1265. — Miller. Dict. n°. 5.

Achillea abrotanifolia, foliis bipinnatis, pubescentibus; pinnulis tenuissimis, linearibus, integerrimis, distantibus; corymbis compositis, fastigiatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2213. n°. 45, & Achill. pag. 46. n°. 30.

Ses calices sont presque globuleux; les demi-fleurons de la circonférence un peu arrondis, au nombre de cinq ou six, divisés en trois dents à leur sommet. (Voyez *ACHILLEE*, n°. 6.)

23. *ACHILLEE à feuilles de filipendule*. *Achillea filipendulina*. Lam.

Achillea foliis pinnatis, subglabris; pinnulis dentatis, distantibus; corymbis brevibus, compactis; radio minimo. (N.)

Tanacetum (angulatum), foliis pinnatifidis;

lacinis lanceolatis, serratis; corymbo cœmbo, calicibus angulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1811. n°. 8.

Cette plante, d'après Willdenow, doit être placée parmi les *tenactum*. (Voy. ACHILLEE, n°. 12.)

24. ACHILLÉE couchée. *Achillea decumbens*. Lam.

Achillea foliis pinnatis; pinnis brevibus, obtusis, mucronatis, subterfatis; corymbis laxis; radio brevi, tridentato; calicibus prostratis. (N.) (Voyez ACHILLÉE, n°. 13.)

* * Les demi-fleurs blanches ou roses.

25. ACHILLÉE à feuilles d'estragon. *Achillea dracunculoides*. Hort. Paris.

Achillea foliis integris seu subserratis, linearibus, glabris, acutis, subsessilibus; corymbo laxo; radio nivo, maximo. (N.)

Achillea (leucanthemum), foliis integerrimis, linearibus; caule ramosissimo; ramis virgatis, foliosis; foliulis radii multis, calice majoribus. Pers. Synops. Plant. vol. 2. pag. 467. n°. 1.

Cette plante a des tiges droites, glabres, cylindriques, un peu anguleuses, divisées en rameaux nombreux, effiles, garnis de feuilles très-simples, épaisses, linéaires, étroites, entières ou finement denticulées, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, la plupart rétrécies à leur base en pétioles courts. Les fleurs sont d'un blanc de neige, disposées en un corymbe lâche, terminal; les pédoncules presque simples, glabres, filiformes; les calices glabres, ovales, d'un jaunepâle; les écailles brunes à leurs bords; les demi-fleurs remarquables par leur grandeur, un peu crénelées à leur sommet, obtus, presque tronquées.

Cette plante croît sur le mont Caucase. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

26. ACHILLÉE lingulée. *Achillea linguata*. Waldf.

Achillea foliis oblongo-linearibus, obtusis, duplicato serratis, pubescentibus, ciliatis; caule villosa. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2190. n°. 1.

Achillea foliis lingulatis, hirsutis, inequaliter serratis; radicalibus petiolatis, floribus corymbosis. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hung. vol. 1. p. 2. tab. 2.

Ses tiges sont droites, velues, garnies de feuilles simples, alternes, oblongues, linéaires, en forme de languette, pubescentes, ciliées à leurs bords, obtuses à leur sommet, munies à leur contour d'un double rang de dentelures inégales, en scie ;

les feuilles radicales pétiolées. Les fleurs sont blanches, plus grandes que celles de l'*achillea ptarmica*, disposées en un corymbe presque umbellé & terminal.

Cette plante croît en Hongrie, sur les hautes montagnes. 7

27. ACHILLÉE à feuilles en coin. *Achillea cuneifolia*. Lam.

Achillea (herba rota), foliis linearibus, basi attenuatis, serratis cauleque glabris Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2191. n°. 2.

Achillea foliis integris, basi cœatis, apice obtusis; caule declinato. Villars, Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 255.

Pteris alpinus altera, floribus minus compactis. Tournef. Inst. R. Herb. 497.

Herba rota. J. Bauh. Hist. 3. pag. 144. (Voyez ACHILLÉE, n°. 21.)

28. ACHILLÉE serratatoire. *Achillea ptarmica*. Linn.

Achillea foliis lanceolatis, acuminatis, argutè serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1266. — Oeder. Flor. dan. tab. 643. — Læw. Eit. tab. 118. — Blackwel, tab. 276. — Lam. Illustr. tab. 683. fig. 2.

Achillea foliis linearibus, acuminatis, equaliter argutè serratis, glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2191. n°. 3.

Dracunculus pratensis, serrato folio. C. Bauh. Pin. 98. — Morif. Oxon. Hist. 5. §. 6. tab. 12. fig. 1. — Petiv. Herb. tab. 19. fig. 3.

9. *Pteris vulgaris, flore pleno.* Clus. Hist. 2. pag. 12. fig. 2. — Kniph. Centur. 5. n°. 2.

Achillea multiplex. Ren. Flor. orn. 78.

7. *Achillea pubescens, caule subliguloso.* Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 211.

Achillea pyrenaica. Sibthorp. Mff. in herb. Lhé. 8. *Achillea linearis, foliis linearibus.* Decand. l. c.

Parmi les variétés de cette plante on distingue celle à fleurs doubles, cultivée dans les jardins sous le nom de *bouton d'argent*. Tous ses fleurons sont bériles & se convertissent en demi-fleurons. Elle a été trouvée sauvage aux environs de Barège, par M. Ramond. La variété 7, originaire des Pyrénées, a ses tiges presque ligneuses & ses feuilles pubescentes, trois fois plus courtes, mais de même largeur que dans la plante ordinaire. On observe sur leur face inférieure, des glandes visibles à l'œil nu. Les fleurs sont peu nombreuses. M. Decandolle la soupçonne une espèce distincte.

La

La variété δ a f. ses feuilles plus étroites, glabres & linéaires. (Voyez *ACHILLEA*, n° 19.)

29. *ACHILLEA* élégant. *Achillea speciosa*. Henck.

Achillea caule tetragono, pubescente; foliis lanceolatis, argute serratis, basi grossi dentatis, utrinque pubescentibus. Henck. Adumb. Plant. pag. 1.

Cette espèce se rapproche de l'*achillea ptarmica*; elle en diffère par ses tiges tétragones & pubescentes; par ses feuilles presque amplexicaules, pubescentes à leurs deux faces, à crêtes dentelées à leur base. Ses racines sont fusiformes; les tiges rameuses, hautes de trois pieds; les feuilles sessiles, alternes, lancéolées, dentées en scie, aiguës; les dentelures arquées, rudes, membraneuses, aiguës. Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires, terminaux, inégaux, peu garnis; les ramifications d'otomes; les fleurons du disque jaunes, nombreux; les demi-fleurons blancs, rabattus. Le calice est grand, hémisphérique, composé d'écaillies oblongues, imbriquées; les extérieures à côtes saillantes, membraneuses à leurs bords. Le réceptacle est garni de paillettes lacéolées, membraneuses, de la longueur des fleurons; les semences nues, ovales, tronquées.

Son lieu natal n'est point connu; elle est cultivée dans quelques jardins botaniques. γ

30. *ACHILLEA* à crêtes. *Achillea cristata*. Retz.

Achillea foliis linearibus, planis, acuminatis, dentatis; dentibus emarginatis, transversis, ciliato-serratis; caule ramoso, diffuso, superne pubescente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2192. n° 4.

Parmica cristata, foliis linearibus, serratis; serraturis transversis, cristatis; caule ramoso, debili. Retz. Observ. bot. pars 2. pag. 25.

Parmica linearifolia, angustifolia, cum margine particulariter crenato, & veluti squamoso; floribus albis. Mich. Hort. Flor. 77. n° 5.

Ses tiges sont très-rameuses, glabres à leur partie inférieure, blanchâtres & pubescentes vers leur sommet, obtusément anguleuses; les rameaux foibles, simples, étalés, rabattus, pubescens, garnis de feuilles étroites, linéaires, acuminées à leur sommet, dentées en scie; les dentelures transverses, un peu arrondies, échancrées ou trifides; ces secondes dentelures ciliées, serrées contre les feuilles. Les fleurs sont blanches, disposées en corymbes lâches, simples, terminaux; les calices presque globuleux.

Cette plante croît en Italie. γ (Descript. ex Willd.)

31. *ACHILLEA* des Alpes. *Achillea alpina*. Linn.

Achillea foliis lanceolatis, dentato-serratis; dentibus. Botanique. Supplément. Tome I.

ciculis tenuissimè serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1266. — Miller, Dict. n° 14.

Achillea (alpina), foliis linearibus, pedinato-pinnatifidis, globosis; laciniis subserratis, corymbo composito. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2193. n° 6.

Achillea (cristata), foliis pedinato-pinnatifidis, argute serratis, globosis. Willden. Achill. pag. 17. n° 8: (Exclus. synonym. Retz.)

Achillea foliis semipinnatis, pinnulis minutissimè serratis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 196. — Halier, Helv. n° 116.

Achillea elatior, foliis pinnatis, pinnulis minutissimè serratis. Vaill. Aët. Paris. 1720. n° 10.

Parmica alpina, millefolii folio. Boccon. Mus. pag. 144. tab. 101.

3. *Achillea (alpina), foliis integris, lanceolatis, brevissimè petiolatis, serratis; serraturis serrulatis*. Willd. Achill. pag. 12. n° 4.

Cette plante varie dans son port & dans ses feuilles: celles-ci ont souvent leurs dentelures un peu denticulées en scie. Les fleurs sont quelquefois rougeâtres. (Voyez *ACHILLEA*, n° 17.)

32. *ACHILLEA* à fleurs jaunes & blanches. *Achillea ochroleuca*. Walld.

Achillea (pedinata), foliis pedinato-pinnatifidis; laciniis linearibus, integerrimis; corymbo composito, coarctato; caule pubescente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2197. n° 13. Non Lam.

Achillea (ochroleuca), cano-tomentosa, foliis linearibus, pinnato-pinnatis; foliolis brevissimis, integerrimis; corymbis florum densissimis. Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. vol. 1. pag. 33. tab. 34. (Exclus. synonym. Erhart.)

Achillea (chamæmelifolia), foliis pedinato-pinnatifidis; laciniis linearibus, integerrimis; corymbo composito, subnudo, coarctato. Decand. Synop. pag. 292. & Flor. franç. vol. 3. pag. 212. — Pourr. Aët. tolos. vol. 3. pag. 305.

Cette plante, dans son lieu natal, est couverte sur toutes ses parties d'un duvet blanchâtre, tomenteux; elle devient presque glabre lorsqu'elle est cultivée, excepté dans la jeunesse. Les feuilles caulinaires inférieures sont pétiolées; les supérieures presque sessiles, pétiolées, presque pinnatifides, linéaires, subulées, très-entières. Les fleurs sont disposées en un corymbe serré & raméux, les demi-fleurons de la grandeur de ceux de l'*achillea nobilis*.

Cette plante croît en Hongrie, aux lieux sablonneux. γ

37. ACHILLÉE à feuilles en scie. *Achillea serrata*. Willd.

Achillea foliis tomentosis, lineari-lanceolatis, pinnatifidis; laciniis basi profundioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2194. n° 7.

Achillea foliis lineari-lanceolatis, sessilibus, tomentosis, profunda serratis, basi laciniatis. Retz. Obscrv. bot. 2. pag. 25.

Pharmica alpina, incana, serratis foliis. Herm. Lugd.-Bat. 694.

Draconculis alpinus, agerati foliis serratis. Rai. Hist. 1. pag. 344.

Achillea serrata? Lam. Dist. 1. pag. 28. n° 20.

Ses tiges sont chargées de feuilles sessiles, linéaires, lancéolées, tomenteuses & blanchâtres à leurs deux faces, pinnatifides; les feuilles caulinaires profondément dentées ou médiocrement pinnatifides; les découpures oblongues, aiguës, très-entières; les inférieures plus profondes. Les jeunes feuilles & les supérieures ne sont que dentées en scie. Les fleurs sont blanches, disposées en un corymbe simple, terminal.

Cette plante croît dans la Suisse. Elle me parait être la même que l'ACHILLÉE n° 20.

34. ACHILLÉE à feuilles planes. *Achillea clavennae*. Linn.

Achillea foliis laciniatis, planis, obtusis, tomentosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1266. — Jacq. Vindob. 177, & Flor. austr. tab. 76.

Achillea clavennae, foliis tomentosis, pinnatifidis; laciniis linearibus, obtusis, summis apice subdentatis; corymbo simpliciter. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2195. n° 9.

• *Achillea foliis obovatis, incisif, tomentosis*. Willd. Achill. pag. 19. n° 5.

Achillea foliis tomentosis, longe petiolatis, palmatis. Haller, Helv. n° 114.

Abies humilis, alpinus, umbelliferum, latifolium. C. Bauh. Pin. 139. — Clus. Hist. 1. pag. 340. Ic. & Pann. pag. 555. tab. 554.

Abies humilis, alpinus, capensis squarrosa. J. Bauh. Hist. 3. pag. 141. Ic.

Draconculis alpinus, argenteus, foliis abies humilis. Morf. Oxon. Hist. 3. pag. 40. §. 6. tab. 10. fig. 5.

5. *Achillea (capensis)*, foliis profunde pinnatifidis, tomentosis; pinnis dentatis, umbellato-capensis. Willd. Achill. pag. 15. n° 7. tab. 1. fig. 1.

Achillea humilis, incana, nemorosifolia, flore candido. Vaill. Act. 1720. n° 14.

Pharmica humilis, foliis laciniatis, abies humilis. Tournef. Inst. R. Herb. 496.

Ses fleurs sont disposées en un corymbe simple, presque en ombelle; les feuilles luitantes; les radicales pétiolées. On y distingue quelques variétés. (Voyez ACHILLÉE corne de cerf, n° 27.)

35. ACHILLÉE argentée. *Achillea argentea*. Lam.

Achillea foliis sericeo-argenteis, apice pinnatis; pinnulis linearibus, subintegris; caulis subsimpliciter, subvillosa. (N.)

Tanacetum (argenteum), foliis pinnatis, sericeo-tomentosis; pinnis lanceolatis, apice subdentatis; corymbo terminali. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n° 7, & Achill. pag. 51. tab. 2. fig. 4.

Willdenow croit que cette espèce est mal rangée parmi les *achillea*; il la rapporte aux *tanacetum*. (Voyez ACHILLÉE, n° 28.)

36. ACHILLÉE impatiente. *Achillea impatiens*. Linn.

Achillea foliis pinnatis; pinnis flantibus, lineari-lanceolatis, basi sursum acutis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1266.

Achillea foliis pinnatis-pinnatifidis, glabris; laciniis linearibus acutis, inferioribus bipartitis; corymbo simpliciter. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2196. n° 12. (Voyez ACHILLÉE de Sibérie, n° 16.)

37. ACHILLÉE bosculeuse. *Achillea bosculosa*. Hort. Paris.

Achillea foliis lanceolatis, inferioribus pinnatifidis, glabris; laciniis serratis; summis serratis, sublinearibus. Pers. Synops. Plant. vol. 2. pag. 467.

Cette espèce est remarquable par ses fleurs blanches, uniquement composées de fleurons. Ses feuilles sont glabres, lancéolées; les inférieures pinnatifides, à découpures dentées en scie à leurs bords; les supérieures, presque linéaires, finement dentées en scie; les fleurs disposées en un corymbe ample, touffu; les calices ovales, épais, blanchâtres, à peine pubescents.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ignore son lieu natal. (V. §.)

38. ACHILLÉE écarlate. *Achillea squarrosa*. Ait.

Achillea foliis lanceolato-linearibus, pinnatifidis; pinnis ovato-cuneiformibus, incisio acuminatis, verticillibus; caule villosissimo. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 242.

Achillea squarrosa, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-cuneatis, inaequaliter dentatis, verticillatis

floris ; corymbis simplicibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2197. n°. 14.

Ses tiges sont ascendantes, hautes d'un pied, cylindriques, pubescentes, striées, garnies de feuilles linéaires lancéolées, pinnatifides, presque glabres, longues d'un pouce & demi ; les découpures petites, oblongues, presqu'en coin, trifides ou inég. l. ment dentées, ouvertes verticalement. Les fleurs sont blanches, de la grandeur de celles de la mille-feuille, disposées en un corymbe simple à l'extrémité des tiges & des rameaux.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. 7

39. ACHILLEE à écailles noires. *Achillea atrata*. Linn.

Achillea foliis pinnatis, pedicatis, integrifoliis ; pedunculis villosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1267. — Jacq. Vind. 157, & Flor. austr. tab. 77.

Achillea atrata, foliis pedinato pinnatis, glabris ; pinnis linearibus, acuminatis, subsimplicibus ; cyma simplici, pedunculis pubescentibus, caule simplicissimo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2200. n°. 20.

Achillea foliis glabris, pinnatis ; pinnis simplicibus & multifidis. Haller, Helv. n°. 111.

Chamaemelum alpinum, saxatile, perenne ; flore albo, singulari ; calice nigricante. Till. Pl. tab. 19.

Matricaria alpina, chamomillefolia. C. Bauh. Pin. 134. — Scheuz. Itin. 4. pag. 338.

Les fleurs sont grosses, presque globuleuses ; les calices hémisphériques ; les demi-fleurs assez grands, un peu denticulés à leur sommet. (Voyez ACHILLEE à feuilles de camomille, n°. 25.)

40. ACHILLEE musquée. *Achillea moscata*. Jacq.

Achillea foliis pinnatis, pinnulis simplicibus, floribus umbellatis. Jacq. Flor. austr. vol. 5. Append. tab. 33. — Allion. Flor. pedem. n°. 662. — Murr. Syst. veget. pag. 778.

Achillea moscata, foliis pedinato-pinnatis, glabris ; pinnis linearibus, obtusifoliis, integerrimis, punctatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2201. n°. 21, & Achill. pag. 28. n°. 17.

Achillea (livida), foliis linearibus, pinnatis, punctatis ; floribus corymbosis. Scopol. del. Flor. & Faun. Insab. n°. 3. tab. 3.

Achillea Genipi. Murr. Appar. Med. 1. p. 68.

Achillea foliis pinnatis ; pinnis simplicibus, glabris, punctatis. Haller, Helv. n°. 112.

Tanacetum alpinum, odoratum. Scheuz. Itin. 2. pag. 142, & 6. pag. 143.

Dracunculus alpinus, argenteus, alatis foliis. Moris. Oxon. Hist. 3. p. 111. §. 6. tab. 80. fig. 7.

Iva moscata. Gefn. Epist. 66.

Cette plante répand une odeur pénétrante, assez agréable. Ses racines sont brunes, presque ligneuses, elles produisent plusieurs riges droites ou ascendantes, glabres ou légèrement pubescentes, longues de huit à dix lignes, garnies de feuilles presque sessiles, glabres ou à peine pubescentes, pinnatifides ; les pinnules linéaires, opposées, entières, distantes, régulières, à peine aiguës ; quelquefois munies d'une petite dent vers leur base, au nombre de cinq à six sur chaque côté. Les fleurs sont peu nombreuses, disposées sur un petit corymbe simple, terminal, un peu serré ; les écailles calicinales un peu jaunâtres, brunes à leur contour ; les demi-fleurs elliptiques, dentés à leur sommet.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, en Italie, &c. 7 (V. f.)

41. ACHILLEE naine. *Achillea nana*. Linn.

Achillea foliis pinnatis, dentatis, hirsutissimis ; floribus glomerato-umbellatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1267. — Allion. Flor. pedem. n°. 663. tab. 9. fig. 3. — Mill. Dict. n°. 2.

Achillea nana, foliis pinnatis, villosis ; pinnis linearibus, integerrimis, foliorum inferiorum dentatis. Willd. Achill. pag. 29. n°. 18.

Achillea nana, foliis pinnatis, villosis ; pinnis dentatis, linearibus, radicalibus bipinnatis, caule simplicissimo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2202. n°. 22.

Achillea foliis tomentosis, pinnatis ; pinnis simplicibus & incisis. Hall. Helv. 2. n°. 113.

Millefolium alpinum, incanum, flore specioso. J. Bauh. Hist. 3. pag. 138. — Tourn. Inst. R. Herb. 456. — Rai, Hist. 347.

Millefolium alpinum, tomentosum, odoratum, nanum. Boccon. Mus. 2. pag. 166. tab. 120.

Achillea lanata. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 640.

Cette plante ressemble beaucoup, par son port, à l'*Achillea tomentosa*, var. 8 ; mais les demi-fleurs sont blancs ; les fleurs jaunes, séparés par des écailles brunâtres à leur sommet. (Voyez ACHILLEE laineuse, n°. 22.)

42. ACHILLEE de Crète. *Achillea cretica*. Linn.

Achillea foliis linearibus ; pinnis subrotundis, retrosum imbricatis ; caule tomentoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1268.

Achillea cretica, foliis pinnatis, pubescentibus ; pinnis subrotundis, quadrifidis, concavis, patulis ; caule apice ramoso. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 2202. n°. 23, & Achill. pag. 26. n°. 16.

N 2

Millefolium incanum, ereticum, foliis fuscatis ferratis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 39. §. 6. tab. 11. fig. 12.

Millefolium incanum, ereticum. C. Bauh. Pin. 130. & Prodr. 72.

Millefolium ereticum. J. Bauh. Hist. 3. pag. 139.

Millefolium ereticum, stratiotes millefolia eretica. Prosp. Alp. Exot. pag. 84. tab. 83.

Astragalus femina, incanum, albo achillea flore, ereticum. Boccon. Mus. 2. tab. 34.

Ses tiges sont ascendentes, tomenteuses, cylindriques & rameuses à leur partie supérieure; les feuilles longues d'un pouce & plus, étroites, pubescentes, tomenteuses sur leurs principales nervures; les cotyles simples & terminaux. (Voyez ACHILLEE, n°. 29.)

43. ACHILLEE à grandes feuilles. *Achillea macrophylla.* Linn.

Achillea foliis pinnatis, planis, inciso-ferratis; extremis majoribus, cordonatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1265. — Mill. Dict. n°. 11.

Achillea macrophylla, foliis pinnatis, glabris; pinnis lanceolatis, inciso-ferratis, extremis confluentibus; corymbis compositis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2204. n°. 26; & Achill. pag. 20. n°. 11.

Achillea foliis pinnatis, planis, inciso-ferratis; extremis confluentibus. Hall. Helv. n°. 115.

Dracunculus alpinus, foliis scabiosis. C. Bauh. Pin. 58; & Prodr. 39.

Millefolium tanacetifolius, flore albo. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 38. §. 6. tab. 11. fig. 3. (Voyez ACHILLEE, n°. 14.)

44. ACHILLEE à feuilles de bacille. *Achillea erichmifolia.* Waldf.

Achillea foliis pubescentibus, caulinis bipinnatifidis; laciniiis linearibus, obtusis; radicalibus bipinnatis, pinnulis tripartitis, corymbis compositis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2207. n°. 32.

Achillea erichmifolia, foliis triplicato-pinnatis, pinnulis linearibus squamiformibus; calicis obtusis, corymbis sessilibus. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hung. vol. 1. pag. 18. tab. 66.

Cette plante est couverte, sur toutes les parties, d'un duvet blanc hâre, & de petits poils couchés. Ses feuilles radicales sont deux fois ailées; leurs pinnules linéaires, à trois découpures obtuses; les feuilles caulinaires deux fois pinnatifides, à découpures linéaires, obtuses. Les fleurs sont disposées en un corymbe sessile; les écailles du calice obtuses, les demi-fleurs blancs, semblables à ceux de la mille-feuille.

Cette plante croît dans les terrains sablonneux, sur les montagnes, en Hongrie. x (V. f.)

45. ACHILLEE à feuilles de tanaïse. *Achillea tanacetifolia.* Allion.

Achillea foliis bipinnatis; laciniiis lanceolatis, ferratis; corymbis compositis, patulo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2207. n°. 33, & Achill. pag. 38. n°. 26. — A lion. Pedem. n°. 666.

Achillea foliis pinnatis; pinnis semipinnatis, incisis & integris. Hall. Helv. n°. 108.

Millefolium purpureum, majus. C. Bauh. Prodr. 76. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 39. §. 6. tab. 11. fig. 14. (Voyez ACHILLEE, n°. 15.)

46. ACHILLEE compaëte. *Achillea compaëta.* Lam.

Achillea (diffans), foliis bipinnatifidis; laciniiis lanceolatis, inciso-ferratis; rachis alata, inciso-ferratis; corymbis sessilibus, compositis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2207. n°. 34.

Achillea diffans. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hung.

Achillea magna. Allion. Flor. pedem. n°. 668. tab. 53. fig. 1. (Non Linn.) — Willd. Achill. pag. 22. n°. 12.

Les feuilles sont un peu velues, principalement sur leur nervure. La principale nervure est bordée par un appendice foliacé, étroit & entier; les découpures nombreuses, très-rapprochées les uns des autres. Les calices sont ovoides, pubescens; les demi-fleurs presque en forme de cœur renversé, terminés par deux dents arrondies, & souvent une troisième plus petite. (Voyez ACHILLEE, n°. 18.)

47. ACHILLEE mille-feuille. *Achillea millefolium.* Linn.

Achillea foliis bipinnatis, nudis; laciniiis linearibus, dentatis; caulibus superius sulcatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1267. — Ludw. Eclat. tab. 67. — Oeder. Flor. dan. tab. 737. — Lam. Illustr. tab. 683. fig. 1.

Achillea millefolium, foliis bipinnatis, glabrescentibus; pinnarum laciniiis linearibus, dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2208. n°. 36, & Achill. pag. 39. n°. 27.

Achillea foliis pinnatis; pinnis semipinnatis, incisis & integris. Haller, Helv. n°. 108.

g. *Achillea tanacetifolia, flore purpureo.* Vaillant, Aët. Paris. 193. — Kniph. Centur. n°. 1.

Millefolium alpinum. Clus. Pann. pag. 562.

g. *Achillea (magna), foliis bipinnatis, subpilo-*

fts; laciniis linearibus, dentatis; auriculis decussatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1267.

Achillea magna, foliis triplicato-pinnatifidis; laciniis lanceolatis, acutis; corymbis compositis, fastigiatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1208. n°. 35.

La variété γ paroît confier une espèce différente de la mille-feuille, en étant distinguée non-seulement par sa grandeur du double, mais encore par les feuilles trois fois pinnatifides, par les découpures très-étroites, par les feuilles radicales très-longues. Les corymbes sont touffus, très-épais. (Voyez *ACHILLEE*, n°. 16.)

48. *ACHILLEE* à petites feuilles. *Achillea microphylla.* Willd.

Achillea foliis bipinnatifidis, internodio brevioribus; laciniis brevioribus, integerrimis; corymbis compositis, fastigiatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1210. n°. 40.

Millefolium minimum, crispum, flore albo, hispanicum. Barrel. Icon. Rar. tab. 1114.

Achillea pinnatifida. ? Lam. Diction. 1. pag. 18. n°. 14.

Ses tiges sont droites, simples, pubescentes, hautes de six à douze pouces, garnies de feuilles deux fois pinnatifides; celles des tiges plus courtes que les entre nœuds, pubescentes, longues d'environ quatre lignes; les découpures linéaires, très-entières; les pinnules de la base plus courtes. Les fleurs sont blanches, de la grandeur de celles de l'*Achillea nobilis*, disposées en corymbes ramifiés, en tête; les calices oblongs.

Cette plante croît en Espagne. γ (*Descript. ex Willd.*)

49. *ACHILLEE* rose. *Achillea rosea.* Hort. Paris.

Achillea (asplenifolia), foliis radicalibus, bipinnatifidis; caulinis incis; laciniis ovatis, serrato-mucronatis, obtusis; floribus rostratis. Vent. Hort. Cels. pag. 95. tab. 95.

Cette espèce se distingue aisément de l'*Achillea millefolium*, var. β , à fleurs purpurines, par ses tiges droites, plus élevées, & surtout par les feuilles, dont les lobes sont ovales & obtus. Ses tiges sont nombreuses, roides, cylindriques, presque simples, légèrement pubescentes; les feuilles oblongues, étroites, à peine pileuses; celles de la racine deux fois ailées; les caulinares alternes, un peu distantes, sessiles, incisées & laciniées; les lobes peu profonds, ovales, obtus, dentés. Les fleurs sont disposées en corymbes ramifiés, terminaux; les calices glabres, ovales; les demi-fleurs d'un rose-tendre, en ovale renversé, divisés en trois dents à leur sommet; les semences glabres, de couleur brune; le réceptacle

conique, garni de paillettes oblongues, concaves, frangées à leur sommet, plus longues que les semences.

Cette plante a été découverte par M. Boëc dans l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (*V. v.*)

50. *ACHILLEE* à feuilles de livèche. *Achillea ligustica.* Allion.

Achillea foliis bipinnatifidis; laciniis linearibus, argutis serratis; rachi alata, integerrima; corymbis compositis, fastigiatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1210. n°. 41, & *Achill.* pag. 19. n°. 10.

Achillea ligustica, foliis pinnatis; pinnis acutis pinnato-dentatis, planis, glabris. Allion. Miscell. Taur. 5. pag. 69, & *Flor. pedem.* n°. 660. tab. 53. fig. 2.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, striées, presque glabres, hautes de trois ou quatre pieds, divisées vers leur sommet en cinq à six rameaux alternes. Les feuilles sont nombreuses, sessiles, deux fois pinnatifides; leurs découpures linéaires, aiguës, dentées en scie, glabres à leurs deux faces; la nervure du milieu bordée, dans toute sa longueur, d'un appendice foliacé, entier ou à peine denté.

Les fleurs sont blanches, assez nombreuses, disposées en petits corymbes rameux, formant, par leur réunion, une sorte d'ombelle composée, fastigiée. Leur calice est un peu ovale, d'un blanc-pâle, pubescent; les demi-fleurs terminés par un limbe ovale, obtus, ou légèrement échancré, semblables à ceux de l'*Achillea nobilis*.

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, sur les collines, au dessus du bourg de Cairo. γ (*V. f.*)

51. *ACHILLEE* noble. *Achillea nobilis.* Linn.

Achillea foliis bipinnatis; inferioribus nudis, planis; superioribus obtusis, tomentosis; corymbis convexis, confertissimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1262. — Retz. Observ. 1. pag. 36.

Achillea nobilis, foliis caulinis bipinnatifidis; laciniis linearibus, subserratis; rachi alata, dentata; radicalibus triplicato-pinnatifidis; corymbis compositis, fastigiatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1211. n°. 42, & *Achill.* pag. 36. n°. 25.

Achillea millefolia, odorata. J. Bauh. Hist. 3. pag. 140.

Millefolium nobile, & Aristoteles vera tragi. Motif. Oxon. Hist. 3. pag. 38. § 6. tab. 11. fig. 4.

Millefolium nobile. Tragus, Hist. pag. 476.

Tanacetum minus, album, odore camphora. C. Bauh. Pin. 132.

Quelques auteurs ont regardé cette plante comme une simple variété de l'*Achillea odorata*, obtenue par la culture. Ses tiges sont beaucoup plus hautes, droites, cylindriques, pubescentes, point filloées, garnies de feuilles deux fois ailées, pubescentes, presque tomenteuses; les découpures d'élancées, étroites, linéaires, obtuses, à peine dentées; l'encore du milieu bordée de dentelures éparpillées; les feuilles supérieures simplement pinnatifides; les radicales plus amples, presque trois fois pinnatifides. Les flus sont terminales, disposées en un corymbe rameux & fastigié. Leur calice est glabre, ovale, d'un blanc pâle; les fleurons jaunâtres, les demi-fleurons peu nombreux, courts, échancrés au sommet, réfléchis en dehors, & alors à peine sensibles.

Cette plante est odorante; elle croît en Suisse, en Allemagne, dans les départements méridionaux de la France. (V. v.)

51. *ACHILLEA odorata*. *Achillea odorata*. Linn.

Achillea foliis bipinnatis, ovalibus, nudiusculis; corymbis fastigiatis, confertis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1268.

Achillea odorata, foliis bipinnatis, subulis pilosis; pinnis linearibus, integerrimis; corymbis simplicibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2212. n°. 43.

Achillea odorata, foliis bipinnatis, hirsutis; pinnulis integerrimis, linearibus, acuminatis; calicibus patentibus, corymbis fastigiatis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 279. tab. 21.

Achillea odorata, var. β . Willd. Achill. pag. 142. n°. 28.

Achillea pinnis aqualibus, confertis, tomentosis; pinnulis capillariter divisis. Haller, Helv. edit. 1. pag. 716. — Sauvag. Monsp. 167.

Ses tiges sont médiocrement striées à leur partie supérieure, hautes de six à sept pouces; les feuilles pileuses en dessous, deux fois ailées; les découpures linéaires, aiguës, très-entières; les fleurs terminales, disposées en un corymbe simple; les demi-fleurons de la grandeur de ceux de la mille-feuille. (Voy. *ACHILLEA odorata*, n°. 2.)

Cette plante croît en Suisse, en France, dans les Alpes. (V. f.)

53. *ACHILLEA setacea*. *Achillea setacea*. Walldst.

Achillea foliis bipinnatis; foliolis linearis setaceis, mucronatis, confertissimis, pilosis; corymbis compositis, fastigiatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2212. n°. 44.

Achillea setacea, foliis pilosis, multiparvis-pinnatis; laciniis setaceis, petiolum undique argenteis;

corymbis densis, fastigiatis. Walldst. & Kitzeb. Plant. rar. Hung. 1. pag. 82. tab. 80.

Achillea odorata, var. α . Willd. Achill. pag. 42. n°. 28. — Lettler. Halens. n°. 878. — Hoffm. Germ. 304. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 369, & vol. 2. pag. 358.

Ses tiges sont droites, cylindriques, pileuses, striées, garnies de feuilles deux fois ailées, planes, alongées, munies de poils fins plus ou moins nombreux; les pinnules étroites, linéaires; les découpures courtes, aiguës, terminées par une petite pointe spinuliforme. Les fleurs sont réunies, au sommet des tiges, en un corymbe rameux, touffu; les pédoncules pubescents, blanchâtres; les calices ovales, presque cylindriques, pileux; les demi-fleurons courts, ovales, élargis, entiers ou légèrement échancrés à leur sommet.

Cette plante croît dans les terrains secs, en Suisse, dans la Hongrie. (V. f. in herb. Desfont.)

54. *ACHILLEA capillaris*. *Achillea capillaris*.

*Achillea foliis bipinnatis, pilosis; pinnulis compo-
sitis, capillaribus, minimis, apice mucronatis; corymbis compositis*. (N.)

Cette espèce est remarquable par les divisions de ses pinnules extrêmement fines. Ses racines sont rampantes; elles produisent plusieurs tiges faibles, ascendantes, ramulées, longues d'environ un pied, cylindriques, à peine striées, couvertes de poils fins & soyeux; garnies de feuilles alternes, au moins deux fois ailées, étroites, alongées; les radicales pétioolées; les caulinaires sessiles, pileuses; les pinnules courtes, capillaires, finement divisées en découpures très-courtes, mucronées à leur sommet. Ses fleurs sont disposées en corymbes composés, presque fastigiés; les calices & les demi-fleurons assez semblables à ceux de la mille-feuille.

Cette plante a été recueillie en France, aux environs de la Rochelle, dans les forêts, aux lieux sablonneux. (V. f. in herb. Desfont.)

ACHIMÈNES. Pers. (Voyez COLOMÈNE, n°. 2.)

ACHIT. Cissus. Ce genre a de grands rapports avec les vignes, & renferme plusieurs espèces intermédiaires entre ces deux genres. (Voyez l'article VIGNE.) Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre ou cinq dents; quatre, quelquefois cinq pétales libres, point adhérents à leur sommet, étalés, caducs; quatre ou cinq étamines; l'ovaire entouré d'un disque; une baie à deux loges, à une ou plusieurs semences.

Observations. Ce genre comprend des arbrisseaux, rarement des herbes, à tiges grimpantes,

sarmenteuses, munies de vrilles opposées aux feuilles : celles-ci sont ou simples, ou composées de trois, de cinq ou sept folioles, quelquefois deux fois ailées. Les fleurs offrent, dans la plupart des espèces, un caractère remarquable dans leur disposition. Les pédoncules sont opposés aux feuilles ; ils se divisent en ramifications étalées, une ou plusieurs fois bifurquées ; chaque rameau terminé par une petite ombelle ou une sorte de corymbe. Les fruits sont petits, médiocrement fuculeux.

Le genre *ampelopsis* de Michaux, que nous réunissons à celui-ci, tient le milieu entre les *cissus* & les *vitis* : il se distingue des *vitis* par ses pétales libres à leur sommet, ouverts & réfléchis ; il diffère des *cissus* par le nombre des parties de la fleur, ayant cinq pétales, cinq étamines, &c.

ESPECES.

* Feuilles simples.

1. ACHIT à tiges comprimées. *Cissus compressifolia*. Ruiz & Pav.

Cissus foliis cordatis, acutis serratis ; floribus umbellatis, pedunculis dichotomis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. tab. 100.

Ses tiges sont tétraogones, grimpantes, comprimées, articulées, rameuses, pubescentes, souvent couchées & radicales ; les feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, pubescentes, un peu luisantes en dessus, veinées, finement dentées en scie, obtuses, quelquefois acuminées, entières, quelques-unes divisées presque en trois lobes ; les pétioles cylindriques & contournés, accompagnés de deux stipules opposées, caduques, en forme de croissant. Les vrilles sont simples, opposées aux feuilles, filiformes, munies, vers leur milieu, de deux petites écailles linéaires, opposées.

Les fleurs sont placées sur des pédoncules solitaires, opposées aux feuilles, plus longues que les pétioles ; ils se développent en une ombelle à quatre ou sept rayons, accompagnés d'autant de bractées ovales ; les pédoncules partiels dichotomes, inégaux. La corolle est jaune, composée de quatre pétales concaves à leur sommet, caducs. Le fruit consiste en une baie arrondie ou un peu ovale, trigone, d'un pourpre-noirâtre, à deux semences.

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'en octobre. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

2. ACHIT ampélipse. *Cissus ampelopsis*. Pers.

Cissus foliis cordatis, dentatis ; racemis duplicato-bifidis, floribus pentandris. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 142. n.º 2.

Ampelopsis (cordata), ramis glabris ; foliis seu

lato & parum profundo, cordatis, interdum superius subtrilobis-angulatis, dentatis ; nervis subius puberulis, racemis duplicato-bifidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 159.

Cette plante a des tiges glabres, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, l'échancrure large, peu profonde & dentée à leur contour, glabres à leurs deux faces, un peu pubescentes en dessous sur leurs nervures ; les feuilles supérieures anguleuses, presque à trois lobes dentés. Les fleurs sont disposées en grappes deux fois bifides. Les étamines sont au nombre de cinq.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les bords du fleuve Savannah, dans le pays des Illinois, &c.

3. ACHIT à feuilles de vigne. *Cissus vitiginea*. Linn.

Cissus foliis cordatis, repando dentatis, subius villosis. Lam. Illustr. vol. 1. pag. 330. n.º 1612.

Cissus vitiginea, foliis cordato-subrotundis, lobatis subindivisisque, villosis, dentatis. Vahl, Symb. 3. pag. 18.

Cissus vitiginea, foliis cordatis, subquincalobis, tomentosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 170. (*Voyez ACHIT, n.º 1.*)

4. ACHIT tomenteux. *Cissus tomentosa*. Lam.

Cissus foliis subpentagonis, obtusis dentatis, subius tomento-ferrugineis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 330. n.º 1613.

Cette espèce, dont je ne connois ni les fleurs ni les fruits, est remarquable par ses feuilles simples, élargies, épaisses, coriaces, de quatre pouces de largeur sur environ deux pouces de longueur, glabres, d'un vert-foncé en dessus, couvertes en dessous d'un duvet brun, presque noir, presque à cinq angles peu marqués, divisés à leur contour en larges dents très obtuses ; les pétioles comprimés, un peu pubescents, articulés, de la longueur des feuilles.

Cette plante a été observée par Commerçon à l'île Bourbon. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

5. ACHIT à feuilles sinuées. *Cissus repanda*. Vahl.

Cissus foliis cordatis, integris sublobatisve, repandis, utrinque glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 18.

Ses rameaux sont flexueux, cylindriques, articulés, couverts d'un duvet tomenteux qu'ils perdent en vieillissant ; les feuilles pétiolées, plus larges que longues, fermes, en cœur, larges de deux ou trois pouces, entières ou légèrement lobées ou sinuées, nerveuses, veinées, un peu

velues dans leur jeunesse, glabres à leurs deux faces tout entier développement; les lobes obtus, terminés souvent par une petite pointe; accompagnés à leur base des stipules opposées, ovales, membraneuses, aiguës, très caduques, longues de six lignes.

Les fleurs sont axillaires, portées sur des pédoncules communs opposés, divisés en rayons rameux, trois fois bifurqués, terminés par des pédicelles en ombelle; des écailles velues & très-courtes, situées à la base des pédicelles. Le fruit est une baie en forme de poire, de la grosseur d'un pois, terminée par le style persistant.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *(Defcript. ex Vahl.)*

6. ACHIT anguleux. *Cissus angulata*. Lam.

Cissus foliis subpentagonis, angulato-lobatis, cre-nularis, subius tomentosis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 331. n°. 1614.

Cette espèce a des tiges rameuses, herbacées; les rameaux allongés, comprimés, striés, légèrement pubescents, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, élargies, à peine échancrées, un peu coriaces, presque glabres en dessus, cotonneuses & cendrées en dessous, quelques-unes entières, d'autres à trois, presque à cinq lobes courts, obtus, à peine aigus, crénelés à leur contour. Les fleurs sont opposées aux feuilles; le pédoncule commun plane, strié, velu, plus long que les feuilles, divisé à son sommet en une ombelle composée, touffue; les pédicelles munis à leur base de petites bractées. Les fruits sont d'un pourpre-noirâtre, petits, en forme de poire.

Cette plante a été rapportée par M. Sonnerat des Indes orientales. *(V. f. in herb. Lam.)*

7. ACHIT à feuilles rondes. *Cissus rotundifolia*. Vahl.

Cissus foliis cordato-subrotundis, dentatis, glabris. Lam. Ill. vol. 1. pag. 331. n°. 1615. — Vahl, Symb. 3. pag. 19.

Salanthus (rotundifolius), foliis cordato-ob-culatis, serratis. Forsk. Flor. ægypti-arab. pag. 35, & Icon. tab. 4.

Ses tiges sont cylindriques, renflées à la base de leurs articulations, garnies de feuilles concaves, chainues, presque rondes, glabres à leurs deux faces, souvent pliées en deux, obtuses, dentées en scie; les dentelures fines, presque sétacées. Les fleurs sont disposées en grappes opposées, presque en ombelles simples, environ au nombre de quatre sur chaque pédoncule commun. Les fruits ne contiennent qu'une seule semence.

Cette plante croît dans l'Arabie. On mange ses feuilles cuites, quoiqu'elles soient très-acides.

8. ACHIT à feuilles en cœur. *Cissus cordifolia*. Linn.

Cissus foliis cordatis, integerrimis. Linn. Syst. veg. 1. pag. 158. — Miller, Dict. n°. 1. — Burn. Amer. tab. 259. fig. 3. (*Voyez ACHIT*, n°. 2, très-rapprochée du *Cissus tomentosa*.)

Cette plante en diffère, en ce que ses feuilles sont beaucoup plus minces, quelquefois presque à trois lobes, munies à leur contour de très-petites dents anguleuses, terminées en une petite pointe très-aiguë; le duvet est épais, rouffâtre, surtout sur les principales nervures & sur les pétioles.

9. ACHIT ficoyote. *Cissus ficoides*.

Cissus foliis cordatis, serratis, usque levibus; dentibus macronatis. Lam. Ill. vol. 1. pag. 331. n°. 1617. tab. 84. fig. 1.

Cissus (ficoides), foliis subcordatis, nudis, fetacco-serratis; ramulis teretibus. Lam. Syst. veg. pag. 158. — Miller, Dict. n°. 2. — Swartz, Observ. 48.

Cissus foliis simplicibus, nitidis. Jacq. Amer. 22. tab. 15.

Vitis foliis dentatis. Plum. Icon. 259. fig. 2.

Bryonia alba, geniculata, viola foliis; bacis à virid-purpureiscentibus. Sloan, Jan. 106. Hist. 1. pag. 233. tab. 144. fig. 1. — Rai, Suppl. 347.

Ses tiges sont grimpantes, glabres, rameuses, striées; les rameaux comprimés, souples, plans, articulés, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, très-simples, ovales, en cœur, luisantes, glabres à leurs deux faces, tendres, succulentes, nerveuses, aiguës à leur sommet, munies à leurs bords de dentelures en scie, inégales, à pointe sétacée. Les fleurs sont opposées aux feuilles, disposées en panicules rameuses, d'abord dichotomes, terminées en ombelles; les pédicelles simples, bifurqués. Les baies sont ovales, obtuses, d'un vert-pourpre.

Cette plante croît à la Jamaïque. *z*

10. ACHIT à feuilles larges. *Cissus latifolia*.

Cissus foliis cordatis, acuminatis, fetacco-dentatis, nervosis; nervis sabkirvatis. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 331. n°. 1618.

Cissus latifolia, foliis cordato-ovatis, villosis, acuminatis, fetacco-serratis; ramis tetragonis. Vahl, Symb. 3. pag. 18.

Funis crepitans, major. Rumph. Amb. vol. 5. pag. 446. tab. 164. fig. 1.

Schunambu-valli,

Schunamhuwalli. Rheed. Malab. vol. 7. pag. 21. tab. 11. (Voyez ACHIT, n° 3.)

11. ACHIT rampant. *Cissus repens*. Lam.

Cissus foliis cordato-ovatis, subdentatis, glabris; floribus umbellatis, baccis monospermis, caule repente. (N.) (Voyez ACHIT, n° 9.)

12. ACHIT ovale. *Cissus ovata*. Lam.

Cissus foliis ovatis, acuminatis, rariter dentatis, utrinque levibus. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 331. n° 1619.

Isfolia scandens, foliis oblongo-ovatis, ad margines denticulatis setaceis. Brown, Jam. pag. 47. tab. 4. fig. 1, 2.

Cette plante a des tiges glabres, géniculées, grimpantes, rameuses, garnies de vrilles simples & de feuilles distantes, alternes, pétiolées, membraneuses, ovales, glabres à leurs deux faces, à peine dentées à leur contour, acuminées à leur sommet, longues au moins de trois poudres, sur deux & plus de large. Les fleurs sont opposées aux feuilles; les pédoncules s'épanouissent à leur sommet en une ombelle, dont tous les rayons, très ouverts, sont dichotomes, terminés par une ombellule.

Cette plante croît à la Guadeloupe, où elle a été recueillie par M. Badiet. (V. f. in herb. Lam.)

13. ACHIT blanchâtre. *Cissus canescens*. Lam.

Cissus foliis ovato-oblongis, obliquis, denticulatis, sustomentosis, canescentibus. Lam. Ill. n° 1620.

Il y a de très-grands rapports entre cette espèce & le *Cissus ovata*, surtout dans la forme des feuilles; mais, dans celles-ci, elles sont plus allongées, obliques ou inégales à leurs côtés, surtout vers leur base, ovales, oblongues, légèrement tomentueuses & blanchâtres en dessous, denticulées à leur contour.

Cette plante croît au Pérou. (Herb. Thouin.)

14. ACHIT glanduleux. *Cissus glandulosa*.

Cissus foliis ovatis, glabris, laxè dentato-serratis; nervis basi glandulosis, petioliis ramisque pubescentibus, caule fruticoso. (N.)

Cissus (antarcticus), *foliis ovatis, laxè serratis, glabrescentibus, subius glandulosis*. Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 21.

Vitis kanguru. Hortulan.

Malgré les rapports nombreux de cette plante avec les deux précédentes, elle en est très-distincte par ses feuilles plus grandes, épaisses, coriaces, glabres, presque luisantes, ovales, élargies.

Botanique. Supplément. Tome I.

gis, mais rarement échançurées à leur base, à dentelures lâches, aiguës; les nervures faillantes en dessous, un peu ramifiées, munies dans leurs aisselles d'une petite glande arrondie, velue; les pétioles pubescents, ainsi que les jeunes rameaux; les vrilles opposées aux feuilles, très-simples, roulées à leur sommet; les tiges ligneuses, cylindriques, finement striées; les rameaux couverts de poils blancs & rares.

Les fleurs sont très-petites, herbacées, couverts de poils roussâtres, disposées en petites ombelles à l'extrémité de pédoncules dichotomes, bifurqués; accompagnées de bractées ovales, membraneuses, aiguës, pubescentes. Le calice est un godet à quatre dents obtuses; la corolle à quatre pétales alternes avec les dents du calice, ovales, obtus, courbés en dedans; quatre étamines opposées aux pétales; un ovaire globuleux, plongé dans un disque tétragon: il produit une baie sèche, globuleuse, de la grosseur d'un grain de raisin, divisée en deux loges, à quatre semences osseuses, dont deux avortent souvent.

Cette plante est originaire de la Nouvelle-Hollande. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

15. ACHIT quadrangulaire. *Cissus quadrangularis*. Linn.

Cissus foliis subdeltoideis, serrato-dentatis, nudis; coule tetragono, articulo, cornoso. Lam. Ill. n° 1621. — Linn. Mant. 39.

Salomhus (quadrangulus), *caule articulo, dichotomo, tetragono; foliis carnosis, cordatis, serratis, semicomplacatis.* Forsk. Flot. ægypt.-siab. pag. 33, & Icon. tab. 2.

Planta boccifera, scandens, epidendros. Pluken. Phyt. 310. fig. 6. *Optima.* (Voyez ACHIT, n° 4.)

16. ACHIT à petites fleurs. *Cissus micrantha*.

Cissus foliis glabris, trilobis, subinterris, acutis; umbellulis subquinqusidis, petiolo vix longioribus. (N.)

Ses rameaux sont grêles, striés, très-glabres, sarmenteux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, glabres & vertes à leurs deux faces, divisées en trois lobes inégaux, les deux inférieurs beaucoup plus courts, presque obtus, celui du milieu lancéolé, aigu, entiers ou munis de quelques dents rares; les pétioles au moins une fois plus courts que les feuilles; les vrilles presque capillaires, biniées. Les fleurs sont latérales, un peu plus longues que les pétioles; le pédoncule commun divisé à son sommet en cinq rayons inégaux, garnis de petites bractées, & terminés par de très-petites ombellules.

Cette plante croît à Saint-Domingue. (V. f. in herb. Desfont.)

* * Feuilles composées.

17. ACHIT acide. *Cissus acida*, Linn.*Cissus foliis ternatis, obovatis, glabris, carnosis, incisis*, Linn. Syst. veget. pag. 158. — Swartz, Obl. 49.*Sicyes trifoliata*, Linn. Spec. Plant. 1. p. 1013.*Ipsoia triphylla, scandens & claviculata, foliis crassis, serratis*, Brown, Jam. 147.*Bryonia alba, triphylla, geniculata, foliis crassis, acidis*, Sloan, Jam. 106. Hill. 1. pag. 233. tab. 142. fig. 6.*Vitis trifolia, minor, corymbosa, acinis nigrioribus, turbinatis*, Plum. Spec. 18. tab. 259. fig. 5. (Voyez ACHIT, n°. 5.)18. ACHIT aisé. *Cissus alata*, Lam.*Cissus foliis ternatis; foliolis hirsutis, denticulatis; ramis membranaceo-angulatis*, Lam. Illustr. n°. 1623.*Cissus trifoliata*, Linn. Syst. veget. pag. 159. — Jacq. Amer. pag. 23. tab. 162. fig. 10. — Miller, Dict. n°. 4. — Swartz, Observ. 50.*Ipsoia triphylla, scandens, foliis ovatis, subserratis; petiolo communi marginato, calicibus majoribus*, Brown, Jam. 147.*Bryonia alba, triphylla, maxima*, Sloan, Jam. 106. Hill. 1. pag. 233. tab. 142. fig. 2. — Rai, Suppl. 347. (Voyez ACHIT, n°. 6.)19. ACHIT luisant. *Cissus lucida*.*Cissus foliis ternatis; foliolis ovatis, lucidis, glabris, densius to se acie; caule compresso, subterragoneo, glanduloso*, (N.)

Cette espèce, qui me paroît se rapprocher beaucoup du *cissus alata*, en diffère par les feuilles glabres, coriaces & luisantes. Ses rameaux sont glabres, sarmenteux, comprimés, légèrement rétrécis, striés, parsemés de quelques petites glandes; les angles un peu membraneux. Les feuilles sont pétioleuses, ternées, composées de trois folioles presque sessiles, ovales, un peu inégales, nerveuses & réticulées en dessous, dentées en sie; les dentelures courtes, terminées par une pointe sétacée. Les fleurs sont étalées; les pédoncules plusieurs fois dichotomes, divines en ombelles & en ombellules.

Cette plante croît à l'île de Cayenne, 7 (V. f. in herb. Desfont.)

20. ACHIT tendré. *Cissus cinerea*, Lam.*Cissus foliis ternatis; foliolis pubescentibus, denticatis; l. teralibus subcordatis, petiolis teretibus*, Lam. Ill. n°. 1624.

Cette plante a toutes les parties recouvertes d'un duvet cendré, pubescent. Ses tiges sont striées, anguleuses, grimpantes, villées, garnies de feuilles alternes, pétioleuses, ternées, composées de trois folioles presque sessiles, ovales, échancrées à leur base, surtout les deux latérales, un peu épais, nerveuses, médiocrement crénelées à leur contour; les pétioles cylindriques, presque de la longueur des feuilles. Les fleurs sont terminales; les pédoncules droits, allongés, ramés vers leur sommet, pubescents, divines par dix-hornie, terminés par de petites ombelles; les pédicelles très-courts; les calices petits, pubescents, de couleur cendrée.

Cette plante a été recueillie dans les Indes orientales par M. Sonnerat. (V. f. in herb. Lam.)

21. ACHIT à petits fruits. *Cissus myrcocarpa*, Vahl.*Cissus foliis ternatis, oblongis, serratis, glabris, membranaceis*, Vahl, Egl. 1. pag. 16.*Vitis trifolia, uvæ corymbosa; acinis minoribus, rotundis*, Plum. Amer. 18, & Icon. tab. 259. fig. 4.

Ses rameaux sont glabres, anguleux, sans membrane sur les angles; ses feuilles ternées; les deux folioles latérales, sessiles, lancéolées, elliptiques, longues de deux pouces, légèrement mucronées; la terminale pétioleuse, presque longue de trois pouces, souvent rétrécie à ses deux extrémités, une fois plus large que les deux autres; toutes glabres, veinées; les nervures rouffées en dessous; les dentelures distantes, mucronées; les pétioles membraneux à leurs bords.

Les fleurs sont petites, pédicellées; les pédoncules axillaires, à quatre rayons légèrement ciliés, inégaux, très-ouverts, deux fois dichotomes. Le calice est très-court, à quatre lobes peu sensibles; quatre pétales oblongs, aurant d'éclat inégaux de la longueur de la corolle; l'ovaire globuleux, auquel succède une baie fort petite, oblongue, obtuse.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 7 (Desfont. ex Vahl.)

22. ACHIT à feuilles obtuses. *Cissus obtusifolia*, Lam.*Cissus foliis ternatis; foliolis obovatis, obtusis, densatis, pubescentibus*, Lam. Ill. n°. 1625. (Voyez ACHIT, n°. 7.) Je soupçonne que cette espèce est la même que le *cissus cinerea*, Vahl, Symb. 3. pag. 19. (Voyez VIGNÉ à trois feuilles, vol. 8. n°. 18.)23. ACHIT à feuilles aiguës. *Cissus acutifolia*.*Cissus foliis ternatis, foliolis emarginatis, glaberrimis, ovatis, dentato sublobatis; lobis acutis, caule debili*, (N.)

Ses tiges sont grêles, farmenteuses, glabres, striées, légèrement comprimées, anguleuses; les feuilles pétiolées, ternées; les folioles petites, pédicellées, ovales, très-minces, vertes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités, divisées, à leur contour, en larges dentelures inégales, anguleuses, aiguës, presque lobées; les pétioles filiformes, plus longs que les feuilles. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. ? (V. f.)

24. ACHIT charnu. *Cissus carnosa*.

Cissus foliis ternatis; foliolis ovato-acutis, serratis, nudis; radice crassa. Lam. III. n°. 1626.

Cissus carnosa, foliis ternatis, ovatis, obtusis, serratis, glabris; ramis petiolisque teretibus. Vahl, Symb. 3. pag. 19.

Hedera indica, trifoliata, claviculata, fruticosa, rotunda, nigra. Rai, Suppl. 36.

Ficus crepitans, trifolium. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 446. tab. 165.

Tjori valli. Rheed, Malab. vol. 7. pag. 17. tab. 9. (Voyez ACHIT, n°. 11.)

25. ACHIT digité. *Cissus digitata*, Lam.

Cissus foliis digitatis, ovatis, serratis, inferioribus quinatis, superioribus ternatis. Lam. Illustr. n°. 1627.

Sclanthus (digitatus), foliis inferioribus palmatis, quinatis, superioribus ternatis, amplexu petiolo communi sustentatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 35, & Icon. tab. 3.

Cette espèce diffère du *cissus pedata* par ses feuilles digitées & non pédiataires; elle se rapproche de l'*Hedera quinquefolia* Linn. Ses tiges sont glabres, cylindriques, rameuses; les feuilles glabres, pétiolées, divisées en plusieurs digitations ou folioles ovales, au nombre de cinq aux feuilles inférieures, de trois aux supérieures; toutes réunies sur le pétiole commun, dentées en scie à leur contour. Les fleurs sont disposées en panicules rameuses. Le fruit consiste en une baie globuleuse, velue, à quatre sillons, s'ouvrant en quatre valves. Les feuilles cuivres de viennent très-acides, & sont employées avantageusement contre la fièvre.

Cette plante croît dans l'Arabie. (Forskhal.)

26. ACHIT ovale. *Cissus obovata*, Vahl.

Cissus foliis ternatis; foliolis obovatis, integerrimis, glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 19.

Ses tiges sont glabres, grimpantes, munies de

villes opposées aux feuilles, biffées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles ovales, très-glabres, entières, membraneuses, mucronées à leur sommet; les deux latérales plus petites, sessiles; celle du milieu pétiolée, trois fois plus grande. Les fleurs sont portées sur des pédoncules axillaires, solitaires, glabres, plus longs que les feuilles, trichomes; chaque branche terminée par trois fleurs pédicellées.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix. (Description, ex Vahl.)

27. ACHIT à feuilles pédiataires. *Cissus pedata*, Lam.

Cissus foliis pedatis, enneaphyllis; foliolis ovato-lanceolatis, subdentatis, subinde pubescentibus. Lam. III. n°. 1628.

Cissus pedata, foliis pedatis; foliolis lanceolatis, serratis, subinde tomentosis. Vahl, Symb. 3. pag. 20.

Cissus (heptaphylla), foliis septenis, serratis, hispidis. Retz. Obs. 5. pag. 22. ?

Sambucus canadensis. Buem. Flor. ind. pag. 75. (Voyez ACHIT, n°. 16.)

28. ACHIT hétérophylle. *Cissus heterophylla*.

Cissus foliis pedatis, pentaphyllis, glabris; foliolis superioribus rhomboideis, crenatis; inferioribus oblongis, obtusis; caule fistuloso, striato. (N.)

Cette plante diffère du *cissus pedata* par le nombre & la forme des pétioles. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, fistuleuses, striées, rameuses; les feuilles longuement pétiolées, pédiataires, composées de cinq folioles inégales, pétiolées, glabres à leurs deux faces, à crénelles obtuses; la foliole du milieu plus grande, rhomboïdale; les deux folioles latérales supérieures plus petites, de même forme, aiguës; les deux inférieures plus courtes, ovales, très-obtus, crénelées à leur côté extérieur; leur côté intérieur plus étroit, presque tronqué, un peu en croissant, très-entier; les pétioles glabres, comprimés, striés. Les fleurs sont éralées, assez nombreuses; les pédoncules flexueux, divisés en plusieurs bifurcations très-ouvertes. Les fruits sont glabres, petits, ovales, obius.

Cette plante a été recueillie à l'île de Java par M. de Labillardière. (V. f. in herb. Desfont.)

29. ACHIT palmé. *Cissus palmata*.

Cissus foliis palmatis, quinatis; foliolis utringue glabris, angustis, lanceolatis, sessilibus, dentato-serratis; ramulis tetragonis. (N.)

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, un peu grêles, tétragones, striés, farmenteux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, palmées ou digitées,

composées de cinq folioles sessiles, très-étroites, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, à nervures peu sensibles, excepté celle du milieu; longues d'environ quatre pouces sur quatre lignes de large, rétrécies à leurs deux extrémités, munies à leurs bords de petites dents distantes, scissées; les pétioles grêles, presque cylindriques, glabres, striés; les vrilles biniées, opposées aux feuilles. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'Île-de-France. (*V. f. in herb. Desfont.*)

30. ACHIT d'Orient. *Cissus orientalis*. Lam.

Cissus foliis subbipinnatis; foliis serratis, ovatis; caule frutescente. Lam. Illustr. n°. 1629. tab. 84. fig. 2.

Cette plante a le port du *vitis arborea*; elle est beaucoup plus grande; ses feuilles moins composées, les folioles plus larges. Ses tiges sont ligneuses, glabres, rameuses, grimpantes, cylindriques, de couleur purpurine; garnies de feuilles amples, longuement pétiolées, une & souvent deux fois ailées; chaque pinnule pétiolée, composée de trois folioles ovales, élargies, largement dentées en scie ou incisées, presque anguleuses, point échancrées à leur base, glabres à leurs deux faces, aiguës, d'un vert-pâle, plus pâles & un peu glauques en dessous, membraneuses, veinées, nerveuses. Les feuilles des jeunes rameaux beaucoup plus petites; les pétioles accompagnés de deux stipules scarieuses, caduques.

Les fleurs sont latérales, opposées aux feuilles; le pédoncule commun de la longueur des pétioles, dichotomes à son sommet; chaque branche terminée par une petite ombelle simple, quelquefois bifurquée; les pédicelles courts, munis de petites bractées caduques; la corolle fort petite, d'un blanc-verdâtre; le fruit globuleux, un peu ovale, surmonté d'un style persistant.

Cette plante a été découverte dans le Levant par Michaux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*V. v.*)

31. ACHIT convolvant. *Cissus convolvans*. Lam.

Cissus foliis subbipinnatis; foliis ovatis, o' tussifolius, subdentatis; petalis convolvantibus. Lam. Ill. n°. 1630.

Cette espèce est très-rapprochée du *cissus orientalis*; elle en diffère surtout par ses folioles plus petites & moins nombreuses. Ses feuilles sont pétiolées, alternes, presque deux fois ailées, composées de folioles ovales, légèrement dentées à leur contour, un peu obtuses à leur sommet. La corolle est formée de cinq pétales convolvants.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. (*Herb. Thouin.*)

32. ACHIT strié. *Cissus striata*. Ruiz & Pav.

Cissus foliis digitatis; foliis oblongo-lanceolatis, serratis; caule striato, flexuoso; cymis cordatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. tab. 100. fig. 6.

Ses tiges sont grimpantes, striées, ligneuses, très-ramifiées; les jeunes rameaux pubescents; les feuilles digitées, composées de trois, quatre, souvent cinq folioles glabres, oblongues, lancéolées, un peu rétrécies en coin à leur base, dentées en scie à leur partie supérieure; les inférieures plus petites; les pétioles pubescents, accompagnés de stipules ovales, aiguës, à demi amplexicaules.

Les fleurs sont disposées en une cime terminale, opposée aux feuilles, dichotome; les pédoncules & les pédicelles pubescents, munis de bractées ovales, fort petites, concaves, aiguës. La corolle est jaune; les baies d'un pourpre-noir, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît au Pérou, & fleurit dans les mois d'octobre & de novembre. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

33. ACHIT granuleux. *Cissus granulosa*. Ruiz & Pav.

Cissus caule angulato, granuloso; foliis quinatis; foliis obovatis, dentatis; cymis potentibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. tab. 101. fig. 7.

Ses tiges sont glabres, ainsi que toutes les autres parties de la plante, ligneuses, grimpantes, très-rameuses, légèrement tétragones, granuleuses; les feuilles composées de cinq folioles en ovale renversé, dentées à leur partie supérieure; les inférieures plus petites; les pétioles une fois plus courts que les feuilles, granuleux, ainsi que les vrilles. Les fleurs forment une cime terminale, éralée, dichotome. La corolle est jaune; les baies noires, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît au Pérou; elle fleurit dans les mois de décembre & de janvier. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

34. ACHIT à feuilles obliques. *Cissus obliqua*. Ruiz & Pav.

Cissus foliis binatis ternatisque, serratis; lateralibus cordatis, obliquis, intermedio ovali; floribus umbellato-corymbosis. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 65. tab. 101. fig. 6.

Ses tiges sont tétragones, grimpantes, rameuses, striées; les jeunes rameaux pubescents; les feuilles longuement pétiolées, alternes, geminées ou ternées, ovales, en cœur, dentées en scie, veinées, pileuses à leur face inférieure; les deux

folioles latérales plus petites, ayant un de leurs côtés plus étroit ; la terminale plus grande, acuminée ; deux stipules opposées, ovales, un peu élargies. Les fleurs sont disposées en une ombelle à trois ou quatre rayons ; les pédicelles dichotomes, inégaux, accompagnés de deux petites bractées. La corolle est jaune.

Cette plante croît au Pérou ; elle fleurit dans les mois de mai & de juin. (*Descript. ex Ruiz & Pavon.*)

35. ACHIT mappou. *Cissus mappia*. Lam.

Cissus foliis subspinatis, levibus ; foliis ovatis, integerrimis. Lam. Illustr. n°. 1631.

Ses jeunes rameaux sont glabres, articulés, comprimés ; les feuilles presque deux fois ailées ; les pinnules composées de trois folioles ovales, pédicellées, très-entières, un peu obtuses, rétrécies à leurs deux extrémités, longues d'environ un pouce & plus, un peu charnues, très-lisses, à nervures fines, latérales. Les pédoncules sont trifides ; chaque ramification divisée en quelques dichotomies inégales ; les fleurs petites ; les fruits ovales, presque pyriformes, très-glabres.

Cette plante croît à l'île de France, où elle a été observée par Commerçon. (*V. f. in herb. Lam.*)

ACHMÉE paniculée. *Achmea paniculata*.

Achmea scapo paniculato, racemoso ; foliis ensiformibus, carinatis, aculeatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 37. tab. 264.

Plante herbacée, dont les auteurs de la *Flora du Pérou* ont fait un genre particulier, & auquel ils attribuent pour caractère essentiel :

Un calice double ; un extérieur à trois folioles ; un intérieur à trois découpures ; trois pétales ; deux écailles à la base de chaque pétale ; six étamines ; un style ; le stigmate trifide ; une capsule à trois loges, à trois valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double ; l'extérieur inférieur, coriace, campanulé, à trois folioles presque ronds, obtus ; la troisième mucronée ; le calice intérieur plus long, supérieur, à trois découpures ovales, roulées sur elles-mêmes, de moitié au moins plus courtes que les pétales.

2°. Une corolle composée de trois pétales lancéolés, rétrécis à leur sommet, accompagnés chacun à leur base de deux écailles ovales.

3°. Six étamines, dont les filaments sont filiformes, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères linéaires.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines ; un stigmate à trois découpures aiguës.

Le fruit consiste en une capsule ovale, à trois loges, à trois valves, contenant plusieurs semences ovales.

Observations. Les pétales, avant leur développement, sont roulés en spirale avec les étamines & le style. Ce genre porte un nom grec qui exprime le caractère de la troisième foliole du calice extérieur, terminée en une pointe mucronée.

Ce genre appartient à la famille des asperges, & doit se placer dans la division des smilacées, entre les *callixene* & les *philisia*. Au lieu d'établir deux calices, comme l'ont fait les auteurs de la *Flora du Pérou*, il est plus naturel de considérer le calice interne comme trois divisions plus courtes de la corolle (calice coloré, *Juss.*) Il est difficile à croire que ces divisions adhèrent ou soient supérieures à l'ovaire, comme le disent les auteurs ci-dessus.

L'achmée ne renferme qu'une seule espèce herbacée, dont les tiges sont garnies de feuilles simples, en forme de glive, armées d'aiguillons. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une grappe allongée, paniculée. La corolle est d'un jaune verdâtre. Cette plante croît sur les arbres, dans les Andes, au Pérou.

ACHRAS. (*Voyez* SAPOTILLIER.)

ACHYRANTHIES. (*Voyez* CADELARI.)

ACHYRONIA. (*Voyez* ACHYRONIE.)

ACHYRONIE velue. *Achyronia villosa*. Wendl.

Achyronia foliis lanceolatis, integerrimis ; pedunculis axillaribus, unifloris. (N.)

Achyronia villosa. Wendl. Observ. bot. pag. 47, & Hort. Herrenhus. 1. pag. 16. tab. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 915.

Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande, qui constitue un genre particulier, de la famille des légumineuses, voisin des *borbonia*, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq dents ; la dent inférieure allongée, bifide ; une corolle papilionacée ; les étamines didelphe ; une gousse comprimée, à plusieurs semences.

Ses tiges sont glabres, droites, rameuses, cylindriques, hautes de deux pieds ; les rameaux alternes, cylindriques, chargés de longs poils épars, soyeux, étalés, garnis de feuilles simples, pétioles, un peu roides, lancéolés, glabres, très-entières, aiguës à leur sommet, munies à leurs bords de longs poils soyeux. Les fleurs sont foliaires, placées, dans l'aisselle des feuilles, sur

des pédoncules simples, uniflores. Leur calice est velu, divisé en cinq dents inégales; l'intérieure plus longue & biffée. La corolle est jaune, papilionacée; l'ovaire libre: il lui succède une gousse comprimée, à une seule loge, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. γ

ACHYROPHORUS. (Vaill. Adanf.) Vaillant a décrit sous ce nom plusieurs plantes du genre *seriola* Linn. (Voyez *SERIOLE*.) Adanson désigne sous ce même nom le genre *porcella* (*hypocharis* Linn.). Gærtner, qui en a fait également usage, ne l'emploie que pour le seul *hypocharis radicata* Linn., dont il fait un genre séparé, caractérisé par l'aigrette de toutes les semences, portée sur un pédicelle, en quoi il diffère des autres espèces d'*hypocharis*, dont l'aigrette des semences marginales est sessile.

ACIA. Willd. **ACIOA.** Aubl. (Voyez *COUPI*.)

ACICARPHA. *Acicarpha*. Juss. Genre de plantes dicotylédones, établi par M. de Jussieu, à fleurs composées, toutes biscoqueuses, très-voisin de la famille des cinarocéphales, qui a beaucoup d'affinité avec le *gundelia*; il comprend des herbes exoriques à l'Europe, à feuilles alternes, à fleurs terminales & solitaires sur les rameaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice commun simple, à cinq découpures, renfermant des fleurs biscoqueuses, à cinq divisions; les étamines syngénèses; un stigmate simple; le réceptacle chargé de paillettes inégales, terminées en pointe, très-serrées, réunies en un seul corps. De leur ensemble résulte un fruit hérissé par les pointes des paillettes, entre lesquelles sont pratiquées de petites loges fermées, à une seule semence non aigrettée.

Observations. La coupe horizontale du fruit offre cinq loges, & sa section verticale trois rangs de loges, placés l'un au dessus de l'autre, appliqués contre un axe central, qui est probablement le réceptacle. « Cette disposition, dit M. de Jussieu, annonce l'existence d'environ quinze loges, qui paraissent communiquer au dehors par un canal très-étroit & presque fermé. Les fleurs du centre sont peut-être stériles. L'existence, la forme & la disposition des loges du fruit offrent un caractère très-particulier dans les plantes composées. On seroit d'abord tenté de rapporter cette plante à la famille des corymbifères; mais son stigmate est simple, ce qui est contraire à l'observation constante des fleurs hermaphrodites de cette famille. De plus, parmi les genres à réceptacle paléacé, on n'en trouve aucun, dans les corymbifères, qui ait avec celui-ci une affinité marquée. Le *castridia* de Gærtner & l'*apaleia* du même auteur ont à la vérité, comme lui, les paillettes

du réceptacle réunies en un seul corps; mais leurs interlites forment de simples cavités alvéolaires, ouvertes supérieurement. Leurs gaines sont couronnées d'une aigrette plumeuse dans l'un, paléacée dans l'autre. Leur calice n'est pas simple, mais formé de plusieurs rangs d'écaillés; enfin, leurs fleurs offrent des demi-fleurs dans leur circonférence. »

Ce genre a beaucoup d'affinité avec les fausses cinarocéphales, qui renferment les éléments d'une nouvelle famille, & surtout avec le *gundelia*, qui a de même les fleurs toutes biscoqueuses, le réceptacle chargé de paillettes, les semences nues, renfermées dans des loges formées par la réunion des parties accessoires de la fructification, mais qui diffère par son calice commun, contenant plusieurs calices partiels, dont chacun, rempli ordinairement de cinq fleurs, se change en un fruit creusé d'une cavité centrale, fertile, monosperme, entouré de quatre cavités stériles & vides. Ces diverses considérations ont suffi pour constituer un genre particulier de cette plante, dont le nom *acicarpha* est composé du grec *axis* (pointe), & *carphos* (paillette), à cause de ses paillettes épineuses. (Juss.)

ES PÈ C E.

ACICARPHA à fruits épineux. *Acicarpha tribuloides*. Juss.

Acicarpha foliis oblongis, sinuatis, inferioribus spatulatis, superioribus basi latiore semiamplexicaulis. Juss. Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. vol. 2. pag. 348. tab. 56. fig. 7.

Plante herbacée, peu élevée, dont la tige, divisée en rameaux alternes, est garnie de feuilles également alternes, pétiolées, oblongues, sinuées; les inférieures spatulées; les supérieures sessiles, amplexicaules. Les fleurs sont jaunes, solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux; elles ont un calice commun simple, à cinq divisions profondes, contenant un assez grand nombre de petits fleurs, dont le tube est grêle, le limbe évasé, à cinq divisions. Les étamines sont syngénètes; elles forment une gaine qui paroît portée sur cinq filiers, insérées au tube. L'ovaire inférieur, surmonté d'un style, terminé par un stigmate simple, se convertit en une semence nue, oblongue, point couronnée par une aigrette, & dépourvue de périsperme. Le réceptacle, qui supporte les fleurs, est chargé de paillettes épaisses, terminées en pointe & de longueurs inégales, plus longues à la circonférence. Ces paillettes, très-serrées les unes contre les autres, se réunissent en un seul corps: il en résulte un fruit qui a le volume & presque la forme du *tribulus*, hérissé de pointes solides & aiguës.

Cette plante a été recueillie par Commerçon

à l'embouchure de la Plata, dans les environs de Buenos-Ayres & de Monte-Video. (Juss.)

ACIDOTON. Brown. Swartz. (Voyez ADÉLIE.)

ACIOA. (Voyez COUPI.)

ACISANTHÈRE quadrette. *Acisanthera quadrata*, Juss.

Rhexia acisanthera, Linn. & Diet. vol. 6. pag. 5.

Cette plante a été mal placée parmi les *rhexia*; elle appartient à la famille des *galicaires*, & se rapproche des *lythrum*. Elle diffère des *rhexia* par le nombre & la disposition des organes de la fructification, par la forme de ses anthères, par les nervures des feuilles & la disposition des fleurs. Les feuilles sont ovales, crénelées sur leurs bords; les anthères vacillantes, en fer de flèche. Le fruit est une capsule recouverte & couronnée par le calice, à deux loges & non à quatre, contenant des semences nombreuses, insérées dans chaque loge sur un placenta particulier. C'est une herbe & non un arbrisseau.

ACLADODEA. Genre de plantes du Pérou, décrit par Ruiz & Pavon; il appartient à la famille des *spanaires*, & a beaucoup de rapport avec les *talisia*, dont il n'est probablement qu'une espèce. On n'a point encore vu son fruit; ce qui a fait croire qu'il étoit dioïque, & que le seul individu mâle avoit été observé (Juss.). (Voyez TALISIA, Suppl.)

ACMELLA. ACMELIE. *Spilanthes acmella*, Linn. (Voyez BIDENT, n°. 11, & l'article STRANTHÈRE.)

Acmella. (Rich. Perfoon.) Perfoon, d'après les observations de M. Richard, a établi le genre *acmella*, composé de plusieurs plantes, la plupart déjà connues & placées dans d'autres genres, dans les *spilanthes*, les *anthemis*, &c. Il lui attribue pour caractère essentiel : un calice simple, à plusieurs découpures foliacées; un réceptacle oblong, garni de paillettes; une corolle radiale; & des semences tétragones, nues & tronquées à leur sommet. Les feuilles sont opposées; les pédoncules solitaires, uniflores; les fleurs jaunes.

L'exposition du caractère générique annonce combien ce genre est voisin des *verbena* & des *bident*. La différence la plus saillante consiste dans les semences tétragones, nues & tronquées à leur sommet; mais alors pourquoi y rapporter l'*acmella mauritiana*, qui est le *spilanthes acmella* Linn. (BIDENT, n°. 11), dont les semences sont bordées de cils courts & terminées par deux dents capillaires? D'ailleurs, les soies & les dents sétacées sont très-caduques dans plusieurs espèces; ce

qui peut occasionner des erreurs ou inspirer des doutes. Les autres espèces sont :

1. *Acmella* (intermedia), caule procumbente, glabris; foliis ovato-lanceolatis, dentatis; pedunculis terminalibus, radiis disco aequalibus. Richard, Perfoon, Synopt. 2. pag. 472.

Elle diffère de la précédente par ses tiges presque glabres; par les feuilles ovales-lancéolées, dentées; par les pédoncules terminaux; enfin, par les rayons du disque, égaux en longueur aux demi-fleurs de la circonférence. Elle croît dans l'Amérique.

2. *Acmella* (repens), caule repens; foliis lanceolatis, integris; pedunculis terminalibus, longissimis. Pers. l. c. pag. 473.

Spilanthes (repens), caule repente; foliis ovali-lanceolatis, subintegris; pedunculis solitariis, terminalibus, longissimis; floribus decem radiatis, seminibus apice nudis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 131. — *Anthemis repens*, Walt. Flor. carol.

Ses tiges sont rampantes; ses feuilles ovales, lancéolées, presque entières; ses pédoncules très-longs, solitaires, terminaux; les fleurs composées à leur circonférence de dix demi-fleurs; les semences nues à leur sommet. Elle croît à la Caroline, dans les lieux inondés, sur les bords du fleuve Santée.

3. *Acmella* (occidentalis), foliis ovatis, serratis, trinerviis, glabris; radio quinqueflora. Pers. l. c.

C'est la même plante que la camomille à feuilles opposées, n°. 16. — *Anthemis occidentalis*, Willd.

4. *Acmella* (buphthalmoides), foliis ovatis, serratis, trinerviis, subhis pubescentibus; radio multiflora. Pers. l. c.

Anthemis buphthalmoides, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2185. — Jacq. Schoenbr. 2. pag. 13. tab. 157.

Anthemis ovatifolia, Ortega, Decad. 6. pag. 73.

Baphthalmum scabrum, Cav. Ic. Rar. 2. pag. 53. tab. 167.

Cette plante, ainsi que la précédente, diffère beaucoup des autres espèces par son port, surtout par la grandeur. Ses tiges sont droites, rameuses, hautes de deux ou trois pieds; ses rameaux opposés; ses feuilles pétioles, opposées, longues de deux pouces & plus; ovales, dentées en scie, à trois nervures, rudes en dessus, pubescentes en dessous, souvent inégales à leur base. Les pédoncules sont longs, uniflores, situés dans la bifurcation des tiges; les fleurs composées d'un grand nombre de demi-fleurs à leur circonférence. Elle croît au Pérou.

M. Perfon soupçonne qu'on pourroit encore rapporter au même genre le *Spilanthus uliginosus* de Swartz, & le *corula spilanthus* Linn.

ACNIDE. *Acnida*. Genre de la famille des amaranthées, qui a des rapports avec le genre du même nom, & dont le caractère essentiel consiste dans

Des fleurs dioïques; dans les fleurs mâles, un calice à cinq divisions; point de corolle, cinq étamines; dans les fleurs femelles, un calice à trois découpures; point de corolle ni de style; trois, quelquefois quatre ou cinq stigmates; une capsule non ouverte, à une loge, une semence.

ESPÈCES.

1. ACNIDE de Virginie. *Acnida cannabina*. Linn.

Acnida foliis lanceolatis; capsulis leviusculis, acutangulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 235. (Voyez ACNIDE, n°. 1.)

2. ACNIDE à haute tige. *Acnida ruscocarpa*. Mich. *

Acnida foliis ovali-lanceolatis; capsulis obtusangulis, rugosis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 234. tab. 50.

Ses tiges sont droites, herbacées, glabres, cylindriques, un peu anguleuses, épaisses, fistuleuses, hautes de cinq à six pieds, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales lanceolées, glabres à leurs deux faces, très entières, aiguës, munies de nervures fines, simples, latérales. Les fleurs sont disposées en un épi simple, avilaire, allongé, réunies au nombre de deux, trois ou quatre, par quelques écailles; les inférieurs accompagnés à leur base d'une petite feuille; les fleurs mâles pétiolées; les femelles presque sessiles; trois stigmates sessiles, réfléchis. Le fruit consiste en une capsule ovale, glabre, ridée, à trois angles obtus, peu sensibles, contenant une seule semence lisse, comprimée, attachée au fond de la capsule par un pédicule très-court.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à la Virginie. ☉

ACOMA. Adanf. (Voyez ACOMAS.)

ACOMAS *Homalium*. Ce genre se rapproche beaucoup de la famille des rosacées; il a de grands rapports avec les *blutellia*. Son caractère essentiel consiste dans

Un calice à six ou sept divisions; autant de pétales alternes avec les découpures au calice; vingt une étamines disposées en trois faisceaux autour de l'ovaire; trois styles; ovaire à demi adhérent avec le calice; une capsule à une loge, polysperme.

ESPÈCES.

1. ACOMAS à grappes. *Homalium racemosum*. Jacq.

Homalium foliis serratis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus pedunculatis. Swartz, Prodr. pag. 86. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1125. — Lam. Ill. Gen. tab. 483. fig. 2. (Voyez ACOMAS, n°. 1.)

2. ACOMAS en épis. *Homalium spicatum*. Lam.

Homalium foliis densatis, coriaceis; racemis terminalibus, floribus subsessilibus. Swartz, Prodr. pag. 86. — Willd. l. c. — Lam. Ill. tab. 423. fig. 1. (Voyez ACOMAS, n°. 2.)

ACOMAT à cloche. Nom sous lequel est connu, dans quelques Antilles, l'*heisteria* des botanistes.

ACOMAT blanc. On a reçu de la Martinique, dit M. de Jussieu, le *symplocos* sous ce nom. C'est probablement le même que Nicolson nomme *acomat*, & dont il dit le bois jaunâtre.

ACOMAT violet. On ne fait que l'arbre de Saint-Domingue Desportes a voulu désigner sous ce nom. Il en fait un *spartium*, & semble le regarder comme congénère d'un autre, qui est l'*ecaphyllum* des botanistes.

ACONIT. *Aconitum*. Ce genre paroît devoir appartenir à une des divisions de la famille des renonculacées. Les parties de la fleur ont reçu différentes dénominations. Selon Linné il n'y a point de calice. M. de Lamarck, ainsi que M. de Jussieu, regarde comme tels les cinq pétales irréguliers; le supérieur concave, en forme de casque. Les pétales sont nombreux, fort petits, en forme d'écailles; les deux supérieurs, que Linné appelle *nectaires*, sont plus grands, allongés, charnés sous le casque, munis d'un long ongle, coulés à l'extrémité. Leur limbe est réfléchi & a la forme d'une lèvre; leur extrémité est épaisse, obtuse. Willdenow donne à ce nectaire le nom de capuchon (*calculus*). Sa base est prolongée en un éperon relevé, & son sommet forme une lèvre. Cette partie de la fleur fournit d'assez bons caractères pour la distinction des espèces. Ce genre se rapproche beaucoup des *delphinium*.

ESPÈCES.

* Fleurs jaunes ou blanches.

1. ACONIT tue-loup. *Aconitum lycoctonum*. Linn.

Aconitum foliis palmatis, multifidis, villosis. Linn. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 750. — Gmel. Sibir. 4. pag. 188. tab. 81. — Jacq. Flor. austr. tab.

tab. 380. — Blackw. tab. 563. — Lam. Ill. tab. 482. fig. 2. — Gærtn. tab. 69.

Aconitum lycoctonum, *caucalli calcare spirali*; *labio ovato*, *emarginato*; *corolla* *galea conica*, *elongata*; *foliis palmatis*, *pubescentibus*; *laciniis trifidis*, *dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1232. n° 1.

Aconitum foliis hirsutis, *semitrilibis*; *lobis duplato-trifidis*. Haller, Helv. n° 1200.

Aconitum lycoctonum, *flore luteo*. Bchl. Eyt. 20. 25. fig. 2.

Napellus flore luteo. Riv. tab. 487.

Aconitum secundum. Amer. Epit. 827.

Aconitum lycoctonum, *vulgare*, *flore luteo*. Clus. Hist. 2. pag. 94. (Voyez ACONIT, n° 1.)

La plante à fleurs bleues, citée comme variété de cette espèce par Murray, est une espèce distincte, dont nous parlerons plus bas sous le nom d'*aconit du nord*.

2. ACONIT du Japon. *Aconitum japonicum*. Thunb.

Aconitum foliis trifido-palmatis; *laciniis incis*, *obtus*. Thunb. Flor. jap. pag. 231.

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques, herbacées, garnies de feuilles pétioles, palmées, à trois divisions principales, les deux latérales bifides, la troisième trifide, toutes obtuses, incisées, dentées; les dentelures arrondies, terminées par une petite pointe. Les fleurs sont disposées en une grappe courte, terminale.

Cette plante croit au Japon. (Descript. ex Thunb.)

3. ACONIT des Pyrénées. *Aconitum pyrenaicum*. Linn.

Aconitum foliis multipartitis; *laciniis linearibus*, *incumbentibus*, *sparsis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 751. Non Willd. — Rai, Europ. 367.

Aconitum pyrenaicum, *caucalli calcare spirali*; *foliis maximis*, *7-11-lobatis*; *lobis 3-5-lacinia* *palmatis*, *incis*; *floribus densis racemosis*. Decand. Flor. franç. Synopf. 421.

Aconitum pyrenaicum, *omphre folio*, *tenuiss laciniato*. Tournef. Init. R. Herb. 424. (Ex herb. Vaill.)

Si cette plante est réellement l'espèce mentionnée par Linné, elle n'est point celle de Willdenow, dont elle diffère par les caractères de sa fleur. Leur calque est long, comparé à la longueur des autres parties; son bord antérieur se prolonge en un bec aigu & un peu saillant; l'éperon du capuchon (l'extrémité de chacun des

Botanique. Supplément. Tome 1.

pétales cachés sous le calque) est roulé en spirale. Les feuilles inférieures sont très-amples, divisées en sept ou onze divisions principales, sous-divisées en trois ou cinq découpures palmées, divergentes & incisées; les découpures latérales recouvrent celles qui les avoisinent. Les grappes sont serrées & rameuses à leur base. (Voyez ACONIT, n° 3.)

4. ACONIT de Sibérie. *Aconitum sibiricum*. (N.)

Aconitum (pyrenaicum), *caucalli calcare recto*, *obtus*; *labio spatulato*, *emarginato*; *galea conica*; *foliis obovato-quinquepartitis*; *laciniis tripartito-dentatis*, *cuneiformibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1233. n° 3.

Cette espèce, différente de la précédente, est plus profondément divisée, digitée, à cinq découpures partagées en trois lanières cunéiformes, dentées. Le capuchon se termine par un éperon droit, obtus; la lèvre est en forme de spatule, échancrée à son sommet; le calque conique.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Tartarie. (Willd.)

5. ACONIT à fleurs d'un blanc-jaune. *Aconitum ochroleucum*. Willd.

Aconitum caucalli calcare arcuato, *obtus*; *labio lanceolato*, *emarginato*; *galea conica*, *elongata*; *foliis subtus pubescentibus*, *palmato-quinquelobis*; *laciniis tripartitis*, *incis*-*dentatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1233. n° 4.

Aconitum flore albo. Stephan. in Litt.

Cette espèce ressemble, par son port, à l'*aconitum septentrionale*. Ses tiges sont pubescentes, cylindriques; les feuilles radicales fort amples, pétioles, glabres en dessus, légèrement pubescentes en dessous, palmées, à cinq lobes; les découpures à trois lanières, incisées, dentées; les dentelures lancéolées; les feuilles caulinaires petites, presque en rondache, médiocrement pétioles.

Les fleurs sont d'un blanc-jaunâtre, pubescentes, disposées en grappes simples, terminales, d'autres pédonculées, solitaires, sortant de l'aisselle des feuilles supérieures. Le calque de la corolle est sessile, conique, alongé, rétréci vers son milieu, obtus à son sommet, dilaté & acuminé à sa partie inférieure. L'éperon du capuchon est étroit, crochu, arqué, obtus à son sommet; la lèvre droite, lancéolée, obtuse, échancrée, Ses piliils sont au nombre de trois.

Cette plante croît dans la Sibérie, jusque sur le mont Caucase. (Descript. ex Willd.)

6. ACONIT anthora. *Aconitum anthora*. Linn.

P

** Fleurs bleues.

Aconitum floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 751. — Jacq. Flor. austr. tab. 382. — Blackw. tab. 562.

Aconitum anthora, cuculli calcare refracto, u-cinato; labio ascendente, obcordato; galeâ conicâ, rotundata; foliis multifidis, laciniis linearibus Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1234. n°. 5.

Anthora foliis hirsutis, semiterlobis; lobis duplicato-trifidis. Haller, Helv. n°. 199.

Anthora seu anthora. Camer. Epit. 837. Ic. — Rivin. tab. 486. — Miller, Icon. tab. 12.

Anthora vulgaris. Clus. Hist. 2. pag. 98. (Voyez ACONIT, n°. 4.)

7. ACONIT à fleurs blanches. *Aconitum album.* Ait.

Aconitum floribus pentagynis; foliis glabris, tripartitis; laciniis acutè incisis; petali supremi ungue lateralibus longiore. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 246.

Aconitum album, cuculli calcare uncinato, obtuso; labio brevissimo-reflexo, bifido; galeâ conicâ, lte unguiculatâ; foliis tripartitis; laciniis ovato-cuneiformibus, trifidis, dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1234. n°. 6.

Aconitum orientale. Miller, Dict. n°. 10.

Aconitum lycoctonum, orientale, flore albo, magno. Tournef. Coroll. 30.

Cette plante se rapproche beaucoup, par son port, de l'*aconitum variegatum*; elle en diffère par ses fleurs blanches & par la forme des parties de sa corolle. Ses tiges sont droites, hautes d'environ six pieds; ses feuilles alternes, pétiolées, glabres, à trois grandes divisions; les découpures ovales, presque en forme de coin, trifides, dentées ou incisées; les dentelures aiguës. Les fleurs sont blanches, grandes, disposées en une grappe ou épi terminal. L'éperon du capuchon est crochu, obtus; la lèvre très-courte, réfléchie & bifide; le calque conique, largement onguiculé; les étamines au nombre de cinq.

Cette plante croît dans le Levant. x

8. ACONIT barbu. *Aconitum barbatum.* Juss.

Aconitum floribus spicatis; corollis barbatis; foliis multipartito-ternatis, pilosis; caule villosa. Pers. Synop. Plant. vol. 2. pag. 83. n°. 7.

Cet aconit a des tiges droites, velues, garnies de feuilles pétiolées, alternes, parragées en plusieurs lobes; chacun d'eux à trois découpures pileuses. Les fleurs sont terminales, disposées en épi; la corolle barbu.

Cette plante a été recueillie dans la Sibérie par M. Patrin. (Herb. Juss.)

9. ACONIT du Nord. *Aconitum septentrionale.* Koell.

Aconitum cuculli calcare revoluta; labio spatulato, submarginato; galeâ conicâ, elongatâ; foliis palmatis, pubescentibus; laciniis trifidis, divaricatis, dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1235. n°. 7.

Aconitum septentrionale. Koell. Aconit. 22.

Aconitum lycoctonum. Var. 9. *Flore coccinea.* Linn. Syst. veget. p. 615. — Wedd. Flor. dan. tab. 123.

Aconitum lycoctonum, floribus pallidè purpureis. Gmel. Sibir. 4. pag. 189.

Calceolus lapponum, seu breffica raniferorum. Schæff. Lapp. 360.

Quoique très-rapprochée, par son port, de l'*aconitum lycoctonum*, cette espèce s'en distingue par ses fleurs d'un bleu pâle, par ses tiges plus élevées, par les dents de ses feuilles plus longues & plus aiguës; les découpures trifides, étalées. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale; l'éperon du capuchon plus oblique, roulé en spirale; la lèvre en forme de spatule, un peu échan-crée; le calque conique, alongé.

Cette plante croît dans la Norvège, la Suède, la Russie, la Sibérie. x

10. ACONIT napel. *Aconitum napellus.* Linn.

Aconitum foliorum laciniis linearibus, supernè latioribus, lineâ exaratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 751. — Koell. Acon. 14. Icon. — Lam. Ill. tab. 482. fig. 1.

Aconitum napellus, cuculli calcare recto, obtuso; labio lanceolato, ascendente, bifido; galeâ convexâ; foliis nitidis, quinquepartitis; laciniis tripartitis, incisis, linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1235. n°. 8.

Aconitum caule simplici; spicâ densâ; petiolis unifloris, cassidis mucrone brevi. Haller, Helv. n°. 1197.

Aconitum lycoctonum sextum, napellus vulgaris. Clus. Hist. 2. pag. 96. (Voyez ACONIT, n°. 2.)

J'ai trouvé cette plante à deux lieues de Villers-Coterêts, dans le fond du vallon de Vaucienne, au milieu d'un marais; elle m'a paru offrir quelques différences dans son port & les fleurs, que je me dispense de faire connoître, n'en ayant conservé que des individus en mauvais état. Il paroît se rapprocher de l'espèce suivante.

11. ACONIT de Neubourg. *Aconitum neomontanum.* Koell.

Aconitum cuculli calcare adunco, obtuso; labio

lanceolato, revoluta, bifido; galea convexa; foliis nitidis, digitato-quinquepartitis; laciniis lato-lanceolatis, brevissimè dentatis; pedunculis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1236. n°. 9. — Koell. Aconit. 16.

Aconitum (neomontnum) coule elongata; spica racemosa-ramosa; galea humilis, breviter rostrata; foliis palmato-quinquepartitis; segmentis profunde incisive, laetioribus. Hoffm. Germ. 187.

Aconitum napellus. Jacq. Flor. austr. pag. 42. tab. 381.

Aconitum. Ait. Holm. 1739. pag. 41. tab. 2.

Aconitum purpureum, seu napellus vertius. C. Bauh. Pin. 183. — Rivin. tab. 488.

Aconitum lycoctonum quintum, neubergense. Clus. Hist. 1. pag. 96. Icon.

Cette plante, qui avoir été confondue avec la précédente, en diffère par plusieurs caractères pris surtout dans les fleurs. Ses tiges sont fermes, droites, alongées, garnies de feuilles pétiolées, alaires, les inférieures amples, écartées, presque palmées, à cinq digitations; les découpures élargies, lancéolées, d'un vert-foncé en dessus, plus clair en dessous, nues, luisantes, très-lisses à leurs deux faces; les dentelures courtes, aiguës, un peu élargies.

Les fleurs sont d'un violet-foncé, formant un long épi lâche, rameux à sa base, presque en grappe; les pédoncules glabres, uniflores; le capuchon muni d'un éperon court, recourbé, obtus; la lèvre lancéolée, roulée, bifide; le calque convexe, très-glabre.

Cette plante croit dans les forêts des montagnes, en Autriche, dans la Carinthie, la Carinthie, &c. &c.

11. ACONIT de Hongrie. *Aconitum tauricum.* Willd.

Aconitum coule simpliciter; racemo florum brevi; compacto; galea humilis, breviter rostrata, ontroscum repando-furcata; foliis nitentibus, quinquepartitis; segmentis oblongis, latiusculis, laciniis; laciniis remotè inciso-dentatis. Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 112. — Jacq. Icon. Rat. vol. 3. tab. 492. — Koell. Aconit. 15.

Aconitum tauricum, cuculli calcare adunco, obtuso; lobis lanceolato, revoluta, bifido; galea convexa; foliis nitidis, digitato-quinquepartitis; laciniis lanceolatis, trifido-incisive; pedunculis pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1236. n°. 10.

Aconitum violaceum, seu napellus secundus. C. Bauh. Pin. 183.

Aconitum napello simile, sed minù caruleum, praeocius. J. Bauh. Hist. 3. pag. 656.

Aconitum lycoctonum quartum, tauricum. Clus. Hist. 2. pag. 95.

Aconitum paniculatum. Lam. Dict. 1. pag. 33.

Peu différente au premier aspect de la plante précédente, celle-ci en diffère par les découpures de ses feuilles plus larges & plus profondes, par ses pédoncules pubescents, par le calque de la corolle plus obtus. Ses tiges sont presque simples, rameuses dans la plante cultivée; ses feuilles luisantes, digitées, à cinq découpures profondes; les lamibres lancéolées, trifides, incisives; l'éperon du capuchon recourbé, obtus; la lèvre lancéolée, roulée, bifide; le calque convexe, très-court. (Voyez ACONIT, n°. 6.)

Cette plante croit en Hongrie & dans quelques contrées de l'Allemagne.

11. ACONIT à tige grimpante. *Aconitum volubile.* Koell.

Aconitum cuculli calcare adunco, obtuso; lobis obcordato, ascendente; foliis opacis, quinquepartitis; laciniis cuneiformibus, trifidis, dentatis; coule volubili. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1237. n°. 11.

Aconitum volubile. Koell. Aconit. 21. — Pallas, Hort. Demidof.

Cette singulière espèce est remarquable par ses tiges grimpantes, en quoi elle est suffisamment distinguée de toutes les autres. Ses feuilles sont touffues, à cinq divisions; les découpures cuneiformes, trifides, dentées; l'éperon du capuchon crochu, obtus; la lèvre ascendante, presque en cœur.

Cette plante croit dans la Sibérie. &c.

14. ACONIT penché. *Aconitum cernuum.* Willd.

Aconitum cuculli calcare subadunco, obtuso; lobis lanceolato, emarginato; galea convexa, racemo nutante; foliis opacis, digitato-quinquepartitis; laciniis trifidis, inciso-dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1237. n°. 12.

Aconitum cernuum. Koell. Aconit. 17.

Aconitum lycoctonum, olivaceum, comà nutante. Clus. Hist. 2. pag. 97. Ic.

Aconitum comà inflexa, maximum. Tourn. Inst. R. Herb. 425. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 658.

Il se rapproche beaucoup de l'*Aconitum tauricum*. Ses tiges sont grêles, cylindriques, rameuses à leur partie supérieure; les racines longues, épaisses, noires en dehors, garnies de beaucoup de fibres; les feuilles nombreuses, touffues, à cinq divisions profondes, étalées; les lamibres trifides, incisives, dentées, glabres, mais point luisantes. Les fleurs sont disposées en une grappe

terminale, ordinairement rameuse, inclinée avant l'épanouissement des fleurs, puis un peu redressée. L'épéron est obtus, un peu recourbé; la lèvre lanceolée, échancrée; le calice convexe. La corolle est d'un pourpre-clair.

Cette plante croît sur les rochers, dans plusieurs contrées de l'Allemagne. γ

15. ACONIT panaché. *Aconitum variegatum*.

Aconitum floribus pentagynis; foliorum laciniiis semipartitis, superne latioribus. Linn. Syst. veget. 419. — Koell. Aconit. 18.

Aconitum cuculli calcare adunco, obtusa; labio oblongo, emarginato, adscendente; galea conica; foliis nitidis, tripartitis; laciniiis trifidis, cuneiformibus, dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1236. n° 13.

Aconitum caruleum, parvum. Dodon. Pempt. 441. Ic. — Dalech. Hist. 1. pag. 1743. Ic.

Ses grappes sont presque simples; les pédoncules inférieurs plus allongés; l'épéron du calice obtus, crochu; la lèvre oblongue, échancrée, ascendente; le calice cosmique; les étamines au nombre de cinq; les feuilles luisantes, à trois divisions peu profondes, élargies; chacune d'elles trifide, cuneiforme, un peu élargie au sommet. (Voyez ACONIT, n° 5.)

16. ACONIT à grandes fleurs. *Aconitum cammarum*. Linn.

Aconitum floribus subpentagynis; foliorum laciniiis cuneiformibus, incisus, acutis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 751.

Aconitum cuculli calcare adunco, obtuso; labio lanceolato, recto, acutè emarginato; galea conica, elongata; foliis opacis, quinquepartitis; laciniiis oblongo-cuneiformibus, trifidis, dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1238. n° 14.

Aconitum caule ramoso, paniculato; petiolis multifloris, cassidis mucrone longo. Haller, Helv. n° 1198.

Aconitum caruleo-purpureum, flore maximo, seu napellus quartus. C. Bauh. Pin. 185. (Voyez ACONIT, n° 7.)

17. ACONIT à crochet. *Aconitum uncinatum*. Linn.

Aconitum floribus subpentagynis, foliis multilobis; corollarium galea longius extensa. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 760. — Koell. Aconit. 22. (Voyez ACONIT, n° 8.)

ACORUS. (Voyez ACORE.)

ACOSTA. Genre de plantes du Pérou, appelé dans le pays *cachimier de montagne*, décrit par MM. Ruiz & Pavon, à rapporter au *moutabea* d'Aublet, dont elle ne diffère que par une anthère à huit loges au lieu de cinq, & une baie à cinq loges au lieu de trois. Le même nom a été donné par Loureiro à un arbrisseau de la Cochinchine, très-voisin de l'airelle, & distinct seulement par une cinquième partie ajoutée à sa fructification, par ses feuilles opposées. La *chauffe-rappe* porte aussi ce nom dans les familles de M. Adanson. (Jussieu.) (Voyez MONTABEE & AIRELLE, Suppl.)

ACRONICHIA. Forster. (Voyez HENNE, n° 3.)

ACROSTIQUE. *Acrostichum*. M. Swartz, dans l'ouvrage intéressant qu'il a donné sur les fougères, a restreint ce genre à des caractères moins étendus que ceux qui lui ont été attribués par Linné: d'où il résulte nécessairement que beaucoup d'acrostiques de Linné doivent être placés dans d'autres genres. J'ai cru devoir les mentionner ici, en indiquant le nouveau genre auquel ils appartiennent. J'y ai réuni en entier le genre *schizæa* par une division, afin d'éviter, le plus possible, de séparer par un long intervalle des genres très-rapprochés les uns des autres. J'ai suivi la même règle pour les *adiantes*, &c.

Le caractère essentiel des *acrostiques* est d'avoir :

La fructification composée de capsules éparses sur le dos des feuilles, très-rapprochées, presque confluentes, entourées d'un anneau élastique, privées d'enveloppe ou tépament.

Dans les SCHIZÆA,

La fructification est composée de capsules distinctes, rapprochées, placées sur le revers d'une foliole très-droite, par séries assez régulières, dépourvues d'un nouveau, marquées de quelques stries qui y tiennent lieu. Le tépament formé par les rebords de la foliole, reploie.

Ce dernier genre est remarquable par le port des espèces qui le composent. Leur tige, élevée sur un pétiole plane, étroit, membraneux à ses bords, faisant réellement partie de la feuille, se divise par bifurcations ou par digitations simples ou plus souvent bifides, étroites, linéaires. M. Swartz a nommé ces dénouures des *appendices* : c'est sur leur revers qu'est placée la fructification.

Quant aux *acrostiques*, ils ont le port des *pteris* & ces *palpodes*, offrant, comme eux, des feuilles simples ou composées, simplement ailées, ou deux & trois fois ailées : d'où résultent autant de sous-divisions faciles à saisir.

I. ACROSTICHUM. Swartz.

ESPÈCES.

* Feuilles simples, point divisées.

1. ACROSTIQUE à feuilles de citronnier. *Acrostichum citrifolium*. Linn.*Acrostichum frondibus lanceolato-ovatis, integris, venosis, subsessilibus; furculo radicante*. Swartz, Fil. pag. 9.*Hemionitis parasitica*. Linn. — Plumier, Filic. tab. 116. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 3, & HEMIONITE, n°. 2.)Les capsules sont éparées, & occupent tout le disque de la face inférieure des feuilles; elles n'ont point de régument. Il paroît que cette plante est la même que l'*hemionitis parasitica*.2. ACROSTIQUE à feuilles de nummulaire. *Acrostichum nummularifolium*. Swartz.*Acrostichum frondibus subsessilibus, cordato-subrotundis, subius tomentosis, fructiferis obovatis; furculo reptante, radicante*. Swartz, Fil. pag. 419, & pag. 191. tab. 2. fig. 1.

Ses fouches sont très-longues, rampantes, garnies, de distance à autre, de petites racines noires, hérissées d'écaillés ovales, acuminées, très-petites, couchées, brunes, imbriquées; garnies de feuilles alternes, presque sessiles; les stériles nombreuses, ovales, un peu arrondies, un peu échanquées en cœur à leur base, très-entières, sans nervures sensibles, glabres en dessus, tomenteuses & blanchâtres en dessous, à peine longues d'un demi-pouce; les poils en étoile; les feuilles fertiles plus petites, ovales, un peu rétrécies à leur base, presque glabres, chargées en dessous de capsules d'un brun-luisant, entre-mêlées de poils étoilés, un peu noirâtres.

Cette plante croît à l'île de Java; elle a le port du *pteris piostelloide*. Linn. (V. f. in herb. Juss.)3. ACROSTIQUE à longues feuilles. *Acrostichum longifolium*.*Acrostichum frondibus lineari-lanceolatis, integris, marginatis; fertilibus spiraliur convolutis*. Swartz, Fil. pag. 9. — Jacq. Collect. 2. pag. 105.*An polypodium (rigidum), frondibus integerrimis, glaucis, oculis* Aubl. Guian. vol. 2. pag. 963.*Candollea longifolia*. Mirbel.

Sa racine noirâtre, épaisse d'un pouce, munie de fibres allongées, est couverte d'écaillés à son collar; elle produit de grandes & longues feuilles linéaires-lanceolées, aiguës, très-entières, lon-

gues d'un à deux pieds; les stériles planes, droites, plus longues; les fertiles rétrécies à leur partie supérieure en une longue languette presque roulée en spirale, couverte sur cette partie, & même plus bas, de la fructification, composée de petites capsules en forme de globules pulvéulents.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (V. f.)

4. ACROSTIQUE à larges feuilles. *Acrostichum latifolium*. Swartz.*Acrostichum frondibus marginatis, integris; sterilibus lato-lanceolatis, fertilibus ovato-lanceolatis*. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1589, & Filic. pag. 9.*Lingua cervina, rigida & glabra*. Plum. Fil. 135.

Ses racines sont rampantes, épaisses, écailleuses, garnies de longues fibres brunes: il s'en élève des pétioles cylindriques, glabres, un peu comprimés, longs de six pouces, soutenant des feuilles longues d'un pied & plus, droites, très-entières, un peu décurrentes sur les pétioles; les stériles lanceolées, larges d'un pouce & demi, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, à nervures transversales & parallèles; les feuilles fertiles une fois plus larges, ovales à leur base, lanceolées, aiguës, à nervures plus apparentes, plus rapprochées, couvertes en dessous par la fructification d'un brun-loncé; les capsules très-petites, entourées d'un petit boudet luisant, d'un brun plus clair.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronc des vieux arbres & sur les rochers.

5. ACROSTIQUE de Sainte-Hélène. *Acrostichum conforme*. Swartz.*Acrostichum frondibus immarginatis, integris, ovato-lanceolatis; fertilibus conformibus; furculo radicante, scarioso, squamoso*. Swartz, Fil. pag. 10 & pag. 192. tab. 1. fig. 1.*Acrostichum latifolium*. Swartz, Obs. in Schrad. Journ. 1801. pag. 271.

Il diffère du précédent en ce qu'il est bien moins élevé, que ses pétioles sont plus fortement membraneux à leurs bords, toutes les feuilles semblables, moins aiguës à leur sommet, moins veinées. Les racines sont dures, épaisses, rampantes, garnies de quelques fibres simples; couvertes d'écaillés nombreuses, imbriquées, scarieuses, ovales-lanceolées, pâles, veinées, réticulées. Les feuilles sont simples, droites, longues de cinq à six pouces & plus, oblongues-lanceolées, souvent un peu finées à leurs bords, légèrement décurrentes sur le pétiole, à nervures peu sensibles & parallèles, glabres à leurs deux faces; les feuilles stériles

d'abord roulées à leurs bords, puis planes & couvertes, à leur face inférieure, de petites capsules nombreuses, très-serrées, d'un brun-pâle.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Hélène & au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

6. ACROSTIQUE simple. *Acrostichum simplex*. Swartz.

Acrostichum frondibus integris; sterilibus lanceolatis, acuminatis; fertilibus linearilanceolatis. Sw. Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1587, & Fil. pag. 10.

Ses racines sont couvertes de paillettes; elles produisent un grand nombre de fibres brunes, simples, velues. Les fougues ou pétioles sont très-courts, nus, comprimés, à peine longs d'un pouce; les feuilles droites, simples; les stériles longues de cinq à six pouces, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres, coriaces, à nervures horizontales & parallèles; les feuilles fertiles deux & trois fois plus longues, linéaires-lancéolées, glabres, entières, couvertes en dessous par la fructification, composée de capsules d'un brun-pâle, très-petites, sans réguement.

Cette plante croît sur le tronc des arbres, parmi les mousses, à la Jamaïque.

7. ACROSTIQUE visqueux. *Acrostichum viscosum*. Swartz.

Acrostichum frondibus integris; sterilibus linearilanceolatis; stipitibus elongatis, costis squamulosis; fertilebus linearibus, subius villosis. Swartz, Fil. pag. 10.

Acrostichum petiolatum. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1588.

On distingue cette espèce à la viscosité de ses pétioles & à ses feuilles fertiles velues. Ses racines sont composées de fibres noires, nombreuses, filiformes, cylindriques & couvertes à leur base de paillettes écailleuses, subulées, brunes, luisantes; les fougues ou pétioles nombreux, roides, noirâtres. Les feuilles sont simples; les stériles longues d'environ un pied, linéaires-lancéolées, acuminées, glabres à leurs deux faces, larges d'un demi-pouce, à nervures parallèles; la côte du milieu saillante, cylindrique; les feuilles fertiles plus longuement pétiolées, ensiformes, un peu obtuses, très-entières, hérissées en dessus de petites écailles ciliées & pileuses à leurs bords, d'un brun-noirâtre, couvertes, à leur face inférieure, de petites capsules d'un jaune-pâle.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les Indes occidentales.

8. ACROSTIQUE hérissé. *Acrostichum hirtum*. Swartz.

Acrostichum frondibus oblongo-lanceolatis, utrinque acuminatis, supra stipitibusque pulchro-hirtis; margine crenulato, punctato; fertilibus ovato-lanceolatis. Swartz, Fil. Add. pag. 419 & pag. 194.

Ses fougues sont ligneuses, radicales, épaisses, anguleuses, couvertes d'écailles luisantes & noirâtres; les pétioles bruns, écailleux, épaissis à leur base, roides, anguleux, filonnés à leur partie supérieure, parsemés de poils noirâtres. Les feuilles sont oblongues-lancéolées, acuminées à leurs deux faces; les stériles légèrement ondulées, ou sinuées ou crénelées à leurs bords, à nervures parallèles, d'un brun-verdâtre; munies, vers leur circonférence, de petits points d'où sortent des poils courts, noirâtres; les feuilles stériles un peu plus petites, plus étroites, membraneuses à leurs bords, parsemées de poils rares à leur face supérieure, chargées en dessous de la fructification, composée de capsules petites, très-nombreuses, serrées, d'un brun un peu clair.

Cette plante croît sur les arbres, à l'île de Madère. (V. f. in herb. Juss.)

9. ACROSTIQUE velu. *Acrostichum villosum*. Swartz.

Acrostichum frondibus lato-lanceolatis, suberrantibus, utrinque villosis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1592, & Fil. pag. 10.

Lingua cervina, villosa, minor. Plum. Fil. tab. 127. D.

Cette plante a des racines fibreuses, noirâtres, nombreuses, filiformes, très-simples, velues; il s'en élève des pétioles en touffe, longs de quatre ou six pouces, pileux, un peu comprimés. Les feuilles sont droites, larges, lancéolées, rétrécies principalement à leur sommet, souvent un peu crénelées ou ondulées à leurs bords; les feuilles stériles velues à leurs deux faces, membraneuses, parsemées de poils roides & longs; les feuilles fertiles un peu plus petites, très-pileuses en dessous, couvertes en dessous de capsules cendrées ou blanchâtres, fort petites, entre-mêlées de quelques poils rares.

Cette plante croît sur le revers des montagnes, à la Jamaïque. (V. f. in herb. Juss.)

10. ACROSTIQUE moussueux. *Acrostichum muscosum*. Swartz.

Acrostichum frondibus squamosis; sterilibus ovato-lanceolatis, obtusis; fertilibus linearilanceolatis. Swartz, Fil. pag. 10, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1591.

p. *Lingua cervina, villis & squamulis auris muscosis*. Plum. Fil. tab. 139. ? — Lam. illustr. tab. 863. fig. 4. ?

Ses fouches sont rampantes, garnies de paillettes & de racines brunes, simples, filiformes; ses feuilles longues de trois ou quatre pouces, oblongues-lancéolées, obtrus, arrondies à leur sommet, entières à leurs bords; les unes stériles, presque glabres en dessus, à nervures parallèles, garnies en dessous d'écaillés petites, oblongues, ciliées; d'autres fertiles, deux & trois fois plus longues, plus étroites, obtuses, très-écaillées à leurs deux faces, couvertes en dessus de capules fort petites, luisantes, d'un brun-châtain.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronc des arbres. La plante a différé de la précédente en ce que ses feuilles sont acuminées & non obtuses; les pétioles & les feuilles ciliés à leurs bords. Elle paroît devoir former une espèce particulière.

11. ACROSTIQUE écailléux. *Acrostichum squamifolium*. Swartz.

Acrostichum frondibus linearilanceolatis, utrinque stipitibus pulcre squamosis; paleis ciliatis. Sw. Fil. pag. 10 & 195.

Ses racines sont ramassées en touffes gazonneuses; elles produisent plusieurs fouches ou pétioles cylindriques, longs de trois à six pouces, couverts d'écaillés presque imbriquées, lancéolées, membraneuses, ciliées à leurs bords, d'un brun un peu clair; les feuilles longues d'un à deux pieds, linéaires-lancéolées, larges d'un pouce, rétrécies à leurs deux extrémités, entières ou légèrement sinuées, ondulées à leurs bords, couvertes à leurs deux faces, principalement en dessous & sur la côte du milieu, d'écaillés noires, luisantes, ciliées; la couleur des feuilles d'un vert-foncé. La fructification n'est pas connue; mais la forme & le caractère des feuilles la rapprochent des espèces précédentes.

Cette plante croît à la Jamaïque & à l'île de Madère.

12. ACROSTIQUE spatulé. *Acrostichum spatulatum*.

Acrostichum frondibus oblongis, obtusis, stipitibus rigidopilosis; fertilibus longius stipitatis, apice spatulatis. Swartz, Fil. pag. 10. — Roy-Saint-Vincent, Voyage aux quatre îles des mers du Sud, vol. 1. pag. 363. tab. 10. fig. 1.

Ses fouches sont rampantes, chargées d'une touffe de petites fibres noires, entre-mêlées, glabres, presque capillaires; les feuilles stériles oblongues, presque en spatule, obtuses, de trois à cinq pouces de longueur, quelquefois moins; parsemées de poils roides & roussâtres, très-ferrés sur le pétiole; les feuilles fertiles de même forme, d'un vert tendre en dessus, veinées, avec quelques poils rares; couvertes en dessous, excepté le petit rebord marginal, de la fructification touffue, qui

noirît en vieillissant. Leur pétiole est presque glabre, bien plus long que celui des feuilles stériles.

Cette espèce croît à l'île Bourbon, sur les pierres, au bord des eaux. (V. f. in herb. Juss.)

13. ACROSTIQUE hybride. *Acrostichum hybridum*.

Acrostichum frondibus sterilibus, ovato-oblongis linearique lanceolatis, margine nervisque crinitis; fertilibus minoribus, glabris; stipitibus longissimis, squamosis. Swartz, Fil. pag. 11. — l'île-Saint-Vincent. l. c. vol. 3. pag. 96.

Cette espèce varie beaucoup dans ses formes. Ses racines sont écailleuses; elles produisent des feuilles nombreuses, les unes fertiles, d'autres stériles; ces dernières sont ovales, aiguës ou très-oblongues, presque linéaires, lancéolées, longues de trois à dix pouces, soutenues par un pétiole grêle, plus long que les feuilles, parsemé de quelques écaillés brunes, caduques, plus rares sur les feuilles; les feuilles fertiles plus courtes & plus petites, variables dans leur forme, très-glabres; leur pétiole très-long, écailléux; la fructification d'abord d'un jaune très-pâle, puis d'un beau brun.

Cette plante croît à l'île-de-France, sur les pierres, dans les carrières. (V. f. in herb. Juss.)

14. ACROSTIQUE chevelu. *Acrostichum crinitum*. Linn.

Acrostichum frondibus lato-ovatis, obtusis, hirsutis, supra crinitis. Linn. Syst. veget. pag. 928. — Swartz, Filic. pag. 11. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 5.)

15. ACROSTIQUE à petites écaillés. *Acrostichum squamatum*. Cavan.

Acrostichum frondibus oblongis; fertilibus brevioribus, subtus stipitibus squamosis. Swartz, Filic. pag. 11. — Cavan. Pict. 1801. n°. 580.

De ses racines s'élèvent des feuilles nombreuses, oblongues, de deux fortes; les unes allongées, stériles; les autres plus courtes, fertiles, garnies à leur base inférieure, ainsi que les pétioles, de petites écaillés. Elle croît au Pérou, sur les rochers.

16. ACROSTIQUE frangé. *Acrostichum fimbriatum*.

Acrostichum frondibus lanceolatis, fimbriatis; stipitibus tostis. Swartz, Filic. pag. 11. — Cavan. Annal. Hist. Nat. 1. pag. 101.

Cette plante est composée de feuilles simples, entières, en forme de lance, frangées à leurs bords. Leurs pétioles sont couverts de petites écaillés semblables à des poils fins, soyeux. Elle croît dans la

royaume de Quito, sur les montagnes, aux lieux ombragés.

17. ACROSTIQUE rampant. *Acrostichum repens*.

Acrostichum frondibus sterilibus, ovato-acutis, ciliatis; fertilibus linearibus; stipitis brevissimis; furculo filiformi, repente. Swartz, pag. 11. — Cav. Præl. 1801. n°. 381.

Ses fouches sont filiformes & rampantes : il s'en élève des pétioles très-courts, qui supportent des feuilles de deux sortes ; les unes stériles, ovales, aiguës à leur sommet, ciliées à leurs bords ; les autres fertiles & linéaires, chargées en dessous de la fructification. Elle croît dans l'Amérique méridionale, au Quayaquil.

18. ACROSTIQUE axillaire. *Acrostichum axillare*.

Acrostichum caulescens, sub quinque pedale; frondibus sterilibus lanceolatis, fertilibus linearibus, stipitatis, ad steriles subaxillaribus. Swartz, Fil. pag. 11. — Cavan. Præl. 1801. n°. 382.

Cette espèce est fort grande, & s'élève presque à la hauteur de cinq pieds. Ses fouches prennent la forme d'une forte tige, garnie de deux sortes de feuilles, les unes stériles, lancéolées, simples, entières ; les autres fertiles, pédoncées, & portant presque de l'aisselle des feuilles stériles.

19. ACROSTIQUE acuminé. *Acrostichum acuminatum*. Juss.

Acrostichum angustifolium lanceolatis, longè acuminatis, integerrimis; sterilibus margine ciliatis; fertilibus obtusis, subitis pulverulentis. (N.)

Ses racines sont noires, épaisses, fibreuses, écailleuses ; les pétioles presque filiformes, comprimés, presque nus, longs de deux à quatre pouces. Les feuilles étroites, lancéolées, glabres, membraneuses ; les stériles ciliées à leurs bords, obtuses, arrondies à leurs deux extrémités, à peine nerveuses, longues de deux pouces & plus, larges de six ou huit lignes, surmontées d'une pointe subulée, velue, longue d'un demi-pouce. Les feuilles fertiles de même forme, mais ordinairement point acuminées, couvertes sur toute leur face inférieure par la fructification d'un brun-foncé, sous la forme de petits globules pulvérulents.

Cette plante a été recueillie au Pérou par M. Joseph de Jussieu. (V. f. in herb. Juss.)

20. ACROSTIQUE luisant. *Acrostichum splendens*.

Acrostichum foliis linearibus, inaequalibus, inter-

adum longissimis, subacutis obtusis, utrinque valè squamosis. (N.)

Confer cum acrosticho misso. ? Swartz.

Elle se rapproche beaucoup de l'*acrostichum muscosum* de Swartz. Ses racines sont fibreuses & noires : il s'en élève plusieurs feuilles d'une longueur très-irrégulière, les unes longues presque d'un pied, les autres de quelques pouces, larges de six ou huit lignes, linéaires, planes, entières, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet ; les unes couvertes à leurs deux faces de paillettes d'un jaune doré & brillant, si abondantes sur certaines feuilles, ainsi que sur les pétioles, qu'elles les cachent entièrement ; d'autres sont presque nues à l'une de leurs faces, quelque fois aux deux. Cette espèce a été recueillie par Commerçon à l'île Bourbon. (V. f. in herb. Juss.)

21. ACROSTIQUE à feuilles de succise. *Acrostichum succisifolium*. Juss.

Acrostichum foliis coriaceis, ellipticis seu lanceolatis-ovatis, subitis squamosis. (N.)

Il s'élève d'une racine commune & un peu épaisse, plusieurs feuilles hautes de trois à six pouces, de forme un peu différente, les unes plus courtes, elliptiques, obtuses à leurs deux extrémités ; les autres ovales, un peu lancéolées, toutes fermes, coriaces, assez semblables à celles de la scabieuse fucifère, couvertes à leurs deux faces, principalement en dessous, de paillettes très-nombreuses, lancéolées, aiguës, caduques, d'un jaune-foncé, qui blanchissent en vieillissant. Les pétioles également écaillés, plus courts que les feuilles ; la fructification éparse sur le revers des feuilles.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-Thouars à l'île de Tristan-d'Acugna. (V. f. in herb. Juss.)

22. ACROSTIQUE douteux. *Acrostichum dubium*.

Acrostichum foliis simplicibus; sterilibus ovatis, multò minoribus; fertilibus oblongo-lanceolatis, subsquamosis; furculo cæcè, repente ramoso. (N.)

An polypodium adnascens ? Swartz fil., pag. 15 & 122. tab. 2. fig. 2.

Elle se rapproche de l'*acrostichum longifolium* ; mais les feuilles sont de deux sortes & bien moins longues, beaucoup plus étroites. Ses fouches sont grêles, cylindriques, tortueuses, rampantes, ramifiées, écailleuses, munies de petites racines fibreuses, noires, un peu velues. Les feuilles stériles sont courtes, ovales, les unes obtuses, presque spatulées ; les autres aiguës à leurs deux extrémités, à peine écailleuses ; les feuilles fertiles beaucoup plus longues, étroites, lancéolées, aiguës,

aiguës, plus ou moins écaillées; la fructification d'un brun-jaunâtre, éparse sur le revers des feuilles.

Cette plante croît à l'île Bourbon. (V. f. in herb. Desfont. & Juss.)

23. ACROSTIQUE à dents de scie. *Acrostichum serratum*.

Acrostichum pumilum, frondibus lineari-lanceolatis, serratis, apice fructiferis. (N.) Lam. Ill. Gen. tab. 865. fig. 2. An schizoa?

C'est une des plus petites espèces de ce genre, une des plus élégantes. Elle croît en gazons, assez semblable à un groupe de petites mousses. Ses racines sont capillaires & touffues; il s'en élève des feuilles nombreuses très-simples, larges à peine d'une ligne, hautes d'un pouce & demi au plus, glabres, d'un vert-gai, linéaires-lancéolées, rétrécies à leur base en un pétiole filiforme, dentées en scie à leurs bords, aiguës, un peu élargies vers leur sommet. Il part de la côte du milieu autant de nervures simples qu'il y a de dents; elles les traversent jusqu'à leur sommet. La fructification est composée de petites capsules confluentes, brunes, luisantes, placées vers l'extrémité des feuilles dont elles recouvrent le disque, excepté les bords.

Je crois que cette plante vient dans l'Amérique. (V. f. in herb. Desfont.)

* * Feuilles simples avec des divisions.

24. ACROSTIQUE pelté. *Acrostichum peltatum*. Swartz.

Acrostichum frondibus sterilibus, apice dichotomoriatis; laciniis linearibus, sterilibus, reniformibus, crenulatis. Swartz, Fil. pag. 11, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1593.

Osmunda peltata. Swartz, Prodrum. pag. 127.

Lichen digitatus, geranii facie. Plum. Fil. tab. 50. A. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 12.

Ses feuilles sont longues, rampantes, filiformes, un peu flexueuses, divisées en longues fibrés, brunes, radicales, couvertes de paillottes imbriquées, membranées, noires; les pétioles sont nus, droits, filiformes, striés, longs de trois à cinq pouces; les feuilles stériles planes, droites, un peu arrondies, dichotomes à leur partie supérieure; les découpures linéaires, bifides, glabres, inégales, obtuses; les feuilles fertiles beaucoup plus petites, en cœur, presque rondes, larges de six lignes, planes, point divisées, d'un vert-pâle, nues & glabres à leur face supérieure, & étendues à leur contour par une bordure membraneuse & ondulée, chargées en dessous de

Botanique. Supplément. Tome I.

petites capsules très-nombreuses, d'un brun luisant, entourées d'un anneau élastique.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronc des arbres. (V. f.)

25. ACROSTIQUE ferrugineux. *Acrostichum ferrugineum*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatifidis; pinnis linearibus, acutis, patentibus, integerrimis, connatis; stipite levi. Linn. Syst. veget. pag. 929. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 11.)

26. ACROSTIQUE biforme. *Acrostichum biforme*. Swartz.

Acrostichum frondibus lineari-dichotomis, pendulis; laciniis sterilibus, linearibus; sterilibus reniformibus, integris; primordiali magno, cretello, oblongo, sublobato. Swartz, Fil. pag. 12.

Osmunda coronaria. Muller. — Naturforscher.

21. St. pag. 107. tab. 3.

Son feuillage, dans son premier développement, est ample, droit, oblong, presque lobé. Les feuilles sont linéaires, dichotomes, pendantes, découpées. Les découpures stériles sont linéaires; celles qui portent la fructification, entières & réniformes.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

27. ACROSTIQUE écussonné. *Acrostichum stemmaria*. Comm.

Acrostichum (alcicorne), frondibus palmatis, cretulis; laciniis dichotomis, lanceolatis, obtusis, versus apicem fructiferis; primordialiibus reniformibus; lobatis, venosis. Swartz, Fil. pag. 12. — Palis. Beauv. Flor. d'Owar. 1. 2. tab. 2.

Neuropleyeron. Pluken. Amakh. tab. 429. fig. 2. — Schkuhr. l. c. tab. 2.

Acrostichum bifurcatum. Cavan. Præl. 1801. n°. 587.

Cette plante offre, pour premier développement, une sorte de feuille large, épaisse, en écusson, lobée, presque palmée irrégulièrement, marquée de nervures longitudinales; les autres feuilles sont plusieurs fois bifurquées; les découpures lancéolées, obtuses, d'abord toutes couvertes de poils étroits & caducs, disparaissant avec la fructification. Celle-ci ne présente d'abord que de petites taches, mais insensiblement ces taches s'agrandissent & recouvrent une grande partie de la feuille.

Cette plante croît sur les arbres, dans l'Asiétique & la Nouvelle-Hollande. (V. f.)

28. ACROSTIQUE à feuilles de chêne. *Acrostichum quercifolium*.

Acrostichum frondibus distindis, ternatis; sterilius foliolis terminalibus ovatis, incisifs, lateralibus trilobis, frutifcantium linearibus, subrepandis. Sw. Fil. pag. 12. — Retz. Observ. bot. 6. pag. 39. — Vahl, Symbol. 3. pag. 103.

Ophryoglossum zeylanicum. Houtt. N. H. 2. tab. 94. fig. 1.

Osmunda trifida. Jacq. Coll. & 3. tab. 20. fig. 3. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 3. (Voyez OSMONDE, vol. 4, n° 19.)

29. ACROSTIQUE bifurqué. *Acrostichum bifurcatum.* Swartz.

Acrostichum frondibus distindis; sterilius pinnis linearis-dichotomis; fertilius ovatis, bifidis simplicibus. Swartz, Fil. pag. 12. — Pluk. Phytogr. tab. 350. fig. 4. — Schkuhr. Crypt. tab. 2.

Osmunda bifurcata. Jacq. Coll. & 3. tab. 20. fig. 2. (Voyez OSMONDE, vol. 4, n° 20.)

30. ACROSTIQUE fleuri. *Acrostichum floridum.*

Acrostichum (aurum), frondibus distindis, ternatis; sterilius foliolis pinnatifidis, medio majori; lateralium laciniis bascos deorsum elongatis; frutifcantium bipinnatis, linearibus. Swartz, Fil. pag. 13 & 198.

Filix florida. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 78. tab. 35. fig. 1.

Ses fouches sont hautes d'un à deux pieds, glabres, anguleuses, d'un pourpre-noirâtre; les feuilles de deux sortes; les unes stériles, ternées, à cinq angles, composées de folioles pédicellées, sinuées, pinnatifides; l'intermédiaire plus grande; les découpures étalées, profondément divisées; les inférieures décourantes, les supérieures confluentes; les plus basses incisées, crénelées; les deux folioles latérales étendues, découpées; les découpures externes plus longues; celles de la base très-grandes, perpendiculaires, incisées, crénelées; les autres entières, toutes glabres à leurs deux faces, un peu veinées. Les feuilles fertiles sont plus longues, partagées en trois; leurs folioles deux fois ailées, à découpures linéaires, couvertes en dessous de capsules fort petites.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

31. ACROSTIQUE doré. *Acrostichum aureum.* Linn.

Acrostichum fronde pinnatâ; pinnis alternis, linguiformibus, integerrimis, glabris. Linn. Syst. veg. 219. — Plum. Filic. tab. 104. — Pluken. Almag.

tab. 288. fig. 2. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 1 & tab. 3. B. (Voyez ACROSTIQUE, n° 14.)

32. ACROSTIQUE auriculé. *Acrostichum aurum.* Lam.

Acrostichum (punctatum), fronde pinnatâ; foliolis alternis, lanceolatis, integerrimis; infimis auriculatis, supremis decurrentibus, supra punctatis, glabris. Linn. f. Suppl. pag. 444.

Acrostichum (punctatum), frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, integris, supra punctatis, infimis auriculatis, terminalibus, basi coadunatis. Swartz, Fil. pag. 13. (Voyez ACROSTIQUE, n° 16.)

33. ACROSTIQUE à feuilles de nicotiane. *Acrostichum nicotianifolium.* Swartz.

Acrostichum frondibus pinnatis; pinnis sterilibus ellipticis, apice attenuatis; fertilibus oppositis, ovato-lanceolatis, minoribus. Swartz, Fil. pag. 13 & pag. 199.

Cette fougère s'élève à la hauteur de trois pieds & plus. Ses fouches sont cylindriques, garnies de paillettes à leur base, glabres à leur partie supérieure, marquées en devant d'un sillon profond. Ses feuilles sont ailées; les unes stériles, presque sessiles, elliptiques, longues d'un pied & demi, longuement rétrécies vers leur sommet; leur contour entier, légèrement ondulé; leurs deux faces glabres, d'un vert-sombre; les nervures parallèles; l'intervalle rempli par des veines réticulées. Les pinnules fertiles sont opposées aux stériles, sessiles, excepté la terminale; beaucoup plus petites, ovales ou lanceolées, acuminées, légèrement ondulées à leurs bords, finement veinées, brunes & granuleuses en dessous, couvertes de capsules éparées, contiguës, mais point agrégées, d'un brun-pâle; point de capsules vers les bords.

Cette plante croît à l'île de Saint-Thomas. (V. f. in herb. Juss.)

34. ACROSTIQUE à folioles ternées. *Acrostichum trifoliatum.* Linn.

Acrostichum frondibus pinnatis; foliolis ternatis, lanceolatis. Linn. Syst. veg. pag. 210. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 3. 22. *Foliolatum.* (Voyez ACROSTIQUE, n° 22.)

35. ACROSTIQUE sinué. *Acrostichum sinuatum.* Swartz.

Acrostichum frondibus pinnatis, ensiformibus; pinnis ovatis, semipinnatifidis, coriaceis, subtus imbricatis-squamosis. Swartz, Fil. pag. 14.

Ses feuilles sont ailées, ensiformes, composées de pinnules ovales, coriaces, à demi pinnatifides,

glabres en dessus, sinuées à leur contour, couvertes en dessous d'écaillés imbriquées.

Cette plante croît au Pérou.

36. ACROSTIQUE étranger. *Acrostichum alienum*. Swartz.

Acrostichum frondibus distinctis; pinnis incis, superioribus coadunatis, decurrentibus, inferioribus semipinnatis. Swartz, Filic. pag. 13, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1595.

Cet acrostique a l'aspect d'un polypode ; il en diffère par sa fructification. Ses fougères sont rampantes, flexueuses, ascendantes, hérissées d'écaillés, garnies de longues fibres brunes, radicales ; les pétioles longs de six pouces, cylindriques, un peu anguleux, très-lisses ; les feuilles stériles droites, longues d'un pied & demi, simplement ailées ; les folioles opposées, lancéolées ; les supérieures un peu confluentes ; celles du milieu libres, sessiles, pinnatifides ; les inférieures médiocrement pédicellées, à demi pinnatifides ; leurs découpures lancéolées, acuminées, glabres à leurs deux faces, légèrement dentées en scie ; les feuilles fertiles semblables aux précédentes, mais plus courtes, un peu moins divisées ; les folioles entières, rarement incisées, couvertes en dessous de capsules très-petites, brunes, luisantes ; leur anneau d'une couleur plus pâle ; entre-mêlées de paillettes fines ou de poils.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque.

**** Feuilles presque deux fois ailées.

37. ACROSTIQUE scolopendre. *Acrostichum cervinum*. Swartz.

Acrostichum frondibus distinctis, sterilibus pinnatis; pinnis ovato lanceolatis, integerrimis; fertilibus pinnatis; pinnis linearibus; pinnulis coadunatis, oblongis. Swartz, Fil. pag. 14 & pag. 100.

Osmunda cervina. Linn. (Voyez OSMONDE, vol. 4, pag. 653, n°. 16.)

38. ACROSTIQUE à ocellettes. *Acrostichum cruciatum*. Linn.

Acrostichum pinnis oppositis, lanceolatis; inferioribus appendiculatis. Linn. Syst. Plant. pag. 930. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 29.)

39. ACROSTIQUE tomenteux. *Acrostichum maranta*. Linn.

Acrostichum frondibus subbipinnatis; pinnis opposito-coadunatis, subtus hirsutissimis, basi sulcatis. Linn. Syst. veget. pag. 919. (Déterminer Barrel. & Pluken. synonym.)

Acrostichum (marantz), pinnulis coadunatis,

inferioribus pinnatifidis, subtus imbricato-paleaceis. Swartz, Filic. pag. 14. — Sturm. Deutsch. Flor. II. 6. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 4. — Spreng. Einl. tab. 2. fig. 18.

Lonchitis altera maranta. Clu^r. Hist. 2. pag. 212. Icon. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 25.)

40. ACROSTIQUE lanugineux. *Acrostichum lanuginosum*.

Acrostichum fronde bipinnatâ, lanuginosâ; foliolis obtusis, distinctis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 400.

Acrostichum (vellem), frondibus bipinnatis, lanuginosis; pinnulis distinctis, ovatis, subcordatis, obtusis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 457. — Swartz, Filic. pag. 14. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 1.

Lonchitis mollior, lanuginosa, ceterach facie, minor, hispanica. Barrel. Icon. tab. 857. 858.

Filicula crispâ, lanugine hepatici coloris vestita, ex Insulis Fortunatis. Pluk. Aïn. pag. 150. tab. 181. fig. 4.

Cette espèce, confondue par Linné, à ce qu'il paroît d'après sa synonymie, avec la précédente, en est parfaitement distinguée par ses feuilles, couvertes à leurs deux faces d'un duvet lanugineux. Ses racines sont tortueuses, brunes, filiformes, laineuses : il s'en élève plusieurs feuilles droites, longues de huit à dix pouces, larges d'un demi-pouce & plus, rétrécies à leurs deux extrémités, chargées d'un duvet blanc ou roussâtre, deux fois ailées ; les folioles petites, épaisses, point confluentes, arrondies à leur sommet. La fructification, de couleur roussâtre, est répandue sur toute la surface inférieure des feuilles.

Cette plante croît dans les fentes des rochers du mont Atlas, en Espagne, aux Canaries. (Ex Desfont.)

41. ACROSTIQUE à queue. *Acrostichum caudatum*. Cavan.

Acrostichum frondibus bipinnatis, pinnulis inferioribus pinnatifidis, laciniis terminalibus linearibus-coadunatis. Swartz, Fil. pag. 15. — Cavan. Przl. 1801. n°. 592.

De ses racines s'élèvent plusieurs feuilles deux fois ailées. Les pinnules inférieures sont pinnatifides ; les folioles linéaires, ainsi que les découpures : celles du sommet, rétrécies, se prolongent en une sorte de queue. Elle croît à Panama.

42. ACROSTIQUE sulfuré. *Acrostichum sulfureum*. Swartz.

Acrostichum frondibus bipinnatis; pinnis bipin-

distis ; *lacinis cuneatis* , *reclusis* , *apice serratis*. Swartz, Fil. pag. 15, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1597.

Il est beaucoup plus élevé que l'*acrostichum calomelanos* ; ses feuilles les plus roides, plus amples. Ses racines sont simples, capillaires, velues ; les foveoles en pétioles filiformes, en touffes cylindriques, d'un brun-rougeâtre ; les feuilles droites, oblongues, acuminées, deux & trois fois ailées ; les pinnules inférieures un peu distantes, courtes ; les intermédiaires plus longues ; les supérieures insensiblement plus courtes, alternes, redressées ; les folioles ovales, alternes ; les inférieures pinnatifides, à découpures cunéiformes, obtuses, dentées en scie, d'un vert-foncé, couvertes en dessous d'une poussière d'abord blanchâtre, puis jaune, dans laquelle sont éparpillées des capules nombreuses, blanchâtres, diaphanes, entourées d'un anneau brun.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le revers des rochers. (*V. f. in herb. Juss.*)

43. ACROSTIQUE à poussière blanche. *Acrostichum calomelanos*. Linn.

Acrostichum frondibus bipinnatis ; pinnis apice attenuatis ; pinnulis lanceolatis, incisio-serratis, inferioribus sursum basi auratis. Swartz, Fil. pag. 15. — Linn. Syst. veget. pag. 930. — Willd. Berol. tab. 41. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 5.

4. *Acrostichum (ebeneum)* , *frondibus pinnatis ; pinnis sessilibus, oblongis, serratis ; summis brevissimis, integerrimis*. Swartz, l. c. — Linn. Spec. — Sloan, Hist. 1. pag. 92. tab. 53. fig. 1. (*Voyez ACROSTIQUE*, n°. 31.)

44. ACROSTIQUE tartareux. *Acrostichum tartareum*. Swartz.

Acrostichum frondibus bipinnatis ; pinnulis subcoarctatis, oblongis, obtusis, infimis basi obsolete incisus, supra marginem subcrenulato, revolutis ; subius albidofarinosis. Swartz, Fil. pag. 15 & pag. 102.

Acrostichum (tartareum) , *foliis bipinnatis ; pinnulis alternis, secundariis oblongis, obtusis ; tegumento transversim striato*. Cavan. Præf. 1801. pag. 242. n°. 591.

Hemionitis dealbata. Willd. Hort. berol. tab. 40.?

Cette plante est haute de deux ou trois pieds. Ses foveoles sont touffues, cylindriques, glabres, hautes d'un pied, fermes, luisantes, d'un pourpre foncé, marquées d'un sillon en avant à leur partie supérieure ; les feuilles ovales-lanceolées, deux fois ailées à leur partie inférieure, droites, simplement ailées à leur partie supérieure ; les pinnules alternes, distinctes, rapprochées, lancéo-

lées, une seconde fois ailées ; les folioles sessiles presque alternes ; les inférieures légèrement decurrentes, les supérieures confluentes ; la terminale ovale-lanceolée, crénelée ; les autres ovales-oblongues, obtuses, glabres, striées, d'un vert-foncé en dessus, couvertes en dessous d'une poussière blanchâtre, adhérente, dans laquelle sont plongées des capules éparpillées, nombreuses, entourées d'un anneau brun.

Cette espèce croît à la Jamaïque, au Pérou, au Chili.

215. ACROSTIQUE à feuilles d'or. *Acrostichum chrysophyllum*. Swartz.

Acrostichum frondibus bipinnatis, pinnis lanceolatis ; pinnulis approximatis, sessilibus, obovatis, incisus, striatis, lucidis ; superioribus coarctatis, subius flavicantibus. Swartz, Fil. pag. 15, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1598.

Filix aurea, pinnulis rotundis incisus divisa. Plum. Fil. tab. 44.

Au port d'un *adiantum* il joint la fructification des acrostiches, & diffère des deux & trois espèces précédentes par ses folioles oblongues, obtuses, striées, d'un beau jaune-doré en dessous. Ses racines sont composées de plusieurs fibres agréables, roides, longues, filiformes, noires ; il s'en élève des foveoles nombreuses, noirs, très-lisses, cylindriques, hauts d'un demi-pied. Les feuilles, d'une forme deltoïde, sont droites, hautes d'un pied, deux fois ailées ; les pinnules étalées, insensiblement plus courtes, composées de folioles oblongues, obtuses, presque entières ou crénelées, roides, d'un vert-luisant en dessus, couvertes en dessous d'une poussière jaune, brillante ; les folioles supérieures rapprochées, presque connexes ; les inférieures distinctes. La fructification consiste en petites capules nombreuses, noires, un peu luisantes, éparpillées dans la poussière jaune.

Cette plante croît aux Antilles, sur les lieux élevés. (*V. f. in herb. Juss.*)

46. ACROSTIQUE scarieux. *Acrostichum scarium*. Swartz.

Acrostichum frondibus bipinnatis, pinnulis subrotundis, squamis scariosis obtectis. Swartz, Fil. pag. 16.

Acrostichum lanuginosum. Willd. Schist. A&Erfurt. 1802. tab. 3. fig. 4.

Cet acrostiche a un aspect lanugineux. Ses feuilles sont deux fois ailées ; les pinnules composées de folioles presque arrondies, couvertes d'écaillés scarieuses, en forme de petites paillettes. Il croît au Mexique.

47. ACROSTIQUE jaunâtre. *Acrostichum flavens*. Swartz.

Acrostichum frondibus decompositis; foliolis bipinnatis; pinnulis oblongis, obtusis, subius flavicant; farinosis. Swartz, Fil. pag. 16 & pag. 204.

Espèce fort élégante, d'environ un pied de haut. Les pétioles sont filiformes, striés, cylindriques, longs de six à sept pouces, glabres, luisans, d'un pourpre-noirâtre, munis vers leur base de quelques poirelles scarieuses, d'un brun-pâle. Les feuilles sont triangulaires, plusieurs fois composées, longues de trois à quatre pouces; les pinnules opposées, deux fois ailées, les folioles également opposées, séparées, souvent ternées, planes, oblongues, obtuses, entières, d'un brun-verdâtre en dessus, couvertes en dessous d'une poussière jaunâtre, dans laquelle sont éparées des capsules nombreuses, luisantes, d'un brun-pâle; la côte du milieu & les bords nus & décolorés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

48. ACROSTIQUE blanchâtre. *Acrostichum albidulum*. Swartz.

Acrostichum frondibus decompositis; foliolis subpinnatis; pinnulis ovato-subrotundis, subius albidis; farinosis. Swartz, Fil. pag. 17 & pag. 205.

Elle diffère de l'espèce précédente par sa petitesse & par ses folioles couvertes en dessous d'une poussière blanchâtre & farineuse; elle ne s'élève qu'à la hauteur de trois ou quatre pouces. Ses pétioles sont droits, presque capillaires, d'un pourpre-foncé; les feuilles oblongues, plusieurs fois composées; les pinnules opposées, presque deux fois ailées, principalement à leur base; les folioles ovales, un peu arrondies, quelquefois à trois lobes, sessiles, un peu en cœur, perites, entières, d'un vert très-foncé en dessus, blanchâtres en dessous, & couvertes de petites capsules brunes, nombreuses, entourées d'un anneau noirâtre & luisant.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

II. SCHIZEA. Swartz, Smith.

49. ACROSTIQUE péliné. *Acrostichum pellinatum*. Linn.

Acrostichum (schizaa pellinata), fronde simplicissima, nuda, filiformi, subtriquetra; paribus appendicularum secundis, subquadratis, apice connatis. Swartz, Fil. pag. 150.

Acrostichum pellinatum. Linn. Amœn. acad. vol. 1. tab. 12. fig. 4 & 5. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 9.)

Il diffère des acrostiques par le caractère de sa

fructification, décrite plus haut dans l'exposition du caractère des schizaa.

50. ACROSTIQUE fistuleux. *Acrostichum fistulosum*.

Acrostichum (schizaa fistulosa), fronde simplicissima, nuda, filiformi, teretifolia; paribus appendicularum secundis, subquadratis; stipitis bascos sciss fistulosi. Labill. Nov. Holl. vol. 2. pag. 103. tab. 250. fig. 3.

Cette espèce s'élève à peine à la hauteur de six à sept pouces, d'une racine épaisse, couverte de poils soyeux, d'un brun-noirâtre, luisans, fistuleux. Ses pédoncules, en forme de tiges, sont simples, nombreux, filiformes, nus, cylindriques, un peu roides, terminés par une petite expansion ovale, foliacée, à deux rangs de petites folioles lancéolées, oblongues, obtuses, glabres, obliquement striées, ciliées & comme déchiquetées à leurs bords, à peine portant, à chacun de leurs côtés, une série de capsules sessiles, solitaires, ovales, brunâtres, striées à leur sommet, s'ouvrant longitudinalement, contenant des semences globuleuses; les enveloppes formées par les bords recourbés des folioles.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labillardière.)

51. ACROSTIQUE en aile. *Acrostichum pennula*.

Acrostichum (schizaa pennula), fronde simplicissima, nuda, filiformi, subuncipiti; appendicularum paribus secundis, subquadratis, apice subulatis, rectis.

Il s'élève de ses racines des feuilles très-étroites, filiformes, presque à deux angles, d'abord très-simples, en forme de pétiole, qui se divisent à leur sommet en plusieurs digitations, ordinairement au nombre de cinq, droites, subulées, unilatérales, obliquement striées; les capsules disposées, au revers des digitations, sur une seule série, entre-mêlées de quelques poils fins, allongés, noirâtres. Elle croît dans l'Amérique septentrionale.

52. ACROSTIQUE digité. *Acrostichum digitatum*. Linn.

Acrostichum (schizaa digitata), fronde simplicissima, nuda, linearis-subtriquetra, longissima; appendicularibus digitatis, linearibus, rectis. Swartz, Fil. pag. 150 & 180.

Acrostichum (digitatum), stipitis nudis, triquetris; fronde digitata, linearis, integerrima, aequali. Linn. Spec. Plant. pag. 424. — Amœn. acad. 1. pag. 269. tab. 11. fig. 1. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 8.)

Ses souches sont noirâtres, triangulaires, longues de deux ou trois pouces, imbriquées à leur base, munies de petites racines. Ces souches se

prolongent en feuilles linéaires, menues, longues de deux pieds, divisées en digitations simples, portant en dessous la fructification sur deux lignes.

53. ACROSTIQUE dichotome. *Acrostichum dichotomum*.

Acrostichum (schizxa dichotoma), fronde nudâ, dichotomâ; laciniis linearis-fubulatis; paribus appendicularum convenientibus, secundis, septenis. Swartz, Fil. pag. 150.

Acrostichum (dichotomum), nudum, spicis Jeundis, ascendentibus, reflexis, compressis. Linu. Syst. veget. pag. 929.

Rhipidium dichotomum. Bernhardsi, in Schrad. Journ. 1800. vol. 2. pag. 127. tab. 2. fig. 3.

Schizxa Forsteri. Spreng. an. 3. pag. 157. ? (Voy. ACROSTIQUE, n. 10.)

54. ACROSTIQUE bifide. *Acrostichum bifidum*.

Acrostichum (schizxa bifida), fronde nudâ, bififormi, compressâ, bifidâ; paribus appendicularum secundis, etiam usculis, subquindenis. Swartz, Filic. pag. 151.

Acrostichum dichotomum. Cavan. Ptol. 1801. n. 584, & Willd. tab. 3. fig. 3.

Les feuilles, qui s'élèvent d'abord en forme de pétiole, sont nues, étroites, comprimées, filiformes, bifides à leur partie supérieure. Chaque branche se divise en digitations unilatérales, redressées, au nombre de quinze environ.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

55. ACROSTIQUE élégant. *Acrostichum elegans*. Vahl.

Acrostichum (schizxa elegans), fronde nudâ, dichotomâ; laciniis linearibus, nervosis; appendiculis secundis, revolutis. Swartz, Fil. pag. 151.

Acrostichum elegans. Vahl, Symbol. 2. tab. 50.

Ses pétioles ou la partie inférieure des feuilles sont simples, droits, nus, très-fles, convexes d'un côté, canaliculés de l'autre, se développant en une lame plane, large, d'abord bifide; chaque branche à deux découpures lancéolées, insensiblement plus larges vers le sommet, bifides & à plusieurs nervures longitudinales, partagées à leur sommet en six ou sept segments inégaux, subulées, qui se terminent par plusieurs déchirures ailées, latérales, disposées sur deux rangs, en forme de petits épis linéaires, subulés, longs de trois pouces, hérissés, recourbés, munis à leur face inférieure de petites capsules globuleuses, placées sur deux lignes entre-mêlées de quelques poils longs, d'un brun-noirâtre.

Cette plante croît à l'île de la Trinité.

* *Lophidium* (latifolium), fronde digitato-pedatâ; digitis lato-spathulatis, bifidis & simplicibus, apice fructiferis, subquadrilatero rotundatis; fructificatione subpaucicellatâ, cristatâ. Swartz, Fil. pag. 151. — Richard, Ag. Soc. Hist. Nat. Patif. pag. 112.

Cette plante paroît devoir appartenir aux schizxa. Ses feuilles se divisent en digitations larges, spatulées, bifides ou simples, presque également arrondies à leur sommet, où se trouve placée la fructification presque pélicellée & en forme de crête. Elle croît à Cayenne.

* Autres espèces d'ACROSTICHUM, ou douteuses ou placées dans d'autres genres.

56. ACROSTIQUE en corne d'élan. *Acrostichum alciornae*. Willem.

Acrostichum frondibus cuneiformibus, lobatis; lobis dichotomis. Willem. Fil. apud Ullér. ann. 18. pag. 61.

Ses feuilles sont simples, en forme de coin, divisées en lobes dichotomes. Il croît à l'île de Madagascar, où il a été observé par le jeune Willemet.

57. ACROSTIQUE à filets. *Acrostichum flaræ*. Forskh.

Acrostichum fronde bipinnatâ; stipite piloso, pinnis alternis; primariis remotis, pinnatis; secundariis cretâs, confluentibus, linearibus, apice flari denatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 184. — Swartz, Fil. pag. 18.

Ses pétioles sont couverts de poils rougeâtres; ses feuilles longues d'un pied, deux fois ailées; les premières divisions alternes, lancéolées; les pinnules partielles confluentes, linéaires-cuneiformes, liriées dans leur longueur, dentées à leur sommet; les dentelures inégales, terminées par le prolongement des nervures en un filic court; les folioles inférieures divisées en lobes parallèles, linéaires, inégaux.

Cette plante croît dans l'Arabie-Heureuse, dans les forêts.

58. ACROSTIQUE en cœur. *Acrostichum fimbriatum*. Cavan.

Acrostichum foliis bipinnatis, subius paleaceis, hisutissimis; foliolis fimbriatis. Cavan. Anal. Hist. Nat. 4. pag. 97. — Swartz, Fil. pag. 18.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Acrostichum lanuginosum*; peut-être même est-ce la même plante. Ses feuilles sont deux fois ailées, très-values & garnies de paillettes en dessous; les folioles presque en forme de cœur. Elle croît à Ténériffe, dans les lieux ombragés.

59. ACROSTIQUE grêle. *Acrostichum tenue*. Retz.

Acrostichum pinnulis oblongis, pinnatifidis; laciniiis obovatis, apice crenatis. Retz. Obf. 6. pag. 39. — Swartz, Fil. pag. 18.

Elle diffère très-peu de notre *adiantum varians*. (*Cheilanthes tenuifolia*, Swartz.) Ses feuilles sont deux fois ailées; ses pinnules oblongues, pinnatifides; les découpures en ovale-renversé, crénelées à leur sommet. Elle croît dans les Indes, à Siam & à Malacca.

60. ACROSTIQUE rouffêtrée, n°. 15. *Acrostichum rufum*. Linn.

C'est, selon M. Swartz, la même plante que l'*Asplenium tomentosum*. Lam. Encycl. vol. 2. pag. 308. n°. 26.

Hemionitis rufa. Swartz, Fil. pag. 20.

L'*Acrostichum cordatum*, Thunb. Prodr. Plant. Cap., doit être réuni aux *grammitis* de Swartz. (Voyez notre genre DORADILLE, *asplenium*. Suppl.)

61. ACROSTIQUE à aiguillons, n°. 28. (Voyez TRICHOMANE, n°. 69.)

62. ACROSTIQUE lancéolé. *Acrostichum lanceolatum*. Linn.

Acrostichum frondibus linearilanceolatis, acutis; furculo scandente. Linn. Syst. veget. pag. 928.

Polypodium (acrostichoides), *frondibus linearilanceolatis, subius incano-tomentosis, t furculo squamoso-radicante; foris confertis*. Swartz, Fil. pag. 29. — Forster, Prodr. n°. 434 Non Encycl. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 1.)

63. ACROSTIQUE à épi. *Acrostichum spicatum*. Linn.

Acrostichum fronde simplici, petiolato-lanceolata, utrinque attenuata, integerrima; spica terminali, lineari. Linn. Syst. veget. pag. 928. — Smith, Icon. ined. tab. 49.

Onoclea (spicata), *fronde simplici, lanceolata; apice attenuata, lineari, frutifera*. Swartz, Fil. pag. 110.

Schizaea spicata. Smith, A&T. Taur. 5. pag. 43. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 2.)

64. ACROSTIQUE hétérophylle. *Acrostichum heterophyllum*. Linn. (Voy. ACROSTIQUE, n°. 4.)

C'est la même plante que le *pteris pilosellatus*. Linn. & Dict. n°. 2. — Amœn. academ. vol. 1. pag. 268. tab. 12. fig. 2.

65. ACROSTIQUE ponctué. *Acrostichum punctatum*. Linn.

Acrostichum frondibus cordato-lingulatis, acuminatis, integerrimis, supra punctatis. Linn. Syst. veg. pag. 928.

Polypodium (lingulatum), *frondibus cordato-lingulatis; acuminatis, integris, supra punctatis; foris confertis*. Swartz, Fil. p. 30. (Voy. ACROSTIQUE, n°. 6.)

66. ACROSTIQUE septentrionale. *Acrostichum septentrionale*. Linn.

Acrostichum frondibus nudis, linearibus, lacinia-tis. Linn. Syst. veg. pag. 928. — W&D. Flor. dan. tab. 60. — Lam. Muhr. tab. 865. fig. 3.

Asplenium (septentrionale), *fronde inferni nudâ, apice bipartita; foliis linearibus, apice lacinia-tis*. Swartz, Filic. pag. 75. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 7.)

67. ACROSTIQUE à lanières. *Acrostichum lingua*. Thunb.

Acrostichum frondibus oblongis, obtusis, integris, petiolatis; furculo repente. Thunb. Flor. jap. pag. 330. tab. 33. — Schkuhr. Crypt. gew. tab. 1.

Polypodium (lingua), *frondibus oblongis, obtusis, integris, glabris, subius ferrugineo-tomentosis; foris confertis, globosis; furculo radicante*. Swartz, Fil. pag. 29.

Ses feuches sont rampantes, & produisent des racines fil-reuses, filiformes : il s'en élève des péti-oles glabres, cylindriques, soutenant des feuil-les simples, oblongues, obtuses, très-entières, glabres à leurs deux faces, couvertes en dessous d'un duvet tomenteux, couleur de rouille. La fructification est constituée par de petits paquets globuleux, très-rapprochés.

Cette plante croît au Japon.

68. ACROSTIQUE en fer de pique. *Acrostichum hastatum*. Thunb.

Acrostichum fronde simplici, hastatâ. Thunb. Fler. jap. pag. 331.

Polypodium (tricapfe), *frondibus hastatis; lobo medio lanceolato; foris sparsis, tomento incano involutis*. Swartz, Fil. pag. 30.

Ses feuilles sont simples, divisées en trois lobes qui leur donnent la forme d'une pique; celui du milieu lancéolé. La fructification est disposée en paquets épars, enveloppée d'un duvet épais & blan-châtre. Elle croît au Japon.

69. ACROSTIQUE australe. *Acrostichum australe*. Linn.

Acrostichum stipitibus nudis, glaberrimis, apice dichotomo-ramosis, quinque sex radiatis, subulatis,

Luterifloria. Linn. Suppl. pag. 444. Non Vahl. — Lam. Dict. 1. n°. 8. var. β.

Asplenium (australe), fronde infera nudâ, apice dichotomâ; foliolis subulatis, corvato-scandis. Swartz, Fil. pag. 73. & tab. 3. fig. 1.

Cette plante ne doit pas être confondue avec l'*acrostichum digitatum*, qui est un fchiâa de Smith; elle se rapproche beaucoup des *pteris*. Sa fructification est placée, non sur le bord des feuilles, mais entre le bord & la côte du milieu. Ses racines sont composées de fibres touffues, simples, roides, filiformes, un peu velues, couvertes d'écaillés membraneuses, linéaires, subulées. Ses pétioles sont nus, roides, filiformes, un peu anguleux à leur base, se divisant par dichotomies, formant des découpures linéaires, convexes, très-étroites, courbées, unilatérales, d'un vert-pâle; cylindriques & subulées à leur sommet. La fructification est placée sur deux lignes parallèles, vers les bords concaves des découpures, munie d'un tégument non interrompu presque marginal, noirâtre, membraneux. Les capsules sont petites, brunes & luisantes; les bourrelets un peu élargis.

Cette plante croît dans les îles Maurice & Bourbon.

70. ACROSTIQUE radié. *Acrostichum radiatum*. Koen.

Acrostichum (asplenium radiatum), fronde infera nudâ, apice dichotomo radiatâ; lacinis linearibus, acutis, rectis. Swartz, Fil. pag. 75.

Acrostichum australe. Vahl, Symb. 1. tab. 25. Non Linn.

Acrostichum dichotomum. Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 184. n°. 2.

Il paroît que cette espèce avoit été confondue avec l'*acrostichum australe*. Linn. Suppl. Elle lui ressemble par son port & par ses pétioles nus; mais les divisions sont radiées & dichotomes à leur sommet; les découpures partagées en deux segments linéaires, droits, acuminés, étalés, & non courbés ni unilatéraux. La fructification est d'une couleur plus rembrunie.

Cette plante croît à l'île Bourbon & dans l'Arabie. Elle se rapproche encore beaucoup de l'*acrostichum digitatum*; mais dans celle-ci la fructification est différente.

71. ACROSTIQUE de la Jamaïque. *Acrostichum polypodioides*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatifidis; pinnis linearibus, obtusis, integerrimis, patentibus, coronatis; stipite squamoso. Linn. Syst. veget. pag. 929.

Polypodium incanum. Swartz, Fil. pag. 35, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1665.

Polypodium ceteracium. Michaux, Flor. boreal. Amer. pag. 271.

Polypodium velatum. Schkuhr. Crypt. gew. tab. 11. B. — Morif. Hist. 3. 11. 14. tab. 2. fig. 5. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 13.)

72. ACROSTIQUE rouffêâtre. *Acrostichum rufum*. Linn.

C'est, d'après M. Swartz, la même plante que l'*asplenium tomentosum*. Linn. vol. 2 (CETERAC, n°. 26); la même que le *pteris rufa*. Linn. Spec. Plant. 1; enfin l'*hemionitis rufa*. Swartz, Fil. pag. 20.

73. ACROSTIQUE à feuilles de forrier. *Acrostichum sorbifolium*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatis; pinnis oblongo-ovatis, integris, serratis, acutis; stipitibus squamosis. Linn. Syst. veget. pag. 929. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 17; voyez aussi POLYPODE de la Guiane, n°. 65.)

La description qui accompagne cette dernière espèce appartient à l'*acrostichum à feuilles de forrier*. La plante d'Aublet paroît être une autre espèce.

74. ACROSTIQUE à bandes. *Acrostichum areolatum*.

Acrostichum frondibus pinnatis; pinnis alternis, linearibus, apice serratis. Linn. Syst. veget. pag. 929.

Onoclea (nodulosa), pinnis sessilibus, linearibus, pinnatifidis; fronde fertili, pinnis quâs noduloso articulatis, necolis contiguis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 272. — Swartz, Fil. pag. 111.

Osmunda caroliniana. Wadl. Flor. carol. p. 287. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 19.)

75. ACROSTIQUE bordé. *Acrostichum marginatum*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatis; pinnulis oblongis, integerrimis, undulatis, acuminatis; stipite nudo. Linn. Syst. Plant. pag. 929.

Pteris grandifolia. Swartz, Fil. pag. 95. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 18.)

76. ACROSTIQUE à feuilles menues. *Acrostichum sanctum*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatis, lanceolatis; pinnulis linearilanceolatis, inciso-serratis; serraturis infimis majoribus. Linn. Syst. veget. pag. 929.

Polypodium sanctum. Swartz, Fil. pag. 39, & Flor. Ind. occid. vol. 3. p. 1667. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 20.)

77. ACROSTIQUE

77. ACROSTIQUE de Virginie. *Acrostichum platyneuron*. Linn.

Acrostichum frondibus pinnatis; pinnis alternis, ovatis, crenatis, sessilibus, sursum arcuatis. Linn. Syst. veg. pag. 529.

Asplenium ebeneum. Air. Hort. Kew. vol. 3. pag. 461. — Swartz, Fil. pag. 79. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 21.)

78. ACROSTIQUE à feuilles en filique. *Acrostichum filiquosum*. Linn.

Acrostichum (peris thaliætoïdes), frondibus bipinnatis; pinnis sterilibus pinnatifidis; laciniis obtusis; fructiferis pinnatis; pinnulis bipartitis, linearibus. Swartz, Fil. pag. 98.

a. *Acrostichum thaliætoïdes*. Linn. Flor. xyl. t. 4.

β. *Acrostichum filiquosum*. Linn. Amcen. acad. vol. 1. pag. 270. tab. 12. fig. 3. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 23 & 24.)

M. Swartz soupçonne que ces deux plantes appartiennent à la même espèce, dont la première, α, ne produit que des feuilles stériles; la seconde, β, des feuilles fertiles.

79. ACROSTIQUE de l'île d'Elbe. *Acrostichum ilvense*. Linn.

Acrostichum frondibus subbipinnatis; pinnulis opposito-coarctatis, obtusis, subius hirsutis, basi integerrimis. Linn. Syst. veg. pag. 529. — Wedd. Flor. dan. tab. 391.

Polypodium ilvense. Swartz, Fil. pag. 39.

Polypodium maranta. Hoffm. — Schkuhr. Cryptog. tab. 19. (Voyez plus bas ACROSTIQUE des Alpes.)

80. ACROSTIQUE fourchu. *Acrostichum furcatum*. Linn.

Acrostichum dichotum, foliis pinnatis; pinnis parallelis, lanceolatis, approximatis, integerrimis. Linn. Syst. veg. pag. 530.

Mertensia furcata. Swartz, Fil. pag. 163. — Willd. in A. Holm. 1804. pag. 166.

Polypodium furcatum. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1679.

Peris frondibus dichotomis. Linn. Spec. Plant. edit. 1. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 27.)

81. ACROSTIQUE à aiguillons. *Acrostichum aculeatum*. Linn. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 28, & TRICHOMANE, n°. 69.)

82. ACROSTIQUE à feuilles d'Osmonde. *Acrostichum barbarum*. Linn.

Botanique. Supplement. Tome I.

Acrostichum frondibus bipinnatis; foliis oppositis; pinnulis lanceolatis, obtusis, serratis, sessilibus, alternis. Linn. Syst. veg. pag. 532.

Todea africana. Swartz, Fil. pag. 162 & 388. — Willd. in Schrift. der Acad. Erlaut. p. 14. tab. 3. g. 1. *Pinna frutif.*

Osmonda barbara. Thunb. Prodr. Cap. pag. 171. — Osmonda tosta. Schrad. Journ. bot. 1800. pag. 105. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 30.)

83. ACROSTIQUE prolifère. *Acrostichum viviparum*. Linn.

Acrostichum frondibus bipinnatis, viviparis; pinnis binatis, unilateralibus; pinnulis pinnatifidis, furcatis, subulatis, margine interiori fructi anti-bus. Linn. Suppl. pag. 444. — Berg. A. Petrop. VI. pag. 11. tab. 7. fig. 3.

Cenopteris (vivipara), fronde tripinnata, pinnulis filiformibus. Swartz, Fil. pag. 89.

84. ACROSTIQUE des Alpes. *Acrostichum alpinum*.

Acrostichum (polypodium hyperboreum), frondibus subbipinnatifidis, subius hirsutis; pinnis cuneatis, tri-quinquelobatis; locis crenulatis, foris confluentibus. Swartz, Fil. pag. 39.

Acrostichum alpinum. Bolton. Sil. t. 2. fig. 42.

Polypodium arvenicum. Smith, Flor. brit. pag. 1115.

Ceterach (alpinum). Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 115. n°. 1433, & Flor. franç. vol. 2. pag. 567.

An acrostichum ilvense? Lam. Dict. 1. pag. 37. Non Linn.

Voici ce que dit M. Decandolle au sujet de cette plante : « Cette espèce diffère certainement de l'*Acrostichum ilvense* de Linné, ce dont je suis assuré, soit par les phrases comparatives de Swartz, soit par la description de Roth, soit par un échantillon envoyé par M. Vahl à M. Desfontaines; mais elle croit dans le midi de l'Europe, & devoit conserver le nom d'*ilvense*, que tous les anciens botanistes lui donnoient. L'espèce de Linné, au contraire, ne croit point dans l'île d'Elbe, mais dans le nord de l'Europe, & devoit prendre le nom d'*hyperboreum*. »

Ses feuilles sont longues de quatre à cinq pouces. Leur pétiole commun est grêle, un peu rougeâtre, pubescent, garni de huit à neuf paires de folioles opposées vers le bas, alternes & plus développées dans le milieu, soudées vers le sommet, longues de quatre à six lignes, arrondies ou oblongues, obtuses, dépourvues de nervures sensibles, découpées en cinq ou sept lobes arrondis & pro-

fonds. Les bords ne se replient point en dessous. La surface inférieure porte des paillettes brunes en forme de poils, plus nombreuses à l'entour des capules : celles-ci naissent en groupes distincts, arrondis, dépourvus de téguments : à la maturité elles couvrent toute la feuille.

Cette plante croît en Provence, dans les Alpes & les Pyrénées. (Decand.)

84. ACROSTIQUE glauque. *Acrostichum glaucum*. Cavan.

Acrostichum (pteris glauca), frondibus quinqueangulis, tripinnatis, glabris ; pinnis infimis bipinnatis ; pinnulis linearibus, obtusis, teretibus, margine revolutis. Cavan. Przl. n°. 668, & Annal. de scienc. nat. vol. 1. pag. 107.

L'ensemble de son feuillage présente cinq angles. Ses feuilles sont trois fois sillées, glabres, presque glauques ; les pinnules inférieures partagées en deux ; les folioles linéaires, obtuses, roulées à leurs bords ; ce qui les fait paroître cylindriques.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne.

Nota. L'*acrostichum cordatum* Thunb. sera mentionné parmi les grammées. (Voyez DORADILLE, Suppl.)

Espèces douteuses.

* ACROSTIQUE bicolor. *Acrostichum bicolor*. Cavan.

Acrostichum foliis lanceolatis, acumine producto fruticantibus, subius albicanibus, superius ferrugineis. Cavan. Przl. 1801. n°. 577. — Swartz, Fil. pag. 113.

Cette espèce des îles Mariannes a des feuilles simples, lancéolées, entières, de couleur rouillée en dessus, blanchâtres en dessous, prolongées en une pointe sous laquelle se trouve la fructification.

* ACROSTIQUE en languette. *Acrostichum linguiforme*. Cavan.

Acrostichum foliis sterilibus lanceolatis, petiolatis ; fruticantibus alioribus, linearibus. Cavan. Przl. 1801. n°. 578. — Swartz, Fil. pag. 113.

Ses feuilles sont simples, entières, de deux sorts, les unes pétiolées, stériles, en forme de lame ; les autres linéaires, fertiles, plus élevées.

Cette plante croît au Pérou, dans le royaume de Quito.

* ACROSTIQUE plissé. *Acrostichum plicatum*. Cavan.

Acrostichum foliis sublinearibus, ferrugineo-squa-

mosis, petiolo brevioribus. Cavan. Przl. 1801. n°. 579. — Swartz, Fil. pag. 113.

Cette espèce, ainsi que les deux précédentes, paroît devoir appartenir au genre *oedea*, d'après Swartz. Ses feuilles sont simples, presque linéaires, plus courtes que leur pétiole, couvertes d'écaillés couleur de rouille. Elle croît au Pérou.

ACTÆA. (Voyez ACTÉE.)

ACTÉE. *Adia*. Ce genre a pour caractère essentiel :

Un calice à quatre folioles caduques ; quatre pétales ; un seul ovaire ; point de style ; un stigmate en tête ; une baie à une loge ; plusieurs semences attachées à un placenta latéral.

E S P È C E S.

1. ACTÉE en épi. *Adia spicata*. Linn.

Adia racemo ovato, frutibus baccatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. — Æser. Flor. dan. tab. 480. — Blackw. tab. 363. — Lam. Illustr. tab. 448. fig. 1.

Adia foliis circumscissis, duplicato pinnatis ; pinnulis extremis trilobatis. Hall. Helv. n°. 1076.

Acotium bacciferum. C. Bauh. Pin. 183.

Christophoriana. Clus. Hist. 2. pag. 86. (Voyez ACTÉE, n°. 1.)

2. ACTÉE à grappes. *Adia racemosa*. Linn.

Adia racemis longissimis, frutibus siccis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. — Lam. Illustr. tab. 448. fig. 2. (Voyez ACTÉE, n°. 2.)

3. ACTÉE du Japon. *Adia japonica*. Thunb.

Adia spicis longissimis ; foliis incisiss, palmatis, divisis. Thunb. Flor. Japp. pag. 221.

Cette plante est glabre dans toutes ses parties. Ses tiges sont herbacées ; ses feuilles pétiolées, ternées ; les folioles simples, en cœur, pédicellées, palmées, à cinq ou sept lobes incisés, dentés en scie ; la tige supérieure verte & glabre ; l'inférieure plus pâle ; le pétiole & les pédicelles alongés, striés. Les fleurs sont disposées en un épi simple, long de trois à sept pouces ; le calice & la corolle très-caducs ; l'ovaire glabre, oblong, dépourvu de style.

Cette plante croît au Japon. 4. (Description en Thunb.)

ACTINÉE. *Adina*. Ce genre, établi par M. de Jussieu pour une plante de l'herbier de Commerce, appartient à la famille des corymbifères, & se rapproche des *hymenopappus* de L'héritier ou *ratkia* Lavo. Il a pour caractère essentiel :

Des fleurs radiées; les fleurs hermaphrodites, à cinq sépales; les demi-fleurs femelles, à trois lobes à leur sommet; un calice simple, à plusieurs folioles; les sémences pileuses en dehors, couronnées par plusieurs arêtes élargies & comme ailées à leur base; le réceptacle nu.

Observations. Ce genre diffère des *rothia* par ses fleurs non stœculéuses, mais radiées; par les divisions de son calice, disposées sur un seul rang, & beaucoup plus courtes. La présence des demi-fleurs forme son principal caractère. Son nom est tiré du mot grec *actin* (rayon).

ESPÈCE.

1. ACTINÉE hétérophylle. *Alinea heterophylla*. Jussieu.

Alinea foliis inferioribus lanceolatis, sinuatis aut dentatis; superioribus linearibus, integris; caule unifloro.

Alinea heterophylla. Juss. Annal. Mus. vol. 2. pag. 425. Tab. 61. fig. 2.

Il s'élève de ses racines plusieurs tiges droites, un peu ligneuses à leur base, couvertes d'un duver rouffâtre, ainsi que toutes les autres parties de la plante, garnies de feuilles alternes, alongées, acuminées; les supérieures entières, étroites, presque linéaires; les inférieures plus larges, sinuées ou simplement dentées, à dents écartées, toutes sinuées dans les rameaux non fleuris; chaque tige ou rameau nu à son sommet, terminé par une seule fleur, dont le calice est simple, composé de plusieurs folioles disposées sur un seul rang: il renferme beaucoup de fleurs hermaphrodites, divisés en cinq lobes à leur sommet, entourés d'un rang de demi-fleurs femelles, dont la languette est terminée par trois lobes. Les étamines sont syngénées; le stigmate binné; les semences velues sur toute leur surface.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'embouchure de la rivière de la Plata. (V. f. in herb. Juss.)

ACTINOPHYLLUM (Flor. peruv.) (Voyez SCIODAPHYLLE.)

ACTINOTUS. (Labillard.) (Voyez VAQUELLE.)

ACUA ou KUA, nom brame d'une espèce d'omome, mentionnée dans Rheed. Hort. Malab. vol. 11. tab. 7. (Voyez AMOME à feuilles larges, vol. 1. pag. 134. n°. 4.)

ACUNNA. Ce genre a été établi par Ruiz & Pavon pour des arbrisseaux du Pérou, que leur caractère ramène au genre *besaria*, suivant l'ob-

servation de M. Ventenat. (Voyez BÉFARÉ, Suppl.)

ACUROA. *Acuroa*. (Aublet, Guian. vol. 4. tab. 301.) Genre de plantes de la famille des légumineuses, établi par Aublet, qui se rapproche beaucoup des *vatairea* (dattier) du même auteur, & même des *pterocarpus*. Il ne comprend qu'un seul arbre, élevé de douze ou quinze pieds, sur environ un pied de diamètre. Ses feuilles sont alternes, ailées avec une impaire; les folioles alternes, ovales, lisses, très-entières, réunies par une pointe moufle, alongée. Ses fleurs sont papilionacées, disposées en grappes terminales & axillaires. Leur calice est urcéolé, à cinq dents; les pétales onguiculés; l'étendard très-grand; la carène composée de deux pétales. Le fruit est une gousse médiocrement péricellée, rouffâtre, arrondie, concave d'un côté, convexe de l'autre, ne s'ouvrant pas, contenant une seule semence.

Cet arbre croît dans la Guiane, sur les bords de la mer. b

ACYNOS. *Acinos*. (Mœnch, Pers.) Ce nom grec avoit été donné à deux plantes de la famille des labiées, au *clinopodium vulgare* Linn. & au *thymus acinos* Linn. MM. Mœnch & Persoon ont cru devoir établir un genre *acynos*, composé du *thymus acinos* Linn. & de quelques autres espèces du genre *thymus*; ils lui assignent pour caractère essentiel :

Un calice à deux lèvres, sillonné, pileux, en bourse à sa base, velu à son orifice; une corolle un peu renflée à son orifice, irrégulière, à deux lèvres; la supérieure droite, échancrée; l'inférieure à trois lobes égaux, celle du milieu concave; toutes les étamines fertiles.

ACYPHYLLA. Forster. *Laserpitium acyphylla*. Linn. Suppl. 181.

Acyphylla squarrosa. Forst. Gen. pag. 135. tab. 68. — Juss. Gen. pag. 222.

Laserpitium (acyphylla), caule vaginato; petiolis foliorum dilatatis; foliis digitatis, linearibus, elongatis, mucronatis. Linn. Suppl. & Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1418.

Cette plante, dont Forster avoit fait un genre, a été rapportée au *laserpitium* par Linné fils. M. de Jussieu est très-porté à la regarder comme devant former un genre particulier, distingué des *laserpitium* par le calice à cinq dents persistantes; par les semences presque trigones sur leur dos. Les involucres universels & partiels sont composés de trois à cinq folioles; plusieurs des ombellules à fleurs mâles. Les tiges sont enveloppées par les gaines dilatées des pétioles, les feuilles distichées, linéaires, oblongues, mucronées; les fleurs disposées en plusieurs ombelles axillaires, à peine plus longues que les pétioles.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande.

ADAMBE. *Adamba*. (Voyez LAGERSTROME)

ADANSONIA. (Voyez BAOBAB.)

ADELIA. (Voyez ADÉLIE.)

ADÉLIE. *Adelia*. Ce genre est encore peu connu en espèces. Le manque de bonnes figures laisse quelques incertitudes sur leur détermination exacte. Celles que j'ai vues dans les herbiers m'ont laissé des doutes. Je ne les citerai qu'en prévenant qu'elles exigent un nouvel examen sur des individus vivants ou mieux conservés. M. de Lamarck en a fait graver deux espèces dans les *Illustrations des Genres*, planche 831. Nous avons fait avec ce savant des recherches inutiles pour retrouver ce genre dans son herbier : d'où il suit que je ne puis rien assurer de positif sur la deuxième figure, qui paroit approcher beaucoup de l'*Adelia acidoton*. Quant à la première, elle a été copiée dans Brown. Jnn. tab. 36. fig. 3. C'est le *borya castanoides* de Willden. vol. 4. pag. 711. (Voyez notre FORESTIERA, Suppl.)

Observations. Ce genre, auquel Linné a donné le nom d'*Adelia*, a été mentionné par Brown sous la dénomination de *bernardia*, auquel se trouve réuni le genre *acidoton* du même auteur, lequel avoit employé ailleurs le nom d'*Adelia* pour un autre genre que Michaux a rétabli dans sa *Flore de l'Amérique* sous le même nom ; ce qui nécessiteroit le changement du nom *Adelia* de Linné. Mais la haute réputation & les grands travaux de cet homme immortel feront toujours adopter de préférence les noms génériques qu'il a établis, qui doivent rester pour l'intérêt de la science, & qu'on ne peut changer de nouveau sans ajouter de nouvelles difficultés à une nomenclature déjà trop étendue.

Le genre *Adelia* de Michaux se trouve dans Willd. now sous le nom de *borya* ; mais avant que ce genre fût publié ou à peu près dans le même tems, M. Labillardière avoit décrit, dans ses plantes de la Nouvelle-Hollande, un genre nouveau, qui porte également le nom de *borya*, & que nous avons mentionné à l'article VINCETOXIC. Dans la nécessité de changer de nouveau le nom d'*Adelia* Mich., je ferai connoître ce genre sous la dénomination de *forestiera*, que j'ai dédiée à mon estimable & ancien ami Forestier, médecin & savant naturaliste à Saint-Quentin.

ESPÈCES.

1. ADÉLIE cotoneuse. *Adelia bernardia*. Linn.

Adelia foliis oblongis, tomentosis, serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1473. — Miller, Dict.

6°. 1. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 867. (Voyez ADÉLIE, 1°. 1.)

2. ADÉLIE ricinelle. *Adelia ricinella*. Linn.

Adelia foliis obovatis, integerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1473. — Amoen. acad. vol. 5. pag. 411. — Mill. Dict. n°. 2. (Voyez ADÉLIE, n°. 2.)

3. ADÉLIE épineuse. *Adelia acidoton*. Linn.

Adelia ramis flexuosis, spinis gemmeis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1473, & Amoen. acad. vol. 5. pag. 411.

Adelia (acidoton), foliis oblongis, obtusis, integerrimis, fasciculatis; spinis axillaribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 868. (Voyez ADÉLIE, 1°. 3.)

4. ADÉLIE à baguettes. *Adelia virgata*.

Adelia foliis obovatis, glabris, integerrimis; pedunculis folio longioribus, ramulis apice spinosis. (N.)

Quoique cette plante soit très-rapprochée de l'*Adelia acidoton*, elle en diffère cependant par ses rameaux très-droits, effilés, allongés, très-souples, un peu cendrés ou d'un brun-rougeâtre, rarement armés d'aiguillons. Les jeunes rameaux, courts & feuillés, se terminent par une épine. Les feuilles naissent d'abord rapprochées en paquets, puis alternes, écartées à mesure que les rameaux s'allongent : elles sont à peine longues de six à huit lignes, sur deux ou trois lignes de large, minces, glabres, vortées à leurs deux faces, très-entières, en ovale renversé, médiocrement pétioles, obtuses, arrondies à leur sommet, très-caduques.

Les fleurs sont nombreuses, presque solitaires dans l'aisselle des feuilles ; mais comme celles-ci sont très-rapprochées & caduques, les fleurs alors paroissent presque fasciculées, portées sur des pédoncules très-nécessaires, glabres, filiformes, longs d'un pruce & plus. Le calice, dans les fleurs femelles (les mâles ne me sont point connues), est petit, d'un vert tendre, à cinq ou six découpures très-ouvertes, ovales, aiguës à point de corolle. L'ovaire est libre, un peu globuleux, placé sur un réceptacle glanduleux, surmonté de trois styles courts, écartés entr'eux ; chaque style divisé à son sommet en deux stigmates aigus, très-ouverts.

Cette plante, originaire de l'Amérique méridionale, est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

5. ADÉLIE anormale. *Adelia anomala*. Juss.

Adelia foliis suboppositis, ovato-lanceolatis, glabris, obtusis crenatis; floribus racemosis, axilla-

ribus, minimis; spinis oppositis; caule tereti, glabro.
(N.)

Ses rameaux sont effilés, cylindriques, de couleur cendrée, très-glabres, armés de deux épines courtes, apposées, d'un jaune-clair, droites, élargies à leur base; de leur aisselle sortent des feuilles opposées; les supérieures alternes, ovales-lancéolées, médiocrement pétiolées, vertes, glabres à leurs deux faces, un peu obtuses à leur sommet, finement nervées, crénelées à leurs bords; les crénelures peu profondes, arrondies & obtuses, quelquefois presque nulles. Les fleurs femelles sont très-petites, presque sessiles, disposées en grappes axillaires, filiformes, à peine de la longueur des feuilles; les stigmates au nombre de deux ou trois, réfléchis; l'ovaire globuleux, à peine de la grosseur d'une tête d'épingle.

Cette plante croît en Afrique, à Sierra-Leona, où elle a été recueillie par M. Smeathman. H (V. f. in herb. Juss. & Desfont.)

ADENANTHERA. (Voyez CONDORI.)

ADENANTHOS. (Labillard.) (Voyez VARETTE.)

ADEMA. (Voyez ADÈNE)

ADENODUS. (Lour. Flor. coch.) Ce genre paroît devoir être rapporté à celui des *clavarpus*. (Voyez GANTIRE, Suppl.)

ADENOPHYLLUM. (Pier.) (Voy. SCHLECHTENDALE.)

ADENOSTEMA. (Forst.) (Voyez LAVENIA, Suppl.)

ADENOSTÈME. *Adenostemum*. M. Persoon a donné ce nom à un genre de plantes que les auteurs de la *Flore du Pérou* avoient nommé *gomortego*, qui est le *lucuma reale*. Molin. Hist. Chil. pag. 300. Il est bon de savoir que Forster avoit déjà appelé *adenostema* une plante des mers du Sud, que l'on a depuis appelée *lavenia*, & que, d'un autre côté, M. de Jussieu avoit mentionné un *lucuma* qui n'est point celui de Molina. Nous conserverons donc le nom d'*adenostema* de Persoon. Ce genre offre pour caractère :

Une corolle à sept pétales; dix étamines disposées sur trois rangs, insensiblement plus petites à chaque rang; deux glandes à la base de chaque filament; un style connelé; deux ou trois stigmates; un drupe à une seule loge; une noix très-dure, à deux ou trois loges; les noyaux comprimés.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce connue.

1. ADENOSTÈME luisante. *Adenostemum nitidum*.

Adenostemum foliis oblongo-lanceolatis, nitidis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3, pag. 108.

C'est un arbre toujours vert, qui s'élève à la hauteur de soixante à quatre-vingts pieds & plus. Son bois est dur, pesant, d'une longue durée, traversé par de belles veines panachées, que les habitants du Chili emploient pour la construction de leurs bâtimens, pour faire des poutres, & dont ils fabriquent aussi des tables & autres meubles fort élégans. Les feuilles sont oblongues, lancéolées, luisantes. Frottées entre les doigts, elles répandent une odeur résineuse, approchant de celle de la lavande ou du romarin; elles sont astringentes & balsamiques au goût, & s'enflamment très-aisément. Le fruit est peu charnu; mais sa chair est jaunâtre & très-agréable au goût.

Cet arbre croît au Chili, dans les grandes forêts; il fleurit au mois de mars, & remplit une grande partie de l'année chargée de fleurs & de fruits. Il paroît qu'il en existe encore une autre espèce à fruits plus petits & plus aigus, d'après le récit des habitants du Chili & les auteurs de la *Flore du Pérou*, qui n'ont vu que les fruits.

ADENOSTEMUM. (Voyez ADENOSTÈME, Suppl.)

ADIANTE. *Adiantum*. Ce genre offre pour caractère essentiel :

Des capsules réunies en petites lignes interrompues, placées sur le bord des feuilles, & recouvertes par un tégument qui s'ouvre de dedans en dehors, & qui est formé par le bord de la feuille repliée en dessous.

Les genres que j'ai rapprochés des adiantes sont composés en partie d'espèces placées d'abord dans ce genre, & que M. Swartz a fait passer dans d'autres, d'après la nouvelle distribution des fougères. Je vais en tracer ici les caractères.

Les *LINDÆA* diffèrent peu des adiantes; ils offrent pour fructification :

Des capsules réunies en petites lignes non interrompues, placées à une petite distance du bord des feuilles, & recouvertes par un tégument qui s'ouvre de dehors en dedans.

Les *CHEILANTHES* ont encore de très-grands rapports avec les adiantes; ils s'en distinguent principalement par leur tégument. Leur fructification offre :

Des capsules réunies en points ou en petites lignes séparées, placées sur le bord des feuilles, recouvertes par un tégument en forme de petites coilles membraneuses, formé par les crénelures repliées des feuilles, s'ouvrant de dedans en dehors.

ESPÈCES.

+ ADIANTUM.

I. Feuilles simples.

1. ADIANTE réniforme. *Adiantum reniforme*. Linn.

Adiantum frondibus orbiculato-reniformibus, indivisis, crenatis. Swartz, Fil. pag. 120. — Lam. Illustr. tab. 870. fig. 2.

Hemionitis arifolia. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 15. (Voyez ADIANTE, n°. 1.)

2. ADIANTE des Philippines. *Adiantum philippense*. Linn.

Adiantum frondibus à sacculo alternis, reniformibus, lobatis. Swartz, Filic. pag. 120. (Voyez ADIANTE, n°. 2.)

II. Feuilles composées, simplement ailées.

3. ADIANTE à trois feuilles. *Adiantum triphyllum*. Lam.

Adiantum fronde triphyllâ; foliis fissilibus, lanceolatis, pinnatifidis, crenatis. Swartz, l. c. — Swartz, Fil. l. c. — Smith, ined. Icon. 74. (Voyez ADIANTE, n°. 5.)

4. ADIANTE rayonné. *Adiantum radiatum*. Linn.

Adiantum fronde digitatâ; foliis pinnatis; pinnis oblongis, sursum auritis, subcrenatis. Swartz, Fil. pag. 121. (Voyez ADIANTE, n°. 8.)

5. ADIANTE du Canada. *Adiantum pedatum*. Linn.

Adiantum fronde pedatâ; foliis pinnatis; pinnis rhombo-oblongis, sublanatis, inciso-lobatis. Sw. Fil. pag. 121. (Voyez ADIANTE, n°. 9.)

6. ADIANTE en éventail. *Adiantum flabellatum*.

Adiantum fronde subpedatâ; foliis pinnatis; pinnis rhombo-rotundatis, crenatis; stipite pubescente. Swartz, l. c.

Adiantum fuscum. Retz. Obs. 2. pag. 28. tab. 5. (Voyez ADIANTE, n°. 14.)

7. ADIANTE lindée. *Adiantum lindseæ* Cavan.

Adiantum frondibus pedatis; foliis pinnatis; pinnis inferioribus rotundatis, superioribus trapeziis. Cavan. Præf. 1801. n°. 675. — Swartz, Fil. pag. 121.

Cet adiante a presque la forme d'un *lindseæ*;

Il en diffère par sa fructification. Ses feuilles se divisent en forme de digitations étalées, composées de folioles ailées. Les découpures inférieures sont arrondies, obtuses; les supérieures en forme de trapèze. Il croît dans le royaume de Quito.

8. ADIANTE lancéolé. *Adiantum lanceolatum*.

Adiantum (lindseæ lanceolata), fronde pinnatâ; pinnis linearibus lanceolatis, obtusis, serratis, alternis subequalibus. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 98. tab. 240. fig. 1.

Ses tiges sont lisses, hautes d'un pied, planes d'un côté, cannelées de l'autre & latéralement, soutenant des folioles disposées en aile, alternes, pédicellées, linéaires-lancéolées, glabres, obtuses, longues de deux pouces, obliquement tronquées à leur base lesquelles portent la fructification: celle-ci est placée vers chaque bord des folioles sur une ligne non interrompue, très-étroite. Le végétal s'ouvre en dehors, & recouvre des capsules cendrées, entourées d'un anneau jaunâtre.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labillardière.)

9. ADIANTE en croissant. *Adiantum lunatum*. Burm.

Adiantum frondibus pinnatis; pinnis alternis, lunatis, subintegris, radiato-venosis; margine superiore integro, incisive repando-fructificantibus; foris fructificantibus. Swartz, Filic. pag. 121. — Willd. Phytogr. 1. tab. 9. fig. 1.

Pteris lunata. Retz. Observ. 2. tab. 4. (Voyez ADIANTE, n°. 6.)

10. ADIANTE luisant. *Adiantum lucidum*. Sw.

Adiantum frondibus pinnatis; pinnis trapeziis, acuminatis, apice serratis; foris superne & antice continuis. Swartz, Fil. pag. 121.

Pteris lucida. Cavan. Præf. 1801. n°. 658.

Cette espèce ressemble presque à un *pteris*. Ses feuilles sont pétioles, simplement ailées, composées de folioles glabres, luisantes, en forme de trapèze, acuminées & demies en scie à leur sommet. La fructification est formée de paquets non interrompus, placés vers l'extrémité des folioles. Elle croît au Pérou & aux îles Philippines.

11. ADIANTE arqué. *Adiantum arcuatum*. Sw.

Adiantum frondibus pinnatis; pinnis alternis, petiolatis, lanatis, margine superiore fructiferis; foris oblongis. Swartz, Fil. pag. 122.

Adiantum lanatum. Cavan. Præf. n°. 676.

Ses feuilles sont simplement ailées, composées de folioles alternes, pédicellées, arquées ou en croissant, couvertes en dessous, vers leur sommet, par la trèç siccation disposée en paquets oblongs.

Cette plante croît aux îles Matiancas & Philippines.

12. ADIANTE pygmé. *Adiantum pumilum*. Sw.

Adiantum frondibus pinnatis; pinnis subrotundis, serratis; terminali majori, trapezoïde; foris marginem superiori subsiliatis. Swartz, Fil. pag. 122, & Flor. Ind. occident. pag. 1703. — Pluken. Almag. tab. 251. fig. 4 — Brown, Jam. 87. 1.

Ses fouches font rampantes, munies de racines nombreuses, noirâtres, velues, capillaires; les pétioles droits, cylindriques, glabres ou un peu pubescens; les feuil les ailées, composées de folioles alternes, un peu arrondies, finement dentées en scie, un peu obliques, quelquefois oblongues, aiguës à leur base; la foliole supérieure plus large, en forme de trapeze, quelquefois lobée, toutes glabres à leurs deux faces, d'un vert-gai, à nervures divergentes; la fructification placée sur les bords des folioles, en paquets solitaires, un peu arqués; leur enveloppe en forme d'écaïlle à demi rond.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronç des vieux arbres.

13. ADIANTE à feuilles en queue. *Adiantum caudatum*. Linn.

Adiantum frondibus pinnatis, pubescentibus, apice caudato radicans; pinnis semi-ovatis, sublanatis, sursum incis; lacinis emarginatis. Swartz, Fil. pag. 122 & pag. 320.

Adiantum incisum. Forskh. Flor. ægypt.-arab.

Adiantum hirsutum. Bory-Saint-Vincent, Itin. vol. 1. pag. 198. (Voyez ADIANTE, n°. 13.)

14. ADIANTE à racines touffues. *Adiantum rhizophorum*. Swartz.

Adiantum frondibus pinnatis, glaberrimis; pinnis deltoides, sursum incis; lacinis integris. (N.)

Adiantum rhizophorum. Swartz, Fil. pag. 320.

Cette belle espèce, très-rapprochée de l'*Adiantum caudatum*, en diffère en ce que ses pétioles & ses feuilles font entièrement glabres, les folioles presque deltoides & non à demi ovales, leurs découpages ordinairement entières & non échancrées à leur sommet. Ses racines sont composées d'un faisceau touffu de fibres brunes, alongées, très-simples, un peu velues, filiformes, d'où s'élèvent en grizan plusieurs tiges purpurines ou pétioles cylindriques, filiformes, garnis à leur partie inférieure de quelques petites écailles roussâtres; la partie

qui supporte les folioles, striée, un peu anguleuse, nue, blanchâtre; les feuilles simplement ailées; les folioles alternes, à peine longues de six à huit lignes, presque sessiles, cunéiformes à leur base, entières, presque droites à leur bord inférieur, incisées inégalement au bord supérieur, un peu glauques; la fructification disposée au bord supérieur en petits paquets séparés, ovales, oblongs.

Cette plante a été recueillie aux îles Maurice par M. Bory-Saint-Vincent. (V. f. in herb. Desfont.)

15. ADIANTE à grandes feuilles. *Adiantum macrophyllum*. Swartz.

Adiantum frondibus pinnatis; pinnis oppositis, trapezoïdis, acutis, serratis incis; summa majori, inferis subsiliatis, reflexis; vix fructiferis superi & antice connatis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 3. pag. 1707, & Fil. pag. 122.

Ses racines sont presque rampantes, épaisses, écailleuses, garnies de fibres longues, filiformes & velues; il s'en élève des fouches longues de deux pieds, cylindriques, un peu comprimées, roides, fragiles, très glabres, d'un pourpre-noir, terminées par des feuilles droites, longues d'un pied & plus, simplement ailées, composées de trois ou quatre paires de folioles opposées, presque sessiles; l'impaire presque triangulaire, longue de trois pouces, presque aussi large, incisée, dentée en scie; les folioles intermédiaires longues de deux pouces, étlées, tétrécies en angle droit à leur base, acuminées à leur sommet; toutes d'un vert-soncé, membraneuses, luisantes & veinées en dessus, plus pâles en dessous; les stéciles incisées & dentées; les autres entières, portant la fructification à leurs deux bords, sans interruption. Elle consiste en très-petites capsules aussi fines que des grins de poussière, très-abondantes, d'un brun noirâtre.

Cette plante croît dans les forêts, à la Jamaïque.

16. ADIANTE deltoidale. *Adiantum deltoidem*. Swartz.

Adiantum frondibus pinnatis, inferis subsiliatis; pinnis deltoides, obtusis; summa triangulari; foris ad marginem superiorem & inferiorem subsiliatis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 3. pag. 1707.

Ses racines sont rampantes, ascendantes, écailleuses, tomenteuses & noirâtres à leur collet; elles émettent plusieurs fouches cylindriques, longues d'un à trois pouces, très fines, prolongées en un pétiole presque capillaire, très-glabre, luisant, soutenant une feuille simplement ailée ou quelquefois deux fois ailée à sa partie inférieure, composée de folioles pétiolées, longues d'environ un demi-pouce, deltoides, obliquement rétrusées à leur base, obtuses & un peu arrondies à leur sommet, d'un vert-soncé, point luisant, plus pâles en dessous; la foliole terminale nue soit

plus grande, presque régulièrement triangulaire. La fructification est placée au bord supérieur des folioles sans interruption; elle est constituée par des capsules nombreuses, couvertes d'une enveloppe membraneuse, noirâtre, formée par le bord replié des folioles.

Cette plante croît sur les rochers, à la Jamaïque.

III. Feuilles deux fois ailées.

17. ADIANTE à dents de scie. *Adiantum serrulatum*, Linn.

Adiantum frondibus pinnatis bipinnatifide; pinnulis dimidiatis, deltoides, oblongis, subsulcatis, serrulatis, margine superiore fructificantiis, Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3, pag. 1709, & Fil. pag. 122. — Pluken. Phyt. tab. 125. fig. 2. (Voyez ADIANTE, n°. 12.)

18. ADIANTE à feuilles larges. *Adiantum latifolium*, Lam.

Adiantum (denticulatum), frondibus pinnatis bipinnatifide; pinnulis trapézoides, oblongis, acuminatis, subcrenato-denticulatis, margine superiore fructificantiis, Swartz, Flor. Ind. occid. p. 1711, & Fil. pag. 121. — Pluken. Almag. 11. tab. 252. fig. 5. — Plum. Filic. tab. 52. (Voyez ADIANTE, n°. 18.)

Il faut en retrancher la synonymie de Plukenet & de Sloane, qui appartient à l'espèce suivante, d'après M. Swartz.

19. ADIANTE en faucille. *Adiantum falcatum*, Swartz.

Adiantum frondibus pinnatis bipinnatifide; pinnulis basi fuscum rectangulis, trapézoides, acuminatis, sulcatis, apice serratis; foris anticæ & superne continuis, Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3, pag. 1715. — Pluk. Phyt. tab. 253. fig. 1. — Sloane, Hist. tab. 55 fig. 1.

Plusieurs fouches triangulaires, glabres, noirâtres, luisantes s'élèvent d'une racine velue & fibreuse; elles se développent en une feuille simplement ou quelquefois deux fois ailée, longue d'un pied ou d'un pied & demi, composée de folioles alternes, presque sessiles, en trapèze, longues d'un pouce, formant un angle droit au dessus de leur base, un peu courbées en faucille, acuminées, dentées en scie vers leur sommet; d'un vert gai, à nervures divergentes. La fructification est d'un brun-noirâtre, placée sans interruption sur le bord supérieur des folioles.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les grandes forêts, aux lieux mouilleux.

20. ADIANTE à feuilles en lance. *Adiantum lancea*, Linn.

Adiantum frondibus bipinnatis; pinnis pinnatifide oppositis, oblongis, terminalibus triangularibus huf-tatis, Linn. Syst. Plant. vol. 4, pag. 430. — Swartz, Fil. 123. (Voyez ADIANTE, n°. 10, & PTERIS, n°. 8.)

21. ADIANTE à crête. *Adiantum cristatum*, Linn.

Adiantum frondibus bipinnatis; foliis infimis bipinnatis; pinnis lanatis, superne multifloris, Linn. Syst. Plant. vol. 4, pag. 432.

g. ? *Adiantum cristatum, frondibus bipinnatis; pinnis infimis bipinnatis; pinnulis oblongis, postice truncatis, superne inciso-crenatis; erenis fructiferis, foris excisis*, Swartz, Fil. pag. 123. — Plum. Fil. tab. 96. ? (Voyez ADIANTE, n°. 20.)

22. ADIANTE nerveux. *Adiantum nervosum*, Swartz.

Adiantum frondibus bipinnatis; pinnulis rhombo-oblongis, striato-nervis, fuscum rectangulis, superne crenatis; erenis fructiferis, foris ovatis, stipite rachique pubescente, Swartz, Fil. pag. 124.

Ses fouches, ainsi que ses pétioles, sont pubescents; ses feuilles deux fois ailées, composées de pinnules à folioles rhomboïdales, oblongues, nerveuses, striées, coupées en angle droit à leur côté supérieur, crénelées à leur bord; les crénelures chargées de la fructification en petits paquets ovales.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

23. ADIANTE strié. *Adiantum striatum*, Swartz.

Adiantum frondibus bipinnatis; pinnis infimis bipinnatis; pinnulis deltoides rhomboïdeis, subsulcatis, striatis, rigidis; stipite tereti, glabro, Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3, pag. 1717, & Fil. pag. 124. — Jacq. Collect. v. 3, pag. 24, & Icon. Rar. vol. 2.

Ses fouches sont cylindriques, presque triangulaires, longues d'un pied, rugées, un peu épineuses vers leur base, d'un brun noir. Les folioles sont droites, longues de douze à quinze pouces, deux fois ailées; les pétioles rudes, cylindriques; les pinnules alternes, longues de quatre à cinq pouces, linéaires, tréécées vers leur sommet, quelquefois partagées à leur base en deux ou trois rameaux; les folioles alternes, très-rapprochées, à peine pétioles, oblongues ou ovales-deltoides, coupées en angle obtus, & quelquefois auriculées à leur base, presque entières, un peu courbées en faucille à leur côté supérieur. La fructification est placée sur le bord supérieur, rarement à l'inférieur; disposée par petits paquets à demi arrondis, interrompus, recouverts par une enveloppe roide, en forme d'écaille.

Cette

Cette plante croît dans les forêts, à la Jamaïque.

14. ADIANTE hérissé. *Adiantum hispidulum*. Swartz.

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnis infimis bipartitis ; pinnulis rhomboïdes , acutis , subfalcatis , striatis , rigidis ; stipite tereti , scabro. Swartz, Fil. pag. 124 & 321.

Il diffère de l'*Adiantum striatum* par son port moins élevé, par ses pinnules rhomboïdales, pubescentes, hérissées. Ses fouches sont anguleuses, roides, filiformes, noirâtres, longues de six à sept pouces ; les pétioles hispides, anguleux ; ses feuilles deux fois ailées, quelquefois plus ; les pinnules alternes ; les inférieures bidentées, composées de folioles rhomboïdales, presque sessiles, comme tronquées à leur base & vers le haut, un peu prolongées & obtuses à leur sommet, crénelées à leur bord supérieur, striées à leurs deux faces ; les nervures divergentes & dichotomes. La fructification est placée au sommet de la face supérieure des feuilles, en forme de capsules d'un brun-pâle & luisant ; leur enveloppe réniforme, formée par le repli du bord de chaque crénelure.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

15. ADIANTE velu. *Adiantum villosum*. Linn.

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnulis trapezioblongis , obtusis , anticè & superne fructificantibus ; fasis oblongis , stipite rachibusque villosis. Swartz, Fil. pag. 124.

Adiantum villosum , frondibus bipinnatis ; pinnis rhombeis , anticè extusque fructificantibus ; stipite villoso. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 431. ?

Ses fouches sont noirâtres, luisantes ; les pétioles velus ; ses feuilles deux fois ailées, composées de folioles oblongues, obtuses, glabres à leurs deux faces, alternes, presque sessiles, en forme de trapèze, chargées à leurs bords supérieur & extérieur de la fructification disposée en paquets oblongs.

Cette plante croît à la Jamaïque. (V. f. Comm. Ledr.)

16. ADIANTE poudreux. *Adiantum pulverulentum*. Linn.

Adiantum frondibus bipinnatis ; pinnulis rhomboïdibus , apice serratis ; fove serrati , margini superiori foliaria ; stipite hirsuto. Swartz, Fil. pag. 124. (Voyez ADIANTE, n°. 19.)

17. ADIANTE tronqué. *Adiantum truncatum*. Linn.

Botanique. Supplément. Tome I.

Adiantum frondibus decompositis ; foliolis pinnatis ; pinnis alternis , cuneatis , subfalcatis , truncatis , integerrimis. Linn. Syst. veget. pag. 947. (Voyez ADIANTE, n°. 21.)

18. ADIANTE cheveu de Vénus. *Adiantum capillus Veneris*. Linn.

Adiantum fronde decomposita ; pinnulis cuneatis , apice rotundatis , lobatis ; lobis fructiferis. Swartz, Fil. pag. 124. — Lam. Ill. tab. 870. fig. 1. — Jacq. Miscell. Aufl. 2. tab. 7.

Adiantum coriandrifolium. Lam. Dict. 1. p. 43.

1. *Adiantum fruticatum , coriandrifolium , jamaisense*. Pluken. A'mag. pag. 10. Phytogr. tab. 254. fig. 1. (Voyez ADIANTE, n°. 17.)

19. ADIANTE crénelé. *Adiantum crenatum*.

Adiantum fronde decomposita ; pinnulis rotundatis , crenatis , obtusis. (N.)

Ses pédoncules sont glabres, presque cylindriques, un peu comprimés, d'un brun noir luisant, d'un très beau poli ; ils se divisent en ramifications alternes, sous-divisées en d'autres capillaires ; les folioles pédicellées, alternes, nombreuses, glabres à leurs deux faces, point luisantes, un peu cendrées, légèrement striées en dessous, arrondies, larges de deux à trois lignes, crénelées à leurs bords ; les crénelures obtuses, portant en dessous une fructification réniforme, comprimée, un peu cendrée.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-Thouars à l'île de Tristan d'Acugna. (V. f. in herb. Juss.)

20. ADIANTE trigone. *Adiantum trigonum*. Labill.

Adiantum fronde supra decomposita ; pinnulis obovato-rhombicis , superne crenulatis , incisè ; sinibus serratis , stipite trigono. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 99. tab. 248. fig. 2.

Ses racines sont perpendiculaires, presque simples, accompagnées de petites fibres nombreuses, quelquefois tomenteuses. Les tiges sont hautes d'environ un pied & demi ; le feuillage plusieurs fois décomposé ; les ramifications alternes ; les pinnules un peu rhomboïdales, en ovale renversé, crénelées, incisées à leur partie supérieure, formant des échancrures à demi circulaires ; la fructification placée dans les échancrures, & formant des paquets en croissant, composés de petites capsules remplies de semences ovales.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labillardière.)

IV. Feuilles plusieurs fois ailées ou sarcomposées.

31. ADIANTE tendre. *Adiantum tenerum*. Sw.

Adiantum frondibus supra decompositis; pinnulis rhombicis, ovatis, superne incisivatis; lobis denticulatis, foriferis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 179, & Filic. pag. 114. — Brown, Jam. pag. 88. n°. 7.

Cette espèce tient le milieu entre l'*Adiantum capillus Veneris* & l'*Adiantum trapeziforme*; elle diffère du premier par ses feuilles plus composées, par les folioles plus exactement rhomboidales, moins arrondies à leur sommet; du second par son port plus petit, plus grêle; par les folioles obtuses & lobées, point acuminées ou simplement incisées. Ses racines font rampantes, tuberculeuses, couvertes d'un duvet noirâtre; les folioles ou pétioles droits, longs d'un à deux pieds, très-glâbres, luisans, d'un pourpre-foncé; les feuilles longues d'un pied, très-étalées, plusieurs fois ailées; les pédicelles capillaires; les folioles alternes, longues d'un pouce, entières à leur partie inférieure, incisées, presque lobées à leur partie supérieure, d'un vert-gai, diaphanes; les lobes pétiolés en points séparés, couvertes par les lobes recourbés en forme d'écaillés.

Cette fougère croît à la Jamaïque, dans les lieux ombragés, les cavernes.

32. ADIANTE veiné. *Adiantum affine*. Swartz.

Adiantum fronde supra decomposita; pinnulis rhombicis subrotundis, radiato-venosis, anticè crenatis; crenis foriferis. Swartz, Filic. pag. 125. & pag. 322. tab. 3. fig. 4.

Il se rapproche beaucoup de l'*Adiantum fragile*; mais ses fougères sont plus longues; son feuillage moins divisé, plus lâche, & les folioles point autant cuneiformes. Ses racines font composées d'un faisceau de fibres filiformes, noirâtres, garnies à leur collet d'écaillés lancéolées, d'un brun-noirâtre; il s'en élève des fougères nombreuses, filiformes, filonées, anguleuses, hautes d'un demi-pied, très-glâbres, luisantes, purpurines; les feuilles plus hautes fois ailées; les pinnules alternes, étalées; les pétioles capillaires; les folioles presque rondes, un peu rhomboidales à leur base, glâbres, d'un vert gai, longues d'environ trois lignes, un peu incisées ou crenelées-denticulées à leur sommet, marquées de nervures divergentes. La fructification est placée à l'extrémité des crenelures; en petits paquets couverts d'enveloppes à demi arrondies.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

33. ADIANTE fragile. *Adiantum fragile*. Swartz.

Adiantum frondibus supra decompositis; pinnulis cuneato-obovatis, subintegris; fructificationibus interruptis. Swartz, Prodr. pag. 135, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1721.

Il se distingue de l'*Adiantum capillus Veneris* par son feuillage plusieurs fois ailé, par ses folioles petites, un peu roides, presque entières. Ses racines font composées de fibres nombreuses, noirâtres, vides, couvertes à leur collet de paillettes écaillées. Les touches & les pétioles sont roides, filiformes, très-lisses, noirâtres; les ramifications capillaires, lâches, fragiles, étalées; les folioles pétioles, alternes, en coin à leur base, arrondies à leur sommet ou un peu ovales, presque entières, rarement incisées, glâbres, vertes, d'un brun-violet en dessous, larges de trois à quatre lignes. La fructification est réunie en trois ou quatre paquets distincts au bord supérieure des feuilles, à demi globuleux, couverts par de petites écaillés en croissant.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les roches calcaires.

34. ADIANTE trapézoïforme. *Adiantum trapeziforme*. Linn.

Adiantum fronde supra decomposita; pinnulis trapezicis, acuminatis, anticè & superne inciso-crenatis; crenis foriferis. Swartz, Filic. pag. 125. (Voyez ADIANTE, n°. 27.) (Exclus. Flukent synonym.)

35. ADIANTE d'Éthiopie. *Adiantum aethiopicum*. Linn.

Adiantum fronde supra decomposita; pinnulis cuneatis, superne rotundatis, inciso-lobatis, crenulatis; lobis emarginatis, foriferis; induratis reniformibus. Swartz, Fil. pag. 125. — Houtt. N. H. 2. tab. 100. fig. 3. (Voyez ADIANTE, n°. 30.)

36. ADIANTE pâle. *Adiantum pallens*. Swartz.

Adiantum fronde supra decomposita; pinnulis ovato-rhombicis, obtusis, sursum incis. infusque basi auratis. Swartz, Fil. pag. 125 & 323.

Filix adianto nigro officinarum similis, pediculis variis, pinnulis magis eleganter incis. ex insula Cheslon. Pluk. Amalth. 91, & Phytogr. tab. 403. fig. 2. *Ranulus frondis.*

Par son port & sa couleur, cette plante ressemble aux *dicksonia*; mais les tégumens sont simples & s'ouvrent en dedans. Ses fougères sont glâbres, cylindriques, canaliculées d'un côté, luisantes, un peu jaunâtres; le feuillage plusieurs fois ailé, long d'un pied & demi; les ramifications alternes, étalées; les pinnules presque opposées, lancéolées à leur sommet; les folioles alternes, oblongues, rhomboidales, un peu rétrécies en coin à leur

basse, incisées ou dentées en sie, striées, verres & luisantes en dessus, plus pâles en dessous; les folioles fertiles moins incisées, un peu auriculées à un de leurs bords, au dessus de leur base. Les capsules sont pâles, un peu brunes, oblongues, marginales; leurs tégumens presque testiformes, blanchâtres, entiers.

Cette plante croît dans les Indes occidentales, aux îles Maurice.

** LINDSÆA.

37. ADIANTE sagitté. *Adiantum sagittatum*. Aublet.

Adiantum (lindsæa sagittata), fronde simplicifolia, sagittata cordatæ, acuminatæ. Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 40. — Swartz, Fil. pag. 118. (Voyez ADIANTE, n°. 3.)

38. ADIANTE échanuré. *Adiantum emarginatum*.

Adiantum (lindsæa reniformis), fronde simplicifolia, reniformi, obtusâ. Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 7. fig. 1. — Swartz, Fil. pag. 118. — Roem. Arch. 2. tab. 4.

Ses feuilles sont simples, portées sur de longs pétioles, arrondies, échanurées à leur bord inférieur en forme de rein; l'échancre profonde, un peu serrée; entières & obtuses à leur bord extérieur. La fructification, un peu distante des bords, est disposée en une ligne non interrompue, couverte d'un tégument continu, s'ouvrant en dehors.

Cette plante croît dans la Guiane.

39. ADIANTE à feuilles en épée. *Adiantum ensifolium*.

Adiantum (lindsæa ensifolia), fronde pinnatâ; pinnis ensiformibus, alternis. Swartz, Fil. pag. 118 & 317.

Il s'élève à la hauteur de deux pieds & plus, sur une souche glabre, cylindrique, caillouteuse en dehors, d'un brun-vertâtre ou rougeâtre. Ses feuilles sont ailées; les folioles alternes, droites, pennées, longues de six à sept pouces, linéaires, ensiformes, larges de quatre lignes, rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet, très-entières, glabres à leurs deux faces, finement nerveuses. La fructification est placée vers le bord des folioles, depuis leur base jusqu'à leur sommet, en une ligne étroite, continue, composée de très-petites capsules d'un brun-noirâtre, recouvertes d'un tégument pâle, très-étroit, inséré vers le bord des folioles, s'ouvrant en dehors.

Cette plante croît à l'île Maurice; elle se rapproche beaucoup du *peris vittata*, n°. 16; elle

en est distinguée par la situation & la forme de ses tégumens.

40. ADIANTE linéaire. *Adiantum lineare*.

Adiantum (lindsæa linearis), fronde pinnatâ; linearis; pinnis brevissimis, subsagittiformibus, antice crenatis, fructificationibus. Swartz, Fil. pag. 118 & 318 tab. 3. fig. 3.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles très-étroites, linéaires, à peine larges de trois lignes, simplement ailées, longues d'un pied avec leur pétiole. Ce dernier est filiforme, à 2 Joints, de couleur purpurine, très-glabre; les folioles fort petites, presque opposées, à peine pédoncelées, étalées en éventail, en coin à leur base, planes, arrondies & légèrement crénelées à leur sommet, glabres, striées, longues de deux lignes, roulées à leur bord supérieur & presque en croissant à la maturité des semences. La fructification est constituée par une ligne non interrompue, d'un brun-pâle; le tégument convexe, un peu crénelé, membraneux, d'un vert-pâle, s'ouvrant en dehors.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

41. ADIANTE à folioles entières. *Adiantum integrifolium*.

Adiantum (lindsæa falcata), fronde pinnatâ; pinnis sublinearis, integrifolis. Swartz, Fil. pag. 118. — Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 7. fig. 2. — Roem. Arch. 2. tab. 5.

Adiantum 7. Aubl. Guian. pag. 963. (Exclus. synonym.)

Ses pétioles, glabres & d'un brun-foncé, se développent à leur partie supérieure en une feuille simplement ailée, longue de six à neuf pouces, composée de folioles alternes, pédicellées, très-entières, presque ovales, courbées en faucille à leur bord inférieur, longues d'un pouce & plus, glabres, obtuses à leur sommet, presque tronquées à leur base, portant la fructification sur leur bord extérieur; les pédicelles un peu décurrens sur le pétiole.

Cette plante croît dans la Guiane.

42. ADIANTE hétérophylle. *Adiantum heterophyllum*.

Adiantum (lindsæa heterophylla), fronde pinnatâ; pinnis integris serrulatisque; inferioribus rhombiculis, superioribus ovatis, serratis. Swartz, Fil. pag. 118. — Dryand. Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 8. fig. 1. — Roem. Arch. 2. tab. 4.

Ses pétioles sont bruns, longs de deux ou trois

pouces; les feuilles de même longueur, ailées; composées de folioles peu distantes, presque alternes, à peine pédonculées, variables dans leur forme, les unes entières, les autres très-finement denticulées; les inférieures rhomboïdales, lancéolées, acuminées; les supérieures plus courtes, rhomboïdales, obtuses; les terminales petites, arrondies, confluentes. La fructification est placée sur le bord extérieur des folioles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à Malacca.

Nota. L'*Adiantum lanceolatum*, n°. 8, doit être placé ici.

43. ADIANTE en serpe. *Adiantum cultratum*. Willd.

Adiantum (lindsæ cultrata), fronde pinnatâ; pinnis deltoidæo-lanceolatis, obtusis; terminali elongatâ. Swartz, Fil. pag. 119.

Adiantum cultratum. Willd. Phytogr. 1. tab. 10. fig. 2.

Ses feuilles sont simplement ailées, composées de folioles glabres, lancéolées, deltoides à leur base, obtuses à leur sommet, un peu courbées en faucille; la foliole terminale beaucoup plus longue que les autres.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

44. ADIANTE orbiculé. *Adiantum orbiculatum*. Lam.

Adiantum pinnis oblongis; pinnulis orbiculato-subarcuatis, inferioribus incisfis seu trifidis. (N.)

8. *Lindsæa* (flabellulata), fronde pinnatâ; pinnis flabelliformibus, denticulatis, adstiorum inferiorum pinnatifidis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 8. fig. 2. — Roem. Arch. 2. tab. 4. — Swartz, Fil. pag. 119. (Voyez ADIANTE, n°. 7.)

45. ADIANTE de la Guiane. *Adiantum guianense*. Aubl.

Adiantum (lindsæa guianensis), fronde bipinnatâ; pinnis patentibus, subulatis; pinnulis inferioribus luncatis, mediis trapeziformibus, supremis flabelliformibus. Swartz, Fil. pag. 119. (Voyez ADIANTE, n°. 2.)

46. ADIANTE à feuilles roides. *Adiantum strictum*. Swartz.

Adiantum (lindsæa stricta), fronde bipinnatâ; pinnis erectis, strictis; pinnulis trapeziformibus. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1722.

Lindsæa elongata. Cavan. Præf. 1801. n°. 653.

Ses racines sont rampantes, couvertes de paillottes noirâtres, munies de fibres roides, noires, épaisses. Les fougues sont droites, un peu cylindriques,

longues d'un demi-pied, glabres, d'un brun-rougeâtre; les périoles aplatis, les feuilles longues d'un pied, deux & presque trois fois ailées; les pinnules opposées, droites, linéaires-lancéolées; les pédoncules glabres, triangulaires, soutenant des folioles alternes, un peu opposées, en forme de trapèze, rapprochées, anguleuses à leur base avec un prolongement, un peu arquées à leur sommet, roides, glabres à leurs deux faces, d'un vert foncé, marquées de veinules radiées, dichotomes. La fructification consiste en capsules nombreuses, très-petites, d'un brun-noirâtre, disposées au bord supérieur des folioles en une ligne non interrompue; le réceptacle continu, inséré sur le disque, vers le bord.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque.

47. ADIANTE trichomanes. *Adiantum trichomanoides*.

Adiantum (lindsæa trichomanoides), fronde bipinnatâ; pinnulis cuneatis, sublinearibus, retusis. Swartz, Fil. pag. 119. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 11. — Roem. Arch. 2. tab. 5.

Adiantum cuneatum. Forst. Prodr. n°. 461.

Ses racines sont rampantes; les fougues ou périoles longs de deux ou trois pouces; les feuilles un peu plus longues, deux fois ailées, composées de folioles rétrécies en coin à leur base, obtuses à leur sommet, petites; les inférieures profondément incisées; les supérieures entières ou à deux lobes. Elle croît dans la Nouvelle-Zélande.

48. ADIANTE triangulaire. *Adiantum triangulare*.

Adiantum (lindsæa tenera), fronde triangulari, tripinnatifidâ; laciniis obovato-rhomboidis, incisfis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. tab. 10. — Roem. Arch. 2. tab. 5. — Swartz, Fil. pag. 120.

Cette plante s'élève à la hauteur de cinq à six pouces sur des fougues ou périoles grêles, nus, de couleur brune. Son feuillage présente une figure triangulaire. Ses feuilles sont trois fois ailées, surtout les pinnules inférieures; elles sont opposées, lancéolées, composées de folioles ovales, rhomboïdales, assez petites, lobées ou incisées, chargées de fructification à leur bord extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

49. ADIANTE à petites feuilles. *Adiantum microphyllum*.

Adiantum (lindsæa microphylla), fronde tripinnatifidâ, lanceolâtâ; laciniis cuneatis, apice dilatatis, crenulatis. Swartz, Fil. pag. 120 & 319.

Ses fougues ou périoles sont filiformes, pâles, fines; le feuillage tendre, lâche, lancéole, long

d'un demi-pied, presque trois fois ailé; les pinnules alternes, longues d'un pouce, flexueuses, composées de folioles distantes, pédiçellées, longues à peine d'une ligne, cuneiformes à leur base, dilatées & crénelées à leur sommet, entières ou lobées, d'un vert-foncé; les lobes de même forme que les folioles, finement striés. La fructification est placée sur le bord des folioles en une ligne non interrompue, composée de capsules très-petites, d'un brun-pâle, luisantes, couvertes d'un tégument membraneux, continu, d'un vert-pâle, s'ouvrant en dehors.

Cette espèce croît à la Nouvelle-Hollande.

*** CHEILANTHES.

50. ADIANTE mignon. *Adiantum micropteris*.

Adiantum (cheilanthès micropteris), frondibus bipinnatis, linearibus; pinnis subsessilibus, subrotundis, incisivo-crenatis, hispida. Swartz, Fil. pag. 126, & 324. tab. 3. fig. 5.

C'est une fort jolie petite espèce, dont les fougues ou pétioles sont nombreux, en touffe, filiformes, glabres, d'un brun-pourpre, hauts de deux à trois pouces, garnis à leur base d'écaillés un peu noirâtres; terminés par une feuille longue de trois à quatre pouces, droite, linéaire, simplement ailée, composée de petites folioles alternes, presque sessiles, arrondies, longues de deux lignes lâchement & médiocrement crénelées à leurs bords, un peu hispides vues à la loupe. La fructification est placée par points séparés, sur le bord & aux crénelures des feuilles, composée de petites capsules d'un brun-pâle, couvertes par les crénelures courbées en dedans.

Cette plante croît au Pérou, aux environs de Quito. (V. f. in herb. Juss.)

51. ADIANTE à feuilles vertes. *Adiantum viride*.

Adiantum (cheilanthès viridis), frondibus bipinnatis; pinnulis ovatis, integris; terminalibus majoribus, ovato-lanceolatis subhastatisve; stipite levi. Swartz, Fil. pag. 127. — Vahl, Symbol. 3. pag. 104, & Dict. 4. pag. 724.

Pteris viridis. Forsk. Ægypt. pag. 186.

Ses fougues sont très-lisses, d'un pourpre-foncé, ainsi que les pétioles & les pédiçelles; le feuillage d'un beau vert, deux fois ailé; les pinnules alternes, étalées; les inférieures pétioleuses, presque opposées, insensiblement plus longues, lancéolées; les supérieures alternes, presque sessiles, conniventes, plus courtes, composées de folioles ovales, entières; les terminales plus grandes, ovales-lancéolées, presque haïssées; la fructification disposée sur le bord des feuilles en points interrompus.

Cette plante croît dans l'Égypte.

52. ADIANTE pubescent. *Adiantum pubescens*.

Adiantum (cheilanthès mitrophylla), frondibus bipinnatis, lanceolatis, utrinque stipitibus pubescentibus; pinnulis oblongis, obtusis, crenulatis; infimis subpinnatis. Swartz, Fil. pag. 127, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1713. (Exclus. synonym. Amman.)

Adiantum nigrum, ramosum, minus, ramulis, &c. Sloan, Hist. 1. pag. 93. tab. 13. fig. 2. Mala.

Lonchitis minima, ramosa, Plum. Fil. tab. 53.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de fibres courtes, roides, noirâtres, couvertes d'un duvet d'un brun-foncé; les fougues & pétioles longs de quatre à cinq pouces, cylindriques, filiformes, très-noirs, luisants, fragiles, couverts de petites écailles très-fines, noirâtres. Les feuilles sont presque trois fois ailées, lancéolées, longues d'un demi-pied; les pinnules courtes, alternes, étalées; les folioles petites, ovales-lancéolées, un peu arrondies, entières, ou crénelées ou sinuées à leurs bords; les inférieures souvent pinnatifides, d'un vert-gai, presque glabres ou parsemées, à leurs deux faces, de quelques poils rares & blanchâtres. La fructification consiste en points distincts, un peu confluents, nombreux, d'un brun-noirâtre, couverts par un tégument entier & membraneux.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Nouvelle-Espagne, dans les forêts.

53. ADIANTE aromatique. *Adiantum fragrans*.

Adiantum (cheilanthès fragrans), frondibus bipinnatis, glabris; pinnulis ovatis, obtusis, sinuato-subpinnatifidis; lacinulis incisus, stipite paleaceo. Swartz, Fil. pag. 127, & 325. tab. 3. fig. 6.

Polydodium (fragrans), frondibus bipinnatis; pinnis ovatis, sublobatis, obtusis, subius nudis, margine reflexis; fructificationibus marginalibus. Linn. Mantill. 2. pag. 307. Non Desfont.

Polypodium pteridioides. Reich. Syst. Plant. vol. 4. pag. 424.

Adiantum (fragrans), frondibus bipinnatis; pinnis ovatis, sublobatis, obtusis, subius nudis. Linn. f. Suppl. pag. 447.

Cette plante s'élève à peine à la hauteur de trois ou quatre pouces. Ses racines sont composées d'un faisceau de fibres nombreuses, entrelacées, d'un brun-noirâtre, velues; elles produisent, à l'extrémité d'une foughe cylindrique, longue d'un pouce, luisante, d'un pourpre-foncé, plusieurs feuilles droites, deux fois ailées, glabres, ovales-lancéolées, longues de deux ou trois pouces, les pinnules étalées, oblongues, opposées, soutenant des folioles fort petites, presque sessiles, ovales, obtuses, glabres, sinuées ou pinnatifides, parsemées de petits points jaunâtres, transparents; les

découpures entières ou bien à deux ou trois lobes à peine sensibles, munis à leur sommet de la fructification sous la forme de petits points interrompus.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

54. ADIANTE à odeur forte. *Adiantum odoratum*.

Adiantum (cheilanthes odora), frondibus tripinnatis, ovatis, glabris; pinnulis subrotundis ovalibusque, terminalibus lobatis; stipite filiformi, piloso. Swartz, Fil. pag. 127 & 327.

Adiantum pufillum. Allion.

Pteris acrosticha. Balbis, Addit. in Flor. pedem. pag. 98.

Polypodium odoratum. Encycl. vol. 4. pag. 541. (Excluf. Linn. fynon.)

Cette plante me paroît être la même que le POLYPODE, n°. 114. Elle fe distingue, félon M. Swartz, par fes pétioles allongés, prefque filiformes, d'un brun-pourpre, couverts de petites paillettes ou poils rouffâtres. Ses feuilles font courtes, trois fois ailées; les folioles un peu arrondies ou ovales; les unes entières, les autres lobées ou prefque pinnatifides; les régu mens de la fructification déchiquetés ou prefque ciliés à leurs bords. Elle croît en Suiffe & en Italie.

55. ADIANTE odorant. *Adiantum suevolens*.

Adiantum (cheilanthes suevolens), frondibus bipinnatis, glabris; pinnulis ovalibus, integris, infimis lobatis pinnatifidisque; stipite filiformi, paleaceo. Swartz, Fil. pag. 127.

Polypodium fragrans. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 458. tab. 257. — Encyclop. vol. 4. pag. 537. (Excluf. fynonym.) — Schkuhr. tab. 19. — Petiv. Gazoph. tab. 73. fig. 4. (Voyez POLYPODE odorant, n°. 104.)

56. ADIANTE polymorphe. *Adiantum polymorphum*.

Adiantum (cheilanthes polymorpha), frondibus decompositis; pinnis suboppositis, angulo-lanceolatis; pinnulis fubintegris, polymorphis. (N.)

Ses pédoncules font glabres, anguleux, prefque tétragones, d'un brun-clair; les pinnules oppofées, étroites, lancéolées, fousvent prolongées, prefqu'entières à leur fommét, composées de folioles un peu décurrentes, oppofées ou alternes, petites; les unes entières, courtes ou allongées; les autres légèrement & irrégulièrement crénelées, glabres, d'un vert-fumée; la fructification marginale, étroite, quelquefois un peu réniforme, cendrée.

Cette efèce croît à Madagafcar & à Tile Bourbon, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. J ff)

57. ADIANTE à feuilles lenticulées. *Adiantum lenticulatum*.

Adiantum (cheilanthes lenticulata), frondibus tripinnatis, fubrotundis; foliolis orbiculatis, minimis. Swartz, Fil. pag. 128 & 325.

Pteris lenticulata. Cavan. Pizl. 1801. n°. 664. — Hort. reg. Matr. 1. Icon.

Filicula americana, villosa, tenuiffimè divifa, pinnulis subrotundis. Amm. Comm. Petrop. 1. pag. 302. tab. 21. fig. 3.

Cette efèce fe distingue des deux fuivantes par fes feuilles conflamment trois fois ailées, & les rapports avec ces deux efèces ont déterminé M. Swartz à la placer dans ce genre, & non parmi les *pteris*, quoique fes régu mens ne foient point interrompus. Elle à un pied de long; elle produit des rejets rampans. Ses fouches font cylindriques, d'un brun-foncé, couvertes, ainfi que les pétioles, de longs poils fins cendres. Les feuilles font planes, linéaires-lancéolées, trois fois ailées; les ramifications alternes, afcendantes, rapprochées; les pinnules alternes; les fupérieures infenfiblement plus courtes; les pédicelles pileux; les folioles prefque rondes, fort petites, d'un vert-foncé, glabres en deffus, couvertes en deffous de poils rouffâtres, un peu réfléchies & crénelées à leurs bords; les terminales un peu plus larges. La fructification confifte en petites capsules prefque folitaires, d'un brun-noirâtre, couvertes par un régu ment blanchâtre, membraneux, fiué entre les crénelures.

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne & dans le royaume de Quito.

58. ADIANTE hériffé. *Adiantum hirtum*.

Adiantum (cheilanthes hirta), frondibus bipinnatis tripinnatifidisque, hirtis; pinnulis ovatis, crenulatis, fubtriè rachidouque paleaceo-hirtis. Swartz, Fil. pag. 128 & 329.

Adiantum Coffrorum. Schrad. Journ. 1800. vol. 2. pag. 85.

Ses racines font composées de fibres nombreuses, roides, filiformes, noirâtres, allongées; elles produifent en rouffe des fouches ou pétioles cylindriques, droits ou afcendans, pubefcens, d'un pourpre-noirâtre, garnis à leur bafe d'écaillés linéaires-lancéolées, luitantes, d'un brun-foncé. Les feuilles font oblongues, lancéolées, deux & prefque trois fois ailées, longues d'un pied; les pétioles velus, cylindriques; les pinnules oblongues, alternes & oppofées; les folioles ovales, petites, quelquefois entières, plus fousvent incifées-pinnatifides; les découpures arrondies, cré-

mêlées, convexes, muries en dessus de poils articulés, très-fins, & en dessous de poils roussâtres. La fructification, placée sur les bords, est composée de capsules d'un brun-noir, couvertes par les crénélures recourbées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

59. ADIANTE à petits lobes. *Adiantum parvifolium*.

Adiantum (cheilanthès parvifolia), frondibus bipinnatis, glabris; pinnaulis trilobatis, convexis, crenulatis, medio oblongo, lateralibus subrotundis, rachibus hirsutis. Swartz, Fil. pag. 128 & 329.

Cette plante est haute d'un pied, très-rapprochée de l'*Adiantum hirtum*, distinguée par ses folioles bien moins distantes, point lobées à leur base. Les fougères sont glabres, rondes, firmes, érythriques, d'un pourpre-foncé; les feuilles oblongues, lancéolées, acuminées, deux fois ailées; leur pétiole cylindrique, hérissé de poils très-fins; les pinnules alternes, étalées horizontalement, longues d'un pouce & plus; les folioles presque opposées, à peine pédicellées, à trois lobes; celui du milieu plus allongé, long de deux lignes; les deux latéraux arrondis, une fois plus petits, tous glabres, convexes, un peu étalés; les capsules presque solitaires, placées aux crénélures qui se replient & les recouvrent, munies de quelques poils.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

60. ADIANTE voilé. *Adiantum vestitum*.

Adiantum (cheilanthès vestita), frondibus bipinnatis tripinnatifidis, hispidaulis; laciniis ovatis, integris, rachibus fissisque hirsutis. Swartz, Fil. pag. 128 & 330.

Adiantum vestitum. Sprengel. Anleit. pag. 121.

Adiantum hispidum. Bosc.

Très-rapprochée des deux précédentes, cette espèce en diffère par plusieurs particularités dans son feuillage, par les capsules privées de réguemens propres, recouvertes par le bord replié des folioles. Ses fougères & ses pétioles sont, ainsi que les feuilles à leurs deux faces, parsemées de poils clairs & non roussâtres. Ces feuilles sont deux fois ailées; les folioles ovales, petites, entières, quelquefois pinnatifides, hérissées de poils rares, articulés.

Cette plante croît à la Caroline & dans la Pensilvanie. (V. f.)

61. ADIANTE du Cap. *Adiantum capense*.

Adiantum (cheilanthès capensis), frondibus de-

compositis, glabris; foliolis subbipinnatis; pinnulis ovatis, indivisis, coudatis, dentato-crenulatis; foliis contiguis. Swartz, l'il. pag. 128.

Adiantum capense. Thumb. Prodr.

Sa fructification est placée sur le bord des folioles, en points non interrompus; ce qui la rapproche de celle des *pteris*. Ses feuilles sont glabres, plusieurs fois ailées; les pinnules presque deux fois ailées; les folioles ovales, conniventes, point lobées, un peu crénulées ou denticulées.

Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

62. ADIANTE pteriole. *Adiantum pteroides*.

Adiantum (cheilanthès pteroides), frondibus supra decompositis, glabris; foliolis tripinnatis; pinnulis cordato-ovatis, crenulatis; foliis contiguis, indivisis imbricatis, apice glaberrimis. Swartz, Fil. pag. 128.

Pteris orbiculata. Thumb. Prodr.

Ses fougères, ainsi que les pétioles, sont très-glabres; son feuillage plusieurs fois ailé; les feuilles tripinnées, glabres à leurs deux faces, composées de folioles ovales, en cœur, légèrement crénulées. La fructification consiste en points marginaux non interrompus, couverts par des réguemens imbriqués.

Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

63. ADIANTE variable. *Adiantum varians*.

Adiantum (cheilanthès tenuifolia), frondibus bipinnatis, supra decompositisque, glabris; foliolis laxis, subbipinnatis; pinnulis oblongis, crenatis. Swartz, Fil. pag. 129.

Pteris nigra. Retz. Obs. 6. n°. 25. — Encycl. vol. 4. pag. 718. n°. 33.

Driopteris campestris. Rumph. Amb. vol. 6. r. 34. fig. 2.

Trichomanes tenuifolia. Burm. Ind. pag. 237.

Pteris humilis. Forst. Prodr. & Cavan. Hort. Matr. ? (Voy. & *PTERIS* noire, n°. 35.)

Les fougères & les pétioles sont légèrement velus à leur base dans les jeunes individus. Quelquefois le feuillage est à divisions moins nombreuses, & alors cette plante ne paraît point différer du *pteris humilis* de Forst. Ces variétés dépendent de l'âge de la plante.

64. ADIANTE multifide. *Adiantum multifidum*.

Adiantum (cheilanthès multifida), frondibus supra decompositis, glabris; foliolis tripinnatifidis; laciniis ovatis, convexis, incisivo-crenatis. Swartz, Fil. pag. 129.

Elle a beaucoup de rapport avec l'*Adiantum*

hirtum ; elle s'en distingue en ce qu'elle est glabre sur toutes les parties, elle s'élève à peine à la hauteur de sept à huit pieds. Ses fouches sont cylindriques, puis à deux côtes, mais point cannelées, très-glabres, luisantes, d'un pourpre-foncé ; munies d'un tubercule radical, couvert d'écailles foluleuses, d'un brun pâle, garni de longues fibres noires, roides, filiformes. Les feuilles sont plusieurs fois ailées, presque quatre fois pinnatifides ; les pétioles & les pédicelles cylindriques, très glabres ; les ramifications presque opposées ; les pinules alternes, ovales, longues d'un demi-pouce, composées de folioles presque filiformes, opposées, oblongues, obtuses, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous ; les inférieures pinnatifides ; les découpures arrondies, crénelées ; les folioles supérieures incisées ou à peine crénelées. La fructification est constituée par des points séparés, placée sous les crénelures.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les fentes des rochers.

65. ADIANTE dichotome. *Adiantum dichotomum*.

Adiantum (cheilanthos dichotoma), frondibus supra decompositis, glabris ; folioli tripinnatis ; rachibus flexuosis ; pinnulis distichis, subrotundis, lobatis ; lobis crenulatis. Swartz, Fil. pag. 129 & 335. tab. 3. fig. 7.

Cette fougère est remarquable par son port ; elle est très-fine, haute d'environ six pouces. Ses fouches sont filiformes, glabres, noires, roides, luisantes ; son feuillage ramifié, plusieurs fois ailé ; les pédicelles capillaires, flexueux, presque divisé par dichotomie ; les folioles très-petites, distantes, opposées ou alternes, glabres, presque sessiles, un peu arrondies, légèrement incisées ou à trois lobes crénelés. Les points de la fructification sont très-petits, sur le bord des lobes, recouverts par les crénelures.

Cette plante croît au Pérou, dans le royaume de Quito, sur le mont Saint-Antoine.

66. ADIANTE globuleux. *Adiantum globatum*.

Adiantum (cheilanthos globata), glaberrimum, fronde supra decomposita, pinnis suboppositis ; folioli lobatis, fructificantibus globatis. (N.)

Ses racines sont fibreuses, d'un brun-noirâtre, un peu velues ; il s'en élève plusieurs pédoncules droits, d'un noir-luisant, un peu comprimés. Les pinules sont opposées, quelquefois alternes ; leurs divisions souvent alternes ; les folioles linéaires, obtuses, divisées en petites lobes obtus à leur contour. Ces lobes se roulettent, & forment, quand ils sont chargés de fructification, de petits globules très-remarquables. Les capsules sont d'un roux foncé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Joff.)

67. ADIANTE arborescent. *Adiantum arborescens*.

Adiantum (cheilanthos arborescens), frondibus supra decompositis, glabris ; folioli quadripinnatis, patentibus ; pinnulis linearibus, serratis ; infimis pinnatifidis. Swartz, Fil. pag. 129 & 336.

Lonchitis (tenuifolia), arborescens, frondibus decompositis ; foliis pinnatis ; pinnis linearibus-oblongis, serratis ; infimis pinnatifidis. Forst. Prodr. n°. 424.

Cette fougère, qui a le port d'un arbrisseau, ne se rapporte à ce genre que par sa fructification. Ses feuilles sont quatre fois ailées, longues d'un pied, larges d'un demi-pied, glabres à leurs deux faces ; les premières divisions étalées, opposées, longues de sept à huit pouces ; les pinules lancéolées, presque opposées, acuminées ; les inférieures ailées ; les supérieures pinnatifides ; les folioles linéaires-oblongues, aiguës, dentées en scie ; les inférieures presque pinnatifides ; la découpure de la base auriculée par sa prolongation. La fructification est disposée, proche des dentelures, en petits points arrondis ; les réguens à demi arrondis, formés par les petites découpures courbées en dedans.

Cette plante croît à l'île des Amis.

* Autres espèces d'ADIANTE, ou douteuses, ou rapportées à d'autres genres.

Nota. Les *davallia*, les *hymenophyllum*, rangés d'abord parmi les adiantes, ont été placés, dans cet ouvrage, à la suite des *trichomanes*. (Voyez vol. 8.)

68. ADIANTE rampant. *Adiantum repens*. Linn. f.

Adiantum (davallia pedata), frondibus quinqueangulis, trifidis trifoliatifque, pinnatifidis ; furculo repente, hispido. Smith, Aët. Taur. vol. 5. pag. 414. tab. 9. fig. 6. — Swartz, Fil. pag. 131.

Humata trifoliata. Cavan. Pixl. 1801. n°. 680. (Voyez ADIANTE, n°. 4.)

69. ADIANTE trifolié. *Adiantum trifoliatum*. Linn.

Adiantum (davallia trifoliata), frondibus alternis, decompositis, flexuosis ; pinnulis ternatis, linearibus ; furculo solitario. Swartz, Fil. pag. 133. — Plum. Fil. tab. 99. fig. B. (Voyez ADIANTE, n°. 15.)

70. ADIANTE à folioles tronquées. *Adiantum clavatum*. Linn.

Adiantum (davallia clavata), frondibus alternis, decompositis,

decompositis, remotis tripartitis; pinnulis linearis-cuneiformibus, clavatis, apice foro subrotundo terminatis; indusio denticulato. Swartz, Fil. pag. 133. (Voyez ADIANTE, n° 24.)

71. ADIANTE à feuilles menues. *Adiantum tenuifolium*. Lam.

Adiantum (davallia tenuifolia), frondibus alternis, decompositis; foliolis subquadripinnatis; loculis linearis-cuneiformibus, retusis; foris geminis. Linn. Filic. pag. 134. (Voyez ADIANTE, n° 25.)

72. ADIANTE épineux. *Adiantum aculeatum*. Linn. (Voyez ADIANTE, n° 26, & TRICHOMANE, n° 68.)

73. ADIANTE trilobé. *Adiantum trilobum*. Linn.

Adiantum frondibus compositis; pinnis tripartitis, obtusis, incisis, multifidis. Linn. Syst. veget. pag. 939. An davallia? Swartz, Fil. pag. 135. (Voyez ADIANTE, n° 27.)

74. ADIANTE de Chine. *Adiantum chusanum*. Linn.

Adiantum frondibus decompositis; pinnis alternis, pinnatifidis; lobis inequalibus, obtusis, margine subdentatis. An cheilanthes? Swartz, l. c.

* *Adiantum scandens*. (Voyez TRICHOMANE, n° 75.)

75. ADIANTE à feuilles de ciguë. *Adiantum cicutasolium*. Lam.

Adiantum frondibus tripartitis, triangularibus; pinnis alternis; pinnulis ovalibus, obtusis, margine subdentatis. An cheilanthes? (Voyez ADIANTE, n° 31.)

Selon M. Swartz, cette plante paroît être la même que son cheilanthes tenuifolia, décrite plus haut. D'après M. de Lamarck, elle semble différer de très-peu de l'*Adiantum pteroides*. Linn.

76. ADIANTE ptéroïde. *Adiantum pteroides*. Linn.

Adiantum fronde supra decomposita; pinnis ovatis, integris, crenulatis; stipite levi. Linn. Syst. veget. pag. 940. An cheilanthes? (Voyez ADIANTE, n° 29.)

77. ADIANTE hexagone. *Adiantum hexagonum*. Linn. (Voyez ADIANTE, n° 28, & PTERIS, vol. 5. pag. 714.)

78. ADIANTE à feuilles d'achillée. *Adiantum achillasolium*. Lam.

Adiantum frondibus tripartitis; pinnis oblongis. Botanica. Supplément, Tome I.

gis, angustis; pinnulis linearibus, obtusis, integris seu apice furcatis; stipite globo. (N.) (Voyez ADIANTE, n° 23.)

Cette espèce n'est peut être qu'une variété de l'*Adiantum furcatum*, Linn. Suppl., que M. Swartz range parmi les *caropteris* (C. Furcata, Fil. pag. 88.) & à laquelle il rapporte, comme synonyme, l'*Adiantum borbonicum*, Jacq. Coll. 1. tab. 21, fig. 1, & le *lurchitii bipinnata*, Forch. Flor. ægypt.-arab. pag. 184, & Act. Petrop. IX, t. b. F., fig. 11 enfi, le *caropteris ratzfolio*, Berg. Act. Petrop. VI, tab 7, fig. 1, 2.

L'*Adiantum auriculatum*, Thunb. Prodr. Pl. Cap., est le *pteris auriculata*. Swartz, Fil. pag. 103, & Encycl. vol. 4. pag. 725.

L'*Adiantum hastatum*, Linn. f. Suppl. pag. 447, paroît être la même plante, mais plus jeune que notre *pteris polymorpha*, vol. 4. pag. 709, n° 425; c'est encore le *pteris hastata*, Swartz, Fil. p. 106, & le *pteris auriculata*, Thunb. Prodr. Pl. Cap.

L'*Adiantum lunatum*, Houtt. tab. 100. fig. 1. (Voyez POLYPODIUM.) (Aspidium truncatulum.) Encycl. 4. pag. 556.

L'*Adiantum scandens*, Loureiro, Flor. coch. pag. 837, paroît appartenir au *hygnum japonicum*. Swartz, Fil. pag. 154.

L'*Adiantum tenellum*, Jacq. Coll. 3. tab. 21. fig. 3. M. Swartz soupçonne que c'est un *hymenophyllum* (trichomane, Encycl.).

ADOLIA. (Voyez ADOLÉ.)

ADONIDE. *Adonis*. On avoit introduit dans ce genre quelques plantes qui offroient dans leurs fleurs le caractère des adonides, mais dont les fruits n'avoient pas été observés par les botanistes modernes qui les ont décrites. Burman, dans ses *Plantes d'Afrique*, avoit bien annoncé que ces fruits étoient composés de petites baies réunies sur un réceptacle commun, mais on l'avoit négligé ce trait de lumière, ou l'on avoit cru ce caractère insuffisant pour la formation d'un nouveau genre. Il se présente néanmoins d'une manière bien naturelle, les espèces d'Adonides à le composer se distinguant déjà des adonides par leur port. M. Ventenat l'a établi dans son bel ouvrage du *Jardin de la Malmaison*; il l'a nommé *anamenia*, de deux mots arabes, & lui a donné pour caractère essentiel :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales & plus; plusieurs baies monospermes, réunies sur un réceptacle commun.

Dans les adonides le fruit, semblable à celui des renoncules, est composé de plusieurs capsules monospermes qui ne s'ouvrent point, & sont réunies sur un réceptacle commun.

Les espèces qui constituent jusqu'à l'ort le genre *anamenia*, ont leurs feuilles toutes radicales, composées, deux fois ternées ou ailées ; leurs tiges nues, ordinairement divisées à leur sommet en une sorte d'ombelle, à rayons alongés, munis d'une collerette, supportant une ombellule. Ce genre se rapproche des *hydrastis* par ses fruits, des *adonis* par ses fleurs, & des ombelles par son port. Je l'indiquerai ici par une division.

E S P È C E S.

A D O N I S.

1. ADONIDE annuelle. *Adonis annua*. Lam.

Adonis caule glabro, superni sulcato ; foliis multifido-linearibus ; petalis 5-8 ovato-oblongis, ungue nitido basi notatis ; seminibus glabris. Lam. Illustr. tab. 498. fig. 1.

Adonis (autumnalis), floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. Linn. Spec. Plant. pag. 771.

Adonis (miniata), floribus octopetalis, obtusis, integris ; fructibus cylindricis. Jacq. Flor. austr. tab. 354.

Eadem, floribus citrinis.

Adonis (vitalis), floribus pentapetalis, fructibus ovatis. Linn. Spec. Plant. pag. 771. (*Floribus phaeis & ochroleucis.*) — Camer. Epit. p. 648. Icon. (*Voyez ADONIDE, n° 1.*)

2. ADONIDE couleur de feu. *Adonis flammea*. Jacq.

Adonis floribus octopetalis ; petalis lanceolatis, acutis ; fructibus cylindricis, caule hirsuto. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1304.

Adonis floribus octopetalis, calicibus hirsutis, fructibus cylindricis. Jacquin ; Flor. austr. vol. 4. tab. 355.

Cette plante n'est peut-être qu'une des variétés de l'espèce précédente ; elle en diffère par ses racines sans sève ; elles sont amères dans l'adonide annuelle ; par ses tiges & ses calices ordinairement un peu hérissés ; par les pétales point tachetés à leur base, lanceolés, aigus ; quelquefois munis d'une ou de deux dents.

Cette plante croît en Autriche, parmi les moissons. O. (V. f.)

3. ADONIDE printanière. *Adonis vernalis*. Linn.

Adonis caule subnudo, ad florem usque folioso ; ramis flexilibus ; foliis vaginantibus ; supra decompositis, linearibus ; petalis 6-8 oblongis ; capsulis villosis. Decand. Synops. Plant. galli. pag. 416. Lam. Illustr. Gen. tab. 498. fig. 30.

Adonis flore dodecapetalis, fructu ovato. Linn. Spec. Plant. pag. 77. — Gertn. de Fruct. & Sem. tab. 74.

Adonis apennina. Jacquin, Flor. austr. tab. 44. (*Voyez ADONIDE, n° 2, var. a.*)

4. ADONIDE de l'Apennin. *Adonis apennina*. Linn.

Adonis caule erecto ; foliis radicalibus pedunculatis, decompositis, sublinearibus ; floribus pedunculatis, nudis ; capsulis glabris, angulosis. Decand. Synops. pag. 416.

Adonis floribus pentadecapetalis, fructu ovato. Linn. Spec. Plant. pag. 772. — Gouan, Illustr. pag. 33.

Helleborus niger, ferulaceus, caule geniculato ; flore magno ; calice minoris insar. Mem. tab. 3. fig. 1.

Adonis vernalis, var. β. Lam. Dict. n° 2.

Quoique très-rapprochée de l'espèce précédente, cette plante en diffère par un port & par des caractères qui lui sont particuliers. Ses tiges sont plus élevées, plus fermes ; ses feuilles radicales portées sur de très-longes pétioles ; leurs découpures aussi nombreuses, mais moins étroites. Les fleurs, presque sessiles dans l'espèce précédente, sont soutenues dans celle-ci par un pédicelle alongé, nu, strié. Les capsules sont glabres, aiguës, anguleuses, réunies en une tête ovale.

Cette plante croît dans les Pyrénées. γ. (V. f.)

* * ANAMENIA. Vent.

5. ADONIS à feuilles coriaces. *Adonis coriacea*.

Adonis (anamenia coriacea), foliis subcordatis, coriaceis, glabris ; umbellâ supra decompositâ, patentissimâ. Vent. Jardin de la Malmaison. vol. 1. pag. 82. tab. 22.

Ranunculus athiopius, foliis rigidis, floribus luteo-virescentibus. Commel. Hort. pag. 1. tab. 1.

Christophoriana africana, ranunculoides, foliis rigidis. Boerh. Lugd.-Bat. 2. pag. 62.

Dans un Mémoire présenté à l'Institut par M. Ventenat, sur l'*Adonis capensis* Linn., il résulte, d'après les observations de ce savant, que Linné avoit compris trois espèces distinctes sous la même dénomination. Ces espèces, ayant un fruit composé de plusieurs baies, doivent constituer un genre nouveau. La plante dont il s'agit, ici se présente sous l'aspect d'une ombelle. Ses racines sont composées de plusieurs fibres alongées, de couleur brune ; elles produisent en touffe plusieurs feuilles radicales très-glabres, amples,

longuement pétioles, coriaces, deux fois ternées, d'un vert-foncé en dessus, pâles & cendrées en dessous; les folioles pétiolées, glabres, ovales, dentées en scie à leur contour, un peu en cœur. Du centre des feuilles s'élève une tige nue, épaisse, glabre, cylindrique, un peu violette, se divisant à son sommet en six ou huit rayons alongés, supportant chacun une ombelle partielle, dont les rayons sont inégaux en longueur, simples ou divisés en ombellules; les collerettes, tant universelles que partielles, composées de plusieurs folioles ovales, presque en spatule, entières ou dentées.

Les fleurs sont inclinées, d'un vert-jaunâtre, de la grandeur de celles de la clématite; leur calice composé de cinq folioles oblongues, obtus, de la longueur & de la couleur de la corolle; les pétales oblongs, obtus, très-variables dans leur nombre, ordinairement de cinq à vingt; les étamines nombreuses, plus courtes que la corolle; les anthères arrondies, à deux lobes; les ovaires nombreux, portés sur un réceptacle globuleux; les styles latéraux, persistants, les stigmates aigus & recourbés. Le fruit est formé de plusieurs baies ovales, lisses, aiguës, d'un noir-foncé, portées sur un réceptacle globuleux; les semences foliaires, attachées au fond de chaque baie, lisses, légèrement comprimées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, sur les montagnes, parmi les rochers. (V. f.)

6. ADONIS à feuilles de laser. *Adonis laserpitifolia*. Vent.

Adonis (anamenia laserpitifolia), foliis subcordatis, rigidis, glabris; lateralibus basi oblique truncatis; umbellâ subsimplici, pauciflorâ. Vent. Jard. de la Malm. pag. 22.

Imperatoria ranunculoides, africana, enneaphylla, laserpitii lobatis foliis rigidis, margine spinosis. Pluken. Almag. 1798. tab. 95. fig. 2.

Adonis vesicatoria. Linn. Suppl. pag. 172. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 264.

Adonis capensis. Linn. Spec. Plant. pag. 772. — Lam. Dict. c. pag. 46. (Excluf. Burm. synonym.) (Voyez ADONIDE, n°. 3.)

7. ADONIDE grêle. *Adonis gracilis*.

Adonis (anamenia gracilis), foliolis ovatis, profundè serratis, rigidis, pilosis; scapi ramulis decumbentibus, paucifloris. Vent. Jard. de la Malm. l. c.

Adonis aethiopica. Thunb. Prodr. Cap.

Cette espèce, beaucoup plus grêle dans toutes ses parties, ayant d'ailleurs le port des précé-

dentes, produit de ses racines des feuilles radicales deux fois ternées; les folioles ovales, pétiolées, roides, profondément dentées en scie, pileuses. De leur centre s'élève une tige simple, nue, divisée au sommet en plusieurs pédoncules ombellés, rabattus en dehors, peu garnis de fleurs. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. Ses feuilles sont employées en Afrique comme vésicatoires.

8. ADONIDE hérissée. *Adonis hirsuta*.

Adonis (anamenia hirsuta), foliis lanceolatis, profundè serratis, hirsutis; scapo basi ramofo; ramis decumbentibus, paucifloris. Vent. Jard. de la Malm. l. c.

Christopharia trifoliata, foliis scabris; flore solitario, rariore. Burm. Afric. pag. 145. 147. tab. 52.

Ses racines sont épaisses, composées de plusieurs fibres simples, brunes, alongées; elles produisent plusieurs feuilles longuement pétioles, deux fois ternées, pétiolées, ovales-lancéolées, profondément & irrégulièrement dentées en scie, hérissées de poils roides, ainsi que les pétioles. De leur centre s'élèvent plusieurs tiges longues de deux pieds, nues, rameuses presque dès leur base, hérissées; les pédoncules rabattus, peu nombreux, partant du même point, accompagnés à leur base de quelques folioles presque sessiles, oblongues, en forme de collerette; les pédicelles alternes, rarement ombellés, munis d'une bractée à leur base. Le calice est composé de cinq folioles oblongues, verdâtres; la corolle à plusieurs pétales de même forme, d'un jaune de soufre, auxquels succèdent des baies glabres & oblongues, à une seule loge monosperme, réunies sur un réceptacle commun.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

9. ADONIDE à feuilles de carotte. *Adonis daucifolia*. Lam.

Adonis (anamenia daucifolia), foliis bipinnatis; foliolis linearibus, pinnatifidis. Vent. Jard. de la Malm. l. c.

Adonis filia. Linn. Suppl. (Voyez ADONIDE, n°. 4.)

ADONIS. (Voyez ADONIDE.)

ADOXA. (Voyez MOSCATELLINE.)

ADUPLA. Genre de plantes de la famille des cyperoides, observé par Boiss. dans l'Amérique septentrionale, & voisin du choïn (*scirpus* Linn.). Le même genre a été décrit sous le nom de *mariscus* (*mariscus*) par Gærtner, qui lui attribue.

seulement pour caractère distinctif, des glumes simples, tuilées; les inférieures stériles, les supérieures fertiles. M. Bosc, admettant des glumes bivalves, trouve dans chacune deux fleurs, l'une mâle & sessile, l'autre femelle & pédonculée. Les autres caractères sont ceux de la famille. Ces deux auteurs y rapportent plusieurs espèces de *scirpus* & de *hillingia* de Linné. (Juss.)

ÆCHMEA. (Voyez ACHMÉE, Suppl.)

ÆCIDIUM. (Voyez UREDO.)

ÆGERITA. (Perf. Fung.) (Voyez ÆGÉRITE.)

ÆGÉRITE. *Ægerita*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui se rapproche beaucoup des moisissures, qui ressemblent aux *botrytis* par leur structure, qui en diffèrent par les fibrilles couchées & beaucoup plus menues qui portent les capsules. Leurs plaques ont une apparence glabre & charnue, tandis que celles des *botrytis* & des *monilia* ont l'aspect velu & filamenteux. Le caractère essentiel de ce genre consiste en ce que :

Les *ægérites* n'offrent qu'un tubercule ou une croûte convexe. Vues à une forte loupe ou au microscope, on y distingue des capsules (sphériques, éparées, attachées à des fibrilles couchées, rameuses & extrêmement menues. Ce genre a été établi par M. Persoon.

ES P È C E S.

1. ÆGÉRITE tête d'épingle. *Ægerita punctiformis*. Decand.

Ægerita minima, hemispharica, caruleo-nigrescens. Decand. Flot. franç. vol. 1. pag. 72.

« J'ai trouvé cette plante, dit M. Decandolle, sur les racines de jacinthes qui croissoient dans l'eau; elle y forme de petits tubercules d'un brun-bleuâtre, gros comme la tête d'une épingle. Vus au microscope, ces tubercules paroissent composés de globules sphériques très-nombreux, adhérens le long de filaments rameux, extrêmement délics.

2. ÆGÉRITE orangée. *Ægerita aurantia*. Dec.

Ægerita crustacea, aurantino-flavescent, seminibus minutissimis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 14.

Macor aurantius. Bull. Champ. pag. 103. tab. 504. fig. 5. (Voyez MOISSISURE, n°. 5.)

3. ÆGÉRITE en étoile. *Ægerita crustacea*. Dec.

Ægerita crustaceo-subcoriacea, ex albo-sulphurea,

demum rubra; stipitibus vix perspicuis. Dec. Synopf. Plant. gall. pag. 14. n°. 182. (Voyez MOISSISURE, n°. 2.)

4. ÆGÉRITE des bois morts. *Ægerita epyxilon*. Decand.

Ægerita pulvinata, ex cinereo-nigricans, inans filamentosa. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 14. n°. 183.

Reticularia epyxilon. Bull. Champ. pag. 90. tab. 472. fig. 1.

Cette espèce est annuelle : elle naît sur le bois mort, dépouillé d'écorce; elle y forme de petites couffins d'abord griffâtes, unis & mous, ensuite bruns ou noirs, & réduits en une poussière qui s'arrache aux doigts. Les capsules sont oblongues, attachées à de petites fibres articulées & élastiques. (Decand.)

5. ÆGÉRITE blanche. *Ægerita candida*. Perf.

Ægerita conferta, levis, candida. Perf. Disposit. Fung. pag. 40, & Synopf. pag. 684.

Sclerotium ægerita. Hoffm. Crypt. tab. 9. fig. 1.

Il se présente en automne dans les bois d'aulnes humides, à la surface des bois, sous la forme de petites plaques serrées, blanches, granuleuses.

6. ÆGÉRITE pâle. *Ægerita pallida*. Perf.

Ægerita sparsa, subruberculosa, pallida. Persoon, Disposit. Meth. Fung. pag. 40, & Synopf. pag. 685.

Il croît sur l'écorce des rameaux tombés des chênes où il forme des amas épars, un peu tuberculeux, d'un blanc-pâle.

7. ÆGÉRITE bleuâtre. *Ægerita casta*. Perf.

Ægerita sparsa, pruinata, casto-albida. Persoon, Synopf. pag. 685.

On l'observe dans l'hiver sur le tronc des arbres, en forme de petits points épars, d'un blanc-bleuâtre, d'une consistance un peu molle, qui disparaît en se desséchant.

ÆGICÈRE. *Ægiceras*. Gærtner nomme ainsi le *rhizophora corniculata* de Linné, dont il fait un genre distinct, & auquel il donne pour caractère essentiel :

Un calice coriace, campanulé, à cinq divisions; cinq pétales, autant d'étamines; un ovaire supérieur, surmonté d'un seul style; une capsule allongée, courbée en forme de corne, entourée à sa base par le calice; une seule semence.

Les affinités de ce genre ne sont pas encore déterminées. Son nom, tiré du grec, exprime la forme

de les capsules. Gærtner en distingue deux espèces, toutes deux figurées dans Rumphie.

ESPÈCES.

1. *ÆGICÈRE* à gros fruits. *Ægiceras majus*. Gærtner.

Ægiceras foliis alternis, ovatis; floribus cymoso-confertis; fructu falcato, maximo. (N.)

Rhiphophora (corniculata), *foliis ovatis, floribus confertis; fructibus arcuatis, acuminatis*. Linn. Syst. veget. pag. 367.

Ægiceras majus. Gærtner. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 216. tab. 46. fig. 1. — Willd. Spec. 1. pag. 1183.

Mangium frutescens, corniculatum. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 117. tab. 77.

Abrusseau qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, garni de rameaux souples, effilés, munis de feuilles pétioles, alternes, ovales, entières, un peu aiguës, veinées, glabres à leurs deux faces, longues de quatre à cinq pouces, larges d'environ un pouce & demi, rétrécies à leur base. Les fleurs sont disposées en paquets axillaires & latéraux, soutenus par des pédoncules simples, filiformes. Le calice est campanulé, persistant, à cinq découpures; la corolle blanche, odorante, à cinq pétales épais, réfléchis en dehors. Le fruit consiste en une capsule coriace, cylindrique, acuminée, arquée ou courbée en faux, très-glabre, à une loge, à une seule valve, longue d'environ un pouce & demi, s'ouvrant longitudinalement par son côté convexe, contenant une seule semence de la même forme & de la même longueur que la capsule; l'embryon semblable à la semence, verdâtre, renversé; les cotylédons très-longs, à demi cylindriques; la radicule très-courte, conique, supérieure; point de périsperme.

Cette plante croît aux îles Moluques, sur les côtes maritimes. H

2. *ÆGICÈRE* à petits fruits. *Ægiceras minus*. Gærtner.

Ægiceras foliis ovato-oblongis; fructibus lunatis, multo brevioribus. (N.)

Ægiceras minus. Gærtner. de Fruct. & Sem. l. c.

Umbra culam maris. Rumph. Amb. 3. pag. 124. tab. 82.

Ses tiges sont de moitié plus courtes que celles de l'espèce précédente, & ses fruits quatre fois plus petits, bien moins aiguës. Ses rameaux sont, les uns alternes, d'autres presque opposés, en croix; les feuilles pétioles, alternes, les supérieures quelquefois opposées, glabres, ovales-oblongues, presque obtuses, un peu rudes, traversées par des

veines à peine sensibles, jaunâtres. Les fleurs sont latérales & fasciculées, blanchâtres, petites; les pétales réfléchis. Le fruit est coriace, roussâtre, finement strié; les semences solitaires, ovales, d'un jaune-pâle; l'embryon elliptique; les cotylédons planes, convexes; la radicule fort petite, globuleuse, supérieure.

Cette espèce croît sur les bords de la mer, aux îles Moluques. H

Observations. On pourroit, à ce qu'il paroît, ajouter une troisième espèce aux deux précédentes; c'est le *mangium floridum*. Rumph. Amboin. 3. pag. 125, tab. 83. Elle se distingue par ses calices contournés; par ses fruits coniques, très-aigus, à peine courbés. Gærtner regarde cette plante comme la même que son *ægiceras majus*; elle en diffère par la forme de les capsules.

ÆGINÉTIE. *Æginetia*. Ce genre, établi d'abord par Linné, avoit été depuis réuni par ce même auteur aux *orobanches*; il paroît néanmoins devoir en être distingué depuis qu'il est mieux connu. Il a pour caractère essentiel :

Un calice d'une seule pièce, en forme de spathe; une corolle campanulée, à deux lèvres; quatre étamines didynames; un style; une capsule à plusieurs loges.

ESPÈCE.

ÆGINÉTIE des Indes. *Æginetia indica*. Roxb.

Æginetia caule nudo, simplici, uniflora; corollâ curvâ. (N.)

Æginetia indica. Roxb. Corom. vol. 1. pag. 63. tab. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 347.

Orobanchæ (*æginetia*), *caule uniflora, flore subspatheo*. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 883.

Æginetia. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 632.

Tsem curvata. Rheed, Hirt. Malab. vol. 11. pag. 97. tab. 47.

Ses tiges sont roides, très-simples, cylindriques, marquées de lignes rougeâtres; elles s'élèvent plusieurs en forme de hampe, d'une racine fibreuse, munie à son collet d'une écaille jaunâtre, lancéolée. Chaque tige est dépourvue de feuilles, terminée par une seule fleur, accompagnée d'une spathe jaunâtre, qui se déchire en s'ouvrant. La corolle est purpurine, recourbée. Le fruit est une capsule composée de plusieurs valves. Cette plante, mêlée avec la mufcade & le sucre, forme un bon masticator qui ramollit les dents & en fait disparaître la mauvaise odeur.

Cette plante croît sur les collines au Malabar. H

Observations. Cavanilles, dans ses plantes, Hispan. 6, tab. 572, a décrit & figuré sous le même

nom un genre de plantes rubiacées, qu'il faudra nommer autrement, à moins qu'une comparaison exacte ne la fasse réunir au genre *carphalea*, dont il parait ne pas différer. (Juss.)

ÆGIPHILE. *Ægiphila*. Ce genre se caractérise par un calice à quatre dents; une corolle tubuleuse, à quatre divisions; un style à demi bifide; une baie à deux ou à quatre semences.

Borné d'abord à une seule espèce, ce genre a été augmenté de trois arbrisseaux de la Guiane, qu'Aublet avoit mentionnés sous le nom générique de *manabea*; on y a joint un *knoxia* de Brown. M. Willdenow y a réuni le genre *nuxia* Lam.; mais cette dernière plante appartient plutôt à la famille des personnées, qu'à celle des verbénacées, dans laquelle se rangent les *ægiphiles*.

ESPÈCES.

1. *ÆGIPHILE* de la Martinique. *Ægiphila martinicensis*. Linn.

Ægiphila glabra, floribus laxè paniculatis. Lam. Illustr. t. pag. 293. n°. 1502. tab. 70. fig. 1.

Ægiphila foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris; ramis diffusis, paniculis terminalibus axillaris, calicibus glabris. Swartz, Prodr. 15. — Vahl, Egl. 1. pag. 14. (Voyez *ÆGIPHILE*, n°. 1.)

Cette plante offre quelques variétés dans ses feuilles, qui sont plus ou moins élargies.

2. *ÆGIPHILE* arborescente. *Ægiphila arborescens*. Vahl.

Ægiphila glabra, floribus glomeratis. Lam. III. n°. 1503.

Ægiphila foliis ellipticis, acuminatis, glabris; paniculis; corymbis axillaribus, calicibus ramisque incanis. Vahl, Egl. 1. pag. 15.

Manabea (arborescens), *foliis ovatis, acuminatis; floribus glomeratis, albis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 64. tab. 24.

Arbre d'une médiocre grandeur, divisé en rameaux tétragones, blanchâtres, garnis de feuilles opposées, pétiolées, longues de trois à quatre pouces & plus, elliptiques, acuminées, rétrécies à leurs deux extrémités, tendres, glabres en dessus, plus pâles & à peine velues en dessous, tomenteuses à leurs deux faces dans leur jeunesse, finement veinées, à nervures obliques. Les fleurs sont blanches, nombreuses, disposées en corymbes opposés, axillaires, plus longs que les pétioles, divisés par bifurcations, accompagnés de petites bractées blanchâtres & subulées; le calice turbiné, à quatre dents, enveloppant le fruit dans sa moitié inférieure; la corolle tubulée, à quatre découpures

lancéolées; le tube un peu plus long que le calice; les filamens à peine sensibles; quatre anthers petites, à l'orifice du tube; l'ovaire globuleux; le style une fois plus long que la corolle, profondément bifide; il lui succède une baie un peu globuleuse, comprimée, lisse, à peine ombiliquée, de la grosseur d'un grain de poivre, contenant de deux à quatre semences ovales, convexes en dehors, planes & comprimées en dessous, revêtues d'une enveloppe coriaccée.

Cette plante croît dans la Guiane. 5

3. *ÆGIPHILE* jaune. *Ægiphila lutea*. Lam.

Ægiphila glabra, floribus glomeratis, axillaribus; corollis flavis. Lam. Illustr. n°. 1505. tab. 70. fig. 3.

Ægiphila (manabea), *foliis oblongo-acuminatis, apice attenuatis; paniculis terminalibus lateradibusque, flaminibus inclusis, pistillo elongato*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 256.

Manabea (levis), *foliis oblongo-ovatis, acuminatis*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 66. tab. 25.

Ses tiges sont quadrangulaires, rameuses, de couleur cendrée; les rameaux étalés, alongés, tétragones, très-lisses, garnis de feuilles paucolées, opposées, oblongues, acuminées, roides, tridentées, glabres à leurs deux faces, presque longues d'un pied; les pétioles courts, cylindriques. Les fleurs sont agglomérées, disposées en panicules axillaires, terminales; les ramifications opposées en croix, trifides vers leur milieu; le calice campanulé, à quatre lobes obtus; la corolle jaune, à quatre découpures étalées; les anthers ovales, point saillantes; l'ovaire placé dans le fond du calice; le style capillaire, bifide vers son sommet. Le fruit consiste en une baie d'abord arrondie, couronnée par le calice, puis allongée, jaunâtre, contenant quatre semences.

Cette plante croît dans la Guiane. 5

4. *ÆGIPHILE* velu. *Ægiphila villosa*. Lam.

Ægiphila villosa, foliis subius incanis. Lam. III. n°. 1504. tab. 70. fig. 2.

Ægiphila foliis oblongis, acutis, subius tomentosis; cymis capitatis, bifidis, axillaribus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 616.

Manabea (villosa), *foliis ovatis, subius incanis; floribus virecentibus, glomeratis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 62. tab. 25.

Ses tiges sont velues, tétragones, hautes de sept à huit pieds; les feuilles opposées en croix, pétiolées, entières, ovales, acuminées, vertes en dessus, blanchâtres & tomenteuses en dessous, souvent d'inégale grandeur; les plus grandes longues d'un pied, larges de quatre à cinq pouces. Les

fleurs sont axillaires, réunies en tête ou en un corymbe bifide, touffu; la base des pédoncules munie de deux glandes opposées. Le calice est velu, à quatre lobes; la corolle verdâtre. Le fruit est une baie jume, à deux loges, contenant chacune une semence.

Cette plante croît à l'île de Cayenne. Les Créoles la nomment *bois-taba*, à cause de la ressemblance de ses feuilles avec celles du tabac. h

5. *ÆGIPHILE étalé*. *Ægiphila elata*. Swartz.

Ægiphila foliis ellipticis, acuminatis; panicula terminalibus, stramineis exsertis, pistis abbreviatis. Swartz, Prodr. 31, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 154.

Xnoxia (scandens), *foliis cordato-ovatis; pedunculis multipartitis, alaribus*. Brown, Jam. 140. tab. 3. fig. 3.

Arbrisseau grimpant, à tiges droites, rameuses, hautes de six pieds, glabres, cylindriques; les rameaux simples, opposés, allongés, garnis de feuilles ovales-oblongues, quelquefois un peu échan-crées à leur base, entières, acuminées, très-glabres; les pétioles courts, pubescents. Les fleurs sont jaunes, assez grandes, disposées en une panicule terminale, quelquefois axillaire, en thyrses; les rameaux opposés, presque trifides. Le calice est campanulé, à quatre découpures droites, ovales; pubescentes; la corolle beaucoup plus longue que le calice; le tube cylindrique; le limbe à quatre découpures oblongues, obtuses, éralées; les filaments plus longs que la corolle; l'ovaire arrondi, auquel succède une baie jaunâtre, un peu dure, à deux loges; deux semences dans chaque loge. Il paroît qu'il existe quatre loges dans les jeunes fruits, d'après l'observation de M. Swartz.

Cette plante croît à la Guinée & à la Jamaïque. h

6. *ÆGIPHILE fétide*. *Ægiphila fetida*. Swartz.

Ægiphila foliis ovato-lanceolatis, subius petiolis, que hirsuta; pedunculis axillaribus, foliariis, trifloris. Swartz, Prodr. pag. 32, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 158.

Noxia (elata), *foliis ellipticis, acuminatis, submembranaceis, oppositis*. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 32. — Brown, Jam. tab. 3. fig. 3.

Arbrisseau haut de deux pieds, à tige glabre, cylindrique; les rameaux pubescents; les feuilles opposées, pétioles, ovales-lanceolées, entières, obtuses, pubescentes, un peu ridées, d'une odeur fétide, approchant de celle de la jujubière. Les fleurs sont axillaires, réunies au nombre de trois sur des pédoncules courts, pubescents, garnis, dans leur milieu, de petites stipules velues, fété-

cées. Leur calice est campanulé, tronqué; la corolle jaune, plus longue que le pédoncule, dilatée vers son limbe; les filaments de la longueur de la corolle; l'ovaire presque tétragone; le style de la longueur du tube; les stigmates épais. Le fruit est une baie arrondie, assez grosse, rouge à sa maturité, à quatre semences, une dans chaque loge.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les montagnes. h (Description ex Swartz.)

7. *ÆGIPHILE trifide*. *Ægiphila trifida*. Swartz.

Ægiphila foliis ovato-lanceolatis, glabris; pedunculis axillaribus, confertis, trifidis. Swartz, Prodr. 32, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 160.

Petit arbrisseau dont les tiges sont droites; les rameaux très-simples, cylindriques, étalés, glabres, allongés; les feuilles ovales-lanceolées, glabres, entières, roides, acuminées, d'un vert foncé. Les fleurs sont axillaires, supportées par des pédoncules courts, réunis plusieurs ensemble, simples ou trifides. Le calice est rubulé, à quatre dents; la corolle blanche; son tube étroit, presque long d'un pouce; le limbe à quatre découpures lanceolées, réfléchies; l'une d'elles roulée en capuchon à son sommet; les anthères non filiformes; le style plus court que les étamines. Le fruit est une baie assez grosse, oblongue, noire, à quatre semences.

Cette plante croît à la Jamaïque. h (Description ex Swartz.)

8. *ÆGIPHILE à fleurs nombreuses*. *Ægiphila multiflora*. Ruiz & Pav.

Ægiphila foliis oblongis; floribus axillaribus, congestis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 50. tab. 576.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de quinze ou dix-huit pieds. Ses tiges se divisent en rameaux quadrangulaires, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles opposées, oblongues, ovales, acuminées, très-entières, veinées & lanugineuses en dessous. Les fleurs sont axillaires, réunies deux ou trois dans chaque aisselle, médiocrement pédonculées. Leur calice est pubescent, de couleur purpurine, à quatre dents; la corolle d'un rouge-pourpre, en entonnoir, trois fois plus longue que le calice; à quatre découpures ovales, réfléchies; les filaments plus courts que la corolle; les anthères oblongues, sagittées; l'ovaire arrondi à quatre filons; deux stigmates aigus; les baies d'un pourpre-obscure, arrondies, presque tétragones, à quatre semences dures, à trois faces.

Cette plante croît au Pérou. h (Description ex Ruiz & Pav.)

ÆGLE. (Perf.) Correa. (Acl. Soc. Linn. Lond.)
(Voyez TAPIER, n°. 5, & Suppl.)

On avoit soupçonné, avec assez de fondement, que le cratœva *marmelos* de Linné devoit former un genre particulier; mais il étoit nécessaire que cette plante fût mieux observée. Roxburg, dans ses *Plantas du Coromandel*, en a donné une bonne figure, tab. 141. Dans les *Aides de la Société linnéenne de Londres*, elle a été décrite sous le nom générique de *correa*; mais comme il existe un autre *correa* (Ventr. Jard. de la Malm. tab. 13), M. Persoon y a substitué le nom d'*agle* (Synopf. 1, pag. 73), dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice d'une seule pièce, à cinq lobes; cinq pétales très-ouverts; un style court, épais; un grand nombre d'étamines inférées sur le réceptacle; une baie globuleuse, à coupe ou seize loges, dont l'écorce épaisse devient ligneuse.

ÆGOLETHRON. Herbe des environs d'Héraclee, dans le royaume de Pont, citée par Pline comme nuisible aux bêtes de charge, & surtout aux chèvres, & donnant également une qualité vénéneuse au miel quand les abeilles récoltent le suc de ses fleurs. Il ajoute que ses mauvais effets ne se font sentir qu'à la suite des printems humides, qui semblent changer sa nature. Alors la couleur de ce miel est plus brillante; son odeur change; il pèse plus que le bon miel, ne s'épaissit point, & excite l'éternuement. Les animaux qui en mangent, se jettent à terre pour calmer la chaleur qu'ils éprouvent. On leur administre avec fucus une espèce d'hydromel, dans lequel on a fait bouillir de la rue.

Les auteurs modernes ne sont point d'accord sur la plante qu'ils doivent regarder comme l'*agolethron*. Quelques-uns croient, au rapport de Bauhin, que c'est la petite douve (*ranunculus flammula* Linn.), parce que cette plante, qui croît dans les lieux humides, est réputée dangereuse pour les moutons. Gefner, suivant le même auteur, la rapportoit à l'espèce de claudelaine, que nous nommons *lathraea squamaria* Linn., probablement parce qu'il lui retrouvait les mêmes qualités.

Tournefort, dans son *Voyage du Levant*, décrit un *chamarodendros* à fleurs jaunes (*azalea pontica* Linn.), commun sur les côtes de la Mer-Noire, dont la fleur excitoit des vapeurs & causoit des vertiges. Le miel que les abeilles en retirent, étouffait ceux qui en mangent, & leur cause des nausées. Cette conformité dans les effets de deux plantes qui croissent dans les mêmes lieux lui a fait présumer qu'il avoit retrouvé l'*agolethron*, & il se confirme dans cette opinion par un second passage de Pline, qui, dans le même chapitre, parle d'une autre sorte de miel recueilli sur les mêmes côtes, appelé *manomenon*, parce qu'il rend insensés ceux

qui en mangent; il est recueilli par les abeilles sur les fleurs du *rhododendros*, commun dans les forêts de cette contrée. Pline rappelle l'événement arrivé dans le voisinage de Trébisfunde à l'armée des dix mille, commandée par Xénophon, dont les soldats eurent, pendant un jour, de fortes évacuations par haut & par bas, suivies de révéries, pour avoir pris beaucoup de miel. Tournefort s'appuie encore du témoignage d'un missionnaire de la Colchide, qui dit que le miel recueilli sur une espèce de laurier-rose jaune est dangereux & fait vomir.

D'après cet énoncé, on ne peut douter de l'action de l'*azalea pontica* Linn., & l'on retrouve un grand rapport entre lui & l'*agolethron*; mais ce dernier est une herbe, au rapport de Pline, & l'*azalea* est un arbrisseau de sept à huit pieds de hauteur, dont le tronc est gros comme la jambe. Il en résulte que l'on peut encore douter de l'identité de la plante de Pline avec celle de Tournefort, & que l'*agolethron* n'est pas encore certainement connu. (Juss.)

ÆGOPRICON. Linn. Suppl. (Voyez MAPROU-NIER.)

ÆGYLOPS. (Voyez ÉGLOPE.)

ÆRIDES. Genre établi par M. Swartz pour plusieurs espèces d'*epidendrum* de Linné. (Voyez ANGREG, Suppl.)

ÆRVE tomenteuse, Lam. Elle paroît être la même plante que l'*achyrantes alopecuroides*. (Voyez CADELARI, n°. 16.)

ÆSCHINOMENE. (Voyez NÉLITTE & SE-SAN.)

ÆSCULUS. (Voyez MARONNIER.)

ÆTHUSA. (Voyez ÆTHUSE.)

ÆTHUSE. *Æthusa*. Le caractère de ce genre est d'avoir :

Un fruit nu, ovale, arrondi ou oblong, strié; les pétales inégaux, en cœur, réfléchis en dedans; les corolletes partielles à trois ou quatre folioles rabattues & déjetées du même côté.

Observations. M. de Lamarck a réuni dans ce genre plusieurs espèces que Linné avoit placées dans d'autres genres; ce qui rend celui-ci plus naturel. Je me bornerai à présenter ici une synonymie essentielle à connoître pour éviter la confusion & les doubles emplois.

ES P È C E S.

1. ÆTHUSE ache des chiens. *Æthusa cynapium*. Linn.

Æthusa

Æthusa foliis conformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 367. — Lam. Ill. tab. 196.

Coriandrum (cynapium), *caule diflorio*; involu-
cellis dimidiatis, *pendulis*. Crantz, Aufl. pag. 211.

Cynapium. Rivin. Pent. tab. 75.

Cicutaria terrestris, *minor*. Comm. Nor. 1740.
Hebd. 49. (Voyez *ÆTHUSA* à feuilles de persil,
n°. 1.)

2. *ÆTHUSA* mutelline. *Æthusa mutellina*.

Æthusa caule subnudo; *foliis bipinnatis* (*costis
seminum prominulis*). Linn. Syst. veget. pag. 286.
Sub phellondrio. — Jacq. Vind. 223, & Flor. aust.
1. tab. 56.

Ligusticum (mutellina), *foliolis acutè multifidis*;
caule subnudo. Crantz, Aufl. pag. 198. — Allion.
Flor. ped. n°. 1318. tab. 61. fig. 2.

Seseli foliis duplicato-pinnatis, *pinnatis semi-pin-*
natis, *lobulis lanceolatis*. Haller, Helv. n°. 763.

Ligusticum (mutellina), *caule simplici, subnudo*,
involucellis dimidiatis. Decand. Synopf. pag. 309.

Ananthe purpurea. Dict. vol. 4. pag. 530.

Meum mutellina. Gært. de Frukt. vol. 1. pag.
106. tab. 23.

Daucus montanus. Clus. Pann. pag. 700. (Voyez
ÆTHUSA, n°. 2, & *ANANTHE* pourpré, vol. 4.
pag. 530.)

Elle diffère des autres espèces de ce genre par
ses tiges saillantes, plus épaisses, au nombre de
cinq sur chaque semence. On l'a placée successive-
ment dans plusieurs genres : elle paroît militer
principalement entre celui-ci & les *ligusticum*.

3. *ÆTHUSA* à feuilles capillaires. *Æthusa meum*.

Æthusa foliis omnibus multiparito-setaceis (*se-*
minibus elongatis, costatis). Linn. Syst. veget. pag.
287.

Æthusa meum, *foliis omnibus multiparito-seta-*
cis; *foliis subverticillatis*; *caule paniculato*; *vaginis*
petiolorum dilatatis, ventricosis; *involucro universali*
monophyllo. Ait. Hort. Kew. t. 1. pag. 354.

Athamanta (meum), *foliolis capillaribus*; *se-*
minibus glabris, striatis. Linn. Spec. Plant. 2. pag.
353.

Meum athamanticum. Jacq. Flor. aust. tab. 303.
— Gært. de Frukt. vol. 1. pag. 105. tab. 23. —
Smith, Flor. brit. 1. pag. 309.

Ligusticum (meum), *foliis capillaribus*. Crantz,
Aufl. pag. 199.

Ligusticum (meum), *foliis bi seu tripinnatis*;
foliolis capillaribus, multifidis; *seminibus elongatis*.
Decand. Synopf. pag. 309.

Botanique. Supplément. Tome I.

Seseli meum. Scopol. Carn. 2. n°. 352.

Ligusticum capillaireum. Lam. Flor. franç. 3. pag.
454.

Meum. Rivin. tab. 62. — Blackw. tab. 525.
(Voyez *ÆTHUSA*, n°. 3.)

L'on voit par cette synonymie, que cette espèce
n'a pas moins varié de genres que la précédente.
Ses semences sont allongées, à côtes saillantes.

4. *ÆTHUSA* de montagne. *Æthusa montana*.
Lam.

Æthusa (*bunius*), *foiolis radicalibus pinnatis*,
caulinis multipartito setaceis. Linn. Syst. veget. pag.
286.

Carum bunius. Syst. Nat. edit. 12. pag. 733. —
Jacq. Hort. tab. 198.

Carum (*bunius*), *umbellis septemfidis*; *foliis*
radicalibus ternatis quinatisque; *caulinis bipinnatis*,
linearibus; *summis setaceis*. Gouan, Ill. 20.

Daucus petroselinii seu coriandri folio. C. Bauh.
Pin. 150.

Seseli faxifragum. Linn. Spec. 374. (Ex Gouan.)

Seseli bunius. Villars, Flor. dauph. vol. 2. pag.
588.

Meum heterophyllum. Mœnch. Meth. 86. (Voyez
ÆTHUSA, n°. 4.)

5. *ÆTHUSA* d'Aiton. *Æthusa fusca*. Ait.

Æthusa foliis omnibus multipartito-setaceis, *fo-*
liolis subverticillatis, *caule multifolio*, *vaginis pe-*
tiolorum angustis, *involucro universali polyphylo*.
Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 355.

Cette espèce se distingue de toutes les autres
par sa collerette universelle composée de plusieurs
folioles, tandis qu'elle n'existe pas ordinairement,
ou bien ne consiste qu'en une ou deux folioles.
Ses tiges sont garnies d'un grand nombre de
feuilles, toutes à divisions nombreuses, très-
fines, presque sétacées; les folioles presque ver-
ticillées. Les pétioles sont munis à leur base, de
gaines étroites.

Cette plante est cultivée dans les Jardins bo-
taniques en Angleterre. Son lieu natal n'est pas
connu. (Aiton.)

ÆTUXION ponctué. *Ætuxion punctatum*.
Ruiz & Pav.

Ætuxion foliis oblongis, *subtus punctatis*.
Ruiz & Pav. Syst. veg. Per. pag. 260.

Genre de plante établi par les auteurs de la
Flora du Pérou, dont les rapports naturels ne font
pas encore assez bien connus pour en déterminer

V

la famille. C'est un arbre très-élevé, qui reste toujours vert, garni de feuilles oblongues, ponctuées à leur face inférieure. Ses fleurs sont dioïques ; elles ont un calice extérieur d'une seule pièce, s'ouvrant latéralement, & un intérieur à cinq folioles caduques. La corolle est composée de cinq pétales crénelés ; elle renferme dans son centre cinq petites écailles en cœur à la base des pétales. Les étamines sont au nombre de cinq, fertiles dans les fleurs mâles, stériles dans les femelles ; elles entourent, dans celles-ci, un ovaire surmonté d'un style simple, latéral, terminé par un stigmate bifide. Le fruit consiste en une grappe à une seule semence, de la forme d'une petite olive.

Cet arbre croît dans les forêts du Chili. Son fruit est vénéneux, principalement pour les chèvres qui en mangent. C'est l'origine de son nom, qui signifie poisson de chèvres. Il porte au Pérou le nom d'*acayunillo*, petite olive. b

AFZELIA. Nom donné par Ehrhart à quelques espèces de mousses du genre *bryum* de Linn., qu'Hewig & Bidel ont rangées parmi les *weissia*. (Voyez *WEISSIE*.)

ATZELIA. (Gmel. Syst. Nat. 927, & Walth. Flor. carol. pag. 171.) Gmelin, d'après Waltherius, avoit décrit, comme un genre nouveau, sous le nom d'*afzelia*, une plante de la Caroline, que Michaux a reconnue devoir appartenir au genre *gerardia*. Linn., & dont il a fait une espèce qu'il nomme *gerardia afzelia*. (Voyez *GERARDE*, Suppl.)

AFZÉLIE d'Afrique *Afzelia africana*. Smith.

Afzelia foliis alternis, abrupte pinnatis ; floribus racemosis. (N.)

Afzelia africana. Smith, Acl. Soc. Linn. Lond. vol. 4.

Arbrisseau de l'Afrique équinoxiale, dont M. Smith a formé un genre particulier sous le nom d'*afzelia*, déjà employé pour deux autres genres supprimés, dont nous avons parlé plus haut. Celui-ci appartient à la famille des légumineuses, & se rapproche des *castia*. Il a pour caractère essentiel :

Un calice tubulé, à quatre découpures caduques ; une corolle composée de quatre pétales onguiculés, le supérieur plus grand ; dix étamines libres, huit stériles, les deux supérieures stériles ; un ovaire surmonté d'un style simple, subulé, terminé par un stigmate aigu. Le fruit consiste en une gousse ligneuse, à plusieurs loges, contenant plusieurs semences noires, enveloppées à leur base par un arille d'une belle couleur pourpre.

Cet arbre est chargé de rameaux alternes, gar-

nis de feuilles pétioles, alternes, ailées, sans impaire. Les fleurs sont d'une couleur rouge-foncée, disposées en grappes.

AGALLOCHE. *Escarcaria*. Ce genre appartient à la famille des *euphorbia* ; il se rapproche des *euturus*. Son caractère essentiel est d'avoir :

Des fleurs dioïques, les mâles disposées en un chaton cylindrique ; un calice à peine sensible, à une seule écaille ; point de corolle ; trois étamines distinctes ; dans les fleurs femelles, trois écailles ; point de corolle ; un ovaire ; trois styles ; une capsule à trois loges monospermes.

Ce genre renferme des arbrustes exotiques, à feuilles alternes, munies de stipules. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, ordinairement lâches dans les fleurs mâles, plus serrés dans les femelles. M. Swartz avoit formé un genre particulier, sous le nom de *gymnasthes*, de quelques espèces qu'il a depuis reconnues devoir appartenir aux *escarcaria*.

ESPÈCES.

1. **AGALLOCHE** d'Amboine. *Escarcaria agallocha*. Linn.

Escarcaria dioica, floribus sessilibus ; flaminibus tripartitis, femineis racemosis ; foliis ovatis, acutiusculis, crenatis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1121. — Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 864.

Escarcaria agallocha. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1451. — Cærtm. de Fruct. tab. 108. — Lam. ill. tab. 805. fig. 1 & 2.

Arbor escarcans. Rumph. Amb. vol. 2. pag. 217. tab. 79 & 80. Mus & semina. (Voyez *AGALLOCHE*, pag. 471 & pour le n°. 2, voyez *GARO*.)

2. **AGALLOCHE** camettie. *Escarcaria camettia*. Willd.

Escarcaria dioica, floribus sessilibus, femineis spinosis ; foliis ovato-oblongis, acutiusculis, integerrimis. Willd. Spec. vol. 4. pag. 864. n°. 2.

Camettia. Rheed. Malab. vol. 5. pag. 89. tab. 45.

Arbre d'environ quarante pieds de haut, dont le bois est blanc, l'écorce cendrée, d'où découle un suc laiteux. Ses feuilles sont pétioles, épaisses, ovales-oblongues, très-entières, arrondies à leur base, un peu aiguës & même quelquefois un peu acuminées, d'un vert-foncé en dessus, plus claires en dessous. Les fleurs mâles sont odorantes, d'un vert-blanchâtre, disposées en épis, arillaires vers l'extrémité des rameaux, longs, très-grêles. Les fleurs femelles sont disposées en grappes plus courtes, ramassées, produisant des baies à trois

coques, vertes ou d'un vert-foncé, renfermant trois semences arrondies.

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux humides, marécageux.

5. *AGALLOCHÆ glanduleuse. Excacaria glandulifolia. Swartz.*

Excacaria monoica, floribus pedicellatis; flaminibus conglomeratis; squamâ glanduliferâ; semineis sessilibus, solitariis; foliis ovatis, acuminatis, subserratis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 1124.

Ricini fructu glabro, arbor jalifera, lactescens; folio myrtino, Sloan, Catal. 131. Hist. 2. pag. 7. tab. 158. fig. 2.

Son tronc s'élève à vingt pieds de haut ; il est revêtu d'une écorce cendrée, rouge en dedans. Les rameaux sont diffus, étalés, cylindriques, glabres, lactescens, garnis de feuilles alternes, pétiolées, éparées, ovales-acuminées, glabres, vertes, luisantes en dessus, un peu dentées en scie, longues d'un pouce ; les pétioles glabres, très-courts ; point de stipules.

Les fleurs mâles sont réunies en chatons lâches, filiformes, vers l'extrémité des rameaux ; chaque fleur portée sur un pédicelle très-court, muni d'une écaille calicinale, concave, & de cinq à six glandes fort petites, placées sur deux rangs ; les filamens un peu plus longs que l'écaille ; les anthères globuleuses, à deux loges. Les fleurs femelles sont solitaires, sessiles à la base des chatons mâles : leur ovaire est ovale, trigone, fort petit ; le style court, trifide ; les stigmates recourbés. Le fruit est une capsule presque ronde, trigone, presque à trois coques, à trois loges, de couleur marron, renfermant des semences solitaires & arrondies.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts. *h* (*Descrip. ex Swartz.*)

6. *AGALLOCHÆ à feuilles elliptiques. Excacaria tinifolia. Swartz.*

Excacaria dioica, floribus pedicellatis, flaminibus tripartitis; floribus femineis racemosis; foliis ovatis, obtusis, subserratis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 1119.

Gymnanthes (elliptica), dioica, flaminibus tripartitis, femineis amplexicatis. Swartz, Prodr. 96.

Arbre de douze à quatorze pieds, point lactescens, chargé de rameaux glabres, cylindriques, fragiles, garnis de feuilles ovales, oblongues, obtuses, un peu coriaces, longues de trois à quatre pouces, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, à dentelures très-obuses ou presque entières. Les fleurs sont dioïques ; les fleurs

mâles réunies en chatons axillaires, filiformes, longs d'environ un pouce & demi ; le rachis glabre, flexueux ; chaque fleur pédicellée, fort petite, munie d'une écaille concave, presque ronde ; de trois filamens réunis à leur base, très-courts ; deux autres écailles fort petites, ciliées, à unies à la base des filamens ; les anthères arrondies. Les fleurs femelles sont disposées en petites grappes axillaires, solitaires ; l'ovaire très-petit ; un style court ; trois stigmates réfléchis. La capsule est à peine de la grosseur d'un petit pois, arrondie, à trois coques, à trois loges, contenant des semences solitaires.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Jamaïque.

7. *AGALLOCHÆ luisante. Excacaria lucida.*

Excacaria monoica, floribus pedicellatis, flaminibus trichotomis, femineis pedunculatis; foliis ellipticis, subserratis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 1121.

Gymnanthes lucida. Swartz, Prodr. 66.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux éparés, cylindriques, glabres, un peu effilés, garnis de feuilles éparées, nombreuses, ovales, coniformes à leur base, quelquefois un peu elliptiques, obtuses à leur sommet,roides, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, longues de deux à quatre pouces, à dentelures un peu écartées. Les chatons des fleurs mâles sont axillaires, sessiles, solitaires, longs d'un demi-pouce & plus ; chaque fleur un peu pédicellée ; les écailles calicinales concaves, un peu arrondies, imbriquées avant la floraison. Les filamens très-courts, réunis à leur base ; les anthères petites, oblongues, trigones, à trois loges. Les fleurs femelles sont presque solitaires à la base des chatons, soutenues par un pédicelle long d'un demi-pouce, glabre, droit, triangulaire. La capsule est presque ronde, inclinée, de la grosseur d'un pois, à trois loges ; les semences brunes, solitaires, glabres, un peu arrondies.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Jamaïque. *h* (*V. f.*)

AGAPANTHUS umbelliferus. (Lhér.) (Voyez CRINOLE, n°. 1.)

AGARIC. (Voyez BOLET, Suppl.)

AGARIC. (Amanite Lam.) Agaricus. Ce genre avoit été nommé *amanite* par M. de Lamarck, d'après Dillen & Haller, le mot *agaricus* de Linné ayant été employé, par les botanistes qui l'ont précédé, pour le genre *boletus* Linné ; mais depuis près de trente ans que M. de Lamarck a présenté le genre *amanite*, la dénomination de Linné ayant

prévalu, j'ai cru devoir également en faire usage, & la substituer au mot *amanite*. Par la même raison, le genre *agaric* de M. de Lamarck sera mentionné à l'article *BOLET*, *Suppl.*

A l'époque de la publication du premier volume de cet ouvrage, les champignons n'avoient encore été que très-peu étudiés, & les espèces connues étoient bornées à un très-petit nombre. On peut juger par ce seul article, combien il s'est étendu par les travaux de plusieurs savans distingués, tels que M.M. Bulliard, Persoon, Palisot-Beauvois, Paulet, &c. & beaucoup d'autres botanistes étrangers. M. Persoon ayant donné sur cette partie l'ouvrage le plus méthodique & le plus complet, j'ai adopté une partie de ses genres, la distribution méthodique & ses divisions.

ESPÈCES.

§. I. AMANITA. Perf. Champignons munis d'une coiffe qui les enveloppe en entier dans leur jeunesse, & laisse quelquefois des lambeaux sur le chapeau.

1. AGARIC printannier. *Agaricus vernus*.

Agaricus (amanita verna), *acris, totus candidus, pileo demum subinfundibuliformi; stipite longo, foliato, cylindrico*. Perf. Synopf. pag. 250. n°. 6. (Voyez AMANITE, n°. 51.)

2. AGARIC bulbeux. *Agaricus bulbosus*.

Agaricus (amanita bulbosa), *totus candidus, pileo convexo; stipite elongato, attenuato, bulboso*. Perf. Synopf. Fung. pag. 250. n°. 7. (Voyez AMANITE, n°. 50.)

3. AGARIC à verrues. *Agaricus verrucosus*.

Agaricus pileo hemispharico, helveto, citrino; lamellis stipiteque albis. Decand. Synopf. pag. 43.

4. *Amanita (citrina)*, *pileo glabro, citrino; lamellis stipiteque albis*. Perf. Synopf. pag. 251. n°. 7.

5. *Amanita (mappa)*, *pileo flavescente, verrucis fuscescentibus variegato*. Perf. l. c.

6. *Amanita (vitidis)*, *pileo convexo, obscure viridi, ut plurimum nudo; lamellis stipiteque albis*. Perf. l. c. (Voyez AMANITE, n°. 47.)

4. AGARIC orange. *Agaricus aurantiacus*.

Agaricus (amanita aurantiaca), *magnum, pileo campanulato, aurantio-rubro; lamellis ventricosis, aureis; verrucis sparsis stipiteque albis*. Persoon, Synopf. Fung. pag. 252. n°. 10.

5. *Amanita (caesarea)*, *tota aurea, pileo striato*. Perf. l. c. — Schæff. Fung. vol. 4. pag. 64. tab. 247.

6. *Agaricus ovoides, albus*. Bull. Herb. tab. 364. (Voyez AMANITE, n°. 46.)

5. AGARIC moucheté, fausse orange. *Agaricus muscarius*.

Agaricus (amanita muscaria), *pileo aurantio-rubro, nido, planiusculo; verrucis, lamellis stipiteque candidis*. Perf. Synopf. 253. n°. 11.

Agaricus imperialis. Batfch. Elem. Fung. pag. 59.

6. *Amanita (formosa)*, *pileo aurantio, fulvo; verrucis laxis, subhævescentibus; lamellis albis; stipite flavescente, longissimo, squamoso-flaccido*. Perf. l. c. — Observ. Mycol. 2. pag. 27.

7. *Amanita (puella)*, *minor, pileo convexo, verrucis ut plurimum denudato*. Perf. l. c. — Schæff. Fung. tab. 28.

8. *Amanita (umbrina)*, *pileo planiusculo, à fuliginoso-subpiceo; verrucis, lamellis stipiteque albis*. Perf. l. c.

Agaricus maculatus. Schæff. Fung. tab. 90. (Voyez AMANITE, n°. 45.)

6. AGARIC à petite coiffe. *Agaricus pusillus*.

Agaricus (amanita pusilla), *pileo hemispharico, umbonato; lamellis ventricosis, roseis; stipite breviusculo, albido*. Perf. Synopf. pag. 249. n°. 5.

Agaricus volucaeus, var. 1. *minor*. Bull. Herb. tab. 350.

Cette espèce est fort élégante. Sa coiffe, de couleur de grisâtre, se déchire en quatre ou cinq lanières, qui persistent à la base du pédicule : celui-ci est blanchâtre, transparent, cylindrique, plein ou fistuleux. Le chapeau est glabre, hémisphérique, large de trois à quatre lignes, traversé par des lignes noires, en rayons, surmonté d'un mamelon convexe, persistant. Les lames sont larges, épaisses, peu nombreuses, assez distantes du pédicule, inégales, de couleur de rose dans leur état adulte.

Cette plante croît en automne, dans les jardins & les bois.

7. AGARIC à grande coiffe. *Agaricus volucaeus*.

Agaricus (amanita virgata), *caespitosa, pileo campanulato, conico, piloso, cinereo nigroque, variegato; lamellis pulverulentis, rubro-cinnamomeis*. Perf. Synopf. pag. 249. n°. 4.

Agaricus volucaeus. Bull. Herb. tab. 262.

8. *Agaricus bombycinus*. Schæff. tab. 98. ?

Sa coiffe est entière, persistante, d'un gris traversé de lignes noires; elle se déchire ensuite à son sommet en cinq ou six découpures. Le chapeau, large d'environ trois pouces, est gris & il

est, en vieillissant, traversé de lignes noires, divergentes; d'abord convexe, puis plane, pubescent. Les feuillets sont blancs dans leur jeunesse, de couleur de brique dans un âge avancé; le pédicule plein, cylindrique & blanchâtre. La plante s, dont la coiffe est jaunâtre, ne pouvoit être qu'une variété de cette espèce.

Cette plante croît en été, par groupes, sur le tan & dans les ferres.

8. AGARIC engainé. *Agaricus vaginatus*.

Agaricus (*amanita livida*), *pileo umbonato, planiusculo, striato; plumbæ livido, lamellis candidis, stipite basi volvâ vaginato*. Pers. Synopf. 247. — Decand. Synopf. 43.

Agaricus vaginatus. Bull. Champ. tab. 512 & tab. 98.

a. *Amanita livida*. Cæder. Flor. dan. tab. 1014.

Agaricus plumbeus. Schæff. Bav. tab. 85 & 86.

Amanita (pallens), *pileo sicco, ex albidopallenscente; disco sublevi*. Pers. l. c.

β. *Amanita* (*hyalina*), *pileo stipiteque beryllo, lamellis flavescenscentibus*. Pers. l. c.

Agaricus hyalinus. Schæff. l. c. tab. 244.

γ. *Amanita* (*fuscescens*), *pileo subconvexo, nitido, à livescens-fubhepatico; lamellis candidis; stipite subulato, livido; volvâ albidâ*. Pers. l. c.

δ. *Amanita* (*spadicea*), *pileo subcampanulato, umbonato, striato, fragili, spadiceo; lamellis candidis; stipite squamuloso, fuscescente*. Pers. l. c. pag. 248.

Agaricus fulvus. Schæff. Fung. tab. 95:?

α. *Agaricus badius*. Schæff. tab. 245.

Amanita (*badiâ*), *major, pileo badio; lamellis stipiteque dilute castaneis*. Pers. l. c.

ζ. *Amanita* (*subviscida*), *pileo planiusculo, ochraceo, fulvo, subviscido; stipite squamuloso, concolore; lamellis albidis*. Pers. l. c. (Voyez AMANITE, n°. 34.)

Cette espèce varie beaucoup par la couleur & la grandeur; mais on la reconnoît constamment en ce que la coiffe d'où elle est sortie, forme une gaine cylindrique, cachée sous terre, & allongée à la base de son pédicule. Le chapeau est d'abord très-convexe, puis plane, large de trois à quatre pouces, roux, marron ou fauve dans sa jeunesse, livide dans un âge avancé, toujours strié sur ses bords. Les lames sont blanches, inégales, rayonnantes, adhérentes au sommet du pédicule: quelquefois on trouve des débris de la coiffe qui forment des taches sur le chapeau. (Decand.)

9. AGARIC rude. *Agaricus asper*.

Agaricus (*amanita aspera*), *pileo carnosio, compaudo, umbonato, rubescens-fulgineo, verrucis acutis aspero; lamellis confertis, candidis; stipite longo, fibrilloso, subulato*. Persoon. Synopf. pag. 256. n°. 16. — Abbiid. Falc. 3. lc.

Agaricus verrucosus. Bull. Herb. tab. 316. — Lam. Illust. Gen. tab. 882. fig. 4.

Cette plante a une odeur forte, désagréable. Son pédicule est long de deux ou trois pouces, un peu renflé à sa base en forme de bulbe, point fistuleux. Son chapeau, d'abord étroit, hémisphérique, finit par devenir un peu concave, large de trois à quatre pouces, d'une chair compacte, blanche ou rougeâtre. Les lames sont blanches, nombreuses, inégales, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane qui se rabat en forme de collier. La coiffe est incomplète; elle disparaît après le premier âge, & laisse sur le chapeau des plaques proéminentes, souvent pointues.

Cette plante croît, dans le courant de l'été, aux lieux humides, dans les bois. On la soupçonne vénéneuse.

10. AGARIC solitaire. *Agaricus solitarius*.

Agaricus fordidi albus, pileo plano, medio, subdepresso, verrucoso, aspero; lamellis latis, pediculo minimi adnatis; stipite pleno, erecto, bulbofo, squamoso, annulato. Decand. Synopf. pag. 42. n°. 560. — Bull. Herb. tab. 10 & tab. 593.

Ce champignon est d'un blanc-sale. Son pédicule est droit, long de six à huit pouces, plein, épais à sa base, garni d'écaillés, qui sont les débris de la coiffe incomplète qui le recouvrait dans sa jeunesse. Le chapeau est presque plane, avec un léger enfoncement au milieu: il a six à sept pouces de diamètre; il est parsemé de verrues éparfes & proéminentes, qui sont les fragments de la coiffe. Ses feuillets sont larges, épais, non contigus avec le pédicule, sur lequel ils laissent leur marque. La membrane qui les recouvrait, se rabat en forme de collier sur le pédicule.

Ce champignon croît en été, à l'ombre, dans les bois; il a un goût exquis. On le mange cuit sur le gril, avec du beurre & du sel. (Decand.)

11. AGARIC très-grand. *Agaricus amplus*.

Agaricus (*amanita ampla*), *pileo carnosio, latissimo, murino; margine levî; verrucis crassiusculis, dilutioribus; stipite solido, crassissimo, albo; lamellis angustis, crassiusculis*. Pers. Synopf. Fung. p. 255. n°. 15.

C'est une des plus grandes espèces de ce genre. Son pédicule est blanc, très-épais, point fistuleux, muni, vers son sommet, de petites écailles

épaisses, transversales, étroites. Ses lames sont épaisses, étroites, larges d'environ trois lignes. Le chapeau est charnu, très-large, lisse à ses bords, d'une couleur claire, parsemé de verrues presque transparentes, un peu épaisses.

Ce champignon est rare; il se trouve sur les montagnes, dans les bois de pins. Sa faveur se rapproche de celle de l'*Agaricus campestris*. (Perf.)

12. AGARIC verdâtre. *Agaricus viridescens*.

Agaricus (amanita viridescens), pileo carnoso, plano, pallide viridescens; verrucis crassis, polyedris, albidis; stipite crassifusco, squamuloso-villoso, candido. Perf. Synopt. pag. 255. n° 14.

Son pédicule est long de trois ou quatre pouces, un peu épais, blanchâtre, couvert d'écaillés molles, velues; il supporte un chapeau plane, charnu, un peu spongieux, d'un vert-pâle, épais de quatre à six lignes, couvert de verrues blanchâtres, polyédres; la coiffe d'un blanc-sale. Ce champignon croît dans les forêts; il n'est point d'un goût désagréable.

13. AGARIC rougeâtre. *Agaricus rubescens*.

Agaricus (amanita rubescens), pileo convexo, opaco, rubescens; verrucis confertis lamellisque albis. Perf. Synopt. pag. 254. n° 13.

Agaricus (margaritiferus), nonnullorum. *Agaricus* pustulatus. Schæff. Fung. tab. 91.

3. *Amanita* (circinnata), pileo hemispharico, subumbilicato, rubescens; verrucis oblongis, circinnatis; lamellis planiusculis, albidis; stipite bulboso, squamuloso; pileo concolore. Perf. l. c.

Agaricus myodes. ? Schæff. Fung. tab. 261.

Ce champignon s'élève sur un pédicule long de deux pouces, solide, souvent bulbeux à sa base, un peu écaillé, blanchâtre; il supporte un chapeau convexe ou hémisphérique, épais, rougeâtre, couvert de verrues nombreuses, blanchâtres, oblongues ou arrondies. Les lames sont planes; ovales, entières, blanches, quelque fois un peu dentées. Il croît en automne, dans les bois de hêtre. La variété 3 est plus rare; elle est toujours percée à sa base par des trous de vers. Sa faveur n'est point désagréable.

5. II. AGARICUS. Perf. Champignons dépourvus de coiffe.

I. LEPOTHA. Perf. Lames qui, en vieillissant, se dessèchent sans noircir, recouvertes dans leur jeunesse d'une membrane qui se déchire ordinairement, et forme alors une sorte de collier autour du pédicule.

14. AGARIC élevé. *Agaricus procerus*.

Agaricus magnus, pileo carnoso, umbonato, squamoso, rufescente-cinereo; lamellis remotissimis, albidis; stipite bulboso, longifuso; annulo mobili. Perf. Synopt. Fung. pag. 257. n° 1. — Oler, Flor. dan. tab. 722. — Ad. Helv. 4. tab. 5. fig. 1. — Curtis, Flor. lond. l. c. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 190.

Agaricus colubrinus. Bull. Herb. tab. 78 & 583.

Agaricus variegatus. Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 114.

Amanita marmorea. Lam. Dict. 1. pag. 112.

3. *Agaricus* (squamosus), superius convexus, squamosus; lamis extra exipitem coalitis, lutescentibus; in medio annulatus, basi bulbosus. Villars, Plant. Dauph. vol. 3. pag. 1013. n° 10.

7. *Agaricus* (excorticatus), minor, subulicatus, squamis obsolete. Schæff. tab. 18. 19. — Sibth. Flor. oxon. pag. 341. (Foy. AMANITE marbrée, n° 49.)

Ce champignon, qui présente quelques variétés, soit dans sa couleur, soit dans la disposition des écaillés, est d'un bon goût; il se mange dans les campagnes, où il est connu sous le nom de grissette.

15. AGARIC en bouclier. *Agaricus clypeolarius*. Bull.

Agaricus (colubrinus), major, pileo campanulato, squamoso, pallidescens; squamis majusculis, sparsis, rufescentibus; lamellis albidis, liberis; stipite longiusculo, flaccido-villoso, molli; annulo fugaci. Perf. Synopt. 258. — Bull. Herb. tab. 405 & 506. fig. 2. — Lam. ill. tab. 882. fig. 2.

Son pédicule est épais, cylindrique, long d'environ trois pouces, blanc, fistuleux, grêle, mou, coronneux; son chapeau campanulé, de couleur blanchâtre, de forme ovale-allongée. Ses bords se redressent ensuite; souvent il devient concave sans cesser d'être protubérant à son centre, fragile, large de deux ou trois pouces, couvert d'écaillés roussâtres, plus nombreuses dans les jeunes individus. Les bords sont souvent étendus ou lobés; les lames blanches, libres, inégales; sa substance peu charnue. Le collet se détruit fréquemment.

Ce champignon varie dans son aspect; il croît dans les bois, en été & dans le courant de l'automne.

M. Persoon cite les variétés suivantes de ce champignon.

3. *Agaricus* (pantherinus), pileo subcarnoso, umbonato; squamis confertis, cinamomo-ferugineis, adpressis; lamellis liberis, latiusculis, lutescentibus; stipite medio-cri, subbulboso, squamuloso. Perf. l. c.

Son pédicule est moins élevé, couvert d'écaillés un peu jaunâtres & de fibrilles cotonneuses. Les lames sont libres, plus larges, jaunâtres, convexes, presque luisantes; le chapeau mou, plus épais; l'anneau du pédicule à peine sensible. Il croît dans les bois de pins.

7. *Agaricus (cristatus)*, parvus, pileo campanulato, albido; disco squamisque ferrugineis; lamellis liberis, candidis; stipite brevifusco, cavo, subresuscitate, globo; annulo fugaci. Pers. l. c. — Bott. Fung. tab. 7.

Agaricus (conspurcatus), stipitatus, pileo fordidè albo; disco fuscescente, squamoso; squamis concoloribus, lamellis albis, annulo stipiteque concolore. Willd. Flor. berol. n°. 1104.

Agaricus suboniquatus. Batfch. Elem. Fung. Cont. 2. pag. 59. tab. 37. fig. 205. a. d.

Celui-ci, qui paroît devoir former une espèce particulière, est beaucoup plus petit. Son pédicule est fistuleux, roussâtre ou de couleur argenteë, long de deux pouces, épais d'une ligne; son chapeau large d'un demi-pouce, blanchâtre, campanulé, couvert de petites écaillés roussâtres, ainsi que son centre; les lames blanches, ovales, détachées du pédicule. Son odeur est forte, & sa saveur souvent rébuteuse. Il croît sur la terre ou sur le tronc des hêtres.

8. *Agaricus (concentricus)*, pileo subcarneo, albico; umbone squamisque rufo-bodis; lamellis remotis stipiteque longissimo, pallescente-albis. Pers. l. c. — Abbild. tab. 5.

Cette variété est remarquable par son pédicule une fois plus long, dépourvu d'anneau; elle se rapporte aux précédentes par sa couleur & la forme de ses lames. Les écaillés sont fort petites, disposées en un ordre concentrique, excepté au centre. Son chapeau est blanchâtre, médiocrement charnu. Il croît aux lieux humides, dans les bois de hêtres.

16. AGARIC de chat. *Agaricus felinus*. Pers.

Agaricus subporvus, pileo planifusco, subumbonato; umbone squamisque nigrescente-umbrinis; lamellis albiatis, liberis; stipite fistuloso, subconcolore; annulo squamuloso, obliquo. Pers. Synopf. pag. 261.

Il se distingue de l'espèce précédente en ce qu'il n'a ni faveur ni odeur sensibles. De plus, son chapeau est presque plane, noirâtre; son pédicule fistuleux, muni d'un anneau plus constant. Ses lames sont libres & blanchâtres. On le trouve dans les forêts, où il est rare.

17. AGARIC d'un brun-clair. *Agaricus dilutus*. Pers.

Agaricus pileo planifusco, subumbonato; umbone obtuso, rufo; lamellis liberis, lotiusculis, fuscis; stipite fistuloso, annulato. Pers. Synopf. pag. 261.

Ce champignon a beaucoup de rapport avec le précédent. Son pédicule est fistuleux, long d'un pouce & demi, un peu épais, entouré d'un anneau rendre. Le chapeau est presque plane, à peine saillant à son centre, muni cependant d'une petite élévation orbiculaire, obtuse, couleur de rose. Ses lames ou feuillets sont libres, un peu élargis, ventrus, d'abord d'un brun-clair, ensuite de couleur grise; enfin, d'un brun-foncé. Cette espèce est rare. On la trouve dans les forêts de hêtres.

18. AGARIC à lames rouges. *Agaricus hamatospermus*. Bull.

Agaricus gregarius, tenuis, pileo umbonato, demum subdepresso, flavescente, orgillaco, globo; lamellis ventricosis, liberis, laterio-rufis; stipite tenui, pileo concolore; annulo parvo, erecto. Pers. Synopf. pag. 261. — Bull. Herb. tab. 395. fig. 1.

9. *Agaricus (nigrescens)*, nigrescente-fulgineus, pileo squamuloso. Bull. l. c. fig. c. h.

Cette espèce croît par touffes étalées. Son pédicule est grêle, cylindrique, jaunâtre, souvent muni d'un anneau redressé & peu régulier, ordinairement fort petit, plein ou fistuleux, long de deux ou trois poudes; il soutient un chapeau d'abord hémisphérique, puis conique, puis plane, avec le centre protubérant; il est gâbre, d'un jaune-terreux, plus foncé au centre. Les feuillets sont à peine adhérens au pédicule, inégaux, arqués, d'un rouge quelquefois très-vif. Il croît sur la terre. La variété 9 est d'un noir de suie. Son chapeau est médiocrement écailléux; il est plus petit dans toutes les proportions.

19. AGARIC moyen. *Agaricus mesomorphus*. Bull.

Agaricus subgregarius, parvus, pileo subumbonato, globo, stipiteque flavescente; lamellis lotiusculis, liberis, candidis; annulo erecto. Pers. Synopf. pag. 262. — Bull. Herb. tab. 306. fig. 1.

Cette plante est assez élégante. Son pédicule est albaire, cylindrique, grêle, fistuleux, épais d'une ligne, long de deux ou trois poudes, entouré d'un anneau fort petit, redressé, en forme de godet très-entier, peülant. Son chapeau est glabre, peu charnu, d'abord presque plane, un peu bombé, se relève par ses bords en vieillissant, & devient ensuite tout-à-fait plane; il est large d'une ligne, roussâtre en dessus, garni en dessous de feuillets blancs assez larges, détachés du pédicule. Il croît solitaire ou par petits groupes sur la terre.

20. AGARIC facé. *Agaricus ramentaceus*. Bull.

Agaricus foliarius, pileo planiusculo, obsolet umbonato, argillaceo; disco obscuro; margine flavescente, squamuloso; lamellis dilute fuliginis, subadnexis; stipite solido, albedo, flavo-maculato, glabro; annulo brevi. Pers. Synops. pag. 263. n°. 9. — Bull. Herb. tab. 595. fig. 3.

Son pédicule est cylindrique, blanchâtre, épais de trois à quatre lignes, haut de deux pouces & plus, point fistuleux, souvent parsemé de taches jaunes, transversales ou en réseau, muni d'un anneau court; il supporte un chapeau médiocrement charnu, large d'un pouce & demi, d'abord de forme sphérique, puis convexe, puis plane, d'un brun-jaunâtre sur les bords, brun au centre, tout couvert de petites écailles noiaâtres, garni en dessous de lames inégales, un peu courbées, d'un roux-pâle, aiguës à leurs deux extrémités, à peine adhérentes au pédicule. Ce champignon croît solitaire sur la terre.

21. AGARIC en toge. *Agaricus togularis*. Bull.

Agaricus flavescent, subargillaceus seu dilute ferrugineus; lamis subventricosus, demum liberis; stipite longiusculo, cavo; annulo reflexo. Pers. Synops. pag. 261. n°. 7. — Bull. Herb. tab. 595. fig. 2.

Son pédicule est fistuleux, cylindrique, long de deux ou trois pouces, épais de deux ou trois lignes, blanc à sa partie supérieure, jaunâtre vers sa base, entouré d'un anneau rabattu qu'il perd avec l'âge; il soutient un chapeau d'abord globuleux, puis convexe, puis presque plane, large de deux à trois pouces, lisse, un peu charnu, d'un jaune-roussâtre, garni en dessous de lames de même couleur, atquées, d'abord un peu adhérentes au pédicule, puis s'en détachant; arrondies à leur base, inégales entr'elles, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane blanche qui forme l'anneau. Il croît sur la terre, en France, solitaire ou par petits groupes de deux ou trois pieds, réunis ensemble par leur base.

22. AGARIC pudique. *Agaricus pudicus*. Bull.

Agaricus pileo albo aut fusco, carnosio, rotundato, globuloso, dein convexo, plano; laminis arcuatis, liberis, cancelloribus; stipite semper flavo, maculato, late annulato; annulo supra striato. Bull. Herb. tab. 597. fig. 2.

a. *Idem*, albus. Bull. l. c. fig. Q. R. S.

b. *Idem*, flavidus. Bull. l. c. L. M. N. O. P.

Ce champignon varie dans sa couleur; il est tantôt blanc, tantôt d'un jaune-fauve. Dans l'un & l'autre le pédicule est plein, cylindrique, tacheté de jaune; long de trois à quatre pouces, épais de cinq à six lignes, entouré d'un anneau entier, étale ou rabattu, souvent situé en dessus; il supporte un chapeau d'abord presque globu-

leux, puis convexe, puis plane ou concave, de quatre à cinq pouces de diamètre, garni en dessous de feuillets inégaux, atqués, non adhérents au pédicule. Cet agaric croît solitaire sur la terre.

23. AGARIC carcharias. *Agaricus carcharias*. Pers.

Agaricus pileo carnosio, convexo, umbonato, granuloso, stipiteque squamuloso incarnatis; lamellis adnexis, candidis. Pers. Synops. pag. 263. n°. 10.

Son pédicule est très-court, épais de deux ou trois lignes, légèrement bulbeux à sa base; il soutient un chapeau charnu, large de deux pouces, hémisphérique ou en forme de mamelon, couvert d'écailles qui le rendent grenu, de couleur de chair, ainsi que le pédicule. Sa face inférieure est garnie de lames lancéolées, séparées, de couleur blanche. Son odeur est nauséabonde; son goût amer. Ce champignon, d'un bel aspect, croît parmi les pins.

24. AGARIC jaune d'ocre. *Agaricus ochraceus*. Bull.

Agaricus mediocris, subgregarius, pileo subcaroso, umbone ferrugineo; lamellis confertis, plerumque pallidis; stipite squamuloso, annulato. Pers. Synops. pag. 264. Sub *agarico granuloso*.

p. *Idem*, lamellis pallidis aut dilute ferrugineis. Pers.

r. *Idem*, pileo expallescente. Pers.

s. *Idem*, totus ferme albidus. Pers.

Agaricus granulatus. Batfch. Elem. Fung. pag. 79 & pag. 170. tab. 6. fig. 24. *Necnon agaricus flavo-flaccidus*. Ejusd. pag. 117. tab. 19. fig. 97. *Huc quoque pertinet*.

Agaricus muricatus. Wedd. Flor. dan. tab. 1015. fig. 2. ?

Agaricus ochraceus. Bull. Herb. tab. 533. fig. 3.

Agaricus croceus. Bott. Fung. pag. 51. tab. 51. fig. 2. — Sowerb. Fung. tab. 19.

Ce champignon, qui présente plusieurs variétés, surtout dans ses couleurs, est ordinairement d'une couleur d'ocre jaune ou de rouille, quelquefois tout-à-fait blanc ou d'un jaune très-pâle. Son pédicule est fistuleux, cylindrique, long de deux pouces, sur deux lignes de large, chargé de quelques écailles au dessous de l'anneau, qui est déchiré & peu apparent. Son chapeau est médiocrement charnu, d'abord très-convexe, ensuite un peu plus en forme de cloche, large d'un pouce; le sommet toujours proéminent & de couleur foncée; les bords assez souvent plissés, ridés par les débris de la coiffe, qui le rendent aussi

suffi un peu écailléux. Les lames sont nombreuses, plus pâles que le reste de la plante. Elle croît solitaire ou en groupes peu nombreux, parmi les bruyères ou dans les bois de pins.

25. AGARIC à gouttes. *Agaricus guttatus*. Pers.

Agaricus magnus, pileo carneo, obtusè umbonato, pallide luteo; lamellis pallente-albidis; stipite longissimo, subulobato, concolore; apice annulato gurgato. Pers. Synops. pag. 265. n°. 12. — Abbild. tab. 2.

Cette espèce est singulièrement remarquable par des gouttes d'un vert-forcé attachées au sommet du pédicule & sur le collet réfléchi. Ces gouttes se dessèchent, & forment ensuite autant de taches livides. Ce champignon est grand; son chapeau charnu, couleur de brique pâle, à sommet saillant, obtus, soutenu par un pédicule très-long, presque bulbeux, de la même couleur; les lames sont d'un blanc-sale, détachées du pédicule. Cet agaric est d'une odeur désagréable; il croît sur les montagnes, dans les bois de pins.

26. AGARIC de mégisthet. *Agaricus alutarius*. Pers.

Agaricus magnus, pileo carneo, obtusè umbonato, alutaceo, glabro; lamellis confertis, liberis, albidoinermatis; stipite glabro, annulo laxo. Pers. Synops. pag. 265.

Son pédicule est glabre, un peu fistuleux, long de trois à quatre pouces, épais de trois lignes, enroulé d'un anneau lâche, & soutenant un chapeau charnu, campanulé, de deux ou trois pouces de diamètre, chargé vers ses bords de quelques petites peluchures. Sa couleur est d'un jaune-clair; son sommet saillant, obtus; les lames libres, nombreuses, d'un blanc-incarnat, larges de deux ou trois lignes. Ce champignon n'a été observé qu'une seule fois dans les jardins, par M. Persoon.

27. AGARIC à racine de navet. *Agaricus radicatus*. Bull.

Agaricus submagnus, compactus, durus, pileo plano-convexo, obtusè umbonato, pallente, maculis sordide rufis variegato; lamellis confertis, rufescentibus; stipite firmo, deorsum incrassato, radicato, squamoso; squamis erectis. Bull. Herb. tab. 260.

Agaricus radicatus. Pers. Synops. 266. n°. 13.

Ce champignon est d'une consistance dure, compacte; dans sa jeunesse, il ressemble à un œuf; ensuite il s'élève par un pédicule charnu, long de trois à quatre pouces, plus gros à sa base qu'à son sommet, chargé de lambeaux écaillés au dessous du sommet. Il pousse une tige très-grosse, verticale, qui émet de longues fibres

Botanique. Supplément. Tome I.

radicales, & qui porte quelquefois de nouvelles plantes de la même espèce. Le chapeau est épais, charnu, presque hémisphérique, d'un blanc-jaunâtre, large de cinq à six poices, garni en dessous de lames nombreuses, trancées, inégales, qui ne se continuent pas sur le pédicule. Une membrane réunit les bords du chapeau avec le pédicule, & en se déchirant laisse des lambeaux sur le premier, & forme sur le second un collet déchiré. Ce champignon est d'une saveur très-désagréable; il croît dans les bois.

28. AGARIC changeant. *Agaricus sphaeromorphus*. Bull.

Agaricus solitarius, pileo hemisphaerico, convexo, albido; lamellis confertis, lutescentibus, decurrentibus; stipite subulobato, solido, glabro. Bull. Herb. tab. 540. fig. 2. — Pers. Synops. 266.

Agaricus sphaeromorphus. Decand. Synops. n°. 415.

Son pédicule est plein, glabre, presque tubéreux, long d'environ trois pouces, épais de trois lignes, soutenant un chapeau blanchâtre, convexe, hémisphérique, d'environ trois pouces de diamètre, garni en dessous de lames jaunâtres, nombreuses, décurrentes. Il croît solitaire sur la terre.

29. AGARIC moisi. *Agaricus mucidus*. Pers.

Agaricus castiposus, candidus, pileo hemisphaerico, tenui, glutinoso; lamellis distantibus; stipite duro ascendente, annulato; apice sulcato. Pers. Synops. 264.

3. *Idem, pileo albido, cinereo seu casto.* Persoon, l. c.

Agaricus (splendens). stipitibus aggregatis, basi incrassatis, supra annulum striatis; pileo convexo, candidissimo, viscido, nitente. Vahl, in Flor. dan. tab. 1150.

Agaricus (nitidus), lamellis niveis, distantibus, candidissimis, viscidis; stipite annulato. Æler. Flor. dan. tab. 773.

Agaricus valens. Scopoli. Carn. edit. 2. pag. 430.

Agaricus mucidus. Schrad. Spicil. Flor. german. pag. 116.

Son pédicule est dur, presque tubéreux à sa base, ascendant, cannelé, principalement au dessus du collet épais qui l'environne; il soutient un chapeau presque transparent, presque membraneux, grêle, hémisphérique, glutineux, de couleur blanche, ainsi que toute la plante; garni en dessous de lames élargies, distantes, farineuses, conniventes à leur base par des lignes décurrentes. Il varie dans sa couleur, qui est quelquefois d'un blanc-cendré ou un peu bleuâtre. Ce champignon

croître en groupes, toujours sur le tronc des hêtres, tant sur les individus vivants, que morts & desséchés.

30. AGARIC noirci. *Agaricus denigratus*. Pers.

Agaricus capitosus, subparvus, pileo campanulato, nigrescente-umbrino; maculis latiusculis, obscurioribus; lamellis albidis-fulgineis; stipite elastico; subincurvo; annulo albicante, subfugaci. Pers. Synops. pag. 267. n°. 16.

Cet agaric croît par groupes sur le tronc des arbres, où il est rare. Son pédicule est un peu courbé, élastique, long d'environ trois pouces, épais d'une à deux lignes, environné d'un anneau blanchâtre & fugace; il soutient un chapeau roide, charnu, campanulé, d'un noir un peu clair, large d'environ neuf lignes, couvert par les frémens assez larges du collar, d'une couleur plus foncée; les lames d'un blanc sale de noir.

31. AGARIC raboteux. *Agaricus squarrosus*. Pers.

Agaricus capitosus, pileo carnoso, stipite squarrosus-squamis, ochraceo-ferrugineis; lamellis confertis, olivaceo-pallidis. Schæff. Ic. Fung. Ill. pag. 25. — Pers. Synops. pag. 268.

Agaricus foscifolius. Curt. Flor. Lond. tab. 164. — Schæff. Fung. tab. 61.

Agaricus (squarrosus), stipitatus, pileo umbonato-lutescente, squamoso; squamis fuscis, squarrosus; stipite infra annulum squarroso, lamellis pallidis. Willd. Flor. berol. 380. — Æder. Flor. dan. tab. 491. — Hallet, Helv. n°. 2399.

β. *Agaricus* (aurivellus), ferrugineo-luteus, pileo campanulato, squamoso; stipite fibrilloso, incurvo. Pers. l. c.

Agaricus (aurivellus), fuscus, pileo luteo-ferrugineo; lam. mollissimâ in flammulas densè imbricatas digesta obducto; stipite pallido fulureo; annulo membranaceo, ferrugineo; lamellis pallidis, ferrugineo fuscis. Batfch. Elem. Fung. Cont. 1. p. 153. fig. 115.

Agaricus filamentosus. Schæff. Fung. tab. 209.?

Amanita filamentosa.? Lam. vol. 1. n°. 48.

Son pédicule est, selon son lieu natal, tantôt très-droit, tantôt courbé & ascendant, entouré d'un anneau fort petit, raboteux; il supporte un chapeau convexe, ordinairement large de trois pouces, jaunâtre, surmonté d'un mamelon peu sensible, d'une consistance ferme, parsemé d'écaillés brunes, raboteuses, garni en dessous de lames fines, d'abord d'une couleur pâle, puis plus foncée. Dans la variété β, les pédicules sont nus, les couleurs plus foncées, le chapeau couvert de petits boccus un peu déchirés. Cet agaric croît en

automne sur le tronc des arbres, particulièrement sur les chênes.

32. AGARIC doré. *Agaricus aureus*. Bull.

Agaricus fulvo-aureus, lamellis candidis; pileo globuloso, dein convexo, lituris parvis, nigris variegata; stipite pleno, basi subattenuato, incurvo, annulato. Bull. Herb. 1. 92. — Decand. Flor. franç. 1. pag. 204. n°. 549.

Agaricus (aureus), subcapitosus, magnus, unicolor-fulvus, pileo carnoso, planiusculo, obtusè squamoso pilosa; lamellis confertis, tenebris, submarginatis; stipite fibrillo, glabro, crassiusculo; annulo subparvo. Pers. Synops. 269.?

Agaricus aureus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 77.

Cet agaric est d'un fauve-doré, à l'exception des feuillets, qui sont blancs. Son pédicule est plein, glabre, cylindrique, un peu aminci & courbé à la partie inférieure, long d'environ trois pouces, épais de cinq à six lignes, garni d'un collier entier & peu apparent. Le chapeau est charnu, d'abord globuleux, ensuite convexe, garni de petites peluchures peu nombreuses, larges de deux pouces. Les feuillets sont blancs, inégaux, très-étroits, couverts, dans leur jeunesse, d'une membrane qui reste adhérente au pédicule. Ce champignon croît dans l'été, dans les bois humides & ombragés. (Decand.)

33. AGARIC annulaire. *Agaricus annularius*. Bull.

Agaricus (polymyces), capitosus, congestus, pileo umbonato-piloso squamoso, ochraceo-fulgineo; lamellis subdecurrentibus, albidis, pallidifluentibus; stipite annulato, conico, olivaceo-cinereo. Persoon, Synops. pag. 270. — Bull. Champ. tab. 540. fig. 3, & tab. 377.

Agaricus (melleus), pileo convexo, lutescente, fusco irrorato; lamellis pallidis; stipitibus annulatis, aggregatis, faridis. Æder. Flor. dan. tab. 1013. — Bolt. Fung. tab. 141. Optima.

Agaricus (congregatus), stipitatus, pileo convexo, squamoso, subfusco; lamellis albidis; petiolo tereti, fusciflorescente, basi crassiusculo; vels. & annulo albidis. Bolt. Fung. tab. 140.

Agaricus fusco-pallidus. Bolt. l. c. tab. 136. Variet.

Agaricus stipitis. Sowerb. Engl. Fung. tab. 101.

Agaricus cumulatus. With. Bot. Atrang. edit. 3. vol. 4. pag. 164.

β. *Agaricus murabilis*. Schæff. Fung. tab. 9. — Batfch. Elem. Fung. tab. 38. fig. 208.

Agaricus annularius. Bull. Herb. tab. 543.

Ce champignon est d'une couleur fauve ou rousse; son pédicule charnu, cylindrique, souvent un peu courbé à sa base, long de quatre à cinq pouces, muni d'un anneau entier, rétrécifié, en forme de godet, glabre ou garni de petites écailles dans la variété *β*. Le chapeau est convexe, un peu proéminent vers le centre, tacheté de petites écailles noires dans la variété *α*, & glabre dans la variété *β*. Les bords sont entiers ou un peu finneux, non étalés; les lames jaunâtres ou blanches, inégales, descendant légèrement sur le haut du pédicule. Cette plante se trouve en automne dans les forêts, sur les vieux troncs ou tout auprès d'eux; elle croît quelquefois en groupes très-nombreux. (Desand.)

34. AGARIC couleur de rhubarbe. *Agaricus rhubarbarinus*. Pers.

Agaricus gregarius, pileo carneo, hemispharico, subumbonato, concentricè piloso-squamoso; lamellis sufferrugineis; stipite longo, squamoso, flavido, annulo fugaci. Pers. Synopf. pag. 271.

Ce champignon a une couleur d'un jaune de rhubarbe; il est sans odeur & sans saveur. Son pédicule est long de deux ou trois pouces, jaunâtre, velu à sa base, écailleux; son chapeau, d'abord hémisphérique, puis presque plane, large d'un à deux pouces, charnu, un peu élevé à son centre, couvert de poils & d'écailles concentriques, garni en dessous de lames d'un jaune de rouille, un peu relevées. L'anneau du pédicule est très-fugace. Ce champignon croît dans la forêt d'Hercynie, sur le tronc pourri des sapins.

35. AGARIC ridé. *Agaricus caperatus*. Pers.

Agaricus subsolitarius, pileo carneo, convexo, rugoso, palléscente citrino; lamellis confertis, subargilaceis; stipite solido, supra annulum obliquum squamuloso. Pers. Obs. Mycol. 1. p. 48, & Synopf. pag. 273.

Son pédicule est cylindrique, un peu tubéreux à sa base, plein, légèrement écailleux au dessus de l'anneau oblique qui l'entoure; il soutient un chapeau large de quatre pouces, campanulé, glabre, charnu, lacuneux & ridé à ses bords, d'une couleur de citron-pâle, garni en dessous de lames nombreuses, un peu grilâtres. Il croît presque folitaire dans les bois de hêtres.

36. AGARIC paillet. *Agaricus helvolus*. Bull.

Agaricus gregarius, mediocris, pileo subcarneo, umbonato, subcinnamomeo; lamellis distantibus, concoloribus; stipite longiusculo, cylindrico, deorsum annulo obsolete cinis. Bull. Herb. tab. 451. — Pers. Synopf. pag. 273.

Agaricus hirsutus. Swerb. Engl. Fung. tab. 173.

Ce champignon est d'une couleur fauve-claire; son pédicule glabre, cylindrique, long de quatre à cinq pouces, un peu courbé à sa base. Son chapeau est d'abord conique. Ses bords s'élargissent ensuite, & suffisent même quelquefois par se relever; mais son centre est toujours un peu proéminent. Ce chapeau est un peu charnu, & continue avec le pédoncule; il est garni en dessous de lames nombreuses, inégales, de la même couleur que le chapeau; & il s'en recouvre, dans leur jeunesse, d'une légère membrane qui se déchire, & forme un collier peu prononcé. Ce champignon croît en groupes dans les bois, les routes, les herbages, &c. (Desand.)

37. AGARIC ponctué. *Agaricus punctatus*. Pers.

Agaricus pileo convexo, levi, caesente-umbrino; lamellis distantibus, umbrinis; stipite fibrilloso, annulo obsolete distant. Pers. Synopf. pag. 274.

Agaricus helvolus, var. *α*. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 49.

Ce champignon a de très-grands rapports avec le précédent; il en diffère par sa couleur plus foncée de terre d'ombre & par son chapeau, dont le centre n'est point proéminent. Ses lames sont moins nombreuses, son pédicule filamenteux. Il croît dans les mêmes lieux que le précédent, mais il est plus rare.

38. AGARIC bronzé. *Agaricus brunneus*. Pers.

Agaricus pileo carneo, plano, obtusè umbonato, ex cinnamomeo umbrino; lamellis distantibus, concoloribus; stipite longiusculo, fibrilloso, dilatato; striis albidioribus, annulo obsolete obliquo. Persoon, Synopf. Fung. pag. 274. n°. 26.

Son pédicule est un peu courbé, fibreux, marqué de stries blanchâtres, long d'environ trois pouces, épais de trois à quatre lignes; il supporte un chapeau charnu, de couleur fauve un peu foncée, presque bronzé, large d'un pouce & demi à deux pouces, roide, plane, proéminent à son sommet, comprimé autour; les lames distantes entr'elles, de la même couleur; l'anneau peu marqué.

Cette plante croît dans la forêt d'Hercynie, parmi les pins.

39. AGARIC à pédicule courtbé. *Agaricus flexipes*. Pers.

Agaricus pileo subcarneo, acutè umbonato, hemispharico, subfibrilloso, cinnamomeo; lamellis subdistantibus, concoloribus; stipite longo, fibrilloso, undulato; velo albedo, subannulato. Pers. Synopf. pag. 275.

Sa couleur est d'un jaune-cannelle; son pédicule flexueux & même ondulé à sa superficie, luisant,

long de deux ou trois pouces, large d'environ deux lignes; il supporte un chapeau large, transparent, point strié, médiocrement charnu, proéminent & un peu aigu à son sommet, hémisphérique, légèrement fibreux, garni en dessous de lames planes, échancrées, conniventes, larges d'une à deux lignes, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane blanchâtre qui se déchire, & forme un anneau peu sensible. Il croît dans les mêmes lieux que le précédent.

40. AGARIC à gros pédicule. *Agaricus macropus*. Pers.

Agaricus magnus, pileo carnoso, convexo; margine inflexo, crustalino; squamulis pilosis, canescentibus, spissis obso; lamellis aquosis cinnamomeis; stipite magno, longo, albidis; annulo obliquo, suboblitterato. Pers. Synopf. pag. 275.

Son pédicule est ferme, très-gros, fibreux, blanchâtre, long de quatre à cinq pouces, épais d'un pouce, écaillé vers son sommet, muni d'un anneau blanc, oblitéré, à peine large d'une ligne. Son chapeau est charnu, convexe, réfléchi à ses bords, large de trois pouces, ridé dans son milieu, parsemé de petites écailles blanchâtres & comme pileuses; garni en dessous de lames d'un jaune-cannelé, un peu ventrues, presque crénelées, presque toujours rongées par les limaçons. Il croît parmi les pins, dans la forêt d'Hercynie.

41. AGARIC élargi. *Agaricus latus*.

Agaricus reparius, subcassitosus, pileo carnoso, convexo, plano, lato, crustalino; lamellis emarginato-adenis, argillaceo-cinnamomeis; stipite solido, fibrilloso, palléscente-albo, cortinato. Pers. Synopf. pag. 276.

Sa couleur est d'un jaune-fale; son pédicule plein, d'un blanc-fale, long de deux à trois pouces, épais d'un pouce, soutenant un chapeau charnu, convexe, puis plane, large de quatre à sept pouces, d'une couleur plus foncée à son disque, garni en dessous de lames nombreuses, conniventes, un peu échancrées, larges de trois lignes. Il croît au milieu des marais, dans la forêt d'Hercynie.

42. AGARIC à tiges d'oignon. *Agaricus caespites*. Pers.

Agaricus caespitosus, pileo campanulato, striato; lamellis liberis; stipite ventricoso, basi solido. Pers. Synopf. pag. 416. n°. 293. — Sowerb. Fung. tab. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 202. n°. 546.

a. *Agaricus (cretaceus), totus albus.* Bull. Herb. tab. 374.

b. *Agaricus (luteus), totus luteus.* With. Brit. Auz. 3. pag. 344.

Cette espèce est remarquable par son pédicule, renflé dans le bas comme une tige d'oignon; il est blanchâtre, un peu roux à sa base, glabre ou le plus souvent velu en dessous du collier, plein, fibreux intérieurement, long de cinq à six pouces, épais d'un demi-pouce à sa base; il supporte un chapeau d'abord globuleux, puis campanulé, puis convexe, & enfin presque plane, blanchâtre, couvert d'un tissu pelucheux, quelquefois blanc. Il croît en été, sur les couches & dans les terres chaudes.

43. AGARIC lustré. *Agaricus nitens*. Bull.

Agaricus solitarius, pileo helveto, nitente, campanulato, dein convexo; laminis nigro-albo maculatis; stipite albo, pleno, tenui, basi subincrassato, annulato; annulo persistente. Bull. Herb. tab. 84. & tab. 566. fig. 4. — Non Pers. & Basch., non Sowerb. (Voyez AMANITE lustré, n°. 54.)

44. AGARIC coronille. *Agaricus coronilla*. Bull.

Agaricus pileo selvo, rufescente, maxime convexo, umbonato; laminis liberis, rotundatis, rubris; stipite albo, vix fistuloso; annulo rotundato, integro, fugaci. Bull. Herb. tab. 597. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 202. n°. 544.

Son pédicule est blanc, glabre, cylindrique, à peine fistuleux, muni d'un collier arrondi, entier & fugace, long d'environ deux pouces. Son chapeau est très-convexe; il devient quelquefois plane, avec le centre proéminent, d'un fauve-roussâtre, charnu, arrondi. Son diamètre varie d'un à deux pouces. Les feuillets sont rougeâtres, libres, inégaux, arrondis. Il croît solitaire. (Decand.)

45. AGARIC pitule. *Agaricus pituliformis*.

Agaricus caespitosus, parvus, rufescens, pileo fere sphaerico, rufescente; margine integro, albo; laminis albis, liberis; stipite albo, fistuloso. Bull. Herb. tab. 112. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 201. n°. 543.

Son pédicule est blanc, fistuleux, glabre, cylindrique, long d'environ un pouce & demi. Le chapeau est presque sphérique, roussâtre, large de quatre à cinq lignes. Sa superficie est sèche, ses bords blancs & entiers, sa chair ferme; les feuillets blancs, libres, inégaux, recouverts, pendant toute leur vie, par une membrane qui s'étend du pédicule aux bords du chapeau, & qui ne se rompt point, comme dans les autres espèces. Il croît en automne, par groupes, sur la mousse, au pied des arbres. (Bull. Decand.)

5. III. CORTINARIA. Pers. Point de coiffe; pédicule central; lames qui ne noircissent point en vieillissant; recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane incomplète, qui laisse sur le pédicule un anneau filamenteux.

46. AGARIC bleu. *Agaricus cyanus*. Pers.

Agaricus totus violaceus, nitidus, pileo carnosio, glabro; stipite subbalbo, pallidescens. Pers. Synopf. pag. 276. n°. 50. — Schæff. Fung. tab. 34. fig. 5.

8. *Agaricus (caeruleus), pileo carnosio, convexo, pallide carneo; lamellis ex caruleo-cinnamomeis; stipite brevifusco, caruleo, bulboso; bulbo marginato, pallido.* Schæff. Fung. tab. 34.

Ce champignon est très-élégant par sa couleur d'un bleu-violet. Son pédoncule est long de deux ou trois pouces, épais d'un pouce, bulbeux; le bulbe un peu comprimé, entouré d'un rebord pâle; le reste de la partie supérieure du pédoncule couvert d'une membrane bleuâtre; la partie inférieure fibreuse; le chapeau très-charnu, large de trois pouces & plus, convexe, quelquefois d'un bleu-pâle; les lames d'un bleu plus foncé, qui s'altère avec l'âge. Il croît dans les forêts.

47. **AGARIC violet.** *Agaricus violaceus.* Linn.

Agaricus stipitatus, pileo rimoso; margine violaceo, tomentoso; stipite carulescente, lano ferrugineo. Linn. Syst. Plant. edit. 4. pag. 602. — Mich. Gen. Plant. pag. 149. tab. 74. fig. 1. — Bolt. Fung. tab. 52.

Ce champignon, qui paroît se confondre avec le suivant, a son pédoncule bleuâtre, couvert d'un duvet ferrugineux; il supporte un chapeau crevassé. Les bords sont violés, tomenteux; son pédoncule bulbeux; son chapeau enveloppé d'une membrane mince, bleuâtre, qui se déchire, & reste en un anneau peu marqué sur le pédoncule. Il croît sur les bords des forêts.

48. **AGARIC nu.** *Agaricus nudus.* Bull.

Agaricus gregarius, pileo carnosio, convexo, plano; margine repando, à violaceo subrufescente; lamellis confertis, dilute violaceis; stipite sublongo, tenuifusco, cylindrico, nudo, conicolore. Bull. Herb. 439. fig. A. — Pers. Synopf. pag. 277.

Selon M. Persoon, ce champignon est très-voisin du précédent, & peut-être le même; mais il en diffère par son pédoncule à peine bulbeux, par l'absence d'une enveloppe membraneuse. Son chapeau est charnu, plane, convexe, jaune & violet à ses bords, puis roussâtre, large de deux lignes; ses lames d'un violet-clair, nombreuses; son pédoncule nu, grêle & cylindrique, de couleur violette. Il croît en groupes dans les bois de pins.

49. **AGARIC d'Herzynie.** *Agaricus hercynicus.* Pers.

Agaricus pileo umbonato, piloso, squamoso, violaceo; lamellis subdistantibus, pulverulentis; stipite longo, folido, carulescente. Pers. Synopf. pag. 178.

C'est une belle espèce, d'un bleu-foncé. Son pédoncule est plein, légèrement bulbeux, velu, long

de trois à quatre pouces, épais de six lignes; il supporte un chapeau pileux, écailleux, proéminent à son centre, large d'un pouce & demi, enveloppé d'une membrane fugace, de couleur ferrugineuse; les lames pulvéreuses. Il croît parmi les pins, dans la forêt d'Herzynie.

50. **AGARIC d'un violet-cendré.** *Agaricus violaceo-cinereus.* Pers.

Agaricus pileo carnosio, hemisphaerico, purpureo, squamuloso, ruguloso, violaceo-cinereo; lamellis distinctis, purpureo-cinereis; stipite bulboso, conicolore. Pers. Synopf. pag. 279. n°. 34.

Agaricus violaceus. Schæff. Fung. tab. 3. — Schrank, Flor. bav. 2. pag. 608.

Son pédoncule est bulbeux; son chapeau charnu, hémisphérique, d'abord violet & tomenteux; il prend, en vieillissant, une couleur sombre & brune; il est ponctué, un peu ridé & légèrement écailleux. Les lames sont séparées & decurrentes sur le pétiole. Il croît dans les bois de chênes; il n'est pas commun.

51. **AGARIC brun-clair.** *Agaricus badius.*

Agaricus pileo carnosio, convexo, umbrino, nitido; lamellis obscurè cinnamomeis, pulverulentis, confertis; stipite tenui, fibrilloso, subbulboso, carulescente. Pers. Synopf. 279.

Agaricus subpurpureus. Batfh. Elem. Fung. tab. 16. fig. 34. ?

Son pédoncule est grêle, fibreux, un peu bulbeux, épais de trois ou quatre lignes. Le bulbe est ovale; le chapeau charnu, convexe, luisant, bleuâtre, d'une consistance épaisse, large de deux ou trois pouces, garni en dessous de lames fertées, d'un brun-jaunâtre, se couvrant, dans leur vieillesse, d'une poussière épaisse. Il croît sur les collines, parmi les gazons.

52. **AGARIC terre d'ombre.** *Agaricus umbrinus.* Pers.

Agaricus pileo carnosio, opaco, lamellisque distantibus, umbrinis; stipite brevifusco, crasso, ex albicante-subcarulescente. Pers. Synopf. pag. 280.

Ce champignon a son chapeau un peu plane, charnu, épais, large d'environ trois pouces, d'un brun-foncé, ainsi que les lames; il est soutenu par un pédoncule long d'un pouce & demi, épais de neuf lignes, blanchâtre en dehors, un peu bleuâtre en dedans ou rougeâtre. On le rencontre dans les forêts.

53. **AGARIC à couleurs variables.** *Agaricus varicolor.* Pers.

Agaricus pileo carnosio, convexo, rufo-spadiceo;

marginè subtomentoso, violaceo; lamellis confertis, ex albidis dilutè fuliginatis; stipite brevi, subbulbosò, albidò, carulescente. Pers. Synopf. pag. 280.

Cet agaric n'est pas com mun : on le trouve dans les bois. Son pédicule est presque bulbeux, long de deux pouces & plus, large d'un pouce, d'un bleu-pâle ; il soutient un chapeau convexe, charnu, d'un jaune-clair ou un peu foncé, épais à son disque, luisant, presque tomenteux & violet à ses bords, large de trois à quatre pouces, garni de lames nombreuses, d'un blanc sale de noir, luisantes, un peu jaunâtres à leurs côtés.

54. AGARIC bicolor. *Agaricus bicolor.* Pers.

Agaricus pileo carnoso, convexo, rufescente-fusco; margine involuto, subtomentoso; lamellis dilutè violaceis; stipite crasso, subulbososo, tomentoso, concolore. Pers. Synopf. pag. 281.

Agaricus violaceus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 109.?

Il s'élève sur un pédicule épais, long de deux pouces, tomenteux, presque tubéreux, soutenant un chapeau convexe, charnu, large de deux pouces, d'une consistance compacte, d'un blanc-violet en dedans, blanchâtre à ses bords, un peu roussâtre en dehors, garni de lames d'un violet-clair, larges de deux ou trois lignes, se détachant facilement. Il croît dans les forêts.

55. AGARIC muqueux. *Agaricus mucosus.* Bull.

Agaricus pileo carnoso, umbonato, viscoso, crustalino; lamellis primò purpurascensibus, dein ferrugineis; stipite transversim in squamas cartilagineo-gelatinosus rupto; primò annulo subobsoleto. Bull. Herb. tab. 549, & tab. 596. fig. 2.

Agaricus collinitus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 9. — Pers. Synopf. pag. 281. n°. 39.

On distingue assez facilement cet agaric à son pédicule hérissé d'écaillés cartilagineuses, irrégulières, un peu gélatineuses, provenant des débris d'une coiffe incomplète : il est un peu bulbeux à sa base, plein, cylindrique, de couleur jaune ; il soutient un chapeau d'abord globuleux, puis convexe, ensuite presque plane, glabre, orbiculaire, d'un jaune plus ou moins clair, large de trois à quatre pouces, garni en dessous de lames d'abord purpurines, puis brunes, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane blanche, filamenteuse. Il croît sur la terre, dans les forêts.

56. AGARIC hybride. *Agaricus hybridus.* Bull.

Agaricus pileo obconico, flavo-rufescente, sphaerico, convexo, plano; margine revolutò; lamellis subdecurrentibus, flavis, membranà caducà, albà, hinc inde obtectis; stipite carnoso, solido; pileo cor-

colore. Bull. Herb. tab. 398. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 200.

Ce champignon s'élève sur un pédicule plein, charnu, fibreux, en cône renversé, de couleur fauve-rougeâtre, long de trois à six pouces, soutenant un chapeau de même couleur, d'abord sphérique, ensuite convexe, puis plane, un peu roulé en dessous à ses bords. Sa chair est ferme, épaisse, jaunâtre ; ses lames minces, nombreuses, inégales, un peu jaunes, decurrentes sur le pédicule ; recouvertes, dans leur jeunesse, par une membrane blanche, qui se déchire, laisse des lambeaux sur le bord du chapeau, & quelquefois des écaillés sur le pédicule. Il croît, ou solitaire, ou en groupes peu nombreux, sur la terre, dans les bois.

57. AGARIC hydrophile. *Agaricus hydrophilus.* Bull.

Agaricus caespitosus, pileo rufescente-ferrugineo, margine striato vel sinuato; laminis numerosissimis, cinnameis, liberis; stipite albo-fistuloso. Bulliard. Herb. tab. 311. — Dec. Flor. franç. 2. pag. 201.

Son pédicule est fistuleux, blanc, cylindrique, long de deux ou trois pouces & plus, soutenant un chapeau d'un fauve-grisâtre ou rougeâtre, d'abord globuleux, ensuite en cloche, puis convexe, & enfin plane. Ses bords sont souvent striés, quelquefois lineux ; les feuilles nombreuses, de couleur canelle, inégales, non adhérens au pédicule, recouverts, dans leur jeunesse, par un réseau blanchâtre qui se déchire, & laisse de légères traces sur le pédicule, & quelques lambeaux fugaces sur le bord du chapeau. On le trouve abondamment dans les bois, après les pluies de longue durée. (Bull. Decand.)

58. AGARIC écaillieux. *Agaricus squamosus.* Bull.

Agaricus fusco-nigricans, totus squamulosus, pileo margine subciliato; laminis ferè rectis, non decurrentibus; stipite centro molli; apice albò, squamis destituto. Bull. Herb. tab. 266. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 201.

Cet agaric est tout entier d'un fauve-foncé, à l'exception du pédicule, qui est plein, cylindrique, mou dans le centre, revêtu d'écaillés peluchées dans toute la partie qui étoit à nu dans son premier âge, glabre dans la partie recouverte par le chapeau dans sa jeunesse. Ses écaillés forment une espèce d'anneau vers le haut du pédicule. Le chapeau est d'abord hémisphérique, puis convexe ou souvent un peu protubérant à son centre, tout hérissé d'écaillés peluchées, un peu cilié sur ses bords, large de quatre à cinq pouces ; les feuilles inégales, nombreuses, presque droites, non decurrentes. Ce champignon croît en automne, dans les bois, sur les vieilles fouches. (Bull. Decand.)

59. AGARIC laineux. *Agaricus lanuginosus*. Bull.

Agaricus pileo brunneo, tomento lanato, concoloro, sensim rarefcente tecto; lamellis liberis, badiis; stipite pleno, nigro, subfibrato. Bull. Herb. tab. 370. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 199.

Cette espèce est munie d'un pédicule plein, long de deux pouces, cylindrique, légèrement rayé de brun, soutenant un chapeau de même couleur, recouvert d'un tiffu drapé & laineux, fort touffu dans la jeunesse de la plante, qui s'éclaircit sur les bords à mesure qu'elle avance en âge. Lorsqu'elle approche de son dépérissement, le chapeau n'est plus laineux qu'à son sommet, & le reste est comme satiné. Ce chapeau est d'abord sphérique, puis campanulé, puis conique, & enfin ses bords se relèvent & se fendent. Les lames sont fauves, libres, inégales, élargies. Les bords du chapeau, dans leur jeunesse, sont lutés au pédicule au moyen d'un tiffu aranéeux, dont une partie reste attachée au chapeau, & l'autre au pédicule. Il croît au printemps & en automne, dans les bois, solitaire ou géminé; il se plaît sur les vieilles fouches & sur la terre. (Bull. Decand.)

60. AGARIC à tête luisante. *Agaricus lamprocephalus*. Bull.

Agaricus cespitosus, ferrugineus, pileo carnosio, obtusè umbonato, nitente; lamellis latiusculis, decurrentibus, obscurioribus; stipite subincurvo, solido. Bull. Herb. tab. 544. fig. 2. — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 199.

Agaricus lucidus. Pers. Synopf. Fung. pag. 199.

Il est tout entier couleur de rouille. Son pédicule est glabre, plein, cylindrique, fouvet un peu courbé à sa base, décurrent sur le chapeau, long de trois pouces, soutenant un chapeau presque sphérique à sa naissance, ensuite convexe, puis presque plane, un peu proéminent dans son centre, luisant en dessus, large de deux pouces, garni de lames larges, inégales, un peu decurrentes sur le pédicule, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane aranéeuse qui laisse sur le pédicule un anneau peu sensible.

61. AGARIC chétain. *Agaricus castaneus*. Bull.

Agaricus gregarius, subparvus, pileo subcarnoso, campanulato, subbado aut sordide violaceo, umbonato; lamellis confertis, dilutè ferrugineis; stipite cavo, subtenue, fibrilloso, albidio. Bull. Herb. tab. 268. — Pers. Synopf. pag. 198. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 199.

Son pédicule est d'un blanc tirant sur le brun, plein, cylindrique, continu avec le chapeau, long de deux à trois pouces, soutenant un chapeau satiné, d'un brun-marron, quelquefois blanchâtre sur les bords, d'abord convexe & campanulé, con-

cave en vieillissant & à rebords relevés; garni en dessous de lames libres, inégales, de couleur brun-clair, couvertes dans leur jeunesse d'un tiffu filamenteux, qui se détache & forme un collier en réseau peu marqué. Il croît en automne, par groupes peu considérables, dans les bois de haute futaie, parmi la mousse ou sur les vieux troncs.

62. AGARIC taché de sang. *Agaricus hamatocelus*. Bull.

Agaricus subulivoxens seu lutescente-fuscus, stipite oblongo, subbulbofo, lutescente, lined ambiente rubra sepi notato; lamellis emarginatis, lutescentibus, cinnamomeis. Bull. Herb. tab. 596. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 198.

3. *Agaricus notatus*. Pers. Synopf. Fung. pag. 296.

Sa couleur est d'un fauve-clair; son pédicule plein, charnu, cylindrique, long de six pouces, épais d'un pouce à sa base, jaunâtre, coupé dans le milieu de sa longueur par une ligne rouge; il supporte un chapeau convexe, puis plane, large de quatre à cinq pouces, garni en dessous de lames inégales, non decurrentes, couvertes dans leur jeunesse d'une membrane en réseau, qui laisse, au haut du pédicule, un anneau à peine sensible. Il croît dans les bois de hêtres, en automne.

63. AGARIC aranéeux. *Agaricus araneosus*. Bull.

Agaricus pileo castaneo, violaceo, flavo vel nigro; margine revolutis, pedunculo adnato ope membrana araneosa; lumen primò albis, dein cinnamomeis vel castaneis; stipite pleno, basi subincrassato. Bull. Herb. tab. 598. fig. 2. B. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 198.

Agaricus glaucopus. Pers. Synopf. Fung. pag. 282.

4. *Agaricus violaceus*. Bull. Herb. tab. 250, & tab. 544. fig. H. — Lam. Flor. franç. p. 1281, n°. 8.

5. *Agaricus crassipes*. Bull. Herb. tab. 96.

6. *Agaricus nitidus*. Bull. Herb. tab. 431. fig. 1.

7. *Agaricus proteus*. Bull. Herb. tab. 431. fig. 2.

8. *Agaricus rimosus*. Bull. Herb. tab. 431. fig. 4.

9. *Agaricus helveolus*. Bull. Herb. t. 431. fig. 5.

10. *Agaricus cinnabarinus*. Bull. Herb. tab. 431. fig. 3.

Agaricus (Bulliard), pileo carnosio, rufescente; lamellis distinctis, cinnamomeis; stipite bulbofo; bulbo ovato, cinnabarinio. Pers. Synopf. Fung. p. 289.

Bulliard a réuni sous une même dénomination un assez grand nombre de plantes, différentes en apparence, mais rapprochées en réalité par un caractère facile à saisir. Dans leur jeunesse, les bords du chapeau sont liés au pédicule par une

membrane si lâche, qu'elle semble une toile d'araignée tendue par-dessus les feuillettes. Le pédicule est plein, cylindrique, plus ou moins renflé à sa base, muni de ramifications radicales très-petites. Le chapeau est d'abord hémisphérique, & ses bords se recourbent en dedans; peu à peu ces bords s'étalent, mais le chapeau reste toujours convexe. Sa couleur est marron, violette, jaunâtre ou noirâtre. Les lames font nombreuses, inégales, d'abord blanches, & ensuite d'une couleur cannelle ou marron. La grandeur & les dimensions de ce champignon varient beaucoup. Il croît en automne, dans les bois. (Bull. Decand.) (Voyez AMANITE, n°. 13.)

64. AGARIC turbiné. *Agaricus turbinatus*. Bull.

Agaricus pileo convexo, carnoso, fordide luteo; canro sulcatis; lamellis nigris, stipitis adhaerentibus, minimè decurrentibus; stipite basi tuberculato, squamuloso, solido; annulo filamentoso, rubro notato. Bull. Herb. tab. 110. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 196.

Agaricus (turbinatus), pileo carnoso, convexo-plano, subviscido, fulvo, ferrugineo; lamellis subvirentibus; stipite bulboso, bulbo marginato, coriina ferruginea. Perf. Synopf. pag. 294.

β. *Agaricus (calochrous), pileo subulato, fuso, luteo; lamellis amant purpurascens; stipitis pallido, bulboso; bulbo marginato.* Perf. Synopf. pag. 282.

γ. *Agaricus (turbinatus, var. β, inquinatus), pileo subumbrino, maculato, margine viscido; lamellis olivaceo-pallidis; stipite crasso, bulboso; coriina flavescens.* Perf. l. c. pag. 294. (Voyez AMANITE, n°. 14.) Il varie dans ses couleurs & dans ses proportions.

65. AGARIC décoloré. *Agaricus decolorans*. Perf.

Agaricus pileo viscido, flavido; lamellis primò purpureo-caruleis, demùm cinnamomeis; stipite glabro, subuloso, albidò; coriina ferruginea. Perf. Synopf. Fung. pag. 283.

Son pédicule est glabre, épais, blanchâtre, un peu tubéreux, long de deux à trois pouces, épais de deux ou trois lignes; son chapeau visqueux, charnu, d'abord convexe, puis plane, large d'environ deux pouces; les lames étroites, d'un pourpre bleuâtre dans leur jeunesse, puis de couleur cannelle. Il croît dans les bois de pins.

66. AGARIC brisé. *Agaricus infractus*. Perf.

Agaricus pileo carnoso, olivaceo, ferrugineo aut umbrino; margine infratto, inflexo; lamellis olivaceis, crispis; stipite bulboso, pileo subconcolore aut pallidescens-caruleo. Perf. Synopf. Fung. pag. 283.

Cette espèce est remarquable par la courbure de son chapeau, qui paroît quelquefois comme brisé. Ce chapeau est charnu, un peu aplati, large de trois pouces, de couleur olivâtre, brune ou terreuse, réfléchi fortement à ses bords, ou simplement flexueux, sinué. Le pédicule est fibreux, bulbeux, un peu luisant, long d'un pouce & demi; les lames creuses, olivâtres. Il croît à l'ombre, dans les bois de hêtres.

67. AGARIC contourné. *Agaricus subtorus*. Perf.

Agaricus pileo convexo lamellifero olivaceis; stipite subtorso, sava, pallidescens-albido; basi albidovilloso. Perf. Synopf. Fung. pag. 284.

β. *Agaricus (subfimbriatus), pileo viscido, molli, fuligineo, fulvo; lamellis latiusculis, primò olivaceis, demùm cinnamomeis; stipitis cylindricis, dilutè carulescentis.* Perf. l. c.

Son pédicule est creux, un peu tors, d'un blanc-sale & velu, long d'un pouce & demi, épais d'un demi-pouce & plus; le disque tronqué, jaunâtre; les bords minces; sa couleur olivâtre, ainsi que celle des lames, qui se couvrent d'une poussière cannelle. Il croît dans les forêts; il est d'un saveur amère. La plante β est plus amère. Son chapeau est mou & visqueux; ses lames plus larges; son pédicule cylindrique, d'un bleu-clair. M. Persoon la regarde comme une espèce distincte.

68. AGARIC fauve-bistré. *Agaricus fulvo-fuliginosus*. Perf.

Agaricus pileo subviscido, fulvo-fuliginoso seu fordide ochraceo olivaceis; lamellis confertis, purpurascens olivaceis; stipite subbulboso, fibrilloso, dilutè carulescente. Perf. Synopf. pag. 284.

Cette espèce tient le milieu entre les deux variétés précédentes. Son pédicule est à peine bulbeux, d'un bleu-clair, fibreux; le chapeau légèrement visqueux, d'une couleur fauve-bistrée ou d'un jaune un peu verdâtre; sa substance blanche, insipide; ses lames nombreuses, d'un pourpre olivâtre, adhérentes en totalité au pédicule. Il croît dans les forêts.

69. AGARIC roux-olive. *Agaricus rufus-olivaceus*. Perf.

Agaricus pileo planiusculo, carnoso, viscido, rufo; lamellis confertis, olivaceis, demùm cinnamomeis; stipite bulboso, pallidescens. Perf. Synopf. pag. 285.

Son pédicule est cylindrique, long de trois pouces, bulbeux, d'un blanc-pâle; il soutient un chapeau convexe, puis plane, large de quatre pouces, visqueux, charnu, rouilleux, plus foncé dans son centre; garni en dessous de lames serrées, d'abord

d'abord olivâtres, puis de couleur canelle. Il croît dans les forêts.

70. AGARIC à pied conique. *Agaricus conopus*. Perf.

Agaricus pileo carnosio, obtusè umbonato, piloso, ex olivaceo, subferrugineo; lamellis confertis, emarginatis; stipite longo, bulboso, conico, in medio velato. Perf. Synopf. pag. 285.

On le distingue par son pédicule allongé, bulbeux, rétréci en cône, moins vers son milieu d'une membrane légère, à peine sensible. Le chapeau est charnu, un peu élevé & obtus dans son centre, pileux, d'un vert d'olive, puis un peu rouillé; il devient plat en vieillissant. Les lames sont nombreuses, échancrées, larges de trois lignes. Il croît dans les forêts.

71. AGARIC blanc-violet. *Agaricus albo-violaceus*. Perf.

Agaricus pileo latè & obtusè umbonato, argenteo-pallido; lamellis primò dilutè violaceis, dein argilaceis; stipite longo, obversè clavato. Perf. Synopf. pag. 286.

Son pédicule est long d'un pouce & demi, en masse à la base, violet vers son sommet, creux dans sa vieillesse. Son chapeau est d'un blanc-pâle, argenté, large d'un pouce, muni d'une faillie large & obtuse dans son milieu; les lames d'abord d'un violet-clair, puis un peu terreuses, jaunâtres. Il croît dans les forêts.

72. AGARIC argenté *Agaricus argentatus*. Perf.

Agaricus pileo carnosio, convexo, argenteo; disco pallescente; lamellis confertis, cinnamomeis; stipite bulboso, pileo concolore, corinà cinnamomeà. Perf. Synopf. pag. 286.

Ce champignon a une odeur assez forte, une saveur amère. Son pédicule est bulbeux, long d'environ deux pouces, épais d'un pouce, d'un blanc-argenté, ainsi que le chapeau. Celui-ci est convexe, large d'un pouce & demi, presque sec, luisant, plus pâle à son centre; les lames planes, un peu échancrées, adhérentes, de couleur canelle. Il croît dans les bois de pins.

73. AGARIC rouverté. *Agaricus decumbens*. Perf.

Agaricus parvulus, pileo carnosio, umbonato, subhemispharico, primò albo, dein pallescente; lamellis remotio-adnexis, ochraceis; stipite decumbente, clavato, bulboso, candido. Perf. Synopf. pag. 286.

Agaricus candidus. Batfch. Elem. Fung. t. pag. 133. tab. 20. fig. 106. ? (Quoad lamellas tantum differt.)

Botanique. Supplément. Tome I.

Cet agaric est fort petit. Sa saveur est amère; son pédicule bulbeux, blanchâtre, renversé, en forme de massue; son chapeau charnu, d'abord hémisphérique & très-blanc dans sa jeunesse, puis un peu proéminent & d'un fauve-clair; les lames distantes, de couleur canelle. Il croît parmi les hêtres.

74. AGARIC pliant. *Agaricus lentus*. Perf.

Agaricus subcassiposus, pallescente-albus, pileo carnosio, plano, viscoso; lamellis confertis, planiusculis; stipite solido, fibrato, squamoso, corinato. Perf. Synopf. pag. 287.

Il croît en petits groupes sur le tronc des arbres. Sa couleur est d'un blanc-pâle; son pédicule plein, fibreux, un peu écaillé; son chapeau très-visqueux, large de trois pouces, plane, charnu, un peu peluché à ses bords; les lames planes, étroites, décurrentes sur le pédicule.

75. AGARIC bâlard. *Agaricus spurius*. Perf.

Agaricus pileo subcarnoso, plano, umbonato, albidio; lamellis distantibus, cinnamomeis; stipite longo, cavo, candido. Perf. Synopf. pag. 288.

Il paroît se rapprocher de la variété ζ de l'agaric aranéux. Son chapeau est quelquefois jeune, plus souvent blanchâtre, plane, un peu charnu, proéminent à son centre, large d'un à deux pouces; les lames distantes, couleur de canelle; son pédicule blanc ou un peu bleuâtre, fibreux, long de trois pouces, un peu fibreux. Il croît dans les forêts.

76. AGARIC roide. *Agaricus rigens*. Perf.

Agaricus subfragilis, pileo sarcinosio, convexo, pleno, glabro, pallescente-albido; lamellis subdecurrentibus, demùm cinnamomeis; stipite longo, sustenui; basi subbulbosâ, villosâ. Perf. Synopf. pag. 288.

Son pédicule est grêle, fibreux, long de trois pouces & plus, velu, un peu bulbeux, d'un blanc-faible. Son chapeau est un peu mou, glabre, large de deux pouces, d'abord convexe, puis plane, d'un blanc-pâle; les lames décurrentes, de couleur jaunâtre dans leur vieillesse. Il croît dans les forêts.

77. AGARIC maculé. *Agaricus maculosus*. Perf.

Agaricus cassiposus, fragilis, pileo obtusè umbonato, albidio; squamis latis, difformibus, umbrinis; lamellis confertis, primò ulbis, dein incarnato- cinereis; stipite fibrilloso, squamoso, lo gualculo, albo; corinà fragaci. Perf. Synopf. pag. 288.

Il s'élève de la même base plusieurs pédicules striés à leur sommet, longs de trois pouces, épais d'un pouce & plus, fibreux, blanchâtres, écaillés.

leux, soutenant un chapeau légèrement visqueux, relevé dans son milieu, large de deux pouces, blanchâtre, recouvert d'une membrane très-mince, fugace, laissant de petites déchirures d'un jaune-fale; les lames ferrées, d'abord blanches, puis d'une couleur incarnate-cendrée. Il croît en groupes dans les forêts.

78. AGARIC sanguin. *Agaricus sanguineus*. Pers.

Agaricus croceo-ruber, pileo conofo, convexo; lamellis affinis; fipite folido, longo. Persoon, Synopf. pag. 289.

Agaricus (sanguineus), fipitatus, fanguineo-ruber, unicolor, annulo araneofo, fugaci, aurantiaco. Wulf. in Jacq. Misc. 2. pag. 107. tab. 15. fig. 3. — *Soweb.* Engl. Fung. tab. 43.

Agaricus (rubens), fipitatus, pileo convexo; lamellis trifidis, profundis; fipite longo, toad plantis ruberrimâ. Bolt. Fung. tab. 36.

La couleur de ce champignon est partout d'un rouge teint de jaune, plus foncé sur les lames. Son pédicule est plein, glabre, long de trois pouces, épais de deux ou trois lignes, enveloppé, dans sa jeunesse, d'une membrane très-fugace. Son chapeau est grêle, convexe, un peu charnu, large d'un pouce & plus; les lames séparées. Il croît dans les forêts.

79. AGARIC pourpré. *Agaricus purpureus*. Bull.

Agaricus gregarius, mediocris, coccineo-ruber, pileo fubfquamulofo, umbonato; margine fipitique fubbreui, flavefcente. Bull. Herb. tab. 598. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 290. — *Decand.* Flor. franç. vol. 2. pag. 197.

Sa couleur est d'un rouge-orangé un peu foncé, légèrement pourprée; son pédicule plus pâle que le chapeau, glabre, plein, cylindrique, long de deux à trois pouces. Son chapeau est large de deux pouces & plus, d'abord campanulé, puis en cône évasé, puis plane & même concave, glabre; le centre saillant, ordinairement un peu écaillé; les bords finueux; les lames inégales, échançonnées à leur base, point adhérentes; recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane filamenteuse, blanche, très-fugace. Il croît sur la terre, par groupes de deux ou trois individus, adhérens ensemble par leur base. (*Bull. Decand.*)

80. AGARIC terre bolaise. *Agaricus bolaria*. Pers.

Agaricus gregarius, pileo fubcarneofo, convexo, abfolutè umbonato, flavefcente; difco maculifque lateritio-rubris variegato; lamellis planis, cinnameis; fipite flexufo, longiffimo; pileo concolore. Pers. Synopf. pag. 291.

Cet agaric est rare, d'un aspect élégant. Son pédicule est fibreux en dedans, long de deux ou

trois pouces, flexueux; son chapeau un peu charnu, convexe, hémisphérique, saillant à son centre, large d'un pouce & plus, d'un fond jaunâtre, un peu couleur de chair, avec de grandes taches irrégulières, d'un rouge de brique, en forme d'écaillés; les lames planes, un peu décurrens, d'un jaune-cannelle; une membrane fugace, très-légère, de même couleur. Il croît en automne, parmi les hêtres.

81. AGARIC visqueux. *Agaricus viscidus*. Linn.

Agaricus gregarius, pileo carneofo, primum convexo, deinde depresso, gelatinofo, fufco-purpureo; lamellis decurrentibus, ramofis, fubcinereis; fipite deorsum incruffato, bafi intusque furo; cortice nigrefcente. Pers. Synopf. pag. 291. — *Schæff.* Fung. tab. 36. — Linn. Flor. Suec. 1070. 1229. — *Soweb.* Fung. tab. 7.

β. *Agaricus (atropunctatus), pileo obtusè umbonato, viscido; lamellis niveis; fipite cruffaculo, albido, nigro, squamulofo*. Pers. l. c.

Son pédicule est glabre, très-court, jaune à sa base & dans l'intérieur, blanc en dehors, renflé, environné d'une membrane mince, très-lucide, un peu noirâtre. Son chapeau est charnu, d'abord convexe, puis comprimé, gérameux, large d'un pouce & plus, d'un pourpre foncé; les lames décurrens, ramuscées, d'un blanc-cendré.

Cette plante croît dans les bois. Dans la variété β, la surface de ce champignon est toute piquetée de points d'un rouge presque noir.

82. AGARIC en masse. *Agaricus gomphus*. Pers.

Agaricus gregarius, pileo umbonato, purpurafcenti-livido feu incarnato-rufa, fubvifcido; lamellis fimplicibus, decurrentibus, purpurafcenti-umbrinis; fipite longo, fquamulofo, unicolor. Pers. Synopf. pag. 292. — Id. Icon. & Descript. Fung. Falcic. 2. pag. 50. tab. 13 fig. 1. — *Soweb.* Fung. tab. 105.

Très-approchée de l'espèce précédente, celle-ci en diffère par sa grandeur, par sa couleur & par ses lames plus simples. Son pédicule est allongé, écaillé, renflé en masse, fon chapeau d'un pourpre-livide ou d'un incarnat foncé, un peu visqueux, proéminent à son centre; les lames décurrens, d'un pourpre-brun. Il croît par groupes dans les forêts de pins.

83. AGARIC aqueux. *Agaricus oquofus*.

Agaricus (aurantius), gregarius, magnus, pileo fquamulofo, viscido-humido, flavo-aurantio; lamellis confertis, canaidis; fipite tranfverfis fquamulofo, apice albido. Pers. Synopf. pag. 292. — *Schæff.* Fung. tab. 37.

Ce champignon est grand; il a une odeur forte & une saveur amère. Sa couleur est d'un jaune de

rhubarbe ou plus foncée; son pédicule un peu écailléux transversalement, blanchâtre à son sommet; son chapeau visqueux, presque toujours humide, comme mouillé; ses lames blanches & serrées. Il croît en automne, par groupes, dans les bois de pins.

84. *AGARIC glutineux. Agaricus glutinosus.* Bull.

Agaricus pileo supremâque stipitis parte viscosus; pileo cinnamomeo, margine revoluta; lamellis albis, decurrentibus; stipite pleno, basi cinnamomeo, subincrassato; apice albo-nigro, maculato. Bulliard. Herb. tab. 298. 539 & 587. fig. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 195.

Agaricus (albo-brunneus), subcastrifolius, pileo carnoso, viscoso aut fisco, umbrino; lamellis candidis, stipite squamuloso, apice albedo. Pers. Synopf. Fung. pag. 293.?

Ce champignon est remarquable par une forte couche d'un mucilage gluant, qui recouvre le chapeau & la partie colorée du pédicule, qui retient adhérens les feuilles & autres corps qui viennent à tomber sur lui. Son pédicule est plein, de couleur cannelle dans le bas, blanchâtre au sommet, un peu renflé à sa base, long de trois à cinq pouces, tacheté vers le haut de petits points noirs, qui paroissent être les débris d'une membrane ou réseau qui recouvroit les feuillets dans leur jeunesse. Le chapeau est convexe, à bords un peu repliés en dessous, large de trois à quatre pouces, de couleur cannelle. Ses feuillets sont blancs, inégaux, décurrens. Son chapeau & même ses feuillets deviennent quelquefois jaunâtres. Dans une autre variété, le pédicule entier est noir. Il croît en automne, solitaire ou par groupes, sur la terre.

85. *AGARIC roussâtre. Agaricus vaccinatus.* Pers.

Agaricus gregarius, pileo carnoso, hemispharico, umbonato, piloso, squamoso, rufo; lamellis albidis, paleiscentibus; stipite cavo, longo, subhorislo. Pers. Synopf. pag. 203. — Id. Icon. & Descript. Fung. pag. 6. tab. 2. fig. 1. 4. *Agaricus rufus.*

Son pédicule est fistuleux, alongé, médiocrement fibreux; il supporte un chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis plane, roussâtre, pileux, écailléux, faillant dans son centre, garni en dessous de lames d'un blanc-pâle; quelquefois tachetées de rouille. Il est commun dans les bois de pins.

86. *AGARIC à tête grenue. Agaricus psammophilus.* Bull.

Agaricus spadicatus, pileo crasso, campanulato, forfuraceo, squamuloso; lamellis lasioculis, emarginatis; stipite squamoso; apice levi, tenuiore. Bull.

Herb. tab. 531. fig. 2, & tab. 586. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 196.

Agaricus arenatus. Pers. Synopf. Fung. pag. 293.

La couleur de ce champignon est d'un fauve-clair. Son pédicule est plein, cylindrique, quelquefois un peu renflé à sa base, couvert de quelques écailles couchées & brunâtres; glabre au dessus du collier, long de deux pouces, soutenant un chapeau d'abord hémisphérique, large de deux pouces, ensuite convexe, charnu, garni en dessous de petites écailles pulvérulentes. Les lames sont inégales, un peu larges, échancrées, recouvertes, dans leur jeunesse, par une membrane qui disparoit en laissant à peine quelques vestiges sur le pédicule.

87. *AGARIC à pied grêle. Agaricus ileopodius.* Bull.

Agaricus proteiformis, fuscescens, pileo campanulato, dein conico, elongato, acuto, postea convexo vel plano, umbonato; lamellis ex rubro-aureatis; stipite apice attenuato, subannulato. Bull. Herb. tab. 578 & 592, & tab. 586. fig. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 196.

Rien de plus variable que ce champignon; il change tellement de formes & de couleurs, qu'il est difficile de le bien caractériser. Son pédicule est large de deux ou trois pouces, épais d'environ deux lignes, blanc ou roussâtre, glabre ou velu, cylindrique ou conique, plein dans sa jeunesse, fistuleux dans un âge plus avancé, portant la marque d'une membrane filamenteuse qui recouvroit les feuillets dans leur jeunesse; il supporte un chapeau quelquefois campanulé à sa naissance, mais le plus souvent il a la forme d'un cône alongé & pointu; il devient ensuite convexe ou plane, avec le centre proéminent; il est fauve ou roussâtre, ou jaunâtre, uni ou rayé, ou tacheté, glabre ou écailléux, large d'un à deux pouces. Ses feuillets sont d'un rouge-orangé, larges, inégaux, échancrés près de leur base, & ensuite légèrement prolongés sur le pédicule. Il croît sur la terre, en touffes, en groupes ou solitaire. (Bull. Decand.)

88. *AGARIC des bois morts. Agaricus xylophilus.* Bull.

Agaricus alutaceus, pileo convexo, dein plano, margine suffriato; lamellis latis, subdecurrentibus; stipite pleno, dein fistuloso, sapis osh hirsuto. Bull. Herb. tab. 598. fig. 1. Non Pers. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 196.

Sa couleur est d'un fauve plus ou moins foncé. Son pédicule est cylindrique, souvent velu à sa base, long d'environ deux pouces, plein dans sa jeunesse, fistuleux dans un âge plus avancé; il supporte un chapeau d'abord convexe, puis plane,

un peu strié sur ses bords dans sa vieillesse, large de deux pouces, garni en dessous de lames inégales, nombreuses, élargies, légèrement décourantes, couvertes, dans leur jeunesse, d'un tissu filamenteux qui se déchire, & laisse sur le pédicule un collier fugace, peu sensible. Il croît sur les bois morts.

89. AGARIC brillant. *Agaricus fulgens*. Pers.

Agaricus gregarius, compactus, pileo auro, nitido, fuso; visco obsoletis squamoso; lamellis niuidis, obscuris subvis; stipite bulboso, subradicato; bulbo marginato, cortina pallida. Persoon, Synopf. pag. 194.

Agaricus sericeus. Schæff. Fung. tab. 14.

Il se distingue par sa couleur d'un beau jaunedoré, brillant; il est d'une saveur agréable. Son pédicule est bulbeux, très-souvent percé en dedans par des trous de larves; il soutient un chapeau un peu épais, presque sec, légèrement écailleux sur son disque, garni en dessous de lames luisantes, d'un roux-foncé. Il croît en groupes dans les bois de chênes & de hêtres.

90. AGARIC jaunâtre. *Agaricus fluvidus*. Pers.

Agaricus caespitosus, pileo subcarnoso, fluvido; disco obscuriore; lamellis squamatis, unicoloribus, flavescens; stipite molli, deorsum incrassato, suffescente. Pers. Synopf. pag. 195. — Schæff. Fung. tab. 14.

Son pédicule est presque brun, mou, un peu renflé; il supporte un chapeau un peu charnu, jaunâtre, plus obscur à son centre, garni de lames séparées, de même couleur que le chapeau. Il est d'une saveur amère; il se rapproche de l'*agaricus fuscicularis* d'Hudson; mais, dans ce dernier, les lames sont d'un vert-nébuleux, qui se noircissent. Il croît sur le tronc des arbres.

91. AGARIC jaune-blanc. *Agaricus ochroleucus*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, suffescente pallido, subincano; lamellis ex argillaceo-cinnamomeis; stipite subbulboso, fibrilloso, albicante; cortina consolor. Pers. Synopf. pag. 195. — Comment. pag. 22.

Son pédicule est d'abord plein, puis fistuleux, un peu bulbeux & fibreux, long de trois pouces, prolifère à sa base, de couleur blanchâtre. Son chapeau est charnu, large de deux pouces, d'un brun-pâle, un peu blanchâtre; les lames d'un jaunefale, un peu canelle, inégales. Sa saveur est amère. Il croît dans les forêts.

92. AGARIC bulbeux. *Agaricus bulbosus*. Schæff.

Agaricus glaber, majusculus, subpedicatus, pileo campanulato, margine tenui; lamellis distantibus;

stipite solido, subelongato, bulboso-ovato; cortina fugaci. Pers. Synopf. pag. 296. — Schæff. Fung. tab. 130.

Son pédicule est d'abord ovale, bulbeux, puis il s'amincit, s'allonge jusqu'à quatre pouces. Sa couleur est presque roussâtre. Son chapeau est campanulé, un peu proéminent dans son centre, aminci à ses bords, large de trois pouces, glabre, d'un jaune-paille; les lames distantes, conniventes, un peu arrondies. Il croît dans les forêts, en Angleterre.

93. AGARIC hemithricos. *Agaricus hemithricus*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, campanulato-conico, suffescente, ad latera canescente-tomentoso; lamellis planis, subargillaceis; stipite crassiusculo, fibrilloso, albicante; cortina ferruginea. Persoon, Synopf. pag. 297.

Son chapeau est charnu, campanulé, un peu conique, large d'un pouce & plus, presque lisse, pileux à ses bords, de couleur brune, blanchâtre à sa circonférence, soutenu par un pédicule blanc, fibreux, un peu épais, long de deux ou trois pouces. Les lames sont planes, d'un jaune-terreux, lancées, entièrement adhérentes au pédicule. Il croît dans les bois de pins.

94. AGARIC safrané. *Agaricus croceus*. Schæff.

Agaricus gregarius, minor, pileo subcarnoso, umbonato, subto mentoso, fulvo, cinnamomeo, opaco; lamellis flavo-croceis; stipite subtenui, fibrilloso, lutescente; cortina fugaci. Pers. Synopf. pag. 297. — Schæff. Fung. tab. 4. — Barich. Elem. Fung. fig. 117.

Agaricus cinnamomeus? Linn. & Bolt. Fung. tab. 150.

Sa couleur est en général d'un jaune de safran plus ou moins foncé. Son pédicule est grêle, long de trois pouces, épais de deux ou trois lignes, fibreux, cylindrique, jaunâtre; son chapeau médiocrement charnu, proéminent à son centre, presque glabre dans les jeunes individus, tomenteux & couvert de petites écailles dans les plus grands, garni de lames luisantes, safranées. Il croît dans les bois de pins & de hêtres.

95. AGARIC canelle. *Agaricus cinnamomeus*. Pers.

Agaricus pileo subcarnoso, umbonato, glabro, nitido, cinnamomeo-rufo (dilute effusente); lamellis latiusculis, cinnamomeis; stipite longiusculo (primò subbulboso?), dilutiore. Pers. Synopf. pag. 297. — Sowerb. Fung. tab. 205.

Cette espèce est d'une couleur canelle parfaite; elle est plus grande que l'espèce précédente; elle

en diffère par son chapeau constamment glabre; par ses lames un peu ventrues, échancrees. Son pédicule est d'une couleur plus claire, d'abord un peu bu-beux, puis plus allongé. Son tissu est filamenteux, très-fugace.

96. AGARIC trompeur. *Agaricus decipiens*. Pers.

Agaricus gregarius, pileo carnosio, membranaceo, circa umbonem acutum depresso, umbrino; lamellis latiusculis, obscurè cinnamomeis; stipite longo, ex albicante-uso. Pers. Synops. pag. 298.

Cet agaric ressemble tellement au précédent, qu'à son premier aspect on le prendroit pour lui; cependant on l'en distingue par les caractères suivans: son pédicule est cylindrique, presque ondulé, long de trois à quatre pouces, épais d'une à deux lignes, d'un blanc-roussâtre. Son chapeau est charnu, membraneux, comprimé & terreux à sa circonférence, saillant, un peu aigu à son centre, glabre, large de neuf lignes; les lames larges, d'un jaune-foncé, adhérentes en entier au pédicule. Il croît par groupes sur la terre, dans les bois de pins.

97. AGARIC couleur abricot. *Agaricus armeniacus*. Pers.

Agaricus fragilis, pileo subcarnoso, convexo, plano, dilatato, helveto; lamellis aqueis cinnamomeis, integris, latoribus; stipite mediocri, subulbo-fuso, albicante. Pers. Synops. pag. 299. — Schæff. Fung. tab. 81.

Son pédicule est grêle, fragile, blanchâtre, à peine bulbeux; il soutient un chapeau un peu charnu, d'abord convexe, puis plane, dilaté, large d'environ trois pouces, à l'axe ombilic saillant; les lames larges, entières, d'un jaune très-clair; le réseau fugace, couleur de rouille. Il croît presque solitaire dans les bois de hêtres & de chênes.

98. AGARIC jaune-clair. *Agaricus dilutus*. Pers.

Agaricus pileo convexo-plano, glabro, helveto; lamellis latiusculis, dilute cinnamomeis; stipite albicante. Pers. Synops. pag. 300.

Sa couleur est d'un jaune-clair très-pâle; son pédicule à peine bulbeux, blanchâtre, long de deux pouces, épais de trois à quatre lignes; le chapeau glabre, d'abord convexe, puis plane, large de deux pouces; les lames décurrentes, élargies. Il croît dans les forêts.

99. AGARIC festonné. *Agaricus subrepandus*. Pers.

Agaricus pileo carnosio, planiusculo, subrepando, subulbo, ferrugineo, nitido; lamellis congestis, argillaceo-cinnamomeis; stipite bulbofo, crassiusculo, albo. Pers. Synops. pag. 300.

Son pédicule est un peu épais, bulbeux, blanchâtre, plein, à peine d'un pouce d'épaisseur, enveloppé d'un tissu rouille; le chapeau charnu, un peu plane, légèrement finué à ses bords, large de trois pouces & plus, luisant, d'un jaune de rouille. Il croît dans les forêts de chênes.

100. AGARIC odeur de soufre. *Agaricus pyridorus*. Pers.

Agaricus pileo carnosio, umbonato, fibrilloso aut subsquamoso (fuligineo), palliato; lamellis confertis, ascendendis, albido-fuscescentibus; stipite cavo, subulbido; coriina fugaci. Pers. Synops. pag. 300.

Sa couleur est d'un jaune plus ou moins foncé, tirant sur l'olivâtre ou un peu blanchâtre, selon l'âge des individus. Le chapeau est roussâtre dans les plus jeunes; ils répandent quelquefois une légère odeur de soufre; ils sont enveloppés d'un tissu très-léger, fugace. Leur pédicule est creux, blanchâtre; leur chapeau charnu, un peu fibreux ou écailleux, saillant à son centre; leurs lames nombreuses, ascendantes, d'un blanc lavé de brun. Il croît dans les forêts.

101. AGARIC rude. *Agaricus scaber*. Pers.

Agaricus gregarius, subparvus, cinereo-fuliginosus; pileo squamoso, lamellis obscurioribus; stipite fibrilloso, aluturo, cylindrico. Pers. Synops. pag. 301. — Sow. Eng. Fung. tab. 207.

Son pédicule est long d'un à deux pouces, épais de trois ou quatre lignes, fibreux, cylindrique, point fistuleux, enveloppé d'un tissu fugace; son chapeau campanule, petit, parsemé d'écailles, d'un gris-foncé, large à peine de deux pouces; les lames d'une couleur plus obscure. Ce champignon est petit; il croît dans les forêts.

§. IV. GYMNOPIUS. Pers. Point de coiffe ni d'anneau; pédicule ordinairement plein & central; feuilles qui ne noircissent point en vieillissant.

102. AGARIC à tête bronzée. *Agaricus molibdocephalus*. Bull.

Agaricus (xneus), subsclitiosus, magnus, pileo subcarnoso, umbonato, fusco-aeo; lamellis latissimis, cinereo-pallidis; stipite solido, apice squamoso. Pers. Synops. pag. 302. — Bull. Herb. tab. 513. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 181.

Cette espèce est très-grande; elle se distingue aisément à ses lames inégales, très-larges, d'un gris-rouillé. Les plus longues, avant d'arriver au pédicule, forment un angle droit ou rentrant. Son pédicule est nu, plein, charnu, jaunâtre & glabre vers sa base, écailleux vers son sommet, long de six ou huit pouces, épais d'environ deux pouces; il soutient un chapeau d'abord convexe, hémisphérique, puis conique par l'élevation de son

centre, de couleur bronze-foncé. Il croît sur la terre.

103. AGARIC à tête brune. *Agaricus phaecephalus*. Bull.

Agaricus pileo carneo, umbonato, subrepando, badi; lamellis liberis, latiscemis; stipite longo, foliato, subulbroso. Bull. Herb. tab. 555. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 302. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 186.

Cet agaric a son pédicule nu, plein, cylindrique, un peu tubéreux à sa base, long de cinq à six pouces, épais d'un demi-pouce, blanchâtre à sa base, brun à son sommet, soutenant un chapeau charnu, d'un brun-roux, d'abord campanulé, un peu sinueux à ses bords, puis en cône, un peu écaillé, large de trois à quatre pouces; ses lames inégales, d'un jaune-argileux, sinueuses, non adhérentes au pédicule. Il croît sur la terre.

104. AGARIC fauve. *Agaricus faveus*. Bull.

Agaricus pileo fusco aut subrubro, rotundato; lamellis floventibus, sinuosis, basi truncatis; stipite foliato, basi incrassato, flavo, striato; stipes rubris. Bull. Herb. tab. 155. fig. 2, & tab. 574. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 186.

Ce champignon a son pédicule nu, plein, renflé à sa base, jaunâtre, strié par des raies rouges, longitudinales, longues de quatre à six pouces, épais d'environ un demi-pouce; il supporte un chapeau d'un brun-fauve ou un peu rougâtre, d'abord arrondi, puis convexe; enfin plane, large de trois à quatre pouces. Les lames sont jaunâtres, inégales, sinueuses, tronquées à leur base, non adhérentes au pédicule. Il croît en groupes peu nombreux, deux ou trois ensemble, adhérents par leur base.

105. AGARIC arqué. *Agaricus arcuatus*. Bull.

Agaricus varius, pileo campanulato, demum depresso, rufescente-griseo; lamellis latiusculis, arcuatis, subdecurrentibus, pallidioribus; stipite foliato, subulbroso. Bull. Herb. tab. 443, & 589. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 303.

« Nous n'avons aucune espèce de ce genre, dit Bulliard, qui varie autant que celle-ci de grandeur, de forme, de couleur, dans un même terrain, à une même exposition. Le caractère qui la distingue, existe dans la forme de ses feuillets, qui sont constamment arqués ou plutôt inclinés autour du pédicule, comme autant de demi-crochets. On en trouve qui, à la hauteur d'un pouce & demi, ont atteint leur maturité; d'autres s'élèvent jusqu'à six pouces, sur une largeur à peu près égale. Leur pédicule est nu, plein, blanchâtre, cylindrique, légèrement bulbeux à sa base; leur chapeau convexe, plan ou concave,

blanc, fauve ou brun; les lames blanches ou bien de couleur fauve ou brune à leur maturité, nombreuses, inégales. Il croît en automne, sur la terre, dans les bois, les prés, les jardins.

106. AGARIC des pacages. *Agaricus ovinus*. Bull.

Agaricus gregarius, pileo carneo, subcampanulato, rufescente, glabro aut suamuloso, margine sapidis incisio; lamellis distinctis, laterè venosis, albidocinereiscentibus; stipite covo, fuliginoso. Bull. Herb. tab. 580. — Pers. Synopf. pag. 303.

Son chapeau varie dans ses couleurs; il est d'un blanc-jaunâtre ou d'un roux-brun, d'abord convexe, puis conique, puis plane, souvent sinueux & fendu à ses bords, quelquefois écaillés à sa surface, large de deux ou trois pouces, soutenu par un pédicule nu, plein, glabre, cylindrique ou un peu conique, filuleux dans un âge avancé, courbé, jaunâtre, un peu strié. Les lames sont peu nombreuses, inégales, blanchâtres, jaunâtres ou grises, adhérentes, mais rarement decurrentes sur le pédicule. Il croît dans les pacages par groupes, mais point adhérents par leur base.

107. AGARIC ficcide. *Agaricus ficoides*. Bull.

Agaricus fulvo-rufescentis, subdurus, pileo campanulato seu obtusè umbonato, aut planiusculo, glabro; lamellis crassis, distinctis; stipite brevi, subtenui, atrovum attenuato. Bull. Herb. tab. 587. fig. 1.

Agaricus pratensis. Pers. Synopf. pag. 304.

Agaricus miniatus. Sowerb. Fung. tab. 141.

Agaricus fulvofus. Bolton. Fung. tab. 56.

B. *Agaricus* (cinereus), pileo carneo, convexo, subnitido; lamellis distinctis, plano-decurrentibus; stipite crassiusculo, foliato, albicante. Pers. l. c.

Agaricus (meisnerienis), cinereus, pileo plano, convexo, papillato; lamellis crassiusculis, ad latera dentato-crispis; stipite subnitido. Pers. l. c.

2. *Agaricus* (vitulinus), pileo diluè rufo, lamellis stipisque candidis. Pers. l. c.

Agaricus oreades. Bolt. Fung. ?

Ce champignon est d'une consistance assez ferme. Son pédicule est plein, nu, cylindrique, blanchâtre, court, un peu grêle; son chapeau glabre, d'abord convexe, ensuite plane, d'un rouge-fauve; son centre plus foncé, saillant à sa circonférence un peu sinuose; les lames inégales, decurrentes, distantes entr'elles, épaisses. M. Persoon cite quelques autres plantes qui n'en diffèrent que par la couleur. Le chapeau est cendré dans la variété β . Il noircit à ses bords en se desséchant.

Son odeur est désagréable. Dans la plante y, la couleur est blanchâtre, les fibres distinctes sur le chapeau, les lames un peu dentées, l'odeur point rebatante. La variété *z* a son chapeau roussâtre, son pédoncule & les feuilles blanches. C. champignon croît ordinairement par groupes, dans les prés ou sur les collines, en automne.

108. AGARIC à tête velue. *Agaricus eriocephalus*. Bull.

Agaricus rufescens, pileo primò campanulato, dein convexo, imprimis margine gossypino; lamellis inaequalibus, subdecurrentibus; stipite cylindrico, attenuato. Bull. Herb. tab. 5-6. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 174.

z. *Agaricus rufes.* Bull. l. c. fig. B. C. D. E.

y. *Agaricus alipes.* Bull. l. c. fig. A.

Ce champignon est d'un roux plus ou moins foncé dans toutes ses parties, excepté dans la variété *z*, qui a le pédoncule blanc. Ce pédoncule est plein, nu, cylindrique, long de deux ou trois pouces & plus, épais de deux lignes, glabre dans la variété *z*, pubescent dans la variété *y*. Il supporte un chapeau d'abord campanulé, puis convexe, cotonneux, surtout vers les bords, régulièrement arrondi, plus foncé au centre & aux bords que dans le milieu, large d'un pouce & demi. Ses feuilles sont inégales, légèrement decurrens. Il croît par petites touffes sur les bois morts. (Bull. Decand.)

109. AGARIC des forêts. *Agaricus nemoreus*. Perf.

Agaricus magnus, solitarius, pileo carnoso, latè umbonato, planiusculo, fulvo-rufescente; lamellis decurrentibus, albis, subdistinctibus; stipite longifimo, solido, basi lanato. Perf. Synops. pag. 305.

Son pédoncule est plein, d'un blanc-pâle, lanugineux à sa base, long de trois à quatre pouces, épais d'un demi-pouce; il supporte un chapeau charnu, un peu plane, protubérant à son centre, d'un rouge-fauve, large de trois pouces; les lames blanches, un peu distantes, decurrentes, larges de deux ou trois lignes. Il croît solitaire dans les forêts, sur la terre.

110. AGARIC savoureux. *Agaricus liquoritia*. Perf.

Agaricus pileo carnoso, convexo, aereo, glabro; lamellis confertis, fulvo-cinnamomeis; stipite cavo, fibrilloso; pileo subconcolore. Perf. Synops. pag. 306.

Ce champignon est d'une saveur d'abord douce, puis légèrement amère. Sa couleur est d'un fauve-luisant, plus ou moins foncé. Son pédoncule est fistuleux, long d'un pouce & demi, épais de deux

lignes, un peu fibreux; son chapeau charnu, convexe, très-glabre, large d'un pouce, d'un jaune-éclatant à son disque; les lames nombreuses, d'un jaune-caneille. Il croît sur le tronc des sapins, dans la forêt d'Hercynie.

111. AGARIC aromatique. *Agaricus aromaticus*. Perf.

Agaricus pileo carnoso, lato, obscurè cinnamomeo, glutinoso; lamellis junioribus decurrentibus, rufescentibus; stipite cavo, mediocri. Perf. Synops. pag. 306. — Swarb. Engl. Fung. tab. 144.

Cet agaric est tendre, fragile, d'abord d'une saveur insipide, ensuite un peu aromatique. Son pédoncule est fistuleux, long de deux ou trois pouces, épais de trois lignes; le chapeau charnu, large de trois pouces, glutineux, lisse, puis ridé, de couleur foncée de canelle; il devient noir aux endroits où on le touche; les lames decurrentes dans leur jeunesse, roussâtres. Il croît en Angleterre.

112. AGARIC cohérent. *Agaricus coherens*. Perf.

Agaricus capitosus, pileo subcarnoso, umbonato, rugoso, cinnamomeo; lamellis distinctis, subadnatis, aquatè cinnamomeis, majoribus junioribus; stipite cavo, nixento-badio, basi caninato. Persoon, Synops. pag. 306.

Cette espèce est très-remarquable. Trois ou quatre pédoncules s'élèvent d'une base commune, adhérents entr'eux en forme de tubercules, couverts, à leur partie inférieure, d'une membrane blanchâtre & velue; ils sont longs de quatre pouces, roides, lisses, fistuleux, d'une belle couleur marron. Leur chapeau est médiocrement charnu, ridé, proéminent à son centre, mou, hémisphérique, large d'un pouce & demi, d'un jaune plus ou moins pâle; les lames distinctes, d'un jaune très-clair; les plus grandes ventrues, élargies. Ce champignon est rare; il croît sur le tronc des arbres ou sur la terre, parmi les feuilles.

113. AGARIC téléphore. *Agaricus telephorus*. Perf.

Agaricus pileo carnoso, convexo-plano, viscoso, papillato, crustalino; lamellis confertis, flavis, aquatè cinnamomeis; stipite solido, subferrugineo, acriusculè pallido. Perf. Synops. pag. 307.

Son pédoncule est nu, plein, un peu rouillé, long d'un pouce & demi, épais de trois ou quatre lignes; son chapeau compacte, charnu, d'abord convexe, puis plane, visqueux, large d'un pouce & plus, d'un blanc-pâle, muni à son centre de petites protubérances irrégulières; les lames d'un jaune-clair, nombreuses, larges d'une ligne & demi. Il croît parmi les pins, dans la forêt d'Hercynie.

114. AGARIC glissant. *Agaricus lubricus*. Persf.

Agaricus pileo cornoso, umbonato, cinnamomeo, viscido; lamellis confertis, adnexis, argilloeis; stipite longiusculo, fistuloso, albidio. Persf. Synopf. pag. 307.

Son chapeau est visqueux, charnu, d'un jaunecanelle, large d'un pouce & demi, un peu strié & même recourbé à ses bords, soutenu par un pédicule long de deux pouces & plus, blanchâtre, fibreux, strié & un peu aminci à son sommet. Les lames sont rapprochées, convexes, un peu roides, terreuses. Il se trouve parmi les pins, dans la forêt d'Hercynie.

115. AGARIC butyreux. *Agaricus butyrosus*. Bull.

Agaricus pileo convexo, glabro, rufescente-badiao (distans eschaneo); lamellis flexuosis, albidis; stipite subconico, ubique piloso, rastro-castaneo. Bull. Herb. tab. 572. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 181.

A. *Agaricus thricopus*. Persf. Synopf. pag. 308.

Cet agaric est d'une couleur touffe, plus ou moins claire, inégale dans ses teintes. Son pédicule est nu, plein, cylindrique, un peu renflé à sa base, d'un rouge-marron, glabre, souvent velu, long d'environ quatre pouces. Son chapeau est d'abord globuleux, puis conique, puis concave, à bords relevés, garni en dessous de feuillets inégaux un peu arqués, blancs ou jaunâtres, adhérens, mais non décurrents sur le pédicule. Il croît sur la terre, ou foliaire ou deux à trois individus adhérens par leur base.

116. AGARIC vineux. *Agaricus vinus* Bull.

Agaricus pileo rufi-rufescente, primùm rotundato, tandem sinuato vel lobato, tomento tenui oblecto; laminis rufis, numerosis; stipite subcylindrico, rufescente. Bull. Herb. tab. 54. — Lam. Diction. 1. pag. 107.

A. *Agaricus leucophyllus*. Persf. Synopf. pag. 309. (Voyez AMANITE, n°. 20.)

117. AGARIC à rebords. *Agaricus marginellus*. Persf.

Agaricus pileo cornoso, membranaceo, componulato, albidio-umbrino; disco obscuriore, globoso; lamellis distinctis, alternis majoribus, albis; margine fimbriato, umbrino; stipite nitido, basi subterreoso, nudo. Persf. Synopf. pag. 309.

Son pédicule est un peu rubéroux à sa base, pileux, long d'un pouce & demi, épais d'une ligne, soutenant un chapeau charnu, un peu membraneux, campanule, large de trois ou quatre lignes, d'un blanc-sale, plus foncé au sommet; les lames distinctes, un peu arquées à leur point

d'adhésion avec le pédicule, frangées & terreuses à leurs bords. Il croît au mois de septembre, sur le tronç pourri des sapins.

118. AGARIC crevassé. *Agaricus rimosus*. Bull.

Agaricus pileo conico, longitudinaliter rimoso, subrufescente; lamellis latiusculis, olivaceo-argillaceis, margine albidis; stipite squamuloso, farinaceo, palliescente. Bull. Herb. tab. 388 & tab. 599. — Persf. Synopf. pag. 310.

Agaricus auriventus. Basch. Elem. Fung. tab. 20. fig. 167.

Ce champignon est peu charnu. Son pédicule est nu, plein, cylindrique, d'un blanc-sale, un peu écailloux & farineux, long de deux à six pouces, soutenant un chapeau d'abord conique, puis presque plane, glabre, presque satiné, proéminent à son centre, strié de jaune & de fauve, marqué de fentes inégales, divergentes; garni en dessous de lames libres, inégales, jaunâtres, blanchâtres à leurs bords. Il croît dans les bois, au bord des routes, en été & dans l'automne.

119. AGARIC à graines orangées. *Agaricus pyrosporus*. Bull.

Agaricus pileo fusco, ferrugineo, nigro maculato, convexo, dein plano; laminis albis, dein rufis, aurantiis; stipite pleno, albo vel pallido flavo. Bull. Herb. tab. 547. fig. 3.

Son pédicule est souvent courbé à sa base, nu, plein, de couleur blanche ou jaunâtre, long d'environ trois pouces, large de trois à quatre lignes, supportant un chapeau d'abord convexe, puis plane, d'un fauve plus ou moins foncé, marqué de petites taches noirâtres, striées, plus nombreuses au centre & dans la jeune plante, large d'environ deux pouces, garni en dessous de feuillets blancs, qui deviennent ensuite d'un roux-orangé, libres, arqués, inégaux. Il croît sur les bois morts.

120. AGARIC des tiges mortes. *Agaricus caulicinalis*. Bull.

Agaricus pileo albo, subconvexo, interdum umbonato; maculis rufis centro variegato; laminis albis, basi intus emarginatis; stipite tenui, rufo, inferius subhirsuto. Bull. Herb. tab. 512. fig. 2.

Ce champignon a un pédicule grêle, nu, plein, cylindrique, glabre ou hérissé vers sa base, de couleur roussâtre, long d'environ trois pouces. Son chapeau est un peu convexe, légèrement mamelonné, blanc avec des mouchetures rouffes, surtout vers le centre; arondi, large de six ou huit lignes, peu charnu, garni en dessous de lames non adhérentes au pédicule, blanches, inégales, échancrées à leur base. Il croît sur les tiges des prêtres & d'autres plantes mortes.

121. AGARIC

111. AGARIC incisé. *Agaricus incisus*. Petf.

Agaricus subparvus, pileo hemispharico, umbonato, squamuloso, spadicis; lamellis albidis, ferrugineis; stipite subbrevis, cavo, glabro. Petf. Synopf. pag. 310.

C'est une petite espèce, dont le pédicule est court, glabre, fistuleux; le chapeau hémisphérique, puis un peu plane, incité à ses bords, d'un jaune-clair, légèrement écaillé; les lames séparées, couleur de toulie. Il croît dans les forêts.

112. AGARIC à pied rayé. *Agaricus grommopidius*. Bull.

Agaricus caespitosus, spadicis, pileo campanulato; disco dilatato, obtusissimo, piloso, squamoso; lamellis confertis, subdecurrentibus, obscurioribus; stipite glabro, flexuoso; connato. Bull. Herb. tab. 548 & 585. fig. 1. — Petf. Synopf. pag. 311.

♂. *Agaricus albus*. Bull. tab. 548. fig. R, & tab. 585. fig. 1. K. G. L. M.

♀. *Agaricus rufescens*. Bull. tab. 548. fig. B. G.

Cet agaric varie dans ses couleurs. Ses feuilles sont blanches ou jaunâtres. Le reste de la plante est tantôt blanc, tantôt roux. Le pédicule est glabre, un peu flexueux, nu, plein, cylindrique, long de trois à quatre pouces, épais d'un demi-pouce, marqué de petites raies noires, irrégulières, un peu renflé à sa base. Son chapeau est parfaitement glabre, d'abord hémisphérique, puis convexe, plane ou concave, saillant à son centre, large d'environ trois pouces, quelquefois couvert de petites écailles; les lames inégales, très-nombreuses, adhérentes, mais non décurrentes. Il croît sur la terre.

113. AGARIC réfléchi. *Agaricus reflexus*. Petf.

Agaricus gregarius; ferrugineo-ochraceus, pileo subcarnoso, avute umbonato, squamoso, ochraceo; lamellis difformis, dilute cinno-momeis; stipite longo; tenui, fibroso, squamoso; squamis reflexis. Persoon, Synopf. pag. 311.

Agaricus pilosus. Schæff. Bav. tab. 80. ?

Son pédicule est long de trois ou quatre pouces, grêle, fibreux, un peu flexueux, couvert de petites écailles réfléchies, d'un jaune de toulie, plus clair à son sommet. Son chapeau est médiocrement charnu, large d'un pouce & demi, presque conique, écaillé, garni de lames distinctes, planes, adhérentes au pédicule, d'un jaune-cannelle. Il croît par groupes sur la terre, dans les bois.

114. AGARIC pied recourbé. *Agaricus curvipes*. Petf.

Agaricus cinnomomeus, pileo hemispharico, squamato. Botanique. Supplément. Tome I.

mulofo; lamellis albidis, dilutioribus; stipite cavo, arcuato, fibrilloso. Petf. Synopf. pag. 312.

Son chapeau est hémisphérique, large d'un pouce & demi, de couleur cannelle, ainsi que toute la plante, un peu écaillé, soutenu par un pédicule arqué, fistuleux, un peu fibreux, long d'un pouce & demi, épais de deux à trois lignes, légèrement bulbeux à sa base. Les lames sont distinctes, minces, flexueuses, ascendantes, d'un jaune plus clair. Il croît sur le tronc des arbres.

115. AGARIC pied en fûseau. *Agaricus fulipes*. Bull.

Agaricus caespitosus, pileo subtemaci, rufescente-vaccino; lamellis d'flantibus, albedo-rufescentibus; stipite sulcato, veneticofo, radicato, glabro. Bull. Herb. tab. 516. fig. 2, & tab. 106. — Persoon, Synopf. pag. 312.

Agaricus crassipes. Schæff. Fung. tab. 83. (Voyez AMANITE à pédicule aminci, n°. 16.)

116. AGARIC à grosse racine. *Agaricus radicans*. Petf.

Agaricus pileo carnoso, umbonato, viscoso, rugoso, fulgineo-vaccino aut fusciscente; lamellis subdecurrentibus, candidis; stipite longissimo, radicato. Petf. Synopf. pag. 313. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 48.

Agaricus macrorrhizus. Petf. Observ. Mycol. 1. p. 87.

On le distingue à sa viscosité & à son pédicule allongé, en fûseau à sa base; il supporte un chapeau campanulé, puis aplati, saillant à son centre, ridé, d'un roux plus ou moins foncé; les lames blanches, presque décurrentes sur le pédicule. Il croît après les pluies, ordinairement solitaire, sur le tronc des arbres, dans les bois taillis.

117. AGARIC élané. *Agaricus longipes*. Bull.

Agaricus (radicatus pudens), pileo umbonato, subcarnoso, levi, vaccino, margine villosa; lamellis ascendens, candidis; stipite solido, tomentoso, radicato, ferrugineo. Persoon, Synopf. pag. 313. — Bull. Herb. tab. 232.

Il est très-approché du précédent, dont il diffère par son chapeau non visqueux, velouté à ses bords; par ses lames non adhérentes au pédicule; par ce dernier un peu velu, revêtu d'une écorce facile à détacher, marqué, dans presque toute sa longueur, de stries noires & parallèles, profondément enfoncé en terre, cylindrique, long de huit à neuf pouces, un peu renflé à sa base. Son chapeau est conique, puis aplati, de couleur brune ou blanchâtre, large de trois pouces & plus; les lames larges, minces, peu nombreuses, filieuses, blanches ou cendrées; les plus longues

terminées en pointe. Il croît en automne, dans les bois.

128. AGARIC pied noir. *Agaricus nigripes*. Bull.

Agaricus castaneus, stipite tomentoso, nigrescentibado; pileo subcarnoso, repando, glabro, brunneo; lamellis ventricosis, lutescentibus. Bull. 344 & 319. fig. 2. — Lam. illustr. tab. 882. fig. 3.

Agaricus velutipes. Pers. Synopf. pag. 314. — Curt. Flor. Icon. — Bolron. Fung. tab. 135. — Vaill. Bot. Paris. tab. 12. fig. 8. 9.

Ce champignon est velouté sur toute la surface de son pélicule, qui est nu, fistuleux, cylindrique, continu, long de quatre pouces, noirâtre dans la partie inférieure; il soutient un chapeau peu charnu, gluant à la superficie, de couleur fauve, avec le centre brun, large de deux pouces & plus, glabre, médiocrement convexe. Ses lames sont inégales, libres, jaunâtres. Il vient, ou solitaire ou plus souvent par groupes, dans les bois à la fin de l'automne & dans les grands froids de l'hiver; il a, lorsqu'on le mâche, la saveur de la gomme arabique.

129. AGARIC sphinx. *Agaricus sphinx*.

Agaricus castaneus, pileo viscido, medio brunneo, margine ochraceo; lamellis cavatis; stipite subfistuloso, deorsum nigrescente, umbrato. Pers. Synopf. pag. 314. — Bat. h. Fung. pag. 145. fig. 121.

On le distingue du précédent par son pélicule point velouté & par les lames blanches. Il croît en automne, sur le tronc des arbres.

130. AGARIC amer. *Agaricus picreus*. Pers.

Agaricus gregarius, subcapitatus, pileo glabro, cinnameo; lamellis emarginatis, lutescentiferrugineis; stipite glabro, nudo, umbrato. Pers. Icon. & Descript. Fung. pag. 14. tab. 4. fig. 7, & Synopf. pag. 315.

Sa saveur est d'une très-grande amertume; sa grandeur médiocre; son pélicule nu, glabre, de couleur terreux-foncé; il supporte un chapeau glabre, d'un jaune-cannelle, garni en dessous de lames échancrées, d'un jaune de rouille. Il est commun sur le tronc des arbres, où il croît par groupes.

131. AGARIC ferme. *Agaricus firmus*. Pers.

Agaricus solitarius, pileo aequali, convexo, rufescentivaccino; lamellis concoloribus; stipite solido, incrassato, fuscescenti-tomentoso fuligineo. Persoon. Icon. & Descript. Fung. pag. 15. tab. 5. fig. 3 & 4.

Son pélicule est plein, épais, long de deux

on trois pouces, épais de trois lignes, tomenteux, pulvérulent, couleur de bistre; il supporte un chapeau convexe, roussâtre, large d'un à deux pouces, garni en dessous de lames de même couleur; nombreuses, presque libres. Il croît solitaire dans les forêts.

132. AGARIC aigu. *Agaricus acutus*.

Agaricus gregarius, pileo subcarnoso, acutè umbonato, glabro, nitido, lutescenti-ochraceo; lamellis distinctis, subdentatum decurrentibus, alutis ochraceis; stipite glabro, solido, subulifisco. Pers. Synopf. pag. 316.

« Peut-être, dit M. Persoon, ce champignon n'est-il qu'une simple variété de l'*agaricus decipiens*; mais il n'y a point observé d'enveloppe sensible. Son pélicule est glabre, solide, presque lallique, long de trois à quatre pouces, épais de deux lignes. Son chapeau est médiocrement charnu, glabre, luisant, d'abord convexe, puis plane à la circonférence; son centre saillant, aigu, sa couleur d'un jaune d'ocre; les lames dilatées, décourantes, étroites, un peu dentées, d'un jaune-clair, pulvérulent. Il croît vers la fin de l'automne, dans les bois de pins.

133. AGARIC à odeur de melon. *Agaricus cucumis*. Pers.

Agaricus pileo glabro, subcarnoso, fisco-purpureo; lamellis ventricosis, ferrugineo-occeis; stipite subtenui, nigrescente. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 45, & Synopf. pag. 316.

Il a dans sa jeunesse l'odeur du melon; il prend celle du poisson putréfié lorsqu'il vieillit. Son pélicule est creux, cylindrique, long de deux pouces & plus, épais de deux lignes, noirâtre, soutenant un chapeau un peu charnu, glabre, d'un pourpre-foncé, éblong, campanulé, quelquefois orbiculaire, large de trois à six lignes, selon son développement; garni en dessous de lames ventruées, d'un jaune de safran foncé. Il croît sur la terre, dans les forêts.

134. AGARIC petit. *Agaricus pumilus*. Pers.

Agaricus solitarius, parvus, pileo subcarnoso, subhemisphaerico, ochraceo; lamellis palliatis cinnameis, laevissimis, planis, distinctis; stipite covo, tenui. Pers. Synopf. pag. 317. — Bull. Herb. tab. 260, & tab. 263. fig. 3. M. N. O. ?

Agaricus pusillus. Schœff. Fung. tab. 203. ?

Cet agaric s'élève à peine à la hauteur d'un pouce, sur un pélicule épais de quelques lignes, fistuleux, soutenant un chapeau peu charnu, presque hémisphérique, d'un jaune d'ocre, large de quatre lignes, garni de lames larges de deux ou trois lignes, d'un jaune de canelle pâle, planes, dif-

tinâtes. Il croît au commencement de l'automne, parmi les gârons, sur le bord des routes.

135. AGARIC en poire. *Agaricus pyriformis*. Persl.

Agaricus parvus, totus umbrinus, pileo subcarnoso, membranaceo, plano, cum lamellis decurrentibus, obtusis; stipite brevi. Persoon, Synops. pag. 317.

Cet agaric est fort petit, de couleur de terre d'ombre. Son chapeau est à peine charnu, large de quatre lignes, convexe, en forme de poire, puis plane, membraneux, garni de lames décourantes, soutenu par un pédicule fistuleux, épais d'une ligne, haut de six à neuf lignes. Il croît sur les pelouses qui revêtent les collines.

136. AGARIC transparent. *Agaricus pellucidus*. Bull.

Agaricus subparvus, rufescens, pileo carnoso, membranaceo, striato, campanulato; lamellis latissimis; stipite longiusculo, tenui. Bull. Herb. tab. 550. fig. 2.

Agaricus biconus. Persl. Synops. pag. 317.

Il est d'une couleur roussâtre. Son chapeau est presque membraneux, campanulé, un peu conique, légèrement strié sur ses bords, large de cinq à six lignes, garni en dessous de lames élargies, inégales, légèrement décourantes. Son pédicule est glabre, nu, plein, cylindrique, grêle, long de deux ou trois lignes, large d'une ligne. Il croît sur la terre, solitaire ou quelquefois par groupes.

137. AGARIC poudré. *Agaricus confertus*. Persl.

Agaricus gregarius, parvus, pileo subcarnoso, hemisphærico, deinde planisculo-rufescente, squamulis farinaceis obiecto; lamellis latiusculis adnatis, cinnameis; stipite sursum concolorato, pileo concolore. Persl. Icon. & Descript. Fung. pag. 50. tab. 12. fig. 3, & Synops. pag. 318.

Sa couleur est d'un brun-roussâtre; son pédicule fort grêle, long d'un pouce & plus, à peine épais d'une ligne, couvert d'écaillés pulvérulentes; son chapeau d'abord hémisphérique, puis plane, large de deux ou trois lignes, farineux, garni de lames adhérentes, couleur de cannelle. Il croît sur le bord des routes, dans le voisinage des bois de pins.

138. AGARIC pied brun. *Agaricus badipis*. Persl.

Agaricus pileo carnoso, membranaceo, campanulato, obtuso, glabro, fulviginoso; lamellis latiusculis, plano descendens, concoloribus; stipite

albido, fibrilloso, deorsum badio, subtenaci. Persl. Synops. pag. 318.

Son pédicule est long de trois pouces, un peu fibreux, tenace, blanchâtre, d'un brun-marron en dehors; il soutient un chapeau presque conique, campanulé, fragile, transparent, légèrement strié, large de trois à quatre lignes, glabre, obtus, un peu rouillé. Les lames sont planes, un peu élargies, adhérentes, ascendantes, de la même couleur que le chapeau. Il croît presque solitaire dans les bois de pins; il se rapproche beaucoup de l'*agaricus caucinalis*. Sow. Arb. Fung. tab. 163.

139. AGARIC vert-foncé. *Agaricus atro-virens*. Persl.

Agaricus pileo tenui, obscure viridi; squamulis minutis scabro; lamellis pallidis; stipite folio, longo, nigricante. Persl. Synops. pag. 319.

Son chapeau est mince, sinueux, d'un vert-foncé, couvert de petites écaillés, large de trois à quatre pouces; les lames plus pâles; son pédicule plein, noirâtre, long de quatre pouces, épais d'un pouce. Il croît dans les forêts de hêtres.

140. AGARIC jaune-verdâtre. *Agaricus flavo-virens*. Persl.

Agaricus pileo carnoso, flexuoso, flavescente; squamis minutis, subobsoletis, nigrescentibus; lamellis citrinis; stipite inaequali, concolore. Persoon, Synops. pag. 319. — Abbild. Icon. — Schœff. tab. 41.

Sa couleur est d'un jaune-verdâtre; son chapeau charnu, sinueux, convexe, puis plane, couvert de petites écaillés noirâtres, large de trois à cinq pouces, garni en dessous de lames d'un jaune-citron. Le pédicule est tantôt glabre, tantôt écailléux, cylindrique ou rétréci. Il croît dans les bois de pins & de hêtres.

141. AGARIC jonquille. *Agaricus leucoganthus*. Persl.

Agaricus pileo carnoso, obscure umbonato, amari flavo; pilis appressis, nigrescentibus; lamellis distinctis stipiteque candidis. Persl. Synops. pag. 319.

An agaricus sejundus? Sow. Arb. Engl. Fung. tab. 126.

Son pédicule est blanc, glabre, long de deux pouces, épais de cinq à six lignes, soutenant un chapeau convexe, d'un beau jaune, large d'un pouce & demi; le centre peu saillant, couvert de poils couchés & noirâtres; les lames libres & blanches. Il croît en automne, dans les forêts, parmi les bruyères.

142. AGARIC à écailles rougeâtres. *Agaricus rutilans*. Pers.

Agaricus pileo carneo, planiusculo, flavido, maculis rubellis ad marginem ut plurimum picto; lamellis pallidis; stipite longo, solido, deorsum incrassato; pileo concoloro. Pers. Synopf. pag. 320. — Schœff. Fung. Bav. tab. 218.

♂. *Agaricus xerampelinus*. Sowerb. Fung. tab. 218.?

Cette espèce est remarquable par de petites taches écailleuses, brillantes, rougeâtres, répandues sur toutes les parties. Son pédicule est plein, renflé, quelquefois un peu courbé, long de deux à trois pouces, épais de six lignes, soutenant un chapeau charnu, convexe, puis un peu plane, jaunâtre, peu saillant à son centre, un peu ridé, large d'un pouce & demi; les lames nombreuses, conniventes, très-pâles. Il croît dans la forêt d'Hercynie.

143. AGARIC d'un blanc-sale. *Agaricus lucidus*. Pers.

Agaricus subgregarius, pileo carneo, subflexuoso, glabro, & virescente-subcinereo; lamellis angustis, laevissimis; stipite solido, squamuloso, pallidescente. Pers. Synopf. pag. 321. — Schœff. Fung. tab. 69.

♂. *Agaricus (cinereus), totus cinereus*. Pers. l. c.

Il est d'une grandeur médiocre. Son pédicule est épais, souvent un peu comprimé, plein, légèrement écailleux, d'un blanc-sale, soutenant un chapeau charnu, un peu finueux, glabre, d'un vert-cendré; les lames jaunâtres, étroites, adhérentes, un peu échancrées. Il croît en automne, dans les forêts, souvent par groupes.

144. AGARIC jaune de cire. *Agaricus cerinus*. Pers.

Agaricus gregarius, flavo-cerinus, opacus, pileo carneo, plano, subumbilicato; lamellis confertis, angustis; stipite brevi, subsolido, glabro. Persoon. Synopf. pag. 321.

Il se distingue par sa couleur uniforme, d'un jaune de cire. Son pédicule est glabre, court, plein; il noircit quelquefois, & soutient un chapeau charnu, large d'un pouce & demi, plane, un peu comprimé, fragile; son centre peu saillant; les lames nombreuses, étroites, minces, planes. Il devient amer, & croît dans les bois de pins.

145. AGARIC à tête jaune. *Agaricus chrysanthemus*. Bull.

Agaricus subgregarius, flavo-cerinus, pileo hemisphaerico; stipite solido, subincurvo, basi albido, hirsuto;

pileo cretato. Bull. Herb. tab. 556. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 321.

Cet agaric produit un effet assez agréable sur les bois & les feuilles mortes, où il croît par groupes de deux ou trois pieds, adhérents à leur base. Son chapeau est d'abord globuleux, puis convexe, puis plane, de couleur jaune; le centre saillant, large de deux pouces, soutenu par un pédicule plein, cylindrique, un peu courbé, jaune, glabre dans presque toute sa longueur, blanc & hérissé du pois à sa base, long de trois pouces; les lames inégales, un peu adhérentes au pédicule, jaunes, légèrement échancrées à leur base.

146. AGARIC couleur de soufre. *Agaricus sulfureus*. Bull.

Agaricus sulfureus, odoratus, pileo carneo, subumbonato, glabro; lamellis distinctis, emarginatis; stipite longo, cavo, flexuoso, dilatato. Bull. Herb. tab. 168 & 345. fig. 2. — Pers. Synopf. pag. 322.

♂. *Agaricus (coronarius), solitarius, odoratus, pileo carneo, umbonato, subrigoso, uluacico-falido, opaco; lamellis rotundato-adenixis, latiusculis; stipite longiusculo, albido.* Pers. l. c.

Cet agaric passe insensiblement d'une teinte jaune un peu verdâtre à une couleur de soufre fondu. Son odeur est celle du chenevis pourri. Selon M. Persoon, elle approche de celle du seringat (*philadelphus*). Sa saveur n'est point désagréable. Son pédicule est plein, glabre, cylindrique, fibreux, long de quatre à cinq pouces, épais de cinq lignes; son chapeau charnu, d'abord conique, puis convexe, large de trois pouces, un peu élevé à son centre; sa surface lisse; les lames inégales, nombreuses, un peu adhérentes au pédicule. Il croît ordinairement solitaire dans les bois, sur la terre, en automne.

M. Persoon regarde comme une variété de cette espèce la plante ♀, dont elle diffère par la couleur de son chapeau, d'un fauve-clair; par ses lames arrondies, adhérentes, plus larges; par son pédicule blanc, plus allongé. Il croît par groupes, dans la forêt d'Hercynie, parmi les pins.

147. AGARIC odorant. *Agaricus odoratus*. Bull.

Agaricus pileo carneo, planiusculo, levi, virescente; lamellis confertis, subadnatis, albidis; stipite solido, subflexuoso, concolori aut viridi. Bull. Herb. tab. 176 & 556. fig. 3. — Sowerb. Fung. tab. 42. Pers. Synopf. pag. 323.

♂. ? *Agaricus (anistatus), gregarius, pileo carneo, subarginoso, opaco; lamellis stipitatisque tuberoso, dilatatis.* Pers. Observ. Mycol. t. pag. 44.

Ce champignon a une odeur forte, pénétrante, qui approche de celle de l'anis ou du girofle. Son pédicule est plein, charnu, cylindrique, plus

élargi à son sommet, long de trois pouces, un peu flexueux, de couleur blanche ou verdâtre; il supporte un chapeau d'abord convexe, puis plane, de couleur verte ou bécuite, un peu sinueux sur les bords, large de quatre à cinq pouces, garni de lames blanches, un peu découronnées sur le pédoncule, très-irrégulières, environ huit demi-lames, entre deux lames plus grandes, entières. Il croit en automne, par groupes peu nombreux, dans les bois de pins à la plante & paroit n'être qu'une variété de cette espèce, dont la couleur est cendrée, un peu bleuâtre; son pédoncule tubéreux, d'une couleur plus claire que le reste, ainsi que les lames.

Lagaricus viridis de Persoon, Synops. pag. 324, & Bol. on. tab. 12, convient également à l'espèce précédente. Son chapeau est glabre & verdâtre, ses feuillets & son pédoncule blancs. On peut presque dire la même chose de *Lagaricus raphanoides*, Pers. l. c. Il a une odeur approchant de celle du raïsin, un saveur âcre. Son chapeau paroît tomenteux au tact; ses lames planes, étroites.

148. *AGARIC* douce-amert. *Agaricus dulcomorus*, Pers.

Agaricus mediocris, pileo subcornoso, hemisphaerico, umbonato, cervino; squamulis pilosis, oasperis; lamellis confertis, totis adaxiis, ex argillaceo dilute olivaceis; stipite mediocri, solido, nudo, Pers. Synops. pag. 325.

Son pédoncule est nu, plein, cylindrique, un peu tomenteux à sa base, long d'un pouce, épais d'une ligne & demie; son chapeau un peu charnu, d'abord hémisphérique, puis plane, large de six à dix lignes, aminé à ses bords, épais & saillant dans son centre, de couleur un peu fauve, couvert de petites écailles pileuses; les lames nombreuses, irrégulières, d'un jaune-olivâtre clair, conniventes; les unes plus larges, d'autres plus courtes, arrondies. Il est rare, & croit dans les bois de pins.

149. *AGARIC* couleur de biche. *Agaricus cervinicolor*, Pers.

Agaricus gregarius, pileo subcampanulato, acutè umbonato, villosio, cervino; lamellis fardis pallidis; stipite longo, scorioso-fuscescente. Persoon, Synops. pag. 325.

Son chapeau est presque campanulé, velu, couleur de biche, large d'environ neuf lignes; son sommet un peu aigu. Son pédoncule est long de deux ou trois pouces, épais de deux lignes, un peu fibreux, de couleur de paille, un peu écailleux à son sommet; les lames d'un blanc-sale. Il croit sur la terre, dans les bois de bêtres.

150. *AGARIC* pied de loup. *Agaricus lycoperdoides*, Bull.

Agaricus pileo subgloboso, tomentofo, cervino;

lamellis subgelatinosis, crassis, subprominulis, castis; stipite tomentofo, cinereis entre. B. H. Herb. tab. 319. fig. 1, & tab. 166. — Pers. Synops. pag. 325. — Michel, tab. 82. fig. 1.

Ce champignon, qui a de grands rapports avec les méruces, ressemble au premier ainsi qu'à une vessie-loup pèdonculeux. Son pédoncule est cylindrique, long d'un à quatre pouces, plein ou un peu fistuleux, glabre ou pubescent, droit ou courbé, continui avec le chapeau, qui est blanc, presque globuleux, ferme & uni dans sa jeunesse. Sa superficie, en vieillissant, devient un peu brune, écailleuse, couverte d'une poussière noire, garnie en dessous de lames rares, noirâtres, peu saillantes, assez semblables à des rides épaisses, divergentes. Il croit en automne, dans les bois, sur d'autres champignons, & en particulier sur l'agaric en lufeau.

151. *AGARIC* ébaudé. *Agaricus crustuliniformis*, Bull.

Agaricus pileo levi, nitido, lateritio, rufo aut pallido, opaco, flexuoso; lamellis aquatè cincomatis; stipite crasso, scorioso, alido. Bull. Herb. tab. 308 & 346.

Agaricus lateritius, Batfch. Elem. Fung. tab. 33. fig. 195.

Agaricus subtilis, Pers. Synops. pag. 326.

5. *Agaricus circinans*, Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 10.

7. *Agaricus involutus*; 8. *lepturus*; 9. *versicolor*; 2. *parvulus*, Pers. Synops. pag. 327.

« Rien de plus curieux, dit Bulliard, que la manière dont ce champignon est semé sur la terre, tantôt autour d'un arbre, à une distance de dix à douze pieds; tantôt au milieu d'une prairie ou d'une forêt, formant des ronds réguliers ou des banes sinuées très-longues sur une largeur de deux ou trois pieds. D'ailleurs, il varie beaucoup dans sa grandeur & ses couleurs. Sa surface est unie, luisante, très-gluante dans les tems humides. Dans sa jeunesse, comme dans un âge avancé, il ressemble, par sa forme & par sa couleur, à un ébaudé. Son pédoncule est nu, plein, cylindrique, blanc, long de deux à trois pouces, glabre à sa base & à son sommet, taché de petites peluchures noirâtres dans le milieu. Son chapeau est convexe, un peu irrégulièrement bosselé & sinueux, glabre, jaunâtre, large de deux à quatre pouces. Les feuillets sont roux, inégaux; ceux qui sont entiers laissent un intervalle entre eux & le pédoncule. Cet agaric est commun en automne, dans les bois & les prairies. »

152. *AGARIC* acerbe. *Agaricus acerbus*, Bull.

Agaricus subasporosus, magnus, pileo carneo,

helveto, margine involuto; lamellis confertis, attenuatis, palliatis; stipite solido, suberecto, punctato, squamuloso; pileo concolore. Bull. H. b. tab. 571. fig. 2. — Pers. Synopf. pag. 318.

Son pédicule est plein, long d'un pouce & demi, épais d'une ligne, cylindrique, jaunâtre, renflé à sa base, couvert, principalement vers son sommet, de petites écailles noirâtres. Il soutient un chapeau charnu, large de trois à quatre pouces & plus, orbiculaire, convexe, roulé en dessous à ses bords, de couleur jaunâtre, garni de lames inégales, étroites, nombreuses, d'un jaune-pâle, légèrement decurrentes. Il croît sur la terre, par groupes de deux ou trois pieds.

153. AGARIC à semences rouges. *Agaricus phosfermus*. Bull.

Agaricus gregarius, magnus, pallescens-albus, pileo planiusculo; lamellis distinctis, summa copiosa, rufo-germinibus; stipite subulbo, crassiusculo; pileo concolore. Bull. Herb. tab. 534 & 547. fig. 1, & tab. 590.

Agaricus fertilis. Pers. Synopf. pag. 318.

Agaricus pallidus. Sowerb. Fung. tab. 143. ?

Son chapeau, d'abord conique & obtus, devient ensuite convexe, puis presque plane, large de trois à quatre pouces, d'abord blanchâtre, puis roussâtre, très-lisse, garni en dessous de lames inégales, nombreuses, non adhérentes, couleur de rouille, contenant des semences nombreuses, de couleur rouge. Le pédicule est plein, cylindrique, un peu renflé à sa base, blanchâtre avec quelques stries roussâtres, long de trois à quatre pouces. Il croît dans les lieux boisés & couverts.

154. AGARIC sinué. *Agaricus sinuatus*. Bull.

Agaricus magnus, carnosus, pileo lato, sinuato, dein depresso, albido, rufescente; lamellis confertis, latis, rufo; stipite brevi, crasso. Bull. Herb. tab. 579. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 329.

La couleur de cet agaric est d'un jaune-pâle, un peu sale; les feuilles d'un roux-jaune. Son pédicule est long de trois à quatre pouces, épais d'un demi-pouce, cylindrique, un peu renflé à sa base, plein, charnu, supportant un chapeau d'abord convexe, puis plane ou concave, large de six à sept pouces, sinué & ondulé irrégulièrement à ses bords. Les lames inégales, un peu sinueuses, tronquées à leur base, à peine adhérentes au pédicule. Il croît solitaire sur la terre.

155. AGARIC dilaté. *Agaricus grandis*. Pers.

Agaricus solitarius, magnus, pileo obtusè umbo-nato, pallescens; disco sabuliferis; lamellis sub-

concoloribus; stipite longissimo, solido, albido. Pers. Synopf. pag. 329.

Son pédicule est pl. in, long de six à sept pouces, épais de huit à neuf lignes, blanchâtre, soutenant un chapeau large de trois à quatre pouces, obtus & saillant à son centre, puis dilaté à sa circonférence, couleur de brique dans son milieu, plus pâle à ses bords, garni de lames adhérentes, un peu échancrées, larges de trois à quatre lignes, de même couleur que le chapeau. Il est rare, & croît dans les bois de hêtres, solitaire.

156. AGARIC ondulé. *Agaricus repandus*. Bull.

Agaricus pileo obtusè umbo-nato, pallescens-luteo-risio, margine repando; lamellis latis, pallidis, rotundatis; stipite cylindrico, albo, glabro. Bull. Herb. tab. 423. — Pers. Synopf. pag. 329.

Cet agaric n'est pas très-commun. Il s'élève à la hauteur d'environ trois pouces, sur un pédicule d'environ un pouce d'épais, glabre, blanc, plein, cylindrique, supportant un chapeau d'abord conique, puis évasé à ses bords, puis plane, élevé à son centre, sinué & même échancré à sa circonférence, lisse, rayé de jaune sur un fond blanchâtre; sa chair blanche, son diamètre de trois pouces & plus dans son parfait développement; ses lames de couleur grise, inégales, libres, très-larges, arrondies. Il croît au printemps, sur la terre, dans les forêts.

157. AGARIC gras. *Agaricus obesus*. Batfch.

Agaricus gregarius, pileo carnosio, planiusculo, flexuoso, pallescens; lamellis æmum frigidis; stipite bulbo, brevi, albido, pallescens. Pers. Synopf. pag. 330.

Agaricus (obesus), pileo crasso, pulvinato, margine & superne aequali, ochraceo-albo, confluenti cum stipite crasso, brevi, carneo-nigro; lamellis palliatis ochraceis. Batfch. Elem. Fung. pag. 90. fig. 216.

p. *Agaricus (montanus), subcaespitosus, carnosus, pileo ex rufo, demum pallido; lamellis subliberis, angustis, æquas argillaceis; stipite subbulbo, brevi.* Pers. l. c.

Son pédicule est plein, court, bulbeux, épais, blanchâtre, long d'un pouce & demi, épais d'un pouce. Il supporte un chapeau charnu, d'abord campanulé, puis presque plane, large d'environ deux pouces & demi, d'un blanc-pâle, un peu ondulé à ses bords, garni en dessous de lames larges de deux ou trois lignes, d'un jaune-pâle. Il croît dans les lieux montagneux & arides. La variété p. en diffère par sa couleur plus foncée.

158. AGARIC en roseau. *Agaricus arundinaceus*. Bull.

Agaricus stipite elongato, pallido, compressiusculo,

vel sulcato, basi subhirsuto; pileo obtusè umbonato, pallescente-rufo, striato; lamellis distantibus, liberis. Bull. Herb. tab. 403. fig. A.

² *Agaricus collinus*. Pers. Synopf. p. 330. — Schæff. Fung. tab. 220.

Agaricus pratensis. Swerb. Fung. tab. 127.

Cet agaric est pourvu d'un pédicule presque enraciné, blanchâtre, élastique, cylindrique, un peu aplati & sillonné d'un côté, glabre, lisse, fistuleux, long de cinq à six pouces, soutenant un chapeau blanchâtre, conique, un peu mamelonné au centre, large à peine de deux pouces, peu charnu, marqué de stries roussâtres; les lames sibles, fauves, arquées, inégales. Il croît solitaire ou en petites touffes, dans les prés, en automne.

159. AGARIC enraciné. *Agaricus peronatus*. Pers.

Agaricus pallescens, pileo carnoso, membranaceo, convexo, subumionato, rugoso; lamellis distinctis; stipite solido, albio, radicato, dorsum flavo-striato. Pers. Synopf. pag. 331. — Bolt. Fung. tab. 58. — Swerb. Fung. tab. 37.

Son pédicule est plein, blanchâtre, entouré à sa base de poils roides, parallèles, jaunâtres, qui semblent l'attacher, comme de petites racines, aux feuilles tombées, parmi lesquelles on le trouve. Son chapeau est charnu, un peu membraneux, convexe, peu saillant à son centre, ridé, d'un blanc-pâle, garni en dessous de lames étroites, médiocrement adhérentes au pédicule, dont elles se détachent facilement.

160. AGARIC des devins. *Agaricus harioforum*. Bull.

Agaricus castiposus, pileo convexo, tenui, alutaceo-pallido; lamellis confertis, angustis, subconcoloribus; stipite toto hirsuto, dorsum incrassato. Bolt. Herb. tab. 56 & 585. fig. 2.

Amanita muscaria. Lam. Dict. t. pag. 107. (Voyez AMANITE monoyète, n°. 21.)

161. AGARIC à longue queue. *Agaricus longicaudus*. Pers.

Agaricus solitarius, pileo subcarnoso, planiusculo, subviscoso, alutaceo; lamellis confertis, planis, argillaceis, subliberis; stipite longissimo, aluticante. Pers. Synopf. pag. 332.

Son pédicule est cylindrique, long de quatre pouces, épais de deux ou trois lignes, blanchâtre, soutenant un chapeau mou, presque plane, un peu visqueux, d'un fauve-pâle, large d'un pouce & demi. Les lames linéaires-lancéolées, épaisses,

à peine conniventes, porcelanées. Il croît dans les forêts, parmi les bruyères.

162. AGARIC alongé. *Agaricus elatus*. Pers.

Agaricus magnus, pileo disco subcarnoso; margine, licato, striato, sordidè ochraceo; lamellis distinctis, latiusculis, brunneis; stipite longissimo, fistuloso, squamuloso, albio. Pers. Synopf. pag. 332.

Agaricus elatus. Eatsch. Elem. Fung. 2. pag. 1. tab. 32. fig. 188.

Son pédicule est long d'environ sept pouces, presque plein, fibreux, blanchâtre, écailleux, soutenant un chapeau large de deux à trois pouces, un peu visqueux, médiocrement proéminent à son centre, d'un jaune-sale, charnu à son disque, strié, presque cannelé, garni en dessous de lames convexes, d'un jaune-cannelé rembruni, un peu plissées, libres, couvertes d'une poussière abondante. Il croît en automne sur la terre, dans les bois de pins.

163. AGARIC brûlant. *Agaricus urens*. Bull.

Agaricus gregarius, pileo hemispharico, levi, obscure, pallido; lamellis angustis, cinnamomeis; stipite longissimo, solido, basi villosa, stria rufescentius maculato. Bull. Herb. tab. 528. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 333.

Sa couleur est d'un jaune-sale & terreux. Son pédicule est cylindrique, long de cinq à sept pouces, un peu renflé & velu à sa base, plein, légèrement strié de roux. Il supporte un chapeau d'abord convexe, ensuite plane, large de deux à trois pouces; les lames inégales, roussâtres; celles qui sont entières, détachées du pédicule. Il croît sur les feuilles mortes.

164. AGARIC à pied ferme. *Agaricus leucopodius*. Bull.

Agaricus pileo tenui, umbonato, subrepando, alutaceo; lamellis latiusculis, cinnamomeis; stipite cavo, nigro, albo. Bull. Herb. tab. 533. fig. 2.

Agaricus leucopus. Pers. Synopf. pag. 333. ?

Son pédicule est nu, plein, cylindrique, long d'environ deux pouces, glabre, toujours blanc, soutenant un chapeau glabre, jaunâtre, plus ou moins conique, à peine large de deux pouces, ordinairement entier à ses bords, garni de lames libres, nombreuses, inégales, assez larges, de la même couleur que le chapeau. Il croît solitaire, dans les bois.

165. AGARIC à pied plein. *Agaricus pleuropodius*. Bull.

Agaricus pileo flavo-pallescens, levi, conico,

plano, tandem subconcauo, vix carnosio; laminis rufis, arcuatis; stipite tenuiori, aluido, pleno. Bull. Herb. tab. 556. fig. 2.

Son chapeau est lifé, d'un jaune-pâle, d'abord conique, puis plane & un peu concave, très-peu charnu, large d'un pouce, soutenu par un pédicule grêle, plein, cylindrique, glabre, blanchâtre; les lames libres, arquées, inégales, rouffâtres. Il croît sur la terre.

166. AGARIC terrestre. *Agaricus trophilus*.

Agaricus subcespitofus, pileo alido-rufefcente, hemispharico, conico, acinid plano, marginis lacero; laminis fufcis, adfcendenfibus; apice rufo, pleno, crebro, tenui. Bull. Herb. tab. 522. fig. 2.

Son pédicule est grêle, droit, plein, rouffâtre, à peine long de deux pouces, glabre, cylindrique, soutenant un chapeau d'abord hémisphérique, puis conique, puis plane, faillant à son centre, souvent fendu à fes bords en cinq ou fix parties, large de fix ou neuf lignes, un peu frié vers fon centre, de couleur blanche ou rouffâtre, garni en dessous de lames libres, jaunâtres, inégales, afcendantes du côté du pédicule. Il croît sur la terre, par petits groupes ou folitaire.

167. AGARIC faux moufferon. *Agaricus torilis*. Bull.

Agaricus albidorufefcens vel fulvus, pileo subcar-noso, hemispharico, dein conico; laminis paulò magis coloratis; stipite pleno, ficcatione torilli. Bull. Herb. tab. 144 & 518. fig. 2.

La faveur de ce champignon approche de celle du moufferon: il est moins délicat, mais fans danger; il porte le nom de *moufferon d'automne* ou *faux moufferon*; il est d'un blanc roux ou fauve. Son chapeau est d'abord hémisphérique, puis conique, quelquefois plane, large de deux pouces, garni en dessous de lames inégales, libres, nom-breuses, plus colorées fur leurs bords; le pédicule plein, cylindrique, long d'environ deux pouces, épais de trois lignes au plus; il se tord comme une corde en fe desséchant. La chair est molle & ne fe déchire qu'avec peine. Il croit en automne, dans les terrains ftériles.

168. AGARIC horizontal. *Agaricus horizontalis*. Bull.

Agaricus rufefcens, pileo convexo, orbiculari, glabro; laminis latis, prominentibus; stipite fere horizontali; apice adfcendente, pleno. Bull. Herb. tab. 324.

Sa couleur est d'un brun-fauve; fon pédicule presque horizontal, un peu afcendant vers fon sommet, plein, glabre, cylindrique, long de fix lignes, soutenant un chapeau glabre, horizontal,

convexe, orbiculaire, large d'un pouce & plus; garni en dessous de lames inégales, larges, sail-lantes, poix adhérentes au pédicule. Il croît au printems & en automne, dans les fentes des troncs du poirier.

169. AGARIC écarlate. *Agaricus coccineus*. Bull.

Agaricus gregarius, totus coccineus, pileo convexo, subviscido; lamellis diftansibus, dentatim connexis; stipite cavo, subconvexo. Bull. Herb. tab. 202 & 570. fig. 1. — Persl. Synopf. pag. 334. — Schæff. Fung. tab. 302.

Cet agaric est très facile à distinguer par la belle couleur rouge qu'il confserve pendant sa jeunesse; mais il la perd en vieilliffant, & devient d'un blanc-fale, taché de brun. Son pédicule est cylindrique, souvent aminci à fa bafe, large de trois à cinq pouces, plein dans fa jeunesse, fistuleux dans un âge plus avancé; il soutient un chapeau d'abord conique, puis presque plane, un peu humide & visqueux, large de deux à trois pouces, d'abord parfaitement arrondi, enfuite un peu fivé, garni en dessous de lames inégales, libres, épaiffes. Il croit en automne, par petits groupes, dans les bois & les terrains incultes.

170. AGARIC à tête rayée. *Agaricus grammoccephalus*. Bull.

Agaricus pileo convexo, interdum plano, plaribus lituris, nigris, interruptis, radiantibus notato; margine sinuato, ferrugineo; laminis dilatè flavis, buse truncatis; stipite pleno, glabro, cylindrico, lufc-fcente. Bull. Herb. tab. 594.

Son chapeau est convexe, assez souvent plane dans fa vieillesse, jaunâtre, marqué d'un grand nombre de raies interrompues, divergentes, noires & rougeâtres; fivé fur fes bords, large d'environ quatre ponce, garni en dessous de lames d'un jaune-clair, non adhérentes, inégales, tronquées à leur bafe; le pédicule plein, glabre, jaunâtre, cylindrique, presque long de cinq pouces, large de cinq à fix lignes. Il croit folitaire.

171. AGARIC blanc cendré. *Agaricus cinerascens*. Bull.

Agaricus totus cinerascens, subcespitofus, fragilis, pileo rotundato, margine subsinuato; laminis latis, denfis, inaequalibus; stipite pleno, cylindrico. Bull. Herb. tab. 418.

Ce champignon passe de la couleur blanche à la couleur cendrée, principalement fur fes feuilles. Sa chair est ferme & cassante; fon pédicule plein, cylindrique, long de trois ponce & plus, soutenant un chapeau arrondi, un peu fivé fur fes bords, convexe, quelquefois un peu concave & mameloné à fon centre, large de trois à quatre ponce, garni de lames inégales, libres, épaiffes, élargies,

élargies, se détachant facilement, & toutes ensemble, du chapeau & du pédicule. Il croît solitaire ou en groupes dans les bois, en automne.

172. AGARIC couleur de froment. *Agaricus frumentaceus*. Bull.

Agaricus helvolus, rubescens, lituris subrubris, hinc inde diffeminatis; pileo convexo, tandem subconvexo; stipite plano, subcylindrico. Bull. Herb. tab. 371. fig. 1.

Cet agaric est d'un jaune de paille, tirant un peu fur le rouge, quelquefois parsemé de petites taches rougeâtres. Son pédicule est plein, charnu, cylindrique, long de trois à quatre pouces & plus, épais de cinq à six lignes, soutenant un chapeau d'abord convexe, ensuite légèrement concave, glabre, arrondi, large de quatre pouces, garni de lames inégales, non adhérentes au pédicule. Il croît par groupes, au nombre de deux ou trois individus adhérens par leur base.

173. AGARIC élégant. *Agaricus latus*. Pers.

Agaricus solitarius, pileo suburnoso, convexo plano, viscoso, dilaté flavo; lamellis dispersis, longe decurrentibus, apice flavis, basi dilaté purpurascens; stipite longo, subtenaci. Pers. Synopf. pag. 334.

C'est une espèce assez élégante, dont le pédicule est d'un fauve-clair, de couleur purpurine à son sommet, plein, visqueux, long de près de trois pouces; il supporte un chapeau un peu charnu, d'abord convexe, puis plane, visqueux, large de six à neuf lignes, strié à ses bords en se desséchant, garni en dessous de lames distantes, longuement decurrentes sur le pédicule, jaunes à leur sommet. Il croît après les longues pluies, dans les prairies des montagnes.

174. AGARIC à chapeau conique. *Agaricus conicus*. Pers.

Agaricus pileo conico, acuto, subviscoso, dilaté virescente, fluvido; lamellis confertis, ascendensibus, flavescens; stipite longo, sulcato, sulco flavo. Persoon, Synopf. pag. 345. — Schœff. Fung. tab. 2. — Battisch. Elem. Fung. fig. 28.

Agaricus croceus. Bull. Herb. tab. 50 & 524. fig. 3.

1. *Agaricus trifidus*. Pers. Synopf. pag. 335. — Schœff. Fung. tab. 2. fig. 9.

2. *Agaricus (incarnatus), pileo conico, repando, fuligineo, pallido, opaco; lamellis luteis; stipite flavo, breviusculo*. Pers. Synopf. pag. 335.

3. *Agaricus aurantius*. Lightf. Flor. Scot. 2. pag. 1025. — Bolton. Fung. tab. 67. fig. 2.

Cet champignon varie dans ses couleurs: il est Botanique. Supplément. Tome 1.

d'abord d'une belle couleur aurore ou safranée; il brunit ensuite & devient parfaitement noir. Son pédicule est cylindrique, d'abord plein, puis fistuleux, long de trois à quatre pouces, jaunâtre, un peu tortueux; il soutient un chapeau assez souvent conique, quelquefois étalé à ses bords, échanuré, lisse ou lobé irrégulièrement jusqu'au tiers de son diamètre, sec & luisant à la surface, garni en dessous de feuillets fermes, épais, fibres, inégaux, presque point charnus. Il croît dans les terrains secs, parmi les gazois, & quelquefois dans les bois.

175. AGARIC perroquet. *Agaricus psittacinus*. Pers.

Agaricus gregarius, subparvus, viscosus, pileo umbonato stipiteque cavo, sulcato, viridique vario; lamellis auris. Pers. Synopf. pag. 335. — Schœff. Fung. tab. 301. — Sowerb. Fung. tab. 82.

Agaricus camelus. Bull. Herb. tab. 545. fig. 1.

Il est très-fragile, visqueux, petit, remarquable, dans sa jeunesse, par une couleur verte élogique; il jaunit en vieillissant. Son pédicule est cylindrique, plein, quelquefois creux vers son sommet, long de deux pouces & plus; son chapeau protubérant, campanulé ou en cône plus ou moins évasé, presque plane dans sa jeunesse, sinués ou fendu sur ses bords, strié ou rayé de jaune, vert ou biezé; ses lames d'un jaune doré, ascendantes; celles du milieu plus larges, à thérentes. Il croît en automne, dans les prés secs, sur les collines & parmi les bruyères, par touffes.

176. AGARIC déchiré. *Agaricus laceratus*. Pers.

Agaricus pileo sulcato, pallidè flavo, margine lacerato; lamellis trifidis, latissimis, basi angustis; stipite fistuloso, costato. Bolton. Fung. tab. 68. — Pers. Synopf. pag. 336.

Cet champignon est plus grand que le précédent, point charnu, assez rapproché de la division des pratelles. Son pédicule est tors, fistuleux; son chapeau d'un jaune-pâle, un peu coriace, déchiré à ses bords, garni en dessous de lames trifides, très-larges, rétrécies à leur base. Il croît dans les prés secs.

177. AGARIC couleur de cite. *Agaricus ceraceus*. Jacq.

Agaricus stipitatus, pileo hemisphaerico, levi, stipiteque subfistuloso, flavis; lamellis aquat luteolis. Wulf. in Jacq. Miscell. austr. vol. 2. pag. 105, tab. 15. fig. 2. — Pers. Synopf. pag. 336.

1. *Agaricus (hypozanthus), gregarius, dilaté fulvus, nidius, pileo planiusculo, viscoso, subobliquo; lamellis dispersis, rotundato-adenis; stipite levi*. Pers. Synopf. pag. 337.

8. *Agaricus (fistulosus), totus amovet sulcus, pileo subcarnoso, rimoso, flavo; lamellis ventricosis, subtriquetris, adscissis; stipite fulvo, utrinque longitudinaliter sulcato.* Pers. l. c.

9. *Agaricus (inflatus), gregarius, pileo planiusculo, margine subinflexo; lamellis ventricosis; stipite compresso, subincrassato.* Pers. l. c.

Ce champignon, variable dans sa grandeur & ses couleurs, s'élève à la hauteur d'un à trois pouces, sur un pédicule cylindrique, d'une épaisseur médiocre, lisse, quelquefois comprimé ou cannelé, jaunâtre, fistuleux, soutenant un chapeau d'abord hémisphérique, puis plane, à peine visqueux, quelquefois légèrement courbé à ses bords & même fendu, lisse, jaunâtre, garni en dessous de lames libres, minces, élargies, un peu ventrues, rarement adhérentes. Il croît en automne, sur les collines sèches & sur le bord des forêts.

178. *AGARIC* peau de lion. *Agaricus leoninus.* Pers.

Agaricus solitarius, pileo campanulato, carnoso, membranaceo, fragili, auro; lamellis remotis, incarnatis, margine flavis; stipite longo, deorsum subincrassato-pallidescens. Pers. Synops. pag. 337. — Id. Icon. & Descript. Fung. Fasc. 1. pag. 22. tab. 7. fig. 4. — Schœff. Fung. tab. 48.

Agaricus (chrysophæus), minor, pileo hemisphærico, levi, subcrassato, opaco; lamellis liberis, unicoloribus, incarnatis. Pers. l. c.

Son pédicule est d'un fauve-pâle, alongé, un peu renflé, soutenant un chapeau charnu, membraneux, d'abord campanulé ou hémisphérique, puis un peu plane, épais, d'un jaune assez éclatant, très-lisse, fragile, garni en dessous de lames non adhérentes, distantes, de couleur incarnate, souvent jaunâtres à leurs bords. La variété 2 est de moitié plus petite. Il croît en automne, sur les troncs & les branches tombois, dans les forêts de hêtres.

179. *AGARIC* rufule. *Agaricus rufula.* Pers.

Agaricus magnus, pileo conico, subconvexo, squamulis granuloso stipiteque solido, brevi, roseo-rubris; lamellis inaequalibus, canalicatis. Pers. Synops. p. 338. — Schœff. tab. 58.

8. *Agaricus (roseus). Stipite longo, albidus, apice tomentoso.* Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 52. — Schœff. Fung. tab. 75.

Ce champignon, qui paroît au premier aspect devoir appartenir à la division des *rufula*, s'en éloigne par ses lames inégales. C'est une espèce assez grande, dont le pédicule est court, plein, d'un rouge-rose, hérissé d'écaillés granuleuses, ainsi que son chapeau, qui d'ailleurs est convexe, un peu plane, charnu; les lames blanches. Dans

la variété 8, le pédicule est plus long, tomenteux vers son sommet.

180. *AGARIC* ionide. *Agaricus ionides.* Bull.

Agaricus pileo campanulato, demum depresso stipiteque solido rubris; lamellis subarcuatis, candidis aut sublaescentibus. Bull. Herb. tab. 535. fig. 3. — Pers. Synops. pag. 338.

Il varie un peu dans sa couleur. Son pédicule est plein, cylindrique, long d'environ trois pouces, plus ou moins roux, soutenant un chapeau d'abord campanulé, puis plane, puis légèrement concave, arrondi & entier, ensuite un peu sinué avec le centre plus foncé, quelquefois d'un jaunepâle, avec le centre & le bord violets, large de deux à quatre poices, garni de lames inégales, blanchâtres, adhérentes par leur pointe, assez sensiblement arquées.

181. *AGARIC* pur. *Agaricus purus.* Pers.

Agaricus variet coloratus, pileo conico-campanulato vel protuberantissimo, margine saporis sinuato; laminae basi pilosa; stipite pleurumque pilis numerosioribus basi ornato, per totam longitudinem fistuloso. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 180. — Persoon, Synops. pag. 339.

8. *Agaricus roseus.* Bull. Herb. tab. 162. — Sowerb. Fung. tab. 72.

8. *Agaricus janthinus.* Pers. l. c. — Batfch. Flehm. Fung. pag. 79. fig. 20. — *Agaricus roseus.* Bull. Herb. tab. 507. fig. pléique.

7. *Agaricus fuscus.* Decand. l. c. — *Agaricus roseus.* Bull. Herb. tab. 507. fig. F. G.

8. *Agaricus (purpureus), stipitatus, pileo hemisphærico, purpureo; lamellis trifidis, albis; stipite purpureo.* Pers. l. c. — Bolton. Fung. pag. 41. tab. 41.

6. *Agaricus (cæsius), pileo planiusculo, opaco, dilute casto; lamellis albidis.* Pers. l. c.

« La forme, dit M. Decandolle, la grandeur & surtout la couleur de cette espèce varient beaucoup. On en voit de roses, de pâilles, de bruns, de rouges, de blanchâtres. Il s'élève quelquefois à sept pouces & plus; quelquefois il n'a pas plus de deux pouces. Son chapeau est tantôt conique, tantôt un peu en cloche, quelquefois absolument plane. Les bords en sont entiers, le plus souvent sinués. Son pédicule est quelquefois glabre, & très-souvent hérissé de poils nombreux à sa base. On peut cependant le distinguer aux caractères suivants : son pédicule est toujours nu, cylindrique, fistuleux dans toute sa longueur. Son chapeau a peu de chair; la surface légèrement humide. Ses feuillets sont nombreux, inégaux, un peu adhérents au pédicule, marqués de veines à

leur bise ; en sorte que, si on les regarde à travers du jour, ils offrent un réseau lentille. Cette espèce croît dans les bois, en automne. »

182. AGARIC couleur de chair. *Agaricus carneus*. Bull.

Agaricus subparvus, pileo carnoso, convexo, subflexuoso, carneo, rufo ; lamellis confertis, adnatis, albis ; stipite medio, subincrassato, concoloro. Bull. Herb. tab. 533. fig. 1. — Persoon, Synopf. pag. 340.

Ce champignon est petit, d'une couleur de chair tirant un peu sur le roux. Son chapeau est compacte, d'abord hémisphérique, régulier, ensuite convexe, souvent irrégulier, fin ou finué, large d'un pouce & plus, garni de feuillets innombrables, blanchâtres, attachés au haut du pédicule : celui-ci est plein, cylindrique, glabre, fibreux, long d'environ deux pouces, de la même couleur que le chapeau. Il croît parmi les gazon.

183. AGARIC jaune-violet. *Agaricus crococalleus*. Pers.

Agaricus subparvus, pileo subcarnoso, obtusè umbonato, dilute caruleo ; lamellis convexis, incarnato-crocatis seu ochraceis ; stipite fistuloso, albedo. Pers. Synopf. pag. 34. — Id. Icon. & Descript. Fung. pars 2. tab. 1. fig. 2.

Ce champignon est petit, d'une saveur amère. Son pédicule est fistuleux, blanchâtre ; son chapeau médiocrement charnu, étalé, à peine saillant à son centre, d'un bleu clair, garni en dessous de lames convexes, couleur de chair ou ocracées, à peine adhérentes au pédicule. Il croît à l'ombre, dans les forêts, sur la terre.

184. AGARIC réticulé. *Agaricus reticulatus*. Pers.

Agaricus major, pileo fragili, subviscoso, dilute violaceo, reticulato, subumbilicato ; lamellis dilute croceis ; stipite fistuloso, albedo. Pers. Ic. & Descript. Fung. pars 2. pag. 13. tab. 4. fig. 4. 5 & 6, & Synopf. Fung. tab. 34.

Son pédicule est cylindrique, fistuleux, blanchâtre, aminci, strié vers son sommet, un peu fibreux, soutenant un chapeau fragile, légèrement visqueux, d'un violet-clair, réticulé, convexe, à peine protubérant à son centre, puis un peu concave, acquérant une couleur noire en vieillissant ; garni en dessous de lames horizontales, d'un jaunâtre pâle, adhérentes au pédicule. Cet agaric est assez grand ; il croît aux lieux montagneux, sur le tronc des arbres.

185. AGARIC bistre-violet. *Agaricus camorphus*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, subhemispharico, molli, subconspicuo, dilute fuliginoso ; lamellis confertis, tenuibus, ex d. lat. violaceo, argillaceis ; stipite longiusculo, violaceo-albido. Pers. Synopf. pag. 342.

Son pédicule est cylindrique, fragile, allongé, d'un violet très-pâle, presque long de trois pouces, épais de trois lignes, supportant un chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe, un peu mou, d'environ d'un bistre-clair, puis d'un violet-pâle, enfin de couleur brune ; large de deux ou trois pouces, garni en dessous de lames nombreuses, minces, horizontales, un peu décurrentes, légèrement dentées à leurs bords, d'un violet-faible, un peu terreux. Il croît en automne, dans les bois de hêtres.

186. AGARIC recourbé. *Agaricus incurvus*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, umbonato, dilute violaceo ; lamellis subconcoloribus ; stipite caudato, tomentoso, deorsum incurvo. Pers. Ic. & Descript. Fung. pag. 23. tab. 9. fig. 5, & Synopf. pag. 341.

Son chapeau est charnu, campanulé, large d'un pouce & demi, proéminent à son centre, d'un violet clair, soutenu par un pédicule tomenteux, allongé en queue, recourbé, d'un blanc-pâle, pourpre vers son sommet ; les lames adhérentes au pédicule, blanchâtres ou d'un violet très-clair. Il croît dans les forêts de hêtres, parmi les feuilles tombées.

187. AGARIC incarnat-griffâtre. *Agaricus dichrous*. Pers.

Agaricus pileo subcarnoso, umbonato, violaceo ; lamellis griseis, pulverulentis ; stipite subfarinaceo, pileo diluore. Pers. Synopf. pag. 343.

Il s'élève à la hauteur d'un pouce & demi, sur un pédicule épais d'une ligne & demi, un peu ferme, presque plein, d'un violet très-clair, presque pulvérulent, soutenant un chapeau médiocrement charnu, proéminent à son centre, large de quatre à six lignes, violet, un peu rouffé à son sommet, garni de lames nombreuses, presque adhérentes, griffâtres, un peu couleur de chair. Il est rare, & croît solitaire sur la terre.

188. AGARIC de couleur brillante. *Agaricus enchrous*. Pers.

Agaricus caspitifolius, truseigenus, obscurè violaceus, pileo campanulato, subumbilicato, squamuloso, demum fuliginoso ; lamellis ventricosus, stipite crassiusculo. Pers. Synopf. pag. 343.

Ce champignon, dans son jeune âge, a une vacuité de couleur très-agréable ; il est d'un violet-foncé. Son pédicule est d'abord épais, puis grêle, transparent, large d'un pouce ; son chapeau campanulé, légèrement ombilicé, un peu écaillé,

passant à une couleur bistrée; les lames ventrues. Il croît en gazon, dans les forêts, sur le tronc des aulnes.

189. AGARIC couleur d'acier. *Agaricus chalybeus*. Pers.

Agaricus pileo subcarnoso, campanulato, subsquamuloso, primis chalybeo, demum nigrescente-cinereo; lamellis purpurascens-cinereis, stipite subtenui, pileo concolore. Pers. Synopf. pag. 383.

Agaricus columbarinus. Sow. Fung. tab. 161. — Bull. Herb. tab. 405. ?

Son pédicule est plein, cylindrique, un peu grêle, de la même couleur que le chapeau qu'il soutient. Celui-ci est médiocrement charnu, campanulé, un peu écaillé, d'abord d'un bleu d'acier, puis noirâtre, un peu cendré, larme d'un ponce, glabre & convexe dans sa jeunesse; les lames un peu flexueuses, d'un pourpre cendré. Ce bel agaric croît en automne, parmi les gazons, sur les collines.

190. AGARIC bleu-vert-foncé. *Agaricus atro-cyanus*. Pers.

Agaricus pileo submembranaceo, campanulato, fibrilloso, griseo, caelo; lamellis distinctis, purpurascens; stipite crassifuto, viridi-caelo (aerullo). Pers. Synopf. pag. 344.

C'est une jolie espèce d'un beau bleu. Son pédicule est légèrement comprimé, d'un vert-bleuâtre, long d'un pouce & demi, épais de deux à trois lignes, soutenant un chapeau large d'un pouce, légèrement membraneux, campanulé, d'un bleu un peu cendré, à fibres longitudinales; garni de lames libres, d'abord d'un bleu un peu blanchâtre, ensuite pourpre. Il croît dans les prairies des montagnes; il est rare.

191. AGARIC glauque. *Agaricus glaucus*. Bull.

Agaricus pileo carnoso, membranaceo stipiteque caelo; lamellis submarginatis, roseis, latiusculis. Bull. Herb. tab. 511. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 345. var. γ.

α. *Agaricus (salicinus), pileo subcarnoso, beryllo; lamellis liberis, roseis; stipite solido, fibrilloso, albido-caruleo.* Pers. Ic. & Descript. Fung. Fasc. 1. pag. 9. & Synopf. pag. 344.

β. *Agaricus (beryllus), pileo molli, crassifuto; disco roseo, cinereo; vitiis nigrescentibus; lamellis confertis, latis, carneis; stipite brevi, albido; fibris subvirescentibus.* Pers. l. c. pag. 344.

Cet agaric varie dans la couleur & même dans la grandeur. Son pédicule est grêle, nu, cylindrique, long de deux à quatre pouces, ordinairement d'un blanc-cendré. Son chapeau est peu charnu,

d'abord hémisphérique, puis convexe, souvent fendu sur les bords, large de deux pouces & plus, de couleur glauque, tirant sur le brun, irisé de noir, souvent tacheté de noir à son sommet, garni en dessous de lames d'argiles, de couleur rougeâtre, échancrées du côté du pédicule. Il croît solitaire sur le tronc des arbres, sur ceux des faibles & des aulnes.

192. AGARIC à lames étroites. *Agaricus angustius*. Pers.

Agaricus foliarius, subparvus, pileo carnoso, subumbonato, convexo, caelo, subvirescente; lamellis angustis, arcuatis, incarnatis; stipite solido, basi villosa, subconcolore. Pers. Synopf. pag. 345.

Son pédicule est plein, velu & un peu courbé à sa base, long de deux pouces, épais d'une ligne & demie, de la même couleur que le chapeau, qui est d'un bleu-verdâtre, large de neuf lignes, charnu, convexe, protubérant à son centre, garni de lames étroites, arquées, un peu décurrentes sur le pédicule, de couleur incarnate. Il croît parmi les feuilles mortes. On le distingue de l'*agaricus polius* par son chapeau plus charnu, & par son sommet non ombiliqué.

193. AGARIC argenté. *Agaricus agyraceus*. Bull.

Agaricus pileo subulicante, lunato; squamulis cinereo-nigrescentibus; lamellis stipiteque longifido cuneatis. Bull. Herb. tab. 423. fig. 1. & 513. fig. 2.

Agaricus myomyces, var. β. Persoon, Synopf. pag. 346.

β. *Agaricus (myomyces), gregarius, pileo carnoso, umbonato, squamoso, cinereo; lamellis stipiteque glabro, albido-cinereis.* Pers. Synopf. pag. 345. var. α.

γ. *Agaricus (scioites), pileo stipiteque brevi, subulato, squamuloso.* Pers. l. c. var. γ.

δ. ? *Agaricus (pardinus), pileo carnoso, campanulato, squamoso; squamis badiolividis, nigrescentibus; lamellis candidis; stipite solido, fibrilloso, albido.* Pers. Synopf. l. c. var. δ.

Cet agaric varie dans ses couleurs. Son pédicule est plein, cylindrique, blanc ou un peu brun, long d'environ trois pouces; il supporte un chapeau d'abord conique, puis plans, un peu concave, le centre prominent, d'abord simplement linéé à ses bords, puis un peu fendu ou lobé, laineux ou drapé dans la jeunesse, large de près de quatre pouces, d'un gris-obscure, surtout à son sommet. Sa couleur s'affaiblit avec l'âge, & se repand par petites mouchetures sur la surface du chapeau, dont le fond est blanc, luisant, comme argenté. Les feuilles sont libres, nombreuses, blanchâtres, irrégulièrement crenelées. Bulliard en a observé une

variété dont le chapeau est gris & uni. La variété à forme presque une espèce distincte. Son chapeau est campanulé, d'un gris-cendré, couvert d'écaillés pileuses, qui noircissent avec l'âge; les lames blanches, souvent rongées, larges de trois à quatre lignes; le pédicule plein, fibreux, blanchâtre. Cet agaric croît souvent par groupes, dans les bois, sur la terre.

194. AGARIC mélangé. *Agaricus meleagris*. Sowb.

Agaricus pileo subconoso, planiusculo, squamis sposis, nigrescentibus; stipite solido, decursum nigrescente; radice reticulata. Sowb. Fung. tab. 171. — Perf. Synopf. pag. 347.

Son pédicule est plein, long de trois pouces, un peu ventru, réticulé à sa racine, noirâtre en dehors; il soutient un chapeau d'abord convexe, puis plane, médiocrement charnu, d'un blanc-livide, couvert de taches noires, un peu rougeâtre en dedans & à ses bords; il noircit en vieillissant. Ses lames sont presque entièrement libres, d'un blanc-sale. Ce champignon a été observé en Angleterre.

195. AGARIC obscur. *Agaricus obscurus*. Perf.

Agaricus parvus, pileo subconoso, convexo, umbonato, squamoso, fuliginoso; lamellis totiusculis, plano-obscendentibus, olivaceo fuliginosis; stipite solido, longo, fibrilloso. Perf. Synopf. pag. 347.

Ce champignon est petit; son chapeau médiocrement charnu, convexe, proéminent à son centre, large de neuf lignes, écailléux, comme enfumé, soutenu par un pédicule long de trois pouces, épais de deux lignes, plein, fibreux, blanchâtre & velu à sa base, un peu rougeâtre en dedans, d'un blanc lavé de noir en dehors. Les lames sont un peu épaisses, larges, planes, ascendantes, blanchâtres à leurs bords. Il croît aux lieux montueux, parmi les pins.

196. AGARIC plumeux. *Agaricus plumosus*. Bolt.

Agaricus pileo hemispherico (squamis), plumoso, murino; lamellis crispis, albis; stipite longo (tenui), plumoso. Bolt. Fung. pag. 33. tab. 33. — Perf. Synopf. pag. 347.

Son pédicule est plein, cylindrique, grêle, de couleur grise, souvent ondulé, long de quatre pouces, épais d'une ligne & plus, couvert d'écaillés pileuses; il supporte un chapeau large d'un pouce & demi, hémisphérique, de même couleur que le pédicule; les écaillés imbriquées à la circonférence. Les lames sont tristes & blanchâtres. Il croît en Angleterre, dans les forêts.

197. AGARIC cendré-obscur. *Agaricus atrocinereus*. Perf.

Agaricus pileo carnoso, obtuso umbonato, cinereo-umbone nigrescente, glabro; lamellis aquoso-lividis, emarginato-adsessis; stipite solido, glabro. Perleoon, Synopf. pag. 348.

Son odeur & sa saveur ne font point désagréables. Son pédicule est plein, glabre, fibreux, long d'un pouce & demi, épais d'un pouce; le chapeau charnu, peu protubérant, obtus, d'un gris-cendré, noirâtre à son disque, large d'un pouce, garni en dessous de lames tristes, échancrées, un peu conniventes, d'un blanc-pâle. Il croît dans les forêts de pins.

198. AGARIC enfumé. *Agaricus fumosus*. Perf.

Agaricus gregaris, rigidus; pileo carnoso, glabro, planiusculo, nigrescente fuliginoso; lamellis confertis, stipiteque solido, fuliginoso-albidis. Perf. Synopf. pag. 348.

Ce champignon est d'une consistance presque cartilagineuse, d'une saveur amère. Son pédicule est long de deux ou trois pouces, plein, d'un blanc lavé de noir, soutenant un chapeau glabre, charnu, d'abord convexe, puis plane, noirâtre, comme enfumé, garni en dessous de lames nombreuses, de même couleur. Il croît par groupes dans les forêts, parmi les gazons.

199. AGARIC à gros pied. *Agaricus dactylus*. Perf.

Agaricus subcapitosus, pileo carnoso, convexo, murino; lamellis stipiteque solido, tomentoso-condatis. Perf. Synopf. pag. 348.

Son pédicule est plein, blanchâtre, épais, long de deux pouces, ferme, couvert assez souvent d'un duvet court, touffu; il supporte un chapeau charnu, convexe, d'un gris de souris, ferme, large de trois pouces; présentant assez souvent un réseau élégant, garni en dessous de lames blanchâtres, fermes, échancrées, conniventes, larges de trois lignes. Il croît sur le tronc des chênes. Son odeur est forte & rebutante; sa saveur amère.

200. AGARIC nébuleux. *Agaricus nebularius*. Batsh.

Agaricus gregaris, firmus, pileo pulverinato, umbonato, cinereo-livido; lamellis confertis, subarcuantibus, pollescentibus; stipite solido, subuloso, cinereo-albido. Perf. Synopf. pag. 349.

Agaricus nebularius. Batsh. Elem. Fung. fig. 193. (Nondum evoluto.)

Agaricus mollis. Bolt. Fung. tab. 40.

Sa consistance est ferme; son pédicule allongé, plein, légèrement bulbeux, d'un blanc-cendré, fistuleux dans la vieillesse, & d'un blanc-coton-

neux. Il supporte un chapeau un peu convexe, proéminent à son centre, d'un cendré livide, garni en dessous de lames nombreuses, un peu décourantes sur le pédoncule, étroites, d'un blanc-pale. Il croît dans les bois de pins, par groupes, pendant tout le courant de l'automne.

201. AGARIC tanné. *Agaricus pallus*.

Agaricus gregarius, *durus*, *pileo carneo*, *convexo*, *plano*, *nigrescente-livido*; *lamellis confertis*, *adnexis*, *stipite* *solido candido*. Pers. Synopf. pag. 349.

Sa saveur est un peu douceâtre. Sa couleur & son chapeau aplatissent le distinguant du précédent. Son pédoncule est long de trois ou quatre pouces, épais d'un demi-pouce, dur, plein, de couleur blanche. Son chapeau charnu, d'abord convexe, puis plane, élastique, large de quatre pouces, d'un noir plombé; les lames nombreuses, adhérentes, lancéolées, larges de deux ou trois lignes. Il croît dans les forêts.

202. AGARIC de plusieurs couleurs. *Agaricus multicolor*. Pers.

Agaricus magnus, *pileo carneo*, *convexo-plano*, *fuligineo-cinereo*; *lamellis subulnatis*, *astinendis*, *pallidis*; *stipite subbulbo*, *solido*, *fistilloso*, *candido*. Pers. Synopf. pag. 350.

Son pédoncule est plein, fibreux, blanchâtre, un peu bulbeux, long de quatre pouces, épais d'un pouce; son chapeau charnu, d'abord convexe, puis plane, large de quatre pouces, de couleur cendrée, enfumée; les lames libres, presque conniventes, blanches, un peu arrondies, larges d'un demi-pouce. Il croît dans les forêts.

203. AGARIC enflé. *Agaricus tumidus*. Pers.

Agaricus pileo carneo, *convexo*, *plano*; *lamellis distantibus*, *latis*, *candidis*; *stipite longo*, *tumido*. Pers. Synopf. pag. 450.

Son pédoncule est légèrement ventru, plein, un peu strié, fusiforme à sa base, très-souvent irrégulier; son chapeau charnu, d'abord convexe, puis plane, glabre, large de trois à quatre pouces, presque sans fentes; les lames distantes entr'elles, fragiles, larges d'un demi-pouce, de couleur blanche. Il croît sur la terre, dans les terrains sablonneux; il est rare.

204. AGARIC astringent. *Agaricus astringens*. Pers.

Agaricus pileo subcarneo, *convexo-plano*, *fuligineo-cinereo*; *lamellis confertis*, *tenuibus*, *subdecurrentibus*, *candidis*; *stipite longo*, *elastico*, *substriato*, *basi subbulboso*. Pers. Synopf. pag. 350.

An agaricus placenta? Batsch. Elem. Fung. pag. 79. tab. 5. fig. 18.

Sa saveur est astringente, un peu styptique; son pédoncule plein, élastique, long de deux ou trois pouces, droit, puis couronné, légèrement strié, un peu bulbeux à sa base, d'une couleur cendrée, enfumée. Il supporte un chapeau large d'un pouce & plus, un peu charnu, convexe, puis plane, très-glabre, un peu protubérant, presque spongieux, de la même couleur que le pédoncule, garni de lames nombreuses, minces, larges d'une ligne & demie, décourantes, d'abord blanches, puis incarnates. Il croît dans les forêts, où il est rare.

205. AGARIC noir & blanc. *Agaricus sephroleucus*. Pers.

Agaricus pileo subcarneo, *convexo-plano*, *squamuloso*, *livido*, *fuliginoso*; *lamellis planis*, *subdecurrentibus*, *astinendis*, *niveis*; *stipite longo*, *solido*, *albo*; *squamulis nigris*. Pers. Synopf. pag. 451.

Agaricus discors? Batsch. Elem. Fung. tab. 34. fig. 196.

Son pédoncule est plein, de couleur blanche, long d'un à deux pouces, épais de deux lignes, couvert d'écaillés noirâtres, soutenant un chapeau un peu charnu, convexe, puis plane, modérément proéminent, large d'un pouce, d'un gris livide, écaillieux, d'une couleur plus foncée à son centre, garni en dessous de lames libres, un peu décourantes, larges d'une à deux lignes, d'un blanc de neige. Il croît sur la terre, dans les bois de pins.

206. AGARIC en groupes. *Agaricus comitialis*. Pers.

Agaricus gregarius, *pileo carneo*, *convexo-plano*, *stipite* *conico*, *nigrescente-fuligineo seu livido*; *lamellis confertis*, *plano decurrentibus*, *niveis*. Pers. Synopf. pag. 352.

Il est d'un aspect assez agréable. Son pédoncule est glabre, long de deux ou trois pouces, élastique, un peu ventru, puis aminci, d'un noir enfumé, ainsi que le chapeau. Ce dernier est charnu, surtout à son disque, conique, puis plane, excepté à son centre, large de deux pouces, garni de lames nombreuses, plates, décourantes, d'un blanc de neige, plus pâles en vieillissant, rétrécies à leurs deux extrémités. Il croît dans les prairies un peu humides des montagnes; quelquefois solitaire, plus souvent par groupes circulaires.

207. AGARIC porte-gland. *Agaricus glandifer*. Pers.

Agaricus pileo carneo, *umbonato*, *campanulato*, *cinereo-livido*; *lamellis distantibus*, *plano-decurrentibus*.

tibus, candidis; stipite longo, albedo-cinereo. Persf. Synopf. pag. 252.

Son pédicule est plein, long de trois pouces, épais de trois lignes, tantôt blanchâtre, tantôt plombé, aminci ou renflé, soutenant un chapeau charnu, campanule, large d'un pouce & demi, d'un cendré-roncé, son centre s'élevant en une protubérance de la forme d'un gland, large d'un demi-pouce; les lames distantes, décourantes, planes, très-blanches. Il croît dans les forêts de pins.

208. AGARIC porte-masse. *Agaricus clavipes.* Persf.

Agaricus pileo carnoso, subumbonato, cinereo-livido; margine albicante; lamellis arcuatis, decurrentibus, albidis; stipite solido, obversè clavato. Persf. Synopf. pag. 355.

Il n'a presque point de saveur. Son pédicule est plein, long d'un pouce & demi à deux pouces, épais de deux ou trois lignes, un peu blanchâtre & cotonneux à sa base, en masse renversée, de couleur plombée, droit ou courbé, soutenant un chapeau large d'un pouce, charnu, un peu protubérant, cendré, blanchâtre à ses bords, convexe, puis entièrement plane, même à son centre; les lames arquées, un peu décourantes, blanches, puis d'un blanc-sale. Il croît en automne, dans les forêts de hêtres.

209. AGARIC à points noirs. *Agaricus atropunctus.*

Agaricus (squarrosus), rufescens, pileo hemispharico, regulari, demum convexo vel plano, sinuoso, margine squamis albidis terminato; stipite basi incrassato, squamoso; squamulis cretatis, acuminatis. Bull. Herb. tab. 535. fig. 3.

Agaricus (atropunctus), gregarius, parvus, pileo subcarnoso, convexo, dilute cinereo; lamellis distantibus, arcuatis, decurrentibus; stipite nitido; squamulis punctiformibus, nigris. Persoon, Synopf. pag. 353. ?

Ce champignon, ordinairement de couleur fauve, quelquefois blanchâtre ou jaunâtre, s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces, sur un pédicule fistuleux, cylindrique, souvent un peu renflé & velu à sa base, hérissé d'écaillés droites, aiguës, plus ou moins nombreuses, soutenant un chapeau d'abord hémisphérique & régulier, ensuite convexe ou plane, bordé d'écaillés blanchâtres. Les lames sont nombreuses, inégales, un peu décourantes, d'un fauve-clair. Il croît par groupes sur la terre, dans les forêts. L'*agaricus atropunctus* de Persoon est un peu différent de celui-ci. Ses lames sont bien moins nombreuses. Ses écaillés ressemblent à des points noirs; son chapeau, d'un cendré-clair.

210. AGARIC papilleux. *Agaricus pustulatus.* Persf.

Agaricus pileo carnoso, subflexuoso, viscoso, cinereo livido, obtusè umbonato, papillis viscosis orisito; lamellis subdecurrentibus stipiteque squamuloso candidis. Persf. Synopf. pag. 354.

3. *Agaricus (confimilis), pileo hemispharico, planiusculo, subviscido, alutè cinereo; lamellis distantibus, subdecurrentibus, candidis; stipite solido, longiusculo, albicante; squamulis cinereis.* Persoon, l. c.

7. *Agaricus (brevis), solitarius, glaber, pileo convexo-nigrescente, subviscoso; lamellis distantibus, subdecurrentibus stipiteque brevi albis.* Persoon, l. c.

Cet agaric, un peu variable dans ses couleurs & sa forme, est pourvu d'un pédicule souvent courbé ou un peu flexueux, haut de trois pouces, un peu écaillé, principalement vers son sommet, plein, de couleur blanche, soutenant un chapeau charnu, visqueux, cendré, un peu sinuueux à ses bords, couvert de petites pustules visqueuses, large d'un demi-pouce, peu élevé à son centre, garni en dessous de lames un peu décourantes, larges d'une à deux lignes, blanchâtres. Dans la variété 3, la couleur est plus claire, les écaillés cendrées. Le pédicule n'a qu'un pouce de long dans la plante 7; le chapeau large d'un pouce, blanchâtre à ses bords; les lames minces, à peine larges d'une ligne. Il croît sur la terre, dans les forêts.

211. AGARIC à lames transverses. *Agaricus limacinus.* Persf.

Agaricus pileo carnoso, subangusto, plano-convexo, glutinoso, olivaceo-fulgente, nigrescente; lamellis decurrentibus, candidis; stipite solido, nudo, transversim rimoso; pileo concolore, apice nigro. Persf. Synopf. pag. 355.

Son pédicule est long de deux à trois pouces, un peu ferme, plein, nu, de même couleur que le chapeau, d'un blanc de neige à son sommet, visqueux, marqué de ridés transverses, soutenant un chapeau large d'un à deux pouces, charnu, convexe, puis plane, glauque, de couleur olive enfumée, puis noir; les lames decourantes sur le pédicule, uniformes, médiocrement séparées, blanchâtres. Il croît parmi les hêtres.

212. AGARIC mélanque. *Agaricus melaleuca.* Persf.

Agaricus fragilis, pileo planiusculo, nigrescente-fulgente, glaberrimo, obtusè umbonato; lamellis confertis, subadnexis, latiusculis, alutis; f. l. longiusculo, basi incrassato. Persf. Synopf. pag. 355.

Il est d'une consistance spongieuse. Son pédi-

cule est glabre, fibreux en dedans, alongé, quelquefois balbeux à sa base, soutenant un chapeau large d'un pouce & demi, d'abord convexe, puis un peu aplati, très-glabre, d'un noir de bistre, élargi, peu saillant à son centre, garni de lames nombreuses, épaisses, un peu lanceolées, presque conniventes, blanchâtres, puis pâles. Il croît parmi les pins.

213. AGARIC gris de souris. *Agaricus murinaeus*, Bull.

Agaricus pileo umbrino, nigrescente, subinciso, centro interdum rufescente; striis nigris, interjectis; laminae griseis, sinuosis, basi intus emarginatis, latissimis, densis & stipite pleno, sulcato, K' sero; striis nigrescentibus, sparsis, Bull. Herb. tab. 320.

3. *Agaricus (nitratum), rigidus, nigrescente-umbrinus, pileo subcarneo, convexo-plano, subinciso; lamellis distantibus, ventricosus, subadnexis; stipite cavo, fusco sord.* Pers. Synops. pag. 356.

Ce champignon est pourvu d'un pédicule plein, nu, cylindrique, quelquefois sillonné, de couleur griseâtre, avec des stries noires, épaisses & long de trois pouces & plus, épaiss de sept à huit lignes, soutenant un chapeau orbiculaire, souvent inné avec son fût, convexe dans sa jeunesse, grisâtre avec des stries noires, quelquefois roux à son centre, large de quatre à cinq pouces; sa chair blanche, ferme, très-fragile; les lames libres, nombreuses, inégales, grises, sinuées, échancrées à leur base, remarquables par leur largeur & leur épaisseur. Il croît en automne, sur la terre, dans les bois de haute futaie.

La plante se parait n'être qu'une variété de la précédente; elle en diffère par son pédicule fistuleux, lacuneux, épais d'un pouce; son chapeau large de trois à quatre pouces, d'abord campanulé, puis un peu plane, d'une couleur approchant de celle de l'acide vitreux, d'un gris-noirâtre; les lames, de couleur d'olive après qu'elles ont perdu les petites taches aqueuses qui les recouvrent. Elle croît sur les montagnes, parmi les gazons.

214. AGARIC cartilagineux. *Agaricus cartilagineus*, Bull.

Agaricus pileo nigrescente, subdifformi, undulato; lamellis alutaceis, rotundatis, confertis; stipite solide, subcereo, striis rubescentibus variegato, Bull. Herb. tab. 389. fig. 2. — Pers. Synops. p. 356.

Il paraît, d'après Bulliard, que cette espèce est d'une consistance cartilagineuse. Son pédicule est plein, long de trois pouces, cylindrique, d'un blanc-cendré, marqué de petites stries rougeâtres, excepté à la base. Il supporte un chapeau noirâtre, convexe, sinueux & ondulé, difforme, large d'en-

viron quatre pouces, garni de lames d'un jaune-pâle, inégales, chargées à leur base, adhérentes à leur sommet. Il croît solitaire, sur la terre.

215. AGARIC livide. *Agaricus lividus*, Bull.

Agaricus pileo griseo, livido, nitido, lvi, concentricis zonis aequantibus notato, primum campanulato, dein plano; laminae r-bris, subsinuosis; si pite albis, rufescente, pleno, basi truncato, Bull. Herb. tab. 382.

Ce champignon est pourvu d'un pédicule plein, nu, cylindrique, d'un blanc-fale, quelquefois taché de rouge, un peu ridé à sa base, charnu, long d'environ quatre pouces, épais de cinq lignes, soutenant un chapeau d'un gris-livide, quelquefois marqué de zones concentriques, listé & même luisant, d'abord campanulé, puis plane, large de quatre à cinq pouces, garni de lames nombreuses, libres, inégales, un peu sinuées, échancrées à leur base, d'un rouge semblable au fruit de la pomme d'amour, produisant une poussière de la même couleur. Il croît sur la terre, dans les bois, solitaire, à la fin de l'été.

216. AGARIC à tête blanche. *Agaricus leuccephalus*, Bull.

Agaricus totus albus, pileo primum sphaerico, campanulato, plano, margine sinuoso; laminae stridis, subsistentibus; stipite ple.o, subcereo, dein nigro, maculato, Bull. Herb. tab. 438. fig. 1, 2. tab. 336.

Sa couleur est blanche, surtout dans sa jeunesse. Son pédicule est cylindrique, plein, charnu, long de trois à quatre pouces, quelquefois un peu ridé de brun; il supporte un chapeau d'abord sphérique, puis campanulé, puis plane, souvent sinués à sa circonférence, large de trois à quatre pouces, d'une consistance ferme, quelquefois un peu brun ou fauve à son centre, garni en dessous de lames nombreuses, minces, adhérentes, de couleur blanche. Il croît par petits groupes ou solitaire, au printemps & en automne, dans les bois.

217. AGARIC velouté. *Agaricus villosus*, Bull.

Agaricus pileo violaceo, pubescente; laminae aurantiacis; stipite cylindrico, plano, candido, Bull. Herb. tab. 214.

Son pédicule est plein, cylindrique, de couleur blanche, long de trois pouces & plus, soutenant un chapeau un peu ovale ou campanulé, puis convexe, souvent sinués à ses bords, légèrement velouté, de couleur violette, blanc en dedans, large d'environ deux pouces, garni de lames inégales, d'abord blanches, puis orangées ou rougeâtres, libres, plus étroites vers le pédicule. Il croît en automne, sur les morceaux de bois pourris.

218. AGARIC pupitre. *Agaricus platensis*, Pers.

Agaricus

Agaricus pileo glabro, subcarnoso, umbonato, rugoso, nigrescente-fulgineo; lamellis confertis, liberis, primò albis, dein roseis; stipite solido, albo; fibris nigrescentibus. Persl. Synopf. pag. 157. — Id. Icon. & Descript. Fung. pag. 8. — Batich. Elem. Fung. pag. 79. & Cont. pag. 77. fig. 76.

Agaricus cervinus. Schæff. Fung. tab. 10.

h. Agaricus (rigens), pileo subcarnoso, fragili, planiusculo, cinereo; disco squamuloso; lamellis liberis, latiusculis; stipite tenui, cavo, subhorisolo, oblique; fibrillis nigrescentibus. Persl. l. c.

Son pédicule est plein, ferme, blanchâtre, traversé par des fibres noires, soutenant un chapeau glabre, très-mou, un peu charnu, ridé, d'abord campanulé, puis conique, noirâtre, enflumé, garni de lames nombreuses, libres, assez larges, distantes du pédicule, d'abord blanches, puis couleur de rose. La variété *h*, diffère de la précédente par sa petite taille, par le disque de son chapeau couvert de petites écailles; par son pédicule fistuleux, long à peine d'un pouce & demi, épais de deux lignes. Le chapeau est spongieux, mince, large d'un pouce & plus. Il croît en automne, sur le tronc des arbres.

219. AGARIC nain. *Agaricus nanus.* Persl.

Agaricus mollis, fragilis, parvus, pileo glabro, planiusculo, rugoso, subumbonato, umbrino; lamellis convexis, subliberis, albidoincarnatis; stipite solido, mediocri, Jordide albo (incurvo). Persl. Synopf. pag. 358.

Il est remarquable par sa petitesse. Son pédicule est long d'environ un pouce, épais d'une ligne, glabre, plein, d'un blanc-sale, quelquefois un peu courbé; son chapeau large à peine d'un demi-pouce, glabre, tendre, d'abord un peu ridé, puis filonné, presque plane, très-peu saillant à son centre, d'une couleur brune, terreuse; garni de lames convexes, larges d'une ligne & demie, blanches, puis incarnates, se détachant aisément du pédicule. Il croît en automne, dans le creux des arbres.

220. AGARIC parasol. *Agaricus umbrosus.* Persl.

Agaricus pileo conoso, membranaceo, planiusculo, rugoso, squamuloso, nigrescente-umbrino, margine piloso; lamellis confertis, latissimis, roseis, liberis; stipite solido, alvido. Persl. l. c. & Descript. Fung. tab. 2. fig. 5, & Synopf. pag. 358.

Il diffère de l'*Agaricus platycus* par son chapeau plus aplati, écailleux, pileux à ses bords; il est d'ailleurs charnu, membraneux, ridé, d'un noir-brunâtre, soutenu par un pédicule plein, blanchâtre. Les lames sont nombreuses, libres, très-larges, couleur de rose. Il croît à l'ombre, sur la terre, parmi les hêtres; il n'est pas commun.

Botanique. Supplément. Tome I.

221. AGARIC à soies courtes. *Agaricus ferricellus.* Persl.

Agaricus subparvus, pileo carnoso, convexo, plano, submentoso, molli, nigricante-fusco; stipite solido, sublacunoso, concolore; lamellis candidis. Persl. Synopf. pag. 358.

Ses lames sont blanches; son pédicule, ainsi que le chapeau, d'un brun-noirâtre, blanc en dedans & à sa base, plein, un peu lacuneux, long d'un pouce & plus, soutenant un chapeau charnu, d'abord convexe, puis plane, mou, large d'un pouce, un peu mamelonné, légèrement cotonneux & suyeux. Il croît sur la terre.

222. AGARIC luisant. *Agaricus nitens.* Batich.]

Agaricus fragilis, pileo subcarnoso, planiusculo, ruguloso, submentoso, nigrescente-umbrino, margine inaequali; lamellis ventriosis, glauco-irides; stipite brevi, subalbicante. Batich. Elem. Fung. 2. pag. 21. tab. 192. — Persl. Synopf. pag. 359.

Cet agaric est d'une consistance fragile. Son pédicule est court, un peu blanchâtre; son chapeau médiocrement charnu, un peu plane, ridé, flexueux, un peu cotonneux, d'un noir-brun, inégal à ses bords, couvert de très-petites papilles lorsqu'on l'examine à la loupe; les lames ventrues, un peu fortes, d'un glauque-cendré, se détachant du pédicule. Il croît vers la fin de l'automne, sur les montagnes arides.

223. AGARIC des crapauds. *Agaricus bufonius.* Persl.

Agaricus pileo rugoso, umbrino, subnigrescente; lamellis alutaceo-pallidis; stipite longo, submentoso; pileo concolore. Persl. Synopf. pag. 359.

Son pédicule est légèrement tomenteux, de couleur terreuse-noirâtre, long de trois pouces, épais de deux lignes, blanchâtre à sa base, soutenant un chapeau ridé, large d'un pouce, à peine proéminent à son centre, de la même couleur que le pédicule, garni de lames un peu décurrentes, d'un fauve très-pâle, luisantes. Il croît dans la forêt d'Hercynie.

224. AGARIC à large chapeau. *Agaricus omphus.* Persl.

Agaricus castiposus, pileo subcarnoso, convexo, glabro, nigrescente-fulgineo; lamellis confertis, totis adnexis, aequalis-cinereis; stipite longo, crassiusculo, glabro, albo. Persl. Synopf. pag. 359.

Il s'élève à la hauteur de six pouces, sur un pédicule glabre, blanchâtre, épais d'un pouce, un peu tomenteux à sa base, soutenant un chapeau très-glabre, un peu charnu, convexe, d'un noir-brunâtre, large de quatre à six pouces, garni de lames nombreuses, larges de trois lignes, con-

B b

ventes, légèrement décurrentes sur le pédicule, un peu denticulées, d'un cendré-clair. Il croît dans les bois de pins.

215. AGARIC à tige basse. *Agaricus humilis*. Perf.

Agaricus gregarius, pileo carnoso, latissimo, fuscescente; disco subdepresso, oboleto squamuloso; lamellis planiusculis, confertis, aequalibus; stipite brevissimo, sursum incrassato, cinerofescente. Perfoon, Synopf. pag. 360.

Son pédicule est plein, long d'un pouce, épais de quatre lignes, un peu tendu vers son sommet, farineux, presque tomenteux à sa superficie, soutenant un chapeau épais, charnu, large de trois à quatre pouces, un peu comprimé à son disque, relevé à ses bords, médiocrement écailleux, de couleur brune-foncée; les lames nombreuses, planes, un peu décurrentes. Il croît vers la fin de l'automne, parmi les gazons.

216. AGARIC trapu. *Agaricus brevipes*. Bull.

Agaricus subgregarius, pileo carnoso, umbonato aut leviusculo, cinereo; disco nigrescente; lamellis confertis, emarginatis, cinereis; stipite brevissimo, concolor. Bull. Herb. tab. 521. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 360.

Son pédicule est gros, plein, cylindrique, à peine long d'un pouce, plus épais, d'un gris-brun, soutenant un chapeau aplati & charnu, large de trois à quatre pouces, d'abord conique, puis plane, souvent irrégulièrement échancré, de couleur cendrée, noirâtre à son disque; les lames inégales, nombreuses, échancrées près du pédicule, d'un gris-cendré à la chair un peu rougeâtre. Il croît en groupes peu nombreux ou solitaire, sur la terre.

217. AGARIC à odeur forte. *Agaricus graveolens*. Perf.

Agaricus grovis, pileo carnoso, crasso, subhemisphaerico, glabro, fuliginoso-cinereo; lamellis confertis, emarginato-adenixis, forditis obliis; angulo acuto, versus stipitem prominente; stipite solido, subruvulo, olivido. Perf. Synopf. pag. 361.

Son pédicule est plein, peu épais, d'une longueur médiocre, blanc, compacte, presque fibreux en dehors, soutenant un chapeau à peine large de deux pouces, épais, charnu, fortement silloné à sa superficie, glabre, hémisphérique, d'un gris-cendré, garni en dessous de lames nombreuses, planes ou un peu arquées, inégales, d'un brun-clair ou d'un blanc-sale, échancrées, convexes, rétrécies en angle aigu vers le pédicule. Il croît sur les gazons. Son odeur est forte, et butante.

218. AGARIC humecté. *Agaricus imbricatus*.

Agaricus pileo subcarnoso, campanulato, livido, humido; lamellis distinctis, arcuatis, stipiteque longo, curvo albis. Perf. Synopf. pag. 361.

Sa consistance est molle, presque aqueuse, tous jours humide. Son pédicule est long de deux pouces, épais de trois ou quatre lignes, fistuleux, blanchâtre; son chapeau large d'un pouce & plus, épais de neuf lignes, un peu charnu, campanulé, de couleur livide, peu saillant à son centre; les lames libres, arquées, légèrement décurrentes. Il croît dans les bois de pins.

219. AGARIC des jardins. *Agaricus hortensis*. Perf.

Agaricus caspiotus, closticus, pileo subhemisphaerico, planiusculo, obsoleto umonato, fuligineo, subnigrescente; lamellis fundercurrentibus, subconcoloris, albidis; stipite subnulato, deorsum incrassato. Perf. Synopf. pag. 362.

Son pédicule est fistuleux, long de deux pouces & demi, épais de deux à trois lignes, un peu élastique & ondulé; il supporte un chapeau large de deux pouces, d'abord hémisphérique, puis un peu aplati, peu proéminent à son centre, tantôt noirâtre, tantôt d'un brun plus clair ou rouffâtre, légèrement papilleux à son disque, garni de lames légèrement décurrentes, planes ou un peu contournées, blanchâtres, puis incarnates, rongées à leurs bords, large de trois lignes. Il croît sur la terre, dans les jardins & dans les bois.

220. AGARIC à tige plate. *Agaricus platyphyllus*. Perf.

Agaricus magnus, pileo subcarnoso, fragili, albidio; umbone obtuso, squamuloso, nigrescente; lamellis latissimis, subobtusis, candidis; stipite subradicato, striato, olivido. Perf. Observ. Mycol. 1. pag. 47. — Synopf. pag. 362.

Cet agaric est pourvu d'un chapeau un peu charnu, fragile, blanchâtre ou cendré, large de trois à quatre pouces, convexe, puis plane, un peu fibreux, un peu écailléux, noirâtre & obtus à son centre; ses lames larges d'un pouce & plus, blanches, adhérentes à un pédicule de même couleur, strié, long de trois pouces & plus. Il croît en automne, presque solitaire, sur le tronc des arbres.

221. AGARIC à pied conique. *Agaricus letopus*. Perf.

Agaricus gregarius, pileo subcarnoso, umbonato, primo subnigrescente, dein fuliginoso-albido aut dilutibado; lamellis candidis; stipite conico, striato, rufescente-livido. Perf. Disposit. Meth. Fung. pag. 21, & Synopf. pag. 362.

Son chapeau est d'abord globuleux & presque noir, puis convexe, large de trois pouces, d'un

blanc-enfumé. Ses lames sont blanches, un peu adhérentes; le pédicule très-glabre, élastique, velu à sa base, conique, lirié, d'un roux-livide. Il croît dans les bois de pins.

232. AGARIC comprimé. *Agaricus compressus*. Pers.

Agaricus fragilis, pileo tenui, planiusculo, irregulari, fusco-terreo; lamellis crassiusculis, distantibus, albis; stipite compresso, subrotundis. Pers. Synopf. pag. 363. — Sowerb. Fung. tab. 66. — Wither. Att. 4. pag. 243.

Son pédicule est creux, comprimé, un peu tors, cannelé, long de trois pouces, épais de trois ou quatre lignes, soutenant un chapeau large de deux ou trois pouces, mince, transparent, aplati, irrégulier, d'un brun-terre, garni de lames blanchâtres, un peu épaissies, distantes, lancéolées, convinentes, arrondies, légèrement fourchues. Il croît en Angleterre.

233. AGARIC blanc. *Agaricus albus*. Pers.

Agaricus totus albus, subsolitarius, pileo carnoso, convexo; lamellis distinctis; stipite crasso, brevi, subsalscedente; basi subattenuato. Pers. Synopf. 363.

Agaricus (virginicus), niveus, stipite crasso, cylindrico, integerrimo. Batfch. Elem. Fung. pag. 39. tab. 3. fig. 12.

Ce champignon est partout d'un beau blanc de neige, parfaitement glabre. Son pédicule est plein, cylindrique, long de deux pouces, épais de neuf lignes, légèrement aminci à sa base; son chapeau charnu, convexe, puis plane, large de deux ou trois pouces, un peu roulé à ses bords; les lames distantes, quelquefois échancrées ou un peu dentées. Il croît sur la terre, presque solitaire, dans les sols sablonneux, parmi les bruyères.

234. AGARIC blanc d'ivoire. *Agaricus eburneus*. Bull.

Agaricus gregarius, candidus, pileo subcarnoso, viscoso, convexo, plano; margine levi; lamellis subsistantibus, parum decurrentibus; stipite longo, apice squamuloso. Bull. Herb. tab. 118. — Pers. Synopf. pag. 364.

Agaricus niveus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 71.

Agaricus jortolus. Scopol. Carn. edit. 2. pag. 431. — Pers. Comment. pag. 16.

Amanita alba. Lam. Dict. 1. pag. 107. (Voyez AMANITE blanche, n° 24.)

235. AGARIC disciforme. *Agaricus discoides*. Pers.

Agaricus subcaespitosus, pileo carnoso, viscido, planiusculo, albedo; disco favescente aut ferrugineo

lamellis subdecurrentibus stipiteque mediocri albidis. Pers. Synopf. pag. 365.

Il est trois fois plus petit que le précédent, auquel il ressemble beaucoup, il en diffère par son chapeau plane, visqueux, un peu jaunâtre à son disque ou d'un brun-roussâtre. Les lames sont minces, légèrement décurrentes; son pédicule presque plein, un peu farineux.

236. AGARIC à pied doré. *Agaricus chrysodon*. Batfch.

Agaricus subcaespitosus, pileo carnoso, albedo, margine tomentoso, flavido; lamellis distinctis, albidis, latere crispis, subdecurrentibus; stipite solido, longo, squamuloso, favescente. Pers. Synopf. pag. 365.

Agaricus chrysodon. Batfch. Elem. Fung. 2. pag. 79. tab. 38. fig. 212.

Son pédicule est plein, allongé, jaunâtre, écaillé, entouré à son sommet d'un anneau velu, d'un beau jaune; le chapeau charnu, blanchâtre, jaunâtre, tomenteux à ses bords, un peu roulé, plane, comprimé à son disque; les lames libres, blanchâtres, quelquefois un peu incarnées, crépues à leur côté, velues & jaunâtres à leurs bords, légèrement décurrentes. Il croît parmi les feuilles pourries, dans les bois de hêtres.

237. AGARIC rougeâtre. *Agaricus rubescens*. Pers.

Agaricus pileo planiusculo, margine revoluta, tomentoso; disco rubescens; lamellis distantibus, subdecurrentibus; stipite sursum incrassato, squamuloso; pileo cancellore. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 21. Synopf. pag. 366.

Son chapeau est blanc, d'abord convexe, puis plane, roulé à ses bords, large de trois pouces, tomenteux, rougeâtre à son centre, garni en dessous de lames distantes, légèrement décurrentes; son pédicule long de deux pouces & plus, un peu écaillé, épais, de la même couleur que le chapeau. Il croît dans les bois de hêtres.

238. AGARIC satiné. *Agaricus sericeus*. Bull.

Agaricus pileo campanulato, nitido, piloso-squamuloso, rufescente aut albedo; lamellis griseis vel flavicantibus; stipite longiusculo, plerumque striato, fistuloso. Bull. Herb. tab. 413. fig. 2, & tab. 526. Non Schaff.

1. *Agaricus (sericeus), pileo campanulato, subcarnoso, piloso, squamuloso, candido; lamellis adnatis, rubris; stipite longiusculo, fibrilloso, albedo, tenui*. Pers. Synopf. pag. 366. — Id. Icon. & Descript. Fung. pag. 17. tab. 6. fig. 2. ?

Le chapeau de cet agaric est, dans sa jeunesse, aussi luisant que du satin, d'abord conique, puis

plane, saillant à son centre, de couleur brune, rousse ou blanchâtre, large de trois à quatre pouces, strié sur les bords & non lustré dans la vieillisse, garni en dessous de lames libres, inégales, nombreuses, grises ou jaunâtres, échancrées à leur base; le pédicule ordinairement fistuleux, quelquefois plein, long de trois à quatre pouces, nu, cylindrique, strié. Il croît en automne, dans les bois, le long des chemins, dans les prés.

239. AGARIC fourré. *Agaricus pellitus*. Persf.

Agaricus fragilis, mollis, pileo planiusculo, carnofo, villofo, candido; lamellis latiusculis, liberis, incarnatis; stipite brevi, glabro, albo. Persf. Synopf. pag. 366.

Sa consistance est presque gélatineuse; sa saveur insipide, aqueuse. Son pédicule est glabre, court, épais de trois lignes, de couleur blanche; il soutient un chapeau d'abord convexe, puis plane, large de deux pouces, un peu charnu, fragile, cotonneux, blanchâtre, garni en dessous de lames larges de quatre lignes, libres, d'un blanc-incarnat, molles, comme crénelées. Il croît sur la terre, où il est rare.

240. AGARIC blanc-safrané. *Agaricus leucocrocus*. Persf.

Agaricus pileo carnofo, convexo-plano, albido; lamellis congestis, angustis, dentatis, dilute croccis; stipite utrinque subincrassato, concolore. Persf. Synopf. pag. 367.

Son pédicule est long d'un pouce & demi, épais de trois lignes, légèrement fléchi, renflé à ses deux extrémités, luisant, d'un blanc-jaunâtre, soutenant un chapeau de même couleur ou blanchâtre, charnu, très-glabre, hémisphérique, puis convexe, puis plane, large d'un pouce & demi, garni en dessous de lames nombreuses, un peu planes, saillantes, presque rameuses, larges d'une ligne, d'un jaune de safran clair, légèrement décourantes. Il croît dans les forêts, sur le tronc des arbres; il est rare.

241. AGARIC traînant. *Agaricus erythropus*. Persf.

Agaricus subcapitosus, pileo subcarnofo, hemispharico, albido-pallescente; lamellis distinctis, subconnexis, concoloribus; stipite longo, glabro, atro-rubente; basi villosa, incrassata. Persoon, Synopf. pag. 367.

Agaricus repens. Bull. Herb. tab. 90.

Amanita repens. Lam. Dict. t. pag. 109. (Voyez AMANITE rampante, n°. 33.)

242. AGARIC confluente. *Agaricus confluent*. Persf.

Agaricus capitosus, albus, pileo obtusè umbrinato; lamellis confertis, angustis; stipite cavo, pulverulento-tomentoso, rufescente. Persf. Obs. Mycol. 1. pag. 10. — Ic. & Descript. Fung. Fasc. 1. pag. 15. tab. 5. fig. 1, & Synopf. pag. 368.

Agaricus tremulus. Batsch. Elem. Fung. 1. pag. 130. tab. 20. fig. 104.?

Agaricus dispar. Batsch. Cont. 2. pag. 75. tab. 38. fig. 210.?

Sa consistance est sèche; sa couleur blanche; son pédicule un peu comprimé, fistuleux, un peu renflé vers son sommet, couvert d'un léger duvet rousseâtre; son chapeau un peu plat, peu élevé à son centre; il devient roux après les vers pluvieux; garni en dessous de lames nombreuses, étroites. Il croît pendant tout l'automne dans les forêts, souvent par groupes finieux & confluents.

243. AGARIC compacte. *Agaricus compactus*.

Agaricus (lignatilis), capitosus, pileo carnofo, livescente-albo, planiusculo; lamellis confertis, totis adnexis, candidis; stipite cavo, subconcentoso, solido, albido. Persf. Synopf. pag. 368. Non Bulliard.

Son pédicule est long d'un à deux pouces, épais de deux lignes, fistuleux, légèrement tomenteux, principalement à sa base, qui s'enfoncé, comme une racine, dans les bois sur lesquels il croît. Il soutient un chapeau charnu, d'un blanc-livide, un peu pulvérulent, large d'un à deux pouces, d'une substance compacte, d'une odeur désagréable, un peu plane, garni en dessous de lames compactes, minces, linéaires, blanchâtres, adhérentes. Il croît par groupes sur les troncs pourris.

244. AGARIC crétaçé. *Agaricus cretaceus*. Persoon.

Agaricus capitosus, albus, pileo carnofo, convexo-plano; lamellis subconfertis, adnexis; stipite longiusculo, solido, subconcentoso. Persf. Synopf. pag. 369.

Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces, sur un pédicule presque tomenteux, un peu comprimé, surtout vers sa base, & un peu courbé, point fistuleux, soutenant un chapeau charnu, d'abord convexe, puis plane, large d'un pouce & demi, garni de lames assez nombreuses, minces, étroites, adhérentes, couleur d'eau. Il croît parmi les pins, sur les montagnes, par groupes de cinq à six individus adhérents par leur base.

245. AGARIC cannellé. *Agaricus rivulosus*. Persf.

Agaricus compactus, pileo carnofo, convexo, plano, ex albido-subrufescente, demum rimoso-rivulo

lofo ; lamellis confertis, palléscente-albis ; stipite stricco, albidó, submentoso ; basi villoso. Perf. Synopf. pag. 369.

Son odeur, ainfi que fa saveur, n'est point désagréable. Son pédicule est long d'un pouce, épais de trois lignes, roide, blanchâtre, un peu tomenteux, velu à fa bafe. Son chapeau est glabre, large d'un pouce & plus, d'abord convexe, puis plane, d'un blanc-rouffâtre. Il fe ride & prend enfuite des cannelures profondes, fousvent concentriques. Ses lames font un peu décurrentes, nombreufes, larges d'un ligne & demie, d'un blanc-fale. Il croit dans la forêt d'Herctynie.

246. AGARIC couffinet. *Agaricus pulvinatus. Perf.*

Agaricus pileo conofo, fubérofo, pulvinato, fub-repando, globro, albidó, difco incarnato, pallido ; lamellis confertis, decurrentibus, albis ; stipite breviffimo, folido, duro. Perf. Synopf. pag. 370.

Il a la saveur du bolet comestible. Son pédicule est long d'un demi-pouce, dur, plein, foutenant un chapeau large de quatre ou cinq pouces, charnu, fubéreux, glabre, blanchâtre, convexe, puis un peu plane, d'un incarnat pâle à fon difque, un peu ride, point écailleux ; les lames nombreufes, blanches, décurrentes, minces, un peu arquées, larges de trois lignes. Il croit fur le tronc, dans les forêts.

247. AGARIC d'un blanc-fale. *Agaricus fordidus. Perf.*

Agaricus fubgregarius, totus fordidó olbus, pileo carnofo, compado, hemifpharico, convexo ; marginé ab initio involuto, fubmentoso ; lamellis confertis, ongustis, aquofo-albidis ; stipite fubfolido, fibrillofo. Perf. Synopf. pag. 370.

Il a d'abord une saveur un peu douce, qui devient enfuite nauféabonde ; fa confiftance très-ferme ; fon pédicule long d'un pouce & de quelques lignes, épais de deux ou trois lignes, légèrement fibreux ; fon chapeau charnu, compaéte, hemifphérique, puis convexe, à peine large d'un pouce, d'abord enveloppé à fes bords, enfuite nu & glabre, garni de lames planes, nombreufes, étroites, très-ferées, d'un blanc-fale, couleur de corne à leur bafe. Il croit ou folitaire ou par groupes, dans les haies, les forêts, au pied des arbres.

248. AGARIC parasite. *Agaricus parasiticus. Bull.*

Agaricus fubparvus, fubefpitosus, parasiticus, pileo campanulato, fuprepando, albidó-palléscente ; lamellis diftensibus, craffifculis, fufcis ; stipite incurvo, pilolo, folido. Bull. Herb. tab. 574. fig. 2.

β. *Agaricus (pilipes), fofciculatus, fufcus ;*

pileo campanulato ; stipite toto fparfim pilolo. Sowerb. Fung. tab. 249. — Perf. Synopf. pag. 371. — An fpecies diftinda ?

Cette efèce croît parasite fur les grands agarics à moitié pourris. Sa couleur est blanche ; fon pédicule cylindrique, nu, plein, un peu courbé, long de deux ou trois pouces, un peu velu à fa partie inférieure, foutenant un chapeau d'abord conique, puis plane ; le centre proéminent, d'une couleur plus foncée, large d'environ un demi-pouce, à fes bords, garni de lames inégales, à peine adhérentes au pédicule, amincies à leur bafe. Il croit en groupes, au nombre de trois ou quatre individus adhérens par leur bafe.

249. AGARIC à pied brun. *Agaricus phisporidius. Bull.*

Agaricus brunneo-fufcus, pileo umbonato, marginé finuato ; laminis candidis, basi arcuatis, inaequalibus, ferè liberis ; stipite folido, bafincurvato. Bull. Herb. tab. 532. fig. 2.

Son pédicule est long d'environ trois pouces, d'un brun-rouffâtre, nu, plein, glabre, renflé à fa bafe, rétréci à fon milieu, élargi à fon sommet, foutenant un chapeau de même couleur, d'abord convexe, puis plan ou concave, faillant à fon centre, un peu finueux à fa circonférence, large de deux à quatre pouces, garni de lames blanches, inégales, arquées à leur bafe, peu adhérentes au pédicule. Il croit folitaire fur la terre.

250. AGARIC ondulé. *Agaricus undulatus. Bull.*

Agaricus porculus, pileo tenui, umbonato, planiusculo, zonato, albidó ; lamellis confertis, decurrentibus, fubargillaceis ; stipite longiusculo, fubflexuoso, undulato. Bull. Herb. tab. 535. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 371.

Son chapeau est peu charnu, blanc, marqué de zones concentriques, d'un jaune-pâle, tacheté de gris à fon centre, d'abord conique, puis plane, large de huit à neuf lignes, un peu finueux fur les bords, foutenu par un pédicule grêle, filuleux, nu, cylindrique, blanchâtre, un peu flexueux, long de deux pouces & plus ; les lames nombreufes, inégales, un peu décurrentes, jaunâtres. Il croit fur la terre.

251. AGARIC jaune d'argile. *Agaricus argillaceus. Perf.*

Agaricus fubparvus, pileo conico, carnofo, membranaceo, umbonato, nitente, albo (fubpalléscente) ; lamellis primò albis, demùm argillaceis, fofefcentibus ; stipite medioerè, fubtenui. Perf. Obl. Mycol. 1. pag. 51. & Synopf. pag. 372.

β. *Agaricus (immutabilis), totus candidus, fub-*

rigidus, pileo campanulato, ovato, subsericeo; lamellis confertis, canalicis (immutabilibus); stipite crassifusco, albo, foliis. Pers. l. c.

Son pédicule est un peu toide, grêle, peu élevé, nu ou couvert d'une membrane très-fugace, soutenant un chapeau charnu, membraneux, conique, un peu aigu, d'un aspect foyeux, lissé, large de neuf lignes, d'une couleur blanche qui pâlit avec l'âge; les lames convinentes, d'abord blanches, puis d'une couleur terreuse, d'un jaune-brun. La variété *β* est un peu plus grande. Ses couleurs ne changent point, excepté celle des lames, qui devient un peu cendrée. Elles croissent toutes deux dans les forêts.

252. AGARIC en capuchon. *Agaricus cucullatus*. Pers.

Agaricus subgregarius, subparvus, totus candidus, pileo campanulato, levi; lamellis arcuatis, decurrentibus; stipite longo, basi subincrassato, piloso; pilis eredis. Pers. Synopf. pag. 373.

Son aspect est assez élégant, de couleur blanche. Son pédicule est fistuleux, long de deux pouces, pileux, épaissi à sa base, effilé à son sommet, soutenant un chapeau large de trois ou quatre lignes, d'abord conique, puis campanulé, très-lisse; ses lames decurrentes, courbées en arc. Il croît presque par groupes, sur la terre, parmi les mouffes.

253. AGARIC alliaire. *Agaricus olliatus*. Pers.

Agaricus subgregarius, odoratus, subparvus, fuscus, pileo subcarnoso, plano, ruguloso, pallidescente-albo; lamellis crispis; stipite brevifusco, rufescente. Schæff. Fung. tab. 119. — Pers. Synopf. pag. 373.

Agaricus Schofferi. Pers.

Cet agaric est petit; il répand une odeur d'ail. Son pédicule est roussâtre, fistuleux, coriace, haut d'un pouce; son chapeau plus sec que charnu, à peine large de quatre lignes, convexe, puis plane, médiocrement ridé, d'un blanc-pâle, à peine lissé, garni en dessous de lames blanchâtres, crépues, qui se détachent facilement du pédicule. Il croît sur les lieux montueux, ordinairement par groupes, sur les gazons, parmi les bruyères.

254. AGARIC à pied calleux. *Agaricus callopus*. Pers.

Agaricus gregarius, inodorus, parvus, pileo subcarnoso, convexo-plano, levi, lamellisque adnexis, olividis; stipite subnecesse, curvo, nitido, rufo-badjo. Pers. Synopf. pag. 373.

Il ressemble beaucoup au précédent, mais il est dépourvu d'odeur, d'une couleur plus éclatante; son chapeau lisse, point ridé, bien moins charnu; les lames détachées du pédicule, échanrées, un peu adhérentes-ent-elles; le pédicule fistuleux un

peu coriace, d'un roux-clair. Il croît dans les bois de hêtres.

255. AGARIC tubéreux. *Agaricus tuberosus*. Bulliard.

Agaricus gregarius, parvus, albidus, pileo convexo, popillio; stipite brevi, subrufescente, tuberosus innato. Bull. Herb. tab. 356, & tab. 522. fig. 4. — Pers. Synopf. pag. 374. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 178.

β. Agaricus omanita. Batfch. Elem. Fung. 1. p. 109. fig. 93. — Pers. Obs. Myc. 2. pag. 52, & Synopf. l. c.

γ. Agaricus (citatus), gregarius, pileo subcapillato, plano, albidus; disco rufescente; lamellis confertis, olividis; stipite longifusco, tenui, rufescente, fibrillis longis orisito. Pers. Obs. Myc. & Synopf. l. c.

Bulliard & Persoon sont d'un sentiment un peu différent sur le développement de cette singulière plante. Selon le premier, on aperçoit d'abord une petite graine ou tubercule rougeâtre, plongé dans le corps ou entre les feuillets des grosses espèces d'agaric ou de bolet. Cette graine s'allonge en un ou plusieurs points, & de chacun fort un fût menu, blanc & surmonté d'une petite tête. Ce fût se développe, & on voit enfin un agaric long de deux ou trois pouces au plus, dont le pédicule est grêle, nu, plein, fistuleux, garni vers sa base d'un anneau de poils, & continu avec le tubercule rougeâtre. Le chapeau est large de cinq à six lignes, plane ou convexe, blanchâtre, lisse, double de feuillets inégaux, blancs, non décorés sur le pédicule. Persoon, au contraire, croit que le tubercule rougeâtre est un végétal particulier, analogue aux truffes du safran, qu'il nomme *scizote des champignons*. Il dit qu'on trouve quelquefois l'agaric sans ce tubercule ou cette plante. Cette espèce croît sur les grandes espèces d'agarics ou de bolets à demi pourris.

256. AGARIC rameux. *Agaricus ramifolius*. Bull.

Agaricus laevis, pileo hemispharico, dein convexo, orbiculari; lominis inaequalibus, ad insertionem stipitis dilatatis; stipitibus cylindricis, basi longe connatis & ramos simulantibus. Bull. Herb. tab. 102.

Amanita ramosa. Lam. Dict. 1. pag. 108. (Foyet AMANITE, n°. 32.)

257. AGARIC des rameaux. *Agaricus ramealis*. Bull.

Agaricus gregarius, parvus, subsperisens, pileo subcarnoso, hemispharico, albidus; disco rufescente; lamellis confertis, angustis; stipite incurvo, pulveraceo. Bull. Herb. tab. 336. — Pers. Synopf. pag. 375, & Obs. Mycol. 1. pag. 45 & 47.

Cet agaric est blanc, excepté le centre du chapeau, qui est rougeâtre. Son pédicule est long d'environ deux pouces, nu, grêle, cylindrique, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis concave, point frisé, à peine large d'un pouce, continu avec le pédicule, garni de lames nombreuses, inégales, terminées en pointe sur le pédicule sans lui adhérer, mais réunies entr'elles. Il croît sur les branches mortes tombées à terre, à demi pourries, particulièrement sur celles du rosier & du bouleau, dans le courant de l'automne.

258. AGARIC inodore. *Agaricus inodorus*. Bull.

Agaricus albidus, pileo conico, dein plano, umbonato; margine subinverso, interdum lacero; laminis ex fusco-flavis, pediculus versus acuminatis; stipite subflexuoso, pleno aut fistuloso. Bull. Herb. tab. 524. fig. 2.

Son pédicule est nu, cylindrique, plein ou fistuleux, quelquefois un peu tortueux, blanchâtre, long de deux pouces & plus, soutenant un chapeau conique, puis plane, blanchâtre, large d'un pouce & demi, protubérant à son centre, légèrement sinueux à ses bords, quelquefois fendu dans sa vieillesse; les lames libres, nombreuses, inégales, terminées en pointe du côté du pédicule. Il croît solitaire, sur la terre.

259. AGARIC terreux. *Agaricus geotropus*. Bull.

Agaricus albidus vel flavo-pallidus, major, pileo rotundo, centro mommofo; lamellis inaequalibus; decurrentibus; stipite corcolore, aliquando basi subhirsuto. Bull. Herb. tab. 573. fig. 2.

Cet agaric est quelquefois entièrement blanc, mais plus souvent ses lames sont blanches, & le reste est d'un jaune-pâle & terreux. Son pédicule est nu, plein, glabre, cylindrique, quelquefois un peu velu à sa base, long de deux ou trois pouces, épais de quatre à six lignes, soutenant un chapeau régulier, arrondi, convexe, puis plane & même concave, saillant à son centre, garni de lames nombreuses, inégales, décurrentes. Il croît solitaire ou en groupes peu nombreux, sur la terre.

160. AGARIC petit bonnet. *Agaricus pileolarius*. Bull.

Agaricus pileo primum hemisphaerico, dein convexo; margine reflexo, griseo, fuscescente, pulverulento; laminis griseis; stipite albidus, fibrilloso, basi ventricoso, striato; stris griseis vel flavicantibus. Bull. Herb. tab. 400.

Son pédicule est long de trois pouces, renflé à sa base, nu, plein, de couleur blanche, traversé par des fibres grises ou jaunâtres, cotonneux en dedans. Le chapeau, continu avec le pédicule, est d'abord hémisphérique, puis convexe, ayant ses

bords repliés en dessous, puis plane & un peu concave, large de quatre à cinq pouces. Sa chair est épaisse, ferme & blanche; sa surface sèche, farineuse ou cotonneuse, d'un gris-touffé; les lames décurrentes, nombreuses, inégales, d'un gris-clair. Il croît vers la fin de l'été, dans les bois, sur des amas de feuilles pourries.

261. AGARIC des bruyères. *Agaricus ericetorum*. Bull.

Agaricus gregarius, albidus, pileo fuscescente, convexo, raro centro prominulo; lamellis subfistulosis, stipite tereti; apice fibrilloso, non squamuloso. Bull. Herb. tab. 551. fig. 1. Non Pers.

Il a de très-grands rapports avec l'*agaricus chrysoneus*; il en diffère par son pédicule fistuleux vers son sommet & point écaillé; par son chapeau d'un blanc-jaunâtre, plus convexe, à peine protubérant à son sommet. Il croît par groupes dans les bois.

262. AGARIC mouffeton. *Agaricus albellus*. Schæff.

Agaricus alutaceus, pileo sphaerico, dein campanulato, quàm maxime carneo, margine parim revoluta; laminis confertissimis, inaequalibus; apicibus acuminatis; stipite plerumque basi incrassato, subhirsuto. (Agaricus mouffeton.) Bull. Herb. tab. 142. (Voyez AMANITE, n°. 15.)

263. AGARIC du bois mort. *Agaricus lignatilis*. Bull.

Agaricus caespitosus, pileo umbonato, glabro, cinnomomeo; lamellis subdecurrentibus, pallide ferrugineis; stipite squamoso, subtenui, cylindrico. Bull. Herb. tab. 554. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 176.

Agaricus caudicinus. Var. Pers. Synopf. pag. 271.

« Cet agaric, dit M. Decandolle, ressemble à l'agaric annulaire, & M. Persoon le considère comme une simple variété; il en diffère cependant en ce qu'il n'a point de collier. Son pédicule est plein, cylindrique, souvent courbé à sa base, jaune, moucheté, vers la base, de petites écailles brunes. Le chapeau est d'abord convexe, puis plane, souvent sinueux, jaune, avec le centre jaune. Les feuilles sont d'un rouge de brique, inégales, adhérents ou légèrement décurrens sur le pédicule. Il croît sur les bois de charpente & la coupe des vieux troncs. »

264. AGARIC à tête enfumée. *Agaricus caespinocephalus*. Bull.

Agaricus pileo flavo, seniore ad centrum & marginem nigro; laminis rufis, inaequalibus, intus emarginatis; stipite cylindrico, basi parim attenuato, fo-

vescente, longitudinaliter striato. Bull. Herb. tab. 347. fig. 2.

Son chapeau, d'abord convexe, devient plane, de couleur fauve; le centre & le bord noircissent dans la vieillesse, garni en dessous de lames inégales, d'un roux-fauve, échancrées à leur base, un peu prolongées sur le pédicule: celui-ci est nu, plein, cylindrique, un peu rétréci à sa base, charnu, jaunâtre, rayé longitudinalement, long de deux pouces & plus, épais de six à huit lignes. Il croît solitaire ou par groupes sur la terre.

265. AGARIC en fûceau. *Agaricus subformis*. Bull.

Agaricus castiposus, pileo fusco-flavescente, convexo, campanulato, sordide subviscoso; stipite levi, apice cylindrico, medio ventricoso, basi acuminato, concolore. Bull. Herb. tab. 76.

Amanita adematosa. Lam. Dict. 1. pag. 108. (Voyez AMANITE, n°. 30.)

266. AGARIC tortu. *Agaricus contortus*. Bull.

Agaricus radice nigra, subconica, stipites flexuosos, glabros, fusco-nigrescentes, plurimos emittentes; pileo concolore, convexo; centro prominulo, rotundato; laminis candidis. Bull. Herb. tab. 36. (Voyez AMANITE, n°. 31.)

267. AGARIC poudreux. *Agaricus furfuraceus*. Bull.

Agaricus pileo pulverulento-lutescente, centro mammoso, margine subsinuato, maculis fuscis centro numerosioribus; lamellis primò albidis, dein flavicantibus; stipite pleno, candido. Bull. Herb. tab. 332. fig. 1. Non Pers.

On le distingue de l'agaric finué à son chapeau d'une couleur jaune plus foncée, bien moins finué à ses bords, poudreux à sa surface, parsemé de mouchetures fauves, plus abondantes vers le centre; d'abord hémisphérique, puis campanulé, puis plane, protubérant à son centre, garni de lames libres, inégales, blanches, ensuite jaunâtres, ascendantes du côté du pédicule: celui-ci est droit, nu, plein, de couleur blanche, long de trois à quatre pouces, épais de quatre à cinq lignes. Il croît sur la terre, par groupes ou solitaire.

6. V. MYCENA. Pers. Point de coiffe ni d'anneau; pédicule central, ordinairement fistuleux; chapeau non ombiliqué; lames ou feuillettes qui ne noircissent point en vieillissant.

268. AGARIC odeur d'ail. *Agaricus alliaceus*. Pers.

Agaricus solitarius, grevolens, pileo campanulato,

membranaceo-fuscescente; lamellis distinctis, albidis; stipite longo, nigrescente, glauco, subradicato; basi strigoso. Pers. Synopf. pag. 373, & Obs. Mycol. 2. pag. 54. — Jacq. Flor. austr. tab. 82. — Linn. Syst. veg. 1. pag. 1014. ?

Son pédicule est fistuleux, noirâtre, allongé, à peine tomenteux, rétréci à sa base, supportant un chapeau campanulé, membraneux, d'un brun plus ou moins foncé, à lries peu marquées, garni en dessous de lames libres, séparées, blanchâtres: il répand au loin une forte odeur d'ail; il croît en automne, dans les lieux humides, parmi des amas de feuilles en putréfaction.

269. AGARIC portreau. *Agaricus porreus*. Pers.

Agaricus gregarius, majusculus, pileo submembranaceo, hemisphaerico, lamellisque flavicantibus; stipite longo, subcylindrico, deorsum sanguineo. Pers. Synopf. pag. 376.

Agaricus (alliaceus), stipite subrubello, ad apicem attenuato, basi subfistulato; pileo ex albidoreflescente, plano vel convexo, vel centro gibbo; laminis concoloribus, liberis. Bull. Herb. tab. 158, & tab. 154. fig. 1. ? — Scopol. Carn. 2. pag. 454. — Sowetb. Fung. tab. 81. — Ant. Juss. A.G. Paris. 1728. pag. 382.

Cet agaric n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente, à laquelle il ressemble beaucoup, & qui répand, comme elle, une forte odeur d'ail. Son pédicule est grêle, nu, cylindrique, un peu conique, plus ou moins velu ou pubescent, long de quatre à cinq pouces, épais d'environ trois lignes, pâle & rétréci à son sommet, rougeâtre à sa base, d'où découle quelquefois un suc rougeâtre. Son chapeau est plane ou convexe, large de deux pouces au plus, saillant en bosse à son centre, un peu finué à sa circonférence, peu charnu, d'abord blanc ou jaunâtre, puis roussâtre, garni de lames inégales, peu nombreuses, libres, roussâtres, rétrécies en pointe du côté du pédicule. Il croît sur les feuilles mortes, dans les bois humides, en automne.

270. AGARIC ventru. *Agaricus ventricosus*. Bull.

Agaricus albidoreflescent, stipite basi ventricoso; radice simplici, acuminato; pileo primùm campanulato, dein convexo; laminis rufis, sinuosis, hamo terminatis. Bull. Herb. tab. 411. fig. 1.

Son pédicule est fistuleux, nu, tendu à sa base, prolongé en une racine simple & pointue, long de quatre à cinq pouces, soutenant un chapeau d'abord campanulé, puis convexe, qui devient assez souvent protubérant à son centre & llié sur ses bords; large de trois pouces au plus, tantôt presque blanc, tantôt d'un gris-jaunâtre, garni en dessous de lames nombreuses, rouffes, sinuées, terminées par une sorte de crochet légèrement décourant

décourent sur le pédicule. Il croît dans les bois, en été & en automne.

271. AGARIC fistuleux. *Agaricus fistulosus*. Bull.

Agaricus castiposus, *stipite levi*, *radicato*, *exsucco*, *bas. strigoso-hirto*; *pileo membranaceo*, *umbonato*, *livido-fuscescente*; *lamellis distinctis*, *albis*. Bull. Herb. tab. 518. excluf. litt. H. P., & tab. 563. fig. 4.

Agaricus golericulatus. Perf. Synopf. pag. 376, & Obferv. Mycol. 2. pag. 57.

Agaricus pseudo-clypeatus. Bolt. Fung. tab. 154.

Agaricus mommiliaris. Hoffm. Nom. pag. 217. tab. 4. fig. 1.

a. Agaricus castiposus communis, Dec. Flot. franç. vol. 2. pag. 160. — Bull. l. c. fig. F. D.

Agaricus galericulatus. Schöff. Fung. tab. 52. — Perf. Obf. Mycol. l. c. var. 4.

β. Agaricus rufescens. Bull. l. c. fig. E.

γ. Agaricus gracilis. Bull. l. c. fig. O. P.

ι. Agaricus proliferus. Soweb. Fung. tab. 169.

— Il est peu de champignons, dit M. Decandolle, qui varient autant que celui-ci pour le port, la grandeur & la couleur. Son pédicule est quelquefois très-grêle, long de quatre à cinq pouces ou de deux & demi, mais plus épais. Sa couleur est blanchâtre, rouille ou d'un gris plus ou moins foncé; son chapeau conique ou en cloche, plane ou souvent marqué d'une protubérance à son centre. Au milieu de toutes ces variations, on remarque que son pédicule est toujours cylindrique, glabre & sans ftries; qu'à sa base il se renfle un peu & est chargé de petits poils roides & noirâtres; qu'il se prolonge en une petite racine pointue, qui entre dans les fentes des arbres. Si on coupe ce pédicule, on voit qu'il est tubuleux dans toute sa longueur, & qu'à son sommet ce tube est divisé par une protubérance qui part du chapeau. Les feuillets sont nombreux, blanchâtres ou grisâtres, très-inégaux, un peu adhérens au pédicule. Quelquefois il se développe, sur le chapeau, une cupule qui offre en dedans des feuillets concentriques comme si c'étoit un petit chapeau d'agaric né à l'envers. Il croît en automne, par groupes réunis par le pied, sur les troncs & les branches d'arbres.

272. AGARIC à cens taies. *Agaricus polygrammus*. Bull.

Agaricus solitarius, *stipite coudato*, *longitudinaliter striato*, *argenteo-casfo*; *pileo campanulato*, *umbonato*, *subcinereo*. Bull. Herb. tab. 395, & tab. 518. fig. H. — Perf. Obferv. Mycol. 2. pag. 59, & Synopf. 377.

Botanique. Supplément. Tome I.

1. *Agaricus* (niveus), *totus amant albus*. Perf. l. c.

γ. ? Agaricus (atro-cyaneus), *niger*, *cyaneo pruinotus*, *pileo cucullato*, *denis striato-filicato*; *marginextremo albeniore*; *stipite elongato*, *lincore*, *striato-filicato*; *lamellis albenioribus*. Batfch. Elem. Fung. pag. 107. tab. 18. fig. 87. Forêt junior.

2. *Agaricus cynophallus*. Batfch. l. c. fig. 85. (*Fungus uondum evolutus*.)

Rapproché du précédent, celui-ci offre, comme lui, plusieurs variétés remarquables, surtout par le changement de couleur. Son pédicule est long de quatre à cinq pouces, souvent velu à sa base, cylindrique, marqué de ftries bleuâtres, longitudinales; fistuleux, sans protubérance au sommet du tube, muni d'une racine allongée, pointue; il soutient un chapeau d'un gris-noirâtre, d'abord ovale, puis conique, puis plane ou concave, déchiré à ses bords, proéminent à son sommet, large de deux pouces & demi, peu charnu, garni de lames libres, blanches, inégales. Cet agaric est tout-à-fait blanc dans la variété β, noirâtre, parsemé de petites taches bleues dans la variété γ; son chapeau profondément cannelé, blanchâtre vers ses bords. Il croît ordinairement solitaire, dans les cavités des vieux troncs, en été & en automne.

273. AGARIC pied menu. *Agaricus filipes*. Bull.

Agaricus stipite longiore, *tenuissimo*, *ad apicem attenuato*, *bas. hirsutissimo*; *pileo conico vel campaniformi*, *stiris rufis*, *radiantibus notato*. Bull. Herb. tab. 120.

Agaricus (pilosus), *pileo glabro*, *membranaceo*, *albido*, *cinereo*, *subtemis. hirsuto*, *papillato*, *stirato*; *lamellis distinctis stipite longo*, *tereti*, *bas. villosa*, *albidiis*. Perf. Synopf. pag. 380. ? — Batfch. Elem. Fung. pag. 67. fig. 2.

a. Agaricus campanulatus. Bull. l. c. fig. A.

β. Agaricus conicus. Bull. l. c. fig. B.

Son pédicule est fort grêle, long de six à sept pouces, cylindrique, fistuleux, blanchâtre, rétréci vers son sommet, très-velu à sa base, soutenant un chapeau campanule dans la variété α, conique dans la variété β, mince, blanchâtre, à peine large d'un pouce, marqué de ftries rouffes, divergentes, garni de lames blanches, lisses, inégales. Il croît dans les bois, parmi les mouffes.

274. AGARIC d'été. *Agaricus stipitus*. Perf.

Agaricus solitarius, *terrestris*, *pi'o submembranaceo*, *obtusè umbonato*, *subcorrupto*, *cinereo-livido*; *lamellis candidis*; *stipite levi*, *subradicato*; *Cc*

radice arcuata, pilosif. Persf. Obsf. Mycol. pag. 9, & Synopf. pag. 372.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de l'*Agaricus polygrammus*. Son pédicule est plus long, de couleur cendrée, lisse, pileux seulement à la base; sa racine arquée. Son chapeau est presque membraneux; un peu ridé, légèrement pombé; et obtus à son centre, de couleur plombée; les lames blanches, d'une grandeur médiocre. Il croît sur la terre, le long des branches de pins abattus.

175. AGARIC noir-blanc. *Agaricus atro albus*. Bolt.

Agaricus pileo (levi), margine albidio, apice nigro; stipite (radicato?), fistuloso, basi plumoso. Bolt. Fung. pag. 137. tab. 137. — Persf. Synopf. pag. 378.

Son pédicule est long de trois pouces, fistuleux, un peu renflé, écailleux à la base, noirâtre dans la jeunesse, prolonge en une racine brune. Son chapeau est d'abord oblong, puis campanulé, lisse à la superficie, d'abord entièrement noir, puis blanc à sa circonférence, garni en dessous de lames blanches & arquées. Il croît en Angleterre.

176. AGARIC à pied laiteux. *Agaricus galopus*. Persf.

Agaricus subulitarius, terrestris, pileo campanulato, nigrescente-glauco; lamellis subdistantibus, albidio-cinereis; stipite subradicato, fistulo succum lacinum secernente. Persf. Obsf. Mycol. 2. pag. 56, & Synopf. pag. 379.

Agaricus lactescens. Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 128.

Il est une fois plus petit que l'agaric fistuleux. Ses couleurs sont plus ou moins foncées. Son pédicule se prolonge en une racine: il en découle un suc laiteux lorsqu'on le brise. Le chapeau est campanulé, glauque, noirâtre; les lames un peu distantes, d'un blanc-cendré. Il croît presque solitaire dans les forêts, sur la terre, parmi les gazons.

177. AGARIC à pied ensanglanté. *Agaricus hamatopus*. Persf.

Agaricus caespitosus, pileo carnoso, membranaceo, ex albidio-rubescens; lamellis angustis, albis; stipite fistuloso, rufescente, rupto succum rubrum secernente. Persoon. Obsferv. Mycol. 2. pag. 56, & Synopf. pag. 379.

Il découle de son pédicule seul un suc rougeâtre. Son chapeau est un peu charnu, membraneux, d'un blanc lavé de rouge, large d'un pouce au plus, presque hémisphérique, soutenu par un pédicule grêle, rouscâtre, long de deux pouces.

Les lames sont blanches, étroites, un peu frangées. On distingue à la loupe, sur leurs bords, des particules brillantes. Il croît sur le tronc des arbres.

178. AGARIC à pied safrané. *Agaricus crocatus*. Persf.

Agaricus pileo campanulato, cinereo, obforescente; lamellis stipitibus fæco croceis rejectis. Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 128. — Persoon. Synopf. pag. 380.

Son pédicule est long de deux ou trois pouces. Il est noir flexueux, jaune à sa base, blanchâtre à son sommet; le chapeau campanulé, large de quatre lignes, de couleur cendrée, à peine strié; les lames distantes: il en découle, ainsi que du pédicule, une liqueur insipide, d'un jaune de safran. Il croît parmi les feuilles pourries.

179. AGARIC poli. *Agaricus levigatus*. Persf.

Agaricus subgregarius, terrestris, pileo membranaceo, campanulato, destituto-cinereo, levi; lamellis albidis; stipite mediocri, basi pilis floridosis. Persf. Synopf. pag. 380.

Il s'élève à peine à la hauteur de deux pieds, sur un pédicule muni à sa base de petits poils fibreux. Son chapeau est membraneux, large d'un demi-pouce au plus, lisse, campanulé, à peine strié, d'un blanc-cendré; les lames blanches, presque entièrement adhérentes au pédicule. Il croît en automne, en groupes éparés sur la terre, dans les bois de pins.

180. AGARIC à tête grêle. *Agaricus leptocephalus*. Persf.

Agaricus totus cinereus, pileo tenuissimo, subumbonato, repando, sulcato; lamellis crassiusculis, obfuscis cinereis; stipite subbrevis, glabro. Persf. Icon. & Descript. Fung. pag. 48. tab. 2. fig. 4, & Synopf. pag. 381.

Il répand une odeur de nitre. Son pédicule est court, glabre, fistuleux; son chapeau très mince; un peu protubérant & médiocrement charnu à son centre, filonneux, un peu fluide à ses bords, de couleur cendrée, garni de lames un peu épaisses, d'un cendré plus foncé, adhérentes, un peu écartées. Il croît en Allemagne, dans les forêts.

181. AGARIC pied jaune. *Agaricus flavipes*. Persf.

Agaricus gregarius, pileo campanulato, striato, lamellisque albidio-cinereis; stipite elongato, subviscoso, flavescente. Persf. Synopf. pag. 382.

Agaricus plicatus. Schæff. Fung. tab. 31.

Agaricus (flavipes), stipitatus, pileo campanu-

lato, piloso, albido, fusco; lamellis albidis; stipite fistuloso, flavo. Sibth. Flor. oxon. pag. 305.

Cet agaric, qui paroît être une variété du suivant, est plus grand dans toutes ses parties; il en diffère par son chapeau convexe, légèrement plissé. Son pédicule est jaunâtre, visqueux, alongé, fistuleux; son chapeau campanulé, puis convexe, strié, d'un blanc-cendré; les lames blanchâtres. Il croît en Angleterre, dans le Hanovre, sur la terre, par groupes, en automne, parmi les pins & les bruyères.

282. AGARIC à couleurs variées. *Agaricus episcyrus*. Persl.

Agaricus subcapitosus, pileo campanulato, leviusculo, obtuso aut subumbilicato, cinereo, casto, subviresco; lamellis distantibus, albis; stipite sulphureo, viscido. Persoon. Disposit. Meth. Fung. pag. 25, & Synops. pag. 382.

a. *Idem, pileo rigido, subargenteo seu plumbeo-cast.* Persl. l. c.

b. *Idem, pileo flavido.* Persl. l. c.

γ. *Idem, lamellis subcaesis aut subincarnatis.* Persl. l. c.

δ ? *Agaricus (nutans), pileo primò nutante, rufescente; ? margine densato, dentibus porrectis, ab initio stipem ambientibus.* Sow. &rb. Fung. tab. 92.

Très-variable dans ses couleurs, cet agaric s'élève à la hauteur de deux pouces sur un pédicule épais d'une ligne, visqueux, d'un jaune de soufre; il supporte un chapeau large d'environ quatre lignes, sec ou peu charnu, presque lisse, campanulé, obtus ou légèrement ombiliqué, à peine visqueux, d'un blanc-cendré, un peu bleuâtre, quelquefois plombé, ardoisé ou jaunâtre, papyracé ou plissé; les lames distantes, blanches, quelquefois tirant sur le bleu ou de couleur incarnate. Il croît presque par groupes, sur les rameaux abattus des pins, en Angleterre.

283. AGARIC rayé. *Agaricus lineatus*. Bull.

Agaricus solitarius, focus, pileo striato, linato, flavescens-opaco; lamellis asperantibus, albidis, basi vix; stipite basi subconico, al. o. Bull. Herb. tab. 522. — Persl. Synops. pag. 383.

Son extérieur a une apparence de sécheresse & d'aridité. Il s'élève à la hauteur de deux pouces, sur un pédicule blanc, légèrement romescent à sa base, plein, grêle, cylindrique, soutenant un chapeau campanulé, d'un jaune-foncé, traversé par des lignes noires, divergentes, large de trois à quatre lignes, garni en dessous de lames distantes, adhérentes au pédicule, blanchâtres, un peu veinées à leur base. Il croît solitaire, en automne, parmi la mousse, dans les bois de hêtres.

284. AGARIC tubulé. *Agaricus foraminulosus*. Persl.

Agaricus f-fus, glaber, pileo campaniformi, stipitis conico, nunquam suprà striato; lamellis inaequalibus, liberis; stipite cylindrico, tenui. Bull. Herb. tab. 403. fig. B. C., & tab. 555. fig. 1.

Il se distingue du précédent en ce que la surface de son chapeau est lisse, jamais striée, de couleur fauve plus ou moins prononcée. Son pédicule est grêle, elabre, fistuleux, cylindrique, long de trois pouces & un peu plus. Le chapeau est campanulé, plus souvent conique, quelquefois aplati, protubérant à son centre dans sa vieillesse, large d'un pouce & demi, garni de lames libres, nombreuses, inégales. Il croît solitaire, en automne, sur le bord des chemins.

285. AGARIC jaune-blanc. *Agaricus luteo-albus*. Bolt.

Agaricus stipitatus, parvus, pileo conico, striato, flavo; lamellis iridis, albis; stipite filiformi. Bolt. Fung. tab. 38. fig. 1. — Persl. Synops. pag. 383.

Son pédicule est filiforme, haut d'un pouce, de l'épaisseur d'un poil de porc, d'un jaune-pâle; son chapeau conique, large de trois lignes, jaune, strié; ses lames blanches, trifides, élargies. Il croît dans les forêts.

286. AGARIC citronelle. *Agaricus citrinellus*. Persl.

Agaricus gregarius, minutus, pileo striato, hemisphaerico, papillato, stipiteque brevi, basi pileo, citrino; lamellis subventricosis, uncinatis, albidis. Persl. Icon. & Descript. Fung. pag. 44. tab. 12. fig. 3.

μ ? *Agaricus (tenellus), pileo pallidi sulphureo, margine pliculis teneris striato; stipite concolore, filiformi; lamellis albidis, longitudine subaequalibus, latitudine alternis.* Barfch. Elem. Fung. Cont. 5. pag. 103. tab. 18. fig. 88.

Son pédicule est très-grêle, filiforme, haut d'un pouce, légèrement pileux à sa base, d'une couleur tendre de citron, ainsi que tout le reste de la plante. Son chapeau est petit, hémisphérique, mamelonné, large de deux ou trois lignes au plus; les lames légèrement ventrues, en crochet, un peu blanchâtres. Il croît en groupes, dans les bois de pins, parmi les feuilles.

287. AGARIC alongé. *Agaricus elongatus*. Persl.

Agaricus solitarius, pileo levi, hemisphaerico, striato, flavescens; lamellis horisomatibus, subconcoloribus; stipite longissimo, basi filiformi. Persl. l. c. & Descript. Fung. pag. 3. tab. 1. fig. 4. — Synops. pag. 384.

Cette espèce est rare ; elle croît parmi les sphagnes, dans les marais, solitairement. Son pédicule est long de trois pouces & plus, grêle, un peu fibré à sa base ; son chapeau lisse, hémisphérique, jaunâtre, strié, large de trois lignes ; les lames d'une couleur un peu plus obscure, horizontales.

188. AGARIC à pied rouillé. *Agaricus rubiginosus*. Pers.

Agaricus pileo subcampanulato, sulcato, lamellis ferrugineis ; stipite longo, subtenaci, rubiginoso. Pers. Synopf. pag. 387.

Son pédicule est coriace, fistuleux, de couleur de rouille, puis d'un brun-noirâtre, roide, long de trois pouces, soutient un chapeau un peu campanulé, filonné, mince, ridé, d'un brun-pâle, large de quatre lignes ; les lames ferrugineuses, adhérentes, un peu ventrues. Il croît parmi les mousses.

189. AGARIC des hypnes. *Agaricus hypnorum*. Pers.

Agaricus tenerimus, parvus, totus ochraceo-ferrugineus, pileo campanulato, sulcato ; lamellis distinctis, latiusculis ; stipite mediocri. Pers. Synopf. pag. 381. — Schrank, Flor. bav. 2. pag. 605. — Bartsch, Flem. Fung. pag. 117. fig. 96. — Schæff. Fung. tab. 63.

1. *Agaricus (bryophilus), pileo obtusè umbonato, lamellis cinnaomeis ; stipite longissimo, fibrillato, pallidissimo*. Pers. l. c.

2. *Agaricus (sphagnorum), pileo hemisphaerico, papilloso, ochraceo, pallido ; lamellis latis, aquosis pallidis ; stipite longo, subtenaci, fulvo*. Pers. l. c.

Cet agaric est d'une substance très-tendre, glabre, petit, d'un jaune d'ocre, un peu ferrugineux. Son pédicule est grêle, long d'un pouce ; son chapeau campanulé, puis un peu plane, filonné ; les lames distantes, médiocrement élargies. Le pédicule est plus tenace dans la variété 1 ; le chapeau large d'un demi-pouce & plus ; son centre un peu saillant, presque corné. Dans la variété 2, le pédicule est long de trois pouces, d'un fauve-sombre ; son chapeau pâle, obtus, large d'un demi-pouce ; les lames plus distantes, plus élargies ; elles deviennent presque d'une couleur incarnate. On le trouve parmi les mousses, après les pluies.

190. AGARIC tendre. *Agaricus tener*. Pers.

Agaricus subsolitarius, ochraceo-ferrugineus, parvus, pileo membranaceo, canico, leviusculo ; lamellis distantibus, stipite longiuscula. Schæff. Fung. tab. 77. — Sowerb. Fung. tab. 33. — Pers. Synopf. pag. 383.

1. ? *Agaricus (atro-rufus), pileo subconico (aut*

convexo-rufa), fisco, elastico ; lamellis paucis, aristatis, fusco-rubris ; stipite praelongo, gracili. Bull. Fung. pag. 51. tab. 51. fig. 1. — Pers. l. c.

Son pédicule est grêle, allongé, à peine épais d'une ligne, très-glabre, soutenant un chapeau conique, lisse, membranéux, de trois à quatre lignes de haut, mou, fe desléchant, & acquiescent des couleurs plus pâles ; les lames minces, distantes, ascendantes, de couleur canelle ; celle du chapeau d'un jaune très-foncé, tirant fur le brun. Dans la variété 2, le chapeau est plutôt convexe que conique, de couleur brune, élastique en fe desléchant ; les lames moins nombreuses, trides, d'un brun-rougeâtre. Il croît presque solitaire sur les gazons, parmi les saules, en été & en automne.

191. AGARIC piloselle. *Agaricus pilosellus*. Pers.

Agaricus tenellis, subferrugineus, pileo campanulato, conico, subpilis ; lamellis latiusculis ; stipite sublongo, pubescente. Pers. Synopf. pag. 387.

Il ressemble beaucoup au précédent. Son pédicule est pubescent, presque filiforme, long d'un pouce. Son chapeau est campanulé, ébrique conique, haut de trois lignes, large de deux, obtus ; pubescent, principalement à son sommet ; les lames d'une largeur moyenne. Sa consistance est tendre ; sa couleur d'un brun-ferrugineux. Il croît sur les troncs pourris.

192. AGARIC couleur de coing. *Agaricus melinoides*. Bull.

Agaricus gregarius, ochraceo-helveticus, expallescent, pileo carnoso, membranaceo, hemisphaerico, planiusculo ; lamellis subconferis, planis ; stipite mediocri, sursum subincrassato. Bull. Herb. tab. 560. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 387.

Personne ne pense que les figures F, H, C, E, qui représentent le chapeau de ce champignon avec des stries, doivent être rapportées à l'*agaricus hypnorum*. Il paraît en effet assez probable que Bulliard a confondu deux espèces : celle dont il s'agit ici est d'un jaune d'ocre ou de coing. Son pédicule est grêle, fistuleux, glabre, quelquefois un peu velu à la base, long de deux ou trois pouces. Le chapeau est d'abord convexe, puis conique, ensuite plane, souvent un peu strié sur ses bords, large d'un pouce, garni de lames inégales, plus ou moins adhérentes au pédicule. Il croît en automne, parmi les gazons & les mousses.

193. AGARIC coqueret. *Agaricus physoloides*. Bull.

Agaricus pileo suffescente, margine non striato, glabro, campaniformi, dein plano ; laminis rufescentibus, latissimis, subdecurrentibus ; stipite cavo, lato vel flavo. Bull. Herb. tab. 566.

Son pédicule est cylindrique, fistuleux, long d'environ deux pouces, épais d'une ou de deux lignes, de couleur fauve ou jaunâtre, soutenant un chapeau glabre, d'abord ovoïde, puis campanulé, puis plane & même concave, arrondi, jaunâtre ou d'un fauve-roux, point strié, large d'un pouce, garni en dessous de lames inégales, très-larges, roussâtres ou d'un fauve-gris, légèrement découronnées sur le pédicule. Il croît solitaire sur la terre.

294. AGARIC pivotant. *Agaricus perpendiculatus*. Bull.

Agaricus pileo alutaceo, primùm convexo, dein plano; laminis liberis, abfesscentibus; stipite tenui, nitido, levi, rufescente; radice perpendiculari, hirsuta. Bull. Herb. tab. 422. fig. 2.

Cet agaric est pourvu d'une racine simple, pivotante, velue. Son pédicule est grêle, long de trois pouces & plus, épais d'une ligne, luisant, cylindrique, lisse, fistuleux, roussâtre; son chapeau d'abord convexe, puis plane, large de huit à dix lignes, de couleur chamois, garni en dessous de lames libres, inégales, constamment blanchâtres. Il croît dans les bois de haute futaie, vers la fin de l'hiver.

295. AGARIC des feuilles mortes. *Agaricus epiphyllus*. Bull.

Agaricus pileo plus minùsve convexo, rotundato, ex albidio-rufescente, margine substriato; laminis angustis; stipite tenuissimo, filiformi, pleno. Bull. Herb. tab. 569. fig. 2.

Son pédicule est très-grêle, plein, cylindrique, long de trois à quatre pouces, noirâtre, soutenant un chapeau large de quatre à cinq lignes, plus ou moins convexe, arrondi, blanchâtre ou roussâtre, un peu strié sur ses bords, garni de lames libres, étroites, inégales. Il croît dans les forêts, sur les feuilles mortes tombées à terre.

296. AGARIC à pied roide. *Agaricus tenacellus*. Pers.

Agaricus gregarius, subparvus, pileo umbonato, corneo-membranaceo, subumbrino aut fuliginaceo-pallido; lamellis plenius, nigris; stipite glaberimo, subfusco, tenaci; basi piloso, apice albidio. Pers. Synopf. pag. 383, & Obs. Mycol. 1. pag. 50.

Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces, sur un pédicule assez ferme, épais d'une ligne, un peu fauve, très-glabre, pileux à sa base, blanchâtre à son sommet; il fournit un chapeau large de quatre lignes & plus, charnu, membraneux, élastique, un peu convexe, proéminent à son sommet, d'une couleur terreuse plus ou moins foncée, ridé, lisse à ses bords, garni de lames pleines, d'un blanc

de neige. Il croît sur la terre, parmi la mousse, dans les forêts, vers le milieu de l'automne.

297. AGARIC des cônes. *Agaricus conigenus*. Pers.

Agaricus gregarius, mediocris, pileo subarcescente, tenui, subumbonato, demùm plano, subfiliformi, fuliginoso, livido; lamellis confertis, albis; stipite subbreve, basi radiculis albis. Persoon, Synopf. pag. 388.

Son pédicule est presque long d'un pouce & demi, un peu pulvérulent, garni de quelques fibres à sa base; le chapeau médiocrement charnu, mince, d'un brun-ensumé, d'abord un peu convexe, puis plane, large de six à neuf lignes, légèrement strié à sa base, déformé dans sa vieillesse, très-comprimé, presque carré, garni de lames, serrées, étroites, blanchâtres, larges d'une ligne. Sa saveur est acre. Il croît vers la fin de l'automne, sur les cônes de sapin, dans lesquels il pénètre par ses petit-s racines fibreuses.

298. AGARIC du commerce. *Agaricus esculentus*. Pers.

Agaricus stipitatus, pileo convexo, argillaceo (fuscato); stipite gracili, fistuloso, ex albo ferdè favescente; lamellis albis. Pers. Synopf. pag. 388. — Wulf. in Jacq. Miscell. 2. pag. 103. tab. 14. fig. 4.

Agaricus clavus. Schæff. Fung. tab. 59.

Agaricus (dubius), pileo membranaceo, striato, subhemispharico, livesciente, subumbonato; lamellis latis, planiusculis, fordide albis; stipite glabra, pileo concolore. Pers. l. c.

Ce champignon est d'une saveur légèrement amère, mais point dangereux; il se mange dans plusieurs contrées de l'Allemagne. On en apporte, au commencement d'avril, plein des corbeilles aux marchés, où ils se vendent sous le nom de *magelchwammen*. Son pédicule est ordinairement long d'un pouce, égal dans toute sa longueur, fistuleux, cylindrique, d'un blanc-sale, un peu jaunâtre. Le chapeau est d'abord convexe, puis plane, légèrement strié. Sa chair est blanche, très-peu épaisse; sa surface d'une couleur argileuse rembrunie; les lames lâches, blanchâtres, élargies. Dans la variété g, le chapeau est strié, presque hémisphérique, livide, membraneux, sans faveur; les lames d'un blanc-sale, ainsi que le pédicule. Il croît sur les lieux montueux, parmi les pins, dans la forêt d'Hercynie. Le premier se rencontre dans l'Autriche, la Bavière, aux environs de Berlin.

299. AGARIC en grappe. *Agaricus racemosus*. Pers.

Agaricus pileo membranaceo, papillato, griseo;

lamellis albis, stipite racemoso. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 15. tab. 3. fig. 8, & Synopf. pag. 389.

Cette singulière espèce a été observée par M. Persoon sur le *seleotium lacunosum*. Son pédicule est rameux ; il ressemble à une grappe de groseille, dépouillée de ses grains. Les rameaux sont simples, latéraux, terminés par de petites têtes transparentes & fugaces. Le chapeau est terminal, légèrement tomenteux, presque large de deux lignes.

300. AGARIC d'Hudson. *Agaricus Hudsoni*. Pers.

Agaricus gregarius, pilco convexo-albido stipiteque pilosus; pilis sparsis, stridis, rubris. Pers. Synopf. pag. 390.

Agaricus (*pilosus*), *stipitatus, pilco convexo, albo, pilosus; pilis rubris, stipite longo.* Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 622. — Soweth. Fung. tab. 164.

Son pédicule est grêle, alongé, noirâtre, luisant ; il devient un peu rougeâtre en vieillissant, d'après Hudson, ainsi que les poils épars à sa base. Il supporte un chapeau convexe, large d'environ trois lignes, blanchâtre, hérissé de quelques poils roides, alongés, noirâtres, garni en dessous de lames blanchâtres, alternativement inégales, un peu distantes les unes des autres, à peine adhérentes au pédicule. Il croît en automne, sur les feuilles mortes du houx.

301. AGARIC styloforme. *Agaricus stylobates*. Pers.

Agaricus pilco membranaceo, convexo, albidocineroscente; lamellis distinctis, plano-ascendingibus; stipite basi membranula obiculari imposito. Pers. Synopf. pag. 390. — Bull. Herb. tab. 563, fig. R. S. T. ?

Cet agaric est remarquable par une base membraneuse, orbiculaire, un peu convexe, large d'une ligne, striée, pileuse à ses bords, du centre de laquelle s'élève un pédicule blanc, glabre, long d'un pouce & plus, soutenant un chapeau convexe, membraneux, d'un blanc-cendré, large de trois lignes, garni en dessous de lames libres, ovales, planes, ascendantes. Il croît parmi les feuilles.

302. AGARIC élégant. *Agaricus elegans*. Pers.

Agaricus majusculus, pilco membranaceo-striato, umbrinato, livescens-flavo; lamellis dilucis crectis, luteo-purpureo-castis; stipite longiusculo, pallidocinervido. Pers. Synopf. pag. 391.

Cette espèce, selon M. Persoon, est fort élégante. Son pédicule est long d'un à deux pouces, épais d'environ une ligne, d'un blanc-pâle ; son chapeau membraneux, sinué, strié, campanulé, protubérant, obtus, jaune à ses bords, plus pâle

à son centre ; les lames un peu épaisses, d'un jaune de safran-clair à leurs bords, d'un pourpre-bleuté à leurs côtés, ascendantes. Il croît sur les montagnes, dans les bois de pins.

303. AGARIC adonis. *Agaricus adonis*. Bull.

Agaricus gregarius, pilco levi, campanulato, albidulo, roseo aut viridi vario; lamellis subnatis, adnatis, albis. Bull. Herb. tab. 560, fig. 2. — Pers. Synopf. pag. 391.

Son chapeau varie dans ses couleurs ; il est blanc, quelquefois teint de rose, jaunâtre ou verdâtre, mince, point charnu, lisse, campanulé, obtus, large de quatre ou cinq lignes, soutenu par un pédicule long de deux ou trois pouces, large de deux lignes au plus, cylindrique, blanchâtre, fistuleux. Les lames nombreuses, inégales, blanches, étroites, non décourtes sur le pédicule. Il naît par groupes dans les bois, sur la mousse & les branches tombées.

304. AGARIC panaché. *Agaricus variegatus*. Pers.

Agaricus gregarius, majusculus, pilco subearneo, campanulato, levi aut papillato, lituris rufescensibus variegato; lamellis uncinato-decurrentibus stipiteque albis. Pers. Synopf. pag. 392.

Agaricus tinatule. Bull. Herb. tab. 560, fig. 3.

Son chapeau est médiocrement charnu, campanulé, panaché par des raies jaunes & blanches, large d'environ un demi-pouce, très-souvent muni à son centre d'une éminence conique, soutenu par un pédicule très-grêle, fistuleux, blanchâtre, long de trois pouces & plus. Les lames sont blanches, inégales, munies dans leur milieu d'un crochet très-marqué, & se prolongeant sur le pédicule. Il croît par groupes, sur les gazon & les mousses.

305. AGARIC rose. *Agaricus roseus*. Pers.

Agaricus gregarius, parvus, roseus, pilco campanulato, papillato; lamellis ubidis; stipite styliformi, pallidocinervido. Pers. Synopf. pag. 393, tab. 5, fig. 3.

Agaricus fistulosus. Bull. Herb. tab. 518, fig. P.

Il est remarquable par la couleur rose, quelquefois grise, de son chapeau campanulé, hémisphérique, puis convexe, proéminent à son centre, large d'un demi-pouce, peu charnu, supporté par un pédicule long de deux pouces, grêle, blanchâtre, fistuleux. Les lames sont peu adhérentes avec le pédicule, blanchâtres, inégales. Il croît sur les branches & les feuilles mortes, dans les bois.

306. AGARIC clou. *Agaricus clavus*. Linn.

conspicuis, primò albidò-purpureiscentibus; stipite longissimo, annulo mobili. Bull. Herb. tab. 16.

Agaricus comatus. Pers. Synops. pag. 395. — Cæd. Flor. dan. tab. 834. — Schmid. Icon. tab. 10. (Voyez AMANITE, n°. 53.)

314. *AGARIC faux éphémère. Agaricus ephemeroideus.* Bull.

Agaricus pileo conico, albidò, centro flavescente, margine striato; stipite fistuloso, basi bulboso, fistulatum inius recondente; annulo nunc fixo, nunc mobili. Bulliard, Herb. tab. 582. fig. 1. — *Basi glabra.* fig. A. F. D. G. — *Basi fistulosa.* fig. B. C.

Cette espèce ressemble, par sa grandeur, à l'agaric éphémère, & par sa forme à l'agaric maffette. Son pédoncule est long de deux ou trois pouces, traversé dans toute sa longueur par un filet velu; il est blanc, fistuleux, cylindrique, renflé à sa base en une bulbe épaisse, glabre ou hérissé. Son chapeau est d'abord ovoïde, puis conique, puis plane avec les bords déchirés, blanchâtre, strié sur les bords, jaunâtre au centre, garni de lames libres, étroites, recouvertes, dans leur jeunesse, par une membrane qui forme autour du pédoncule un anneau fixe ou mobile; elles se détachent, dans leur vieillesse, en une eau noire. Il croît sur le fumier.

315. *AGARIC plissé. Agaricus plicatus.* Pers.

Agaricus capitosus, pileo campanulato, plicato, fuscescente cinereo, apice squamuloso, margine demum revolutò; lamis confertis, latis, primò purpureiscentibus, pratinatis. Pers. Synops. pag. 356. — Dispos. Fung. pag. 52, & Comm. pag. 27. — Lightf. Scot. 2. pag. 1023. — Curtiss, Lond. tab. 101. — Non Lam. Diâ.

Son chapeau est d'un brun-cendré, campanulé, plissé, couvert à son sommet d'écailles brunes, couchées; il se rabat & se dissout en eau à sa circonférence. Les lames sont nombreuses, adhérentes entr'elles, parsemées d'une poussière blanchâtre, très-rapprochées, d'abord d'un rouge-brun, puis noires; le pédoncule, coupé transversalement, offre des couches circulaires. Il croît par groupes le long des haies, dans les prés.

316. *AGARIC larmoyant. Agaricus lacrymans.* Bull.

Agaricus pileo campanulato, rufescente, subtomentoso; lamellis luteo-nigrescentibus; stipite nudo. Bull. Herb. tab. 194, & tab. 125. fig. 3.

Agaricus velutinus. Pers. Synops. pag. 409.?

Son pédoncule est long de quatre à cinq pouces, épais d'environ cinq lignes, cylindrique, fistuleux, un peu coroneux, d'un blanc-punâtre; il supporte un chapeau d'abord hémisphérique, puis

campanulé, puis relevé à ses bords en dessus, large de trois à cinq pouces, sec à sa superficie, d'un fauve-clair ou foncé, garni de lames jaunâtres, inégales, légèrement décurrentes sur le pédoncule, parsemées de petites taches noirâtres, couvertes, dans leur jeunesse, d'un réseau filamenteux, très fin, qui se détruit entièrement: on distingue de petites gouttes d'une eau noirâtre sur le bord des lames. Il croît solitaire dans les bois, sur la terre, dans le courant de l'automne.

317. *AGARIC pie. Agaricus picaceus.* Bull.

Agaricus pileo campanulato, tenuissimo, albidò, in squamas latis, fissuras demum rupto; lamellis denudatis, confertis, umbrinis; stipite longissimo, bulboso, nudo. Bull. Herb. tab. 206. — Persoon, Synops. pag. 397. — Sowerb. Fung. tab. 170.

Cet agaric, très-fugace, est pourvu d'un pédoncule cylindrique, blanc, fistuleux, long de huit à neuf pouces, épais d'un demi-pouce, renflé en tubercule à sa base, soutenant un chapeau presque-ovale, puis conique, puis un peu plane, incisé à ses bords, recouvert d'une pellicule blanche qui se fend en travers, & laisse apercevoir des lames brunes, inégales, très-nombreuses, adhérentes entr'elles par le dos, séparées du pédoncule, parsemées de plaques blanches, se fondant en une eau noirâtre. Il croît sur les plantes en putréfaction.

318. *AGARIC voilé. Agaricus obscurus.* Pers.

Agaricus pileo albidò, tomentoso, evanescente; lamellis denudatis, primò rubris; stipite basi annulato. Pers. Synops. pag. 397.

Son chapeau est d'abord blanc, tomenteux, ensuite strié, déchiré, parsemé d'une poussière rougeâtre, soutenu par un pédoncule fistuleux, couvert d'un voile blanc qui persiste en anneau. Les lames sont nombreuses, entières; elles deviennent noirâtres & se détruisent assez promptement, ainsi que les autres parties de la plante. Elle croît en Angleterre, sur le fumier.

319. *AGARIC à grosse racine. Agaricus macrorhizus.* Mich.

Agaricus pileo campanulato, griseo; stipite brevissimò; radice longissima, fissiformi. Mich. Nov. gen. pag. 189. tab. 183. fig. 2.

Cette espèce est très-remarquable par sa racine ou pivot filiforme, long de six pouces, d'où s'élève un pédoncule court, long de deux pouces & demi, épais de trois lignes, soutenant un chapeau campanulé, d'un gris-cendré, écailleux dans sa jeunesse. Il croît vers la fin de l'automne, sur du fumier de poule.

320. *AGARIC cendré. Agaricus cinereus.* Bull.

Agaricus

Agaricus pileo conico, sulcato, subtomentoso, clatere; apice levi, diviso, margine demum lacerato, inflexo; lamellis linearibus; punctatis, subflexuosis; stipite longo, nudo, fuscescentibus. Bull. Herb. tab. 88. — Schæff. Fung. tab. 100. — Wedd. Flor. dan. tab. 1198. — Lam. Dict. var. 1. — Pers. Synopf. 398. var. 4. — Michel, Gen. tab. 80. fig. 5.

Toutes les parties de ce champignon sont d'un gris-cendré. Son pédicule est long de sept à huit pouces & plus, fistuleux, cylindrique, un peu flexueux, couvert d'une poussière tenace & de petites inégalités. Son chapeau, large de cinq pouces, peluché à sa surface, offre d'abord la forme d'un cylindre, puis il se relève à ses bords, qui se fendent, le recoquillent en dessus & se fondent en eau. Les lames sont nombreuses, inégales, séparées du pédicule, linéaires, ponctuées, un peu flexueuses; elles se noircissent rapidement. Il croît en été, dans les bois, les prés, sur les bouses de vache.

321. AGARIC drapé. *Agaricus tomentosus.* Bull.

Agaricus pileo oblongo, ob initio pyramidalis, postea campaniformi, lacerato; lamellis numerosis, angustis, pallidis; margine atris; stipite nudo, brevi, cylindrico, tomentoso, attingit ostaculato. Bolton Fung. pag. 156. tab. 156. — Bull. Herb. tab. 138.

Agaricus cinereus. Var. 1. Pers. Synopf. pag. 399.

6. ? *Agaricus (pallatus), stipitatus, pileo campanulato, plicato, atro; stipite longo, ventricoso, albidulo.* Bolt. Fung. pag. 20. tab. 20.

Cet agaric est très-fugace, & se résout promptement en une eau noirâtre. Son pédicule est blanchâtre, fistuleux, un peu tomenteux, long de deux à trois pouces, rétréci à ses deux extrémités; il supporte un chapeau d'abord cylindrique, puis un peu conique, large d'un pouce & demi, couvert d'une pellicule peluchée, cotonneuse qui disparaît, & met à nu des lames blanches, étroites, inégales, appliquées deux par deux l'une contre l'autre. Il croît en automne, sur la terre, dans les jardins & les bois; la variété 6 sur les fumiers, dans les prés. Cette dernière a son chapeau campanulé, son pédicule ventru.

322. AGARIC à pied long. *Agaricus striatus.* Pers.

Agaricus pileo campanulato, fesso, striato (non revoluto); lamellis confertis, nigris; stipite longissimo, fibrilloso, albo. Pers. Synopf. pag. 399.

Son pédicule est long de sept à huit pouces, épais de trois lignes, blanc, cylindrique, un peu courbé; son chapeau campanulé, puis fendu, mais point relevé, haut de deux pouces, un peu pulvérescent à sa superficie, roussâtre & obtus à son centre, cendré vers les bords; les lames noires, nombreuses. Il croît sur le tronc des arbres.

Botanique. Supplément. Toms I.

323. AGARIC à duvet blanc. *Agaricus niveus.* Pers.

Agaricus pileo campanulato, squamuloso-farinaceo; stipiteque tomentoso, niveis; lamellis integris, annexis. Pers. Synopf. pag. 400.

Son chapeau est campanulé, parsemé d'écaillés farineuses, large d'un pouce, revêtu d'un duvet d'un blanc de neige, ainsi que le pédicule, qui est grêle, aminci, long de trois pouces, épais de deux lignes. Il croît dans les forêts humides, sur les crotins de cheval.

324. AGARIC à encroûte. *Agaricus atramentarius.* Bull.

Agaricus gregarius, pileo ob initio globuloso, deinde campaniformi, elongato, lutescente, muculis subnigris, praefertim in disco, notato; stipite albo, nudo, cylindrico. Bull. Herb. tab. 164. — Vaill. Bot. Paris. tab. 12. fig. 10. 11.

L'eau noire en laquelle se résout la substance de ce champignon a servi à Bulliard à faire de l'encre pour le lavis. Son pédicule est glabre, fistuleux, long de six à sept pouces, nu, blanc, cylindrique, soutenant un chapeau large de trois pouces & plus, à peine charnu, d'abord globuleux, puis campanulé, un peu allongé, jaunâtre, finué à ses bords, muni vers son sommet de petites plaques rousses, strié à sa circonférence, humide à sa superficie, garni de lames inégales, d'abord blanches, puis d'un noir-bistré, repliées sur elles-mêmes, point adhérentes au pédicule, un peu pubescentes à leurs bords, vues à la loupe. Il croît dans les lieux humides, en automne, par groupes très-étendus, souvent partant de la même souche.

325. AGARIC micaé. *Agaricus micaetus.* Bull.

Agaricus aspidiosus, pileo campanulato, sulcato, ferrugineo; lamellis nientibus, primò roseis, dein cinereis, tandem nigrescentibus; stipite nudo, tereti. Bull. Herb. tab. 555.

Agaricus ferrugineus. Pers. Synopf. pag. 40.

Agaricus lignorum. Schæff. Fung. tab. 66. ?

La surface du chapeau & celle des feuillets sont parsemées, dans ce champignon, de petites pointes brillantes, sensibles à la loupe. Son pédicule est nu, fistuleux, cylindrique, blanc, de quatre à cinq pouces de long, soutenant un chapeau à peine charnu, d'abord convexe, puis campanulé, allongé, puis plane, protubérant à son centre, qui est sauté & peluché; marqué à ses bords de stries très-ferrées, garni de lames libres, inégales, très-nombreuses, formées par les duplicatures d'une seule & même membrane, en sorte que chacune d'elles paroît composée de deux lames; elle se réduit en une eau noire comme de l'encre. Il croît

D d

dans les bois, les prés & les jardins, trois ou quatre fois par an.

326. AGARIC F. :x éteignoir. *Agaricus pseudotindorius*. Decand.

Agaricus (extinctorius), *stipite nudo, subcylindrico, longiusculo, basi tumidiusculo; pileo campanulato, margine inaequali, sursum squamuloso, pallido, apice fuscescente, margine demum lacero, inciso*. Bull. Herb. tab. 417. fig. 1. (Non Perf. Bolt. & Linn.) — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 148.

Agaricus ferrugineus. Var. γ. Perfoon, Synopf. pag. 401.

Son pédicule est ou, fistuleux, glabre, cylindrique, blanc, long de cinq à six pouces, continu avec le chapeau, un peu épaissi à sa base, prolongé en une racine courte, soutenant un chapeau d'abord cylindrique, puis ovale, puis conique, un peu blanc ou jaunâtre à son sommet, obtus, long d'environ deux pouces, strié vers ses bords, puis frangé, sinué, parsemé, dans son milieu, des débris de la pellicule en forme de petites plaques, garni de lames adhérentes par leur dos, inégales, blanchâtres, puis noires. La plupart périssent après la chute de la peau : il n'en reste que les plus grandes, sous la forme de huit à dix rayons partant du pédicule. Il croît solitaire, dans le courant de l'été, sur le fumier.

327. AGARIC ferrugineux. *Agaricus ferrugineus*. Perf.

Agaricus castiposus, pileo campanulato, sulcato, ferrugineo; lamellis nitentibus, primò roseis, dein cinereis, tandem nigrescentibus. Perf. Dispos. Meth. Fung. pag. 62, & Synopf. pag. 400.

Agaricus lignorum. Schæff. Fung. tab. 66.

β. *Agaricus* (hortensis), gregarius aut castiposus, pileo subplicate, flexuoso, ochraceo; lamellis angustis, primò subcassis, dein nigrescentibus; stipite glabro, primò mediocri, crassiusculo. Perf. l. c.

Agaricus truncorum. Schæff. Fung. tab. 4.

Son chapeau est campanulé, cannelé, strié, d'un brun-ferrugineux, souvent parsemé à les bords de petits flocons farineux, soutenu par un pédicule blanc, long de quatre pouces, épais, fistuleux. Les lames font étroites, inégales, luisantes, d'abord un peu rougeâtres, puis cendrées, puis noires; elles font, dans la variété β, de couleur ochracée, ainsi que le chapeau; les lames linéaires, entières, noires à l'une de leurs faces, ochracées à l'autre. Il croît en automne, sur le tronc des arbres, dans les forêts. La variété β se rencontre dans les jardins, sur la terre & les bois pourris, après les pluies de l'été.

328. AGARIC lacuneux. *Agaricus lacunosus*. Perf.

Agaricus solitarius aut subcastiposus, pileo campanulato, obtuso, expalliescente, ruguloso; lamellis subadscendentibus, lutescentibus, purpureo-cinereis; stipite mediocri, cylindrico; deorsum squamuloso. Perf. Synopf. pag. 401.

Son pédicule est cylindrique, fistuleux, long de deux ou trois pouces, épais d'une ligne & plus; son chapeau campanulé, obtus, un peu ferme, pâle, à cannelures lacuneuses à sa surface; les lames presque ascendentes, d'un pourpre-cendré, un peu élargies. Il croît sur le tronc des arbres.

329. AGARIC cotonneux. *Agaricus gessipinus*. Bull.

Agaricus castiposus, pileo lato, subplicate, campanulato, ochraceo; lamellis distinctis, liberis; stipite cavo, villosio, deorsum incrassato. Bull. Herb. tab. 426. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 402.

Cet agaric est fugace, & ne dure au plus que cinq à six jours; il est muni d'un chapeau campanulé, puis plane, romentoux, ensuite glabre, blanc dans sa jeunesse, ensuite jaune-pâle, roux à son centre, enfin d'un gris-cendré, marqué, à mesure qu'il vieillit, de stries divergentes à ses bords, large de deux pouces, peu charnu, soutenu par un pédicule long de deux pouces, blanchâtre, fistuleux, cylindrique, couvert à sa base, ou quelquefois dans toute sa longueur, d'un duvet blanc, coronneux, fugace. Les lames sont libres, inégales entr'elles, d'abord blanches, puis noirâtres, qui se réduisent, ainsi que le chapeau, en une liqueur noire. Il croît sur la terre, à la fin du printemps, dans les bois.

330. AGARIC à pied alongé. *Agaricus macropus*. Perf.

Agaricus pileo hemispharico, molli, albido-polliescente; lamellis griseis, margine albidioribus; stipite longo, onnulo fugaci. Perf. Synopf. pag. 402.

Son pédicule est fistuleux, long de trois ou quatre pouces, épais d'une ligne, de même couleur que le chapeau; celui-ci est hémisphérique, convexe, puis plane, mou, d'un blanc-pâle, très-glabre à son disque; les lames adhérentes, horizontales, d'abord grises, un peu incarnées, plus blanches à leurs bords, ponctuées de noir; le pédicule muni d'un anneau fugace. Il croît solitaire sur la terre.

331. AGARIC d'un fauve-clair. *Agaricus vitellinus*. Perf.

Agaricus fragilis, pileo viscido, dilute vitellino; lamellis distinctis, argillaceis; stipite fistuloso, farinaceo, pulverulento, nudo. Perf. Synopf. pag. 402.

Son pédicule est long de deux pouces & demi, épais de deux lignes, nu, fistuleux, couvert d'une poussière farineuse, soutenant un chapeau vis-

queux, d'un fauve-clair, surtout à son sommet, strié, campanulé, obtus, garni de lames libres, d'un jaun-terreux, flasques, ascendantes, un peu plissées à leurs côtés. Il croît par groupes sur le fumier de cheval.

332. AGARIC en forme de dé. *Agaricus digitaliformis*. Bull.

Agaricus pileo ab initia ovoides, dein digitaliformis; centro rufescente, margine striis nigris notato; stipite tenui, nudo, striato. Bull. Herb. tab. 12, & tab. 525, fig. 1.

Agaricus diffiniatus. Var. β . Persoon, Synopf. pag. 403. (Voyez AMANITE, n°. 41.)

333. AGARIC disséminé. *Agaricus diffeminatus*. Pers.

Agaricus congestus, parvus, fugax, pileo semi-ovato, striato-plicato, primùm subochraceo, dein griseo; lamellis distinctis, semi-adnexis, albidis subsessilibus; stipite et plurimum incurvo. Pers. Comm. pag. 85, & Synopf. pag. 473. — Schæff. Fung. tab. 358. Junior.

Ce champignon paroît n'être qu'une variété du précédent; il est petit, fugace. Son pédicelle est ordinairement recourbé; il soutient un chapeau à demi ovale, plissé, strié, d'abord légèrement ochracé, puis grisâtre, garni en dessous de lames distinctes, à demi adhérentes, d'un blanc rembruni. Il croît sur le tronc des arbres, en été & dans l'hiver.

334. AGARIC domestique. *Agaricus domesticus*. Pers.

Agaricus pileo campanulato, obtuso, undulato, sulcato, fuligineo; squamulis furfuraceis; lamellis confertis, linearibus, primò casto-rubris, dein brunneis, nigricantibus. Pers. Synopf. pag. 405. — Bolt. Fung. pag. 26. tab. 26.

Son pédicelle est long de trois poudres, épais de trois à quatre lignes, blanc; tubuleux, fistuleux, soutenant un chapeau campanulé, puis plane, obtus, ondulé, cannelé, couleur de bistre, couvert d'écaillés farineuses; les lames nombreuses, linéaires, d'abord d'un rouge-bleuâtre, puis brunes & noires, attachées au sommet du pédicelle. Il croît dans les maisons, sur les murs humides.

335. AGARIC à demi strié. *Agaricus semistriatus*. Æder.

Agaricus (pulcher), tener, fugax, pileo umbilicato, planiusculo, plicato; plicis latiusculis, castis; lamellis liberis, distinctis; stipite elongato, albidoprescente. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 63, & Synopf. pag. 404. — Æder. Flor. dan. tab. 1134.

Agaricus plicatus. Curtis, Flor. Lond. Icon. — Wierher. Arrang. 4. pag. 297.

Agaricus (subfinitis), pileo membranaceo, planiusculo, cinereo; apice squamoso, rimoso, nigricante; lamellis angustis, flexuosis; stipite albo, pulverulento. Pers. l. c. pag. 405.

Son pédicelle est allongé, d'un blanc-roussâtre, légèrement élastique, un peu tuberculeux à sa base, soutenant un chapeau très-mou, large de neuf lignes, plissé, cannelé, ombiliqué, plane, fugace; les stries fourchues, le sommet glabre, d'un roux-ochracé; les lames point adhérentes au pédicelle, cendrées, noisettes. La variété β est plus petite. Ses lames sont adhérentes au pédicelle, en forme d'anneau; les cannelures du chapeau dichotomes, un peu tomenteuses. Il croît dans les prés, les jardins, sur des monceaux d'ordures.

336. AGARIC narcotique. *Agaricus narcoticus*. Batfch.

Agaricus pileo convexo, cinereo, plicis densis, bifidis, distinctis plicato, vertice integro; stipite subulato; lamellis rarioribus, integris, & amidatis alternis. Batfch. Elem. Fung. Cont. 1. pag. 79. tab. 16. fig. 77.

Ce champignon répand une odeur tellement narcotique, qu'il occasionne des maux de tête assez violents à ceux qui l'observent un peu trop longtemps. Son pédicelle est tubuleux; son chapeau d'abord oblong, puis convexe, puis plane, large d'un demi-pouce, velu, puis glabre, cendré, marqué de plis nombreux, bifides & d'écaillés recourbées; garni de lames peu nombreuses, entières, alternes avec d'autres de moitié plus courtes, cendrées dans la jeunesse. Il croît le long des chemins, sur les gazons.

337. AGARIC à mamelons. *Agaricus papillofus*. Batfch.

Agaricus pileo griseo, furfuraceo, campanulato-lacero; margine striato, vertice papillifero, stipite lineari; laminis integris, crassioribus, & reliquis vix brevioribus, teneris, utrisque alternis. Batfch. Elem. Fung. Cont. 1. pag. 81. fig. 78. — Pers. Synopf. pag. 406.

Son chapeau est d'abord oblong, large de trois lignes, puis campanulé, écailléux, floconneux, strié, déchiré à ses bords, couvert à son sommet de petits mamelons oblongs, de couleur grise, soutenu par un pédicelle linéaire, long d'un pouce & demi, fouillé à son sommet; les lames inégales, les entières plus épaisses; les autres alternes, plus courtes, rendues, noires, blanchâtres à leurs bords. Il croît sur la terre, le long des ornières des grands chemins.

338. AGARIC elliptique. *Agaricus ellipticus*. Pers. D d 2

Agaricus pileo plano, elliptico, dilute casto seu albidocinereo; lamellis planiusculis, subcistatis, primò subpurpureiscentibus, demùm cinnamomeis; stipite brevi, nitido. Pers. Synops. pag. 406.

Son pédicule est long d'un pouce, luisant; son chapeau très-tendre, frié, plane, elliptique, d'un bleu léger ou d'un blanc-cendré; les lames presque planes, peu nombreuses, très-minces, larges d'une ligne, presque adhérentes, d'abord légèrement purpurines, puis d'un jaune-cannelle. Il est rare: on le rencontre sur le tronc des arbres.

339. AGARIC éphémère. *Agaricus ephemerus.* Bull.

Agaricus gregarius, minor, pileo campanulato, demùm partito, striato, glabro, subcinereo; disco rufescente; stipite nudo, longo, glabro. Bull. Herb. tab. 542. fig. 1. — Pers. Synops. pag. 406.

1. *Agaricus momentaneus.* Bull. Herb. tab. 128.

Ce champignon est grêle & sa consistance molle & fugace. Son pédicule est blanchâtre, fistuleux, glabre, cylindrique, long au plus de quatre pouces, épié d'une ligne, soutenant un chapeau glabre, d'abord ovale, puis campanulé, puis étalé, souvent partagé en cinq ou six lobes profonds & divergens, quelque fois roulé en dessus à ses bords, roussâtre à son centre, d'un jaune-sale à sa circonférence, marqué de stries noires; les lames étroites, libres, inégales, blanchâtres, se réduisant ensuite en une liqueur noirâtre. Il ne dure qu'un jour & croît sur les fumiers.

340. AGARIC des fumiers. *Agaricus stercorearius.* Bull.

Agaricus minutissimus, griseus, pileo demùm planiusculo, radiato-fisso; disco ochraceo; lamellis distantibus; stipite fissiformi, nudo. Bull. Herb. tab. 68 & 142. fig. 2.

Agaricus radiatus. Pers. Synops. 407.

Cet agaric ressemble beaucoup au précédent; il en diffère en ce qu'il est un peu plus grand, & par son chapeau plus griffé, garni, ainsi que le pédicule, d'un duvet peluché, plus abondant dans la jeunesse de la plante. Il croît en automne, sur les fumiers.

341. AGARIC hydropique. *Agaricus hydroporus.* Bull.

Agaricus calpefusus, pileo ab initio campaniformi, demùm caneco; disco rufescente; margine laevi, striato, griseo, sursum repleto; stipite subradicato, nudo. Bull. Herb. tab. 558. fig. 2.

Son chapeau est frié, large d'un pouce & demi, grisâtre sur les bords, roux à son centre, d'abord

en cloche, puis conique, relevé & déchiré à ses bords, soutenu par un pédicule glabre, nu, fistuleux, cylindrique, long de quatre à cinq pouces, épais de deux lignes; les lames sont étroites, inégales, jaunâtres, un peu adhérentes au pédicule. Il croît sur la terre, par groupes, dans les bois, les prés & les jardins.

342. AGARIC déliquescent. *Agaricus deliquescens.* Bull.

Agaricus pileo griseo, striato, ab initio hemisphaerico, acinè campaniformi, elongato; lamellis liberis, primò albidis purpureiscentibus, deinè nigris; stipite nudo. Bulliard, Herb. tab. 437. fig. 2, & tab. 558. fig. 1.

Son pédicule est long de quatre à six pouces, nu, glabre, fistuleux, cylindrique, de couleur blanche, rayé à son sommet, soutenant un chapeau peu charnu, d'abord hémisphérique, puis en cloche allongée, puis relevé à ses bords, large de deux pouces, fauve à son centre, gris & frié sur ses bords, garni de lames libres, nombreuses, inégales, d'abord blanches ou purpurines, ensuite noires, se fondant en eau noirâtre avec le chapeau. Il croît toute l'année, en groupes, dans les prés & les jardins.

343. AGARIC entassé. *Agaricus congregatus.* Bull.

Agaricus confusus, pileo digitaliformi, sub finem latefcente; colore dilute flava; lamellis albis, dein nigrescentibus; stipite nudo. Bull. Herb. tab. 54. (Voyez AMANIE, n°. 41.)

344. AGARIC de terreau. *Agaricus semipurus.* Bull.

Agaricus pileo campanulato, viscoso, subinflatescente; lamellis ascendens, cinereo-nigrescentibus, nebulous; stipite longo, annulato, fusco. Bull. Herb. tab. 66.

Agaricus semiovatus. Pers. Synops. pag. 408. — Wither. Art. 3. pag. 256. — Sowerb. Fung. tab. 131.

Son pédicule est glabre, fistuleux, cylindrique, roussâtre, long de six à neuf pouces, marqué, un peu en dessous du chapeau, d'une tache noirâtre, circulaire, soutenant un chapeau peu charnu, d'abord jaunâtre, puis gris & noirâtre, large de deux pouces, gluant à sa surface dans sa vieillesse; d'abord en cloche un peu conique, puis plane & relevé à ses bords, garni de lames nombreuses, inégales, adhérentes au pédicule, noirâtres dans leur vieillesse. Il croît sur le terreau, sur les couches en automne, dans les jardins, les terres chaudes.

345. AGARIC papilionacé. *Agaricus papilionaceus.* Pers.

Agaricus pileo campanulato, fuligineo, subnigrescente; lamellis rotis adnexis, cinereo nigroque varietis, margine albiatis; stipite nudo. Bulliard, Herb. tab. 158, & tab. 561. fig. 2. — Pers. Synops. pag. 410.

Agaricus varius. Pers. Icon., & Descr. Fung. 2. pag. 40.

Ses lames sont parsemées de taches semblables à celles de quelques papillons; elles sont minces, larges, inégales, adhérentes au pédicule, noires dans leur vieillesse; le chapeau peu charnu, large à peine de quatre lignes, glabre, d'abord conique, puis campanulé, d'un jaune-sale, un peu frangé à ses bords, soutenu par un pédicule jaunâtre, glabre, nu, cylindrique, fistuleux. Il croît dans le courant de l'été, sur les feuilles pourries, dans les bois & les jardins.

346. AGARIC en demi-globe. *Agaricus semiglobatus.* Pers.

Agaricus pileo carnoso, hemispharico, subviscoso, fusciscenti; lamellis lutescentibus, horizontalibus, nigrescenti-nebulosis; stipite longo, annulato. Persoon, Synops. pag. 407. — Batfch. Elem. Fung. pag. 140. fig. 110. — Sowb. Fung. tab. 248. — Bull. Herb. tab. 566. fig. 4.?

Agaricus glutinosus. Curt. Flor. Lond. tab. 69.

Son pédicelle est allongé, parsemé souvent de points noirâtres, muni d'un anneau fugace, soutenant un chapeau charnu, hémisphérique, large de six ou neuf lignes, jaunâtre, un peu visqueux, garni de lames adhérentes au pédicule, très-larges, remplissant toute la cavité du chapeau, horizontales, noirâtres, nébuleuses. Il croît dans les prés, dans les forêts.

347. AGARIC défilé. *Agaricus depilatus.* Pers.

Agaricus stipite solido, veluto (annulato), squamoso-squarroso; pileo fastigiato, levi (glabro), livido-fusciscenti; lamellis nigris. Pers. Synops. pag. 408.

Agaricus squarrosus. Vahl, in Flor. dan. tab. 1191. c.

Son pédicelle est plein, long de cinq pouces, épais d'un demi-pouce, couvert d'écaillés scabreuses, muni d'un anneau, soutenant un chapeau glabre, nu, conique, proéminent à son sommet, d'un jaune caille, large de trois pouces, garni de lames noirâtres. Il croît sur le tronc des bouleaux.

348. AGARIC écailléux. *Agaricus squamosus.* Pers.

Agaricus subspinosus, pileo carnoso, umbonato, atraceo, margine sparsum squamoso; lamellis laevis,

nigrescenti-nebulosis; stipite longo, squamoso, annulato. Pers. Synops. pag. 409.

3. *Agaricus diffrans.* Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 13.

7. *Agaricus nitens.* Vahl, in Flor. dan. tab. 1064.

Il est très-rapproché de l'espèce précédente. Son pédicelle est long, d'un brun noir, écailléux, muni d'un anneau, soutenant un chapeau charnu, un peu visqueux, proéminent à son centre, de couleur d'ochre, écailléux & frangé à ses bords, garni de lames noirâtres, larges d'un demi-pouce. Il croît sur les troncs d'arbres; la variété 3 dans les lieux marécageux, sur les feuilles tombées, & la variété 7 sur le fumier de vache.

349. AGARIC à ceinture. *Agaricus cinclulus.* Pers.

Agaricus stipite, pileo convexo, sulco, cinclulo obscuriore pileo; lamellis trifidis, latis, nigris; stipite longo, fistuloso, fusco. Bolt. Fung. pag. 152. tab. 152.

On le distingue à une bande circulaire située vers le bord du chapeau, d'une couleur plus foncée & qui pénètre dans la substance. Le pédicelle est long, fistuleux, de couleur brune; le chapeau est fauve, convexe; les lames larges, trifides, noirâtres. Il croît dans les prés, sur le fumier, après les pluies.

350. AGARIC des foins. *Agaricus fanestheil.* Pers.

Agaricus gregarius, fragilis, pileo campanulato, fusciscenti-fuligineo; lamellis subventricosus, nebulosis, subumbrinis; stipite subincrassato, glabro, nudo. Pers. Icon., & Descr. Fung. pag. 42. tab. 11. fig. 1, & Synops. pag. 411.

Il est très-tendre, fragile. Son pédicelle est très-glabre, nu, un peu renflé; son chapeau campanulé, d'un brun-bistré; ses lames ventrues, nébuleuses, de couleur un peu terreuse. Il croît dans les prés après la coupe des foins, & sur le fumier de vache.

351. AGARIC coprophile. *Agaricus coprophilus.* Bull.

Agaricus pileo subcarnoso, latè umbonato, rufescente, f. l. lineo; lamellis latis, ventricosus, arcuatis, adnexis, lividis aut gilvis; stipite nudo, fistuloso, cineriscente. Bull. Herb. tab. 566. fig. 3. — Pers. Synops. pag. 412.

Son pédicelle est grêle, nu, fistuleux, long de trois à quatre pouces, velu, ainsi que le chapeau, dans la première jeunesse, de couleur cendrée, soutenant un chapeau conique, rouffécâtre, peu

charnu ; son centre large, proéminent ; les lames larges, arquées, un peu ventrues, d'un gris-roux, échancrées de bas en haut au point de leur insertion sur le pédicule. Il croît en touffes, sur les fumiers.

352. AGARIC bulbeux. *Agaricus bullaceus*. Bull.

Agaricus gregarius, parvulus, pileo hemisphaerico, margine striato, obscurè rufo ; lamellis latissimis, cinnameis, planis ; stipite nudo, subbrevis, lanuginoso, pallidescens-olivo. Bulliard, Herb. tab. 566. fig. 2. — Pers. Synopl. pag. 412.

Il ressemble beaucoup au précédent. Ses couleurs sont plus foncées. Son pédicule, souvent hérissé, est long de deux pouces au plus, épais de deux lignes, nu, filiforme, cylindrique, quelquefois glabre, soutenant un chapeau hémisphérique, convexe, large d'un pouce & demi, rouffesâtre, brun & frire sur les bords, garni en dessous de lames inégales, élargies, d'un jaune canelle, adhérentes au pédicule, se terminant par une ligne préhensile droite. Il croît par touffes, sur le fumier.

353. AGARIC fumeterre. *Agaricus fomicola*. Pers.

Agaricus gregarius, pileo subcarneo, hemisphaerico, rufescente-alutaceo ; lamellis latissimis, fuscis ; stipite filiformi, nitido ; pileo concolore. Pers. Synopl. pag. 412.

Son pédicule est long de deux ou trois pouces, épais d'une ligne, un peu renflé à son sommet, pulvérulent, de couleur brune ; son chapeau médiocrement charnu, hémisphérique, d'un roux-pâle ; les lames brunes, élargies, adhérentes au pédicule, larges d'environ deux lignes. Il croît dans les prés, sur les boules de vache, par groupes.

354. AGARIC des bruyères. *Agaricus ericetorum*. Pers.

Agaricus solitarius, pileo subcarneo, hemisphaerico, obsolete papillato, fulvo-ferrugineo ; lamellis latissimis, nebulois, nigris ; stipite nudo, subtenaci, elongato. Pers. Synopl. pag. 413.

Agaricus helvolus. Schæff. Fung. tab. 210. ?

Son pédicule est nu, un peu ferme, allongé, d'un fauve-luisant, soutenant un chapeau médiocrement charnu, hémisphérique, un peu mamelonné, large d'environ un pouce & demi, fauve, un peu ferrugineux, garni de lames élargies, noires, blanches à leurs bords. Il croît solitaire, parmi les bruyères.

355. AGARIC des sables. *Agaricus dichrous*. Pers.

Agaricus pileo subcarneo, hemisphaerico, subviscido, spadiceo, nitido ; lamellis distantibus, cin-

reis, nigro-punctatis ; stipite longo, nudo. Perfoon, Synopl. pag. 413.

Il a beaucoup de rapport avec le précédent. Son pédicule est long de quatre pouces, nu, légèrement flexueux, un peu fauve, soutenant un chapeau peu charnu, hémisphérique, puis plane, un peu visqueux ; sa surface luisante, d'un jaune-pâle ; les lames distantes, un peu ventrues, adhérentes, de couleur cendrée, ponctuées de noir. Il croît dans les plaines sablonneuses, sur les hauteurs.

356. AGARIC varié. *Agaricus varius*. Pers.

Agaricus parvulus, pileo campanulato, nitido, pallido, & livido vario ; lamellis variegatis, ascendensibus ; stipite tenui, rufescenti, subtenaci. Pers. Synopl. pag. 414.

Agaricus (varius), stipitatus, pileo conico, obtuso, colore vario, cinereo, griseo sive nigro ; lamellis trifidis, stipite filiformi. Bolt. Fung. pag. 66. tab. 66.

Il se distingue par la grandeur & les couleurs extrêmement variées de son chapeau, pâle, luisant, livide ou cendré, gris foncé ou noir, campaniforme, large de trois lignes, soutenu par un pédicule filiforme, long de deux pouces & plus, épais d'une ligne, rouffesâtre, légèrement tenace ; les lames triennes, ascendantes & panachées. Il croît sur les gazons, parmi les saules.

357. AGARIC humide. *Agaricus udus*. Pers.

Agaricus gregarius, terrestris, pileo subbrevis, ruguloso, primò subochraceo, exspollescenti ; lamellis ex albido-subpurpureiscentibus, demùm nigris ; stipite longissimo, basi villosa. Pers. Synopl. pag. 414.

Il est d'une consistance aqueuse. Son pédicule est long de quatre ou six pouces, velu à sa base, soutenant un chapeau court, ridé, large à peine de six lignes, obtus, d'abord d'un jaune d'ocre, puis pâle ; les lames légèrement ventrues, d'abord d'un blanc teint de pourpre, puis noires. Il croît en groupes sur les gazons, aux lieux humides, dans les forêts.

358. AGARIC chancelant. *Agaricus titubans*. Bull.

Agaricus nitidus, fragilis, pileo campanulato, friato, viscido, pallidescens ; disco flavo ; lamellis distinctis, incarnatis ; stipite lutescente, nudo, basi piloso. Bull. Herb. tab. 425. fig. 1. — Perfoon, Synopl. pag. 415. — Sowerb. Fung. tab. 128.

Cet agaric est luisant, très-fragile ; son pédicule nu, jaunâtre, filiforme, grêle, cylindrique, velu à sa base, long de quatre à cinq pouces ; il soutient un chapeau en cloche, puis plane, sinué à ses bords, point charnu, n'ayant qu'une pellicule

cule jaune, facile à enlever, blanchâtre à ses bords, marqué de stries noirâtres; les lames rouffes, inégales, un peu incarnates, point adhérentes au pédicule. Il croît sur la terre, dans les bois, parmi les feuilles mortes, & ne dure que trois ou quatre jours.

359. AGARIC cilié. *Agaricus ciliaris*. Bolt.

Agaricus (*magnus*), *stipitatus*, *pileo conico*, *primū testā pulverē niveo*, *postea glutinoso*, *marginē ciliato*; *lamellis crispis*, *nigris*; *stipite bulboso* (*corrinato*). Bolt. Fung. pag. 53. tab. 53. — Pers. Synopf. pag. 416.

Son pédicule est assez ferme, plein à sa base, puis fistuleux, souvent couvert d'une poussière grise, bulbeux à sa partie inférieure; le chapeau grand, conique, couvert d'abord d'une poussière très-blanche, puis d'un pailler clair, puis glutineux; ses bords noirâtres, déchirés, plus longs que les lames, & formant des cils noirs; les lames presque lancéolées, noires, trifides. Il croît dans les prés & sur les fumiers, en Angleterre.

360. AGARIC éteignoir. *Agaricus extinctorius*. Pers.

Agaricus pileo campaniformi, *albido*, *lucido*; *lamellis niveis* (*fuscescentibus*); *stipite subbulboso*, *subulato*, *nudo*. Bolt. Fung. pag. 24. tab. 24. *An Linnaei?* — Pers. Synopf. pag. 417.

Son pédicule, muni de petites racines brunes, s'élève à la hauteur de cinq pouces, sur un demi-pouce d'épaisseur; il est nu, un peu bulbeux, cylindrique, subulé à son sommet; son chapeau en cloche, blanchâtre, déchiré à ses bords. Les lames, d'abord d'un blanc de neige, deviennent brunes, & se réduisent en eau de même couleur. Il croît tantôt solitaire, tantôt par groupes, dans les terrains sablonneux.

5. VII. PRATELLA. Pers. *Points de coiffe*; *pédicule central nu ou muni d'un anneau*; *chapeau charnu ou membraneux*, *persistant*; *lames qui noircissent dans leur vieillissement*, *sans se fonder en eau*.

361. AGARIC comestible. *Agaricus edulis*. Bull.

Agaricus gregaris, *magnus*, *pileo candido*, *levi*, *aut obsolete squamoso*; *lamellis rubris*; *stipite longo*, *bulboso*; *annulo manifesto*. Bull. Herb. tab. 514. — Pers. Synopf. pag. 418.

Agaricus arvensis. Schreff. Fung. tab. 310. 511.

6. *Agaricus* (*campbellii*), *pileo carnosio*, *planiusculo*, *rufo*, *squamoso*; *lamellis rubescens-fuscis*; *stipite brevi*, *annulo incompleto*. Pers. l. c. — Schreff. Fung. tab. 53. — Linn. Spec. Plant. pag. 1641. — Bull. Herb. tab. 154.

7. *Agaricus* (*vaporarius*), *major*, *pileo convexo*, *pileo-squamoso*, *rufescenti-umbrino*; *lamellis fuscis*; *stipite tuberoso*, *squamuloso*. Pers. l. c. (*Voy. AMANITE*, n°. 51.)

Ce champignon, dont il existe quelques variétés, est le moins funeste de tous, le plus facile à reconnoître, d'un goût agréable, mais non le plus délicat. On le cultive sur couches; il se rencontre dans les jardins, les bois & les prés; il est couvert de moucheures jaunes dans la variété 6. Son pédicule est plus court; son collet incomplet. Le pédicule est tubéreux dans la variété 7, écailléux; le chapeau d'un jaune-terne; les lames brunes.

362. AGARIC hérissé. *Agaricus echinatus*. Roth.

Agaricus pileo convexo, *squamoso*, *echinato*, *fuliginoso*, *marginē membrā lacerā cinis*; *lamellis minutis*; *stipite recto*, *squamoso*, *purpureo*. Roth, Catal. 2. tab. 9. fig. 1. — Gunn. Flor. norweg. 2. pag. 125. tab. 7. fig. 6.

Son pédicule est droit, long d'un pouce & demi ou deux pouces, de couleur purpurine, noirâtre à sa base, couvert d'écaillés d'un brun-bité, soutenant un chapeau à peine charnu, convexe, bifurqué, hérissé d'écaillés redressées, environné à ses bords d'une membrane déchiquetée. Les lames sont nombreuses, d'un rouge-vif, élargies à leur base, adhérentes au pédicule. Il croît dans les terres chaudes.

363. AGARIC azuré. *Agaricus cyaneus*. Bull.

Agaricus pileo glutinoso, *aruginoso*, *exsiccatione flavescens*; *lamellis planis*, *adnatis*, *purpurascens*, *fusco-variegatis*; *stipite squamoso*, *annulo fugaci*. Bull. Herb. tab. 170. & tab. 530. fig. 1.

Agaricus aruginosus. Pers. Synopf. pag. 419.

Agaricus beryllus. Batfch. Fung. fig. 213.

Agaricus polius. Bolt. Fung. tab. 50.

Cette belle espèce s'élève à la hauteur d'environ deux pouces & demi, sur un pédicule plein, cylindrique, bleuâtre, un peu écailléux en dessous du collier, soutenant un chapeau d'abord globuleux, puis convexe, azuré, puis jaunissant par degrés, lisse & un peu glutineux à sa surface, large de deux pouces, les lames inégales, d'un jaune-roux, peu adhérentes au pédicule, recouvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane qui se détruit, laisse sur le pédicule la trace d'un collier peu prononcé, & quelquefois aussi de s débris sur les bords du chapeau. Il croît solitaire, en automne, dans les forêts, sur les troncs d'arbres.

364. AGARIC à graines noires. *Agaricus melanospermus*. Bull.

Agaricus pileo carneo, convexo, flavescens; lamellis rotundatis, subanatis, primò flavescens, demùm nigris; stipite albedo, annulato, deorsum incrassato. Bull. Herb. tab. 540. — Perf. Synopf. pag. 420.

Son chapeau, d'abord hémisphérique, devient plane, large de deux pouces, lisse, glabre, un peu charnu, blanc sur ses bords, jaune à son centre, soutenu par un pédicule plein, cylindrique, charnu, blanchâtre, bulbeux à sa base, long d'environ quatre pouces, garni d'un collier. Les lames sont decurrentes sur le pédicule, inégales, jaunâtres, puis noires, recouvrent, dans leur jeunesse, par la membrane qui forme le collier. Il croit en France.

365. *AGARIC précoce. Agaricus praeco.* Perf.

Agaricus subgregarius, pileo carneo, hemisphaerico, alutaceo-lutescente, primò albedo; lamellis planis, tenuibus, aquosè fuscis; stipite solido, subnatis; annulo fugaci. Perf. Comment. pag. 89, & Synopf. pag. 420.

Agaricus candicans. Schœff. Fung. tab. 217.

Son pédicule est ferme, plein, garni d'un anneau fugace, soutenant un chapeau un peu visqueux, presque luisant, d'abord blanchâtre, puis d'un jaune-clair, charnu, hémisphérique; ses lames planes, minces, d'un vert d'olive, un peu nébuleuses. Il croit par groupes, dans l'été, après les pluies, sur le bord des chemins, parmi les gazons.

366. *AGARIC couleur d'ocre. Agaricus silaceus.* Perf.

Agaricus subgregarius, terrestris, pileo carneo-viscoso, aurantio-rufo (aut boreali); lamellis confertis, subviridescente-cinereis; stipite bulboso, cortinnato. Perf. Synopf. pag. 421.

Son pédicule est jaunâtre, bulbeux, couvert d'une membrane fibreuse, soutenant un chapeau visqueux, charnu, d'abord convexe, puis plane, presque large de trois pouces, de couleur orangée-foncée ou d'ocre; les lames nombreuses, verdâtres, un peu cendrées. Il croit en automne, sur la terre.

367. *AGARIC amer. Agaricus amarus.* Bull.

Agaricus espiptofus, magnus, pileo carneo, subviscoso, lateritio; margine flavescens; lamellis distinctis, subnebulosis, viridescente-cinereis; stipite longo, subsolido; annulo fugaci, nigrescente. Bull. Herb. tab. 50 & tab. 562.

Agaricus lateritius. Schœff. Fung. tab. 49. fig. 4. s. — Perf. Synopf. pag. 421.

Agaricus auratus. Orl. Flor. dan. tab. 810. (Voyez AMANITE, n° 18.)

368. *AGARIC poudreux. Agaricus pulverulentus.* Bull.

Agaricus espiptofus, ochraceus, pileo in medio protuberante; lamina adnatis, primò acute obtusis, membranà albâ, ad marginem pilei lacerâ, persistente. Bull. Herb. tab. 178.

Agaricus fascicularis. Perf. Synopf. pag. 421, & Comment. pag. 19. — Bolron. Fung. tab. 19. — Batfch. Elem. Fung. tab. 7. fig. 29.

1. *Agaricus (pratensis), solitarius, parvus, pileo carneo-membranaceo, ochraceo; lamellis distinctis, planis, viridescente-cinereis; stipite longo, tenuissimo.* Perf. l. c. pag. 422.

2. *Agaricus (marginatus), gregarius, pileo campanulato, subferrugineo; margine tomentofo-albicante; lamellis ex viridescente-nebulosis; stipite nudo, fibrilloso, argenteo-nitido.* Perf. l. c., & Observ. Mycol. t. pag. 11.

Cet agaric est, ainsi que le précédent, d'une saveur amère, d'un jaune-fauve plus ou moins foncé. Son pédicule est glabre, fistuleux, cylindrique, long d'environ quatre pouces, soutenant un chapeau d'abord conique, puis évasé, protubérant à son centre, large de trois pouces, sec à sa surface, peu charnu. Ses lames sont inégales, nombreuses, adhérentes au pédicule, enveloppées, dans leur jeunesse, d'une membrane blanchâtre, qui, en se déchirant, reste souvent adhérente par lambeaux, tant aux bords du chapeau qu'au pédicule; couvertes d'une poussière rouille, abondante, fugace. Il croit par touffes, sur les souches pourries, en automne &c. en été.

La variété 2 croît solitaire dans les prés, sur les gazons. Son pédicule est long, très-grêle; son chapeau large d'un demi-pouce, ochracé; ses lames planes, distinctes, d'un vert-cendré. Dans la variété 1, le pédicule est long d'environ deux pouces, velu à sa base, d'un blanc-argenté; le chapeau campanulé, presque ferrugineux, blanchâtre, tomenteux à sa base; ses lames adhérentes, d'un vert-nébuleux. Il croît en groupes, sur le tronc des sapins. Ces deux variétés sont peut-être des espèces distinctes; elles sont amères.

369. *AGARIC à appendices. Agaricus appendiculatus.* Bull.

Agaricus espiptofus, congestus, fragilis, pileo subaquofo, glabro, fuscescente-irido, ex siccatione ruguloso, pallidescens; lamellis confertis, incarnato-fuscis, obtusis membranâ æquâ lacerâ, ad marginem pilei persistente. Bull. Herb. tab. 392.

1. *Agaricus stipitatus.* Perf. Synopf. pag. 423.

Agaricus spadiceus. Schœff. Fung. tab. 217.

Il est d'une consistance molle & aqueuse. Son pédicule

pédicule est nu, blanc, fistuleux, cylindrique, glabre, long de quatre poices, soutenant un chapeau d'abord ovoidé, puis campaniforme, puis convexe, de couleur fauve, rouffêtrée ou d'un blanc-fauve, marqué de stries divergentes, souvent fendu & rebrouillé à ses bords. Les lames sont inégales, nombreuses, d'un rouge plus ou moins vif, couvertes, dans leur jeunesse, d'une membrane qui, en se déchirant, reste par lambeaux, adhérente aux bords du chapeau. Il croît en automne & en été, par groupes, dans les jardins & les bois.

370. AGARIC incliné. *Agaricus cernuus*. Vahl.

Agaricus pileo hemispharico, alido; lamellis cinereo-nigricantibus; stipitibus subsolitariis, fistulosis, nudis, curvatis. Vahl, in Flor. dan. tab. 1005. — Pers. Synops. pag. 423.

Son pédicule est nu, fistuleux, recourbé; il soutient un chapeau hémisphérique, blanchâtre, garni de lames d'abord de couleur cendrée, puis noirâtres. Il croît presque solitaire, dans le Danemark.

371. AGARIC denticulé. *Agaricus denticulatus*. Bolt.

Agaricus (subaquosus, tenuis), pileo hemispharico, purpureo-livido; lamellis margine denticatis; stipite fistuloso, fulvescente. Bolt. Fung. tab. 4. — Pers. Synops. pag. 424.

Son pédicule est brun, fistuleux; son chapeau très-mou, hémisphérique, point charnu, légèrement strié, d'un pourpre-livide, large de deux ou trois poices; les lames de même consistance & de même couleur que le chapeau, munies à leurs bords de dents ou d'appendices noirâtres. Il croît en Angleterre, dans les forêts.

372. AGARIC à fibres noires. *Agaricus fibrillosus*. Pers.

Agaricus pileo submembranaceo, hemispharico, albicante; lamellis latissimis, purpureo-fuscis, margine nigris; stipite longo, alido, fibrillis nigrescentibus confuso. Pers. Synops. pag. 424.

Son chapeau est hémisphérique, presque membraneux, blanchâtre, large d'un pouce & demi, soutenu par un pédicule blanchâtre, alongé, muni de fibres noirâtres. Les lames sont planes, entièrement adhérentes au pédicule, élargies, purpurines, ponctuées de noir, noirâtres à leurs bords. Il croît sur la terre, parmi les feuilles tombées.

373. AGARIC à graines brunes. *Agaricus peltospermus*. Bull.

Agaricus pileo flavo-pallidescens, aliquando margine striato; laminis pediculo adnatis, ex violaceo-Botanique. Supplément. Tome I.

nigrescentibus; stipite nudo, alido, nunc glabro, nunc breviter hispido. Bull. Herb. tab. 561. fig. 1.

Agaricus (corrugis), pileo submembranaceo, campanulato, subrugoso, roseo; lamellis subviolaceo-nebulosis; stipite elongato, albo. Pers. Disp. Meth. Fung. pag. 24, & Synops. pag. 424.

Son chapeau est d'un jaune-pâle ou brun, quelquefois strié à ses bords, d'abord ovale, puis conique, puis plane, four nu par un pédicule nu, grêle, fistuleux, blanchâtre, long de quatre à cinq poices, tantôt velu à la base, tantôt glabre; les lames inégales, adhérentes au pédicule, d'un brun-violet, puis noires. Il croît par touffes à pieds distincts, dans les forêts, sur les feuilles mortes.

374. AGARIC grêle. *Agaricus gracilis*. Pers.

Agaricus totus fragilis, pileo membranaceo, campanulato, acuto, mollissimo; lamellis linearibus, nigrescente-cinereis; stipite longissimo, glabro. Pers. Synops. pag. 425.

a. *Idem, pileo colore incarnato*. Pers. l. c.

β. *Idem, pileo sordide ochraceo aut subrufescente*. Pers. l. c.

γ. *Idem, pileo exalbido, dilute olivaceo*. Pers. l. c.

Agaricus diffusus. Batich. Elem. Fung. pag. 145.

δ. *Agaricus (cuspidatus), pileo conico, acuto, rubro-fusco; lamellis subsuccis, basi angustis; stipite fistuloso*. Bolt. Fung. tab. 66.

Cet agaric est une des espèces les plus tendres & les plus fragiles. Son pédicule est long de trois poices, fistuleux, velu à sa base, quelquefois entièrement glabre; son chapeau chancelant, membraneux, campanulé, aigu, large d'un pouce & plus, de même hauteur, très-variable dans ses couleurs, incarnat ou d'un jaune-foncé, ou presque tout, quelquefois blanchâtre ou d'un fauve-clair; les lames linéaires, d'un noir-clair, cendré, rétrécies à leur base. Il croît dans les forêts, parmi les feuilles tombées.

375. AGARIC papyracé. *Agaricus papyraceus*. Pers.

Agaricus stipitatus, pileo hemispharico, membranaceo, alido; lamellis crispis, remotis, pallidis; stipite alido, fistuloso. Pers. Synops. pag. 425.

Agaricus membranaceus. Bolt. Fung. tab. 11.

Son pédicule est fragile, long de trois poices, blanchâtre, fistuleux, soutenant un chapeau membraneux, hémisphérique, large d'environ deux poices, sec & d'une consistance papyracée, garni de lames libres, très-tendres, distantes, trides, pales, puis brunes, puis noires. Il croît sur le tronc des chênes.

376. AGARIC ramassé. *Agaricus confertus*. Bolt.

Agaricus cespitosus, pileo conico, alido, acuminato; lamellis fusco-pallidis; stipitibus numerosis, albidis. Bolt. Fung. pag. 18. tab. 18. — Persoon, Synops. pag. 436.

Il est d'une consistance molle. Son pédicule est filiforme, long d'un pouce & demi, blanchâtre. Son chapeau est sec, papyracé, blanc, conique, acuminé, large à peine de neuf lignes; les lames d'un brun-pâle. Il croît par groupes, sur les écorces, dans les forêts chaudes.

377. AGARIC en cloche. *Agaricus campanulatus*. Bull.

Agaricus gregarius, brunneus, pileo campanulato, obtuso, levi; lamellis confertis, latissimis, liberis; stipite longo, juniorum subannulato. Bull. Herb. tab. 552. fig. 1. — Pers. Synops. pag. 426.

Son pédicule est cylindrique, glabre, fistuleux, long de quatre pouces & plus, épais de deux lignes, d'un roux-cendré, muni, dans sa jeunesse, d'un anneau peu apparent; le chapeau campanulé, lisse, obtus, large d'un à deux pouces, d'un roux plus ou moins foncé, un peu jaunâtre, sinué à ses bords; les lames larges, point adhérentes, inégales, arquées, de couleur canelle, large de quatre lignes. Il croît par groupes sur la terre.

378. AGARIC semi-orbiculaire. *Agaricus semi-orbicularis*. Bull.

Agaricus pileo concolore, levi, nitido, hemisphaerico; laminis liberis, nunquam maculosis; stipite firmo, raso, nudo. Bull. Herb. tab. 421. fig. 1.

Son pédicule est ferme, nu, cylindrique, de couleur jaunâtre, reconvert d'une écorce que l'on peut détacher entièrement du canal fistulaire interne. Son chapeau est constamment hémisphérique, large d'un pouce; quelquefois il devient concave ou bosselé, glabre, luisant, jaunâtre à sa surface, garni de lames libres, inégales, nombreuses, élargies, d'abord d'un blanc-grisâtre, puis jaunâtres, puis bistres, mais jamais mouchetées. Il croît sur le bord des chemins & des pelouses, pendant presque toute l'année.

379. AGARIC à tête conique. *Agaricus conocephalus*. Bull.

Agaricus subfoliarius, pileo campanulato-conico, cinereo-livido, striato; lamellis liberis, obscurè rufis; stipite nudo, longo, albidio. Bull. Herb. tab. 563. fig. 1. — Pers. Synops. pag. 427.

Il est d'une consistance molle. Son pédicule est nu, blanchâtre, long de quatre à cinq pouces, épais de deux lignes, cylindrique, fistuleux, soutenant un chapeau d'abord conique, puis convexe, puis plane, de couleur rouille, jaune ou

blanchâtre, marqué de plis ou de stries profondes, divergentes; les lames libres, inégales, d'abord d'un jaune-pâle, puis d'un brun rouillé. Il croît solitaire dans les prés, les jardins, les bois, sur la terre.

380. AGARIC des pâturages. *Agaricus fuscus*. Pers.

Agaricus subfoliarius, pileo submembranaceo, nitido, ab initio conico, dein dilatato, subflexuoso, umbrino, subaprefcato; lamellis latissimis, incarnato-rufis. Pers. Comment. pag. 94, & Synops. pag. 427.

Son pédicule est long de deux pouces; son chapeau charnu, presque membraneux, luisant, mince, fragile, d'abord conique, puis plane, un peu flexueux, d'un brun-terreux, puis noirâtre; les lames élargies, un peu échancrées, d'un roux clair. Il croît à 11, presque solitaire, dans les pâturages des montagnes.

381. AGARIC bistre. *Agaricus fuliginosus*. Pers.

Agaricus gregarius, fragilis, pileo campanulato, obtuso, fuligineo-livido; papilla obsoleta; lamellis tenuibus, e cinereo-albido-incarnatis; stipite mediocri, deorsum incrassato. Pers. Synops. pag. 427.

Il a beaucoup de rapport avec le précédent. Son pédicule est grêle, épaissi, d'une longueur médiocre, soutenant un chapeau campanulé, obtus, bistre, un peu cendré, à peine proéminent, large d'un demi-pouce, un peu ridé; les lames molles, nombreuses, à peine adhérentes au pédicule, blanchâtres, cendrées ou de couleur incarnate. Il croît sur la terre.

382. AGARIC blanchâtre. *Agaricus caesus*. Vahl.

Agaricus pileo plantiscula, fusco; lamellis griseo-fusis; stipite subfoliario, inani, nudo, basi albidio. Vahl, in Flor. dan. tab. 1010. — Persoon, Synops. pag. 428.

Son pédicule est nu, fistuleux, long d'un pouce & demi, épais de deux ou trois lignes, velu, cylindrique, blanchâtre; son chapeau fragile, d'abord convexe, puis plane, quelquefois un peu concave, de couleur brune; les lames nombreuses, grises ou brunes, nébuleuses. Il croît après la récolte des foins, dans les prés, dans la Norvège.

383. AGARIC obtus. *Agaricus obtusus*. Pers.

Agaricus pileo subcarneo, campanulato, obtuso, nitido, dilute badio; lamellis umbrinis, subnubulosis, margine albidioribus; stipite deorsum incrassato, pallidescendo-albido. Pers. Synops. pag. 428.

C'est, dit M. Persoon, une assez belle espèce, qui est rare & qui croît sur les troncs pourris. Son

pedicelle est épais, d'un blanc-fâle, plus blanc & velu à sa base; son chapeau médiocrement charnu, campanulé, obtus, luisant, d'un jaune-citron, haut de neuf lignes, ridé dans sa jeunesse; les lames pre que linéaires, entièrement adhérentes au pédicelle, couleur de terre d'ombre, nébuleuses, blanchâtres à leurs bords.

384. AGARIC des montagnes. *Agaricus montanus*. Pers.

Agaricus gregarius, parvus, pileo subcarneo, convexo, fuscescente; lamellis planis, loriculatis, umbrinis, subnubulosis, margine demum subalbicante; stipite breviusculo. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 9 & Synopf. pag. 418.

3. ? *Agaricus subhepaticus*. Batsch. Elem. Fung. fig. 111.

Son pédicelle est très-court, blanchâtre; son chapeau petit, un peu charnu, convexe, d'un brun plus ou moins foncé; les lames plan s, élargies, terreuses, enfoncées, un peu blanchâtres à leurs bords; elles noircissent dans leur jeunesse. La plante a de grands rapports avec celle-ci; mais son chapeau est en forme d'entonnoir. Cet agaric croît par groupes aux lieux montagneux, stériles.

385. AGARIC noirissant. *Agaricus nigricans*. Bull.

Agaricus majusculus, pileo depresso, olivaceo-cinereo, aemulū nigrescente, ad. flo; lamellis crassis, albidis; stipite solido, breviusculo, cinereo, nudo. Bull. Herb. tab. 112. & tab. 370. fig. 2. tab. 579 & tab. 166. — Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 50. — Lam. Illustr. tab. 882. fig. 1.

Agaricus odosus. Pers. Synopf. pag. 459.

4. *Agaricus (el-phantiuus), magnus, primo albidus, convexus*. Sowerb. Fung. tab. 36. — Bolt. Fung. tab. 28.

Cet agaric devient noir en vieillissant; il est, dans sa jeunesse, brun en dessus, ainsi que sa chair; ses feuillets & son pédicelle blancs. Ce dernier est long de deux pouces & demi, épais de huit à dix lignes, plein, nu, presque cylindrique, soutenant un chapeau d'abord convexe, déprimé à son centre, recourbé en dessous à ses bords, puis plane, un peu sinué, ferme & cassant, garni de lames inégales, peu nombreuses, épaisses, non adhérentes au pédicelle. Il croît solitaire dans les lieux arides, en automne, dans les bois de haute futaie.

386. AGARIC aqueux. *Agaricus oquosus*. Bull.

Agaricus pileo ex albo-fuscente, aquoso, molli; stipite nudo, fusco, radiculos plures emittente. Bull. Herb. tab. 12.

Agaricus melleus. Schæff. Fung. tab. 45.

Son pédicelle est sauve, nu, fistuleux, cylindrique, haut de trois à quatre pouces, muni de petites racines filiformes, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis plane, quelquefois concave ou mamelonné à son centre, ridé sur ses bords, d'un blanc mêlé de sauve, légèrement sinueux, large de deux à trois pouces; sa chair molle & aqueuse; les lames inégales, peu serrées, très-fragiles, point adhérentes au pédicelle. Il croît parmi la mousse, dans les bois ombragés, vers la fin de l'été.

387. AGARIC à feuillets violets. *Agaricus violaceo-lamelletus*. Decand.

Agaricus capitosus, pileo griseo-rufescente; disco calloso, margine subfistoso; lamellis eg. egie violaceis; stipite nudo, albidis. Decand. Synopf. Plint. v. all. pag. 31. & Flor. franç. vol. 2. pag. 153. n°. 406.

Son pédicelle est nu, fistuleux, cylindrique, blanchâtre, long de quatre pouces, épais d'une à deux lignes; son chapeau mince, presque sans chair, en cône arrondi au sommet, large de sept à huit lignes, long d'un pouce & demi, calleux à son sommet, d'un gris-roux, un peu ridé sur ses bords. Les feuillets sont d'un beau violet, inégaux, étroits, nombreux, distincts du pédicelle. Il ressemble beaucoup à l'agaric à tête conique; il vient sur la terre, par groupes.

388. AGARIC strié. *Agaricus striatus*. Bull.

Agaricus pileo conico, demum convexo, tandem plano, rufo-albescente, striis profundis aut plicis radiatis notato; stipite nudo, albo, cylindrico, tenui. Bull. Herb. tab. 552. fig. 2.

5. *Agaricus plicatus*. Schæff. Fung. tab. 31. — Bull. Herb. tab. 80.

Amanita plicata. Lam. Dict. 1. pag. 110. (*Voy. AMANITE*, n°. 39.)

6. VIII. LACTIFLUUS. Pers. Point de crosse; chapeau charnu, souvent comprimé; feuillets inégaux; suc laiteux.

389. AGARIC âcre. *Agaricus acris*. Bull.

Agaricus olbus, lamineis numerosis, sapē bifurcatis, aliquandō flavis aut rubris; succo acris. Bull. Herb. tab. 558.

7. *Agaricus (piperatus), pileo infundibuliformi, margine expanso, glabro, albidis; lamellis congestis, furcatis, eand. dis. pallidescens*. Persoon, Synopf. pag. 429. — Obs. Mycol. 2. pag. 40. — Batsch. Fung. tab. 13. fig. 59. — Bolt. Fung. tab. 21. — Schæff. tab. 83.

7. *Agaricus (exsuccus), magnus, infundibuliformis, exsuccus; lamellis dispersis, pallidescens*, E c 2

subcrispis. Pers. Obs. l. c. pag. 47. — Buxb. Cent. 4. tab. 1. (Voyez AMANITE, n°. 1.)

La variété γ est une fois plus grande, sèche ; les lames pâles, distantes, un peu crépues.

390. AGARIC à bords retrouffés. *Agaricus conroversus*. Pers.

Agaricus castiposus, albus, maculis rarisque sanguineis variegatus ; pileo planiusculo, margine revoluta, tomentoso. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 39, & Synops. pag. 430.

An *agaricus piperatus* ? Linn.

Agaricus sanguinalis. ? Batfch. Elem. Fung. Contr. 2. pag. 47. tab. 36. fig. 201.

M. Persoon présume que cet agaric pourroit bien être le véritable *agaricus piperatus* de Linné ; peut être est-il encore le même que celui figuré dans Batfcher, mais vieux & desséché. Il est de couleur blanche, panaché de taches & de bandes d'un rouge de sang. Son chapeau est tomenteux ; il devient plane avec les bords retrouffés. Ses lames sont simples & incarnates. Il est très-âcre. On le rencontre par groupes dans les bois.

391. AGARIC à larmes laiteuses. *Agaricus dycomogulus*. Bull.

Agaricus toms albus, succo lacteo, infuso ; pileo raris griseis aliquando notato. Bull. Herb. tab. 584.

Il est de couleur blanche, parfaitement glabre, rempli d'un suc laiteux, insipide. Son pédicule est plein, cylindrique, long de deux pouces & plus, épais de cinq à dix lignes, soutenant un chapeau orangé ou cuivré, convexe, puis plane, comprimé à son centre, large de trois à cinq pouces, quelquefois marqué de zones grisâtres. Les lames sont inégales, légèrement décurrentes sur leur pédicule. Il croît solitaire ou par petits groupes.

392. AGARIC à zones. *Agaricus zonarius*. Bull.

Agaricus pileo umbilicato, zonato, dilute ochraceo, margine revoluta, villosa ; succo acro. Bull. Herb. tab. 104.

Agaricus flexuosus. Persoon, Synops. pag. 430. (Voyez AMANITE, n°. 6.)

393. AGARIC à lait jaune. *Agaricus theiogalus*. Bull.

Agaricus minor, pileo infundibuliformi, depresso, stipiteque rufo ; succo flavo. Bull. H. tab. 167. fig. 2. — Pers. Synops. pag. 431.

Si chair, naturellement blanche, devient jaune lorsqu'on la coupe, ainsi que le lait qui en découle. Son pédicule est d'un roux fauve, plein,

cylindrique, long de deux pouces, épais de trois lignes ; il supporte un chapeau d'abord convexe, puis plane, puis concave, large de trois pouces, glabre, d'un fauve presque distribué par zones ; les lames inégales, adhérentes & un peu decurrentes sur le pédicule, terminées en pointe. Il croît solitaire.

394. AGARIC pâle. *Agaricus pallidus*. Pers.

Agaricus castiposus, pileo umbilicato, subcrispato, subincarnato-pallido ; lamellis stipitibus elongato-dilutioribus. Pers. Synops. pag. 431.

Agaricus incarnatus. Pers. Dispos. Fung. p. 64.

Agaricus subinvolutus. ? Batfch. Fung. tab. 37. fig. 204.

Son pédicule est allongé, d'un blanc-faïe ; son chapeau ombiliqué, légèrement visqueux, d'une couleur pâle incarnate ; les lames d'une couleur plus claire, presque blanches ; il en découle un suc âcre. On le trouve dans les bois de hêtres.

395. AGARIC testacé. *Agaricus testaceus*. Pers.

Agaricus pileo planiusculo, fulvo, cinnamomeo ; lamellis patulentibus, stipite crassiusculo. Persoon, Synops. pag. 431.

Agaricus ichoratus. ? Batfch. Fung. pag. 37. tab. 13. fig. 60.

3. *Agaricus (fulvo-croceus)*, pileo subdepresso, glabro, papillato, stipiteque longo, fulvo croceo ; lamellis confertis, pallidis. Pers. l. c.

4. ? *Agaricus (aurantiacus)*, pileo subangusto, planiusculo, aurantiaco ; lamellis pallidis, subdecurrentibus ; stipite longo. Pers. l. c.

Agaricus lactifluus. Bolt. Fung. tab. 9. ?

Cet agaric présente plusieurs variétés, principalement dans sa couleur. Son pédicule est long de deux ou trois pouces, un peu épais, fauve ou d'un jaune de safran ; son chapeau convexe, puis plane, comprimé, glabre, un peu mamelonné, large de trois pouces, fauve ou d'un jaune-cannelle, quelquefois ponctué ; les lames plus pâles, nombreuses. Il croît dans les forêts ; il en découle un suc âcre.

396. AGARIC délicieux. *Agaricus deliciosus*. Linn.

Agaricus pileo umbilicato, subaurantio, exficcato, foris at pallido ; lamel. in succoque aurantio lateritius. Schæff. Fung. tab. 11. — Linn. Spec. 1641. — Pers. Synops. 431. — Sowerb. Fung. tab. 222.

Lactarius lateritius. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 64. (Voyez AMANITE, n°. 3.)

397. AGARIC sans zones. *Agaricus ozonites*. Bull.

Agaricus pileo sublobato, ex griseo-rufescente; laminiis & stipite basi fœvis. Bull. Herb. tab. 519. fig. 1, & tab. 567. fig. 3.

Son pédicule est long de deux pouces & plus, épais de quatre à cinq lignes, plein, cylindrique, blanchâtre, un peu jaune à sa base, soutenant un chapeau arrondi ou un peu lobé, sans zones concentriques, d'un gris-pâle, tirant un peu sur la couleur de café au lait, convexe, puis concave, large au plus de trois pouces, garni de lames droites, inégales, jaunâtres, peu adhérentes au pédicule. Son suc est laiteux, de couleur blanche. Il croît solitaire, sur la tûre.

398. AGARIC meurtier. *Agaricus necator.* Bull.

Agaricus pileo umbilicato, zonato, diluè ochraceo, margine revoluto, viloso; lamellis albis. Bull. Herb. tab. 529. fig. 2.

Agaricus terminus. Persoon, Synopf. 430. — Schœff. Fung. tab. 12.

3. *Agaricus (necator), pileo ex olivaceo, umbrino, margine toto-entato, involuto.* Pers. Synopf. 435. — Bull. Herb. tab. 14. (Voyez AMANITE, n^o. 4 & 5.)

399. AGARIC rouge. *Agaricus ruber.* Pers.

Agaricus gregarius, moxifculus, pileo depresso, ochraceo-rubro; lamellis fufescentibus, stipite crassifusculo, pileo concolore. Pers. Synopf. 433.

Agaricus latissimus? Schœff. Fung. tab. 5. Quoad colorem.

Son pédicule est d'un rouge-ferrugineux, blanchâtre à sa base, un peu épais, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis déprimé, à peine proéminent, roide, légèrement sillonné, d'un rouge d'ocre; les lames jaunâtres, d'une largeur médiocre; il est d'une faveur âcre & d'une odeur amère. On le trouve dans les bois de pins, dans la forêt d'Hercynie, où il croît par groupes.

400. AGARIC douceâtre. *Agaricus subdulcis.* Pers.

Agaricus pileo infundibuliformi, rufescente, aliquando zonis nigris, concentricis inscripto; lamellis pulchre-incarnatis; succo albo, subdulci. *Agaricus dulcis.* Bull. Herb. tab. 224. — Pers. Synopf. 433.

Agaricus rubescens. Schœff. Fung. tab. 73.

4. *Agaricus azonatus.* Bull. l. c. fig. A. B.

5. *Agaricus zonarius.* Bull. l. c. fig. C.

6. *Agaricus rubro-castaneus.* — *Agaricus camphoratus.* Bull. Herb. tab. 567. fig. 1.

7. *Agaricus (cimicarius), pileo opaco, subumbonato, obsolete zonato, subpallidico; lamellis luteis-*

centibus, subatidis; stipite longiusculo. Pers. Synopf. pag. 434. — Barfch. Elem. Fung. pag. 69.

1. *Agaricus (innocens), pileo subdepresso, ruguloso, obscure cinnamomeo; lamellis ferrugineis, nitidis; stipite longiusculo.* Pers. l. c.

Lactarius latissimus. Swerb. tab. 204. ?

2. *Lactarius (queretii), parvulus, pileo planiusculo, rugoso, papillato, spadicico, opaco; lamellis obscure fulvis.* Pers. l. c.

Cet agaric présente de nombreuses variétés. Sa couleur est assez généralement d'un fauve-roucâtre. Sa superficie est sèche, sa chair cassante. Il répand une odeur pénétrante, assez semblable à celle du mélilot bieu; il produit, dans sa jeunesse, une assez grande quantité d'un lait douxâtre. Son pédicule est plâtre, cylindrique, droit ou un peu courbé, plein dans sa jeunesse, irrégulièrement fistuleux dans un âge plus avancé, long de deux à trois pouces, épais d'environ cinq lignes, soutenant un chapeau d'abord convexe ou conique, puis plane ou concave, protubérant à son centre, large de quatre à cinq pouces, tantôt uni, tantôt marqué de zones noires, concentriques; garni de lames inégales, adhérentes au pédicule. Il croît en automne, dans les bois.

401. AGARIC d'Hercynie. *Agaricus hyrcinicus.*

Agaricus (umbrinus), pileo convexo, flexuoso, umbrino; lamellis pallidis; stipite brevi, cinerescens. Pers. Synopf. pag. 435.

Son pédicule est court, à peine long d'un pouce, de couleur cendrée, soutenant un chapeau épais, mou au tact, convexe, un peu flexueux, couleur de terre d'ombre, garni de lames plus pâles, décurrentes. Il croît dans la forêt d'Hercynie, parmi les pins.

402. AGARIC plombé. *Agaricus plumbeus.* Bull.

Agaricus pileo latissimo, infundibuliformi, stipiteque nigrescente-fulgineis; lamellis lutescentibus, succo acerrimo. Bull. Herb. tab. 232, & tab. 559. fig. 2. — Pers. Synopf. 435.

3. *Amanita aruginea.* Lam. Dict. 1. pag. 105.

Cet agaric a un pédicule plein dans sa jeunesse, irrégulièrement fistuleux dans un âge plus avancé, jaunâtre, épais de neuf lignes, long de deux ou trois pouces, soutenant un chapeau convexe, puis plane, déprimé à son centre, déjeté en bas à ses bords, large de huit à dix pouces, sec à sa surface, de couleur noirâtre, et fumée ou plombée, sans zones. Sa chair est blanche & cassante; les lames jaunâtres, nombreuses, inégales, décurrentes sur le pédicule, médiocrement laiteux, très-âcre. Il croît en automne, dans les bois. M. Decandolle

penne qui s'élève brève n°. si qu'une variété de celui-ci. (Voyez AM. NIK, n°. 7.)

403. AGARIC caustique. *Agaricus pyrogalus*. Bull.

Agaricus pileo planiusculo, plumbeo-livido, zonato; lamellis numerosis, rubescentibus; stipite recto, fuliginoso; fœco primâ subadâ, demum acerrimo. Bull. Herb. tab. 567. fig. 2. — Perf. Synopf. pag. 431.

La chair de cet agaric est blanche; elle jaunît lorsqu'on la coupe: il en découle un lait qui devient également jaune. Son pédicule est long de deux pouces au plus, épais de trois lignes, plein, cylindrique, d'un roux-fauve; il soutient un chapeau d'abord convexe, puis plane, puis concave, glabre, large de trois pouces, d'un fauve un peu zôné, garni de lames aigües, inégales, adhérentes & un peu décurrentes sur le pédicule. Il croît solitaire.

404. AGARIC à pied velu. *Agaricus trichopus*.

Agaricus (luridus), pileo planiusculo, margine depresso, obsolete zonato, subviscoso, ex cinereo sub-rufescente; lamellis abbreviatis, albicantibus; stipite bafi villosa. Perf. Synopf. pag. 436.

♂. ? *Agaricus fuscus*. Schœff. tab. 235.

Son pédicule est fistuleux, long de deux pouces & demi, épais d'un demi-pouce, velu à sa base; son chapeau convexe, puis un peu aplati, rabattu à ses bords, légèrement visqueux, cendré ou presque fauve, obscurément zôné, garni de lames arquées, courtes, larges d'une ligne, blanchâtres. Il produit un suc laiteux qui devient rougeâtre; il croît parmi les bruyères.

405. AGARIC brûlant. *Agaricus urens*.

Agaricus (actis), pileo æono, planiusculo, sub-obliquo, cinereo-fuligineo; lamellis primò albidis, dein alutaceis; stipite albidis, fœco ex albo-rubescens. Perf. Synopf. pag. 447. — Bolt. Fung. tab. 60. — Batfch. fig. 68. — Krapf. Schwam. tab. 4. fig. 4 & fig. 9-10. ?

♂. ? *Agaricus (livido-rubescens), rigidus, fragilis, medullifolius, lactescens, pileo obsolete sfo-maculato; stipite albescens, laminis pallidissime flaventibus*. Batfch. Elem. Coni. 2. pag. 51. fig. 102.

γ. *Agaricus (alneti), pileo cinereo-livido, obsolete zonato; lamellis pallidis lutescentibus, stipite extus intusque cinereo*. Krapf. Schwam. tab. 8. fig. 8 & 9.

Il est rempli d'un suc qui, de blanc, devient jaunâtre, & puis prend une couleur rousse dans la substance même du champignon, d'une grande causticité. Son pédicule est blanchâtre, fauve, cendré, visqueux dans les variétés; son chapeau

convexe, puis plane, un peu oblique, quelques-uns légèrement écharné, réfléchis à ses bords, n'ont une couleur grise, en unie; les lames blanches, puis d'un roux-clair. Dans la variété ♂, le chapeau est tacheté de brun. Sa substance, qui est comme tonneuse, devient purpurine, ainsi que le bord des lames lorsqu'elle est frappée par l'air, puis violette. Il croît dans les bois, parmi les gazons & les broussailles.

406. AGARIC des substances putréfiées. *Agaricus xyophilus*. Perf.

Agaricus minor, pileo plano, depresso, subviscoso, stipiteque casto-griseis; lamellis candidis. Perf. Disp. Fung. pag. 65, & Synopf. 438.

♂. *Agaricus (viscosus), pileo plano, depresso, viscoso, ruguloso, o livaco-cinereo; lamellis candidis, stipite tenui*. Perf. l. c.

Plus petit que les précédents, cet agaric est muni d'un pédicule court, cylindrique, de la même couleur que le chapeau: celui-ci devient plane, déprimé, large d'un pouce & demi, un peu visqueux, d'un bleu-cendré; les lames blanches. Dans la variété ♂, le chapeau est un peu ridé, d'un vert d'olive, un peu cendré; le pédicule grêle. Il croît sur les troncs pourris ou sur la terre, dans leur voisinage.

♂. IX. RUSSULA. Perf. Points de coiffe; chapeau charnu, ordinairement comprimé; lames égales entr'elles, & non terminées par un bourrelet annulaire; pédicule nu.

407. AGARIC blanc de neige. *Agaricus niveus*. Perf.

Agaricus minor, totus niveus, stipite breviusculo, pilei margine tuberculoso. Perf. Synopf. 438.

Cet agaric est d'une grande blancheur; il est fort petit. Son pédicule est à peine long d'un pouce, épais de cinq à six lignes; son chapeau charnu, comprimé, tuberculeux à ses bords, les lames minces, distinctes. Il croît dans les forêts. Peut-être appartient-il à une des variétés de l'espèce suivante.

408. AGARIC à dents de peigne. *Agaricus pectinatus*. Bull.

Agaricus pileo subdepresso, margine striato; stipite alio, cylindrico; lamellis adnexis. Bull. Herb. tab. 509. — Decand. Synopf. pag. 28.

α. *Agaricus albus*. Bull. l. c. fig. M. N.

Agaricus (laetens), pileo subdepresso, albo; margine levi, lamellis aquosè pallidis. Perf. Synopf. 439.

♂. *Agaricus (fulvus)*. Bull. l. c. fig. O. P.

Agarius (emeticus), *ovis*, *pileo depresso*, *marginis folcato*, *fargineo-rubro*; *lamellis canaidis*; *stipite albo*, *rubellior rario*. Pers. Synopl. 439.

γ. *Agarius ochroleucus*. Bull. l. c. fig. R. S. Q.

Agarius (ochroleucus), *pileo flavescente*, *planiusculo*; *marginis levi*, *lamellis stipiteque albis*. Pers. Synopl. pag. 443.

δ. *Agarius (rosaceus)*, *pileo convexo*, *plano*, *sublevi*, *rosco seu dilute rubro*; *lamellis stipiteque albis*. Pers. Synopl. 439.

« Il est peu de plantes, dit M. Decandolle, qui varient autant que celle-ci pour la couleur & l'apparence. La première variété est toute blanche, & devient quelquefois verdatre dans le centre du chapeau; la deuxième a le chapeau sauto, avec les feuillets blancs; la troisième a le chapeau & les feuillets d'un jaune-terreux, & le pédicule blanc; la quatrième a le chapeau rouge, avec le pédicule & les feuillets blancs. Peut-être sont-elles réellement des espèces distinctes. Elles offrent cependant des caractères communs assez tranchés. Leur pédicule est blanc, nu, cylindrique, charnu, plein, long de deux pouces, épais de cinq à six lignes. Le chapeau est d'abord convexe, ensuite plane, avec le centre déprimé, souvent concave. Ses bords sont quelquefois irrégulièrement relevés, & l'impression des feuillets y marque des stries assez sensibles. Les feuillets sont simples, presque droits, adhérens au pédicule, & tous d'égale longueur. Elle croît solitaire, dans les bois, en été & en automne. » (Decand.)

• 409. AGARIC pâissant. *Agarius depallens*. Pers.

Agarius gregarius, *magnus*, *pileo opaco*, *fuscescentibus*; *disco depallente*; *lamellis crassiusculis*, *distinctis*, *albidis*. Pers. Synopl. pag. 440. — Schæff. Fung. tab. 112.

Son pédicule est blanc, légèrement teint de rouge. Son chapeau est ferme, épais, brun-rougeâtre, plus pâle à son centre, large d'environ trois pouces; ses lames blanches, distinctes, un peu épaisses; son odeur douceâtre. Il croît dans les forêts, sur les montagnes.

410. AGARIC à chapeau flexueux. *Agarius flexuosus*.

Agarius (fragilis), *pileo depresso*, *flexuoso*, *dilute purpurascens* - *rubello*; *lamellis latisculis*, *stipiteque canaidis*. Pers. Synopl. 440.

Sa saveur est très-acre; son pédicule long d'un pouce & plus, épais de quatre lignes, blanchâtre; son chapeau fragile, comprimé, flexueux, d'un pourpre-clair, un peu rougeâtre, large de deux pouces, un peu tuberculeux à ses bords, difforme, quelquefois ondulé; les lames blanches, élargies. Il croît dans les bois de hêtres.

411. AGARIC en cloche. *Agarius campanulatus*. Pers.

Agarius pileo campanulato, *rosco*; *lamellis flavescens*, *stipite albo*. Pers. Synopl. 440.

Son pédicule est blanc; son chapeau convexe, campanulé, de couleur rose, un peu lisse à sa superficie; les lames jaunâtres. Il croît dans les forêts, parmi les gazons.

412. AGARIC fauve d'alouette. *Agarius alutaceus*. Pers.

Agarius magnus, *pileo planiusculo*, *subtuberulosus*, *rubro*; *lamellis alutaceo-pallidis*, *stipite albo*. Pers. Synopl. 441.

β. *Russula (sublyptica)*, *pileo depresso*, *dilute rufescente-rubro*, *marginis fuscato*; *lamellis aurum obscurè ochraceis*, *nidis*; *stipite brevi*, *albo*. Pers. l. c.

Cet agaric est grand; son pédicule blanc. Son chapeau devient plane, rouge, un peu tuberculeux, large de sept pouces; les lames d'un fauve-clair. Dans la variété β, qui est peut-être une espèce distincte, le chapeau est d'une couleur plus claire, sillonné à ses bords. Les lames sont luisantes, d'un jaune d'ocre obscur; le pédicule plus court. Il croît dans les forêts.

413. AGARIC sec. *Agarius xerampelinus*.

Agarius (esculentus), *pileo rubro*; *lamellis obscurè flavis*, *nidis*; *stipite flavescens*. Persoon, Synopl. pag. 441, & Oberv. Mycol. 1. pag. 101. — Schæff. Fung. tab. 15, fig. 1 & 3. — Krapf. tab. 5.

β. *Agarius xerampelinus*. Schæff. tab. 214 & 215.

Il appartient aux grandes espèces, qui ont le plus d'éclat; il est d'une consistance sèche, fragile. Sa saveur n'a rien de rebutant. Son pédicule est jaunâtre; son chapeau rouge; ses lames luisantes, d'un jaune-foncé. Il croît dans les forêts, où il est rare.

414. AGARIC roide. *Agarius rigidus*.

Agarius (aureus), *nidius*, *pileo plano*, *depresso*, *fulvo*; *lamellis crassiusculis*, *alutaceis*; *stipite flavido*. Pers. Obv. Mycol. t. pag. 101, & Synopl. 442. — Krapf. tab. 5, fig. 6 & 8.

C'est une très-belle espèce, très-ferme, fragile, d'une grandeur médiocre, d'une saveur point rebutante. Son pédicule est jaunâtre; son chapeau luisant, plane, déprimé, d'un jaune-faune clair, plus jaune intérieurement; les lames un peu épaisses, de couleur fauve. Il croît dans les forêts, au commencement de l'automne.

415. AGARIC veau fauve. *Agaricus vitellinus*. Pers.

Agaricus minor, pileo planiusculo, dilute vitellino; lamellis nitidis, ex incarnato dilute croceis; stipite tenui, albo. Pers. Synopf. 442.

Agaricus rufigallinus. Barfch. Elem. Fung. 1. pag. 67. tab. 15. fig. 72. A. B. C.

Son pédicule est blanc, grêle, long d'un pouce; sa substance fragile, son odeur désagréable. Son chapeau, d'une forme convexe, devient ensuite aplati, difforme, large d'un pouce & plus, tantôt lisse, tantôt un peu tuberculeux, d'un fauve clair; les lames luisantes, un peu incarnates ou d'un jaune de safran clair. Il croît dans les forêts.

416. AGARIC rufule. *Agaricus rufula*.

Agaricus (luteus), pileo subviscoso, umbilicato, pallidcente; lamellis distinctis; stipite longiusculo, albo. Pers. Synopf. 442.

Agaricus (luteus), stipite, pileo convexiusculo, viscido; lamellis omnibus aquilidis, flavis. Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 611.

Son pédicule est blanc, légèrement fistuleux, long d'un pouce & demi, soutenant un chapeau presque visqueux, pâle, ombiliqué, large d'un pouce, garni de lames distinctes, d'un fauve clair, un peu épaisses. Il croît dans les forêts.

417. AGARIC à chapeau oblique. *Agaricus subobliquus*.

Agaricus (ochraceus), pileo convexo, vitellino; lamellis confertis, tenuibus, ochraceis; stipite albo. Pers. Synopf. 443.

Son pédicule est long d'un pouce & demi, blanchâtre, épais d'une demi-ligne, soutenant un chapeau presque oblique, large de deux ou trois pouces, convexe, d'un jaune-clair, sillonné à ses bords; les lames minces, nombreuses, un peu plissées à leurs bords, larges de deux ou trois pouces.

418. AGARIC puant. *Agaricus satens*. Pers.

Agaricus magnus, fætidus, sordidè pallidus, pileo depresso, margine fornicato, tuberculato, fæteo; lamellis nonnullis dimidiatis. Pers. Synopf. 443; & Obs. Mycol. 1. pag. 102. — Annal. bot. Falc. 9. pag. 9.

Agaricus piperatus. Bull. Herb. tab. 292.

Son odeur est infecte. Sa chair a une saveur très-piquante. Sa couleur est d'un jaune-terreux sale, tirant sur le jaune. Son pédicule s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces; il est épais d'environ un pouce; il supporte un chapeau peu charnu, d'abord convexe, puis plane, puis un

peu concave, irrégulièrement sinué sur ses bords, marqué de cannelures articulées à son contour, large de huit à dix pouces, chargé d'une matière gluante; les feuillets libres, peu nombreux, épais, souvent bifurqués sur le bord du chapeau. Il croît en automne, dans les bois. Les limaçons en font si friands, qu'ils dévorent l'intérieur du pédicule, tellement qu'on a peine à en trouver d'entiers.

419. AGARIC en touffes. *Agaricus gregarius*.

Agaricus (nitidus), gregorius, fragilis, subparvus, pileo planiusculo, dilute purpurascence; lamellis late flavis, dentato-convexis; stipite breviusculo, albo. Pers. Synopf. 444.

R. Ruffula (purpureo-fulginea), subparvus, pileo fuliginoso dilute purpurascence; disco obscuriore; lamellis vitellinis, crassiusculis; stipite albo. Pers. 1. c.

Son pédicule est droit, court, long d'environ un pouce, épais de trois lignes, quelquefois élastique, de couleur blanche, soutenant un chapeau convexe, puis plane, luisant, d'une consistance fragile, petit, d'un pourpre-clair ou enfumé; les lames d'un jaune-gai, fauves dans la variété s. Il croît dans les bois de pins. Sa saveur est douce, plus forte dans la variété.

420. AGARIC savoureux. *Agaricus sapidus*.

Agaricus (griseus), magnus, pileo subdepresso; & griseo dilute purpurascence; margine levii; lamellis latis, crassis, flavescens; stipite longo, albo. Pers. Synopf. 445.

Il est doué d'une saveur assez agréable. Son pédicule est de couleur blanchâtre, long de quatre à cinq pouces, épais de neuf lignes, soutenant un chapeau large de trois à quatre pouces, convexe, puis un peu déprimé, rougeâtre à son disque, d'un vert-olivâtre, un peu cendré à ses bords, lisse, muni de lames épaisses, jaunâtres, un peu tordues. Il croît dans les bois de hêtres.

421. AGARIC bleu-céleste. *Agaricus caeruleus*. Pers.

Agaricus pileo carneo, depresso, caeruleo; lamellis alutaceis; stipite subbrevis, candido. Pers. Synopf. 445.

Son pédicule est court, blanchâtre; son chapeau un peu rouffâtre dans son centre, lisse, bleuâtre à son contour, charnu, garni de lames nombreuses, large de trois à quatre lignes, d'un jaune d'ocre clair. Il croît dans les forêts.

422. AGARIC rongé. *Agaricus erosus*.

Agaricus (cynoxanthus), pileo depresso, casto; disco expallido, subpurpurascence; lamellis candidis. Pers.

Perf. Synopf. 445, & Comm. pag. 37. — Schœff. Fung. tab. 93. — Bolton. Fung. tab. 1. Fig. *superf.*

Cet agaric paroît après les pluies dans les mois de juillet & d'août, dans les forêts de chênes & de hêtres; il dure peu, étant rongé par les insectes, surtout par les scarabées des bois. Son pédoncule soutient un chapeau d'abord convexe, puis plane, déprimé, bleuâtre, tendant vers la couleur rouge, plus pâle à son centre, garni de lames blanchâtres.

413. AGARIC *suspectus*. *Agaricus suspectus*.

Agaricus (lividus), *magnus*, *pileo subdepresso*, *purpureo-livido*, *subviscoso*; *lamellis nonnullis furcatis*, *candidis*. Perf. Synopf. 446.

β. *Russula* (angustata), *minor*, *pileo purpurascens-livido*, *subviscoso*, *marginibus levibus*; *lamellis confertis*, *angustis*, *albids*.

Il a une faveur presque farineuse. Son pédoncule est long de trois pouces, épais de quatre à six lignes; son chapeau grand, un peu déprimé, légèrement visqueux, d'un pourpre-livide; les lames blanchâtres, quelques-unes bifurquées. Dans la variété β, qui pourroit bien former une espèce, le pédoncule est plus court, son chapeau légèrement ridé à son disque; les lames larges à peine d'une ligne. Son faveur est âcre. Il croît dans les bois de hêtres.

414. AGARIC nauséux. *Agaricus nauseosus*. Perf.

Agaricus pileo umbilicato, *subrufescente*; *disca purpureo-livido*, *oleaceo*, *lamellis ochraceis*; *stipite albo*, *solido*. Perf. Synopf. 446.

Son pédoncule est plein, blanchâtre, long d'un pouce; il soutient un chapeau convexe, puis plane, ombiliqué à son sommet, un peu rougeâtre, large d'un pouce & demi, d'un vert-olivâtre, un peu pourpré à son disque; les lames d'un jaune d'ocre, larges de trois lignes. Sa faveur donne des nausées.

415. AGARIC à lames fourchues. *Agaricus furcatus*.

Agaricus pileo subinfundibuliformi, *ex pallidoviridi*; *lamellis albidis*, *seris omnibus furcatis*. Dc. Synopf. pag. 18. — Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 102, & Synopf. 446.

Agaricus bifidus. Bull. Herb. tab. 2. (Voyez AMANITE, n°. 15.)

416. AGARIC rouge. *Agaricus ruber*.

Agaricus pileo sanguineo, *lamellis albis*, *in pediculis subdecurrentibus*, *bi- an trifurcatis*; *stipite primo Botanique, Supplément, Tome 1.*

pleno, *dein frongioso*. Decand. Synopf. pag. 18. — Bull. Herb. tab. 42.

Agaricus silvaticus. Lam. Flor. franç. 1. pag. 106.

Agaricus integer. Linn. Spec. 1640. ? (Voyez AMANITE, n°. 8.)

417. AGARIC verdissant. *Agaricus virescens*. Perf.

Agaricus majusculus, *pileo carnoso*, *convexo*, *reflexato*, *rufescente*, *aruginoso*; *lamellis nonnullis dimidiatis*, *candidis*. Perf. Synopf. 447.

Russula aruginosa. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 103.

Il est d'une médiocre grandeur. Son chapeau est charnu, convexe, fendillé & ridé à sa surface, de couleur de rouille, un peu verdissant, blanchâtre à ses bords; les lames blanchâtres, un peu épaisses, les unes bifurquées, les autres plus courtes. Il croît dans les forêts.

418. AGARIC vert d'olive. *Agaricus olivaceus*. Perf.

Agaricus pileo olivaceo, *livido*, *subumbilicato*, *friato*; *lamellis dilutis croceis*. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 103. — Synopf. 447.

Son pédoncule est blanc, long de deux pouces; son chapeau d'un vert d'olive pâle, convexe, strié, puis plane, un peu ombiliqué à son sommet; les lames distantes, d'un jaune-clair de safran. Il croît parmi les bois de pins.

5. X. OMPHALIA. Perf. Point de coiffe; pédoncule nu, plein ou fistuleux; chapeau très-souvent ombiliqué; lames qui ne noircissent pas, presque toujours alternantes.

419. AGARIC contigu. *Agaricus contiguus*. Bull.

Agaricus magnus, *pileo carnoso*, *depresso*, *hepaticis*, *marginibus revolutis*, *tomentosis*; *lamellis dichotomis*, *basis subporiformibus*; *stipite tereti*, *pleno*. Bull. Herb. tab. 140, & tab. 576. fig. 2.

Agaricus involutus. Batfch. Elem. 1. pag. 39. tab. 13. fig. 61. — Perf. Synopf. 448.

β. *Agaricus* (trunciginus), *minor*, *pileo subexplicato*, *mollis*. Perf. 1. c.

Agaricus cyathiformis. Schœff. Fung. tab. 151.

D'après Bulliard, ce champignon est d'un jaune-terreux plus ou moins foncé. Son pédoncule est nu, glabre, cylindrique, long à peine de trois pouces, épais d'environ un pouce & demi, plein, charnu, contigu avec le chapeau: celui-ci est convexe dans sa jeunesse, roulé en dedans à ses bords, qui sont cotonneux & cannelés. Ce chapeau s'aplatit; mais les bords ne se déroulent que lorsque la plante a

f f

pris tout son accroissement : ce chapeau atteint six à sept pouces de diamètre. Les lames sont nombreuses, d'écailles sur le pédicule, de manière que l'on croit voir les tubes d'un bolet. Dans un âge avancé, elles forment des rayons droits, entremêlés de demi-feuilles. Tous les feuillets sont formés d'une membrane plissée avec une délicatesse extrême. Cette membrane se détache aisément de la chair, avec laquelle elle n'est que contiguë. Il croît solitaire dans les bois, en été. Son suc poisse les bois.

430. AGARIC en entonnoir. *Agaricus infundibuliformis*. Bull.

Agaricus gregarius, submagnus, flavo-ferrugineus, nitidus, pileo infundibuliformi, rigido, margine reflexo; stipite pleno, crasso, subterroso. Bull. Herb. 286, & tab. 353.

Agaricus gilvus. Pers. Synops. 448.

Agaricus cyathiformis. Vahl, in Flor. dan. tab. 1011.

β. ? *Agaricus flaccidus*. Sowerb. Fung. tab. 185.

Ce champignon est luisant, d'un jaune de canelle très-clair ou un peu grisâtre. Son pédicule est nu, cylindrique, plein, fibreux, long de deux ou six pouces, continu, évasé à sa partie supérieure, soutenant un chapeau fragile, mince, humide, toujours creusé en entonnoir, large de quatre à cinq pouces, plus ou moins sinué sur les bords, garni de lames minces, étroites, terminées en pointe; un très petit nombre prolongées jusqu'à la base du chapeau & légèrement décourtes. Il croît en automne, dans les bois, sur les feuilles mortes entassées, qu'il pénètre par les fibrilles radicales de son pédicule.

431. AGARIC mou. *Agaricus mollius*. Bull.

Agaricus pileo subcarneo, infundibuliformi, molissimo, margine mox reflexo; laminis flavis, angustissimis, inaequalibus; stipite solido, ex albo-flavescente. Bull. Herb. tab. 38. (Voyez AMANITE, n°. 19.)

432. AGARIC en bosse. *Agaricus gibbus*. Pers.

Agaricus pileo subnervi, pallido, infundibuliformi, medio umbone prominente; lamellis albis; stipite elastico, subuloso. Pers. Synops. 449.

Agaricus membranaceus. ? Oeder. Flot. dan. tab. 1012. *Quoad habitum*.

Son pédicule est fistuleux, élastique, grêle, aminci, légèrement bulbeux, long d'un pouce & demi, de la même couleur que le chapeau : celui-ci est mince, un peu mou, en forme d'entonnoir, d'un jaune très-pâle, muni dans le fond d'une petite élévation en mamelon. Les lames sont blan-

ches. Il croît au commencement de l'automne, dans les bois de hêtres & de pins.

433. AGARIC à petites écailles. *Agaricus squamulosus*. Pers.

Agaricus pileo infundibuliformi, minute squamuloso, fuscicento-alutaceo; lamellis agrosti albidis; stipite subconico, solido. Pers. Synops. 449.

Cet agaric est remarquable par les petites écailles dont son chapeau est tout parsemé : celui-ci est d'ailleurs infundibuliforme, un peu tenace, d'un fauve clair, soutenu par un pédicule plein, un peu conique, médiocrement épais, presque bulbeux; les lames d'un blanc-pâle. Il croît dans les bois de pins.

434. AGARIC lobé. *Agaricus lobatus*. Sowerb.

Agaricus gregarius, pileo infundibuliformi, lobato, fuscico; lamellis confertis, pallidoribus; stipite oblongo, sursum incrassato. Sowerb. Fung. tab. 186. — Pers. Synops. pag. 450.

Son pédicule est long de deux pouces, épais de trois ou quatre lignes, épaissi vers son sommet, soutenant un chapeau en forme d'entonnoir, lobé, plissé, d'un jaune de paille, large de trois pouces; les lames nombreuses, étroites, d'une couleur plus claire. Il croît par groupes en Angleterre.

435. AGARIC en limaçon. *Agaricus cochleatus*. Pers.

Agaricus capitosus, pileo lobato, contorto, rufescens-fusco; lamellis serratis, pallidioribus; stipite sulcato-risfo, basi connato. Pers. Synops. 450, & Disposit. Meth. Fung. pag. 22. — Abbild. D. Schw. 3. Heft. Icon.

Agaricus confusus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 168.

β. *Agaricus (cornucopioides), stipitatus, pileo lobato; lamellis triphas, decurrentibus; stipite tortuoso*. Bolt. Fung. tab. 8. — Gmel. Syst. Nat. pag. 1429. Sub *merulio*.

Cet agaric répand une odeur approchant de celle de l'ail. Son pédicule est tortueux, presque spirale, rouffâtre, sillonné; il soutient un chapeau lobé, contourné, d'un jaune-clair, brun ou rouffâtre; les lames plus pâles, dentées en scie. Elles sont tristes & décourtes dans la variété β. Il croît en Angleterre, sur le tronc des hêtres, où il est rare.

436. AGARIC d'un brun-pourpre. *Agaricus fusco-purpureus*. Pers.

Agaricus esrifosus, pileo subcarneo, hemisphaerico, umbilicato; stipite caudato, ruginoso, acoriam hirsuto, strigoso. Pers. Synops. 451 & Icon. & Descript. Fung. pag. 12. tab. 4. fig. 1.

Son pédicule est prolongé en forme de queue, de couleur de rouille, ridé, hérissé, soutenant un chapeau médiocrement charnu, presque sec, d'abord convexe, puis hémisphérique, puis enfoncé à son sommet, d'un brun pourpre, plus pâle dans la vieillesse. Les lames sont brunes, inégales dans leur largeur. Il croît par groupes parmi les feuilles mortes, dans les bois de hêtres.

437. AGARIC ventre de biche. *Agaricus cervinus*. Hoffm.

Agaricus stipite in pileum infundibuliformem, obliquè reflexum dilatato, cervino, (hust) tuberoso, tomentoso; lamellis angustissimis, albis, inaequaliter decurrentibus. Hoffm. Nomencl. Fung. pag. 119. tab. 2. fig. 2.

Son pédicule est plein, long de trois pouces au plus, tubéreux & tomenteux à sa base, le prolongeant en un chapeau en forme d'entonnoir, oblique, charnu, large d'un pouce, d'un jaune-fauve. Les lames sont blanches, très étroites, inégalement décourantes, larges d'une ligne & demie. Il croît vers la fin de l'automne, dans les bois des montagnes.

438. AGARIC denté. *Agaricus trichas*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, alutaceo, sparsim pilosissimo, umbilicato; lamellis dentatim decurrentibus, stipite cavo lateo. Pers. Synopf. pag. 451.

Son chapeau est charnu, d'un jaune un peu clair, ombiliqué, légèrement visqueux, large d'un à deux pouces, parsemé de petits écailloux, soutenu par un pédicule glabre, recourbé, jaunâtre, fistuleux. Les lames sont décourantes, un peu élargies, dentées, de couleur jaune. Il croît sur les bois de pins pourris, dans la forêt d'Hercynie.

439. AGARIC luisant. *Agaricus splendens*. Pers.

Agaricus pileo carnoso, plano, depresso, glabro, trusulino, splendens; lamellis congestis, tenuibus, decurrentibus, albis; stipite elastico, flexuoso, deorsum villosa. Pers. Synopf. 452.

Il n'est point désagréable au goût. Son pédicule est plein, allongé, blanchâtre, élastique, flexueux, velu, soutenant un chapeau charnu, plane, déprimé, glabre, luisant, de couleur de cire, large de deux ou trois pouces; les lames minces, nombreuses, décourantes, blanchâtres. Il croît dans les bois de chênes.

440. AGARIC joli. *Agaricus bellus*. Pers.

Agaricus subparvus, pileo carnoso, membranaceo, umbilicato, squamuloso, auro; lamellis dentatoconnatis, stipiteque distinctioribus. Pers. Synopf. 452.

Espèce assez jolie, dont le pédicule est grêle,

mais ferme, long d'un pouce, d'un beau jaune-clair, supportant un chapeau un peu charnu, membraneux, tendre, opaque, ombiliqué, un peu difforme dans la jeunesse, large d'un pouce, parsemé de petites écailles d'un jaune d'or; les lames conniventes, séparées à leur sommet, dentées, d'un jaune-clair. Il croît solitaire, sur le tronc des pins, dans la forêt d'Hercynie.

441. AGARIC forestier. *Agaricus driophylus*. Bull.

Agaricus gregarius, pileo subcarnoso, hemisphaerico, umbilicato, lamellis pallidis; stipite cavo, lutescente-rufilo. Bull. Herb. tab. 414. — Persoon, Synopf. 452. — Soweth. Fung. tab. 127.

Cet agaric s'élève à la hauteur de deux ou trois pouces, sur un pédicule glabre, fistuleux, cylindrique, épais de trois à quatre lignes, brun ou fauve, soutenant un chapeau d'abord hémisphérique, puis plane, ombiliqué dans son centre, légèrement sinué à ses bords, lisse, mince, strié dans sa jeunesse, presque large de quatre pouces, brun ou d'un jaune-pâle, garni de lames inégales, blanches ou jaunâtres, élargies vers leur base, étroites à leur sommet, terminées brusquement, de manière à former un angle rentrant & profond avec le pédicule. Il croît par groupes sur la terre, parmi les feuilles mortes & les mousses, dans les bois.

442. AGARIC farineux. *Agaricus farinaceus*. Bull.

Agaricus pileo subcarnoso, umbilicato, subsquamuloso, stipite longo, ochraceo, rufo; lamellis distinctius, rostris, demum farinaceis. Bull. Herb. tab. 510. fig. K. — Hudson, Angl. pag. 616. — Soweth. Fung. 108. — Pers. Synopf. pag. 453.

8. *Agaricus (rosellus); gregarius, minor, pileo subumbilicato, brevi, subcarnoso; lamellis incarnatorosis*. Bull. l. c. fig. H. — Batsch. Elem. Fung. l. pag. 123. tab. 19. fig. 59.

Agaricus subcarnosus. Batsch. l. c. fig. 100.

9. *Agaricus (tortilis), stipitatus, pileo fusco, striato, undulato; lamellis curvis, stipite brev.* Bolton. Fung. pag. 41. tab. 41. fig. A.

Son pédicule est un peu ferme, allongé, d'un jaune-ochracé, soutenant un chapeau médiocrement charnu, un peu mince, large d'un pouce, ombiliqué, légèrement écailloux, de même couleur que le chapeau, garni de lames distantes, de couleur de rose, blanches & farineuses dans leur jeunesse, un peu décourantes, d'une médiocre largeur. La variété 9 est peut-être le même agaric dans sa jeunesse. Son chapeau est parfaitement glabre. Il croît par groupes dans les forêts, parmi les gazons, vers la fin de l'été.

443. AGARIC poudré. *Agaricus subfarinaceus*.

Agaricus (*furfuraceus*), *gregarius*, *subparvus*, *pileo carneo*, *membranaceo*, *umbilicato*, *conescente helveto*; *squamulis subfarinaceis*; *lamellis planis*, *subdecurrentibus*, *cinnamomeis*; *stipite furfuraceo*, *subrigido*. Perf. Synopf. 454.

Agaricus pulverulentus. Schœff. Fung. tab. 226.?

C'est une petite espèce, dont le pédicule est long d'un pouce & demi, à peine épais d'une ligne, un peu ferme, parsemé, ainsi que toute la plante, de petites écailles farineuses. Son chapeau est médiocrement charnu, membraneux, convexe, puis ombiliqué, d'un blanc-jaunâtre, large d'environ neuf lignes, glabre dans son centre, garni de lames planes, légèrement décurrentes, d'un jaune-cannelé. Il croît parmi les mousses, par groupes, dans les forêts.

444. AGARIC en cupule. *Agaricus cupularis*. Bull.

Agaricus solitarius, *pileo subcarneo*, *hemisphaerico*, *umbilicato*, *lamellisque pallidis*; *stipite cavo*, *lutescente-rufilo*. Bull. Herb. tab. 554. fig. 2. — Perf. Synopf. 454.

Son pédicule est glabre, fistuleux, grêle, cylindrique, blanchâtre, long de trois à quatre pouces, large de deux lignes, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis plane, puis déprimé, ombiliqué en coupe à son centre, d'un jaune-pâle, garni de lames inégales, oblongues, légèrement décurrentes, d'un jaune foncé. Il croît solitaire sur la terre.

445. AGARIC des neiges. *Agaricus nivalis*. Vahl.

Agaricus pileo planiusculo, *flavo*, *stipiteque fistuloso*, *nudo*, *lamellisque dilatioribus*. Vahl, in Flor. dan. tab. 1072. fig. 2. — Perf. Synopf. 454.

Il est fort petit, de couleur jaune. Son pédicule est allongé, fistuleux; son chapeau d'abord convexe, puis hémisphérique, puis concave, ombiliqué, large de trois à quatre lignes; les lames étroites, presque décurrentes, d'un jaune plus pâle. Il croît sur les hautes montagnes de la Norwège.

446. AGARIC fragile. *Agaricus fragilis*. Perf.

Agaricus subparvus, *pileo convexo*, *fragili*, *medio tantum umbilicato*, *ochraceo*; *marginibus albentibus*, *irregularibus*; *stipite gracili*, *brevi*, *una cum lamellis pallidioribus*. Batrch. Elem. Fung. Cont. 2. pag. 87. tab. 39. fig. 215. — Perf. Synopf. 455.

Son pédicule est grêle, cylindrique, long d'un pouce & plus, épais d'une ligne & demie, d'un blanc-falé; le chapeau glabre, un peu visqueux,

convexe, fragile, ombiliqué seulement dans son centre, large d'un pouce & plus, d'un jaune d'ocre, irrégulier & blanchâtre à ses bords; les lames plus pâles ou d'une couleur de chair un peu rougeâtre. Il croît dans les bois de pins.

447. AGARIC odorant. *Agaricus fragrans*. Sw.

Agaricus gregarius, *odoratus*, *albido-fufcescens aut pallidus*, *pileo umbilicato*, *levi*; *lamellis horizontalibus*; *stipite longo*, *solido*. Sowb. Fung. tab. 10. — With. Ariang. 4. pag. 161.

Cet champignon se distingue par son odeur. Les uns lui donnent celle de la mauve odorante; d'autres, celle du foie; d'autres enfin, celle d'un *cratagarus*. Son pédicule est long de trois pouces, épais de deux lignes au plus; son chapeau lisse, ombiliqué, luisant, d'un brun plus ou moins clair ou d'un blanc-falé, large d'un pouce & demi; les lames horizontales, distinctes, à peine connexes, un peu décurrentes. Il croît en Angleterre, dans les prés.

448. AGARIC virginal. *Agaricus virgineus*. Jacq.

Agaricus gregarius, *subparvus*, *candidus*, *pileo carneo*, *primò convexo*, *dein plano-depresso*, *adultis marginibus subinflexis*, *striato*; *lamellis d'flantibus*, *decurrentibus*, *venosis*, *connatis*. Jacq. Miscell. 2. tab. 15. fig. 1. — Perf. Synopf. 456.

Agaricus ericeus. Bull. Herb. tab. 188.

Agaricus niveus. Schœff. Fung. tab. 231.

Cet agaric est assez agréable au goût : on le mange dans quelques campagnes sous le nom de *mousseron*. Sa couleur est blanche ou légèrement roussâtre. Il est sec & solide lorsqu'il croît dans un lieu exposé au soleil, un peu mou lorsqu'il vient à l'ombre, dans un lieu humide. Son pédicule est plein ou fistuleux, cylindrique, long d'un pouce & plus, continu avec le chapeau; celui-ci est d'abord convexe, puis plane ou concave, rabattu à ses bords, large de deux pouces, se gercant à sa surface, garni de lames peu nombreuses, entre-mêlées de demi-lames, décurrentes sur le pédicule. Il croît en automne, par groupes, dans les bruyères & les friches.

449. AGARIC d'un blanc-luisant. *Agaricus candidans*. Perf.

Agaricus totus elasticus, *albo-nitens*, *pileo umbilicato*, *levissimo*, *primò convexo*. Perf. Synopf. 456.

Agaricus umbilicatus. Bolton. Fung. tab. 17.

Il est élastique dans toutes ses parties, d'un blanc-éclatant. Son pédicule est long d'un à deux pouces; son chapeau d'abord convexe, puis légèrement ombiliqué, très-lisse, large de neuf lignes.

Il croît au commencement de l'automne, dans les bois de hêtres & de chênes.

450. AGARIC or & argent. *Agaricus chrysosoleus*. Pers.

Agaricus castiposus, pileo carnosomembranaceo, hemisphaerico, albidio; lamellis distantibus, sulphureis; stipite stipuloso, albo, brevi. Pers. Synops. 457.

Il paroît avoir de grands rapports avec l'*agaricus mollis*. Son pédicule est court, blanchâtre, grêle, un peu arqué, plein dans sa jeunesse, fistuleux dans un âge plus avancé; le chapeau d'abord hémisphérique, puis concave, un peu conique, charnu, membraneux, blanchâtre, puis pâle, un peu gercé, large d'un pouce; les lames peu nombreuses, décurren-tes, d'un jaune de soufre. Il croît par groupes, sur le tronc des sapins, dans la forêt d'Hercynie.

451. AGARIC phyllophile. *Agaricus phyllophilus*. Pers.

Agaricus subcastiposus, candidus, pileo umbilicato, levi; lamellis confertis, subdecurrentibus; stipite basi villosio, incurvo. Pers. Synops. pag. 457.

Son pédicule est allongé, fistuleux, très-velu à sa base; il supporte un chapeau très-lisse, ombili-qué, large de deux pouces, de couleur blanche, ainsi que toute la plante; garni de lames nombreu-ses, légèrement décurren-tes. Il croît presque soli-taire, en automne, parmi les feuilles tombées, dans les bois de hêtres.

452. AGARIC couleur de prune. *Agaricus prunulus*. Pers.

Agaricus subgregarius, pileo carnosio (primò con-vezo), depresso, flexuoso, candido aut subcavo; la-mellis demùm subincarnatis; stipite brevi, deorsum incrassato, villosio. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 20, & Synops. 457. — Scop. Carn. 2. pag. 437.

Il se distingue aisément par son odeur de farine nouvelle. Son pédicule est grêle, court, variable dans sa forme, un peu rec-til, couvert d'un duvet mou. Le chapeau, également variable, est d'abord convexe, puis comprimé, aplati, flexueux, lobé ou incisé, blanc ou bleuâtre; les lames de couleur incarnate. Il croît solitaire ou par petits groupes, parmi les gazons, dans les forêts, aux lieux om-bragés, en été & en automne.

453. AGARIC tronqué. *Agaricus truncatus*. Pers.

Agaricus solitarius, parvus, compactus, pileo ap-planato-depresso; margine revolutio, subtomentoso; lamellis incarnato-argillaceis; stipite brevi, sursum incrassato. Pers. Synops. 458.

Son pédicule est glabre, médiocrement cylindri-que, court, épaissi à sa partie supérieure; son cha-peau un peu grêle, mais ferme, lisse, convexe,

puis concave, aplati, comprimé, large d'un pouce, rebroussé & un peu tomenteux à ses bords; les lames minces, nombreuses, d'un jaune-clair ou incarnates. Il croît dans les bois de pins.

454. AGARIC tigré. *Agaricus tigrinus*. Bull.

Agaricus pileo carnosio, albidio; squamis subpilis, nigrescentibus; stipite pleno, duro, subquamuloso. Bull. Herb. tab. 70. — Sowerb. Fung. tab. 68. — Pers. Synops. pag. 458.

Agaricus eriniius. ? Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 65.

? *Agaricus squamosus*. Schæff. Fung. tab. 29 & 30. (Voyez AMANITE, n°. 21.)

455. AGARIC à rigoles. *Agaricus elizus*. Pers.

Agaricus magnus, pileo carnosio, subdepresso, re-pando, virgato, nigrescente sulcino; lamellis pal-lidis, subdecurrentibus; stipite solido, longiusculo. Pers. Synops. 460. — Sowerb. Fung. tab. 172.

Son pédicule est plein, inégal, long de trois pouces & plus; son chapeau un peu charnu, con-ve-ze, puis un peu déprimé, finué ou cannelé, irrégulier, long de trois pouces, large d'un demi-pouce, d'un noir-ensumé; les lames peu nombreu-ses, pâles, médiocrement décurren-tes. Il appar-tient à peine à cette division; il croît dans les forêts, aux environs de Londres.

456. AGARIC en gobelet. *Agaricus cyathoides*. Pers.

Agaricus pileo subtenui, primò planiusculo, dein infundibuliformi, umbrino; lamellis decurrentibus, ex albidio fusciscentibus; stipite longissimo, bulboso; radicibus copiosis, fibrosis. Pers. Synops. 460. — Bolton. Fung. tab. 145.

Son pédicule est bulbeux, long de quatre pou-ces, aminci vers le haut, réticulé à sa superficie, d'un blanc-roussâtre, garni à sa base de fibres nombreuses; le chapeau d'abord un peu plane, puis en forme d'entomolier, de couleur brune, terreuse; sinué, ondulé à ses bords dans sa vieillesse, large d'un pouce & demi; les lames décurren-tes, d'un blanc-fâle, ensumé. Il croît en Angleterre, au mois de févri-er.

457. AGARIC en coupe. *Agaricus cyathiformis*. Bull.

Agaricus elasticus, nigrescente-umbrinus, pileo infundibuliformi, margine reflexo, levi; stipite tenui, albo, pleno. Bull. Herb. tab. 248, & tab. 568. fig. 1, & tab. 575.

Agaricus tardus. Pers. Synops. 461. — Vaillant, Bot. Paris. tab. 14. fig. 1 & 3.

Agaricus infundibulum. Leyser. Flor. halens.

Agaricus sericeus. Plag. Fung. Erfurth. pag. 73.
Agaricus fordicus. Dickf. Crypt. Brit. 1. pag. 16.
 tab. 3. fig. 1.

§. *Agaricus (rufolamellatus)*, pileo stipiteque mediocri, lamellis rufis. Bull. Herb. tab. 568. fig. 1.
 — Perf. 1. c.

Son chapeau est lisse, d'une couleur blanche, jaunâtre ou brune, large d'un pouce & demi, d'abord concave, puis en forme de coupe profonde, soutenu par un pédicule plein, cylindrique, long de quatre pouces, blanc, concin avec le chapeau. Les lames sont minces, inégales, décourantes sur le pédicule, blanches ou brunes, terminées en pointe. Il croît à l'ombre, en été & en automne, dans les bois, parmi la mousse.

458. AGARIC pâles couleurs. *Agaricus expallens*. Perf.

Agaricus pileo carnosio, membranaceo, umbilicato, livido, cinereo, margine substriato; lamellis subdistichis, cinereis; stipite crassifusco, subtenaci, pallido. Perf. Synopf. 461.

Il ressemble beaucoup au précédent; mais il est plus petit, d'une consistance plus tendre, d'une couleur cendrée. Son pédicule est épais, un peu ferme, pâle, soutenant un chapeau charnu, membranaceux, d'abord convexe, puis concave, ombiliqué, légèrement strié à ses bords, d'un blanchâtre, un peu gris; les lames peu nombreuses, de couleur cendrée. Il croît solitaire, au commencement de l'automne, sur la terre, dans les forêts de pins.

459. AGARIC à deux couleurs. *Agaricus difcolor*. Perf.

Agaricus pileo hemispharico, umbilicato, cinereo, dimidiato albescens; lamellis consentis, subdecurrentibus, dilatioribus; stipite mediocri, subcompresso, basi obscuri cinereo. Perf. Synopf. 462.

Il n'est peut-être qu'une variété du précédent. Son pédicule est long d'un pouce & demi, d'abord cylindrique, puis comprimé, cendré, parsemé de petites taches blanches; son chapeau d'abord hémisphérique, cendré, puis concave, ombiliqué, blanchâtre, presque transparent, large d'un pouce & demi; ses lames nombreuses, adhérentes, lanugineuses, un peu décourantes, d'une couleur plus claire. Il croît dans les bois de pins.

460. AGARIC difforme. *Agaricus difformis*. Perf.

Agaricus pileo carnosio, membranaceo, cinereo, livido, striato, irregulari, umbilicato; lamellis latiusculis, plano-decurrentibus, albis; stipite longiusculo, subtenaci, tenui. Perf. Synopf. 462.

Son pédicule est grêle, un peu ferme, allongé,

épais d'une ligne & plus, luisant, supportant un chapeau charnu, membranaceux, d'abord convexe, puis concave, ombiliqué, de couleur livide, cendrée, un peu luisant, strié, ondulé, irrégulier à ses bords; les lames blanches, élargies, un peu ventruës, blanchâtres ou cendrées. Il croît parmi les pins, dans la forêt d'Hercynie.

461. AGARIC des troncs. *Agaricus epichysum*. Perf.

Agaricus truncigenus, parvus, tener, cinereo-nigricans, pileo infundibuliformi, striato; lamellis distindis; stipite cylindrico, basi villosio. Perf. Disp. Fung. pag. 25, & Synopf. pag. 462.

§. *Agaricus (icmadophilus)*, tenerimus, pileo infundibuliformi, obscuri cinereo; lamellis plano-decurrentibus, cinereis. Perf. Synopf. 463.

Son pédicule est court, cylindrique, velu à sa base, long d'un à deux pouces, épais d'une ligne & plus, soutenant un chapeau tendre, d'abord convexe, puis en entonnoir, strié, d'un cendré-noirâtre, large d'environ neuf lignes, garni de lames distinctes, planes, cendrées & décourantes dans la variété §. Il croît en automne, sur le tronc des saules creux. Sa variété se rencontre parmi les sphagnees, dans les marais tourbeux.

462. AGARIC noirâtre. *Agaricus nigrella*. Perf.

Agaricus parvulus, subcassiosus, pileo glabro, umbilicato, nigrescente; lamellis incarnato subcinereis; stipite brevi, glauco. Perf. Synopf. 463.

Cet agaric est fort petit. Son pédicule a un pouce au plus de haut; il est de couleur glauque, & supporte un chapeau glabre, d'abord convexe, puis concave, ombiliqué, noirâtre, large de trois à quatre lignes, d'une couleur plus foncée à son disque. Les lames sont décourantes, incarnates ou un peu cendrées. Il croît dans les prés, sur les montagnes.

463. AGARIC à petites dents. *Agaricus serrula*. Perf.

Agaricus pileo umbilicato, squamuloso, nigrescente-fulgineo; lamellis serratis, incarnato-pallidis (sublatis), margine nigris; stipite longiusculo, cavo, subarcuato. Perf. Synopf. 464.

Ce champignon est assez élégant; il se rapproche de l'*agaricus chalybeus*. Son pédicule est fistuleux, un peu atqué, long de deux pouces; son chapeau convexe, puis ombiliqué, légèrement écailléux, noirâtre, enfumé, large d'un pouce & demi & plus; les lames presque libres, se détachant facilement du pédicule, dentées en scie, pâles, incarnates, noires à leurs bords. Il croît sur les collines, parmi les gazon.

464. AGARIC bocager. *Agaricus callophyllus*. Persf.

Agaricus subparvus, pileo hemisphaerico, umbilicato, umbrino-fulgineo; lamellis decurrentibus, purpureo-rubris; stipite subviscoso, crassifusculo. Persoon, Synopf. 464.

Son pédicule est épais, visqueux, insensiblement aminci, long d'un pouce, luisant, d'abord de couleur purpurine; puis il prend celle du chapeau. Celui-ci est petit, convexe, puis hémisphérique, ombiliqué, d'un brun enfumé, légèrement strié, large de trois à quatre lignes; les lames élégantes, décurrençes, d'un pourpre-rouge. Il croît sur les troncs pourris.

465. AGARIC à pied violet. *Agaricus cyanipes*. Persf.

Agaricus pileo convexo (umbilicato), nigro; stipite innati, basi crassius, lamellisque dentatis, dilatationibus, Vahl, in Flor. dan. tab. 1071. — Schrad. Spicil. pag. 121. — Persf. Synopf. 464.

Cet agaric, qui paroit appartenir à la division des *proleia*, a son pédicule fistuleux, ventru en dehors, surtout vers sa base, un peu violet, long de deux pouces, presque épais de trois lignes, soutenant un chapeau convexe, puis concave, ombiliqué, d'un pouce de large, autant de haut, de couleur noire. Ses lames sont adhérentes, d'un gris-cendré ou enfumées. Il croît en Danemarck, dans les prés.

466. AGARIC améthyste. *Agaricus amethysteus*. Bull.

Agaricus gregarius, subtenax, recens late violaceus, demum consensens; lamellis albis; stipite longo, fibrilloso, obtenuato, foliido. Bull. Herb. tab. 198, & 570. fig. 1. — Persf. Synopf. 465. — Bolt. Fung. tab. 63. — Hudf. Flor. angl. pag. 612.

p. Agaricus (incanus), pileo levi cum subsquameoso, expallenscente. Bull. 670. fig. L. M.

Il est, à sa naissance, d'une couleur violette-améthyste; il devient, en vieillissant, d'un blanc-jaunâtre. Son pédicule est plein, cylindrique, filandreux, long d'environ six pouces, continu avec le chapeau, muni de quelques fibres radicales. Son chapeau est convexe, hémisphérique, régulier, puis déprimé à son centre, un peu sinué à ses bords, sec, comme velouté à sa surface, large de trois pouces; les lames épaisses, peu nombreuses, les unes entières, les autres décurrençes sur le pédicule. Il croît en automne, par groupes, dans les bois.

467. AGARIC poli. *Agaricus politus*. Persf.

Agaricus gregarius, pileo subcarneo, hemisphaerico, obsolete umbilicato, casto-livido, subnitente;

lamellis subdecurrentibus, albedo-incarnatis; stipite longiusculo, cavo, rigido. Persf. Synopf. 465.

Agaricus lividus. Persf. Dispos. Fung. pag. 22.

Son pédicule est long de trois pouces, roide, fistuleux; son chapeau médiocrement charnu, hémisphérique, puis un peu ombiliqué, d'un bleu-livide, large d'un pouce & demi, très-lisse, presque luisant; ses lames légèrement décurrençes, d'un blanc-incarnat. Il varie dans les couleurs plus ou moins foncées; il croît dans les bois de hêtres.

468. AGARIC ardoisé. *Agaricus ardoiseus*. Bull.

Agaricus majusculus, pileo primim convexo, dein subinfundibuliformi, plumbeo; lamellis confertis, liberis, subserugineis; stipite cavo, longo, plumbeo. Bull. Herb. tab. 348. — Persf. Synopf. 466.

Il est d'un bleu d'ardoise sur son pédicule & son chapeau, roux ou couleur de rouille sur les lames. Son pédicule est cylindrique, fistuleux, long de cinq à six pouces, plus épais & un peu blanchâtre à sa base, soutenant un chapeau peu charnu, campaniforme, convexe, puis concave, presque en entonnoir, sinué à ses bords, lisse à sa surface, large de trois à quatre pouces, quelquefois marqué de zones concentriques, noires, garni de lames larges, peu épaisses, libres, nombreuses, entre-mêlées de quelques demi-feuilles. Il croît en automne, dans les prés humides.

469. AGARIC ombiliqué. *Agaricus umbilicatus*.

Agaricus pileo convexo, centro prolixo convexo, margine reflexo; laminais floris, laevis, nonnullis hamatis, subdecurrentibus; stipite fistuloso. Bull. Herb. tab. 411. fig. 2.

Son pédicule est glabre, blanchâtre, fistuleux, cylindrique, long d'environ trois pouces, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis concave, avec les bords rabattus, large d'un pouce & demi de couleur jaunâtre, quelquefois des fibres rouges sur les bords; garni de lames larges, inégales, quelques-unes munies à leur base d'un crochet décurrent sur le pédicule. Il croît dans les bois en été.

470. AGARIC falbalète. *Agaricus fimbriatus*. Persf.

Agaricus majusculus, pileo infundibuliformi; marginis elegantissimo, crispato, lobato, fimbriato, tenui, apertis albo, semitransparente; lamellis trifidis, longissimis, angustis, pellucidis; stipite gracili, brevi. Bolzon. Fung. pag. 61. tab. 61. — Persoon, Synopf. 466.

Il est d'une grandeur médiocre, d'une consistance molle; son pédicule est court & grêle; son chapeau d'abord convexe, puis en entonnoir.

mince, blanchâtre, à demi transparent, large d'environ trois pouces, lobé, frangé, crépu d'une manière fort élégante à ses bords; garni de lames trifides, étroits, fort longues, transparentes. Il croît en Angleterre.

471. AGARIC veiné. *Agaricus venosus*. Persf.

Agaricus pileo submembranaceo, tenaci, venosofriato, umbrino-refco; lamellis parvis, subconcoloribus, glaucis, subannulatis apicibus; stipite compresso, nigrescente, pruinato. Persf. Synopf. 467.

Merulius fatidus. Sowerb. Fung. tab. 21. ?

Son pédicule est d'une substance presque cornée, noirâtre, comprimé; il soutient un chapeau tenace, un peu membraneux, ombiliqué, presque pulvérulent, veiné, strié, d'une couleur sombre, terreuse; les lames peu nombreuses, presque de la couleur du chapeau, glauques, un peu transparentes, détachées, & formant une sorte d'anneau autour du pédicule. Il croît sur les troncs à demi pourris, dans le mois d'août.

472. AGARIC en roue. *Agaricus rotula*. Persf.

Agaricus castitosus, albus, pileo profundo sulcato, lamellis tubo stipitem ambiente adnatis, stipite nigrescente. Persf. Synopf. 467. — Scopol. Carn. edit. 2. pag. 1569. — Sowerb. Fung. tab. 95.

Agaricus androsaceus. Bull. Herb. tab. 64.

Agaricus nigripes. Vahl, Flor. dan. tab. 1134. fig. 1. — Schrad. Spicil. pag. 129.

3. *Agaricus pileo flavido*. Bull. Herb. tab. 569. fig. 3.

Cette espèce se rapproche de la précédente; elle est très-singulière, assez jolie, toute blanche, excepté le pédicule, qui est noirâtre ou d'un violet foncé à sa base. Il est grêle, plein, luisant, poli, long d'un pouce & demi, épais d'une ligne, soutenant un chapeau plus ou moins convexe, ombiliqué, strié, très-mince, large au plus d'un demi-pouce, un peu ondulé & presque crénelé à ses bords, d'un jaune d'ocre dans la variété β , garni de lames peu sailantes, peu nombreuses, entières, également écartées du pédicule, & formant une sorte de bourlet circulaire. Il croît en gazon, sur les feuilles mortes & le bois pourri, en été & en automne, dans les forêts.

473. AGARIC androsacé. *Agaricus androsaceus*. Persf.

Agaricus gregarius, persiflens, pileo planiusculo, subplicate, albo, obsolete umbonato; lamellis simplicibus, totis adnatis; stipite nigrescente-basido. Persf. Synopf. pag. 468. — Ehrh. Plant. Crypt. Exf. — Sowerb. Fung. tab. 92.

Agaricus perforans. Hoffm. Nomencl. tab. 4. fig. 2.

Son pédicule est noirâtre, légèrement pileux vu à la loupe, soutenant un chapeau convexe, puis plane, plutôt coriace que membraneux, point fragile, un peu saillant à son centre, légèrement plicé, d'un blanc un peu lavé de rouge; les lames simples, adhérentes, un peu crépues. Il croît abondamment pendant presque toute l'année, sur les feuilles des sapins.

474. AGARIC des feuilles. *Agaricus epiphyllus*. Persf.

Agaricus gregarius, minutus, albus, pileo membranaceo, convexo, demum subumbilicato; lamellis raris, ramentis; stipite nigrescente. Persf. Synopf. pag. 468.

Agaricus squamula. Batfch. Elem. Fung. 1. pag. 95. tab. 84. — Sowerb. Fung. tab. 93.

Agaricus laevis. Bull. Herb. tab. 601. fig. 2.

β . *Agaricus (saccharinus), pileo conico, explicato, levi, plicato, undulato, nereo; laminis paucis, concoloribus, stipite subulato, atriore*. Batfch. l. c. pag. 93. fig. 83.

γ . *Agaricus (rugatus), niveus, pileo plano, membranaceo, subtus rugis subulatis*. Vhal, Flor. dan. tab. 1194.

Agaricus acicularis. Hoffm. Nomencl. Fung. pag. 215. tab. 5. fig. 2. Junior.

Agaricus (mucosus), minutissimus, griseus, pileo convexo; lamellis paucis; stipite tenero, basi bulbo annulari inserto. Batfch. l. c. pag. 91. fig. 82. Junior.

Dans sa jeunesse, cet agaric ressemble au *clavaria gyrans* de Batfch. Il est fort petit. Son pédicule est alors tout-à-fait blanc & un peu velu; il noircit ensuite & supporte un chapeau membraneux, d'abord convexe, un peu hémisphérique, puis légèrement ombiliqué, très-mince, large d'un pouce & demi ou deux pouces, blanc, très-souvent irrégulier, quelquefois un peu mamellonné. Les lames sont peu nombreuses, épais, rameuses, blanchâtres, légèrement décurrentes. Le pédicule est subule, d'un rouge-foncé dans la variété β . Le chapeau plane & marqué en dessous d'environ huit ris dans la variété γ . Il croît par groupes, en automne, dans les bois, sur les feuilles sèches & tombées des hêtres.

475. AGARIC clochette. *Agaricus campanulatus*. Persf.

Agaricus pileo hemispharico, umbilicato, striato, ferrugineo; lamellis decurrentibus; stipite subulato, fradisco. Persf. Comment. pag. 94. & Synopf. 469. — Batfch. Elem. Fung. pag. 74.

Agaricus

Agaricus fragilis. Schæff. Fung. tab. 130.

Son pédicule est fistuleux, d'un jaune-pâle, soutenant un chapeau fort petit, d'abord hémisphérique, puis un peu concave, ombiliqué, strié, de couleur brune, large de trois à quatre lignes, transparent, garni de lames décurrenles, adhérentes entr'elles, plus pâles que le chapeau. Il croît par groupes nombreux, sur le tronc des pins.

476. AGARIC des mouffes. *Agaricus muscarum*. Pers.

Agaricus stipitatus, pileo impresso, striato, flavofusco; stipite basi incrassato, brevi; lamellis horizontaliter fissis, pallidioribus. Persoon, Synopf. pag. 470.

Son pédicule est court, épais à sa base, arqué, ascendant, de la même couleur que le chapeau. Celui-ci est membraneux, strié, d'un jaune-foncé, large d'environ un pouce; les lames d'une couleur plus pâle, placées horizontalement. Il croît par groupes, parmi les mouffes, en automne, au pied des arbres.

477. AGARIC nivelé. *Agaricus hydropannus*. Bull.

Agaricus castiposus, unicolor, totus albus aut rufus, pileo striato; stipite cavo, undulato, subincurvo, crassifusculo. Bull. Herb. tab. 564. A. B. — Pers. Synopf. pag. 470.

Ce champignon est d'une seule couleur, tantôt blanc, tantôt roux, tantôt jaunâtre. Son pédicule est cylindrique, nu, un peu ondulé, long de deux à trois pouces, creux selon Persoon, quelquefois plein selon Bulliard. Le chapeau est d'abord convexe & presque globuleux, ensuite il devient creux dans son centre, & enfin plane, un peu finueux; il est glabre, strié sur les bords, large de deux pouces, plus pâle à son centre. Les feuillets sont inégaux entr'eux, un peu décurrens sur le pédicule. Les plus longs se terminent tous au même niveau. Il croît sur les feuilles mortes. (Descand.)

478. AGARIC en boîte. *Agaricus pyxidatus*. Bull.

Agaricus gregarius, pileo cupulari seu infundibuliformi, striato, subpallido; lamellis lutescentibus; stipite elongato, solido, pallido. Bull. Herb. tab. 568. fig. 2. — Pers. Synopf. 471.

β. *Agaricus fulvus*. Bull. l. c. fig. C. H.

γ. *Agaricus luteolus*. Bull. l. c. fig. A.

δ. *Agaricus albus*. Bull. l. c. fig. B.

Cet agaric varie dans les couleurs de son chapeau, qui est ordinairement fauve, quelquefois blanc ou jaunâtre, concave à son centre, relevé Botanique. Supplément. Tome I.

& convexe à ses bords, strié, large d'un pouce, soutenu par un pédicule glabre, plein, cylindrique, blanc ou roussâtre, long de trois pouces, épais de deux lignes au plus. Les lames sont étroites, rousses, inégales, décurrenles. Il croît par groupes sur la terre.

479. AGARIC fêchet. *Agaricus fibrila*. Bull.

Agaricus parvus, pileo levii, ochraceo-rufescente; lamellis distantibus, albidis; stipite longifusculo, solido. Bull. Herb. tab. 186, & tab. 550. fig. 1. — Pers. Synopf. 471. — Soweb. Fung. tab. 45.

β. *Agaricus (tubula), major, pileo submembranaceo, umbilicato, striato, ochraceo-fulvo; lamellis arcuatis, candidis; stipite solido, subteriaci, undulato; pileo concolore*. Pers. l. c.

Cet agaric est petit, un peu variable. Son pédicule est grêle, roux ou blanchâtre, plein, long de deux pouces, épais d'une ligne, continu avec le chapeau. Ce dernier est convexe, puis concave à son centre, entier & un peu rabattu à ses bords, fauve ou rougeâtre, large de quatre à cinq lignes, garni de lames inégales, fort étroites, jaunâtres, décurrenles. Il croît en automne, parmi les mouffes. La variété β a la forme d'un tube; elle est plus grande. Son chapeau est légèrement membraneux, d'un jaune d'ocre, strié, large de trois à quatre lignes; les lames blanchâtres, arquées; le pédicule long de deux pouces, blanchâtre à sa base. Il croît sur le mont Meisner, parmi les mouffes.

480. AGARIC en famille. *Agaricus amadelphus*. Bull.

Agaricus parvulus, gregarius, pileo flavo-pallidiflorescente, primum convexo, dein plano, in centro concavo; lamellis rufescentibus; stipite pleno, albidio, incurvato, ascendente, basi subhirsuto. Bull. Herb. tab. 550. fig. 3.

Son pédicule est grêle, plein, blanchâtre, long de six à neuf lignes, courbé, puis redressé, un peu hérissé à sa base, soutenant un chapeau convexe, puis plane, ombiliqué à son centre, d'un jaune-pâle, quelquefois inégal à ses bords, large de trois ou quatre lignes, garni de lames décurrenles, inégales, rougeâtres. Il croît par groupes nombreux sur l'écorce des arbres.

481. AGARIC faux androsace. *Agaricus pseudo-androsaceus*. Bull.

Agaricus gregarius, totus griseus, membranaceus, pileo convexo, demum infundibuliformi; lamellis distantibus, basi larissimis; stipite mediocri, solido. Bull. Herb. tab. 276. — Sibthorp. Oxon. pag. 336.

Agaricus ericetorum. Pers. Observ. Mycol. t. 1. pag. 50. tab. 4. fig. 12, & Synopf. 472. — Flor. dan. tab. 1015.

Agaricus nothus. Gmel. Syst. Nat. 2. pag. 1423.

β. ? *Agaricus* (Vaillantii), fungus, pileo candidante; lamellis paucis (latissimis); pedunculo fuscolpescente. Vaill. Bot. Paris. tab. 11. fig. 21 & 23. — Pers. l. c.

Cet agaric est fort petit; il varie dans sa couleur, qui est blanche, grise ou roussâtre. Son pédicule est plein, cylindrique, long de deux pouces au plus, soutenant un chapeau convexe, puis en forme d'entonnoir, rabattu à ses bords, un peu épais, marqué de stries divergentes, garni de lames peu nombreuses, inégales, décourantes, plus larges dans la variété β. Il croît par groupes sur la mousse, dans les bois, en automne & en été.

§. XI. PLEUROPUS. Pers. Point de coiffe; pédicule nu, excentrique, latéral ou nul.

481. *AGARIC* à duvet noirâtre. *Agaricus atro-tomentosus*. Pers.

Agaricus magnus, pileo convexo, fusco-fertugineo; lamellis pallide ochraceis; stipite cylindrico, subcurvato, tomentoso, atrofusco. Pers. Synopf. 472. — Batfch. Elem. Fung. pag. 89. tab. 8. fig. 32.

Son pédicule est court, épais, cylindrique, un peu courbé, hérissé d'un duvet brun-noirâtre, supportant un chapeau oblique, sec, un peu charnu, un peu rulé, toulé à ses bords, d'abord convexe, puis presque plane, de la couleur du pédicule, garni de lames d'un jaune-pâle, distinctes, conniventes, point décourantes. Il croît sur le tronc des arbres, particulièrement sur les saules.

483. *AGARIC* orcelle. *Agaricus orcellus*. Bull.

Agaricus gregarius, pileo elliptico aut orbiculari; stipite pallido, subexcentrico; lamellis confertis, incarnatis. Bull. Herb. tab. 573. fig. 1, & tab. 591. — Pers. Synopf. 473.

« Cet agaric, dit M. Decandolle, tient le milieu entre ceux dont le pédicule est central, & ceux où il est excentrique; il est dans l'une ou l'autre division, selon la position dans laquelle il se développe. Son pédicule est nu, glabre, plein, jaunâtre, ordinairement courbé, long d'un à deux pouces, soutenant un chapeau d'abord convexe, puis plane & même concave dans le milieu, un peu sinueux, jaunâtre, zoné ou tacheté, large de deux ou trois pouces; les lames étroites, inégales, d'un jaune d'ocre, un peu décourantes, aiguës à leurs deux extrémités. Il croît en rouffes, quelquefois solitaire, sur les vieux troncs. »

484. *AGARIC* d'orme. *Agaricus ulmarius*. Bull.

Agaricus pileo carnoso, latissimo, unicolore, pal-

lescente aut lividis variegato; lamellis latissimis, submarginato-adnexis; stipite adfcescente. Bull. Herb. tab. 510. — Pers. Synopf. 473. — Sowerb. tab. 67. ? (*Totus cinereus*.)

Son pédicule est excentrique, plein, charnu, cylindrique, d'un blanc-sale, arqué, long de six pouces, épais d'un pouce, continu avec le chapeau. Celui-ci est charnu, convexe, arrondi, très-ample, d'un jaune-terreux, marqué, dans sa vieillisse, de petites raies rouges ou noires, quelquefois large d'environ un pied & demi, garni de lames élargies, adhérentes au pédicule, inégales, échancrées à leur base, blanchâtres, puis d'un jaune-sale. Il croît en automne, sur le tronc des ormes.

485. *AGARIC* marqueté. *Agaricus tessellatus*. Bull.

Agaricus pileo convexo, carnoso, tessellato; tessellis ferè hexagonis; stipite tereti, subexcentrico. Bull. Herb. tab. 513. fig. 1. — Pers. Synopf. 474.

Cet agaric s'élève à la hauteur de trois à quatre pouces, sur un pédicule plein, charnu, cylindrique, arqué, de couleur blanche, soutenant un chapeau convexe, charnu, arrondi, inégal à ses bords dans sa vieillesse, marqué de taches presque hexagonales, d'un jaune-clair, sur un fond plus obscur, large d'environ six pouces, garni de lames inégales, blanches ou un peu jaunâtres, adhérentes au pédicule, échancrées à leur base. Il croît en automne, sur les vieux troncs ou sur les vieilles poutres de chêne.

486. *AGARIC* palmé. *Agaricus palmatus*. Bull.

Agaricus castrosum, pileo lamellis opacis, rufospadiceis; stipite excentrico, subtrito, alvido. Bull. Herb. tab. 516. — Pers. Synopf. 474. — Hoffm. Nomencl. pag. 113.

β. *Agaricus totus rubescens.* Sowerb. Fung. tab. 62.

Son pédicule est excentrique, plein, charnu, blanc, d'abord renflé à sa base, puis cylindrique, arqué, long de trois à six pouces, soutenant un chapeau d'abord convexe, arrondi, puis inégal & sinué à ses bords, d'un jaune-brun ou roux, large de cinq à six pouces, garni de lames inégales, peu nombreuses, un peu irrégulières, de même couleur que le chapeau, terminées par une membrane qui empêche leur adhérence avec le pédicule. Il croît en automne, par groupes, le long des bois ou des troncs d'arbres.

487. *AGARIC* en voûte. *Agaricus fornicatus*. Pers.

Agaricus solitarius, compactus, pileo planiusculo, sublivido; lamellis distinctis, subdecurrentibus, ratilis;

stipite brevissimo, tomentoso, subexcentrico. Perf.
Synopf. 474.

Agaricus carneus. Bolt. Fung. tab. 146.

Il est petit. Son pédicule est perpendiculaire, long de trois ou quatre pouces, & autant de largeur, tomenteux, un peu excentrique, soutenant un chapeau qui devient plane, large d'un pouce & plus, légèrement subéreux, de couleur livide; les lames distinctes, presques décurrentes; elles deviennent ensuite flexueuses. Il croît sur le tronc des arbres.

488. *AGARIC toruleux. Agaricus torulosus. Perf.*

Agaricus carneo-suberosus, pileo infundibuliformi, margine revoluta, subobliquo, fulvo, carneo; lamellis longe decurrentibus; stipite brevi, griseo-tomentoso. Perf. Synopf. 475.

Agaricus griseo-tomentosus. Batfch. Elem. Fung. fig. 33.

Son pédicule est court, épais, bulbeux à sa base, couvert d'un duver grisâtre; son chapeau convexe, puis concave, en entonnoir, un peu oblique & roulé à ses bords, presque toruleux; sa substance charnue, presque subéreuse; sa couleur incarnate ou sauve, parsemée de taches très-pâles; les lames longuement décurrentes. Il croît sur le tronc des arbres.

489. *AGARIC inconstant. Agaricus inconstans. Perf.*

Agaricus majusculus, pileo subtenaci, depresso, integro aut dimidiato, lobato, flexuoso, subrescescente; lamellis subramosis, basi crispis, albis subrutisque. Perf. Comment. pag. 17. & Synopf. 475.

Agaricus flabelliformis. Schæff. Fung. tab. 43 & 44.

Agaricus (dimidiatus), pileo cochleariformi, margine sinuato, stipite laterali; lamellis flavescenscentibus; in peridium decurrentibus. Bull. Herb. tab. 503 & tab. 517. — Decand. Synopf. n°. 364. Sub agarico inconstanti.

8. *Agaricus (conchatus), totus flavescens, pileo subinfundibuliformi, lamellis simplicibus. Bulliard, Herb. tab. 298. — Perf. l. c. 476. var. 8.*

Sa couleur est blanche, brune ou jaunâtre; sa chair un peu mollassé; son pédicule plein, presque cylindrique, arqué, variable dans sa longueur, continu avec le chapeau & inséré sur son bord. Ce chapeau est mince, comprimé, quelquefois parsemé de quelques petites écailles, ayant souvent la forme d'une coquille, large de huit à dix pouces & plus, irrégulièrement lobé ou sinué à son bord; les lames inégales, nombreuses, décurrentes sur le pédicule, de couleur jaune. Il croît

sur le tronc des arbres vivans. (Voyez, pour la variété 8, MERULE, n°. 10.)

490. *AGARIC denté. Agaricus dentatus. Perf.*

Agaricus gregarius, pileo peltato, umbilicato, integro, ut plurimum dimidiato, rufescente-pallido; lamellis dentatis, albidis; stipite sulcato, rufo. Perf. Dispos. Fung. pag. 22. & Synopf. 476. — Abbild. Icon.

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Son pédicule est rouffette, filonné, latéral ou central; son chapeau en rondache, entier, ombiliqué, large de neuf lignes, d'un roux-pâle; les lames blanchâtres & dentées. Il croît sur le tronc des pins.

491. *AGARIC glanduleux. Agaricus glandulosus. Bull.*

Agaricus subfissilis, badius, lamellis candidis, decurrentibus, ad latera glandulosus. Bull. Herb. tab. 426. — Perf. Synopf. 476.

Cet agaric est remarquable par ses lames larges, blanches, inégales, décurrentes, munies de houppes glanduleuses & velues, répandues çà & là sur leur surface. Son chapeau est fissile ou rétréci à sa base en un pédicule fort court, épais, latéral. Ce chapeau est de couleur brune plus ou moins foncée, large de six à sept pouces, lisse en dessus, d'abord hémisphérique, rabattu & arrondi à ses bords, qui deviennent ensuite presque planes & sinueux. Il croît en automne & en hiver, dans les bois, sur les arbres & les souches pourries. (Voy. MERULE, n°. 9.)

492. *AGARIC en huître. Agaricus ostreatus. Perf.*

Agaricus subspitatus, fasciculato-imbricatus, pileo convexo, cinereo aut fuscescente obovato; lamellis albidis, decurrentibus, basi subanastomosantibus. Perf. Synopf. 477. — Curtis, Flor. lond. tab. 216. — Jacq. Flor. austr. 3. tab. 188.

8. *Agaricus (atro-albus), cespitosus, pileo carnoso, convexo-plano; margine revoluta, nigrescente; lamellis venoso-decurrentibus, candidis; stipite laterali, brevi, albo-nigrescente. Perf. l. c.*

Agaricus albus. Flor. dan. tab. 892.

Agaricus ostreatus. Sowetb. Fung. tab. 241. ?

7. *Agaricus (flavo-cinereus), pileo carnoso, subdimidiato, convexo, cinereo-subrufescente; lamellis flavo-vittellinis, latere albidis. Perf. l. c. 478.*

Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente, dont elle n'est peut-être, selon M. Persoon, qu'une variété. Elle croît sur le tronc des arbres; par groupes presque imbriqués. Son chapeau est à

peine pédiculé, épais, convexe, presqu'orbiculaire ou ovale, réfléchi à ses bords, de couleur brune ou cendrée; les lames blanchâtres, décurren-tes, presqu'anastomosées à leur base.

Dans la variété β , le pédicule est court, latéral, mélangé de blanc & de noir; le chapeau charnu, convexe, puis plane, de couleur un peu violette, puis noire; les bords noirs & roulés; les lames blanches, veinées, décurren-tes.

La variété γ est peut-être une espèce distincte. Son pédicule est court, latéral, épais d'un pouce; son chapeau compacte, convexe, d'abord cendré, puis un peu roussâtre; les lames d'un jaune-clair, blanches à leurs côtés. Il croît sur le tronc des chênes.

493. AGARIC des druides. *Agaricus dryinus*. Pers.

Agaricus solitarius, pileo compacto, subobliquo, albedo; squamis sparsis, obsoletis; lamellis subsistentibus, stipite obsoleto squamuloso. Pers. Comm. pag. 96, & Synopf. 478. — Schœff. Fung. tab. 233.

Son pédicule est dur, court, horizontal; son chapeau compacte, presqu'entier, surtout dans sa première jeunesse, puis oblique, blanchâtre, parsemé, ainsi que le pédicule, de quelques pelu-chures épar-ses; les lames médiocrement distantes. Il croît sur le tronc des chênes.

494. AGARIC des saules. *Agaricus salignus*. Pers.

Agaricus magnus, subsimplex, horizontalis, pileo lato, convexo; stipite laterali, albo, tomentoso. Pers. Synopf. 478.

α . *Agaricus (ochraceus), totus ochraceus*. Abbild. Icon.

β . *Agaricus (fuliginosus), totus fuliginosus*. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 45.

Ces deux variétés ne diffèrent que par leur cou-leur, d'un jaune d'ocre dans la première, d'un noir-ensumé dans la seconde. Leur pédicule est latéral, blanchâtre, tomenteux, tenace, un peu recourbé; le chapeau convexe, déprimé & strié à sa base, large de quatre pouces, garni de lames décurren-tes sur le pédicule, un peu rameuses, blanches ou cendrées. Il croît sur les saules, vers la fin de l'automne.

495. AGARIC tardif. *Agaricus serotinus*. Pers.

Agaricus imbricatus, pileo carnoso, compacto, olivaceo; lamellis confertis, subramosis, pallidis aut lutescentibus; stipite flavido, squamulis nigrescentibus. Persoon, Synopf. 479, & Comment. pag. 101. — Abbild. Icon.

Son pédicule est jaunâtre, parsemé d'écaillés noi-râtres; son chapeau charnu, compacte, humide, presque visqueux, d'un vert d'olive, réfléchi à ses bords; les lames nombreuses, pâles ou jaunâtres, quelques-unes rameuses. Il croît à la fin de l'au-tomne, sur le tronc des hêtres & des aulnes.

496. AGARIC en éventail. *Agaricus flabelliformis*. Pers.

Agaricus substipitatus, pileo planiusculo, lacero, multiformi, cervino, margine crinato; lamellis trifidis, palliatis, sulcatis; stipite brevi aut nullo. Pers. Synopf. 479. — Bolton. Fung. tab. 157.

Il n'a presque point de pédicule ou n'en a qu'un très-court. Son chapeau est glabre, convexe, puis plane, de couleur fauve, irrégulièrement déchiré & crénelé à ses bords, large de deux ou trois pou-ces; les lames un peu larges, pâles, trifides, un peu crénelées. Il croît sur le tronc des arbres.

497. AGARIC spatulé. *Agaricus spatulatus*. Pers.

Agaricus erectus, spatuliformis, pileo alutaceo-pallido; disco spongioso, squamuloso; stipite canaliculato, perpendiculari. Pers. Synopf. 479.

Agaricus anomalus. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 55, tab. 4. fig. 1.

β . ? *Agaricus (petaloides), erectus, pileo exsiccato albedo, disco farinoso; stipite marginali, semicylin-drico, supra canaliculato*. Bull. Herb. tab. 226 & 557. fig. 2.

Son pédicule est tomenteux, perpendiculaire, canaliculé; son chapeau cannelé, d'un jaune-pâle, étalé en forme d'éventail, réfléchi à ses bords, spongieux & légèrement peluché à son disque; les lames décurren-tes. Il croît sur la terre, à l'ombre, dans les forêts. Le pédicule est glabre dans la va-riété β . (Foyez MÉRULE, n°. 11.)

498. AGARIC plane. *Agaricus planus*. Pers.

Agaricus dimidiatus, imbricatus, ex albedo-rubef-cens seu aquato cinnamomeus, lamellis confertis; stipite brevi, albo-tomentoso. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 8, & Synopf. 480.

Il est d'une consistance fragile, un peu compacte. Son pédicule est court, tomenteux & blanchâtre; son chapeau plane, latéral, d'un blanc un peu rou-géâtre ou de couleur canelle très-claire, large d'un pouce; les lames nombreuses, larges d'une ligne. Il croît par groupes imbriqués, sur le tronc pourri des arbres.

499. AGARIC étendu. *Agaricus porrigens*. Pers.

Agaricus imbricatus, candidus, pileo plano, gla-berrimo; basi compressa, angustata, porrecta; lamellis

longè decurrentibus. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 54, & Synopf. 480.

Agaricus abietinus. Schrad. Spicil. pag. 132.

Il est entièrement blanc, d'une consistance mince, un peu humide. Son chapeau est plane, très-glabre, comprimé, étalé & rétréci en forme de pédicule à sa base, large de deux pouces. Ses lames sont longuement décourantes. Il croît sur le tronc des sapins.

500. AGARIC gélatineux. *Agaricus gelatinosus*.

Agaricus (mollis), *gregarius*, *mollis*, *pileo glabro*, *gibboso*, *pallido*; *lamellis aquosè cinnamomeis*. Pers. Synopf. 480, & Comm. pag. 88. — Schœff. Fung. tab. 213. — Sowerb. Fung. tab. 98.

Son chapeau est un peu gélatineux, convexe, légèrement flexueux, glabre, en bosse, de couleur pâle, rouffâtre, pulvérulent à sa base, large d'un pouce ou d'un pouce & demi; les lames d'une couleur canelle très-claire. Il croît en automne, sur les troncs catiés.

501. AGARIC styptique. *Agaricus stypticus*. Bull.

Agaricus castiposus, *pileo subcoriaco*, *emarginato*, *alutaceo*; *stipite compresso*, *ascendente*; *apice dilatato*. Bull. Herb. tab. 140, & tab. 557. fig. 1. — Pers. Synopf. 481, & Observ. Mycol. 1. pag. 52. — Sowerb. Fung. tab. 109.

Agaricus semipictolotus. Schœff. Fung. tab. 208.?

?. *Agaricus* (gramineus), *lamellis rubris*, *pileo stipiteque brevi*, *cornosis*, *olvis*. Flot. dan. tab. 832.

Cet agaric est d'une saveur si âcre, qu'il saisisse fortement à la gorge par une sorte d'étranglement lorsqu'on le mâche; il est d'une couleur canelle plus ou moins foncée, d'une consistance molle. Son pédicule est plein, un peu comprimé, long de six à huit lignes, élargi vers son sommet, continu avec le chapeau. Celui-ci est légèrement coriace, hémisphérique, arrondi & prolongé à ses deux extrémités, un peu échancré & roulé en dessous à ses bords, large d'un pouce & demi, garni de lames étroites, entières, routes égales. Il croît en groupes sur les troncs d'arbres, dans les bois, en hiver & en automne. La plante se ressemble à la précédente par sa forme; mais ses lames sont rouges, son chapeau & son pédicule blancs. Elle croît sur les gazons, en Danemarck. (Voyez MÉRIER, n°. 6.)

502. AGARIC doux. *Agaricus miis*. Pers.

Agaricus gregarius, *totus condidus*, *pileo subcar-noso*, *glabro*, *levi*; *lamellis simplicibus*, *stipite horizontali*, *apice dilatato*. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 54. tab. 5. fig. 3, & Synopf. 481.

Sa couleur est blanche; son chapeau médiocre-

ment charnu, lisse, glabre, garni de lames très-simples; le pédicule horizontal, dilaté à son sommet. Il croît par groupes sur les rameaux du pinus loric.

503. AGARIC niché. *Agaricus nidulans*. Pers.

Agaricus gregarius, *pileo dimidiato*, *reniformi*, *primò resupinato*, *tomentoso*, *flavo*; *lamellis confertis*, & *croceò demùm cinnamomeis*. Pers. Icon. & Descript. Fung. pag. 19. tab. 81. fig. 4, & Synopf. 481.

Cet agaric est sessile, entièrement couché dans sa première jeunesse, & adhère aux troncs par un duvet épais. Son chapeau est tronqué, réniforme, large d'un pouce & plus, jaunâtre, garni de lames nombreuses, d'abord couleur de lafran, puis d'un jaune-cannelle. Il croît sur le tronc des sapins.

504. AGARIC bisse. *Agaricus bisfidus*. Pers.

Agaricus pileo suborbiculati, *hirsilloso*, *fuligineo-canefcente*; *lamellis incarnato-fuliginis*; *stipite brevissimo*, *lateralis*; *radiculis bisfoideis*, *albis*. Pers. Icon. & Descript. Fung. pag. 56. tab. 14. fig. 2, & Synopf. pag. 482.

Son pédicule est très-court, long de deux lignes, latéral, muni de petites racines blanches, femblables aux filaments d'un bisfil; le chapeau presque orbiculaire, blanchâtre, légèrement ombilique, d'abord entier, puis fragile, couleur de bistre-clair; les lames un peu arquées, incarnates, entières, décourantes sur le pédicule. Il croît sur les troncs, dans les lieux ombragés.

505. AGARIC violet-jaune. *Agaricus fulvens*. Batfeh.

Agaricus pileo dimidiato, *membranaceo*, *violaceo-fulvo*; *lamellis concoloribus*. Batfeh. Elem. Fung. pag. 95. tab. 9. fig. 39. — Pers. Synopf. pag. 483.

Son chapeau a une forme demi-orbiculaire; il est membraneux, tomenteux en dessus, d'un violet un peu jaunâtre, garni de lames convexes, de même couleur que le chapeau. Il croît sur les pourres humides.

506. AGARIC variable. *Agaricus variabilis*. Pers.

Agaricus (sessilis), *sessilis* aut *centro stipitatus*, *luteus*, *pileo subglabro*, *succo*; *lamellis tenuibus*, *ferrugineis*, *inaequalibus*. Bull. Herb. tab. 152, & tab. 581. fig. 3.

a. *Agaricus* (variabilis), *gregarius*, *aculeis*, *pileo suotomentoso*, *canaiis*; *lamellis ex albo*, *demùm rubiginosis*. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 45. tab. 5. fig. 12, & Synopf. 483.

Agaricus mutabilis. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 15.

Agaricus niveus. Swartz. Fung. tab. 57.

Agaricus pubescens. Flor. dan. tab. 1073. ?

1. *Agaricus pedicula centrali donatus*. Pers. Obs. Mycol. 2. tab. 5. fig. 12.

2. *Agaricus (sinuatus), pileo membranaceo, repando-sinuato, subtomentoso-albido; lamellis spadicis, medio latissimis*. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 46.

Cet agaric est très-variable; il est assez généralement dépourvu de pédicule. Néanmoins, M. Persoon a remarqué que, dans sa jeunesse, il étoit muni quelquefois d'un pédicule court. Son chapeau est attaché par le bord, d'un blanc de lait, sec, glabre ou un peu tomenteux, peu charnu, large de six ou huit lignes, d'abord arrondi, puis irrégulier & sinué à ses bords, garni de lames larges, minces, nombreuses, inégales, couleur de rouille ou de canelle; les lames entières, moins nombreuses, amincies à leurs deux extrémités. Il croît par groupes, en été, dans les bois, sur les branches mortes, &c. même sur la terre. (Voyez MÉRULE, n°. 7.)

507. AGARIC à racines réticulées. *Agaricus dyctiorrhizus*. Decand.

Agaricus pileo subsessili, candido, semiorbiculari; margine sinuato, basi fibrilloso; radicibus tomentosis, albis, reiformibus; lamellis inaequalibus, pileo concoloribus. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 28.

Il est presque sessile, muni de petites racines blanches, fibreuses, tomenteuses, étalées en forme de réseau. Son chapeau est blanc, à demi-orbiculaire, sinué à ses bords, garni de lames inégales, de même couleur que le chapeau. Il croît dans l'argile humide.

508. AGARIC des ornieres. *Agaricus epigeus*.

Agaricus pileo reniformi, fragili, rufescente-cano, basi villosa, albido; lamellis distinctis, aequalibus, divergentibus. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 47. & Synopf. 484.

Agaricus depluens. Batfch. Elem. Fung. pag. 167. fig. 122.

1. *Agaricus (trophomelus), gregarius, subterrestris, cinerascens, pileo stipiteque tereti-tomentoso*. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 47. & Synopf. l. c.

2. *Agaricus (glaucus), griseus, subsupercatus, pileo sericeo, stipite albentiori, pruinato, brevi, laterali, &c.* Batfch. l. c. pag. 169. fig. 223.

3. *Agaricus tremulus*. Schæff. Fung. pag. 53. tab. 124.

4. *Agaricus (planus), acaulis, erectus, planus, lamellis trifidis, lanceolatis*. Bolt. Fung. pag. 73. tab. 71. fig. 3.

Ce champignon n'est pas moins variable que l'*Agaricus variabilis*. Son pédicule est très-court, presque nul, velu & blanchâtre. Le chapeau est fragile, latéral, réniforme, roufféâtre, un peu cotonneux; les lames distinctes, divergentes, d'un jaune-clair. Il est de couleur cendrée dans la variété 1, glauque & grisâtre, un peu soyeux dans la variété 2; plane, redressée, sessile, à lames trifides, lancéolées dans la variété 3; il croît par groupes sur la terre, dans les ornieres, au milieu des bois. La variété 4 croît parmi les moules, sur les troncs pourris.

509. AGARIC à petites stries. *Agaricus striatulus*. Pers.

Agaricus subfoliarius, glaber, dilute cinereus, pileo sessili, pellucidis, striato. Pers. Synopf. 485.

Agaricus striato-pellucidus. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 48.

Son chapeau est sessile, transparent, finement strié, convexe, large de trois ou quatre lignes, glabre, d'une couleur claire, cendrée. Il croît presque solitaire, sur le tronc des pins.

510. AGARIC des troncs. *Agaricus epyrion*. Bull.

Agaricus subsessilis, ex caruleo-ardeus, lamellis inaequalibus, distinctissimis, primò purpurascens, tandem nigris. Bull. Herb. tab. 581. fig. 2.

Agaricus applicatus. Batfch. Elem. Fung. 2. tab. 24. fig. 125.

1. *Agaricus centro adfixus*. Bull. l. c. fig. K. Q.

Son chapeau est sessile, latéral, arrondi, d'un bleu d'ardoise en dessus, large de sept lignes, garni en dessous de lames d'abord rougeâtres, puis noirâtres, inégales, distinctes, foliacées. Il s'évase quelquefois en rour sens également, &c. alors il est attaché par le centre, & porte les lames en dessus. Il croît sur les troncs coupés.

511. AGARIC de l'aune. *Agaricus alneus*. Linn.

Agaricus subsessilis, subcoriaceus, albo-griseus, lamellis fissis, margine revolutis, subpurpurascens cinereis; pileo saepe multifido. Bull. Herb. tab. 346. & tab. 581. — Pers. Synopf. pag. 485.

Agaricus (alneus), acaulis, lamellis bifidis, pulverulentis. Linn. Spec. Plant. 1645. — Sowerb. tab. 183.

Agaricus multifidus. Batfch. Elem. Fung. fig. 126. — Vaill. Botan. Pacif. tab. 10. fig. 7. — Schæff. Fung. tab. 256.

Ce champignon se présente d'abord sous la forme d'une petite coupe sessile ou un peu pédonculée, régulière, arrondie; elle s'évase ensuite

d'un côté en forme de chapeau, devient hémisphérique, puis plus ou moins profondément ou régulièrement lobé, roulé en dessous à ses bords dans la jeunesse; ensuite plane, coriace, mince, sec, large de deux à quatre pouces, horizontal, d'un blanc-falé, un peu jaunâtre, couvert, dans la jeunesse, d'un duvet blanc ou grisâtre, zôné, garni de lames épaisses, étroites, rougeâtres, canaliculées, ramifiées à leur sommet. Il croît en hiver & au printemps, sur tous les bois, mais particulièrement sur l'aune. (Voyez MÉRULE, n°. 4.)

512. AGARIC à duvet toux. *Agaricus rufo-velutinus*. Decand.

Agaricus sessilis, subcapitatus, rufescens, pileo tomentoso, coriaceo-mollifusculo; lamellis parum numerosis, concoloribus. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 27. n°. 357.

Son chapeau est d'une consistance coriace, un peu molle. Sa forme est arrondie, convexe. Il est sessile, attaché par le côté, couvert d'un duvet mou, épais, cotonneux, d'un roux-carmélite; les feuillets à peu près de la même couleur, peu nombreux, continus avec le chapeau, entiers ou interrompus, quelquefois un peu réunis par la base. Cet agaric a été trouvé dans les caves de l'Observatoire, par M. LÉMAN. Il naît par groupes de deux ou trois individus, réunis par une espèce de prolongement membraneux & cotonneux, qui s'étend sur la poutre à laquelle il adhère. (Decandole.)

513. AGARIC du sapin. *Agaricus abietinus*. Bull.

Agaricus sessilis, coriaceus, fuligineo-umbrinus, subcapitatus, pileo brevi, lato, crasso. Bull. Herb. tab. 442. fig. 2, & 541. fig. 1. — Pers. Synopf. pag. 486.

Agaricus affeculorum. Schrad. Spicil. pag. 134.

Il est parfaitement sessile, coriace, d'un roux-brun; son chapeau cotonneux dans la jeunesse, court, large, épais, marqué quelquefois d'une zone transversale, garnie de lames inégales, irrégulières, nombreuses, continues avec le chapeau. Elle le trouve entre les fentes des troncs de sapins.

514. AGARIC de diverses couleurs. *Agaricus versicolor*.

Agaricus pileo suberoso, coriaceo, tomentoso, fusco, griseoque fasciato; lamellis albis, redivis. Planter. Fung. Erfurt. pag. 4. — Persoon, Synopf. pag. 486.

Il a le port du *boletus versicolor*. Son chapeau est coriace, lubéreux, tomentueux, marqué de bandes brunes & grisâtres. Les lames sont simples, pap-

racées, droites, blanches. Il croît dans les environs d'Erfurt.

515. AGARIC coriace. *Agaricus coriaceus*. Bull.

Agaricus sessilis, pallidus, conatus, tomentosus, tonis concentricis, nigris. Bull. Herb. tab. 594, & tab. 587. — Persoon, Synopf. 486. — Bolton, Fung. tab. 158. — Lam. Ill. tab. 883. fig. 1.

Agaricus betulinus. Soweb. Fung. tab. 182. ?

An merulius umbrinus? Persoon, Disf. Fung. pag. 26. ?

Il est d'une consistance sèche & coriace, sans pédicule, attaché par ses bords, lobé ou sinueux, large de trois à quatre pouces, cotonneux, d'un jaune-pâle, marqué de zones noires, concentriques, muni de lames épaisses, sinueuses, blanchâtres, puis jaunâtres, anastomosées dans leur jeunesse, puis distinctes & simples. Il croît pendant toute l'année, sur les vieilles souches, dans les bois. (Voyez MÉRULE, n°. 3.)

516. AGARIC tricolor. *Agaricus tricolor*. Bull.

Agaricus sessilis, coriaceus, versicolor, lamellis sinuatis, dichotomis; pileo reniformi, supra tomentoso. Bull. Herb. tab. 541. fig. 2.

Agaricus sepiarius. Var. β . Pers. Synopf. 487.

Sa consistance est coriace; son chapeau sessile, attaché par le côté, réniforme, sinueux, arrondi, tomentueux en dessus; muni de zones concentriques, assez régulières, rouges, jaunes & noires; garni de lames nombreuses, égales, d'un jaune-falé, à dentelures aiguës, prolongées. Il croît sur le tronc du bouleau blanc.

517. AGARIC des haies. *Agaricus sepiarius*. Pers.

Agaricus coriaceus, durus, utrinque planus, pileo strigoso, tomentoso, spadiceo; lamellis confertis, ramosis, lutescentibus. Pers. Synopf. pag. 487.

Merulius sepiarius. Persoon, Observ. Mycol. 2. pag. 93.

Agaricus hirsutus. Schreiff. Fung. tab. 76. — Vaill. Paris. tab. 1. fig. 1. 2.

Agaricus affeculorum. Batfch. Elem. Fung. pag. 91.

Cette espèce, qui a beaucoup de rapports avec la précédente, devient, ainsi que la suivante, intermédiaire entre les agarics & les mérules, & sert de passage de l'un à l'autre genre. Son chapeau est sessile, dur, coriace, plane à ses deux faces, ridé, tomentueux, d'un jaune-pâle, garni en dessous de lames nombreuses, jaunâtres, ramifiées, anastomosées; les anastomoses si fré-

quénres & si serrées, qu'elles offrent comme de larges pores.

Cet agaric croît le long des haies, sur les bois & sur le tronc des pins.

518. AGARIC de chêne. *Agaricus quercinus*. Linn.

Agaricus sessilis, dimidiatus, coriaceus, crassus, fuferosus, ligneo-pallens, lamellis ramoso sinuatis; fœulis magnis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 133. — Linn. Syst. veget. pag. 797. — Vaill. Paril. tab. 1. fig. 3.?

Dadalea quercina. Pers. Synop. pag. 500.

Merulius quercinus. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 1431.

Agaricus labyrinthiformis. Bull. Herb. tab. 352, & tab. 442. fig. 1.

Cette plante est un Prorée, qui n'a aucune forme constante; elle s'étend en larges plaques sur le bois, auquel elle adhère presque entièrement par sa face supérieure, de sorte qu'on ne voit à l'extérieur que la surface poreuse. Ces pores sont larges, sinueux & anastomosés, & cette plante, selon ses développemens, pourroit être prise, tantôt pour un bolet, tantôt pour un agaric. Sa consistance est subéreuse; sa couleur d'un roux-pâle. Elle croît sur les vieux bois de charpente & sur le tronc des arbres. Celles qui croissent sur le sapin sont toutes noires. (Voyez MÉRULE, n°. 1 & 2.)

AGATHOMERIS. Agarhoméride. (Delaun. Bon Jard.) (Voyez CALOMERIA. Suppl. & Vent. Malm. tab. 73.)

AGATI, AGATY. Rheed. Malab. 1. pag. 85. tab. 51. (Voyez SERBANE, n°. 1.)

M. Adanson en a fait un nom générique: c'est une espèce d'*afchinomene* Linn., qui l'avoit d'abord considérée comme devant appartenir aux *robiniæ*.

AGATOPHYLLUM. (Voyez RAVENSERA.)

AGAVE. Ce genre, très-rapproché des aloës, en diffère par l'ovaire adhérent avec la corolle, & par ses étamines saillantes. Il tire son nom d'un mot grec qui signifie admirable. Ces plantes, en effet, sont d'une grande beauté, & quelques espèces répandent une odeur très-suave. Nous avons peu de choses à ajouter à ce genre, sinon les phrases qui doivent en distinguer les espèces. Nous remarquerons cependant que M. Ventenar a cru devoir séparer de ce genre quelques espèces dont il a composé un nouveau genre dédié à

M. Fourcroy, sous le nom de *furcraea*. Nous les ferons connoître à la fin de ce genre, duquel elles ne pouvoient pas être séparées.

ESPÈCES.

1. AGAVE d'Amérique. *Agave americana*. Linn.

Agave acaulis, foliis dentato-spinosis; scapo ramoso; tubo corollæ medio angustato; flaminibus corollæ longioribus; stylo flaminibus longiore. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 192.

2. *Agave (variegata), foliorum margine luteo.* (Voyez AGAVE, n°. 1.)

La variété 2 est remarquable par ses feuilles panachées, ou plutôt bordées de jaune; ce qui produit un effet très-agréable.

2. AGAVE vivipare. *Agave vivipara*. Linn.

Agave acaulis, foliis dentato-spinosis; scapo ramoso; tubo corollæ medio angustato; flaminibus corollæ æquantibus. Willd. l. c. pag. 191. — Lam. Ill. tab. 235. fig. 1. (Voyez AGAVE, n°. 3.)

3. AGAVE de Virginie. *Agave virginica*. Linn.

Agave acaulis, herbacea, foliis carilagineo-seratis, scapo simplicissimo. Willd. l. c. pag. 193. — Lam. Ill. tab. 235. fig. 2. — Jacq. Ic. rar. 2. tab. 378. (Voyez AGAVE, n°. 4.)

4. AGAVE à fleurs vertes. *Agave lurida*.

Agave subcaulescens, foliis dentato-spinosis; scapo ramoso; flaminibus corollæ cylindricæ longioribus; stylo flaminibus brevioribus. Willd. Spec. l. c. p. 193. — Air. Hort. Kew. 1. pag. 472. — Jacq. Collect. 4. pag. 94. tab. 11.

a. *Eadem, foliis latioribus.* *Agave Vera-Cruz.* Mill. Dict.

b. *Eadem, foliis angustioribus.*

Rapprochée de l'agave d'Amérique, elle en diffère par sa corolle verte & non jaune, cylindrique, & non serrée à son milieu par un commencement de riges. Le style est plus court que les étamines, saillantes hors de la corolle; les feuilles garnies à leurs bords de dents épineuses ou larges ou plus étroites. Elle croît dans l'Amérique méridionale.

5. AGAVE tubéreuse. *Agave tuberosa*. Mill.

Agave caulescens, foliis dentato-spinosis, radice tuberosa. Miller, Dict. n°. 4.

Agave, n. spinis foliatis, p. spinis duplicibus. (Voyez AGAVE, n°. 6.)

Ses feuilles sont fort longues, étroites, munies à leurs bords d'épines tantôt simples, tantôt doubles.

* FURCRAEA.

Les espèces suivantes sont très-rapprochées des autres par leur port ; elles en diffèrent si peu, que nous ne croyons pas qu'on puisse admettre le genre que M. Ventenat a établi pour elles, & auquel il donne les caractères suivans :

Une corolle campanulée, à six découpures, adhérente à l'ovaire par sa partie inférieure ; les filamens insérés sur une glande, épaissis à l'extérieur, comprimés, subulés ; une capsule inférieure, à trois loges, à trois valves ; plusieurs semences.

6. AGAVE fétide. *Agave fetida*. Linn.

Agave (furcra gigantea), *caulescens*, *foliis integerrimis*. Linn. — Vent. Bull. philom. n°. 28. — Decand. Plant. graff. Icon. — Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 339. (Voyez AGAVE, n°. 5.)

Ses fleurs sont disposées en une ample panicule rameuse, étalée. La corolle est d'un blanc-verdâtre.

7. AGAVE du Mexique. *Agave mexicana*. Lam.

Agave (furcra odorata), *acutis*, *foliis ciliatopinnatis*, *corollis hexapetalis*. Persf. Synopf.

Agave cubensis. Jacq. Amer. (Voyez AGAVE, n°. 1.)

« Cette plante, dit M. Mirbel, est le *maguy* des Mexicains ; elle fournit une boisson à laquelle les Indiens ont donné le nom de *palque*. Les diverses parties de cette plante ont chacune leur utilité. Selon Raynal, les racines servent à faire des cordes ; les tiges donnent du bois ; les épines sont des clous ou des aiguilles ; les feuilles sont bonnes pour couvrir les toits. On les fait aussi roir, & l'on en retire un fil propre à fabriquer divers tissus. Mais ce qui fait du *maguy* un végétal vraiment précieux pour les Mexicains, c'est l'eau douce & transparente qu'il distille lorsqu'on en a arraché les feuilles intérieures. La flossette formée au centre des feuilles se remplit de la liqueur, que l'on recueille chaque jour, & qui chaque jour se renouvelle pendant un an ou dix-huit mois. En s'épaississant, elle se convertit en sucre. Mêlée avec de l'eau de fontaine, elle acquiert, après quatre ou cinq jours de fermentation, le piquant & le goût du cidre ; & si l'on y ajoute de l'écorce d'orange ou de citrou, elle devient enivrante. Les Mexicains ont un si grand penchant pour cette boisson, qu'ils s'en procurent aux dépens de la subsistance & même des vêtemens de leur famille. »

AGÉRATE. *Ageratum*. Les deux espèces décrites par M. de Lamarck ne sont point celles de Linné ; elles doivent être rappelées ici avec leur caractère spécifique.

Botanique. Supplément. Tome I.

1. AGÉRATE fausse conize. *Ageratum conyzoides*. Linn.

Ageratum foliis ovatis, *subcordatis*, *obtusis*, *crenatis* ; *caule subpiloso*, *ramis interdum procumbentibus*. (N.) Lam. Illustr. tab. 672. fig. 1.

Ageratum foliis ovatis, *caule piloso*. Linn. Spec. Plant. pag. 1175. — Swartz, Obsev. pag. 301. — Griseb. de Fruct. & Sem. tab. 175.

Eupatorium humile, *africanum*, *senecionis facie*, *folio lamii*. Pluken. Phyt. tab. 88. fig. 1. — Herzm. Parad. tab. 161.

Conyza urtica folio. Sloan, Jam. 1. 218. tab. 152. fig. 2.

Ses tiges se divisent très-souvent, dès leur base, en rameaux étalés, quelquefois couchés, très-légèrement pileux ou glabres, presque cylindriques, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, à peine pileuses, principalement sur les pétioles, obtuses, à crénelures également obtuses, élargies, entières à leur base ; les fleurs légèrement bleuâtres, quelquefois blanches, en bouquets globuleux, axillaires, opposés. Leur réceptacle est nu, ovale ; les semences glabres, anguleuses, noires, surmontées d'une aigrette à cinq paillettes membraneuses, lancéolées, subulées & dentées.

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes. O (V. v.)

2. AGÉRATE à larges feuilles. *Ageratum latifolium*. Cavan.

Ageratum foliis ovatis, *basi cuneatis* ; *caule piloso* ; *pappi lanceolatis*, *acutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1774.

* *Ageratum foliis subrotundis*, *serratis*, *pappi foliolis*, *semine brevioribus*. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 33. tab. 357.

Elle a beaucoup de rapport avec la précédente ; elle en diffère par ses feuilles presque rondes, très-obtuses, rétrécies en coin à leur base, dentées en scie à leur contour ; les tiges pileuses ; les semences couronnées par des paillettes lancéolées, aiguës, à peine de la longueur des semences, point ciliées ni denticulées. Elle croit au Pérou, aux environs de Lima. O

3. AGÉRATE bleu. *Ageratum caruleum*. Hort. Patif.

Ageratum caule erecto, *hirsuto*, *basi subcylindrico* ; *foliis lato-ovatis*, *crenato-dentatis*, *subpilosis* ; *pappi aristatis*, *denticulatis*. (N.)

II h

Ageratum obtusifolium. Lam. Dict. 1. pag. 54.

Cette espèce ressemble à l'*Ageratum conyzoides* par le caractère de ses semences. Ses fleurs sont plus nombreuses, d'un bleu plus vif; ses tiges droites, plus élevées, presque tétragones à leur base, hérissées de poils courts; les feuilles plus larges, dentées ou crénelées irrégulièrement à leurs bords, obtuses, légèrement pileuses à leurs deux faces, très-hérissées sur les pétioles, marquées de nervures blanchâtres & velues. (Voyez *AGERATE*, n°. 2.)

4. *AGERATE* hérissé. *Ageratum hirsutum*. Lam.

Ageratum caule hirsuto, foliis ovato-lanceolatis, acutis, hirsutis; pedunculis suffulcatis, folio multo longioribus. (N.) Lam. Illustr. tab. 672. fig. 2. (Voyez *AGERATE*, n°. 1.)

5. *AGERATE* cilié. *Ageratum ciliare*. Linn.

Ageratum foliis ovatis, crenatis, obtusis; caule glabro. Lam. Spec. Plant. pag. 1175.

Centaurium ciliare, minus, bisnagaricum, originis foliis amplioribus, floribus in umbellis. Pluk. Almag. pag. 93. tab. 81. fig. 4.

Quoique cette plante ne me soit pas connue, elle ne paraît pas cependant, d'après la phrase de Linné & la figure de Plukenet qu'il cite, devoir être la même espèce que l'*Ageratum caruleum*. Ses tiges, ainsi que ses feuilles, sont parfaitement glabres; les crénelures peu marquées, plus serrées, plus petites; les fleurs disposées en une sorte d'ombelle terminal. Elle croît dans les Indes, à Bishnagar.

6. *AGERATE* à corymbes. *Ageratum corymbosum*. Zuccagni.

Ageratum foliis ovato-lanceolatis, serratis; caule pubescente, suffruticoso. Petf. Synop. Plant. vol. 1. pag. 402.

Ageratum corymbosum. Zuccagni.

Elle a le port d'un *acynum*. Ses tiges sont droites, rameuses, presque ligneuses, fort élevées, pubescentes, de couleur pурpurine, garnies de feuilles ovales-lanceolées, dentées en scie. Les fleurs sont disposées en corymbe, de couleur bleue; les styles longs & saillans; les paillettes qui couronnent les semences, point aristées.

AGERATON. Cette plante, qu'on trouve mentionnée dans Dioscoride & Marthiole, plus connue sous le nom vulgaire d'*espacaire de Meslé*, est aujourd'hui l'*Achillaea ageratum* Linn. Tournefort l'avait placée dans son genre *ptarmica*; il s'en est servi du mot *ageratum* pour un autre genre que M. Adanson a conservé sous le même nom, & qui répond au genre *erianus* Linn.

AGERATUM. (Voyez *AGÉRATE*.)

AGERIA. Genre établi par M. Adanson, qui répond aux *erianus* Linn.

AGÉRITE. (Voyez *AGÉRITE*, Suppl.)

AGIHALID. *AGRAHALID*. On trouve sous ce nom, dans l'ouvrage de Pruspet Alpin sur les plantes d'Égypte, publiée en 1640, un petit arbre d'un aspect blanchâtre, garni de longues épines qui naissent au dessus des feuilles. Ce n'est-ci sont alternes, stipulées & conjuguées, c'est-à-dire, composées de deux folioles portées sur le même pétiole. Les fleurs, d'un blanc verdâtre, sont axillaires, au nombre de sept ou huit; elles ont, selon Lippi :

Un calice à cinq divisions profondes; cinq pétales; dix étamines; un ovaire supérieur, formant d'un style & d'un stigmate; une baie contenant une noix pentagone & monosperme.

Cette plante avoit d'abord été rapportée par Linné au genre *ximenia*; & ensuite il l'a supprimée sans la rapporter ailleurs. Elle paroit devoir constituer un genre distinct par son port, par le nombre de ses pétales & de ses étamines, & même, quand sa fructification sera mieux connue, elle sera sans doute reportée à une famille différente de celle du *ximenia*. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, où elle ne fleurit pas. Suivant Prosper Alpin, les feuilles, qui ont un goût aride, sont employées en Éthiopie comme vermifuge. Son fruit est purgatif, au rapport de Lippi, qui ajoute que cet arbre n'est abondant que dans le royaume de Senaar. (Juss.)

AGINEI. *Agnesia*. Le nom que Linné avoit imposé à ce genre, & qu'il avoit composé de deux mots grecs, annonçoit le caractère qu'il lui supposoit; savoir, d'avoir des fleurs femelles privées de style & de stigmate. L'observation faite par M. Ventenat en 1797, sur un individu qui a fleuri dans le jardin de Cels, a prouvé l'erreur de cette opinion. Ce savant a rétabli ainsi qu'il suit le caractère essentiel de ce genre, qui consiste en des fleurs monoïques.

Les fleurs mâles offrent :

Un calice persistant, à six découpures ouvertes, au dedans duquel est un disque divisé en six lobes; point de corolle; les étamines composées d'un pivot central, obtus, surmonté de trois anthers adnées à sa face intérieure, un peu au dessous de son sommet.

Les fleurs femelles offrent :

Un calice comme dans les fleurs mâles; point de corolle; un ovaire déprimé, ovale-arrondi, à six filons, muni d'une fessette centrale; trois styles aplatis, filloïdés, couchés sur la partie de l'ovaire déprimée,

n'excedant point ses bords, terminés chacun par deux stigmates réfléchis; une capsule suture sur le calice persistant, presque ovale, tranquille, à six dents au sommet, à trois loges ou coques; chaque loge s'ouvrant avec élasticité en deux valves qui se courbent, contenant deux semences oblongues, anguleuses.

E S P A C E S.

1. AGINEE glabre. *Agyneia impubis*. Linn.

Agyneia foliis ovato-subrotundis, obtusis, glabris; eoule diffuso. (N.) Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 568. — Vent. Hort. Cels. tab. 23. (Voyez AGINEE, n°. 1.)

Ses feuilles sont arrondies, assez semblables à celles de la nummulaire, à peine pétiolées, un peu épaisses, d'un vert-glauc, accompagnées de stipules courtes, ovales, terminées en pointe; les bractées assez semblables aux stipules.

2. AGINEE à feuilles ovales. *Agyneia ovata*.

Agyneia foliis ovatis, glaberrimis, utrinque obtusis; pedunculis axillaribus, unisporis. (N.) Lam. Illustr. tab. 797. fig. 2. Sub andrachne.

Cette plante, gravée d'après un individu pris dans l'herbier de M. de Lamarck, mais que nous n'avons pu retrouver, appartient aux *agyniea*. C'est par erreur qu'elle a été placée parmi les *andrachne*. La description que j'en donne ici est faite d'après la gravure. Ses tiges sont glabres, cylindriques, très-rameuses, garnies de feuilles alternes, à peine pétiolées, ovales, elliptiques, glabres, entières, obtuses à leurs deux extrémités, accompagnées de petites stipules aiguës. Les fleurs sont axillaires, presque solitaires, à peine pédonculées, fort petites. Les capsules sont composées de trois coques ovales, obtuses, environ deux fois plus longues que le calice persistant, un peu inclinées, une fois plus courtes que les feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

3. AGINEE pubescent. *Agyneia pubera*. Linn.

Agyneia foliis subrotundis, tomentosis. Linn. Mantiss. pag. 296. (Voyez AGINEE, n°. 1.)

4. AGINEE à feuilles obliques. *Agyneia obliqua*. Willd.

Agyneia foliis oblongis, acutis, inaequalibus, integerrimis, basi rotundatis, glabris, subius glauciflucibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 568.

Agyneia multilocularis. Rottler. in Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4. pag. 206.

Kaballa. Flot. zeylan. 629.

Ses tiges sont ligneuses; ses rameaux bruns, glabres, cylindriques, comprimés dans leur jeu-

neffe, garnis de feuilles alternes, oblongues, très-entières, longues de trois ou quatre pouces, glabres en dessus, glauques en dessous, arrondies & inégales à leur base, aiguës à leur sommet. Les pédoncules soutiennent trois & quatre fleurs, auxquels succèdent une capsule à cinq loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5

5. AGINEE à plusieurs loges. *Agyneia multilocularis*. Willd.

Agyneia foliis oblongo-lanceolatis, obtusis, basi attenuatis, integerrimis, subius glaucis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 568.

Agyneia multilocularis. Roxb.

Cette espèce, d'après Willdenow, diffère de la précédente par ses feuilles plus étroites, rétrécies & point inégales à leur base, oblongues-lanceolées, très-entières, glauques en dessous, longues de deux ou trois pouces, obtuses, mucronées à leur sommet. Les pédoncules font axillaires; ils supportent trois ou quatre fleurs. Les capsules font divisées en plusieurs loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5

AGLAEA. Pers. Synops. 1. pag. 46. (Voyez GLAYEUL graminé. Suppl.)

AGLAEA. Arbrisseau de la Cochinchine, décrit par Loureiro dans son *Flora cochinchinensis*; il en fait un genre particulier, auquel il attribue pour caractère essentiel :

Un calice d'une seule pièce, à cinq dents; cinq pétales; cinq étamines, dont les anthères sont placées à l'ouverture d'un tube formé par la réunion des filaments. Ce tube est attaché sous l'ovaire, formant par deux stigmates sessiles. Le fruit est une baie à quatre sillons, contenant une seule semence.

Ce genre paroît se rapprocher beaucoup des *marzaya* Linn., dont il ne diffère que par ses cinq étamines, peut-être aussi par ses fruits; il a également de grands rapports avec le *camulani* Rumph. Amb. 5. tab. 18. fig. 2.

Cet arbrisseau est remarquable par son élégance & par son agréable parfum. Ses tiges se divisent en rameaux étalés, foudroyés en d'autres plus nombreux, formant une tête large & touffue, garnie de feuilles ailées, composées de cinq folioles glabres, entières, luisantes, ovales-oblongues. Les fleurs sont jaunes, petites, odorantes, disposées en grappes axillaires; elles produisent des baies d'un beau rouge.

Cet arbrisseau est cultivé dans les jardins d'agrément, à la Chine & à la Cochinchine. 5

AGNANTHE. Cornutia. Ce genre a été con-

H h 2

sacré à Cornuti, botaniste français, par le Père Plumier. Vaillant le nomme *agnanthus* à cause de ses fl. us., approchant de celles de *Vegarus castus*. Son fruit est une baie à une seule semence : ce qui avait déterminé Jacquin à regarder comme un genre particulier, qu'il nomme *hoffs*, & Persoon *hoffsana*, le *Cornutia paniculata* de Willdenow & d'Aiton, dont le fruit consiste en un drupe à quatre semences, & dont la corolle est irrégulière, caractères qui peuvent confirmer le genre de Jacquin. Le *Cornutia corymbosa* décrit par M. de Lamarck a été placé ensuite par le même auteur parmi les *callicarpa*, dans ses *Illustrations*, sous le nom de *call. lanata*, n°. 1500 : d'où il suit qu'il ne reste, pour ce genre, que l'espèce suivante :

AGNANTHE à fleurs en grappes. *Cornutia pyramidata*, Linn.

Cornutia paniculata terminata, nuda, elongata. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 332. — Lam. Ill. tab. 541.

Agnanthus visburni folio. Vaill. Aët. Patif. 1720. pag. 273. (Voyez AGNANTHE, n°. 1.)

Ses fleurs sont d'un bleu assez gracieux, mais d'une odeur peu agréable ; elles paroissent plaire aux cochenilles des terres, qui les attaquent & les dévorent très-souvent.

AGNUS CASTUS : nom que l'on emploie souvent, même en français, pour désigner le *saxif. agnus castus* de Linné. (Voyez GATILIER, n°. 1.)

AGON ou AGAVON : nom provençal de la bugrane ou arête-de-bœuf (*Ononis* Linn.).

AGOURRE ou ANGURE DE LIN (*angina lini*) : nom ancien donné, suivant Dalechamp, à la cuscute, parce qu'elle étouffe & fait périr les tiges de lin lorsqu'elle s'y attache. On la nomme aussi *poutte de lin* (*podagra lini*). Dans les plantes usuelles de Chomel, elle y est encore sous le nom d'*angourre de lin*. (Voyez CUSCUTE.)

AGRA : bois de fenteur provenant de l'île de Hainan, voisine de la Chine ; il est estimé, & on le vend très-cher à Canton. (*Juss.*)

AGRAHALID. (Voyez AGHALID.)

AGRENAS : nom provençal du prunier sauvage, suivant Garidel. Le fruit se nomme *agreno*.

AGRETA. On nomme ainsi, à Montpellier, l'osille ronde des jardins (*rumea fuscata* Linn.).

AGREVOUX : nom languedocien du houx ordinaire.

AGRIMONIA. (Voyez AIGREMOINE.)

AGRIPAUME. *Leonurus*. Ce genre se distingue mieux par le port des espèces que par le caractère de ses fleurs, qui ne le sépare que faiblement des *phlomis*, & qui même n'est pas très-général ; ce qui a occasionné l'établissement de plusieurs autres genres, dont les caractères sont peu faillans. Muench range parmi les *cardiaca* les espèces qui ont les étamines velues & les ovaires surmontés d'une rosette de poils. Parmi les *choirous*, celles dont les étamines & les ovaires sont glabres ; enfin, parmi les *pungeria*, celles dont la lèvre inférieure, divisée en trois lobes, a le lobe du milieu échancré. Les véritables *Leonurus* conservent alors rigoureusement le caractère que Linné leur a assigné. On a ainsi fait rentrer dans ce genre des espèces placées dans d'autres, tel que le *galeopsis galeopetalon*, que Willdenow place parmi les *Leonurus*, & la *ballota lanata*, que M. Persoon rappelle parmi les *Leonurus*.

Sans prononcer sur ces réformes, nous dirons que lorsqu'on considère l'ensemble des espèces, leur port, l'affinité qu'elles ont entre elles, on est bien tenté de conserver le genre tel que Linné l'a établi, malgré l'insuffisance du caractère essentiel.

ESPÈCES.

* Étamines velues ; ovaires tomenteux à leur sommet. *CARDIACA*. Muench.

1. AGRIPAUME vulgaire. *Leonurus cardiaca*, Linn.

Leonurus foliis cuneiformi-ovatis, trilobis, dentatis ; corollis calice pungente majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 114. — Lam. Illustr. tab. 109. fig. 1 & 2. — Backh. tab. 171. — Fusch, Hist. 395. Icon. (Voyez AGRIPAUME, n°. 1.)

2. AGRIPAUME crépu. *Leonurus crispus*, Linn.

Leonurus foliis trilobis quinquelobisve, inciso-dentatis, undulatis ; corollis calice pungente majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 114. — Murr. Nov. Comm. Goett. 1777. pag. 44. tab. 4.

Cardiaca crispata. Sabbat. Hort. Rom. 3. tab. 43.

Leonurus cardiaca, var. β . Lam. Diction. 1. pag. 55.

Cette plante est si rapprochée de la précédente, qu'elle peut être considérée comme n'en étant qu'une simple variété : elle a le même port, les mêmes caractères ; elle en diffère par ses feuilles ondulées ou crépues à leurs bords, par les lobes plus profondément dentés, presque incisés. Elle croît dans la Sibérie.

- *** *Étamines & ovaires glabres. CHAETURUS.*
Möench.

3. *AGRIPAUME à feuilles simples. Leonurus marrubiastrum.* Linn.

Leonurus foliis ovatis lanceolatisque, serratis; calicibus sessilibus, spinosis. Linn. Spec. 817. — Jacq. Flor. austr. vol. 5. pag. 3. tab. 405.

Marrubiastrum foliis cordatis. Bocc. Mus. 2. pag. 120. tab. 98. (Voyez *AGRIPAUME*, n°. 2.)

4. *AGRIPAUME couché. Leonurus supinus.* Willd.

Leonurus foliis subquaque lobis; lobis obtusis, apice dentatis; calicibus sessilibus, spinosis. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 116. — Stephan. in litt.

Il sort de la même racine plusieurs tiges longues d'un demi-pied, couchées à leur partie inférieure, puis ascendantes, rameuses, tétragones, pubescentes, garnies de feuilles pétiolées, opposées, longues d'un demi-pouce, pubescentes à leurs deux faces, principalement en dessous, divisées en trois ou cinq lobes oblongs, un peu rétrécis en coin à leur base; obtuses & munies de trois ou cinq dents obtuses à leur sommet: les pétioles de la longueur des feuilles. Les fleurs sont sessiles, réunies en verticilles, au nombre de quatre ou six, accompagnées de bractées sétacées, pubescentes, mucronées, plus courtes que les calices. Ceux-ci sont pubescents; leurs déconnures ovales, épineuses à leur sommet. La corolle blanche, un peu plus longue que le calice. La lèvre inférieure à trois lobes obtus; les étamines plus courts que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibérie. * (V. f.)

- *** *La lèvre supérieure en volée; l'inférieure à trois lobes; le lobe du milieu échancré. PANZERIA.* Möench.

5. *AGRIPAUME de Tartarie. Leonurus sibiricus.* Linn.

Leonurus foliis tripartitis, laciniatis; calicibus villosis. Linn. — Mill. Ic. 80. — Houttuyn. Syst. pag. 500. tab. 57. fig. 1. (Voyez *AGRIPAUME*, n°. 3.)

6. *AGRIPAUME de Sibérie. Leonurus sibiricus.* Linn.

Leonurus foliis tripartitis, multifidis, linearibus, obtusiusculis. Linn. Spec. Plant. 817. (Voy. *AGRIPAUME*, n°. 4.)

AGRIPIHYLLUM. Juss. Desfont. (Voy. *ROMARIA. Suppl.*)

C'est le même genre que l'*apuleia* de Gärtnér,

le *berckheia* Willd.; il renferme plusieurs espèces de *gorteria* Linn.

AGROSTEMMA. (Voyez *LYCHNIDE*.)

AGROSTIS. Agrostis. Ce genre renferme une belle suite d'espèces nombreuses, à petites fleurs, disposées en panicules finement ramifiées, d'un port agréable, les unes terminées par une barbe ou arête, les autres muriques ou sans arête. Ces fleurs ont un calice à deux valves, unillore; une corolle bivalve.

Quoique ce genre puisse être considéré comme naturel lorsque l'on ne fait attention qu'au port & au rapport des espèces entre elles, néanmoins quand on examine leurs fleurs avec une grande attention, on y trouve des différences suffisantes pour former plusieurs genres des *agrostis*. Quelques espèces se rapprochent des *arundo* par les poils courts, quelquefois à peine sensibles, qui enveloppent la base des semences ou plutôt des valves de la corolle, persistantes avec les semences; mais les *arundo* sont de très-granles graminées, à calice multiflore & sans arête. Quelques espèces n'ont cependant qu'une seule fleur; elles ne sont alors distinguées des *agrostis* sans arête que par leur port. Quelques auteurs ont établi pour elles le genre *calamagrostis*. (Gmel. Syst. Nat.)

D'autres espèces, & même le plus grand nombre, telles que l'*agrostis rubra*, *canina*, *alrina*, &c. ont une arête dorsale & torse, comme celle des avoines; mais dans ces dernières, le calice est multiflore, comme celui des *arundo*.

Il en est enfin qui conservent parfaitement le caractère essentiel du genre, mais qui s'écartent des autres espèces par leur port, & dont les fleurs, au lieu d'être disposées en panicule, le sont en épi simple, ou digité ou ramifié; ce qui leur donne des rapports avec les *panicum* & les *paspalum*.

Les *milium* ne sont distingués des *agrostis* que par leurs fleurs un peu plus grosses, & par leurs valves concaves, un peu arrondies. M. de Lamarck a réuni ces deux genres: cependant comme les *milium* diffèrent des *agrostis* par leur port, étant assez généralement plus élevés, à plus grosses fleurs, je les séparerai par une division. Quelques autres espèces d'*agrostis* ont été exclues de ce genre; elles seront mentionnées dans les genres particuliers auxquels elles se rattachent.

Les *agrostis* ne croissent, la plupart, que parmi les gazons peu élevés, dans les sols arides ou un peu humides; ils ne pourroient habiter parmi les hautes graminées, qui les étoufferoient par le luxe de leur végétation. Ces graminées, trop fines & généralement trop petites pour tomber sous le tranchant de la faux, sont plutôt destinées pour la dent de la bœuf, qui les broute sans les détruire, & qui

n'attaque que la partie d'oite de la tige, tandis que la partie inférieure, couchée, rampante dans plusieurs espèces, produit souvent à ses articulations de nouvelles racines & pousse d'autres tiges en très-peu de tems, surtout lorsque la sécheresse n'est point de trop longue durée. C'est ainsi que la nature fait reparoître, dans les pâturages, plusieurs fois dans la même saison, ces utiles graminées, & qu'elle assure l'existence des animaux ruminans par la fertilité, en quele forte surabondance, des plantes qui doivent les nourrir. Foulées par les pieds des animaux & des hommes, elles en souffrent peu, & forment ainsi un gazon toujours vert, une pelouse délicate pour la promenade, qui n'est ni embarrassée ni gênée par la hauteur trop élevée des chaumes. Il sera donc utile de multiplier, pour former de belles allées vertes ou des pâturages dans des terrains un peu sablonneux, l'*agrostis floulofera*, *pumila*, *alpina*, *rubra*, &c. Si le terrain est un peu humide, il sera avantageux de faciliter l'accroissement de l'*agrostis canina interrupta*, tandis que l'*agrostis spica venti-alba*, *flouatica*, à tiges plus élevées, ajouteront à la bonne qualité des foins. L'*agrostis pungens*, dont les racines sont longues & traînantes, & qui se plaît dans le sable, sur les côtes maritimes, est une de ces plantes dont la multiplication est extrêmement importante pour fixer la mobilité des sables, & parvenir à les fertiliser. Les espèces exotiques ne sont pas moins intéressantes sous le rapport de l'économie.

ESPÈCES.

I. AGROSTIS.

* Fleurs paniculées, manies d'arêtes.

1. AGROSTIS des champs. *Agrostis spica venti*. Linn.

Agrostis petalo exteriore aristâ rectâ, striâ, longissimâ; paniculâ patulâ. Lam. Ill. n°. 756. tab. 41. fig. 1. — Less. Herborn. tab. 4. fig. 1. (Voyez AGROSTIS, n°. 1.)

2. AGROSTIS interrompu. *Agrostis interrupta*. Linn.

Agrostis petalo exteriore aristato; paniculâ attenuatâ, coarctatâ, interruptâ. Linn. Spec. Plant. pag. 92. (Voyez AGROSTIS, n°. 2.)

3. AGROSTIS miliacé. (Voyez n°. 3.) (*Agrostis miliacea*. Linn.)

Agrostis montis aurei. Delatb. Flor. d'Auverg. pag. 8.

4. AGROSTIS bromoïde. *Agrostis bromoides*.

Agrostis paniculâ simplicî, angustâ; corollâ pa-

bricente; aristâ rectâ, calice longiorâ. Linn. (Voyez AGROSTIDE, n°. 4.)

5. AGROSTIS austr. (Voyez AGROSTIS ventru.)

Elle passe aujourd'hui pour être la même plante que le *milium tendigerum*.

6. AGROSTIS en roseau. *Agrostis arundinacea*. Linn.

Agrostis paniculâ oblongâ; petalo exteriore basi villosâ, aristâque tortâ, calice longiorâ. Linn. Spec. pag. 91.

Calamagrostis arundinacea. Roth. Germ. 1. pag. 33. (Voyez AGROSTIS, n°. 6.)

7. AGROSTIS argenté. *Agrostis calamagrostis*. Linn.

Agrostis paniculâ incrassatâ, petalo exteriore toto lenato, apice aristato, culmo ramofo. Linn. Spec. pag. 92.

Calamagrostis arunda. Kœl. Gram. 102. (Voyez AGROSTIS, n°. 7.)

C'est avec raison qu'on a séparé cette plante des agrostis; elle a bien plutôt le port des roseaux par la grosseur de ses fleurs & leur caractère, pas les valves de la corolle couvertes de soies brillantes; mais le calice n'a qu'une fleur munie d'une arête.

8. AGROSTIS tardif. *Agrostis serotina*. Linn.

Agrostis paniculâ fuscalis oblongis, mucronatis; culmo obtuso, foliis brevissimis. Linn. Mantif. 30.

Festuca serotina. Linn. Spec. pag. 111. (Voyez AGROSTIS, n°. 8.)

9. AGROSTIS rouge. *Agrostis rubra*. Linn.

Agrostis panicula parte florente pumtissimâ; petalo exteriore glabro; aristâ terminali, tortâ, recurvâ. Linn. Flot. suec. n°. 60. — Scheuz., Gram. 148. tab. 3. fig. 11. C. (Voyez AGROSTIS, n°. 9.)

10. AGROSTIS des montagnes. *Agrostis alpina*. Leyfl.

Agrostis paniculâ parvâ, subangustâ, calice colorato, corollâ longiorâ; foliis setaceis. Lam. Ill. n°. 805. — Leyfl. Hal. n°. 67. — Allion. Flor. pedem. n°. 2160. — Kœl. Gram. 34. — Scheuz., Gram. 147. — Prodr. tab. 4. fig. 1. — Hall. Helv. n°. 14. (Voyez AGROSTIS, n°. 11.)

11. AGROSTIS filiforme. *Agrostis filiformis*. Willd.

Agrostis paniculâ attenuatâ, erectâ; aristâ rectâ,

spicula sublongioribus; culmo erecto, foliis setaceis, pedicellis geminis. Decand. Synopf. Pl. gall. pag. 129. — Willd. Dauph. 2. pag. 78.

Elle a des rapports avec l'agrostis des Alpes : elle est un peu plus grande. Ses racines sont blanches & fibreuses ; les feuilles fines, linéaires, presque routes radicales, longues de quatre à cinq pouces ; les tiges droites, hautes d'un pied, extrêmement fines, soutenant une panicule mince, droite, peu garnie ; les pédicelles presque sétacés, souvent geminés, appliqués contre les tiges ; les bêtes calicinales très-fines, violettes, un peu inégales, très-aiguës ; celles de la corolle un peu plus courtes, l'une des deux munie à sa base d'une arête droite, un peu plus longue que la fleur. Elle a été recueillie par M. Villars, aux environs de Briançon, le long des chemins.

12. AGROSTIS genouillé. *Agrostis canina*. Linn.

Agrostis calicibus elongatis; petalorum aristâ dorsali, recurvâ; culmi prostrati, subramosi. Linn. Spec. 92. — Hoffm. Getm. 3. tab. 6. (Voyez AGROSTIS, n° 10.)

13. AGROSTIS de Magellan. *Agrostis magellanica*. Lam.

Agrostis calicibus hirsutis, corollâ duplè longioribus; petali exterioris aristâ recurvâ, longiusculâ. Lam. III. n° 827.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, un peu rudes vers leur sommet, soutenant une panicule longue de trois à quatre pouces ; les ramifications comprimées, courtes, verticillées, un peu pubescentes, ainsi que le rachis & les pédicelles ; les valves calicinales velues sur leur dos, plus longues que celles de la corolle, lancéolées, très-aiguës. Les valves de la corolle un peu obtuses, l'extérieure plus longue, munie d'une barbe terminale, presque droite. Les feuilles sont glabres, linéaires, de la longueur des gaines ; celles-ci glabres, munies à leur orifice d'une membrane allongée, blanche, obtuse. Elle a été recueillie par Commerson, au détroit de Magellan. (V. f.)

14. AGROSTIDE des rochers. *Agrostis rupestris*. Allion.

Agrostis foliis filiformi-setaceis; paniculâ parvâ; calicibus hispidiusculis, patentibus, coloratis; petalo exteriori aristâ dorsali geniculatâ, flore duplè longiore. Willd. Spec. pag. 368. — Allion. Ped. 2161. — Hall. Helv. n° 1478. — Scheuz. Gram. 14.

Agrostis setacea. Villars, Dauph. 2. pag. 76.

15. *Agrostis* (setacea), *calicibus lanceolatis; corollâ bisp. aristâ; aristâ geniculatâ, foliis radicalibus setaceis.* Smith, Flor. britann. pag. 79. — Curt. Flor. Lond. tab. 12.

Agrostis alpina. Whter. — Lofy. Journ. bot. 2. pag. 105.

Agrostis festucoides. Villars, Dauphin. 2. pag. 274.

La plante s., rapprochée de celle-ci, n'en est peut-être qu'une variété ; ce que je n'ose affirmer, ces deux plantes ne m'étant pas connues. Dans cette dernière, les feuilles radicales sont sétacées, un peu glauques ; les panicules redressées ; les calices lancéolés ; la corolle munie à sa base d'une arête paniculée. Elle croît en Angleterre, & dans les landes du Bordeaux & de Bretagne. Elle fleurit au printemps.

Elle n'est peut-être qu'une variété de l'agrostis *alpina*, dont elle diffère par ses feuilles plus étroites, presque capillaires ; par la panicule constamment étalée ; par les valves calicinales plus ovées, point rouées ni tubulées. Les épillets sont d'un brun clair & non violets ; les barbes deux fois plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans les prairies sèches des Alpes. O

15. AGROSTIS douteux. *Agrostis dubia*. Loeef.

Agrostis calicibus aequalibus, levibus; corollis infra apicem mucronatis; foliis setaceis. Loeef. Herb. n° 56. tab. 4. fig. 4.

Agrostis compressa. Willd. Spec. 2. pag. 368.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'agrostis *canina*. Ses racines sont rampantes ; les tiges un peu courbées à leur base, ascendantes, glabres, obliques, longues d'un pied, garnies de feuilles glabres, étroites, peu nombreuses, sétacées, un peu rudes ; les gaines très-fines ; une membrane obtuse à leur orifice. Les fleurs sont disposées en une panicule étroite, un peu serrée, longue d'un à deux pouces, d'un blanc-verdâtre ; les pédoncules courts, foliivates, les inférieurs ternés ; les valves calicinales glabres, égales entr'elles ; celles de la corolle petites, blanchâtres, conniventes, un peu rudes sur leur dos ; l'une d'elles terminée par une petite arête à peine plus longue que la valve, souvent caduque vers la fin de la floraison. Elle croît dans les bois, sur les coteaux arides.

16. AGROSTIS à panicule soignée. *Agrostis strilla*. Willd.

Agrostis paniculâ elongatâ, strillâ; corollis calice minoribus; aristâ bisp. petali, toruli, flore longiore. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 366.

Cet agrostis a de grands rapports avec l'agrostis *rubra*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses feuilles sont planes, étroites, linéaires ; l'orifice de leur gaine muni d'une membrane lancéolée, déchiquetée. Les fleurs sont disposées en une pa-

nicule longue de quatre à cinq pouces; les ramifications divisées en petits rameaux courts, toides, nombreux. Les fleurs sont blanchâtres; leur calice étalé, un peu rude sur sa carène; les deux valves de la corolle formées par une membrane fort tendre, beaucoup plus courte que le calice; de la base de la valve extérieure s'élève une arête torse, plus longue que la fleur.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale.

17. AGROSTIS à panicule ovale. *Agrostis ovata*. Forst.

Agrostis petalo exteriori ante apicem aristato; panicula ovata, coarctata, spiciformi. Forst. Prodr. n°. 40. — Labill. Nov. Holl. 1. pag. 19. tab. 21.

Voici la description que M. Labillardière présente de cette plante, qu'il a observée au cap Van-Diemen. Ses tiges sont foibles, couchées à leur partie inférieure, puis redressées, striées, un peu cylindriques, parsemées de petites écailles en forme d'aiguillons recourbés; garnies de feuilles étroites, lancéolées, d'une médiocre longueur, striées, ainsi que leurs gaines. Les valves du calice sont ovales-oblongues, hérissées sur leur carène; celles de la corolle à peine plus longues que le calice, un peu inégales, pileuses à leur base; l'extérieure bisulc à son sommet, d'où s'élève une arête droite, denticulée, plus longue que les fleurs; la valve intérieure pileuse sur le dos, une fois plus courte; les semences oblongues, acuminées.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande & au cap Van-Diemen.

18. AGROSTIS quadrifide. *Agrostis quadrifida*. Labill.

Agrostis foliis setaceis, panicula coarctata; valvula exterioris corollæ aristâ torili inter lacinias quatuor terminales. Labillard. Nov. Holl. pag. 20. tab. 22.

Ses tiges sont cylindriques, striées, coudées à leur base, hautes de six à sept pouces; les feuilles sétacées, un peu roulées; les gaines striées, pileuses à leur partie inférieure, plus longues que les feuilles caulinaires. Les fleurs sont disposées en une panicule grêle, en forme d'épi; les valves du calice oblongues, aiguës, presque égales, hérissées sur leur dos; celles de la corolle un peu plus longues, pileuses à leur base; l'extérieure divisée à son sommet en quatre découpures aiguës, du milieu desquelles s'élève une arête torse, une fois plus longue que la corolle; la valve intérieure plus courte, ovale, concave, aiguë; les anthères presque globuleuses.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labill.)

19. AGROSTIS articulé. *Agrostis articulata*.

Agrostis panicula angustâ, patulâ; glumis calicinis inaequalibus; corollâ calicibus longiore; aristâ subterminali, longissimâ; pediculis incrassatis; culmo basi articulo. (N.)

Ses racines sont capillaires; ses chaumes géo-culés à leur partie inférieure, puis redressés, longs de huit à dix pouces; les feuilles glabres; les inférieures plus étroites; les fleurs disposées en une panicule droite, verdâtre, un peu étroite, étalée, longue de deux pouces & plus; les pédicelles courts, tenues en masse; les valves calicinales inégales, très-glabres, luisantes, un peu obtuses; celles de la corolle plus longues; l'extérieure plus allongée, étroite, aiguë, terminée par une longue barbe fine, un peu torse à sa base.

Cette plante croît dans le Portugal. (V. f. in herb. Desfont.)

20. AGROSTIS à petites fleurs. *Agrostis tenuiflora*. Willd.

Agrostis panicula simplicissima ramis adpressis; corollis aristatis, aristis fere longioribus. Willden. Spec. 1. pag. 364.

Cette plante, d'après Willdenow, a le port de l'*agrostis bromoides*; mais les rameaux de la panicule sont plus resserrés; les fleurs plus étroites, plus aiguës; les feuilles plus larges. Ses tiges sont droites, très-simples, hautes d'un pied & demi, planes, élargies, un peu rudes; l'orifice de leur gaine muni d'une membrane très-courte & tronquée; les panicules composées de rameaux très-simples, roides, serrés, peu garnis de fleurs. Leur calice est une fois plus court que la corolle; les valves de celle-ci acuminées; l'extérieure garnie d'une arête à son sommet, une fois plus longue que les valves, droite, quelquefois torse. M. Willdenow n'y a observé que deux étamines. Les anthères sont jaunes; les stigmates pourpres.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. x (Willd.)

21. AGROSTIS en épi. *Agrostis spicaformis*. Linn. Suppl.

Agrostis panicula spicaformi, flosculis biaristatis; aristâ alterâ receptaculo insertâ, geniculatâ, longiori; alterâ infra apicem corollæ reatâ, corollis hirsutis. Linn. Suppl. pag. 108. (Voyez AGROSTIS, n°. 12.)

22. AGROSTIS velu, n°. 13. *Agrostis hirsuta*. Linn. Suppl.

23. AGROSTIS tardif. *Agrostis serotina*.

Agrostis panicula; flosculis oblongis, mucronatis; culmo obiecto, foliis brevissimis. Linn. Mantill. pag. 30.

Fesuca

Festuca serotina. Linn. Spec. pag. 111.

Gramen foliaceum, serotinum, panicula expansa.
Seuier, Veron. 3. pag. 146. tab. 3. fig. 2.

Ses tiges sont hautes d'un pied, ascendantes, couvertes par les gaines des feuilles. Celles-ci sont courtes, à peine plus longues que les articulations, étalées. Les ramifications de la panicule sont aplaties, médiocrement rameuses; la plupart des fleurs fertiles. La balle caliciale est courte, membraneuse; celle de la corolle lancéolée; les deux valves oblongues, aiguës, mucronées; l'une d'elles légèrement arêtée; les piliils de couleur purpurine.

Cette plante croît aux environs de Vérone.

24. AGROSTIS des vignes. *Agrostis vinealis*. Schreb.

Agrostis callicibus coloratis, petalorum aristâ dorsali, longitudinali ferè calicis; culmis ascendentibus. Schreb. Spicil. 47. n°. 977. — Hoffm. Germ. 25.
— Roth, Germ. 1. pag. 31, & vol. 2. pag. 82.

Avena monantha, panicula sparsa, aristâ paulô fiores superante. Hall. Helv. n°. 1481.

— *Gramen caninum, vineale*. Scheuch, Agrost. 143.

1. ? *Agrostis (gigantea), panicula parte superiore prius florente patentissimâ; calicibus hispida; petalo exteriori glabro, dorso superat subaristato, culmo erecto*. Roth, Germ. vol. 1. pag. 31, & 2. pag. 83.
— Hoffm. Germ. 25.

γ. *Eadem, aristis longioribus*. Roth, l. c.

Ses tiges sont un peu couchées à leur base, puis ascendantes, glabres, variables dans leur longueur, soutenant à leur sommet une panicule étalée, ramifiée. Les fleurs sont fortement colorées; les valves du calice hispides sur leur dos; celles de la corolle munies d'une arête dorsale de la longueur des fleurs, quelquefois nulle ou caduque; les feuilles très-glabres, étroites, plus courtes que les tiges. Selon Willdenow, la plante n'est qu'une variété de la précédente, à tige plus droite, plus élevée; la panicule plus étalée, surtout à sa partie supérieure desqu'elle commence à fleurir. L'arête est quelquefois très-courte, quelquefois plus longue que les fleurs.

Cette plante croît dans les champs, sur les coteaux, en Suisse, en Allemagne; la variété β sur le bord des fleuves.

25. AGROSTIS à pédoncules foibles. *Agrostis debilis*.

— *Agrostis foliis linearibus, asperis; panicula laxâ; ramulis longissimis, capillaribus; floribus acutis; glumis calicinis corollâ longioribus; aristâ dorsali, contorta*. (N.)

Botanique, Supplément. Tome 1.

Ses tiges sont grêles, hautes d'environ un pied & plus; les feuilles planes, linéaires, un peu rudes au toucher, ainsi que leur gaine, qui est glabre à son orifice, & munie d'une membrane mince, allongée, étalée, très souple, vacillante; les ramifications presque fasciculées, fort longues, très-grêles, rudes, capillaires, quelquefois ramifiées presque en ombelle. Ces fleurs sont d'un vert blanchâtre, aiguës; les valves du calice égales, hérissées sur leur dos; celles de la corolle beaucoup plus courtes, pubescentes, un peu obtuses; l'extérieure munie d'une arête dorsale, torse, fine, plus longue que la fleur.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est inconnu. (V. f. in herb. Desfont.)

26. AGROSTIS des limons. *Agrostis luteola*.

Agrostis (littoralis), calicibus lineari-lanceolatis, aristatis; corollâ nudâ; aristâ subterminali, rectâ; culmis decumbentibus. Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 78. — Witter. Flor. tab. 23.

Ses tiges sont glabres, couchées ou renversées; ses fleurs disposées en une panicule terminale; les valves calicinales étroites, linéaires-lancéolées; la corolle glabre; sa valve extérieure munie vers son sommet d'une arête droite.

Cette plante croît en Angleterre, sur les bords de la mer, dans les terrains limoneux; elle fleurit au mois d'août.

27. AGROSTIS fil d'araignée. *Agrostis arachnoidea*.

Agrostis panicula laxâ, patentissimâ; ramulis complicitis, arachnoideis; calicibus corollâ multò brevioribus; foliis angustis, subinvolutis. (N.)

Ses tiges sont droites, grêles, très-fines, cylindriques, élevées; leurs articulations fort distantes, surtout les supérieures. Les feuilles sont étroites, un peu roulées, très-aiguës, leurs gaines fort longues, munies à leur orifice d'une membrane étroite, obtuse, déhiscence. Les fleurs sont disposées en une panicule ample, fort grande, étalée; les ramifications très-fines, rameuses, entrecroisées comme les fils d'une toile d'araignée; les ramifications inférieures disposées en verticilles latéraux; les supérieures solitaires, alternes; les pédicelles très-courts, plus fins qu'un cheveu, terminés par une petite filière oblongue, d'un brun-rougeâtre foncé, les valves calicinales petites, obtuses, égales, de moitié plus courtes que celles de la corolle. Celles-ci sont étroites, aiguës, rougeâtres; l'extérieure terminée par une arête droite, naissante, très-fine, de la longueur de la valve; les semences enveloppées par la valve interne.

Cette plante a été découverte dans la Caroline par M. Bosc, qui m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

* * Fleurs dépourvues d'arêtes ou de barbe.

28. AGROSTIS traçant. *Agrostis stolonifera*. Linn.

Agrostis panicula ramulis brevibus, muticis, subconfertis; culmo geniculato, repente. Lam. Illustr. n° 816.

Agrostis tenella. Hoffm. Germ. 3. pag. 36.

Agrostis coarctata. Hoffm. Germ. 3. pag. 37.

Agrostis verticillata. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 36.

Agrostis varians. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 35.

1. *Agrostis prolifera. (Voy. AGROSTIS, n° 22.)*

La variété β est remarquable par sa panicule serrée en forme d'épi, presque toujours blanchâtre, & dont les pédicelles sont appliqués contre l'axe. La variété γ est beaucoup plus grande, plus étalée, & divisée, d'espace en espace, en verticilles irréguliers. C'est presque le même port dans la variété δ . La panicule est rousseâtre; les fleurs inférieures distinctes; les supérieures en fascicules pédonculées.

Je n'ai pas cru devoir regarder comme espèce distincte la plante notée γ ; elle est très-remarquable par le prolongement des valves de la corolle, au moins une fois plus longues que celles du calice, étroites, subulées, aigües. Ses fleurs sont d'ailleurs disposées en une panicule étalée, longue de deux ou trois pouces, lâche, verticillée; les pédoncules & les pédicelles glabres, sétacés. On y distingue des fleurs de deux sortes: les unes petites, ayant les valves de la corolle à peine aussi longues que celles du calice, très-glabres; les autres presque une fois plus grosses, & dont la corolle se prolonge, ainsi que je l'ai dit plus haut. Les feuilles sont planes, rudes à leurs bords, nues à leur orifice, munies d'une membrane blanchâtre. J'ai observé cette singulière variété dans l'herbier de M. Desfontaines.

29. AGROSTIS dorm. *Agrostis dulcis. Hort. Parif.*

Agrostis panicula densa, breviuscula, interrupta; floribus fasciculatis, subsessilibus.

Agrostis stolonifera, var. γ . Persoon, Synops. 1. pag. 75.

Agrostis (gracilis), caespitosa, culmo gracili, subdecumbente; panicula in fricam cylindricam coarctata; flosculis glabris, subsessilibus. Pers. l. c.

Cette espèce n'est peut-être qu'une des variétés de l'*Agrostis stolonifera*; elle en diffère par sa panicule plus courte, plus touffue, sensiblement interrompue, & formant quelquefois de gros paquets de fleurs presque sessiles, l'ouvent d'un vert foncé; les valves presque glabres. Elles sont entièrement glabres dans la variété β ; les tiges fort menues; les fleurs disposées en un épi grêle, serré, presque cylindrique, luisant; les feuilles plus petites & plus étroites. Elle croît dans l'Orient. La variété β a été recueillie aux environs de Lyon par M. Persoon. γ (V. f.)

30. AGROSTIS piquant. *Agrostis pungens. Lam.*

Agrostis panicula parva, conferta, subovata; foliis convolutis, pungentibus; culmo ramofo, repente. Lam. Illustr. n° 817. — Schreb. Gram. 2. tab. 27. fig. 3.

Phalaris disticha. Forskh. Egypt. p. 17. (Voy. AGROSTIS, n° 23.)

Je l'ai recueillie sur les côtes de la Barbarie.

31. AGROSTIS de Virginie. *Agrostis virginica.*

Agrostis panicula (spiciformis, elongata) contracta, mutica; foliis involuto subulatis, rigidis, extantibus. Elagt. Virg. 507. — Swartz, Obf. 38. — Labill. Nov. Holl. 1. pag. 20. tab. 25.

Agrostis (juncea), panicula parva, subspectata; foliis convolutis-juncetis, bifariis; radice repente. Lam. Illustr. n° 818, & Illustr. tab. 41. fig. 2.

Agrostis tremula. Willd. Spec. 1. pag. 372.

Rapprochée de l'espèce précédente, celle-ci en diffère par ses panicules plus étroites, plus alongées, en forme d'épi, à ramifications courtes & serrées. Ses feuilles sont plus étroites ou plutôt plus fortement roulées sur elles-mêmes, disposées sur deux rangs, très-étalées, subulées, moins roides, moins piquantes; l'orifice de leur gaine garni de quelques poils fins, très-blancs; les tiges couchées & traînantes; les rameaux courts, redressés.

Cette plante m'a été communiquée par M. Ledru, qui l'a recueillie à Porto-Ricco. γ (V. f.) La variété β ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle est beaucoup plus petite, d'un vert un peu glauque. (Voy. AGROSTIS, n° 32.)

32. AGROSTIS maritime. *Agrostis maritima. Lam.*

Agrostis panicula spicata, ramulis brevissimis; calicibus muticis, levibus, aequalibus. Lam. Illustr. n° 819.

An agrostis arenaria? Gouan, Illustr. pag. 3. (Voy. AGROSTIS, n° 33.)

31. AGROSTIS de Villars. *Agrostis Villarsii*.

Agrostis (verticillata), panicula recta, verticillis radiatis, rigidis interruptis; foliis mucicis. Vill. Dauph. t. 2. pag. 74.

Agrostis (alba, var. β , verticillata), panicula subterrestris; foliis fasciculatis, subsistibus, nitidis; glumis mucicis. Pers. Synop. t. 2. pag. 76.

Cette plante me paroît devoir former une espèce bien distincte, diff. 2 semblable, par sa panicule, à l'*Agrostis flexuosa*, très-différente d'ailleurs par son port & par ses tiges. Celles-ci sont longues, traçantes, écinées, dures, cylindriques, garnies de feuilles courtes, un peu roides, glabres, étroites, nues à l'orifice de leur gaine. La panicule est courte, épaissie, très-serrée; ses ramifications presque verticillées, courtes, touffues; les verticilles un peu interrompus; les valves calicinales aiguës, presque mucronées, d'un vert-pâle, un peu jaunâtre; celles de la corolle plus courtes & mutiques.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, aux lieux humides & sablonneux. α (V. f.)

34. AGROSTIS des rives. *Agrostis littoralis*. Lam.

Agrostis panicula contracta, subpanicata; calicibus inaequalibus, vaginis foliorum barbatis. Lam. Illustr. n°. 810.

β . Eadem, ramis panicula longioribus.

Cette espèce est encore très-rapprochée des précédentes. Ses tiges sont grêles, alongées, terminées par un épi serré, presque interrompu, d'un vert-blanchâtre; les valves calicinales inégales. Les feuilles sont un peu distantes, presque disséquées, glauques, un peu blanchâtres, roulées & tubulées, un peu roides, barbuës sur les bords de leur gaine. La variété β a les rameaux de sa panicule plus alongés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, & la variété β au Sénégal.

35. AGROSTIS pyramidal. *Agrostis pyramidata*. Lam.

Agrostis panicula patente, parva, pyramidata; calicibus corollâ longioribus; vaginis ore pilosis. Lam. Illustr. n°. 821.

Elle diffère de la précédente par ses panicules plus ouvertes, étalées, petites, en forme de pyramide. Les calices sont plus longs que la corolle, & les gaines des feuilles pileuses seulement à leur orifice.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.

36. AGROSTIS en jonc. *Agrostis juncea*. Mich.

Agrostis foliis stricte credis, convolutato-fetacis, rigidulis; panicula oblongo pyramidata, floribus mucicis, valvula extima duplo minor. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 52.

Ses tiges sont garnies de feuilles roides, droites, roulées à leurs bords, sétacées; la panicule oblongue, pyramidal, sans arête; la valve extérieure de la corolle une fois plus courte.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale.

37. AGROSTIS à épi. *Agrostis spicata*. Vahl.

Agrostis panicula spicata; foliis involutis, rigidis, in geniculis concavatis; ramis infractis. Vahl, Symb. t. 2. pag. 9.

Agrostis (virginica), *sermentis repentibus; foliis convolutis, ciliatis*. Forsk. Descript. pag. 20.

Elle a presque le port de l'*Agrostis repens*. Ses tiges sont rampantes, alongées; il s'élève de leurs articulations des rameaux ou foliaires ou quelquefois fasciculés, droites, longs de cinq à six pouces, terminés par un épi long de deux pouces, qui s'incline & se divise en plusieurs lobes. Le calice est plus court que la corolle; la valve extérieure trois fois plus petite. Les feuilles sont courtes, glabres, roulées à leurs bords, terminées par une forte pointe subulée; leur gaine légèrement ciliée, plus longue que les feuilles.

Cette plante croît dans les sables de l'Arabie.

38. AGROSTIS du Cotomandel. *Agrostis cotomandolina*. Retz.

Agrostis panicula ovata, patente; pedunculis simplicibus; floribus secundis, mucicis; calicibus aequalibus, acutis, nitidis. Retz. Obs. bot. 4. pag. 19. — Vahl, Symb. t. 2. pag. 10.

Agrostis indica. Forsk. Catal. arab. pag. 104. n°. 66.

Toute cette plante est roide, blanchâtre, haute d'un demi-pied; les racines nombreuses, sétacées, blanches, roides, flexueuses. Ses tiges sont filiformes, ascendantes, feuillées à leur base, couvertes par les longues gaines des feuilles. Celles-ci sont élargies, longues d'une pouce, roides, lancéolées, aiguës. La panicule est ovale, médiocre; les pedoncules égaux, verticillés, un peu pendans vers l'extrémité, nus, luisans, pédicellés; les valves calicinales égales, noirâtres, aiguës; celles de la corolle un peu plus petites; l'une des deux plus obtuse; les semences jaunes & luisantes.

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux arides; elle n'est point attaquée par les troupeaux.

39. AGROSTIS vulgaire. *Agrostis vulgaris*.

Agrostis paniculâ patulâ, glumis darâ hispidiusculis; culma subscescente, flarente; perigonii involuta interiâ darâ breviate, retusâ. Dec. Synops. pag. 124. — Hoffm. Getm. 3. pag. 36.

Agrostis (capillaris), paniculâ capillari, patente; calicibus acutis, coloratis, subsqualibus; floriculis muticis. Linn. Illustr. n° 822. — Ædet. Flor. dan. tab. 163. Nan Linn.

Agrostis (hispida), ramis paniculâ patentia verticillaris; calicibus aequalibus, hispidiusculis; floriculis muticis. Willd. Spec. 1. pag. 370.

Agrostis capillaris. Linn. Flor. suec. edit. t. n° 62. — Leers, Herb. n° 54. tab. 4. fig. 3. — Hall. Helv. n° 1475.

Gramen micaceum minus, paniculâ rubente. Monti, 52. Icon. 54.

Agrostis divaricata. Hoffm. Germ. 3. pag. 37.

Agrostis violacea. Thuill. Flor. patif. édit. 2. pag. 35. (Voyez AGROSTIS, n° 25.)

Les valves calicinales, vues à la loupe, sont hérissées de très-petits poils, pointues, égales entr'elles; celles de la corolle glabres.

40. AGROSTIS capillaire. *Agrostis capillaris*.

Agrostis paniculâ capillari, patente, flexuosa; calicibus subulatis, aequalibus, glabris, calaratis, muticis. Smith, Icon. ined. Fasc. 3. tab. 54.

Agrostis capillaris. Linn. Spec. Plant. edit. t. pag. 42, & edit. 2. pag. 93. (Nan descriptio nec synonyma.)

Agrostis paniculâ tenuissimâ. Flor. lapp. n° 45.

Cette espèce, confondue avec la précédente, en diffère par les valves calicinales, parfaitement glabres, très aigües; par la panicule à ramifications plus fines, capillaires, flexueuses, étalées. Elle croit en Laponie, sur les hautes montagnes.

41. AGROSTIS des bois. *Agrostis silvatica. Linn.*

Agrostis paniculâ caespitâ, muticâ; calicibus aequalibus, virginatis corollâ brevioribus, secundariis duplâ longioribus. Linn. Spec. pag. 93. (Voyez AGROSTIS, n° 26.)

Quelques auteurs pensent que cette plante n'est qu'une variété de l'agrostis vulgaire, dont les fleurs, atteintes de maladie, prolongent leurs valves calicinales. Elle se rapproche de notre AGROSTIS, n° 28, var. 1.

42. AGROSTIS blanc. *Agrostis alba. Linn.*

Agrostis paniculâ laxâ; calicibus muticis, aequalibus; culma repente. Linn. Spec. pag. 93. — Hoffm. Germ. 3. pag. 36.

Agrostis (palustris), paniculâ caespitâ, muticâ; calicibus aequalibus, hispidiusculis; culmo repente. Hudson, Angl. 27. (Voyez AGROSTIS, n° 27.)

Peut-être n'est-elle qu'une variété de l'agrostis vulgaire. Dans la plante 5, la panicule est plus serrée, plus épaisse; les fleurs d'abord purpurines, puis pâles; les calices un peu hérissés sur leur dos.

43. AGROSTIS à feuilles roulées. *Agrostis involuta.*

Agrostis paniculâ angustâ, spicatâ; foliis glabris, involuta-subulatis; culmis ramosis, geniculatis. (N.)

Cette espèce a quelques rapports avec l'agrostis alba; elle en diffère par les tiges rameuses, un peu coudées à leurs articulations, glabres, cylindriques, un peu roides, hautes d'un à deux pieds; par les feuilles roulées sur elles-mêmes, & non planes, fermes, subulées, très-glabres, tant sur la gaine qu'à son orifice. La panicule forme un épi ramoux, droit, serré, long de deux ou trois pouces; les pédoncules & les pédicelles glabres; les fleurs aigües; les valves du calice égales, lancéolées, aigües, un peu hérissées sur leur dos; celles de la corolle plus courtes, privées d'arêtes.

Cette plante croît dans les environs de Maroc, où elle a été recueillie par M. Broussonet. (V. f. Comm. Desfont.)

44. AGROSTIS nain. *Agrostis pumila. Linn.*

Agrostis paniculâ muticâ, secundâ; culmis fasciculatis, erectis. Linn. Mantif. 31. (Voyez AGROSTIS, n° 28.)

Peut-être n'est-elle qu'une variété naine de l'agrostis vulgaire.

45. AGROSTIS du Mexique. *Agrostis mexicana. Linn.*

Agrostis paniculâ oblongâ, cæspitâ; calicibus corallisque acuminatis, subsqualibus, muticis. Linn. Mant. 31. (Voyez AGROSTIS, n° 30.)

Cette plante paraît presque se confondre avec le cinna de Linné, ou du moins en être une espèce très-voisine. Quelques auteurs sont de cet avis; mais le voyageur Michaux, dans sa Flore de l'Amérique septentrionale, pense que le genre cinna doit être conservé; qu'il n'est constamment qu'une seule éramire, & que la valve extérieure de la corolle est presque toujours pourvue d'une arête presque de moitié plus courte que cette valve.

46. AGROSTIS feuillé. *Agrostis frondosa.*

Agrostis culmo flexuosa, articulis ramosis, foliosis;

paniculis coarctatis; calicibus acutis, corollâ brevioribus. (N.)

Ses tiges sont hautes d'un à deux piéds, glabres, un peu flexueuses à leurs articulations : de chacune de ces articulations il sort des rameaux feuillés, comprimés, également flexueux, & souvent de couleur purpurine au dessous des nœuds. Les feuilles sont glabres, courtes, nombreuses ; leur gaine lâche, nue à son orifice, munie d'une petite membrane blanche. Les panicules sont étroites, serrées, assez semblables à celles de l'*Agrostis mexicana* ; les ramifications en forme d'épis oblongs, de couleur verte, un peu purpurine ; les fleurs petites, oblongues ; les valves calicinales plus courtes que celles de la corolle, aiguës, mucronées à leur sommet ; celles de la corolle étroites, oblongues, aiguës.

Cette plante croît en Allemagne. (V. f. in herb. Desfont.)

47. AGROSTIS des Indes. *Agrostis indica*. Linn.

Agrostis (elongata), paniculâ contractâ, elongatâ, muticâ; ramulis alternis, stridisimis; glumis levibus, inaequalibus. Lam. Illustr. n°. 826. — Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 52. — Swartz, Observ. bot.

1. ? *Agrostis (purpurascens), paniculâ coarctatâ, elongatâ; ramis adpressis, erectis; flocculis inaequalibus, acuminatis.* Swartz, Prodr. pag. 25, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 185. (Voyez AGROSTIS, n°. 51.)

48 AGROSTIS tenace. *Agrostis tenacissima*. Linn. Suppl. (Voyez AGROSTIS, n°. 34.)

49. AGROSTIS disparate. *Agrostis dispar*. Mich.

Agrostis erecta, majuscula, paniculâ laxâ, subverticillatâ pyramidalâ, multiflorâ; gluma mutica, valvis exterioribus multo majoribus, interiorum alterâ minimâ. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 52. Non *Agrostis dispar*. Hort. Paris.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, élevées, garnies de feuilles allongées, glabres, aiguës. Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, en forme de pyramide ; les ramifications presque verticillées, soutenant des fleurs nombreuses, pédicellées ; les valves calicinales beaucoup plus longues que celles de la corolle ; celles-ci petites, sans arête ; l'une des deux beaucoup plus courte.

Cette plante croît à la Caroline, dans les terrains arides & sablonneux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

50. AGROSTIS rude. *Agrostis aspera*. Mich.

Agrostis culmis stridis, ramosis; foliis longissimis,

recurvis, asperis, ore barbatis; paniculis coarctatis; floribus majusculis, calicibus corollâ subtriplo majoribus.

Agrostis aspera. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 52.

Ses tiges sont roides, redressées, rameuses dès leur base ; les feuilles très-longues, pendantes, recourbées, très-mûres velues & barbues à l'orifice de leur gaine ; les fleurs assez grandes, disposées en une panicule tendue, latérale & terminale ; les valves de la corolle presque trois fois plus courtes que celles du calice.

Cette plante croît dans le pays des Illinois, sur les collines & les rochers.

51. AGROSTIS à fleurs latérales. *Agrostis lateriflora*. Mich.

Agrostis culmis nodosis, foliis planis; paniculis pusillis, coarctatis, densis; valvis acutissimis, scabris, interioribus majoribus, basi sabbarbatis.

Agrostis lateriflora. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 53.

Ses tiges sont redressées, noueuses, cylindriques ; les feuilles planes, linéaires ; les panicules latérales & terminales, petites, serrées, à fleurs nombreuses ; les valves calicinales très-aiguës, un peu rudes sur leur dos, plus courtes que celles de la corolle ; celles-ci un peu barbues à leur base.

Cette plante croît sur les rochers, le long du fleuve de Mississipi, dans le canton des Illinois.

52. AGROSTIS à grappes. *Agrostis racemosa*. Mich.

Agrostis culmis erectis, foliis angustis; racemis oblongis, subinterruptis; calicibus longe mucronatis, corollâ longioribus.

Agrostis racemosa. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 53.

An *agrostis dispar*? Hort. Paris.

Cette plante se rapproche beaucoup, par son port, de la précédente. Ses tiges sont droites ; ses feuilles longues, linéaires, plus étroites ; ses fleurs disposées en une grappe oblongue, composée d'épis un peu distans, à fleurs nombreuses ; les valves de la corolle plus longues que celles du calice, terminées en une pointe roide, semblable à une arête.

Cette plante croît sur les rives sablonneuses & inondées du fleuve de Mississipi.

53. AGROSTIS rude. *Agrostis scabra*. Willd.

Agrostis paniculâ ramosa, divaricatâ; flocculis

mutica, ped. nœufque incrassatis & foliis scabris. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 370.

Ses tiges sont droites, rameuses; les feuilles longues, étroites, linéaires, rudes au toucher, munies à leur orifice d'une membrane courte. Les panicules sont très-étalées, rameuses, diffusées, fort amples, presque longues d'un pied; les ramifications allongées, filiformes, flexueuses; les pédicelles rudes, nombreux, épais vers leur sommet: les deux valves du calice égales, pointues, colorées à leur sommet, rudes sur leur dos; celles de la corolle membracées, plus courtes que le calice.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Willd.)

54. AGROSTIS à deux étamines. *Agrostis diantha*. Retz.

Agrostis paniculata elongata, contraria; floribus subulatis, mutica, diantha; foliis convolutis. Retz. Oef. bot. 5. pag. 19.

Un des caractères particuliers à cette espèce est de n'avoir que deux étamines dans chaque fleur. Ses feuilles sont roulées à leurs bords, étroites, allongées, subulées; ses fleurs fort petites, presque sessiles, la plupart unilatérales, disposées en une panicule lâche, allongée, un peu resserrée; les pédoncules & les pédicelles faibles, seracés; les valves calicinales un peu subulées, aiguës; celles de la corolle plus courtes, dépourvues d'arêtes; les semences ovales, roussâtres.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Desfont.)

55. AGROSTIS cilié. *Agrostis ciliata*. Thunb.

Agrostis paniculata mutica; glumâ calicinâ angulata, ciliata. Thunb. Flor. japon. pag. 49.

Ses tiges sont glabres, droites, cylindriques, simples, hautes de deux pieds, garnies de feuilles plus courtes que les tiges, rudes, striées, poncturées & ciliées sur le bord & à l'orifice de leurs gaines. La panicule est longue d'un pied, ramifiée; les pédoncules filiformes, ciliés, anguleux; les fleurs médiocrement pédicellées, appliquées contre les rameaux; les valves calicinales lancéolées, aiguës, anguleuses, ciliées sur les angles; celles de la corolle dépourvues d'arêtes.

Cette plante croît au Japon.

56. AGROSTIS d'Afrique. *Agrostis africana*.

Agrostis (spicata), paniculâ spicata, cylindrica, mutica; culmo nante. Thunb. Prodr. pag. 19.

Agrostis capensis. Willd. Spec. 1. pag. 371.

Ses tiges sont inclinées; elles se terminent par

une panicule cylindrique, allongée en forme d'épi. Les fleurs sont sans arête. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

57. AGROSTIS à grosses semences. *Agrostis panicoides*. Lam.

Agrostis paniculâ oblongis, mutica, levibus; calicibus brevissimis; culmo reclinato, ramossissimo. Lam. Illustr. n° 818.

Ses tiges sont glabres, en partie couchées, coulés à leurs articulations, très-rameuses; les feuilles planes, glabres, un peu élargies; les fleurs disposées en panicule, très-fines, serrées; les ramifications un peu flexueuses; les valves calicinales concaves, ovales, presque égales, à peine aiguës; celles de la corolle de même forme, presque aussi longues. Les semences sont grosses, luisantes & roussâtres. Cette espèce se rapproche des *milium*. Son lieu natal n'est pas connu. Elle a été cultivée au Jardin des Plantes.

58. AGROSTIS élevée. *Agrostis procerâ*. Retz.

Agrostis paniculâ pedunculis racemosis, erectisculis; floribus hirsutis, mutica, lanceolata. Retz. Oef. 4. pag. 19.

Ses tiges sont ascendantes, hautes de quatre pieds & plus, rameuses, brunes & entourées d'un duvet blanc à leurs articulations; les feuilles étroites, longues d'un demi-pied, très-glabres. La panicule est longue d'un demi-pied & plus; les pédoncules solitaires, redressés, divisés en grappe par des pédicelles renflés en massue. Les fleurs sont comprimées, lancéolées, velues, aiguës. Les valves du calice sont presque égales, un peu planes, l'une d'un brun-pourpre, l'autre verte; celles de la corolle plus petites, inégales; les stigmates d'un pourpre-noirâtre; les semences blanches, ovales.

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux un peu humides & gazonneux. (Retz.)

59. AGROSTIS à panicule composée. *Agrostis composita*.

Agrostis paniculâ compositâ pedunculis racemosis, erectis; glumis corollinis acutis, calice longioribus; foliis asperis, longissimis. (N.)

Ses tiges sont fort élevées, un peu anguleuses & comprimées, principalement à leur partie supérieure; les feuilles larges, très-allongées, rudes à leurs bords; les fleurs petites, d'un vert-pâle, disposées en une panicule fort ample, très-longue, composée de plusieurs panicules partielles; chacune d'elles formée de ramifications presque simples, inégales, un peu verticillées, en épis grêles; les fleurs alternes & presque sessiles sur de petits

rameaux courts; les valves du calice presque égales, plus courtes que celles de la corolle.

Cette espèce a été découverte par M. Bosc, dans la Caroline. (V. f. Comm. Bosc.)

60. AGROSTIS à panicule inclinée. *Agrostis nutans*.

Agrostis panicula compressa, longissima, nutante; glumis acutis, altera multo brevior; foliis latis, asperis. (N.)

C'est une grande espèce, dont les tiges sont droites, hautes, garnies de feuilles longues, lancéolées, élargies, rudes, planes, glabres sur leur gaine. Les fleurs sont disposées en une panicule longue d'un à deux pieds, souple, inclinée, composée de plusieurs panicules partielles, dont les rameaux sont allongés, rudes, triangulaires, ramifiés, un peu serrés. Les pédicelles filiformes, réunissant un grand nombre de fleurs presque sessiles, d'un vert pâle ou jaunâtre. Les valves du calice sont glabres, fort inégales, concaves, l'une de moitié plus courte, aiguë; l'autre aussi longue que la corolle, terminée par une petite pointe roide, subulée.

Cette plante a été recueillie dans la Caroline, par M. Bosc. (V. f. Comm. Bosc.)

61. AGROSTIS élégant. *Agrostis elegans*. Loefl.

Agrostis culmo erecto, filiformi; foliis involuto-subulatis; paniculis laxis; ramulis capillaribus; floribus minimis, ovatis, mucis. (N.)

Agrostis elegans. Thore, l'Ined. — Loefl. Journ. bot. 2. pag. 107. tab. 8. fig. 1.

Jolie petite espèce, dont les tiges sont fort menues, un peu coudées à chaque nœud, haute de cinq à six pouces; les feuilles courtes, roncées, subulées, munies à leur gaine d'une membrane tronquée & lacinée. La panicule, d'abord serrée, s'épanouit en rameaux capillaires, très-étalés. Les valves du calice sont glabres, ovales, très-ouvertes, petites; celles de la corolle plus courtes, luisantes.

Cette plante croît dans les landes, aux environs de Dax, où elle a été recueillie par M. Thore. Elle fleurit au printemps. ○

62. AGROSTIS à fleurs lâches. *Agrostis laxiflora*.

Agrostis panicula patente, setacea, laxa; floribus raris, minimis; foliis brevissimis, angustis; culmo filiformi, opiete setaceo. (N.)

Ses racines sont courtes, fibreuses, fasciculées; elles possèdent plusieurs tiges un peu coudées à leurs articulations inférieures, redressées, filiformes, setacées à leur partie supérieure, hautes de huit à dix pouces. Les feuilles sont courtes, planes,

très-étroites, glabres ainsi que sur leur gaine & à son orifice. Les panicules sont droites, très-étalées; les pédoncules & les pédicelles opposés, presque verticillés, extrêmement fins, nus, un peu hérissés, munis vers leur sommet seulement de quelques fleurs fort petites, pédicellées; les valves calicinales ovales, aiguës, un peu plus longues que la corolle, luisantes, légèrement purpurines.

Cette plante croît dans la Caroline, où elle a été recueillie par M. Bosc. (V. f. Comm. Bosc.)

63. AGROSTIS verticillé. *Agrostis verticillata*. Lam.

Agrostis spicis numerosissimis, subverticillatis; floribus geminis, ciliato-muricatis, altero sessili. Lam. III. Gen. 1. pag. 162. n°. 831. An hujus generis?

An *phalaris* ? & *anoliis* ? Linn.

Vulgairement petitvert. (Voyez AGROSTIS, n°. 41, & ALPISSE. Observations.)

*** Fleurs en épi simple ou ramifié.

64. AGROSTIS pileux. *Agrostis pilosa*. Retz.

Agrostis spicis digitatis, linearibus; foliis marginatis pilosis. Retz. Obs. 6. pag. 22.

Ses tiges sont hautes d'un pied & demi, géniculées, munies d'une seule feuille; les racines sont radicales, linéaires, longues d'un demi-pied, garnies à leurs bords de longs poils blancs. Les fleurs sont disposées en épis fasciculés, linéaires, unilatéraux; le rachis plane, velu à ses dentelures; ces fleurs sont geminées, l'une sessile, l'autre pédicellée; les valves calicinales planes, ovales, de la grandeur des semences; l'une des deux convexe, trois fois plus petite; les semences brunes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Retz.)

65. AGROSTIS linéaire. *Agrostis linearis*. Retz.

Agrostis spicis subquaternis, digitatis; flosculis unilateralibus, alternis, adpressis, mucis. Retz. Obs. 4. pag. 19.

Cette plante est blanchâtre, haute d'un demi-pied, assez semblable, par son port, au *poa linearis*. Les feuilles occupent le bas des tiges; elles sont courtes, étroites, étalées, disposées sur deux rangs. Les fleurs sont disposées en trois ou quatre épis ombellés, à peine longs d'un pouce; le rachis flexueux & linéaire; ces fleurs sont alternes, sessiles, unilatérales, appliquées contre le rachis. Les valves du calice ouvertes & subulées; celles de la corolle plus grandes, inégales.

Cette plante croît dans les Indes, le long des grands chemins.

66. AGROSTIS plant. *Agrostis lenta*.

Agrostis spicis subternis, umbellatis; flosculis muticis, oblongis, acutis; valvulis calicinis subsagittatis; foliis vaginisque glabris. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 96.

Ses feuilles sont glabres, ainsi que leurs gaines. Ses fleurs sont disposées en épis presque ternés & en ombelle. Les valves sont oblongues, aiguës, sans arêtes; celles du calice presque égales.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

67. AGROSTIS étoilé. *Agrostis stellata*. Willd.

Agrostis spicis quaternis, umbellatis; flosculis muticis, ovatis, compressis; valvulis calicinis inaequalibus, foliis vaginisque glabris. Willd. Spec. 1. pag. 376.

Ses tiges sont hautes d'environ un demi-pied, rameuses à leur base; les feuilles glabres, ainsi que leurs gaines, linéaires, en carène sur leur dos, longues d'un à deux pouces. Les fleurs disposées en forme d'ombelle, composées de quatre épis, enveloppés à leur base par une feuille spatulée. Les valves calicinales sont ovales, comprimées, mutiques, inégales.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Hélène.

68. AGROSTIS à un seul épi. *Agrostis monostachya*.

Agrostis spica foliaria, compressa, longissima; floribus sessilibus; glumis acutis; foliis latissimis, arundinaceis. (N)

Cette plante est très-éloignée, par son port, des autres espèces de ce genre; elle y convient par le caractère de ses fleurs. Ses tiges sont droites, fort élevées, rudes & anguleuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles longues, très-larges, assez semblables à celles de l'*arundo donax*, planes, glabres, très-aiguës, rudes à leurs bords, larges de deux pouces. Chaque tige est terminée par un épi étroit, long d'un pied & plus; c'est une véritable panicule, dont les ramifications, courtes, serrées & appliquées contre le rachis, offrent l'apparence d'un épi. Les fleurs sont d'un vert-jaunâtre, d'une grosseur médiocre; les valves calicinales un peu plus longues que la corolle, terminées par une pointe droite, semblable à une arête courte; la valve extérieure un peu plus longue.

Cette plante a été recueillie à Porto-Ricco, par M. Riedlé. (V. f. in herb. Desfont.)

* AGROSTIDE à feuilles menues. *Agrostis tenuifolia*. Marsh.

Agrostis paniculâ oblongâ, potentiunculâ, scabrâ; calicibus aequalibus, acutis; foliis linearis-setaceis. Marsh. Flor. cauc. 1. pag. 56.

Ses racines poussent plusieurs tiges grêles, ramifiées, hautes d'un pied. Les feuilles sont étroites, linéaires, setacées, roulées sur elles-mêmes. À peine larges d'une ligne. Les fleurs disposées en une panicule oblongue, médiocrement éralée, rude au toucher; les épillets petits, très-aigus; les valves calicinales aiguës, presque égales, un peu rudes sur leur dos; celles de la corolle très-minces, plus courtes que le calice, sans arêtes, l'une beaucoup plus courte que l'autre.

Cette plante croît sur le mont Caucase. (Marsh.)

* AGROSTIDE à panicule touffue. *Agrostis densa*. Marsh.

Agrostis paniculâ contrahâ, lobatâ, muticâ; calicibus confertis, acutis, aequalibus, corollâ duplè longioribus. Marsh. Flor. cauc. 1. p. 56.

Agrostis (palustris), paniculâ contrahâ, muticâ; calicibus aequalibus, hispidiusculis; culmo repente. Hudf. Angl. 27.

Ses tiges & ses feuilles ressemblent beaucoup à celles de l'*agrostis alba*. Les rameaux de la panicule sont chargés d'épillets très-serrés, rapprochés & comme divisés par lobes, verdâtres, plus petits que dans l'*agrostis alba*. Les valves calicinales égales, fort aiguës; celles de la corolle sans arêtes, fort petites; l'intérieure plus étroite & un peu plus courte.

Cette plante croît dans le royaume d'Immitète & sur le mont Taurus. (Marsh.)

Observations. On trouvera à l'article CHLORIS, Suppl. quelques espèces qui faisoient partie des agrostis, telles que l'*agrostis radiata*, *cruciata*, &c., & à l'article TRICHODE, vol. 8, pag. 60, l'*agrostis cornucopia*. L'*agrostis minima* Linn. forme un genre particulier qui sera mentionné sous le nom de STURMIE. (Sturmia. Pers.)

II. MILIUM. Linn.

Fleurs plus grosses; valves un peu arrondies.

69. AGROSTIS à fruits noirs. *Agrostis melanospema*. Lam.

Agrostis (milium paradoxum. Linn.), paniculâ laxissimâ; calicibus levibus, ex viridi-albidis, corollâ longioribus; arisâ terminali. Lam. Ill. n°. 808. — Schreb. Gram. tab. 28. fig. 2. (Voyez AGROSTIS, n°. 18.)

70. AGROSTIS ponctué, n°. 17. *Agrostis punctata*. Lam.

Milium punctatum. Linn. — Swartz, Observ. bot. pag. 37. — Willd. Spec. 1. pag. 339.

71. AGROSTIS

71. AGROSTIS à longue chevelure. *Agrostis comosa*.

Agrostis (miliun comosum), panicula maximâ, nutante; floribus aristatis; foliis subulperis, arundinaceis. (N.)

Gramen miliaceum, majus, nutante paniculâ, arundinaceum. Bartel. Icon. 754. — Herb. Vaillant.

Gramen figetum, paniculâ arundinacê. C. Bauh. Pin. 3. — Tournef. Inst. 124.

Gramen agrorum Lobelii. J. Bauh. Hist. 2. pag. 461. Icon.

Agrosum venti spicâ & gramen agrorum, latiore, arundinacê; comosâ paniculâ. Lobel. Icon. 3.

On distingue aisément cette espèce à sa panicule ample, penchée, touffue. Ses tiges sont droites, glabres, filées, cylindriques; les feuilles longues, élargies, planes, un peu rudes, glabres sur leurs gaines, ainsi qu'à leur orifice. La panicule est presque longue d'un pied; ses ramifications rudes, à formes, anguleuses, à divisions capillaires, froutenant des fleurs pédicellées, verdâtres, purpurines à leur base, ovales, aiguës, terminées par une arête droite, un peu plus longue que les valves.

Cette plante croît en Italie; elle a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. f. in herb. Desfont.)

72. AGROSTIS rameux. *Agrostis ramosa*.

Agrostis (miliun ramosum Retz.), culmo ramoso; floribus paniculatis, subdinatis, hirsutis. Retz. Obf. 6. pag. 12.

Ses tiges sont rameuses, comprimées, pubescentes à leurs articulations; les feuilles étroites, linéaires, glabres, ainsi que leurs gaines; les panicules réunies plusieurs ensemble, longuement pédonculées; chaque panicule partielle roide, à ramifications simples; les pédicelles velus, renflés, munis d'un rebord pileux à leur insertion, soutenant deux fleurs; l'inférieure presque sessile; les valves calicinales égales, pointues, lancéolées, pileuses; celles de la corolle plus courtes, glabres, luisantes, conniventes à leur base; l'exterieure terminée par une petite pointe roide; les stigmates bruns, plumeux, allongés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Retz.)

Observations. M. Swartz pense que l'on doit placer ici, sous le nom de *miliun villosum*, l'*Andropogon infularis* de Linné, & Lam. Dict. n°. 11. (Voyez Swartz, Prodr. 24, & Observ. 32 & 383.)

73. AGROSTIS globuleux. *Agrostis globosa*.
Botanique. Supplément. Tome I.

Agrostis (miliun globosum), paniculâ parvâ, glumis mucosis, pedicellis angulo luto. Thumb. Flor. Jap. pag. 49.

Ses tiges sont droites, simples, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles étalées, rudes, filées, lancéolées, longues à peine de trois à quatre pouces, ciliées sur le bord & à l'orifice de leur gaine. Les panicules font étalées, un peu ovales; les pédoncules & les pédicels capillaires, flexueux, munis vers leur sommet d'une bande jaunâtre, circulaire. Les valves calicinales sont ovales, obtuses, glabres, d'un vert-foncé, tirant sur le brun; celles de la corolle dépourvues d'arêtes.

Cette plante croît au Japon.

74. AGROSTIS à feuilles roides. *Agrostis rigidifolia*.

Agrostis (miliun rigidum), paniculâ simplicî, pauciflora; ramis brevibus; glumis ovato-concavis, mucosis; foliis brevibus utrinquè attenuatis, apice subulatis. (N.)

Cette plante s'élève peu. Ses tiges sont fermes, glabres, cylindriques; les feuilles courtes, dures, longues d'environ un pouce, lancéolées, filées, rétrécies & comme étranglées à leur base, planes dans leur milieu, roulées & prolongées vers leur sommet en une pointe roide, subulée, à nervures blanchâtres. Les gaines glabres, pileuses à leur orifice, plus courtes que les feuilles, couvrant toute la tige. La panicule est simple, longue d'un à deux pouces, à ramifications courtes, étalées; les fleurs glabres, petites, pédicellées, ovales, obtuses, mutiques; les valves du calice concaves, égales, à peine plus longues que celles de la corolle; celle-ci est d'un brun-noirâtre; les valves presqu'hémisphériques, un peu inégales, concaves, presque hémisphériques, ouvertes, caduques.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (V. f. in herb. Desfont.)

75. AGROSTIS fluet. *Agrostis tenella*.

Agrostis (miliun tenellum), culmo simplicî, foliis caulinibus, paniculâ subcylindricâ. Cavan. Ic. Rar. vol. 3. pag. 37. tab. 274. fig. 1.

C'est une fort petite espèce, dont les racines caillaires & fibreuses produisent plusieurs tiges grêles, droites, hautes de trois à quatre pouces. Les feuilles radicales sont capillaires, longues d'un pouce. Celles des tiges, au nombre de trois, ont leur gaine filée, renflée dans son milieu, terminée par une petite foliole subulée, aiguë, longue de trois à quatre lignes. Les fleurs forment une panicule terminale, serrée en une sorte d'épi droit, cylindrique, presque en massue; les pédicelles très-courts, sétacés. Les valves du calice

Kk

sont glabres, hémisphériques, concaves, égales, formant, avant leur épanouissement, une petite tête globuleuse; les valves de la corolle beaucoup plus petites que celles du calice, dépourvues d'arêtes.

Cette plante croît en Espagne, dans les lieux sablonneux. ○

76. AGROSTIS étalé. *Agrostis effusa*.

Agrostis (milium effusum Linn.), panicula laxa; floribus dispersis, muticis; calicibus obtusiusculis, levibus. Lam. Ill. n° 815. — Werner. Flor. dan. tab. 1143. — Leerf. Herb. pag. 18. tab. 8. fig. 7. (Voyez AGROSTIS, n° 22.)

Ses feuilles sont larges, rudes à leurs deux faces.

1. *Milium* (confertum), floribus paniculatis, confertis. Mill. Dict. n° 4.

Milium asperum, panicula coarctata; floribus coloratis, muticis. Pers. Synops. 1. pag. 74.

Les auteurs ne sont point d'accord sur cette plante; les uns la regardent comme une simple variété du *milium effusum*; d'autres pensent qu'elle doit former une espèce, étant plus hérissée que la précédente, ayant fa panicule resserree & non étalée, & ses fleurs colorées.

77. AGROSTIS bleuâtre. *Agrostis carulefcens*.

Agrostis (milium carulefcens), panicula laxa, pedunculis capillaribus; calice exteriore membranaceo, acuto, interiore subaristato. Desfont. Fl. atlant. vol. 1. pag. 66. tab. 11. — Schousb. Maroc. vol. 1. pag. 34.

Il s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses tiges sont grêles, droites; les feuilles glauques, très-glabres, distantes, munies d'une petite membrane à leur orifice. Les fleurs forment une panicule lâche, à ramifications capillaires, flexueuses, diffusées, inégales, rameuses. Les valves calicinales un peu membraneuses à leur sommet, presque égales, aiguës, convexes, bleuâtres à leur base; les valves de la corolle obtuses, l'extérieure munie d'une arête terminale, caluque, très-courte. Les semences sont brunes, oblongues, luisantes.

- Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines, dans les fentes des rochers, sur le mont Atlas. 2 (V. f.)

78. AGROSTIS comprimé. *Agrostis compressa*.

Agrostis (milium compressum), panicula elongata, pedunculis subverticillatis, glumis compressis; valvulis calicinis inaequalibus, muticis; exteriore acutiuscula, longiore; femine ovato, fisco. (N.)

Ses tiges sont hautes de deux ou trois pieds, glabres, cylindriques; les feuilles fort longues, glabres, un peu étroites; leur gaine lisse, un peu ciliée à leur bord supérieur, principalement à leur orifice. Les panicules sont droites, longues presque d'un pied, médiocrement étalées; les peduncules capillaires, presque verticillés; les pédicelles courts, alternes, droits, rapprochés des peduncules. Les fleurs glabres, comprimées; les valves du calice inégales; l'extérieure plus longue, très-aiguë; l'intérieure presque de moitié plus petite, un peu obtuse; dans la corolle, la valve la plus longue, opposée à la plus courte du calice, aiguë, concave; la plus courte presque plane, obtuse, opposée à la plus longue du calice; les semences d'un brun-noirâtre, ovales, obtuses.

Cette plante a été découverte par M. Boë, dans la Caroline. (V. f. Comm. Boë.)

79. AGROSTIS de la Jamaïque. *Agrostis jamaicensis*.

Agrostis (milium panicum), spicis subdigitatis, alternis, approximatis, filiformibus; fuscis secundis, muticis, acrospis, trigonis. Swartz, Prodr. 24, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 179.

Ses tiges sont simples, filiformes, hautes d'un pied; les feuilles lisses, linéaires, droites; les gaines pubescentes sur leur dos, pileuses à leur orifice. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, presque digités ou rapprochés, au nombre de trois ou quatre, filiformes, étalés; les pédicelles terminés par deux fleurs fort petites, ovales, aiguës, unilatérales, trigones, l'une un peu plus courte que l'autre. Les valves calicinales presque égales, striées, un peu ciliées à leurs bords; celles de la corolle aussi longues que les valves du calice, brunes, luisantes, sans arête. Les semences sont ovales, noirâtres.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les lieux arides & sablonneux.

80. AGROSTIS punaise. *Agrostis cimicina*.

Agrostis (milium cimicinum), racemis digitatis, calicum valvula exteriore digitata. Linn. Mantill. 184.

Panicum (cimicinum), panicula umbellata, racemis subquaternis; glumis calicina altera ciliata. Reiz. Obs. 3. pag. 9. — Willd. Spec. 1. pag. 344. (Voyez AGROSTIS digité, n° 20.)

81. AGROSTIS digité. *Agrostis digitata*.

Agrostis (milium digitatum), spicis digitatis, subquaternis, subfiliformibus; fuscis muticis, acrospis, secundis; foliis margine cartilagineo-ferratis. Swartz, Prodr. 24, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 181.

Les racines sont filiformes; les tiges simples, droites, glabres, hautes d'un pied, filiformes, comprimées à leur base; les feuilles courtes, lancéolées, glabres, striées, un peu rudes à leurs bords; leurs gaines comprimées, velues à leur orifice; celles des feuilles radicales velues les autres glabres. Les fleurs sont disposées en épis denses, presqu' sessiles, filiformes, longs de deux pouces, étalés, redressés. Les pédicelles sont très-courts, & supportent deux fleurs inégales; les valves calicinales égales, acuminées, striées, ciliées à leurs bords; celles de la corolle lancéolées, aiguës, & les semences brunes, oblongues.

Cette plante croît dans les prés secs, à la Jamaïque.

82. AGROSTIS comprimé. *Agrostis compressa*.

Agrostis (miliun compressum) , spicis subternis; spiculis alternis, muticis, vix adpressis; calamo medio, articulo-compresso; perianthis longissimis. Swartz, Prodr. 24, & Flor. Ind. occident. 1. pag. 183.

Cette plante est pourvue de racines blanches & filiformes, d'où s'élèvent des tiges fortement comprimées, hautes d'un pied & plus, articulées & pubescentes vers le milieu de leur longueur. Les feuilles sont presque toutes radicales, longues, glabres, linéaires; une seule vers le milieu de la tige, courte, élargie, lancéolée, pubescente à ses bords, munie d'une gaine très-longue, glabre, striée; celles des autres feuilles courtes & comprimées. Les fleurs sont disposées en épis, presque ternées, linéaires. Ces fleurs sont linéaires, alternes, sessiles, presqu'imbriquées, unilatérales; les valves calicinales, linéaires, aiguës, verdâtres, velues à leurs bords vues à la loupe; celles de la corolle une fois plus prites que le calice, dépourvues d'arêtes; les semences linéaires & comprimées.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les prés secs. (*Descript. ex Swartz.*)

83. AGROSTIS ventru. *Agrostis lendigera*.

Agrostis (miliun lendigerum Linn.), paniculâ spicidâ, pyramidalâ; spiculis subternis, basi ventricosis. Decand. Synopf. pag. 123. — Vahl, Symb. 2. pag. 18.

Agrostis australis. Linn. Mantiff. 30.

Agrostis panicea. Lam. Ill. n°. 811. — Schreb. Gram. tab. 24. fig. 3.

Agrostis ventricosa. Gouan, Hort. pag. 39. tab. 1. fig. 2. Mela. (*Voyez AGROSTIS, n°. 15.*)

Il a été reconnu que cette espèce étoit la même que l'*agrostis panicea* Linn.

84. AGROSTIS ponctué, n°. 16. *Agrostis punctata.* Lam.

Miliun punctatum. Linn. Amœn. Academ. 5. pag. 392.

Ses tiges sont élevées, glabres, un peu comprimées, coudées à leurs articulations intérieures, un peu rameuses; les feuilles glabres, planes, allongées; les gaines lisses, nues à leur orifice; les fleurs ovales, aiguës.

85. AGROSTIS du Cap, n°. 15. *Agrostis capensis.* Lam.

Miliun capense. Linn. Mantiff. pag. 185.

86. AGROSTIS noireâtre. *Agrostis nigricans.*

Agrostis (miliun nigricans), floribus paniculatis, confertis; valvulis calicinis nitidis, nigrescentibus; foliis ensiformibus, longissimis. Ruiz & Pav. Flot. peruv. vol. 1. pag. 47.

Ses tiges sont hautes, garnies de feuilles alternes, très-longues, en forme de lames d'épée; les fleurs nombreuses, assez grosses, disposées en une panicule touffue, terminale; les valves du calice luisantes & noires.

Cette plante est cultivée au Pérou, où elle porte le nom de *maïs de Guinée*. Les Péruviens en font torréfier les semences; ils en retirent une farine dont ils se nourrissent.

87. AGROSTIS houque. *Agrostis holciformis.* Marsh.

Agrostis paniculâ nutante, ramis longissimis, corollâ glabrâ; glumâ exteriori aristâ terminali, spiculâ longitudine. Marsh. Flor. taur. Cauc. 1. pag. 54.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ deux pieds; elles sont munies de feuilles longues, planes, étroites, striées. La panicule est très-ample, inclinée; les ramifications nues à leur partie inférieure; les épillet ovales, assez grands, plus rapprochés de ceux des avoines ou des *halcus*, que des *agrostis*; les valves calicinales concaves, presqu'égales, aiguës, très-glabres, d'un pourpre verdâtre, membraneuses à leurs bords; la corolle glabre, un peu plus courte que le calice; l'une de ses valves terminée par une arête de la longueur de l'épillet, & qui se tord avec l'âge.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Tauride. x (*Marsh.*)

88. AGROSTIS printanier. *Agrostis vernalis.*

Agrostis (miliun vernalis), paniculâ compressâ; spiculis alternis, approximatis, acutis, muticis; radicibus annuâ. Marsh. Flor. taur. 1. pag. 53.

« Cette espèce, dit Marsh., se rapproche
K k 2

beaucoup du *miliun effusum*; elle en diffère par ses tiges plus basses, par les feuilles beaucoup plus étroites; par les épillettes plus touffues, rapprochées; par les racines annuelles. Elle croît sur les collines du mont Caucase, fleurit au mois d'avril, & non dans le courant de juillet, comme le *miliun effusum*. ☉ (*Marsh.*)

Observations. Le *miliun latifolium*, Cavan. Ic. vol. 3, tab. 273, est la même plante que notre *paspalum racemosum*, vol. 5, pag. 32. n°. 19; la même que le *paspalum flouiferum* de Boiss & Hort. Paris.

III. MATRELLA. Pers.

89. AGROSTIS matrella. *Agrostis matrella*. Linn.

Agrostis floribus sessilibus, spicatis; foliis involutis, patentibus, bifariis. (N.)

Agrostis (matrella), *floribus racemosis; calicis valvula exteriori incurvâ, carina apice tantum dehiscente*. Linn. Mantiss. pag. 185.

Matrella juncea. Pers. Synops. 1. pag. 73.

Non agrostis juncea. Lam. Dict. n°. 31.

Cette plante forme évidemment un genre bien distinct, dont le caractère essentiel consiste dans :

Une corolle cartilagineuse ou endurcie, mutique, comprimée, à une seule ou à deux valves conniventes d'un côté, s'ouvrant longitudinalement de l'autre; point de valves calicinales.

Ce genre a été jusqu'alors très-peu connu ou mal décrit. Les individus que j'ai observés dans l'herbier de M. Desfontaines ont été reconnus par M. Valh lui-même pour être le *matrella* de Linné. D'après cette indication, j'ai la preuve que les caractères généraux indiqués par Linné n'existent pas complètement dans les individus que j'ai analysés. Je n'y ai point vu de valves calicinales : il n'en existe qu'une seule pour la corolle. Cette valve est concave, ovale, d'une seule pièce, s'ouvrant longitudinalement d'un seul côté. Peut-être n'est-elle qu'adhérente du côté opposé, & qu'elle se divise en deux valves à la maturité des semences; ce que je n'ai pu vérifier. Les ligamens sont faibles, velus.

Toute cette plante est petite; elle a le port de l'*agrostis juncea* de Lamarck; mais elle en est très-distincte, d'après l'examen que j'en ai fait dans son herbier. Ses tiges sont hautes de deux ou trois pouces, dures, grêles, cylindriques, rameuses à leur base; les racines un peu traçantes, couvertes à leur partie supérieure, ainsi que la base des tiges, par les gaines des premiers feuillets. Ces gaines sont un peu renflées, glabres, striées; les feuillets courts, dures, glabres, roulés à leurs bords, aigus, subulés, disposés sur deux rangs. Les fleurs sont

feibles, alternes, disposées, à l'extrémité des tiges, en un petit épi droit, ovale, oblong, de couleur un peu purpurine, glabre, long d'environ un demi-pouce.

Cette plante croît au Malabar & dans les Indes. ☿ (*V. f. in herb. Desfont.*)

AGUAPE. On connoît sous ce nom le népenthès dans le Brésil.

AGUARA-POUDA : herbe du Brésil, décrite imparfaitement par Marcgrave. Il dit qu'elle s'élève à un pied & demi; que les feuilles sont verticillées, au nombre de quatre ou cinq; que les fleurs, disposées en épi terminal, composées de cinq pétales, ont la couleur & l'odeur de la violette de mars.

AGUARA-QUIYA : nom brésilien d'une morelle qui paroît être l'espèce ordinaire (*solanum nigrum* Linn.) ou une espèce très-voisine. (*Juss.*)

AGUARIMA : nom caraïbe d'un genre de plantes nommé *saururus* Linn.

AGUAXIMA : nom brésilien d'une espèce de poivre, *piper umbellatum* Linn.

AGUILLON : nom provençal du *scandix pecten Veneris*.

AGUL : nom arabe de l'*hedysarum alhagi*.

AGY. C'est sous ce nom que l'on cultive le piment (*capsicum* Linn.) au Pérou, & surtout dans la vallée d'Avica. Cette culture y est si étendue, au rapport de Frézier, qu'il s'en vend chaque année dans ce lieu pour plus de quatre-vingt mille écus, quoique le prix en soit très-moderé. Le goût des Espagnols pour le fruit très-piquant de cette plante est tel, qu'ils ne peuvent s'en passer dans aucun régime.

AGYNEIA. (*Voyez AGINEL.*)

AHÉ, AHETS : mots qui, dans la langue malgache, c'est-à-dire, des habitants de Madagascar, signifient herbe en général : de là vient qu'il sert de prénom à plusieurs petites plantes herbacées, dont voici les plus remarquables d'après M. du Petit-Thouars.

AHE-PAIKI : espèce de *sauvagesia*, commune dans les marais.

AHÉ-DONGOUTS : très-petite espèce d'*utriculaire*.

AHÉ-DAVA, qui veut dire long, désigne assez

bien une espèce de perficaria, remarquable par ses feuilles longues.

ARE-TAHORI : plante aquatique, presque congénère du *val faria*. Souvent, par son abondance, elle bouche les canaux pratiqués par les naturels avec beaucoup d'industrie pour amener l'eau, quelquefois d'assez loin, dans les rizières aquatiques, qu'ils nomment *horac*.

ARETS BOULE, ARETS MANCHA, RONGONE. Ces mots, suivant Flacourt, désignent le chanvre, que les habitants de Madagascar cultivent avec soin pour le seul usage des feuilles, qu'ils emploient à la manière du tabac pour fumer. Cette pratique a lieu dans une grande partie de l'Orient, quoiqu'il soit reconnu que cet usage pernicieux cause des vertiges & une espèce de frénésie terrible. Le mot *boule* signifie *jardin* ou *endroit cultivé*.

ATHIPIHI : nom caraïbe d'une espèce d'ériothrine (*Erythrina corallo-dendron* Linn.).

AHOUI. *Cerbera*. Ce genre a pour caractère essentiel :

Un calice à cinq divisions ; une corolle en entonnoir, couronnée, à cinq découpures ; un drupe très gros, contenant une noix ossée, à une ou deux semences.

ES P È C E S.

1. **AHOUI** du Brésil. *Cerbera ahouai*. Linn.

Cerbera foliis ovatis, acutis ; laciniis corollae undulatis, calicinis foliolis reflexis. Andrew. Depos. bot. tab. 231. — Lam. Ill. tab. 170. fig. 1. (Voyez AHOUI, n° 1.)

2. **AHOUI** ovale. *Cerbera ovata*. Cavan.

Cerbera foliis ovatis, sparsis, subsessilibus ; floribus terminalibus, subsessilibus. Cavan. Ic. Rat. 3. pag. 35. tab. 170.

Abrutissant remarquable par sa fructification. Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, vertes, légèrement tomenteuses ; ses feuilles épures, ovales, presque sessiles, glauques & légèrement tomenteuses en dessous, vertes en dessus, à une seule nervure finement ramulée ; les fleurs réunies quatre ou cinq à l'extrémité des rameaux, soutenus par des pédoncules longs d'un pouce. Leur calice est composé de cinq folioles ovales, aiguës, réfléchies, conniventes à leur base. La corolle est d'un jaune-foncé ; le tube coriace, pentagone ; l'intérieur de l'orifice fermé par cinq écailles qui couvrent les étamines ; le limbe à cinq découpures un peu arquées, élargies à leur sommet ; les étamines attachées à l'orifice du tube ; les anthères sagittées, terminées par une arête courte. L'ovaire est supérieur,

ovale, environné d'un corpuscule pentagone ; le style filiforme, de la longueur du tube ; le stigmate en massue, ovale, conique & bifide à sa partie supérieure, entouré à son milieu par une pellicule circulaire, frangée, sous laquelle existent dix folioles. Le fruit n'est pas connu. (Cavan.)

Cette plante ne me paroît point convenir aux *cerbera*, mais devoir former un genre particulier lorsque le fruit sera connu ; elle croît dans la Nouvelle-Espagne. Toutes les parties sont lactescentes.

3. **AHOUI** des Indes. *Cerbera manghas*. Linn.

Cerbera foliis lanceolatis, nervis transversalibus. Linn. Syst. veget. pag. 251. — Petiv. Gazoph. tab. 16. fig. 4.

Manghas fructu venenato. C. Bauh. Pin. 440. — Rai, Hist. 1552. (Voyez AHOUI, n° 3.)

4. **AHOUI** des Antilles. *Cerbera thevetia*. Linn.

Cerbera foliis linearibus, longissimis, confertis ; floribus subsessilibus, axillaribus, elongatis. (N.) Lam. Illustr. tab. 170. fig. 2. (Voyez AHOUI, n° 1.)

5. ? *Cerbera (peruviana), foliis linearilanceolatis, confertis, longis ; pedunculis brevissimis, paucifloris*. Pers. Synops. 1. pag. 167.

Cerbera thevetia. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 2. pag. 27.

La plante est, ou une variété très-remarquable, ou plutôt une espèce particulière, qui diffère de la précédente par l'ovaire tétragone & non arrondi ; par son stigmate en tête, acuminé, accompagné de vingt petites dents recourbées, tandis que, dans la première, le stigmate est en tête ovale, bifide à son sommet ; enfin, les pédoncules sont très-courts, & garnis quelquefois de plusieurs fleurs, jusqu'à un nombre de huit. Dans la précédente, les fleurs sont presque solitaires, les pédoncules beaucoup plus longs.

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes forêts. Les Indiens forment avec ses fruits, qu'ils nomment *castibales*, des chapelets qu'ils placent à leurs cous & à leurs genoux, & qui, lorsqu'ils dansent, produisent un bruit qui leur est agréable.

5. **AHOUI** ondulé. *Cerbera undulata*. Andrew.

Cerbera foliis lanceolatis, utrinque attenuatis ; cymis ramosis, divaricatis, axillaribus. Andrew. Depos. botan. tab. 130. — Persoon, Synops. 1. pag. 166.

Cerbera (maculata), foliis lanceolatis, venosis, maculatis ; cymis axillaribus, ramosis, divaricatis. Willd. Spec. 1. pag. 1218.

* *Ochrosia maculata*. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 321, & Collect. 4. pag. 218. Excluf. fynon. Forfter. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 227.

Quoique cette efpece paroiffe fe rapprocher du *Cerbera parviflora* de Forfter, elle s'en diftingue par la forme de fes feuilles. Andrew foupçonne que les taches attribuées aux feuilles auroient été occafionnées par la prifion pendant la deficcation de la plante. Elles font glabres, lancéolées, veinées, rétrécies à leurs deux extrémités, ondulees à leurs bords. Les fleurs font axillaires, difpofées en cônes, rameufes, divariquées. La corolle eft blanche, bordée d'un beau lieret rouge.

Cette plante croît à l'île Bourbon. \bar{y}

* *Efpèces douteufes.*

* *Cerbera* (oppositifolia), *foliis oppositis, ovatis; panicula brevi, axillari; floribus parvis.* (N.) (Voyez AROUAI, pag. 62.)

* *Cerbera* (multifloriformis), *foliis ovato-oblongis, obtusis, sparsis; floribus racemosis.* (N.) (Voy. AROUAI à fruits en moule, pag. 62, qui eft aujourd'hui le *banfia multifloriformis*. Suppl. n°. 5.)

* *Cerbera* (parviflora), *foliis fclatis, obovatis*. Forft. Prodr. pag. 121. — Willden. Spec. 1. pag. 1222.

AIDIA. *Aidia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des chèvre-feuilles, qui paroît fe rapprocher des *toranthus*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles font oppofées, entières, & les fleurs en grappes.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents; une corolle monopétale, à cinq lobes; cinq anthères féfelles; un ftyle; une baie monofperme, couronnée par les dents du calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une feule pièce, tubulé, divifé à fon bord en cinq dents droites.

2°. Une corolle monopétale, fupérieure, en fonce; le tube lanugineux à fon orifice; le limbe divifé en cinq découpures lancéolées.

3°. Cinq étamines; les filamens nus; les anthères leffiles, linéaires, inférées fur les divifions de la corolle.

4°. Un ovaire ovale, adhérent, furmonté d'un ftyle de la longueur des étamines, terminé par un ftigmat: ovale, oblong.

Le fruit confifte en une baie ovale, petite, cou-

ronnée par les dents du calice, renfermant une feule femence ovale.

Observations. Loureiro, auteur de ce genre, lui a donné le nom d'*aidia*, du mot grec *aidios* (*asternus*), éternel, à caufe de la dureté & de la longue durée de fon bois.

ESPÈCE.

AIDIA de la Cochinchine. *Aidia cochinchinensis*. Lour.

Aidia foliis oppositis, lanceolatis; racemis laxis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 177.

C'est un fort grand arbre, divifé en branches & en rameaux étalés, garnis de feuilles oppofées, lancéolées, glabres, très-ennières. Les fleurs font blanches, difpofées, dans l'aiffelle des feuilles, en grappes courtes, lâches, chargées de petites baies. Le bois eft pefant, de couleur blanche, composé de fibres épaiffes. On l'emploie avec un très grand avantage dans les édifices, furtout pour les fondemens des maifons, & dans la conftruction des ponts; il dure très long tems, foit dans l'eau, foit fous la terre.

Cet arbre croît à la Cochinchine. \bar{y}

AIGRE DE CÈDRE : fuc tiré d'une efpece de citron à demi mûr des environs de San-Reino, dans l'Etat de Gènes, d'où il eft transporté, dit Pomet, en différens endroits, & employé par les parfumeurs.

AIGREMOINE. *Agrimonia*. Ce genre comprend un très-petit nombre d'efpèces toutes herbacées, munies de feuilles ailées avec une impaire, composées de folioles la plupart alternativement de grandeur inégale. Les fleurs font difpofées en épis terminaux; chacune d'elles munie de trois bractées. Linné croit, d'après Dalechamp, que le nom *agrimonia* vient par altération de celui d'*argemone*, donné à une efpece de pavot, parce que cette plante paffoit pour guérir les maladies des yeux.

ESPÈCES.

1. **AIGREMOINE officinale.** *Agrimonia officinalis*. Lam.

Agrimonia (eupatoria), *foliis caulibus pinnatis, impari petiolato; fructibus hispida.* Linn. Syft. veg. 447. — Gler. Flor. dan. tab. 588. — Blackw. tab. 21. — Luedw. E&T. tab. 29. — Lam. Ill. tab. 409. fig. 1. — Mill. Dict. n°. 1. 2.

2. *Agrimonia* (odorata), *fructibus hispida, foliis pinnatis; foliolis oblongis, inferioribus diminutis; petalis calice duplo longioribus.* AN. Hort. Kew. 2. pag. 130. — Mill. Dict. n°. 3. — Camer. Hort. 7. (Voyez AIGREMOINE, n°. 1.)

2. AIGREMOINE du Levant. *Agrimonia repens*. Linn.

Agrimonia foliis coulinis pinnatis, impari sessili; fructibus hispidis. Linn. Spec. 643. — Gært. de Fruct. & Sem. 1. tab. 73. — Lam. Ill. tab. 409. fig. 2. — Mill. Dict. n°. 4. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 130. (Voyez AIGREMOINE, n°. 2.)

3. AIGREMOINE à fleurs en faisceau. *Agrimonia agrimonoides*. Linn.

Agrimonia foliis caulinis ternatis, fructibus globosis. Linn. Syst. veget. 448.

Agrimonoïdes. Barrel. Icon. Rar. 612. (Voyez AIGREMOINE, n°. 3.)

* *Agrimonia* (parvispora), *fructibus hispidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis plurimis lanceolatis, petiolis calice sessulolongioribus*. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 130.

Observations. *Agrimonia decumbens*. Linn. f. Suppl. (Voyez ANCISTRE.)

A I L. *Allium*. Ce genre, un des plus naturels parmi les liliacées, avoit été divisé en plusieurs sections par les Anciens; elles formoient autant de genres; savoir: les oignons (*cepo*), les aulx proprement dits (*allium*), les poireaux (*porrum*) & les moly. Ces genres étoient si peu fondés, qu'ils ne peuvent pas même aujourd'hui fournir de bonnes divisions: ceux que l'on a établis depuis sont à la vérité peu naturelles, & il paroît difficile d'en trouver de satisfaisantes; elles aident du moins, dans ce genre assez nombreux en espèces, à rendre plus faciles les moyens de les reconnoître. Les divisions, appuyées sur les feuilles planes, cylindriques ou à demi cylindriques, offrent des espèces intermédiaires fort embarrassantes; elles éloignent des espèces rapprochées par d'autres rapports plus nombreux. Celles fondées sur la présence ou l'absence des bulbes dans les fleurs sont encore plus irrégulières, puisqu'il est des espèces tantôt munies, tantôt dépourvues de bulbes. Les étamines ont leurs filaments ou simples ou alternativement simples & trifides: ces derniers sont divisés à leur sommet en trois pointes subulées, l'amière placée sur la pointe du milieu. M. Decandolle a profité avec avantage de ce caractère, qu'il substitue dans les sous-divisions à celui des bulbes.

Les espèces potagères datent de la plus haute antiquité. Les Israélites, sous la conduite de Moïse, regrettoient, dans leurs déserts, les oignons dont ils se nourrissoient pendant leur esclavage en Egypte. Ces plantes étoient devenues sacrées pour les Egyptiens.

Porrum & cepa nescit violare & frangere morsu.
Omnia sunt genera quibus hæc nascuntur in hortis
Namina....

à dit Juvénal. Chacun connoît les imprecations d'Horace contre l'ail.

La saveur âcre & brûlante, l'odeur infecte & désagréable qui caractérise la plupart des aulx, sembloient devoir faire exclure ce genre de nos plantes d'agrément. Il en existe néanmoins, & l'on en a encore découvert depuis peu, de très-belles espèces, dont les fleurs attirent la vue par la belle teinte de leur couleur rose, pourpree, jaune ou d'un blanc de lait; par la grandeur remarquable de leur corolle, par l'odeur suave qu'elles exhalent, & par une certaine élégance dans leur port, qui les associe à la belle famille des liliacées.

Draparnaud a observé que presque tous les aulx devenoient bulbifères dans les années pluvieuses; alors les ombelles, au lieu de capsules, portent des bulbes: ces bulbes sont toujours sessiles au centre de l'ombelle; ce qui annonce que la nature les forme avec les sucs nutritifs destinés à la production & au développement des fleurs, des pedoncules & des capsules. Lorsque *Yolium maritimum* devient bulbifère, la tige ne se développe point, & le faisceau de bulbes est sessile au milieu des feuilles radicales.

ESPÈCES.

* Feuilles planes, coulinares; ombelle portant des capsules.

1. A I L faux-poireau. *Allium ampeloprasum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbellâ globosâ, flaminibus tricuspidatis, petalis carinâ scariosis. Linn. Spec. Plant. 423. — Haller, All. 5. Opusc. pag. 344. n°. 5. — Lam. Ill. tab. 242. fig. 1. — Mill. 4. tab. 271. — Rudb. Elyf. 2. pag. 151. fig. 1.

Porrum ampeloprasum. Mill. Dict. n°. 2.

Scorodoprasum latifolium, spontaneum, italicum; floribus dilute purpureis, odoratis. Michel. Gen. 25. tab. 24. fig. 5. (Voyez AIL, n°. 1.)

2. A I L poireau. *Allium porrum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus tricuspidatis, radice tunicatâ. Linn. Spec. Plant. 423. — Haller, All. pag. 348. n°. 7. — Blackw. tab. 421. — Camer. Epit. 321. Ic. (Voyez AIL, n°. 2.)

3. A I L linéaire. *Allium lineare*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbellâ globosâ; flaminibus tricuspidatis, corollâ duplâ longioribus. Mill. Dict. n°. 4. — Haller, All. pag. 352. n°. 9. (Voyez AIL, n°. 3.)

4. AIL odorant. *Allium suaveolens*. Jacq.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbellâ capitata; flaminibus subulatis, corollâ duplo longioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 65.

Allium (suaveolens), scapo nudo, teretifolio; foliis linearibus, carinatis; umbellâ subrotundâ, flaminibus subulatis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 364, & Collect. 2. tab. 305.

M. DeCandolle pense que cette espèce n'est qu'une variété de son *Allium ambiguum*; mais elle est beaucoup plus grande dans toutes les parties; ce qui peut-être est dû à la culture; de plus, elle est odorante, caractère dont il n'est pas fait mention dans la description de l'*Allium ambiguum*. Elle croit en Autriche. (Voyez plus bas l'AIL douteux, n°. 14.)

5. AIL rabattu. *Allium deflexum*. Willd.

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus tricuspidatis; longitudine corollâ; foliis angustolinearibus, scapo declinato. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 65.

Il se rapproche beaucoup de l'*Allium rotundum* par son port; il en diffère par les tiges ascendantes & dressées, n'ayant qu'une seule feuille caulinaires, les autres sont radicales, linéaires, très-étroites; l'ombelle n'est point globuleuse. Les étamines sont aussi longues que la corolle, & celle-ci d'un blanc-pâle.

Son lieu natal n'est point connu. (Willd.)

6. AIL à tête ronde. *Allium rotundum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus tricuspidatis; umbellâ subglobosâ; floribus lateralibus, nutantibus. L. n. Syll. Plant. 2. pag. 50. — Clus. Pann. pag. 216. tab. 219. — Hall. de All. n°. 8. — Lam. Ill. tab. 241. fig. 3. — Gærtn. de Fruct. & Sem. tab. 16. (Voyez AIL, n°. 4.)

7. AIL à feuilles de plantain. *Allium viârialis*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbellâ rotundâ; flaminibus lanceolatis, corollâ longioribus; foliis ellipticis. Linn. Spec. Plant. pag. 424. — Clus. Pann. pag. 223. tab. 224. (Voyez AIL, n°. 5.)

8. AIL velu. *Allium subhirsutum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; foliis inferioribus hirsutis, flaminibus subulatis. Linn. Spec. Plant. pag. 424. — Hall. de All. n°. 18. (Voyez AIL, n°. 6.)

9. AIL magique. *Allium magicum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; ramulo bul-

bifero, flaminibus simplicibus. Linn. Spec. 424. — Mill. Dict. n°. 6. — Hall. de All. n°. 22. (Voyez AIL, n°. 7.)

10. AIL à feuilles obliques. *Allium obliquum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus filiformibus, flore triplo longioribus; foliis obliquis. Linn. — Mill. Dict. n°. 7.

Allium ramosum. Jacq. in Icon. Rar. 2. tab. 62, & Miscell. 2. pag. 358. (Voyez AIL, n°. 8.)

11. AIL rameux. *Allium ramosum*. Linn.

Allium caule subplanifolio, umbellifero; flaminibus subulatis, longioribus; umbellâ globosâ; foliis linearibus, subconvexis. Linn. — Mill. Dict. n°. 8. (Voyez AIL, n°. 9.)

12. AIL de Tartarie. *Allium tataricum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; foliis semicylindricis; flaminibus simplicibus, umbellâ planâ. Linn. Suppl. 196. (Voyez AIL, n°. 11.)

13. AIL rose. *Allium roseum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbellâ festigiatâ; petalis emarginatis; flaminibus brevissimis, simplicibus. Linn. Syr. veget. pag. 266. — Rusb. Elyf. 2. pag. 166. fig. 17.

β. Idem, bulbiferum. — *Allium carneum*. Benth. Plant. gen. 51. (Voyez AIL, n°. 10.)

14. AIL douteux. *Allium ambiguum*. Decand.

Allium umbellâ capsuliferâ, globosâ; foliis linearibus, flaminibus exsertis, floribus bractéatis, fructu bicorni, umbellâ breviori. Decand. Synopf. p. 163.

α. *Allium* (graminifolium), caule umbellifero, umbellâ subglobosâ; flaminibus simplicibus, corollâ longioribus. Persl. Synopf. 1. pag. 456.

Allium erectorum. Decand. l. c. — Thore, Fl. Lond. 123.

β. *Allium* (appendiculatum), caule umbellifero, flaminibus subulatis; petalis internis basi auriculatis; foliis angustolinearibus, subcaïnatis. Persl. Synopf. 1. pag. 456. — Ramond. Pyren. Incd.

Sa bulbe est oblongue, entourée d'écaillés brunâtres & caduques; elle pousse une tige élevée, cylindrique, haute d'un pied & plus, munie, dans sa partie inférieure, de quelques feuilles linéaires, allongées, plus courtes que la tige, larges d'environ une ligne. Les valves de la spathe sont moins longues que l'ombelle; celle-ci est sphérique, composée de quinze à vingt fleurs; les pédoncules munis à leur base de petites bractées membraneuses. Les fleurs sont blanches, quelquefois

un peu violettes ou rougeâtres; les étamines simples, subulées, filantes, hors de la fleur.

« La variété », dit M. Decandolle, m'a été communiquée par M. Thore, qui l'a trouvée dans les landes, aux environs de Dax, où elle fleurit en été. La variété *g* a été trouvée par M. Ramond, sur les rochers des Pyrénées, vers le sommet de l'Hérins, au voisinage de Bagères, entre Luz & Lavedan, dans la vallée. Elle ressemble absolument à la précédente, excepté que les découpures intérieures de la fleur s'élargissent assez brusquement à la base, de manière à former deux appendices arrondis. Ces deux plantes me paroissent de simples variétés de *Valium saxatile* Jacq.; mais la plante de Jacquin est plus grande dans toutes ses parties. Elle est odorante, circonstance dont les botanistes français ne font pas mention. » (Decandolle.)

Observations. Le caractère des trois divisions intérieures, élargies à leur base & prolongées en appendices, est très-suffisant pour former de la plante *g* une espèce distincte, & M. Ramond m'a assuré que ce caractère étoit constant.

15. AIL de Caroline. *Allium carolinianum*. Decand.

Allium bulbo oblongo; foliis planis, linearibus, obtusis; spathe brevi, bivalvi; umbella globosa, capsulifera; filamentis subulatis; ovario trimaculato, subgloboso. Decand. — Rêdout. Lillac. vol. 2. tab. 101.

Elle a des rapports avec *Valium saxatile* de Jacquin; elle en diffère par sa hampe nue & par ses feuilles non canaliculées. Ses bulbes sont étroits, oblongues, enveloppés de tuniques brunes. Ses feuilles, toutes radicales, sont droites, planes, linéaires, obtuses, presque de moitié plus courtes que la hampe. Celle-ci est droite, cylindrique, un peu glauque, haute d'un pied & plus, terminée par une ombelle globuleuse de vingt-cinq à trente fleurs; la spathe beaucoup plus courte que l'ombelle, partagée en deux valves; les pédoncules cylindriques, un peu renflés au sommet, deux fois plus longs que la corolle, accompagnés de quelques bractées avortées; la corolle blanche, teinte de rose, à six découpures concaves, obtuses; les filaments subulés, deux fois plus longs que la corolle; les anthères ovales, comprimées, à deux lobes; l'ovaire presque globuleux, blanc, marqué de trois taches vertes à son sommet; les semences nombreuses, noires & anguleuses, disposées sur deux rangs dans chaque loge.

Cette plante a été rapportée de la Caroline par M. Bosc, cultivée dans le jardin de M. Cels.

16. AIL à fleurs d'ornithogale. *Allium ornithogaloïdes*. Bosc.

Botanique. Supplément. Tome I.

Allium scapo flaccido, compresso, nudo; foliis angustis, linearibus; umbella pauciflora; pedunculis elongatis, inaequalibus, ciliatis. (N.)

Ses tiges sont molles, herbacées, grêles, comprimées, longues de six à huit pouces, presque nues, munies seulement à leur base de quelques feuilles glabres, tendres, étroites, linéaires, en peu aiguës, un peu plus courtes que les tiges. L'ombelle est composée de fleurs peu nombreuses, accompagnée d'une spathe très-courte, concave. Les pédoncules sont inégaux, étalés, presque capillaires, soutenant une fleur blanche, semblable à celle de quelques ornithogales; les découpures oblongues, lancéolées, aiguës; les étamines plus courtes que la corolle; les anthères oblongues, obtuses à leurs deux extrémités; les capsules ovales, arrondies. Je n'y ai point remarqué de bulbes.

Cette plante m'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline. (V. f.)

17. AIL glauque. *Allium glaucum*. Schrad.?

Allium scapo subnudo, glauco; foliis linearibus, acutis; plantis; floribus capitatis; acutis; filamentis basi dilatatis, corollis brevioribus. (N.)

Ses tiges sont hautes d'un pied & demi & plus, un peu comprimées, feuillées seulement à leur base; les feuilles vaginales à leur partie inférieure, planes, étroites, linéaires, aiguës, plus courtes que les tiges; les fleurs pédicellées, réunies en une tête ombellée, un peu arrondie, entourée d'une spathe large, concave, biseulée, membraneuse, plus courte que l'ombelle. La corolle assez grande, d'un blanc teint de rose, à six découpures lancéolées, aiguës; les étamines simples; les anthères ovales, élargies à leur base; les filaments subulés, élargis à leur base; l'ovaire globuleux; point de bulbes.

J'ignore le lieu natal de cette plante, que l'on cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f. in herb. Desfont.)

18. AIL à fleurs aiguës. *Allium acutiflorum*. Loef.

Allium caule planifolio, umbellifero; umbella subglobosa; petalis lanceolatis, acutis; filamentis trifidis; filamentis marginis ciliatis. Loef. Journ. bot. 2. pag. 279.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, hautes d'un pied, garnies à leur partie inférieure de feuilles planes, linéaires, longues de six pouces, très-glabres. La spathe est d'une seule pièce; il en sort une ombelle d'environ quarante rayons, formant une tête presque globuleuse. La corolle d'un pourpre-clair; les pétales lancéolés, aiguës; les

étamines à trois pointes, de la longueur des pétales; les filaments ciliés à leurs bords.

Cette plante a été découverte par M. Perret, dans le Piémont, à Tende & au mont Gros; elle fleurit au mois de juin. (Loisel.)

* * Feuilles planes & caulinaires; ombelles portant des bulbes.

19. AIL potager. *Allium sativum*. Linn.

Allium caule planifolio, bulbifero; bulbo composto, flaminibus tricuspidatis. Linn. Spec. Plant. pag. 425.

β. *Allium bulbo simplici*. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 151. (Voyez AIL, n°. 12.)

La variété β a la bulbe simple; elle a été découverte par M. Gerard, sur le bord de la mer, près des îles d'Hières. On la soupçonne la souche primitive de notre ail potager.

20. AIL rocamboule. *Allium scorodoprasum*. Linn.

Allium caule planifolio, bulbifero; foliis crenatis, vaginis ancipitibus; flaminibus tricuspidatis. Linn. Spec. pag. 425. (Voyez AIL, n°. 13.)

21. AIL des sables. *Allium arenarium*. Linn.

Allium caule planifolio, bulbifero; vaginis teretibus, spathâ mucidâ, flaminibus tricuspidatis. Linn. Spec. pag. 425. (Voyez AIL, n°. 14.)

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente.

22. AIL en carène. *Allium carinatum*. Linn.

Allium caule planifolio, umbellifero; flaminibus subulatis. Linn. Spec. pag. 426. — Haller de AIL, n°. 27. tab. 2. fig. 2. (Voyez AIL, n°. 15.)

* * * Feuilles cylindriques & caulinaires; ombelle portant des capsules.

23. AIL à tête sphérique. *Allium sphaerocephalon*. Linn.

Allium caule teretifolio, umbellifero; foliis semiteretibus; flaminibus tricuspidatis, corollâ longioribus. Linn. Spec. Plant. 426.

Allii genus forte, scorodoprasum alterum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 164. l.c. 2. (Voyez AIL, n°. 16.)

24. AIL à fleurs nombreuses. *Allium multiflorum*. Desfont.

Allium foliis carinatis, caule superne nudo; capite rotundo, non bulbifero; flaminibus tricuspidatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 288.

Il se rapproche de l'*allium sphaerocephalon*, dont

il diffère principalement par ses feuilles relevées en carène. Ses bulbes sont ovales, revêtus d'enveloppes blanchâtres, membraneuses; les tiges droites, hautes de deux à trois pieds, légèrement striées; les feuilles glabres, aiguës, larges de trois à quatre lignes. Les fleurs sont très-nombreuses, réunies en une tête arrondie, enroulées d'une spathe à deux valves concaves à leur base, caliques, à deux pointes en forme de cornes; les pédoncules filiformes; la corolle violette, à découpures aiguës; les filaments plus longs que la corolle, alternativement dilates, à trois pointes; les deux latérales filamenteuses.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines aux environs d'Alger. (V. f. in herb. Desfont.)

25. AIL descendant. *Allium descendens*. Linn.

Allium caule subteretifolio, umbellifero; pedunculis exterioribus brevioribus; flaminibus tricuspidatis. Linn. Hort. Upsal. 78. & Spec. Plant. 426.

Allium flaminibus alternè trifidis, foliis fistulosis; capite sphaerico, non bulbifero; atropurpureo. Haller, de AIL, n°. 11. tab. 2. fig. 1.

Moly atropurpureum. Swartz, Florig. tab. 60.

M. de Lamarck a regardé cette plante comme une simple variété de la précédente. Haller n'est point de cette opinion, & croit qu'elle doit être distinguée comme espèce. Ses fleurs forment par leur réunion une tête ovale, allongée. Les pédoncules intérieurs sont beaucoup plus longs que les extérieurs. Les feuilles sont longues d'un pied, roulées en cylindre, semblables à celles des joncs; les tiges hautes de trois pieds; les étamines très-saillantes hors des fleurs; les semences anguleuses, ainsi que les capsules.

Cette plante croit dans la Suisse. (Voyez AIL, n°. 17.)

26. AIL à petites fleurs. *Allium parviflorum*. Linn.

Allium caule subteretifolio, umbellifero; umbellâ globose; flaminibus simplicibus, corollâ longioribus; spathâ subulata. Linn. Spec. Plant. 427.

β. *Idem, floribus cinereis*. (*Allium parviflorum*.) Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 290. (Voyez AIL, n°. 17.)

La variété β, observée en Barbarie par M. Desfontaines, diffère de la plante de Linné par la couleur luisante & cendrée de ses fleurs, traversées par une ligne verdâtre.

27. AIL de Pallas. *Allium Pallasii*. Murr.

Allium caule subteretifolio, umbellifero, difformi; flaminibus simplicibus, corollam aequantibus; stylo

brevissimo. Murr. Comm. Gœtt. 6. 1775. pag. 31. tab. 3.

Ses bulbes sont globuleuses, solitaires, tuni-
quées, de la grosseur d'une petite noisette ; les
tiges grêles, cylindriques, feuillées, hautes d'un
pied & demi ; les feuilles plus courtes que les
tiges, subulces, à demi cylindriques, vaginales ;
leur gaine pâle, striée, marquée de lignes vio-
létiques. L'apathie se divise en deux grandes valves,
une fois plus courte que l'ombelle. Celle-ci est
arrondie, à fleurs nombreux, plusieurs stériles,
soutenues par des pédoncules longs d'un pouce,
de couleur purpurine, épaissis vers leur sommet.
La corolle est petite, purpurine ; les pétales égaux,
ovales-lancéolés ; les étamines aussi longues que la
corolle ; les filaments pourpres & subulces ; les an-
thères brunes ; le style très-court ; les capsules
triangulaires.

Cette plante croît dans la Sibérie. ✕

28. AIL musqué. *Allium moschatum*. Linn.

*Allium caule teretifolio, umbellifero ; umbellâ
sustentâ, subsexflorâ ; petalis acutis, flaminibus
simplicibus, foliis satocis*. Linn. Spec. Plant. pag.
427. — Haller, de All. n°. 17. (Voyez Ail.,
n°. 18.)

29. AIL jaune. *Allium flavum*. Linn.

*Allium caule teretifolio, umbellifero ; floribus
pendulis, petalis ovatis, flaminibus corollâ longio-
ribus*. Linn. Spec. Plant. 427. — Hallet, de All.
n°. 24.

Allium flore luteo seu pallido. J. Bauh. Hist. 2.
pag. 561. 1c.

Allium fœ moly montanum quartum. Clus. Pann.
pag. 216. tab. 17. 18, & Hist. 194. (Voyez Ail.,
n°. 19.)

30. AIL à fleurs pâles. *Allium pallens*. Linn. *

*Allium caule subteretifolio, umbellifero ; floribus
pendulis, truncatis ; flaminibus simplicibus, corollâ
equantibus*. Gouan, Illustr. 24. — Linn. Spec. 427.
(Voyez Ail., n°. 20.)

31. AIL paniculé. *Allium paniculatum*. Linn.

*Allium caule subteretifolio, umbellifero ; pedunculis
capillaribus, effusis ; flaminibus simplicibus, spathâ
longissimâ*. Linn. Spec. 428. — Hall. de All. n°. 25.
1c. tab. 1. fig. 1. (Voyez Ail., n°. 21.)

32. AIL odoriférant. *Allium odoratissimum*. Desfont.

*Allium bulbis tunicato, poroso ; foliis linearibus-subul-
catis, crassiusculis ; spathâ brevi, subquadrifidâ ; flo-*

ribus umbellatis, non bulbiferis. Desf. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 189. tab. 83.

Ses bulbes sont ovalés, tuniqués ; les tuniques
extérieures sèches, membranées, déchirées à
leur sommet, percées d'un grand nombre de po-
res. Les hampes sont grêles, nues, longues d'un
pied & demi ; les feuilles glabres, étroites, un
peu charnues, linéaires, subulces, plus courtes
que les tiges ; les ombelles médiocrement étalées,
développées d'une spathe membraneuse, courte,
se déchirant en trois ou quatre découpures ovales,
aiguës ; les pédoncules presque égaux, longs d'en-
viron un pouce ; les fleurs blanches ; les décou-
pures de la corolle elliptiques, un peu obtuses,
les étamines une fois plus courtes que la corolle.
Ces fleurs sont très-odorantes ; elles se montrent
dans l'hiver.

Cette plante a été découverte par M. Desfont-
aines en Barbarie, dans les sables du désert, aux
environs de Casa & de Tozzat. ✕ (V. f. in herb.
Desfont.)

*** Feuilles cylindriques & coulinaires ; ombelle
portant des bulbes.

33. AIL des vignes. *Allium vineale*.

*Allium caule teretifolio, bulbifero ; flaminibus tri-
cuspidatis*. Linn. Spec. Plant. 428. (Voyez Ail.,
n°. 22.)

34. AIL des lieux cultivés. *Allium oleraceum*. Linn.

*Allium caule teretifolio, bulbifero ; foliis scabris,
semiteretibus, subtus sulcatis ; flaminibus simplicibus*.
Linn. Spec. Plant. pag. 129. (Voyez Ail., n°. 23.)

***** Toutes les feuilles radicales ; hampes
nues.

35. AIL penché. *Allium nutans*. Linn.

*Allium scapo nudo, ancipiti ; foliis linearibus,
planis ; flaminibus tricuspidatis*. Linn. Spec. p. 429.
(Voyez Ail., n°. 24.)

36. AIL anguleux. *Allium angulosum*. Linn.

*Allium scapo nudo, ancipiti ; foliis linearibus,
canaliculatis, subtus subangulatis ; umbellâ sessiliâ*.
Linn. Spec. 430. — Jacq. Austr. tab. 423. —
Bauh. Hist. 2. pag. 564. Icon. (Voyez Ail.,
n°. 25.)

37. AIL des prés. *Allium senescens*. Linn.

*Allium scapo nudo, ancipiti ; foliis linearibus,
subtus convexis, levibus ; umbellâ subrotundâ, fla-
minibus subulatis*. Linn. Spec. 430.

Allium umbelliferum, pratense. J. Bauh. Hist. 2. pag. 564. 1c.

Les auteurs ne font point d'accord sur cette plante & la précédente. Les uns pensent, avec Linné, qu'elles doivent être séparées comme espèces; les autres, avec Haller, les regardent comme variétés. M. Willdenow affirme qu'elles sont réellement distinctes, les ayant cultivées pendant plus de vingt ans. Dans celle-ci, les racines sont traçantes, les tiges à deux angles, mais point striées; les feuilles convexes en dessous, très-lisses, point anguleuses ni striées; les ombelles de forme arrondie, point fistigées; les divisions de la corolle point conniventes, mais étalées & rectifiées; les étamines plus longues que la corolle.

Cette plante croît en Suisse, en Sibérie, &c. &

38. AIL échallotte. *Allium ascalonicum.* Linn.

Allium scapo nudo, tereti; foliis subulatis, umbellâ globosâ, flaminibus triestigatis. Linn. Spec. Plant. pag. 429. (Voyez Ail, n°. 34.)

39. AIL d'Illyrie. *Allium illyricum.* Jacq.

Allium scapo nudo, tereti; foliis linearibus, carinatis, planis, umbellâ fistigatâ, flaminibus subulatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 76. — Jacq. Icon. 2. tab. 365, & Col. c. 3. pag. 273.

Ses tiges sont droites, nues, glabres, cylindriques, garnies de feuilles toutes radicales, linéaires-lancéolées, un peu canaliculées à leur base, puis planes, légèrement relevées en carène sur leur dos. Les fleurs sont disposées en une ombelle fistigée; les étamines subulées.

Cette plante croît en Autriche, dans les vignes. &

40. AIL à grandes fleurs. *Allium grandiflorum.* Linn.

Allium (narcissiflorum), scapo nudo, tereti, foliis linearibus subulatis longioribus, umbellâ fistigatâ, pediculis mucronatis, flaminibus simplicibus. Willden. Spec. 2. pag. 77.

Allium narcissiflorum. Vill. Dauph. 2. pag. 258. tab. 6. (Voyez Ail, n°. 28.)

41. AIL odorant. *Allium odorum.* Linn.

Allium scapo nudo, teretifloro; foliis linearibus, canaliculatis, subius angulatis; umbellâ fistigatâ. Linn. Mantiss. 62.

Ses tiges sont hautes d'un pied, droites, cylindriques ou munies d'un angle à peine sensible; les feuilles radicales, presque fasciculées, linéaires, allongées, à peine charnues, légèrement velues, striées en dessous, canaliculées en dessus. La spathe

est courte; les pédoncules disposés en ombelle, droits, plus longs que les fleurs, accompagnés à leur base de petites bractées membranacées. La corolle est blanche, odorante; ses découpures ovales, oblongues, un peu aiguës, brunes sur leur carène; les étamines simples, tubulées, une fois plus courtes que la corolle; l'ovaire cendré, marqué de points enfoncés; le style blanc.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. &

42. AIL inodore. *Allium inodorum.* Ait.

Allium scapo nudo, subtriquetro; foliis linearibus, planis, subius carinatis; umbellâ fistigatâ, fistigatâ; flaminibus simplicibus. Aiton, Hort. K. w. vol. 1. pag. 427. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 76.

Cette espèce, que je ne connais pas, se rapproche, selon Willdenow, de l'ail ascalonique; mais elle est deux fois plus grande. Ses tiges sont nues, un peu triangulaires; les feuilles toutes radicales, planes, linéaires, en carène à leur face inférieure. L'ombelle est chargée de fleurs fistigées; les étamines simples.

Cette plante croît à la Caroline. &

43. AIL à odeur de vanille. *Allium fragrans.* Vent.

Allium scapo tereti; foliis linearibus, carinatis, obtusis, contortis; pedunculis nudis, flaminibus filamentis planis. Vent. Hort. Cels. tab. 26.

Cet ail est remarquable par ses fleurs très-odorantes, & dont l'odeur approche de celle de la vanille. Ses bulbes sont arrondies, revêtues de membranes blanchâtres; les hampes cylindriques, finement striées, un peu glauques, deux fois plus longues que les feuilles; celles-ci linéaires, obtuses, canaliculées, striées, un peu épaisses; la spathe courte, s'ouvrant en deux valves ovales oblongues, aiguës, presque égales; environ dix à seize fleurs disposées en une ombelle lâche, inclinée avant la floraison, d'un rose-tendre, puis d'un blanc de lait, parsemées de lignes pourpurines; les découpures de la corolle ovales-oblongues, presque obtuses; les étamines planes, aiguës, plus courtes que la corolle, rapprochées en cylindrique; les anthères oblongues, d'un pourpre-foncé, à deux lobes, creusées de quatre sillons; l'ovaire ovale, d'un vert-foncé; le style triangulaire, plus court que les étamines; le stigmate tronqué.

Cette plante, originaire de l'Afrique, est cultivée au Jardin des Plantes. & (V. v.)

44. AIL strié. *Allium striatum.* Jacq.

Allium scapo nudo, obsolete triquetro; foliis linearibus, obliquis, subcanaliculatis, subius striatis;

umbellâ sagittariâ, pauciflorâ. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 366, & Collect. Suppl. 51. * — Willd. N. Spec. Plant. 1. pag. 77. — Redout. Liliac. vol. 1. tab. 50.

Cette espèce est remarquable par ses étamines légèrement réunies à leur base, & par ses feuilles linéaires ou filiformes, n'exhalant aucune mauvaise odeur. Sa bulbe est ovale, de la grosseur d'une petite noix; elle produit cinq à six feuilles radicales, linéaires, presque ovales, creusées en gouttière, étalées, longues d'environ huit pouces. De leur centre s'élèvent une ou deux tiges nues, glabres, un peu triangulaires, plus courtes que les feuilles. La spathe se divise en deux folioles opposées, courtes, oblongues, aiguës, persistantes, enveloppant une ombelle étalée, composée d'environ dix fleurs blanches, d'une médiocre grandeur, légèrement odorantes. Les pédoncules sont grêles, cylindriques; la corolle divisée en six découpures oblongues, presque obtuses; les filamens subulés, à peine de la longueur de la corolle, légèrement adhérens à leur base; le stigmate triangulaire; la capsule à trois angles obtus; les semences noires & anguleuses.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. f.)

45. Ail grêle. *Allium gracile*. Ait.

Allium scapo nudo, tereti, longissimâ; foliis linearibus, canaliculatis; flaminibus subulatis, basi connatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 419. — Andréw, Botan. rep. vol. 2. tab. 107.

Plus crêlée que la précédente, cette plante n'en parait être qu'une variété, ayant, comme elle, les étamines un peu réunies à leur base. Ses tiges sont nues, cylindriques, beaucoup plus longues que les feuilles, crêlées, hautes de trois pieds; les feuilles toutes radicales, linéaires, canaliculées, approchant de celles des narcisses. Les fleurs sont droites, blanches, onguiculées; les onglets forment, avec la base des éminences, un cône verdâtre.

Cette espèce croit à la Jamaïque. ✕

46. Ail globuleux. *Allium globosum*.

Allium foliis teretibus, filiformibus; flaminibus simplicibus, perigonio acutissimo longioribus; bulbis oblongis; scapo tereti, suanudo; umbellâ globosâ. D. Caud. — Redout. Liliac. vol. 3. tab. 179.

Ses bulbes sont grêles, oblongues, réunies par fascicules; elles produisent toutes une tige droite, cylindrique, un peu tortueuse, garnie à sa base de feuilles filiformes, cylindriques, d'une odeur d'ail, plus courtes que la hampe. La spathe se divise en deux valves inégales, subulées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en une ombelle

globuleuse, d'un rose-vif, soutenues par des pédoncules rougeâtres, plus longs que les fleurs, dépourvus de bractées. La corolle est en forme de cloche, divisée en six découpures égales, lanceolées, aiguës; les étamines saillantes; les filamens filiformes, de couleur de rose; les anthères droites, ovales, d'un rouge de brique; l'ovaire ovale-globuleux; les carpiques à trois angles saillants; les semences noires & anguleuses.

Cette plante croit sur le mont Caucas, où elle a été découverte par M. Marshall, qui en a envoyé des graines au Jardin des Plantes. Elle fleurit vers le milieu de l'été.

47. Ail du Piémont. *Allium pedemontanum*. Willd.

Allium scapo subterragano; foliis linearibus, obtusis; umbellâ pauciflorâ. Willd. Spec. 2. pag. 77.

Allium nigrum. All. on. Ped. n°. 1881. tab. 25. fig. 1. Non Linn.

Allium narcissifolium. Lam. Dict. pag. 68. Non Scopol. (Voyez Ail, n°. 26.)

48. Ail noir. *Allium nigrum*. Linn.

Allium scapo nudo, tereti; foliis linearibus, umbellâ hemisphericâ, petalis patentibus, flaminibus simplicibus. Linn. Spec. 430.

Allium monspessulanum. Gouan, Ill. 24. tab. 16. — Lam. Dict. 1. pag. 68.

Allium multibulbosum. Jacq. Austr. t. pag. 9. tab. 10. (Voyez Ail, n°. 27.)

49. Ail du Canada. *Allium canadense*. Linn.

Allium scapo nudo, tereti; foliis linearibus; capitato bulbifero. Linn. Spec. 430.

Est-ce *Allium canadense*? Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 194. (Voyez Ail, n°. 29.)

Il est douteux que la plante de Michaux soit la même que celle de Linné. Ses feuilles sont planes, canaliculées, étroites, linéaires, allongées; ses hampes nues, comprimées, un peu plus longues que les fleurs; les ombelles peu garnies; la spathe très-courte; les pédoncules redressés, allongés, à peine au nombre de huit; les découpures de la corolle lanceolées, avec une nervure d'en verticillaire; les étamines simples. (Michaux.)

50. Ail changeant. *Allium mutabile*. Mich.

Allium scapo tereti, foliis supernâ subteracco-convolatis, flaccidis; umbellâ submultiflorâ, flaminibus simplicibus. Pers. Synop. 1. pag. 357. — Mich. Flor. boreal. Amer. t. pag. 195.

Ses bulbes sont arrondies, enveloppées de membranes fibreuses; les tiges droites, cylindriques;

les feuilles radicales, plus courtes que les tiges, planes, canaliculées, molasses, presque sétacées & roulées à leur partie supérieure. La spathe est courte; les ombelles composées de plusieurs fleurs; quelquefois elles portent des bulbes, & alors les fleurs sont moins nombreuses. La corolle est d'un blanc lavé de rose; ses découpures ovales-lancéolées; les étamines très-simples. Quelquefois les ombelles ne sont composées que de bulbes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale; elle fleurit au commencement de mai. (Michaux.)

51. AIL à trois cornes. *Allium tricorne*. Hort. Paris.

Allium caule nudo, compresso, acutius; foliis planis, linearibus, striatis; umbellâ reflexâ; flaminibus simplicibus, corollâ longioribus. (N.)

Ses bulbes sont ovales, de la grosseur d'une noix, enveloppées de membranes roussâtres; les tiges simples, hautes d'environ un pied, nues, comprimées, à deux angles opposés, sillons. Les feuilles sont radicales; elles enveloppent la tige par une gaine un peu lâche, longue de deux ou trois pouces, prolongée en une feuille plane, linéaire, frisée, large d'environ deux lignes, un peu plus courte que les tiges. La spathe est membraneuse, divisée en deux découpures inégales, plus longues que les pédoncules. Ceux-ci sont nombreux, & forment une ombelle rouffue, fortement inclinée pendant la floraison. La corolle est d'un blanc lavé de rose; trois de ses divisions plus aiguës que les autres; les étamines saillantes; les anthères petites, ovales.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. L'ignote son lieu natal. ♀ (V. f. in herb. Desfont.)

52. AIL à feuilles de primevère. *Allium ursinum*.

Allium scapo nudo, triquetris; foliis lanceolatis, petiolatis; umbellâ saggittatâ. Linn.

Allium petiolatum. Lam. D. & 1. p. 69. (Voyez Ail, n°. 31.)

53. AIL de l'Écluse. *Allium elusianum*. Willd.

Allium scapo nudo, tereti; foliis linearibus, planis, ciliatis; umbellâ pauciflorâ; petalis obovatis, concavis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 79. — Retz, in Litt.

Moly minus. Clus. Hist. 1. pag. 191. Icon. Bona. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 563. Icon.

Cet ail a des bulbes fort petites, à peu près de la grosseur d'un pois, blanches, ovales; il en sort des feuilles graminiformes, planes, linéaires,

molasses, plus longues que les tiges, munies à leurs bords de poils blanchâtres. Ses tiges sont cylindriques, longues de six à huit pouces, terminées par une ombelle peu garnie, enveloppée par une spathe d'abord cylindrique, subulée, qui se déchire ensuite irrégulièrement. Les pédoncules sont inégaux, longs d'un demi-pouce à un pouce; la corolle blanche, ouverte, inodore; les découpures concaves, un peu arrondies, en carène sur leur dos, trois alternes plus larges; les étamines très-simples, blanches, de la longueur de la corolle; l'ovaire d'un blanc-verdâtre; le style blanc; le stigmate simple. Ses bulbes ont l'odeur & la saveur de l'oignon.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. ♀

54. AIL triangulaire. *Allium triquetrum*. Linn.

Allium scapo nudo foliosque triquetris; flaminibus simplicibus. Linn. Spec. pag. 431. (Voyez Ail, n°. 30.)

55. AIL blanc. *Allium album*. Sant.

Allium scapo nudo, obsoletè triquetris; foliis radicalibus linearilanceolatis, canaliculatis, carinatis; umbellâ capsuliferâ, petalis ovatis, flaminibus simplicibus. Loef. Journ. bot. 2. pag. 280. — Senti, Viagg. p. 352. tab. 7. — Ex Bertol. Plant. Gen. pag. 51.

« Cette espèce, dit M. Loiseleur de Longchamps, est bien distincte de l'*Allium triquetrum*. Sa tige est plus fortement triangulaire; les pétales lancéolés, traversés par une nervure longitudinale, rouffâtre. Sa spathe s'ouvre en deux pièces. Elle est commune dans le pays de Gènes & aux environs de Toulon. Elle fleurit au mois d'avril. ♀

56. AIL oignon. *Allium cepa*. Linn.

Allium scapo nudo, infernè ventricoso, longiore foliis teretibus. Linn. Spec. 431. — Lam. Ill. tab. 242. fig. 2. — Tournef. Inst. tab. 205. (Voyez Ail, n°. 35.)

57. AIL doré. *Allium moly*. Linn.

Allium scapo nudo, subcylindrico; foliis lanceolatis, sessilibus; umbellâ saggittatâ. Linn. Spec. Plant. pag. 432.

Allium aureum. Lam. D. & 1. pag. 69.

Moly flavo flore. Swert. Floril. 1. tab. 60. fig. 2. (Voyez Ail, n°. 32.)

58. AIL à fleurs de scorfonère. *Allium scorfoneraefolium*. (Desfont.)

Allium foliis linearilanceolatis, concavis, subita nervosis; umbellâ pauciflorâ, bulbiferâ; ovario

hexaptero; *flaminibus simplicibus, inclusis*. Desfont. Catal. Hort. Paris. — Redout. Liac. vol. 2. tab. 99.

Cette espèce a des rapports avec l'*Allium mo'y*; elle en diffère par ses feuilles plus étroites, concaves, à fortes nervures; par ses ombelles chargées de bulbes; par ses fleurs peu nombreuses; par ses ovaires à six angles faillans. Sa bulbe est blanche, de la grosseur d'une petite noix; elle pousse de son sommet un petit nombre de feuilles, quelquefois plus longues que les tiges, linéaires, lancéolées, canaliculées, à trois sortes de nervures parallèles: de leur milieu s'élève une tige droite, cylindrique, terminée par une ombelle de quatre à six fleurs très-étalées, jaunes, un peu verdâtres sur leurs nervures, munies, à la base des pédoncules, de deux ou trois bulbes ovales, fistules, accompagnées d'une bractée membraneuse & blanchâtre. La spathe qui enveloppe l'ombelle est enrièr, ovale, concave, rejetée d'un seul côté; les pédoncules grêles, deux fois plus longs que la spathe. La corolle est en cloche, à six découpures ovales, oblongues, un peu obtuses; les étamines plus courtes que la corolle; les anthers droites, à deux loges; l'ovaire jaunâtre, hexagone, à six crêtes saillantes entre les filaments des étamines.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est point connu. (V. v.)

59. AIL à trois coques. *Allium tricoccum*. Ait.

Allium scapo nudo, semitereti; foliis lanceolato-oblongis, planis, glabris; umbellâ globosâ, seminibus foliariis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 428.

Ses tiges sont nues, à demi cylindriques; les feuilles toutes radicales, glabres, planes, oblongues, lancéolées. Les fleurs sont disposées en ombelles globuleuses; les capsules ne renferment chacune qu'une seule semence.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

60. AIL fistuleux. *Allium fistulosum*. Linn.

Allium scapo nudo, adaequant folia teretia, ventricosa. Linn. Hort. Upl. 78. — H. J. de All. n°. 13. Excluf. Dodonæi Synonym. ex Hall.

5. *Allium alticum*. Pall. Itin. 2. Append. n°. 108. tab. R.

Cette espèce paroît d'abord ne devoir être considérée que comme une variété de l'*Allium cepa*. C'étoit l'opinion de M. de Lamarck. Linné & Haller la regardent comme distincte; mais ce dernier croit que le *cepa oblonga*, Dodon. p. 687, ne doit pas être rapporté à cette plante, mais à l'*Allium cepa*. La principale différence consiste dans les étamines, alternativement trifides dans l'*al-*

lium cepa, simples dans celui-ci. Ses tiges sont ventrues dans leur milieu; les feuilles fistuleuses, plus courtes que la hampe; les fleurs blanches, nombreuses; les trois divisions extérieures de la corolle plus courtes; les filaments rapprochés, élargis à leur base; les capsules arrondis, à trois loges, en forme de trois coques; les semences noires & anguleuses; même odeur que celle de l'oignon. Son lieu natal n'est pas connu. ♀ La variété 5 croît en Sibérie. Selon Willdenow, elle n'offre d'autre différence qu'en ce qu'elle est beaucoup plus petite.

61. AIL civette. *Allium f. haenrorasum*. Linn.

Allium scapo nudo, adaequant folia teretia, subulato foriformia. Linn. Spec. pag. 432. (Voy. AIL, n°. 35.)

62. AIL feuillé. *Allium foliosum*. Decand.

Allium umbellâ caespitosa, cœteris; foliis teretibus, subulato filiformibus; aliis radicalibus, alia ad basim caulis insertis. Decand. Synopf. pag. 164.

Ses bulbes sont ovales, blanchâtres; les racines composées de longues fibres blanches, faiculées; les tiges droites, hautes de huit à dix pouces, cylindriques, glabres, striées, presque nues. Les feuilles sont presque cylindriques, épaissies d'une ligne, subulées, plus courtes que les tiges; les unes radicales; d'autres enveloppent la base de la tige par une gaine longue d'environ deux pouces, striée, un peu purpurine à sa partie inférieure. Les fleurs sont réunies en une ombelle globuleuse; les pédoncules courts; la spathe divisée en deux découpures lancéolées, aiguës, un peu élargies, plus courtes que l'ombelle; la corolle purpurine; ses divisions lancéolées, presque mucronées; les étamines simples, plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans les Pyrénées. ♀ (V. f. in herb. Desfont.)

63. AIL de Sibérie. *Allium sibiricum*. Linn.

Allium scapo nudo, tereti; foliis semicylinaricis, flaminibus subulatis. Linn. Mant. 562. (Voy. AIL, n°. 37.)

64. AIL sétacé. *Allium setaceum*.

Allium scapo nudo, tereti; foliis setaceo-subulatis, ciliato-ferratis; petalis ovato-lanceolatis, apice emarginatis. Plant. Hung. pag. 70. tab. 68.

Ses tiges sont nues, glabres, cylindriques. Les feuilles, toutes caulinaires, sont sétacées, subulées, presque denticulées & ciliées à leurs bords; les fleurs disposées en ombelle, enveloppées à la base des pédoncules par une spathe longuement mucronée; les divisions de la corolle ovales-lancéolées, échancrées à leur sommet.

Cette plante croît en Hongrie, aux lieux pierreux & stériles.

65. AIL de Portugal. *Allium lusitanicum*. Lam.

Allium scapo nudo, tereti; foliis filiformibus, flaminibus corollâ longioribus; spathe ovata, bifida; umbellâ confertâ. (N.) (Voyez AIL, n°. 36.)

66. AIL à feuilles capillaires. *Allium capillare*. Cavan.

Allium scapo nudo, tereti; foliis capillaceis, umbellâ pauciflorâ; petalis lanceolatis, acutis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 82. — Cavan. Icon. Bar. 3. pag. 4. tab. 206. fig. 1.

Cet ail paroît se rapprocher beaucoup de l'*Allium lusitanicum*; mais les étamines sont plus courtes que la corolle; ses feuilles plus fines; la spathe très-étroite; les ombelles peu garnies. Ses tiges sont gielles, droites, nues, cylindriques, hautes d'un pied; les feuilles toutes radicales, plus courtes que les tiges, fines, capillaires, vaginées à leur base. La spathe est étroite, courte, zigüé, d'une seule pièce, déchirée par l'expansion des pedoncules; ceux-ci au nombre de six à neuf, longs d'un demi-pouce, disposées en une ombelle lâche. La corolle est purpurine, à six divisions oblongues, aiguës, les étamines subulées, plus courtes que la corolle; les anthères brunes, ovales, un peu écharcées à leur base; l'ovaire globuleux, turpment d'un style plus court que les étamines. Le fruit est une capsule globuleuse, à trois filons, contenant, dans chaque loge, ordinairement deux semences noires, ovales.

Cette plante croît en Espagne, aux environs de Valence; elle fleurit en juillet. (V. f. in herb. Desfont.)

67. AIL à feuilles menues. *Allium tenuissimum*. Willd.

Allium scapo nudo, tereti; foliis lineari-subulatis, umbellâ pauciflorâ; petalis subrotundo-ovatis, obtusis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 83.

Allium scapo nudo, tereti, inani; foliis subulatis, filiformibus; capitulis laxis, paucifloris. Gmel. Sibir. 1. pag. 61. tab. 15. fig. 2. 3.

Cet ail a de très grands rapports avec le précédent; il en diffère principalement par les divisions de la corolle, qui sont ovales, presque rondes, obtuses. Ses hampes sont cylindriques, fistuleuses; ses feuilles subulées, linéaires, presque filiformes; les ombelles larges; les étamines plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Voyez AIL, n°. 38.)

68. AIL à fleurs obtuses. *Allium obtusiflorum*. Decand.

Allium foliis subradicalibus, semicylindricis, capillaribus, acutis, scapo fere superantibus; scapo tereti, flaminibus semicibibus, peratis obtusissimis. Decand. — Redout. Liliac. t. b. 118.

Allium capillare. Hort. Paris.

Il se rapproche de l'*Allium stellerianum*. Ses bulbes sont blanches, sphériques, de la grosseur d'une cerise; il en fort quelques feuillets étroits, radicaux, un peu étalés, capillaires, demi-cylindriques, striés sur leur gaine, presque aussi longs que les tiges. Ceux-ci sont droites, glabres, cylindriques, terminées par une ombelle serrée, presque globuleuse, composée de quinze à vingt-cinq fleurs, environnée d'une spathe blanche, concave, ovale, d'une seule pièce, fendue à son sommet en deux lobes aigus; les pedoncules blancs, cylindriques, épaissis à leur sommet, un peu pendans à l'époque de la floraison. La corolle est blanche, globuleuse, avec une légère teinte de rose, à six découpures oblongues, égales, très-obtuses, presque tronquées à leur sommet; les étamines simples, de la longueur de la corolle, planes, élargies à leur base; l'ovaire pyramidal, marqué à sa base de trois cavités glanduleuses; le style court; le stigmate simple.

Cette plante, originaire de la Sicile, se cultive au Jardin des Plantes du Paris; elle fleurit à la fin du printemps. (V. f.)

69. AIL de Steller. *Allium stellerianum*. Willd.

Allium scapo nudo, tereti; foliis semicylindricis, umbellâ densâ; flaminibus subulatis, corollâ longioribus. Willd. Spec. 2. pag. 82.

Cepa scapo nudo, tereti, inani; foliis semicylindricis; capitulis spissis, multifloris. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 63. tab. 16. fig. 1. 2.

Ses bulbes sont petites, ovales, souvent fasciculées, munies de racines fibreuses, purpurines. Les tiges sont nues, fistuleuses, cylindriques, longues d'environ un pied; les feuilles étroites, à demi cylindriques, glabres, toutes radicales. Les fleurs sont disposées en une ombelle touffue. La spathe se divise en deux ou trois découpures aiguës. La corolle est d'un blanc-verdâtre; les divisions ovales-ancolées; les étamines subulées, plus longues que la corolle.

Cette plante croît en Sibérie. (V. f.)

70. AIL nain. *Allium chamamoly*. Linn.

Allium scapo nudo, subulato; caespitibus cernuis; foliis planis, ciliatis. Linn. Spec. Plant. 433. (Voyez AIL, n°. 39.)

Ses bulbes sont ovales; ses feuilles planes, aiguës,

algues, étalées par terre; les hampes grêles, à peine sorties de terre; la spathe courte, membraneuse; la corolle blanche, à six découpures lancéolées, aiguës; les étamines plus courtes que la corolle; la capsule arrondie.

J'ai recueilli cette plante vers la fin de l'hiver, sur les côtes de Barbarie. γ (V. v.)

71. AIL rougeâtre. *Allium rubellum*. Marsh.

Allium scop. subnudo, tereti; foliis semicylindricis, canaliculatis; spathâ brevi; umbellâ convexâ, multiflorâ; flaminibus simplicibus, corollâ duplâ brevioribus. Marsh. Flor. Cauc. 1. pag. 264.

Cette espèce a le port de l'*Allium angulosum*. Ses bulbes sont simples, presque ronds, de la grosseur d'une noisette. Ses hampes, cylindriques & nues, ont à leur base, outre d'autres feuilles, une ou deux feuilles vaginales à leur partie inférieure, un peu charnues, canaliculées, à demi cylindriques, plus courtes que la hampe. L'ombelle est convexe, garnie de beaucoup de fleurs; les pédicelles grêles, beaucoup plus longs que les corolles: celles-ci sont d'un pourpre clair; les pétales aigus, redressés; les étamines simples, une fois plus courtes que la corolle; le style court.

Cette plante croît en Espagne. γ (Marsh.)

72. AIL des rochers. *Allium saxatile*. Marsh.

Allium scop. subnudo, tereti; foliis semiteretibus; spathâ acuminatâ, umbellâ longiore; flaminibus simplicibus, corollâ longioribus. Marsh. Calp. pag. 167. App. n°. 39, & Flor. Cauc. 1. pag. 264.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Allium stellerianum*; mais elle en diffère par sa spathe longue, subulée. Ses bulbes sont oblongues, agrégées; les feuilles toutes radicales; quelques-unes vaginales à leur base, à demi cylindriques; la hampe cylindrique; les fleurs en ombelle; les pétales étalés; les étamines simples, plus longues que la corolle. Elle varie à fleurs purpurines.

Cette plante croît sur le mont Taurus, parmi les pierres calcaires. γ (Marsh.)

* AIL du Caucase. *Allium caucasicum*.

Allium (globosum), caule subteretifolio, umbellifero; flaminibus simplicibus, corollâ duplâ longioribus; umbellâ globosâ; spathâ subulatâ, longissimâ. Marsh. Flor. Cauc. 1. pag. 262.

Allium foliis semicylindricis, caulinis; spathâ longissimâ, capitulo globofo. Gmel. Sibit. 1. pag. 51. n°. 15. tab. 10.

Ses bulbes sont oblongues, agrégées, revêtues d'enveloppes luisantes, d'un brun-foncé; les feuilles caulinaires, très-étroites, à demi cylindriques, litées, canaliculées. Les tiges supportent une

Botanique. Supplément. Tome I.

ombelle globuleuse, de la même forme & de la même couleur que celle de l'*Allium rotundum*, mais plus petite. La spathe est à deux valves, dont une beaucoup plus longue que l'ombelle; les étamines simples, une fois plus longues que la corolle.

Cette plante croît au mont Caucase, sur les collines. γ (Marsh.)

AJONG. *Ulex*. Il faut retrancher de ce genre l'*Ulex capensis*, n°. 3, qui est l'*indigofera depressa*. Thunb.

1. AJONG d'Europe. *Ulex europaeus*. Linn.

Ulex foliis villosis, acutis; spicis spicatis. Linn. Spec. Plant. 1045. — Smith, Flot. brit. 2. pag. 756. — Lam. Ill. tab. 621.

Ulex grandiflorus. Pourr. Aët. Tolos. 3. pag. 333.

Ulex vernalis. Thore, Lond. 399.

a. *Genista spinosa major, longioribus oculis*. C. Bauh. Pinn. 394.

b. *Genista spinosa major, brevioribus oculis*. C. Bauh. Pinn. 394. — Linn. var. b. (Voyez AJONG, n°. 1.)

2. AJONG nain. *Ulex nanus*. Smith.

Ulex (minor), foliis linearibus, glabris, acutis; spicis spicatis; calicis foliolo inferiore tripartito. Roth. Catal. 1. pag. 33. — Smith, Flot. brit. 2. pag. 757.

Ulex parviflorus. Pourr. Aët. Tolos. 3. pag. 333.

Ulex autumnalis. Thore, Lond. 399.

b. *Ulex (provincialis), dentibus calicinis lanceolatis, distantibus; bracteis minutis, adpressis; ramulis glabrisculis, erectis; calicibus subobscenibus, corollam vix superantibus.* Loisel, Journ. bot. 2. pag. 367. tab. 13. fig. 2.

Cette espèce se distingue des deux variétés précédentes par son port, étant bien moins élevée, formant un petit buisson bas, dont les rameaux sont étalés, diffus, presque couchés sur la terre. Ses branches sont glabres, ainsi que ses feuilles; ses épines très-dures, plus courtes; ses fleurs plus petites & plus nombreuses; les deux folioles du calice glabres ou à peine pubescentes; l'inférieure terminée par trois dents. La corolle est jaune; l'étendard presque plane, entier à son sommet; les ailes plus courtes que la cavène; les écailles du pédicelle très-petites, & appliquées dessus.

J'ai recueilli cette plante sur les rochers aux bords de la mer, à Marseille. Elle croît aussi dans les Pyrénées, à Fontainebleau, &c. γ (V. v.)

Observations. Je ne crois pas que cette dernière

Al m

espèce puisse se rapporter à l'*ulex europæus*, Vkr. p. Linn. Ce dernier est velu sur les rameaux & sur les feuilles; il a d'ailleurs un port différent. Ses rameaux sont droits, élancés; les tiges élevées. Il se distingue de la variété a par ses aiguillons beaucoup plus courts, moins roides, un peu souples; par ses fleurs plus petites, & ses folioles calicinales bien moins pubescentes. Je ne doute pas que ce ne soit une espèce distincte.

La plante b est une autre variété intermédiaire entre ces deux espèces, « ayant, dit M. Loisel de Longchamps, les fleurs de la première, les rameaux de la seconde, dont elle se rapproche encore par les bractées ou écailles du pédicelle. Ses tiges sont hutes de trois pieds; les calices à peine plus longs que la corolle, un peu pubescents; leurs dents lancéolées, écartées. » On la rencontre sur les bords de la mer, aux environs de Toulon.

AJOUVÉ. *Ajovæ*. Auhl. *Douglassia*. Schreb. Gen. n°. 17, p. 61. Ce genre d'Aublet a été réuni aux *laurus* par Swartz. Il le nomme *laurus hexandra*. Flor. Ind. occid. 2. pag. 708. (Voyez LAURIER. Suppl.)

AIRELLE. *Vaccinium*. Le nombre des étamines variant de huit à dix dans ce genre, & les divisions du calice & de la corolle de quatre à cinq, pourroient fournir une sous-division pour la distribution des espèces. On pourroit encore employer la disposition des fleurs solitaires ou réunies en grappes. Celle admise par Linné, appuyée sur les feuilles annuelles ou persistantes, me paroît plus naturelle, quoique plus difficile à établir lorsque l'on ne peut observer que des individus en herbier. La chute ou la persistance des feuilles tient évidemment à une organisation particulière, dépendante de la nature des espèces.

Ce genre a, depuis un certain nombre d'années, acquis un grand accroissement. Parmi les espèces qu'il renferme, quatre sont indigènes de l'Europe; les autres nous viennent de l'Amérique. La plupart ont un feuillage élégant, & pour fruits, des baies d'une couleur agréable; ils procurent des avantages particuliers. Ceux du *vaccinium myrtillus* ont une saveur acide, rafraîchissante. Les habitants de la campagne les mangent crus, quelquefois avec du lait, & on en exprime un suc dont on fait un sirop employé contre la dysenterie. Macérés avec l'alun, ils donnent une couleur violette, avec laquelle on teint les toiles. Les baies du *vaccinium uliginosum* passent pour enivrantes, quoique leur saveur ne soit pas désagréable. M. Bosc cite que, dans le nord de l'Amérique, où les airelles sont très-multipliées, & où leurs fruits se succèdent pendant trois mois de l'année, les habitants en tirent un parti fort avantageux: ils les cueillent indistinctement; ils les mangent frais, & en font une sorte de confiture qui se conserve pendant plusieurs an-

nées. M. Bosc ajoute que les Sauvages préfèrent les fruits du *vaccinium corymbosum*, parce qu'ils sont plus abondans & plus faciles à ramasser, mais que ceux du *vaccinium uliginosum* lui ont paru les meilleurs de tous. (Bosc & Desfont.)

ES P È C E S.

* Feuilles caduques ou annuelles.

1. AIRELLE myrtille. *Vaccinium myrtillus*, Linn.

Vaccinium pedunculis unifloris; foliis serratis, ovatis, deciduis; caule angulato. Linn. Spec. 498. — Lam. Ill. tab. 268. fig. 1. (Voyez AIRELLE, n°. 1.)

2. AIRELLE à feuilles lancéolées. *Vaccinium myrtilloides*, Mich.

Vaccinium pedunculis unifloris; foliis lanceolatis, integris, margine pubescentibus, membranaceis. Pers. Synops. 1. pag. 478. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 234.

Elle a le port de l'airèle myrtille. Ses feuilles sont étroites, lancéolées, entières, membraneuses, pubescentes à leurs bords & le long de leurs nervures. Les fleurs font éparées, presque solitaires, médiocrement pédicellées: il leur succède une baie d'un noir-glaque.

Cette plante se rencontre depuis le Canada jusqu'à la baie d'Hudson.

3. AIRELLE pâle. *Vaccinium pallidum*, Ait.

Vaccinium racemis bracteatis, corollis cylindrico-campanulatis; foliis ovatis, acutis, serratis, glabris, deciduis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 10.

Arbrisseau garni de feuilles alternes, glabres, ovales, légèrement dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet, caduques; les fleurs disposées en grappes, accompagnées de petites bractées; la corolle campanulée, presque cylindrique.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. b

4. AIRELLE hérissée. *Vaccinium hirtum*, Thunb.

Vaccinium pedunculis unifloris; foliis ovatis, serratis; ramis teretibus, divaricatis. Thunb. Flor. Japon. 155.

Cet arb. est très-tamenn. Ses rameaux sont diffus, cylindriques, ridés, si inflexes, velus vers leur sommet, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, ovales, aiguës, dentées en scie à leurs bords, velues, plus pâles en dessous, inégaux, étalés, longues d'environ six lignes. Les fleurs sont solitaires; la corolle campanulée; ses découpures

rabattus en dehors ; les anthères plus courtes que la corolle.

Cette plante croît au Japon. \bar{h}

5. AIRELLE à longues étamines. *Vaccinium flammineum*. Linn.

Vaccinium pedunculis foliatis, unifloris ; antheris corollâ longioribus ; foliis oblongis, integerrimis. Linn. Spec. Plant. 498. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 227. (Voyez AIRELLE, n°. 2.)

Cette espèce, d'après Michx., varie dans sa grandeur. Ses riges sont plus ou moins hutes ; ses rameaux & ses feuilles glabres ou légèrement pubescens ; les feuilles plus ou moins blanchâtres en dessous ; les fleurs plus petites, avec les éramines à peine saillantes, ou plus grandes avec les éramines saillantes ; la corolle blanche ; les baies verdâtres.

6. AIRELLE fangeuse. *Vaccinium uliginosum*. Linn.

Vaccinium pedunculis unifloris ; foliis integerrimis, obovatis, obtusis, levibus. Linn. Spec. 499. — \bar{O} der. Flor. dan. tab. 231. — Jacq. Vind. 139.

8. \bar{V} *Vaccinium* (sednense), *pedunculis unifloris ; foliis ovalibus, integris ; caule decumbente, ramossissimo*. Perf. Synopf. 1. pag. 478. (Voy. AIRELLE, n°. 3.)

Ses éramines varient de huit à dix, selon Michx.

7. AIRELLE blanche. *Vaccinium album*. Linn.

Vaccinium pedunculis simplicibus ; foliis integerrimis, ovatis, subius tomentosis. Linn. Spec. Plant. pag. 499. (Voyez AIRELLE, n°. 4.)

8. AIRELLE mucronée. *Vaccinium mucronatum*. Linn.

Vaccinium pedunculis simplicissimis, unifloris ; foliis ovatis, mucronatis, glabris, integerrimis. Linn. Spec. 499. (Voyez AIRELLE, n°. 5.)

9. AIRELLE myrsinée. *Vaccinium myrsinæ*.

Vaccinium ramossissimum, foliis ovalibus, acutis, vix dentatis, subius subpilosis ; floribus corymbosis, sessilibus. (N.) Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 233. ? (Voyez AIRELLE, n°. 6.)

Ses feuilles, d'après Michx., sont ponctuées & glanduleuses en dessous, quelquefois médiocrement lancéolées ; les fleurs axillaires, fasciculées ; les écailles des bourgeons purpurines ; les découpures du calice d'un rouge-écaille ; la corolle ovale, un peu oblongue, d'une belle couleur pourpre, à cinq dents. Elle parait la même espèce que celle décrite par M. de Lamarck.

10. AIRELLE en buisson. *Vaccinium dumosum*. Andrew.

Vaccinium foliis ovatis, acutis, glabris ; pedunculis unifloris, bracteatis ; corollis urceolatis. Andr. Bot. Dupoi. tab. 112.

Ses rameaux sont nombreux, diffus, de couleur cendrée ; ses feuilles presque sessiles, glabres, ovales, aiguës, veinées, réticulées, retrécies en pétiole ; les fleurs solitaires, axillaires ; les pédoncules plus courts que les fleurs, accompagnées à leur base de deux bractées lancéolées ; le calice glabre, teint de rouge à ses bords ; à cinq découpures aiguës ; la corolle urcéolée, blanchâtre, avec une légère teinte de rose ; les éramines au nombre de dix, renfermées dans la corolle.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. \bar{h}

11. AIRELLE diffuse. *Vaccinium diffusum*. Ait.

Vaccinium pedunculis foliatis, nudis, unifloris ; foliis ovatis, acutis, obsolete serratis, villosiusculis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 11.

Ses rameaux sont étalés, diffus, garnis de feuilles ovales, médiocrement velues, aiguës à leur sommet, à dentelures obtuses. Les fleurs sont solitaires ; les pédoncules nus, uniflores.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Caroline. \bar{h}

12. AIRELLE à feuilles étroites. *Vaccinium angustifolium*. Ait.

Vaccinium pedunculis foliatis, unifloris ; foliis elliptico-lanceolatis, glabris, obsolete serrulatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 11.

Ses feuilles sont glabres à leurs deux faces, elliptiques, lancéolées, à denielures obtuses ; les fleurs solitaires, axillaires ; les pédoncules uniflores. Elle croît à Terre-Neuve & à celle du Labrador. \bar{h}

13. AIRELLE à bractées. *Vaccinium bracteatum*. Thunb.

Vaccinium racemis foliatis ; foliis serratis, acutis. Thunb. Flor. jap. 136.

Abriss au garni de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, aiguës, un peu dentées en scie, roulées à leurs bords, glabres à leur deux faces, veinées, longues d'un pouce ; les fleurs disposées en grappes unilatérales, accompagnées de petites feuilles lancéolées, dentées en scie, longues d'une ligne. Les pédoncules sont à peine longs d'une demi-ligne, munis dans leur milieu de deux petites bractées sétacées, de la longueur du pédoncule. La corolle est blanche, cylindrique.

Cette plante croît au Japon. \bar{h}

14. AIRELLE à corymbes. *Vaccinium corymbosum*. Linn.

Vaccinium floribus corymbosis, ovatis; foliis oblongis, acuminatis, integerrimis. Linn. Spec. 459.

Vaccinium amatum. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 12.

Vaccinium diforophum. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 231.

Arbrisseau ordinairement à tige basse, qui quelquefois s'élève davantage. Ses rameaux sont rudes; ses feuilles ovales, oblongues, aiguës ou légèrement acuminées, ordinairement très-entières ou à peine dentées en scie, légèrement pubescentes en dessous, principalement sur leurs nervures; les écailles, tant des boutons que des bourgeons, de couleur purpurine. Les fleurs sont disposées en corymbes presque sessiles, ayant leurs pédoncules cachés en partie sous les écailles; les découpures du calice presque rondes, un peu obtuses. La corolle est d'un blanc-pourpre, ovale, cylindrique, allongée; ses dents très-courtes, un peu aiguës; les étamines renfermées dans la corolle.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. h (V. f.)

15. AIRELLE ciliée. *Vaccinium ciliatum*. Thunb.

Vaccinium racemis foliatis; foliis ovatis, integerrimis, hispidis. Thunb. Jap. 156.

Les rameaux sont alternes, redressés & velus, garnis de feuilles éparées, ovales, aiguës, très-entières, hispides, inégales, longues d'un à deux pouces; les fleurs disposées en grappes unilatérales, accompagnées de petites feuilles lancéolées, glabres, longues de trois lignes. La corolle est rouge.

Cette plante croît au Japon. h

16. AIRELLE brunâtre. *Vaccinium fuscatum*.

Vaccinium racemis mediisulcis, corollis cylindrico-ovatis, calicibus acutis; foliis ellipticis, acutis, integerrimis; venis subulis villosis. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 11.

Ses rameaux sont garnis de feuilles elliptiques, très-entières, aiguës à leur sommet, veinées; les veines légèrement pubescentes en dessous. Les fleurs sont disposées en grappes ordinairement dépourvues de feuilles; les calices aigus à leurs découpures; la corolle ovale, cylindrique.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. h

17. AIRELLE feuillue. *Vaccinium frondosum*. Linn.

Vaccinium racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis subcampanulatis; foliis obovato-ob-

longis, integerrimis, deciduis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 11. — Linn. Spec. pag. 499 — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 230. — Andrew, Depof. bot. tab. 100.?

Petit arbrisseau dont les rameaux, les feuilles & les grappes de fleurs sont glanduleux & visqueux; les baies noires & globuleuses; les feuilles oblongues-ovales, presque entières; les fleurs alternes, disposées en grappes lâches, garnies de petites bractées; la corolle campanulée, à cinq découpures. Il croît en Virginie, dans la Floride, aux lieux arides, parmi les pins. (V. f. Comm. Bof.)

18. AIRELLE gracieuse. *Vaccinium venosum*. Aiton.

Vaccinium racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis subcampanulatis; foliis ellipticis, integerrimis, deciduis, glabris. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 11.

Ses feuilles sont elliptiques, très-entières; les fleurs disposées en grappes munies de folioles ou de bractées; les pédoncules supportant aussi de très-petites bractées; la corolle presque campanulée.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. h

19. AIRELLE résineuse. *Vaccinium resinofum*. Aiton.

Vaccinium racemis bracteatis, corollis ovatis; foliis ellipticis, acutiusculis, integerrimis, deciduis; atomis resinosis, irroratis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 12. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 230.

Andromeda baccata. Wangenh. Amer. 11. tab. 30. fig. 69.

Ses feuilles sont minces, oblongues-ovales ou lancéolées, glabres, entières, pétioles, ordinairement obtuses, quelquefois un peu aiguës, parsemées en dessous de petits points résineux. Les grappes sont latérales; les fleurs tournées en dehors du même côté, soutenues par des pédoncules très-courts; la corolle ovale, à cinq faces, d'un vert-pâle, légèrement lavée de rouge, resserrée à son orifice. Les baies, selon Wangenh, renferment dix semences.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. h

20. AIRELLE glauque. *Vaccinium glaucum*. Lam.

Vaccinium foliis sublancoolato-cuneatis, integerrimis, dilute glaucis, subtus resinosis; racemis laxis, corollis plobosis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 231. (Voyez AIRELLE, n°. 7.)

Il se rapproche beaucoup du précédent: il s'en distingue principalement par la corolle globuleuse

& non pentagone. Les feuilles sont ordinairement oblongues, quelquefois ovales & un peu lancéolées, parsemées en dessous de points rubes ou veines & réticulées, surtout dans leur jeunesse. Les baies sont globuleuses, bécuettes ou glauques avec une teinte noire, bonnes à manger.

21. AIRELLE à feuilles de troëne. *Vaccinium ligustrinum*. Linn.

Vaccinium racemis nudis, caule fruticoso; foliis crenulatis, oblongis. Linn. Spec. Plant. 500. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 233.

Ses tiges sont droites, roides; ses rameaux anguleux; les feuilles redressées, presque sessiles, membraneuses, légèrement pubescentes, oblongues-lancéolées, finement dentées en scie, mucronées, traversées par des veines purpurines, ainsi que les écailles des bourgeons. Les fleurs sont fasciculées, presque sessiles, dépourvues de bractées latérales ou axillaires; la corolle ovale-oblongue, à cinq dents.

Cette plante croît dans la Virginie & la Pensylvanie. ♀ (P. f.)

22. AIRELLE de Pensylvanie. *Vaccinium pensylvanicum*. Linn.

Vaccinium ramis angulosis, cortice viridi; foliis sessilibus, ovali-lanceolatis, mucronatis, serrulatis, utrinque lucidis; fasciculis confertifloris, subterminalibus; corolla ovata, quinquecostata. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 232. (Voyez AIRELLE, n°. 7.)

23. AIRELLE effilée. *Vaccinium virgatum*.

Vaccinium racemis sessilibus, corollis subcylindricis; foliis oblongo-ellipticis, subcuneiformibus, serrulatis, deciduis, subglabris. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 12. — An Andrew, Bot. Repof. tab. 181?

Ses rameaux sont élançés, garnis de feuilles oblongues, elliptiques, un peu rétrécies en coin à leur base, légèrement dentées en scie à leur contour, caduques, presque glabres; les fleurs disposées en grappes sessiles; les corolles presque cylindriques.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

24. AIRELLE fluette. *Vaccinium tenellum*.

Vaccinium racemis bracteatis, sessilibus; corollis obovato-cylindricis; foliis oblongo-ellipticis, subcuneiformibus, serrulatis, deciduis, subglabris. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 12.

D'après les caractères qu'Aiton attribue à cette plante, elle paroît différer très-peu de la précédente. Ses grappes sont dépourvues de bractées;

ses corolles ovales, cylindriques; les feuilles presque glabres, caduques, oblongues, elliptiques, presque cunéiformes, dentées en scie.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

25. AIRELLE galé. *Vaccinium galerans*. Mich.

Vaccinium foliis sessilibus, cuneato-lanceolatis, subferrulatis, pubescentibus; fasciculis sessilibus, calice acuminatis; corolla ovata; fauce vixit: coarctata, quinquecostata; stylo erecto. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 232.

Michaux soupçonne que cette plante pourroit bien être la même que la précédente: c'est un petit arbrisseau qui a le port du *myrica gale*, dont les branches & les rameaux sont pubescents; les feuilles sessiles, lancéolées, rétrécies en coin à leur base, légèrement pubescentes, un peu dentées en scie, veinées & réticulées. Les fleurs sont disposées par fascicules presque sessiles; elles sortent d'entre plusieurs écailles qui cachent les pédoncules. Leur calice est acuminé; la corolle ovale, très-réserée à son orifice, à cinq dents; le style saillant; les baies petites, globuleuses, noires à leur maturité, couronnées par le calice.

Cette plante croît à la Caroline, dans les lieux ombragés. ♀

26. AIRELLE de Cappadoce. *Vaccinium aretostaphylos*. Linn.

Vaccinium floribus racemosis; foliis crenulatis, ovatis, acutis; caule arboreo. Linn. Spec. pag. 500. (Voyez AIRELLE, n°. 8.)

27. AIRELLE à feuilles de myrte. *Vaccinium myrtifolium*. Mich.

Vaccinium repens, foliis ovalibus, lucidis, subdenticulatis; corymbis paucifloris, subsessilibus; corolla subgloboso-complanata. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 229.

Cette espèce & la suivante appartiennent peut-être à la seconde sous-division. Ses tiges sont rampantes, très-glabres; ses rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, glabres, ovales, luisantes, recourbées à leurs bords, rarement denticulées; les fleurs disposées en corymbes fasciculés, presque sessiles, peu garnis; la corolle globuleuse, un peu campanulée, à cinq petites dents très-courtes; dix étamines; les anthères mutiques sur leur dos; les baies petites, légèrement pédicellées, noires, globuleuses, couronnées par les dents du calice.

Cette plante croît dans la Caroline. ♀ (Description ex Mich.)

28. AIRELLE en gazon. *Vaccinium cespitosum*. Mich.

Vaccinium foliis cuneato-rotundatis, serratis; floribus solitariis, subsessilibus; corollâ urceolata. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 234.

Très-petit arbrisseau, qui ne s'élève qu'à la hauteur de deux à quatre pouces, & dont les tiges & les rameaux nombreux sont ramassés en gazon. Les feuilles sont glabres, ovales-arrondies, rétrécies en coin à leur base, obtuses à leur sommet, membraneuses, dentées en scie. Les fleurs sont solitaires, latérales, presque sessiles; la corolle courte, en godet; les baies un peu pédicellées, globuleuses, d'un noir glauque.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, principalement vers la baie d'Hudson. (Description. ex Mich.)

29. AIRELLE à petites fleurs. *Vaccinium parviflorum*. Andr.

Vaccinium foliis lanceolatis, undulatis, venosis; floribus racemosis; pedunculis longissimis, bracteatis; corollâ conicâ, striatâ. Andr. & Bot. Rep. tab. 115.

Ses tiges sont glabres, cylindriques; ses rameaux garnis de feuilles glabres, lancéolées, entières, acuminées, un peu ondulées, rétrécies en pétiole à leur base. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, portées sur de longs pédoncules; les pédicelles munis de bractées à leur base, & quelquefois vers leur sommet; le calice court; la corolle petite, rougeâtre, conique, striée; les éranimes au nombre de dix; les filaments pubescents; les anthères oblongues, bifides à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. h

* Feuilles persistantes.

30. AIRELLE australe. *Vaccinium meridionale*. Ait.

Vaccinium foliis ovato-oblongis, acutis, serratis, persistentibus, planis, lucidis; racemis terminalibus, erectis; corollis frimaticis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 13. — Swart. Flor. Ind. occid. 2. pag. 676.

Elle a le port du *vaccinium arctostaphylos*, mais ses feuilles sont persistantes. Cet arbrisseau s'élève depuis dix jusqu'à trente pieds. Ses rameaux sont étalés, striés, pubescents; les feuilles petites, alternes, pétiolées, ovales, acuminées, luisantes, glabres, coriaces, dentées en scie, légèrement acuminées; les pétioles courts; les grappes presqu' terminales, plus longues que les feuilles, nues, contenant des fleurs éparpillées, pédicellées, d'un rouge-blanchâtre; leur calice à quatre dents

larges, courtes, aiguës; la corolle ovale, d'abord tétragone; le limbe réfléchi, à quatre découpures ovales; huit filaments, de la longueur de la corolle, hérissés dans leur milieu; les anthères ovales, aristées après l'émission de leur pollen. Les baies sont arrondies, à quatre loges, d'un blanc-rougeâtre, renfermant plusieurs semences éparpillées dans une pulpe.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque. h

31. AIRELLE d'Otaïti. *Vaccinium cereum*. Forst.

Vaccinium pedunculis foliatis, usifloris; corollâ quinquangulari-ovatis; foliis ovato-subrotundis, serratis. Forst. Prodr. n°. 167.

Andromeda cerea. Linn. Suppl. 238. — Linn. Di. 1. pag. 160.

Forster croit que cette plante, qui est mentionnée parmi les ANDROMÈDES, n°. 19, doit appartenir aux airelles.

32. AIRELLE ponctuée. *Vaccinium vitis idæae* Linn.

Vaccinium racemis terminalibus, nutantibus; foliis obovatis, revolutis, integerrimis, subius punctatis. Linn. Spec. 500. — Oeder. Flor. dan. tab. 40. — Lam. Ill. tab. 286. fig. 2. (Voyez AIRELLE, n°. 9.)

Elle varie dans le nombre de ses étamines, de huit à dix.

33. AIRELLE canneberge. *Vaccinium oxycoccus*. Linn.

Vaccinium foliis integerrimis, ovatis, revolutis; caulibus repensibus, filiformibus, nudis. Linn. Spec. pag. 500. — Oeder. Flor. dan. tab. 80. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 228. — Lam. Ill. tab. 286. fig. 3. (Voyez AIRELLE, n°. 10.)

34. AIRELLE à gros fruits. *Vaccinium macrocarpon*. Ait.

Vaccinium foliis integerrimis, ovali-oblongis, obtusis, planis; caulibus repensibus, filiformibus. Air. Hort. Kew. 2. pag. 13. tab. 7. — Wajgenh. Amer. 108. t. b. 30. fig. 67. — Lam. Ill. tab. 286. fig. 4.

Vaccinium (oxycoccus, var. β , oblongifolius), foliis oblongis, obtusis; corollâ lacinias lanceolatis, fructu paulo majore. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 228.

Vaccinium oxycoccus. Var. β . Lam. Di. 1.

Cette plante se rapproche beaucoup du *vaccinium oxycoccus*, & même, selon Michaux, elle n'en est qu'une variété. On l'en distingue par son

port, & par les parties de la fructification un peu plus grandes. Ses tiges sont rampantes; les rameaux glabres, filiformes; les feuilles planes, alternes, sessiles, ovales-oblongues, très-obtusées, un peu blanchâtres en dessous. Ses pédoncules axillaires, solitaires, allongés, recourbés, munis vers le milieu de deux bractées semblables aux feuilles, mais plus petites; le calice glabre; la corolle à quatre découpures profondes, étroites; un peu aiguës, réfléchies en dehors; les étamines au nombre de huit; les anthères saillantes & mucigues; les fruits globuleux, couronnés par les quatre dents du calice.

Cette plante croît dans les marais tourbeux de l'Amérique septentrionale. h

35. AIRELLE hispide. *Vaccinium hispidulum*. Linn.

Vaccinium foliis integerrimis, revolutis, ovatis; caulis repentibus, filiformibus, hispidis. Linn. Spec. Plant. 101. — Michx. Flor. bor. Amer. 1. pag. 128. tab. 13.

Arbutus thymifolia. Ait. Hort. Kew.

Arbutus filiformis. Lam. Dict. 1. pag. 128. (Voyez ARBOUSIER, n°. 8.)

Ses baies sont blanches, un peu globuleuses, couronnées un peu au dessous de leur sommet par les quatre dents du calice. Ce dernier est accompagné à sa base de deux petites bractées. Les étamines sont au nombre de huit. Le fruit est très-bon à manger. (V. f. in herb. Juss.)

36. AIRELLE à fruits rouges. *Vaccinium erythocarpus*. Michx.

Vaccinium foliis ovalibus, acuminatis, serrulatis, ciliatisque; caule erecto. Michx. Flor. bor. Amer. 1. pag. 127.

Arbustifère dont les tiges droites se divisent en rameaux diffus, flexueux, garnis de feuilles assez grandes, ovales, acuminées, minces, membraneuses, dentées en scie & ciliées à leurs bords, légèrement pubescentes à leurs deux faces le long de leurs nervures. Les pédoncules sont solitaires, axillaires; le calice petit, à quatre découpures aiguës; la corolle presque conique avant son développement, oblongue, linéaire, à quatre découpures réfléchies en dehors; huit anthères saillantes, mucigues sur leur dos; les baies globuleuses, luisantes, d'un rouge-vif.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Caroline, sur les plus hautes montagnes. h

37. AIRELLE en arbre. *Vaccinium arboreum*. Michx.

Vaccinium foliis petiolatis, obovatis, mucronatis; racemis bracteatis; corolla campanulata, acute quinquefidâ; antheris oviformibus aristatis. Michx. Flor. bor. Amer. 1. pag. 230. — Marshall, Amer.

Très-belle espèce, dont les tiges s'élèvent à la hauteur de dix-huit à vingt pieds. Ses rameaux sont glabres, cendrés, noueux, garnis de feuilles petiolées, glabres, luisantes à leurs deux faces, rarement denticulées, parsemées de points glanduleux, un peu pubescentes dans leur jeunesse, ovales, quelquefois un peu arrondies; les fleurs disposées en grappes feuillées; les pédoncules un peu recourbés; la corolle campanulée, à cinq dents aiguës; le style un peu plus long que la corolle; les anthères au nombre de dix, aristées sur leur dos; les baies noirâtres dans leur maturité, globuleuses, un peu succulentes.

Cette plante croît dans les forêts arides de la Caroline &c de la Floride. h (V. f.)

38. AIRELLE à feuilles de buis. *Vaccinium brachygerum*. Michx.

Vaccinium pumilum, foliis ovalibus, subcrenatis; corymbis subsessilibus, corollâ brevi, filamentis glandulosis, antheris brevissimis corniculatis. Michx. Flor. bor. Amer. 1. pag. 234.

Ses tiges sont basses; les feuilles ovales, à peine crénelées, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces. Les fleurs disposées en peits corymbes fasciculés, presque sessiles; la corolle courte; les filaments des étamines glanduleux; les anthères surmontées d'une petite corne.

Cette plante croît dans la Virginie, aux environs de Winchester.

Nota. J'ignore si les espèces suivantes perdent ou conservent leurs feuilles.

39. AIRELLE élégante. *Vaccinium formosum*. Andr. w.

Vaccinium foliis integerrimis, oblongis, acutis, glabris; floribus racemosis-fasciculatis, subcylindricis, ciliatis; calicibus adpressis. Andrew, Botan. Depos. tab. 97.

Arbustifère d'une forme très-élégante, dont les tiges, divisées en rameaux alternes, sont garnies de feuilles glabres, oblongues, pétioles, très-étroites, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont latérales & terminales, disposées en grappes pendantes, fasciculées, munies de petites bractées. Le calice est coloré, à cinq divisions courtes, un peu obtuses; la corolle blanche & rose, presque cylindrique, à côtes un peu saillantes; les étamines au nombre de dix; les filaments un peu velus; les anthères oblongues, échanquées à leur base, sessiles à leur sommet; le fruit globuleux, à cinq loges.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. *h*

40. AIRELLE à feuilles charnues. *Vaccinium crassifolium*, Andrew.

Vaccinium foliis ovatis, serratis, crassifolius; floribus subumbellatis, campanulatis, Andr. Botan. Repos. tab. 105.

Cette espèce est remarquable par ses petites feuilles roides, un peu charnues, ovales, très-finement dentées, glabres, obtuses, rétrécies en pétiole à leur base. Les fleurs sont rouges, disposées presque en petites ombelles latérales & terminales. Le calice est court; la corolle à peine une fois plus longue, campanulée, contenant dix anthères bifides à leurs deux extrémités, soutenues par des filamens un peu pubescens.

Cette plante croît à la Caroline. *h*

41. AIRELLE à épis. *Vaccinium spicatum*.

Vaccinium foliis oppositis, ovato-lanceolatis; spicis terminalibus.

Acofia spicata, Lout. Flor. coch. 1. pag. 338.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq pieds, dont tous les rameaux sont ascendans; les feuilles opposées, ovales-lanceolées, planes, glabres, épaisses, régulièrement & légèrement dentées en scie. Les fleurs sont blanches, disposées en épis droits, filiformes, à l'extrémité des rameaux. Le calice est presque globuleux, velu, coloré, à cinq dents; la corolle trois fois plus longue que le calice; son tube urcéolé, à cinq faces; le limbe très-court, à cinq lobes étalés; dix étamines de la longueur du calice; les filamens épais, pileux, insérés sur le réceptacle; les anthères oblongues, vacillantes & prolongées à leur sommet. L'ovaire arrondi, adhérent avec le calice; le style de la longueur de la corolle; le stigmate épais; il leur succède une petite baie globuleuse, à cinq loges, couronnée par des dents du calice; les semences nombreuses, fort petites, arrondies.

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochinchine. *h*

AIRI, AYRI. On nomme ainsi, dans le Brésil, une espèce de palmier à tige couverte d'épines, à feuilles ailées, qui peut être une espèce d'*elais* ou de *hadria*. Les Brésiliens se servent de ses épines comme de clous; ils en arment aussi leurs flèches. On tue de son tronc, par incision, une liqueur qui devient spiritueuse par la fermentation. (*Voyez Pison. Brasil.* pag. 129.) (*Juss.*)

AITONE du Cap. *Aytosia capensis*. Linn. f. — Lam. lil. Gen. tab. 571. — Cavan. Diss. bot. 5. pag. 301. tab. 159. fig. 1.

AIZOON. (*Voyez LANGUETTE.*)

AJUGA. (*Voyez BUGLE.*)

AJUVEA. (*Voyez AJOUVE.*)

AKÉE d'Afrique. *Akefia africana*, Detuff.

Akefia foliis alternis, obtusè pinnatis; floribus racemosis, axillaribus. Detuff. Flor. des Aunl. 1. pag. 66. tab. 3.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des *Sonchiers*, qui a des rapports avec les *passifloras*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles ailées sans impaire, & dont les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales appendiculés; huit étamines; trois stigmates; une capsule trigone, à trois loges monospermes; les semences enfoncées dans un arille charnu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, à cinq folioles ovales, concaves, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle à cinq pétales, insérés sur un disque glanduleux, munis à leur base intérieure d'un appendice pétaliforme.

3°. Huit étamines, dont les filamens sont libres, très-courts, velus, insérés sur le disque, terminés par des anthères droites, oblongues.

4°. Un ovaire libre, trigone, velu; un style cylindrique, persistant, trisé à son sommet; trois stigmates obtus.

Le fruit est une capsule ovoïde, trigone, obtuse, s'ouvrant par son sommet en trois loges, contenant chacune une semence sphérique, noire, luisante, attachée à l'angle interne, & enfoncée en partie dans un arille blanc, charnu, qui occupe toute la cavité inférieure de la loge.

L'embryon dépourvu de périsperme; la radicule courbée en lobes.

Ce genre ne contient qu'une seule espèce. C'est un très-bel arbre, dont le tronc, haut de plus de cinquante pieds, supporte une cime touffue, composée de rameaux diffus, garnis de feuilles alternes, ailées, sans impaire, composées de folioles assez grandes, pétiolées, opposées, ovales, lanceolées, aiguës, glabres, entières, à nervures parallèles, luisantes & d'un vert-foncé à leur face supérieure; les pétioles canaliculés. Les fleurs sont d'un blanc éclatant, pétiolées, opposées en

croix

eroix & disposées en une grappe simple, axillaire ; une bractée touffue, lancéolée, velue, persistante à la base de chaque pédicelle. Le calice est velu, à cinq divisions très profondes ; les pétales velus, un peu plus longs que les calices. Le fruit est une grosse capsule rouge, ovoidé, à trois angles obtus, à trois loges monospermes.

Cet arbre, originaire de Guinée, a été apporté à la Jamaïque par un vaisseau négrier, où il s'est très-bien naturalisé. (*Desfuss.*)

« Le bois de cet arbre, dit M. Desfussac, a de la consistance. Il peut être employé avec avantage. L'ombre agréable qu'il procure, & le bel effet qu'il produit quand il est couvert de fruits rouges qui ressortent merveilleusement parmi son feuillage, le rendent propre à faire de belles avenues. La pulpe, qui enveloppe une partie de la graine, est sensible, en quelque sorte, à des isis de veau, & se mange de même, cuite dans une fricassée de poulets ou d'une autre manière. L'on vend ce fruit, qui commence à devenir commun dans tous les marchés de la Jamaïque. On peut multiplier cet arbre par ses graines ; elles lèvent très-facilement, mais il est délicat dans sa jeunesse, & souffre difficilement la transplantation. On peut le greffer sur le cupany ou châtaignier des Antilles. Il fleurit dans le même tems, en mai & juin, & ses fruits mûrissent comme ceux de ce dernier, en août & septembre. »

• **AKEESIA.** (*Voyez AKÉS.*)

ALADER : nom languedocien de l'alatène. Le *phyllis* porte celui d'aladet mâle.

ALADY : nom brame du *curcuma longa*. Linn.

ALAFIA : nom malgache d'un arbrisseau grimpant, lacteux, remarquable par la quantité de fleurs d'un rouge éclatant dont il se couvre. Il est de la famille des apocinées, dans laquelle il doit former un genre nouveau. Il a, comme la plupart de ceux du même ordre, un calice à cinq lobes ; une corolle tubulée, ventrue, divisée par le haut en cinq parties ; cinq étamines à filaments courts, & anthères allongées, distinctes ; un ovaire double, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate en tête ; mais il se distingue de tous les autres par des prolongemens filiformes qui partent du sommet des filaments des étamines, & vont s'attacher au style sous le stigmate. Ces appendices, qui constituent son caractère essentiel, établissent un passage entre les genres des apocinées à anthères libres, & ceux à anthères adhérentes au stigmate. On ne connoît point encore son fruit ni les graines, qui serviroient à déterminer sa place dans la famille ; mais, d'après son port, on peut conjecturer qu'il s'éloigne peu de l'échine & du periploca. M. du Petit-Thouars, au-

Botanique. Supplément. Tome I.

teur de cette notice, & qui a observé cet arbrisseau à Madagascar, lui conserve le nom qu'il porte dans le pays.

ALAGAO, ARAGO, ADGAO, TANGAY : noms sous lesquels sont connus, aux Philippines, des arbrisseaux que Camelli regarde comme des sureaux, parce qu'ils ont une même disposition de feuilles & de fleurs. L'un d'eux est indiqué comme bon en cataplasme pour les maux de tête & de ventre, les tumeurs & les ulcères. Ce port, ces vertus, font présumer que les *alagao* appartiennent au genre andarèse (*gremna*), surtout en examinant les dessins qu'en donne Camelli, & qui présentent des fruits dégagés du calice, très-différents de ceux des sureaux. (*Juss.*)

ALANGIUM. (*Voyez ANGOLEAN.*)

ALBERGE. (*Voyez ABRICOTIER.*)

ALBERGINE. AUBERGINE. (*Voyez MORELLE.*)

ALBOTIN : nom arabe du térébinthe.

ALBOUCOR. Les Arabes nomment ainsi, au rapport de Dalechamp, la liqueur qu'ils tirent par incision de l'arbre de l'encens.

ALBOUR. AUBOUR : noms anciens du *laburnum* de Plin, plus connu sous celui d'ébénier ou cythre des Alpes. (*Cytisus laburnum*. Linn.)

ALBUCA. Six étamines, dont trois stériles & trois fertiles, forment, dans Linné, un des principaux caractères de ce genre ; il a été depuis découvert plusieurs plantes qui se rapprochent des *albuc* par leur port & par les autres caractères du genre, mais toutes les étamines se trouvoient fertiles. Au lieu d'établir un nouveau genre pour ces plantes, on a préféré, avec assez de raison, de les ranger parmi les *albuc*, à l'aide d'une sous-division ; alors le caractère essentiel de ce genre se trouve réduit à celui-ci : savoir :

Une corolle à six divisions profondes ; les trois intérieures redressées, rapprochées & conniventes ; les extérieures ouvertes ; un style pyramidal, triangulaire.

Ce genre renferme de très-belles espèces, toutes originaires du Cap de Bonne-Espérance, & dignes d'occuper un rang distingué dans la brillante famille des lilacées. Elles ont extérieurement beaucoup de ressemblance avec les apocynées & les ornithogales. Leurs racines sont bulbeuses ; leurs tiges ou hampes nues ; leurs feuilles toutes radicales, engainantes à leur base ; les fleurs disposées en une sorte d'épi ou de grappe lâche, terminale.

N a

* Trois étamines fertiles.

1. ALBUCA jaune. *Albica lutea*. Lam.

Albica (major), *petalis interioribus*, *apice glandulosis*, *inflexis*; *foliis linearibus-lanceolatis*, *planiusculis*. Dryand. Act. Holm. 1784. pag. 293.

Albica (major), *foliis lanceolatis*. Berg. Plant. Cap. 87. — Linn. Syst. veget. 326. — Redout. Liliac. tab. 69. (Voyez ALBUCA, n°. 2. var. 4.)

2. ALBUCA à petites fleurs. *Albica minar*. Linn.

Albica petalis interioribus, *apice glandulosis*, *inflexis*; *foliis linearibus-subulatis*, *canaliculatis*. Dryand. l. c. pag. 294. — Linn. Spec. 438. (Voyez ALBUCA, n°. 2. var. 3.)

Ses tiges sont hautes d'un demi-pied, à peine épaissies d'une ligne; ses tiges linéaires, subulées, larges de six lignes, longues d'un pied & plus; les fleurs jaunes, disposées en une grappe terminale, longue de six lignes & plus. Les pétales n'ont pas un pouce de long; les extérieurs épaissies à leur sommet; les intérieurs blanchâtres, surmontés d'une glande, recourbés en dedans; les bractées vertes, membraneuses à leurs bords.

Il croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

3. ALBUCA blanc. *Albica alba*. Lam.

Albica (altissima), *petalis interioribus*, *apice glandulosis* & *inflexis*; *foliis canaliculato-convolutis*, & *se subulatis*. Jacq. Coll. 2. pag. 164. & Icon. Rat. 1. tab. 36. — Lam. Ill. tab. 241. (Voyez ALBUCA, n°. 1.)

4. ALBUCA à feuilles flaccides. *Albica flaccida*. Jacq.

Albica foliis lanceolato-linearibus, *flaccidis*; *racema brevi*; *pedunculis potentissimis*; *floribus nutantibus*; *filamentis alternis*, *sterilibus*. Jacq. Icon. Rat. 2. tab. 444, & Collect. 4. pag. 291.

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus; ses feuilles étroites, linéaires, lancéolées, très-molles, rabattues obliquement; les fleurs disposées en une grappe courte, terminale; les pédoncules ouverts, formant un angle droit avec les hampes. La corolle inclinée, jaune & blanche; les trois divisions extérieures vertes à leur base & à leur sommet; les intérieures d'un blanc-jaunâtre, courbées en dedans, glanduleuses à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

5. ALBUCA à fleurs vertes. *Albica viridis*. Ward. Jacq.

Albica foliis linearibus, *canaliculatis*, *fortis villosa*, *racema paucifloro*, *pedunculis potentibus*, *floribus nutantibus*; *filamentis alternis*, *nutantibus*. Jacquin, Icon. Rat. vol. 2. tab. 446, & Collect. Suppl. 98.

Cette plante s'élève à la hauteur d'un pied sur une tige droite, flexueuse, glabre à sa partie supérieure, hérissée à sa base. Les feuilles sont linéaires, subulées, creusées en gouttière, hérissées à leur face extérieure. Les fleurs sont terminales, inclinées, au nombre de trois ou quatre; les pédoncules très ouverts; les trois divisions extérieures de la corolle d'un vert-gai; les intérieures glanduleuses à leur sommet, réfléchies en dedans, d'un vert-jaunâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

6. ALBUCA à fleurs serrées. *Albica coarctata*. Dryand.

Albica petalis interioribus, *apice fornicatis*; *foliis glabris*, *pedunculis longitudine bractearum*. Dryand. Act. Holm. 1784. pag. 295. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 436.

Ses tiges sont à peine de la grosseur d'une plume d'ore; les feuilles linéaires, subulées, profondément canaliculées, hautes de deux pieds & plus, un peu plus longues que les tiges. Les fleurs forment; à l'extrémité des hampes, une grappe serrée, longue d'un demi-pied; les pédoncules ouverts, d'un pouce & plus de long, presque de la longueur des bractées; la corolle jaune; les trois divisions extérieures épaissies à leur sommet, longues d'un pouce & plus; les intérieures ovales, un peu plus courtes que les extérieures, courbées en voûte à leur sommet; les arthères sagittées; les filaments stériles un peu plus courts que les autres, canaliculés, convexes en dehors; le style prismatique, de la longueur de l'ovaire.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

* * Toutes les étamines fertiles.

7. ALBUCA en f. h. *Albica fastigiata*. Thunb.

Albica foliis lanceolato-ensiformibus, *linearibus erectis*, *panicula fastigiata*. Thunb. Prodr. 65. — Dryand. Act. Holm. 1784. pag. 296.

Les feuilles sont d'abord canaliculées, linéaires; elles deviennent ensuite planes, lancéolées, ensiformes, glabres à leurs deux faces, larges d'un pied & demi. De leur centre s'élève une hampe de moitié plus courte que les feuilles. Les fleurs forment une grappe en taze, de la longueur des hampes. Les pédoncules, longs de trois ou quatre pouces, sont ouverts à l'époque de la floraison, puis redressés, accompagnés de bractées membra-

neufes, roufféâtres sur leur dos, longues d'un demi-pouce. La corolle est blanche; les divisions extérieures linéaires-oblongues; les intérieures ovales-oblongues, rapprochées en voûte à leur sommet, un peu plus courtes que les extérieures; trois filamens atelines plus courts; le style un peu plus long que les étamines, cannelé, prismatique.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

8. ALBUCA en queue. *Albica caudata*. Jacq.

Albica foliis lanceolato-linearibus, canaliculatis, striâta erectis; pedunculis patentissimis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 442, & Collect. 4. pag. 205.

Ses hampes sont droites, un peu arquées, hautes de deux pieds & plus; les feuilles linéaires, lancéolées, roides, roulées à leurs bords, canaliculées, deux fois plus courtes que les hampes; les fleurs terminales, redressées; les pédoncules très-longs, ouverts horizontalement; les trois divisions extérieures de la corolle blanches, marquées d'une tache verte depuis leur milieu jusqu'au sommet; les intérieures verdâtres, traversées par une ligne blanche, tachetées de jaune à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

9. ALBUCA foyeux. *Albica fetosa*. Jacq.

Albica foliis lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice fetosis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 440, & Collect. Suppl. 100.

Cette espèce se rapproche de l'*albica suffigata*, dont elle n'est peut-être, selon Jacquin, qu'une simple variété. Ses bulbes sont couvertes d'écaillés terminées par un poil foyeux; les tiges aussi longues que les feuilles et celles-ci linéaires, lancéolées, un peu planes, lâches, rabattues; les pédoncules ouverts en angle droit; les intérieures longs de trois pouces, graduellement plus courts vers le sommet, point recourbés; les divisions extérieures de la corolle vertes, bordées de blanc; les intérieures jaunâtres, traversées par une raie verte.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

10. ALBUCA à feuilles dorées. *Albica aurea*. Jacq.

Albica foliis lanceolato-linearibus, pedunculis floribusque erectis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 441, & Collect. 4. pag. 202.

Ses hampes sont hautes d'un pied & demi; ses

feuilles planes, linéaires, lancéolées; les pédoncules très-rapprochés des tiges, longs de trois pouces; les fleurs redressées; la corolle d'un beau jaune-doré, traversée par une ligne verte; les trois divisions intérieures glanduleuses à leur sommet, réfléchies en de-là; les filamens extérieurs relevés en bosse vers leur pointe.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

11. ALBUCA d'Abyssinie. *Albica abyssinica*. Jacq.

Albica petalis interioribus, apice foveatis; foliis glabris, bracteis flore longioribus. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 64, & Collect. 1. pag. 55. — Dryand. Aët. Holm. 1784. pag. 297.

An asphodelus africanus? Lam. Dict. 1. pag. 300.

Ses feuilles sont roides, linéaires-lancéolées, creusées en gouttière. Ses hampes portent à leur sommet une grappe de fleurs soutenues par des pédoncules plus courts que la corolle, accompagnés de bractées linéaires, subulées, plus longues que la fleur. La corolle est d'un jaune-verdâtre.

Cette plante croît dans l'Abyssinie. ♀ Cette espèce me paroît être la même que l'*ASPHODELUS* d'Afrique, n°. 3.

12. ALBUCA odorant. *Albica fragrans*. Jacq.

Albica foliis linearilanceolatis, canaliculatis, glabris; pedunculis patentissimis, floribus cernuis, filamentis omnibus fertilibus, bulbo depresso. Jacq. Hott. Schoenbr. 1. pag. 44. tab. 84.

Cette espèce a presque le port d'un *anthericum*; elle a des bulbes comprimées. Ses feuilles sont glabres, linéaires-lancéolées, creusées en gouttière. Les hampes supportent des fleurs penchées, odorantes; les pédoncules très-ouverts, de la longueur des fleurs, accompagnés de bractées fort courtes; la corolle d'un jaune-verdâtre. Une ligne d'un vert plus foncé règne sur le dos de chacune des divisions.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

13. ALBUCA visqueux. *Albica viscosa*. Linn. f.

Albica floribus erectis; foliis linearibus, villosa-viscosa. Linn. f. Suppl. pag. 196. — Thunb. Prodr. 65. Aët. Holm. 1786. pag. 58. — Dryand. Aët. Holm. 1784. pag. 297. — Jacq. Icon. 2. tab. 445, & Collect. Suppl. pag. 99.

Les feuilles sont linéaires, subulées, couvertes de poils visqueux, ainsi que les hampes & les bractées; les pédoncules presque glabres, très-ouverts, inclinés, une fois plus longs que les fleurs; les divisions extérieures de la corolle blanches, traversées par une large bande verte; les

trois intérieures courbées en voûte, & jaunâtres à leur sommet. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. γ

14. ALBUCA à feuilles en spirale. *Albucca spiralis*. Linn. f.

Albucca floribus natis, foliis spiralibus. Linn. f. Suppl. 196. — Thunb. Prodr. 65; & Ait. Holm. 1786. pag. 58. tab. 1. fig. 1. — Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 499, & Collect. Suppl. 100.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles linéaires, fusulées, repliées à leurs bords, roulées en spirale à leur sommet, velues, rudes au toucher, plus longues que les hampes. Celles-ci supportent à leur partie supérieure des fleurs soutenues par des pédoncules inclinés. La corolle est d'un jaune-fale; ses divisions traversées sur leur dos par une large bande verdâtre. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. γ

ALCANA. Plusieurs ouvrages de botanique désignent sous ce nom le henné (*lausonia inermis* Linn.), nommé aussi *athenna*, & par corruption *alcanna*. Il est encore quelquefois attribué à une espèce de filaria (*phyllaria* Linn.). Enfin, dans Dulechamp, les racines de l'orcanette (*anchusa tinctoria* Linn.), employées dans la teinture, sont nommées *alcanna radices*. Cette identité de noms est probablement déterminée par le même emploi du henné & de l'orcanette pour teindre les dents & les ongles. (Juss.)

ALCÉE. *Alcea*. Ce genre, distingué des guimauves (*althæa* Linn.) par son port, n'en diffère dans sa fructification que par son calice extérieur, à six divisions au lieu de neuf; encore faut-il en excepter l'alcée de la Chine, qui en a de six à neuf. MM. de Jussieu & Cavanilles ont cru devoir réunir ce genre à celui des guimauves. En effet, cette variation dans les divisions du calice extérieur en fait disparaître le caractère distinctif. On peut néanmoins ajouter aux caractères des alcées celui d'avoir leurs capsules entourées d'un rebord membraneux & filloïde.

ESPÈCES.

1. ALCÉE rose. *Alcea rosea*. Linn.

Alcea (althæa rosea), caule erecto; foliis rugosis, cordatis, quinqueangulatis, crenatis. Cav. Diff. 2. pag. 97. tab. 18. fig. 1. — Lam. Ill. tab. 581. fig. 1. (Voyez ALCÉE, n°. 1.)

2. ALCÉE à feuilles de figuier. *Alcea ficifolia*. Linn.

Alcea (althæa ficifolia), caule erecto; foliis inferius palmatis, superius ovatis, crenatis; superioribus hastatis. Cavan. Dissert. 2. pag. 91. tab. 28.

fig. 2. — Lam. Illustr. tab. 581. fig. 2. (Voyez ALCÉE, n°. 2.)

3. ALCÉE de la Chine. *Alcea sinensis*. Lam.

Alcea (althæa sinensis), caule erecto, glabro, inferius ramoso; foliis cordatis, scabris, crenatis, angulatis; radice annua. Cavan. Diff. 2. pag. 92. tab. 29. fig. 3. (Voyez ALCÉE, n°. 3.)

4. ALCÉE à fleurs pâles. *Alcea pallida*. Waldf.

Alcea (althæa pallida), foliis subrotundo-ovatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 773. — Waldf. & Kitaib. Plant. Hung.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'alcée rose; mais ses feuilles sont ovales, arrondies; les lobes très-peu marqués. Le calice extérieur est aussi long que l'intérieur; les pétales d'un blanc teint de pourpre, profondément divisés en deux lobes.

Cette plante croît dans la Hongrie. σ

5. ALCÉE du Coromandel. *Alcea coromandeliana*. Cavan.

Alcea (althæa coromandeliana), foliis subtriangularibus, crenatis, obtusis, quinqueangulatis, subrotatis; floribus incarnatis, simplicibus, solitariis. Cavan. Diss. 2. pag. 93.

Tchima toutti, apud Indos. Commerf. Herb.

Ses tiges sont herbacées, tomenteuses, ainsi que toute la plante; ses feuilles périodées, presque triangulaires, crénelées, obtuses, à trois lobes peu marqués; les stipules courtes; les fleurs solitaires, axillaires, presque sessiles; le calice extérieur à six découpures; l'intérieur une fois plus long, à demi divisé en cinq découpures lancéolées. La corolle est grande, étalée, couleur de chair; les pétales oblongs, élargis, rétrécis à leur base; les étamines courtes, nombreuses; leur tube rougeâtre; les anthères jaunes; les stigmates de couleur purpurine, plus longs que le tube.

Cette plante a été recueillie à Pondichery par Commerf. (Herb. Juss.)

6. ALCÉE à tige courte. *Alcea acaulis*. Cavan.

Alcea (althæa acaulis), caule crasso, minimo; foliis numerosis, floribus spicatis. Cavan. Dissert. 2. pag. 93. tab. 27. fig. 3.

Mulva rosea, folio subrotundo, chalcopensis, acaulis; flore palliat luteo. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 524. l°. 21.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges courtes, droites, fermes, diffuses, de l'épaisseur du doigt, hautes de deux à six pouces, légèrement tomenteuses, ainsi que toute la plante. Les feuilles sont nombreuses, longuement pétiolées, ridées,

arrondies, échanrées en cœur, crénelées, divisées en lobes fécondes seulement dans les jeunes feuilles; les stipules larges, acuminées, ciliées. Les fleurs sont solitaires, axillaires, médiocrement pédonculées, réunies en épi; leurs calices tomentueux; l'extérieur hémisphérique, à six dents; l'intérieur globuleux, acuminé, strié, un peu pentagone à la partie supérieure, à cinq découpures; la corolle d'un jaune-pâle; les pétales rétrécis & velus à leurs ongles, élargis, échanrés au sommet; les anthères réniformes; l'ovaire comprimé, un peu arrondi, marqué de vingt-quatre filons.

Cette plante paroît être originaire du Levant; elle a été cultivée au Jardin des Plantes. O (Cavan.)

7. ALCÉE d'Afrique. *Alcea africana*. Lour.

Alcea foliis trilobis, crenatis; floribus solitariis, axillaribus; calice utroque sexpartito. Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 513.

Al. alba sinensis? Cavan. Dissert. 2. pag. 92. tab. 29. fig. 3.?

Cette espèce paroît avoir de grands rapports avec l'*alcea sinensis* de Cavanilles. Ses tiges sont ligneuses, droites, cylindriques, hérissées, hautes de quatre pieds; les feuilles rudes, alternes, pétiolées, divisées en trois lobes, inégalement crénelées; les fleurs latérales, d'un beau rouge-écarlate, soutenu par des pédoncules simples, solitaires, allongés. Les deux calices ont six découpures. L'ovaire est surmonté de cinq styles; le fruit composé de cinq capsules monospermes.

Cette plante croît sur les côtes de l'Afrique orientale. H (Lourcra)

ALCHIMILLE. *E. Alchemilla*. Ce genre & l'*aphanes* de Linné sont très-voisins; ils ne se distinguent que par le nombre des styles & des semences. On remarque deux styles & deux semences dans les *aphanes*; mais comme l'une des deux avorte très-souvent, il est alors très-difficile de les séparer des *alchemilla*, qui n'ont constamment qu'un style & une semence. M. de Lamarck avoit réuni ces deux genres dans son Dictionnaire; il les a ensuite séparés dans les *Illustrations des Genres*. Je crois qu'en effet, malgré l'avortement des semences, leur nombre, ainsi que celui des styles, est un caractère suffisant pour l'établissement de ces deux genres.

MM. Ruiz & Pavon ont ajouté trois espèces aux *aphanes*, sous le nom d'*alchemilla*. Ces espèces varient dans le nombre de leurs étamines, d'une à quatre.

ESPÈCES.

* ALCHIMILLE. Un style; une seule semence.

1. ALCHIMILLE commune. *Alchemilla vulgaris*. Linn.

Alchemilla foliis lobatis, utrinque nudis; caule glabra, floribus pedicellatis. Lam. Ill. 1. n°. 1702. tab. 86. fig. 1.

2. *Alchemilla* (glabra), *tota glabra, floribus paulo majoribus*. (Voyez ALCHIMILLE, n°. 1.)

La variété 2, qui croît dans les Alpes, a les fleurs un peu plus grandes, & les feuilles, ainsi que la tige, parfaitement glabres. Dans la première on remarque quelques poils rares sur les nervures en dessous.

2. ALCHIMILLE pubescente. *Alchemilla pubescens*. Lam.

Alchemilla foliis lobatis, subtus pubescentibus; caule villosa, floribus pedicellatis. Lam. Illustr. n°. 1703.

Alchemilla hybrida. Linn. Spec. 179. — Pluken. tab. 240. fig. 1.

Cette plante est constamment distincte de la précédente par ses tiges, ses feuilles & toutes ses autres parties, tomentueuses & plus grandes. Elle croît dans les bois & les prés des montagnes. ♀ (V. v.)

3. ALCHIMILLE argentée. *Alchemilla argentea*. Lam.

Alchemilla foliis digitatis, serratis, subtus sericeo-argenteis. Lam. Ill. 1. n°. 1705.

Alchemilla alpina. Linn. Spec. 179. (Voyez ALCHIMILLE, n°. 2.)

4. ALCHIMILLE quinte-feuille. *Alchemilla pentaphylla*. Linn.

Alchemilla foliis quinatis ternatisque; foliis multistidis, subciliatis. Linn. Spec. 179. (Voyez ALCHIMILLE, n°. 3.)

5. ALCHIMILLE aphanotide. *Alchemilla aphanoides*. Linn. f.

Alchemilla foliis multipartitis, caule erecto. Linn. f. Suppl. 129.

Ses tiges sont droites, hautes de sept à huit pouces, à peine rameuses, pubescentes; ses feuilles assez semblables à celles de l'*aphanes*, uées, à plusieurs découpures; les radicaux périodées, les autres amplexicaules; les fleurs presque verticillées, disposées en grappe terminale. Le calice est à huit divisions, de la grandeur de celui de l'*aphanes*. Elle croît à la Nouvelle-Grenade. O (Linn. f.)

6. ALCHIMILLE du Cap. *Alchemilla capensis*. Lam.

Alchemilla villosa, foliis crenatis; floribus sessilibus, glomeratis. Lam. Illustr. Gen. 1. n°. 1704. tab. 86. fig. 2.

Petite plante d'un port agréable, légèrement velue sur toutes les parties, dont les tiges sont filiformes, rameuses; les feuilles petites, orbiculaires, sessiles, amplexicaules, assez semblables à celles du *Sischorpia europæa*, échancrées à leur base, crénelées ou finement lobées à leur contour. Les fleurs sont terminales, sessiles, agglomérées.

Cette plante a été recueillie au Cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat. (*V. f. in herb. Lam.*)

*** APHANES. Deux styles; deux semences, dont une souvent avortée.

7. ALCHIMILLE des champs. *Alchemilla arvensis*.

Alchemilla (aphanes arvensis), foliis trifidis, pubescentibus; floribus axillaribus, glomeratis. Linn. Spec. 179. — (Weder. Flor. dan. tab. 973. — Lam. ill. tab. 87. (Voyez ALCHIMILLE, n°. 4.)

8. ALCHIMILLE trifide. *Alchemilla tripartita*. Flor. peruv.

Alchemilla villosa, foliis tripartitis; laciniis cuneiformibus, multifidis; floribus dichotomo-corymbosis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. t. pag. 68.

Ses racines font très-fibreuse; elles produisent plusieurs tiges étalées, rampantes, filiformes, rameuses, velues, air si que le reste de la plante; garnies de feuilles alternes, à peine pétiolées, à trois lobes cunéiformes, multilobes; les pétioles engainant. Les fleurs sont petites, sessiles, axillaires & terminales, disposées en corymbes dichotomes, soutenues par des bractées en forme de gaine déchi quetée. Les calices sont verts; les filaments au nombre de deux; deux ovaires dans le fond du calice, surmontés de styles filiformes, de la longueur des étamines, & de stigmates globuleux; deux semences renfermées dans le calice.

Cette plante croît sur les montagnes, au Pérou. x

9. ALCHIMILLE orbiculaire. *Alchemilla orbiculata*. Ruiz & Pav.

Alchemilla foliis orbiculato-reniformibus, lobatis, serratis; floribus spicato-corymbosis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. t. pag. 68.

Toute la plante est velue; ses tiges très-rameuses, farmenteuses, rampantes; les feuilles radicales éparées, longuement pétiolées, orbiculaires, réniformes, lobées, incisées & dentées, glabres en dessus, velues & argentées en dessous, très-veinées; les fleurs presque en corymbes dichotomes, pétiolées, assez nombreuses; les pédoncules accompagnés de bractées petiolées, déchi quetées; le calice campanulé, à huit découpures ovales, alternativement plus courtes; deux filaments, autant d'ovaires & de semences. Elle croît au Pérou. x

10. ALCHIMILLE ailée. *Alchemilla alata*. Ruiz & Pav.

Alchemilla foliis pinnatis, pinnulis bi-trifidis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 69.

Plante pileuse, stolonifère. Ses tiges sont cylindriques, farmenteuses, rampantes; les feuilles radicales pétiolées, ailées; deux à cinq pinnules cunéiformes, sessiles; les feuilles caulinaires amplexicaules; les pédoncules courts, axillaires; les calices verdâtres; deux étamines; deux ovaires; autant de semences. On trouve cette plante dans le Pérou; elle fleurit dans les mois de septembre & d'octobre.

ALCHORNEA. (Voyez ALCORNEE.)

ALCINA. (Voyez POLYMNIS perfoliée, vol. 5, pag. 566.) Ce genre avoir été établi par Cavanilles, & consacré à la mémoire du J.-suite espagnol qui a écrit sur l'histoire naturelle des Philippines, où il avoit fait un long séjour. Ce genre ne diffère des polymania que par son calice simple.

ALCORNEE. *Alchornea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dicées, qui paroît appartenir à la famille des euphorbes, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, à fleurs disposées en épi. Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; dans les fleurs mâles, un calice à trois ou cinq folioles; point de corolle; huit étamines; les filaments réunis à leur base; dans les femelles, un calice d'une seule pièce, à cinq dents; deux ou trois styles; une capsule un peu charnue, à deux ou trois coques monospermes.

ES PÈCE.

ALCORNEE à larges feuilles. *Alchornea latifolia*. Swartz.

Alchornea foliis ovato-acuminatis, denticulatis, glabris; racemis axillaribus terminalibusque. (N.) Swartz, Flor. ind. occid. 2. pag. 1154.

C'est un arbre d'environ vingt pieds. Son tronc se divise en branches horizontales, divergentes, & en rameaux cylindriques, un peu rabatus, légèrement verruqueux, gais de feuilles éparées, alternes, pétiolées, assez grandes, longues de deux ou trois pouces & plus, ovales ou un peu arrondies, membraneuses, très-glabres, un peu luisantes en dessus, légèrement ridées en dessous, soutenues par des pétioles glabres, cylindriques, alonges, réfléchis.

Les fleurs sont dioïques, disposées en grappes axillaires, terminales, longues de six à dix pouces, médiocrement paniculées, à rameaux alternes, étalés; les fleurs mâles d'un jaune-verdâtre, reu-

nées au nombre de quatre ou cinq par paquets sessiles. Leur calice est composé de trois ou cinq folioles ovales, concaves, égales, colorées. La corolle manque. Les filaments, au nombre de huit, sont filiformes, de la longueur du calice, réunis à leur base; les anthères droites, ovales. Les fleurs femelles sont disposées en longues grappes presque simples, lâches, un peu pendantes, latérales & non axillaires. Ses fleurs sont presque sessiles, alternées, distantes, solitaires. Leur calice est tubulé, presque ovale, à trois ou cinq petites dents aiguës; l'ovaire plus grand que le calice, en cœur ou à deux lobes; le style court, bifide, quelquefois trifide & à deux ou trois stigmates très-longs, lan-céoles, linéaires. Le fruit est une capsule noirâtre, globuleuse, à deux ou trois coques, contenant des semences solitaires & arrondies.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Jamaïque; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

ALDÉE ailée. *Aldea pinnata*. Flor. peruv.

Aldea foliis alternis, pinnatis, superioribus simplicibus; spicis terminalibus, binis, apice revolutis. Ruiz & Pav. Flor. per. v. 2. p. 8. tab. 114. fig. A.

Genre de plantes du Pérou, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des borraginées, qui a des rapports avec les *hydrophyllum* & les *phacelia*, qui jusqu'alors ne renferme qu'une seule espèce. Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; une corolle campanulée; le style bifide; une capsule bivalve, à une seule loge, contenant une ou deux semences.

Ses tiges sont herbacées, garnies de feuilles alternes, ailées; les feuilles supérieures simples. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, tournées d'un seul côté, comme dans l'héliotrope, dont cette plante a un peu le port. Le calice est persistant, à cinq divisions profondes, droites, linéaires; la corolle campanulée, de la longueur du calice, à cinq lobes arrondis; cinq filaments tubulés, velus, une fois plus longs que la corolle, insérés à sa base, soutenant des anthères oblongues; un ovaire libre, ovale, surmonté d'un style filiforme, bifide; il lui succède une capsule ovale, à une seule loge, contenant deux ou une seule semence par avortement, s'ouvrant en deux valves.

« Cette plante, observe M. de Jussieu, ressemble tellement à l'*heliotropium pinnatum*, Vahl, Symb. par ses feuilles ailées, par sa capsule & par son style fourchu, qu'elle n'en est peut-être qu'une variété à épis plus serrés. » M. de Lamarck, regardant comme capsulaire le fruit de cet *heliotropium*, l'a rapporté au genre *hydrophyle*, sous le nom d'*hydrophyllum magellanicum*. S'il en est ainsi, il faudrait également y réunir l'aldée, qui

toujours au moins pour la suivre immédiatement.

ALDINE. *Aldina*. Ce nom est donné par Adanson, en mémoire d'Alain, à l'ebony, arbre de la Jamaïque, décrit & figuré sous celui de *oryza* par Brown, Histoire de la Jam. 229, tab. 21, fig. 2. Il présente, dans sa fleur & dans son pistil, les caractères ordinaires des plantes légumineuses. Sa corolle est à deux pétales. Son ovaire devient une gouffe courte, remplie de deux graines, droite du côté de la future, courbe & finée d'un son milieu du côté opposé, prenant ainsi la forme d'un fruit composé de deux lobes monopermes, séparés par un étranglement. Ses feuilles sont rassemblées en faisceau, du milieu desquelles s'élèvent des pédoncules solitaires, chargés d'une ou plus souvent de deux fleurs.

Linnaeus rapportoit à son *aspalathus ebenus* cette plante, ainsi qu'un *spartium* de Plumier, figuré par Burmann, tab. 246, fig. 1, très-différent par son fruit entier, non finé. Murray, distinguant avec raison ces deux plantes, a fait de celle de Plumier un *ptero-carpo* (*ptero-carpus baxifolius*). L'aldine a été réunie par Swartz à l'*amerimona* de Brown; mais la gouffe entière du ce dernier, qui avoit empêché Brown lui-même de faire ce rapprochement, est toujours un signe distinctif, qui forcera peut-être de laisser subsister l'*aldina* comme genre séparé, différent des trois genres énoncés ci-dessus.

Scopoli avoit donné postérieurement le même nom au *vadakh*, que Rheed, Hort. Malab. vol. 9, tab. 41, annonçoit comme n'ayant qu'une graine nue; mais cette plante a été reconnue depuis comme une espèce de carmanthe. (*Jussiaea gendarussa*, Linn. & Diet. n°. 7, dont le fruit est certainement une capsule semblable à celle des espèces congénères. (Juss.)

ALDROVANDE vésiculeuse. *Aldrovanda vesiculosa*. Lam. Ill. Gen. tab. 220.

ALECTOROLOPHOS. Ce nom vient d'un mot grec, qui signifie une crête de coq. Les Anciens l'ont donné à plusieurs plantes assez différentes, telles que l'ailante, *erythraea allaria* Linn., espèce de vélar; la sciare des prés, *salvia pratensis* Linn., espèce du genre sauge; la crête de coq, *rhinanthus crista galli* Linn., espèce de co-ciée, & deux autres du même genre. Haller, dans ses *Stirpes helvetica*, l'emploie exclusivement pour ces dernières plantes, qu'il sépare des *rhinanthus*, d'après leur calice renflé & comprimé, & la lèvre supérieure de leur corolle plus courte. Cette séparation n'a pas encore été généralement admise.

ALECTRE. *Alectra*. Genre de plantes dicory-

lédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières; il se rapproche de la famille des pédi-
culaires, & a de grands rapports avec les oroban-
ches. Il comprend des herbes exotiques à l'Europe,
à feuilles éparfes, & dont les fleurs font dispo-
sées en un épi terminal.

Le caractère effentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres; la lèvre supérieure bifide,
l'inférieure trifide; une corolle en entonnoir; quatre
étamines didynames; les filamens barbus; une capsule
à deux loges; semences folitaires.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à deux lèvres,
la supérieure à deux divisions, l'inférieure bifide.

2°. Une corolle monopétale, tubulée; le tube
insensiblement élargi; le limbe étalé, à cinq dé-
coupures élargies, lancéolées, obtuses.

3°. Quatre étamines didynames; les filamens fi-
liiformes, insérés sur le tube de la corolle, barbus,
de la longueur du tube, deux un peu plus courts,
soutenant des anthères à deux lobes.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style fili-
forme, de la longueur des étamines, terminé par
un stigmate recourbé, un peu plus épais que le
style, de la même longueur, strié à ses deux
côtés.

Le fruit consiste en une capsule ovale, obtuse,
à deux loges, à deux valves; une semence ovale
dans chaque loge.

E S P È C E.

ALECTRE du Cap. *Alectra capensis*. Thunb.

*Alectra foliis ovatis, sessilibus, sparsis; floribus
spicatis, terminalibus.*

Alectra capensis. Thunb. Nov. Gen. Plant. vol. 3.
pag. 80.

Cette plante a le port d'un orobanche. Ses tiges
sont droites, simples, striées, cylindriques, ve-
lues, fistuleuses, hautes d'environ un pied, garnies
de feuilles éparfes, sessiles, droites, ovales, très-
entières, obtuses à leur sommet, velues; les in-
férieures plus petites; les supérieures insensible-
ment plus grandes, longues de cinq à six lignes.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal,
pouvues d'un calice à deux lèvres; la supérieure
divisée en deux lobes; l'inférieure en trois. La
corolle est jaune, marquée de stries purpurines,
d'une seule pièce, consistant en un tube évasé par
le haut, attaché au fond du calice, divisé à son
limbe en cinq coupures. Les étamines, au nom-

bre de quatre, ont leurs filamens velus. L'ovaire,
libre, est surmonté d'un style & d'un stigmate
strié; il se convertit en une capsule glabre, ovale,
à deux loges, s'ouvrant en deux valves, conte-
nant une semence dans chaque loge.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance,
parmi les gazons, sur le bord des fleuves, où elle
a été découverte par Thunberg. Elle noircit par
la dessiccation. ○ (*Descript. ex Thunb.*)

ALECTRYON. Gartn. de Fruët. & Sem. 1, pag.
216, tab. 46, fig. 2. Gärtner fait mention, sous
ce nom, d'une plante particulière, dont il n'y a
que le fruit de connu. Il en établit le caractère
ainsi qu'il suit :

Une baie sèche, à une seule loge, comprimée en
côté à sa partie supérieure; une seule semence; un
arille incomplet & pulpeux.

Cette baie est dégagée du calice, coriace, glo-
buleuse, pubescente, cendrée ou un peu brune,
surmontée d'une crête marginale. La semence est
sphérique, luisante, d'un pourpre-noirâtre, à
moitié entourée d'un arille. La radicule de l'em-
bryon, dépourvu de périsperme, est recourbée sur
les lobes courbés en spirale. Ces caractères
déterminent la famille de cette plante, qui, d'après
M. de Jussieu, doit entrer dans celle des favo-
naires; mais peut-être que, si cette même plante
étoit mieux connue dans toutes ses parties, elle
seroit réunie à quelqu'autre genre déjà établi. Elle
porte le nom d'*evonymoides excelsa*, dans les ma-
nuscripts de Solander.

ALÉPIDÉE ciliée. *Alepidia ciliaris*. M. de La-
roche, dans un très-bel ouvrage qu'il vient de
publier sur les *eryngium*, a séparé des *astrantia*
Linn., l'*astrantia ciliaris* Linn. f., espèce plus rap-
prochée des *eryngium* que des *astrances*, mais qui
en diffère suffisamment pour constituer le nouveau
genre établi par M. de Laroche, & auquel il
donne pour caractère effentiel :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales courbés en
dedans; fleurs sessiles, réunies en tête sur un récep-
tacle nu, hémisphérique; fruits tuberculeux.

Les ombelles partielles sont composées d'une
petite tête de fleurs sessiles, entourées par un in-
volucre à dix coupures profondes, lancéolées,
épéneues à leur sommet. Le calice est d'une seule
pièce, à cinq coupures ovales, presque obreses;
le tube adhérent à l'ovaire, & couvert d'un grand
nombre de petits tubercules. La corolle est fort
petite, composée de cinq pétales caducs, alternes
avec les divisions du calice; les étamines un peu
saillantes, opposées aux coupures du calice;
les anthères ovales, à deux loges; l'ovaire om-
bilicé; dix crénélures à son sommet; il s'en élève
deux styles filiformes. Le fruit est ovale, adhérent
avec

avec le tube du calice, couvert de tubercules, partagé en deux à l'époque de la maturité. (Voyez pour les autres détails, ASTRANCE ciliata, n°. 4.)

ALÉTRIS. *Aletris*. Linné avoit réuni dans ce genre, plusieurs espèces qu'un examen plus étendu des caractères génériques a fait reconnoître appartenir à de nouveaux genres qui ont été établis sous les noms de *Sansevieria* & *Veltheimia*, mentionnées dans cet ouvrage.

D'après cette réforme, le caractère des alétris se réduit aux suivans :

Une corolle infundibuliforme, point adhérente à l'ovaire ; à six divisions ; six étamines attachées à ces divisions ; un style ; un stigmate trifide ; une capsule à trois faces, à trois loges, divisée en trois valves, portant chacune une cloison mitoyenne, contenant plusieurs semences.

ESPÈCES.

1. ALÉTRIS odorant. *Aletris fragrans*. Linn.

Aletris caulescens, foliis lanceolatis, laxis. Jacq. Vind. 309. — Linn. Syst. Plant. 337. (Voyez ALÉTRIS, n°. 5.)

2. ALÉTRIS farineux. *Aletris farinosa*. Linn.

Aletris acutula, foliis lanceolatis, membranaceis ; floribus alternis. Linn. Spec. Plant. 456.

Aletris (alba), floribus manifestius pedicellatis, oblongo tubulosis ; calicibus fructiferis, levissimis, formosis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 189. (Voyez ALÉTRIS, n°. 1.)

3. ALÉTRIS à fleurs jaunes. *Aletris aurea*. Walth.

Aletris floribus subsessilibus, breviter tubulatis, campanulatis ; calicibus fructiferis, rugosis, scaberrimis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 190. — Pluken. Almag. 135. tab. 174. fig. 5. — Morif. Hist. 3. pag. 606. 5. 15. tab. 2. fig. 1.

Il sort des racines plusieurs feuilles étalées en rosette, toutes radicales, lancéolées, très-aiguës, du centre desquelles s'élève une tige droite, garnie de petites folioles alternes, en forme d'écaillés. Les fleurs sont alternes, presque sessiles, en épi terminal. La corolle est d'un beau jaune-doré, en forme de bulle avant son épanouissement, un peu pubescente, médiocrement tubulée, presque campanulée. Cette corolle persiste sur le fruit ; elle devient ridée & scabre.

Cette plante croît dans la Caroline.

Michaux y rapporte les synonymes de Plukenet & de Morifon, que Linné avoit pensé devoir appartenir à son *Helonia bullata*.

Botanique, Supplément. Tome I.

4. ALÉTRIS écarlate. *Aletris punicea*. Labill.

Aletris foliis linearilanceolatis, striatis, emarginatis ; subsessilibus. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 85. tab. 111.

Les feuilles radicales sont planes, roides, striées à leurs deux faces, un peu cartilagineuses & légèrement crénelées à leurs bords, presque aussi longues que les tiges. Cell-s-ci sont hautes de deux pieds, légèrement cylindriques, munies à leur partie inférieure d'une ou de deux feuilles semblables aux radicales, mais plus petites, & d'autres feuilles à demi vaginales, en forme d'écaillés, appliquées contre les tiges, petites, semblables aux bractées. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, longue d'environ six pouces & plus ; les pédoncules simples, longs d'un pouce ; la corolle est, en dehors, d'un pourpre écarlate, d'un jaune de safran en dedans, rubulée, ventru ; le limbe court, à six découpures ovales, bordées de jaune ; six étamines opposées aux divisions de la corolle ; les anthers hautes, obtuses, à deux loges. L'ovaire est libre, lancéolé, trigone ; le style subulé, à peine saillant hors de la corolle ; le stigmate trifide. Le fruit consiste en une capsule allongée, trigone, pédicellée, à trois loges, à trois valves ; les semences hispides, nombreuses, oblongues, attachées en un double rang sur le bord intérieur des valves. L'embryon est linéaire, cylindrique, placé dans un péricarpe charnu.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Description ex Labill.)

* *Aletris (cochinchinensis), caulescens, foliis lanceolatis linearibus, reflexis ; flore paniculato*. Lour. Flot. cochin. vol. 1. pag. 253. An *aletris chinensis* ? Lam.

ALEVRITE. BANCOLIER. *Alevrites*. A ce genre, établi par Forster, se réunissent deux autres plantes placées par Linné, l'une parmi les *Jatropha*, l'autre parmi les *Croton*, déjà mentionnées dans cet ouvrage, la première sous le nom de *MEDICINER des Moluques*, n°. 6, vol. 4 (*Jatropha moluccana* Linn.) ; la seconde sous celui de *CROTON des Moluques*, n°. 15, vol. 2 (*Croton moluccanum* Linn.).

ALEVRITE à trois lobes. *Alevrites triloba*. Forst. — Lam. Ill. Gen. tab. 791.

Ses feuilles sont larges, alternes, longuement pétioles, divisées en trois, rarement en cinq lobes aigus ; les deux latéraux très-courts, le terminal lancéolé. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, étalée, très-rameuse. (Voyez BALUCANAD, Suppl.)

ALIBOUFIER. *Stryx*. Ce genre a pour caractère essentiel :

O o

Un calice d'une seule pièce, à cinq dents, médiocrement adhérent avec l'ovaire par sa partie inférieure; le nombre des étamines variable (de six à dix); les filaments réunis par leur base, naissant du fond du tube d'une corolle monopétale, à trois ou cinq découpures; l'ovaire contient plusieurs semences, mais il n'en reste qu'une ou deux dans le drupe qui lui succède.

E S P È C E S.

1. ALIBOUFIER officinal. *Styrax officinale*. Linn.

Styrax foliis ovatis, subita villosis; racemis simplicibus, folio brevioribus. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 76. — Linn. Spec. 635. — Cavan. Diff. 6. pag. 338. tab. 188. fig. 2. — Garid. Aix, pag. 450. ab. 95. — Lam. Ill. tab. 369. (Voyez ALIBOUFIER, n°. 1.)

2. ALIBOUFIER à grandes feuilles. *Styrax grandifolium*. Ait.

Styrax foliis obovatis, subita villosis; pedunculis axillaribus, foliatis, unifloris. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 75. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 41.

Styrax officinale. Walth. Flor. carol. 140.

Ses feuilles sont beaucoup plus larges que celles de l'espèce précédente, velues en dessous, en ovale renversé, médiocrement denticulées, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes allongées, terminales, sessiles à leur partie inférieure; les pedoncules axillaires, solitaires, à une seule fleur.

Cette plante croît dans les forêts de la Caroline. (V. f.)

3. ALIBOUFIER pulvérulent. *Styrax pulverulentum*. Mich.

Styrax foliis parvulis, subsessilibus, ovalibus, non acuminatis, subita quasi pulverulento-tomentosis; floribus axillaribus, foliatis-terminalibus, brevissimis pedicellatis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 41.

Cette espèce a de très-grands rapports avec l'aliboufier à grandes feuilles; mais les feuilles sont beaucoup plus petites, presque sessiles, ovales, point acuminées, tomenteuses & comme pulvérentes à leur face inférieure. Les fleurs sont axillaires, médiocrement pedicellées, réunies presque trois par trois au sommet des rameaux.

Elle croît à la Caroline, dans les forêts. (V.)

4. ALIBOUFIER à feuilles glabres. *Styrax glabra*. Cavan.

Styrax foliis subovatis, glaberrimis, denticulatis; floribus axillaribus, cernuis. Cavan. Diff. bot. pag. 340. tab. 188. fig. 1. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 41.

Styrax americana. Lam. Dict. 1. pag. 82.

Styrax leve. Walth. Flor. car. 140.

Styrax levigatum. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 75. (Voyez ALIBOUFIER, n°. 2.)

Ses étamines varient de six à dix. L'ovaire est adhérent au calice dans sa partie inférieure.

5. ALIBOUFIER benjoin. *Styrax benzoin*. Dryand.

Styrax foliis oblongis, acuminatis, subita tomentosis; racemis compositis, longis, dine foliorum. Dryand. in Act. Angl. 77. pag. 38. tab. 12.

Laurus benzoin. Houttuyn. in Act. Harlem. 21. pag. 265. tab. 7.

Arbor benzoini. Grimm. in Ephem. A. N. C. decad. 1. ann. 1. pag. 370. fig. 31.

Benjui. Garcias, ab Hort. in Clus. exot. p. 155.

Ses feuilles sont oblongues, ovales, acuminées, très-entières à leurs bords, tomenteuses à leur face inférieure; les fleurs disposées dans l'aisselle des feuilles en grappes paniculées, de la longueur des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à Sumatra. (V.)

Observations. L'on n'avoit eu jusqu'alors que des présumptions incertaines sur l'arbre qui produit cette résine, connue sous le nom de benjoin. Linné pensoit, d'après Commelin, que c'étoit une espèce de laurier; d'autres, & M. de Lamarck penchoit pour cette opinion, l'attribuoient à un badamier (*terminalia benjoin* Linn. f.), trompés par l'analogie de l'odeur de sa résine. Enfin, Dryander a prouvé depuis, dans les *Transfusions philosophiques*, que l'arbre qui fournit le benjoin est un aliboufier.

A l'âge de cinq à six ans on fait, au haut du tronc de cet arbre, une incision oblique; il en sort une résine blanche & transparente; elle devient, en se figeant, d'un gris-jaunâtre ou d'un brun-rougeâtre & maculé par places; d'où vient le nom d'*amygdaloïde* donné au benjoin. A Malacca, Java & Sumatra, on ne conserve ces arbres que pendant six ans, parce que la récolte, qui est d'environ trois livres par an, diminue beaucoup après cet âge.

Le benjoin se sublime au bain de sable, en fleurs argentées. Ces fleurs sont un acide particulier, nommé *benzique*. On emploie les fleurs du benjoin dans les parfums; en médecine, pour les maladies du poulmon, & dans la chirurgie contre la gangrène & les écrouelles. On a prétendu qu'elles enlevoient les taches de rousseur; aussi la résine, dissoute dans l'esprit-de-vin, donne-t-elle cette teinture, dont quelques gouttes, mêlées dans l'eau, deviennent la liqueur blanchette

qui, sur les toiles, porte le nom de lait virginal. (Voyez BENJOIN.)

ALISIER. *Cratagus*. La plupart des alisiers sont indigènes de l'Europe. Parmi les espèces qui y croissent, les unes ne font que des arbrisseaux peu élevés ; les autres, des arbres d'une médiocre grandeur. Les premiers sont la décoration des hautes montagnes, où l'œil le plus d'aurait plus à les considérer, que les grands végétaux y sont si rares de nos forêts. S'ils ne les égalent pas en hauteur, si l'ombre épaisse de leur cime est nuisible à la végétation des alisiers, ceux-ci remplissent avec avantage les clairières & le vide des taillis ; ils s'y distinguent par la beauté de leurs feuilles, semblables à celles des érables dans l'alisier des bois, bien moins anguleuses, mais plus larges dans l'alisier de Fontainebleau. Leurs fleurs au printemps, leurs fruits en automne, étalent avec élégance leurs cotynthes rameux.

Les alisiers des hautes montagnes ont un tout autre aspect ; ils se présentent sous une forme agreste & sauvage, mais tellement en harmonie avec les rochers arides & solitaires où ils croissent, qu'ils plairoient moins s'ils avoient plus d'élégance. Cette forme peu régulière n'exclut point la beauté : on la retrouve dans les feuilles de l'allouchier, d'un blanc satiné en dessous, à reflets argentés lorsqu'elles sont frappées par le soleil ; dans les fleurs de l'alisier nain, nombreuses & réunies en petits corymbes touffus. Dans toutes ces espèces, les fruits, globuleux, jaunâtres ou d'un rouge plus ou moins vif, ne le cèdent point aux fleurs pour l'agrément, & l'emportent par leur utilité : c'est pour eux qu'un grand nombre d'oiseaux viennent visiter les solitudes des Pyrénées & des Alpes, & animer par leur présence ces rochers abandonnés.

On a vu dans l'ouvrage de M. de Lamarck les caractères d'après lesquels cet auteur distingue les *Cratagus des mepilus*, & les motifs qui autorisent cette nouvelle distribution. Nous n'avons à ajouter à ce travail que les phrases spécifiques & quelques espèces nouvelles.

ESPÈCES.

1. **ALISIER blanc, ALLOUCHIER.** *Cratagus aria*. Linn.

Cratagus foliis ovatis, incis, serratis, subulis tomentosis. Linn. Spec. 681. — *Æder*. Flor. dani. tab. 302. — Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. tab. 34. — Lam. Ill. tab. 433. fig. 1.

Pyrus aria. Willd. Spec. 2. pag. 121.

Sorbus aria. Crantz. Austr. Fasc. 2. tab. 2. fig. 2.

a. *Cratagus foliis subrotundo-ovatis ; subulis albidis-tomentosis*.

b. *Cratagus foliis ovato-oblongis, subulis tomentosis*. (Voyez ALISIER, n°. 1.)

2. **ALISIER de Fontainebleau.** *Cratagus latifolia*. Lam.

Cratagus foliis ovato subrotundis, basi angulosis, serratis, subulis albidis, tomentosis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. 4. pag. 130. tab. 35.

Cratagus dentata. Thuill. Paris, édit. 2. pag. 245. (Voyez ALISIER, n°. 2.)

3. **ALISIER des bois ou torminal.** *Cratagus torminalis*. Linn.

Cratagus foliis cordato-ovatis, laciniato-lobatis, serratis ; lobis infimis divaricatis, floribus corymbosis. Poir. in D. ham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 128. tab. 33. — Linn. Spec. 681. — *Æder*. Flor. dan. tab. 798. — Jacq. Flor. Austr. 5. pag. 21. tab. 443. — Lam. Ill. tab. 433. fig. 2.

Pyrus torminalis. Willd. Spec. 2. pag. 1022. (Voyez ALISIER, n°. 3.)

4. **ALISIER à trois lobes.** *Cratagus trilobata*.

Cratagus foliis lato-cordatis, trilobatis, serratis ; lobis lateralibus bifidis, terminali trifido, pedunculis foliatis. (N.)

Ses rameaux sont cylindriques, raboteux ; les feuilles éparées, pétiolées, élargies, un peu échancrées en cœur à leur base, divisées en trois lobes principaux ; les deux latéraux & inférieurs très-ouverts, inégalement bilobés ; le supérieur & terminal plus large, à trois divisions, toutes plus ou moins lancéolées, aiguës, denrées en scie, glabres, coriaces ; un peu pubescentes en dessous dans leur première jeunesse ; les pétioles grêles, alongés, un peu comprimés. Les fleurs sont suspendues vers l'extrémité des rameaux, sur des pedoncules solitaires, rapprochés, presque aussi longs que les pétioles, uniflores ; le calice très-tomentueux, à cinq découpures lancéolées, aiguës, pendantes ; les fruits de la grosseur d'une cerise, globuleux, de couleur rouge ; les semences cartilagineuses.

Cette plante croît en Syrie, où elle a été découverte par M. Labillardière. h (V. f. in herb. Desfont.)

5. **ALISIER nain.** *Cratagus humilis*. Lam.

Cratagus foliis ovatis, serratis, utrinque glabris ; floribus divinis, corymbo-capitatis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 133.

Cratagus chamaemepilus. Jacq. Vind. 243, & Flor. austr. tab. 231.

Mespilus chamaemepilus. Linn. Spec. 685.

Sorbus fruticosa, &c. Crantz. Austr. pag. 83, tab. 1. fig. 3. (Voyez ALISIER, n°. 4.)

6. ALISIER à feuilles d'arbutifolia. *Crataegus arbutifolia*. Lam.

Crataegus foliis ovatis, acutis, serratis, subtus albidis, subpubescentibus. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 131.

Mespilus arbutifolia? Linn. Spec. 685. (Voyez ALISIER, n°. 5.)

7. ALISIER à feuilles de poirier. *Crataegus pyrifolia*. Lam.

Crataegus foliis oblongo-ovatis, argutè serratis, subtus incano-tomentosis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 131. (Voyez ALISIER, n°. 6.)

8. ALISIER amélanchier ou à feuilles rondes. *Crataegus amelanchier*.

Crataegus foliis ovato-subrotundis, dentatis, subglabris; petalis lanceolatis. Poir. in Duham. Arb. vol. 4. pag. 131.

Crataegus rotundifolia, var. α . Lam. Dict. 1. pag. 84.

Mespilus amelanchier. Linn. Spec. 685.

Pyrus amelanchier. Linn. Suppl. 256. — Willd. Spec. 2. pag. 1014.

Sorbus amelanchier. Crantz. Austr. 90.

9. ALISIER de Crète. *Crataegus cretica*.

Crataegus foliis circinnatis, argutè dentatis, apice truncatis; floribus racemosis, petalis ellipticis, germinibus tomentosis. Desfont. Coroll. pag. 79. tab. 59.

Crataegus (pyrus cretica), foliis subrotundis, emarginatis, mucronatis, subtus lanatis; floribus racemosis, petalis lanceolatis; germinibus calicinisque segmentis lanato-tomentosis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1015.

Crataegus rotundifolia, var. β . Lam. Dict. 1. pag. 84.

Cerasus idea. Alpin. Exot. pag. 3. tab. 2.

Mespilus cretica, folio circinnato, & quasi cordiformi. Tournef. Inst. Coroll. 43.

Malgré ses rapports avec l'espèce précédente, celle-ci en est très-distincte. Ses feuilles sont ovales ou arrondies, fermes, épaisses, blanches & tomenteuses en dessous, glabres en dessus, presque glabres à leurs deux faces dans leur jeunesse, la plupart échançrées à leur sommet, avec une petite pointe dans le milieu de l'échancrure; à denzelures courtes, lâches, très-aiguës; les nervures fines, latérales & parallèles; les pétioles tomenteux ou pubescents; les fleurs disposées en grappes lâches, presque en corymbe, axillaires, plus longues que les feuilles; les pédoncules & les calices tomenteux; la corolle blanche; les pé-

tales obtus, elliptiques; les fruits de la grosseur d'un grain de groseille, ovales-arrondis, rouges, puis noirâtres, à cinq loges; deux semences cartilagineuses dans chaque loge.

Cette plante croît à l'île de Crète, sur le mont Ida. \mathfrak{H} (V. f. in herb. Desfont.)

10. ALISIER à fines denzelures. *Crataegus serrulata*.

Crataegus foliis ovato-oblongis, obtusis, apice mucronatis, subtus tomentosis; floribus racemoso-corymbosis. (N.)

An mespilus (arbutifolia), inermis, foliis oblongo-ovalibus, acuminatis, subtissimè serrulatis, subtus subcanescentibus; corymbo composito? Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 191.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, luisants, couleur de bronze; ceux qui portent les fleurs, roides, très-courts, horizontaux; les feuilles médiocrement pétioles, ovales-oblongues, obtuses, un peu mucronées à leur sommet, très-finement denticulées à leur contour, glabres en dessus, blanches & tomenteuses en dessous, longues d'un pouce & plus, larges d'environ six lignes, un peu rétrécies à leur base; les nervures obliques, se dirigeant vers le sommet des feuilles. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des petits rameaux, en corymbes courts; les pédoncules de la corolle pubescents; la corolle blanche; les pétales ovales, rétrécis en onglet à leur base.

Cette plante croît dans la Caroline. \mathfrak{H} (V. f. Comm. Bosc.)

11. ALISIER à épis. *Crataegus spicata*. Lam.

Crataegus foliis rotundatis, serratis, subglabris; floribus racemosis spicatis, calice intus tomentoso, petalis brevibus. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 132.

Pyrus (ovalis), foliis subrotundo-ellipticis, acutis, glabris; floribus racemosis, petalis obovatis, germinibus calicinisque segmentis pubescentibus. Willd. Spec. 2. pag. 1014. (Voyez ALISIER, n°. 8.)

12. ALISIER à grappes. *Crataegus racemosa*. Lam.

Crataegus foliis ovato-oblongis, acutis, serratis, subglabris; floribus racemosis; petalis sublinearibus, oblongis. Poir. in Duham. Arb. edit. nov. vol. 4. pag. 133.

An mespilus canadensis? Linn. Spec. 685. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 191.

An pyrus botryapium? Linn. Suppl. 255. — Wengenb. Amer. 90. tab. 28. fig. 65. — Willd. Spec. 2. pag. 1013. (Voyez ALISIER, n°. 9.)

ALISMA. (Voyez FLUTEAU.)

ALISMOÏDES. On trouve sous ce nom, dans le *Tableau du règne végétal*, par Ventenat, une famille de plantes qu'il a détachée de celle des joncs, dont elle formoit une section particulière dans le *Genera Plantarum* de M. de Jussieu. Dans cette nouvelle famille :

Le calice est à six divisions (un calice à trois folioles, trois pétales, Linn.), entourant six ou neuf étamines, rarement plus, au milieu desquelles sont trois ou six ovaires & plus, surmontés chacun d'un style ou d'un stigmate. Ces ovaires deviennent autant de capsules monospermes, qui ne s'ouvrent point, ou polyspermes, s'ouvrant en deux valves. L'embryon, contenu dans les gaines, est droit ou courbé, dénué de périsperme.

Les plantes de cette famille sont herbacées, & croissent dans l'eau ou dans les lieux humides. Leurs feuilles sont radicales, alternes, engainantes ; les fleurs disposées en épis, en ombelles ou en verticilles, accompagnées d'un involucre à plusieurs folioles dans quelques genres. Le *Sagittaria* est le seul genre de cette famille qui soit monoïque, le seul qui ait un nombre indéfini d'étamines.

Les principaux caractères qui distinguent les alismoïdes des joncs sont la pluralité des ovaires & l'absence du périsperme ; ils suffisent pour en former une famille distincte, & même pour les séparer des autres familles monocotylédones à étamines (pérygines) attachées au calice, qui toutes ont un périsperme, & généralement un seul ovaire ; « mais alors, dit M. de Jussieu, quel lieu occupera celle-ci dans l'ordre naturel si elle s'éloigne des joncs ? » Ce problème sera difficile à résoudre. Les principaux genres qui composent cette famille sont les suivans :

§. I^{er}. Fleurs en ombelle ou verticillées.

Les butomas.	<i>Butomas.</i>
Les flutiaux.	<i>Alisma.</i>
Les fléchères.	<i>Sagittaria.</i>

§. II. Fleurs en épis.

Les scheuchères.	<i>Scheuchzeria.</i>
Les triglochins.	<i>Triglochin.</i>

ALKENGE. (Voyez COQUERET.)

ALLAMANDA. (Voyez ORÉLIE.)

ALLASIA. (Voyez ALLASIE.)

ALLASIE à fruits rouges. *Allasia paysonii*. Lour.
Allasia foliis pentaphyllis, pedunculis multifloris.
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 107.

C'est un grand arbre à rameaux étalés, garni de feuilles opposées, pétioles, digitées, composées de cinq folioles entières, velues, disposées en main ouverte sur un pétiole commun. Ses fleurs sont terminales, réunies plusieurs ensemble sur un même pédoncule.

Chaque fleur est composée, 1^o. d'un calice tubuleux, divisé à son sommet en quatre lobes, & environné à sa base d'un autre petit calice extérieur très-court, à cinq découpures ; 2^o. quatre étamines, dont les filamens sont épais, surmontés d'anthères à deux lobes, attachés au sommet du tube du calice intérieur, qui fait corps avec un ovaire surmonté d'un seul style & d'un stigmate. Cet ovaire se convertit avec le calice en une baie grande, pendante, charnue, allongée, de couleur rouge tirant sur le brun, à une seule loge, remplie de graines nichées dans une pulpe.

Cet arbre croît en Afrique, sur la côte de Mozambique. Ses feuilles, appliquées en cataplasme sur les reins, facilitent l'accouchement, au rapport de Louréiro.

ALLIAIRE. (Voyez VELAR.)

ALLELUIA : nom commun de l'*Oxalis*. (Voyez OXALIDE.)

ALLIONIA. (Voyez ALLIONE.)

1. ALLIONE incarnate. *Allionia incarnata*. Linn.
— Lhérit. Strp. 63. tab. 41. — Lam. Ill. tab. 58.
— Flor. petr. vol. 1. pag. 49.

3. ALLIONE à feuilles de jalap. *Allionia nybaggina*. Michx.

Allionia creba, foliis lato-cordatis, acutis ; pedunculis solitariis, involucri quinquefolio, calice fructifero pubescente. Michx. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 106.

Cette espèce a le port du *mirabilis jalapa* Linn. Ses tiges sont droites, presque glabres, garnies de feuilles larges, en cœur, très-entières, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont solitaires, pédonculées, munies d'un involucre ou calice commun à cinq découpures oblongues, contenant trois fleurs ; le calice propre beaucoup plus petit, légèrement pubescent ; les corolles un peu irrégulières ; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les bords du fleuve Tennassée. (Michx.)

ALLIUM. (Voyez AIL.)

ALLOPHILUS. (Voyez ALLOPHILE & USURE.)...

ALLOSURUS. (Bernh.) Même genre que le cheilanthus. (Voyez ADIANTE, Suppl.)

ALNUS. (Voyez AUNE & BOULEAU.)

ALOËS. *Alôë*. Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Une corolle tubuleuse, ses découpures à son orifice ; ses étamines insérées sur le réceptacle du pistil ; une capsule libre, à trois loges, à trois valves ; des semences nombreuses, disposées sur deux rangs, membraneuses à leurs bords.

ESPÈCES.

* Feuilles bordées de dents épineuses.

1. ALOËS à bord rouge. *Alôë purpurea*. Lam.

Alôë (marginalis), caudice arboresc., foliis densato-spinosis ; geminis ovato-globosis, trifidis. Decand. Plant. grass. pag. 31. Icon.

Dracaena (marginalis), fruticosa, foliis densato-spinosis, racemis axillaribus, baccis polyspermis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 454. n° 3. (Voyez ALOËS, n° 1.)

Cette espèce diffère des autres espèces d'aloë par sa corolle, dont le fond n'est pas rempli d'un suc glutin ; par sa capsule charnue, globuleuse, à trois sillons ; par ses loges point divilées par une cloison imparfaite ; par ses semences, point membraneuses à leurs bords ; enfin, ses feuilles ne sont ni épaisses ni charnues. Elle diffère des *dracaena* par ses étamines non dilatées dans leur milieu, par les loges des capsules, contenant plusieurs semences disposées sur deux rangs.

2. ALOËS succotrin. *Alôë succotrinum*. Lam.

Alôë caule fruticoso, foliis oblongo-ensiformibus, submaculatis ; margine corneo, albo, spinoso ; spinis rectis. Decand. Plant. grass. pag. 85. Ic. — Blackw. edit. Trav. 3. tab. 333. — Regnaud, Bot. Ic.

Alôë (innata), caulescens, foliis ensiformibus, mucato-ferratis, reflexis ; floribus racemosis, erectis, cylindricis. Willd. Spec. 2. pag. 187. (Exclus. synon. Ait. & Dillen.)

Alôë vera. Mill. Dict. n° 15.

Alôë perfoliata, var. 1. Linn. Spec. 458.

Alôë perfoliata, succotrina. Ait. Kew. 1. p. 466. n° 2. var. 2. (Voyez ALOËS, n° 2.)

3. ALOËS ordinaire. *Alôë vulgaris*. Lam.

Alôë foliis petalis, adscendentibus, margine spinosis ; pedunculo ramoso, ramis bracteis duplici amplexis. Decand. Plant. grass. pag. 27. Ic.

* *Alôë* (barbadiensis), foliis mollibus, maculatis aut immaculatis, margine & spinis obsolète rubris. Decand. 1. c. — Mill. Dict. n° 2. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 66. n° 2. var. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 210. — Blackw. Herb. 4. tab. 219. — Regnaud, Bot. 1c. — Tragaf. Hist. 952. — Camer. Ejus. 450. Icon.

Alôë perfoliata, vera. Linn. Spec. Plant. pag. 458. var. 1.

Alôë elongata. Murr. Comm. Goett. 1788. pag. 191. tab. 2.

Alôë sempervivum, morinum. Lobel. 1c. 374, & Obf. pag. 202.

Alôë arabica, ferotina, vulgaris officinarum. Morif. Hist. 2. pag. 414. 5. 4. tab. 22. fig. 1. Medicinis.

4. *Alôë* (abyssinica), foliis densiusculis, maculatis aut immaculatis ; spinis rubris. Decand. 1. c. — Lam. Dict. n° 5. (Voyez ALOËS, n° 3 & 5.)

Selon M. Decandolle, l'aloë d'Abyssinie n'est qu'une variété de l'aloë ordinaire. Ses feuilles sont plus fermes ; leur contour rougeâtre, & les épines d'un rouge vif.

4. ALOËS rougeâtre. *Alôë rubescens*. Decand.

Alôë foliis amplexicaulis, petalis, margine spinosis ; pedunculo compresso, ramoso ; ramis subsessilibus. Decand. Plant. grass. pag. 15. Ic.

Alôë vera. Lam. Dict. 1. pag. 86. (Voyez ALOËS, n° 4.)

5. ALOËS cornes de bœlier. *Alôë fruticosa*. Decand.

Alôë (arborescens), foliis amplexicaulis, reflexis, margine spinosis. Decand. Plant. grass. pag. 38. Ic.

Alôë perfoliata, arborescens. Ait. Kew. 2. pag. 466. n° 1. variété 1. — Linn. Spec. Plant. 457. variété 1.

Alôë caulescens, foliis reflexis, margine spinosis. Pluken. Almag. rab. 129. fig. 3. Mala. (Voyez ALOËS, n° 6.)

6. ALOËS féroce. *Alôë ferox*. Lam.

Alôë caule arborescente ; foliis perfoliatis, undequaque spinosis ; flaminibus corollis duplo longioribus. Decand. Plant. grass. pag. 32.

Alôë perfoliata, ferox. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 467. variété 2. (Voyez ALOËS, n° 7.)

7. ALOËS mitré. *Alôë micriformis*. Lam.

Alôë foliis crassis, margine spinosis, inferius spinis

lofus, adpressis, impunctatis; racemis umbellatis.
Decand. Plant. grail. pag. 99. Ic.

Aloë perfoliata. var. v. Linn. Spec. 458. (Voyez ALOËS, n°. 8.)

8. ALOËS en ombelle. *Aloë umbellata.* Decand.

Aloë foliis crassis, margine spinosis, maculatis; maculis rotundatis, sparsis; racemis umbellatis.
Decand. Plant. grail. pag. 98. Ic.

Aloë maculosa. var. n. Lam. Dict. 1. pag. 87.

Aloë perfoliata. var. d & v. Linn. Spec. Plant. pag. 458.

9. *Aloë umbellata minor.* Decand. l. c. (Voyez ALOËS, n°. 9, var. n.)

9. ALOËS à feuilles minces. *Aloë tenuifolia.* Lam.

Aloë foliis tenuibus submembranaceis, maculatis; maculis minimis; dentibus albis, cartilagineis. (N.)
(Voyez ALOËS, n°. 10.)

10. ALOËS perfolié. *Aloë perfoliata.* Linn.

Aloë foliis caulibus densatis, amplexicaulis, vaginatis; floribus corymbofis, cernuis, pedunculatis, subcylindricis. Linn. Syst. veget. 337. — Ait. Kew. 1. pag. 466.

Aloë ferra. Decand. Plant. grail. pag. 80. Icon. (Voyez ALOËS, n°. 11, var. n.)

11. ALOËS à feuilles courtes. *Aloë brevifolia.* Decand.

Aloë foliis caespitosus, brevissimis, glaucis, apice trigonis; angulis spinosis; spinis albis, apice numerosioribus. Decand. Plant. grail. pag. 81. Icon.

Aloë perfoliata. var. p. Linn. Spec. 458. (Voyez ALOËS, n°. 11, var. v.)

12. ALOËS nain. *Aloë humilis.* Lam.

Aloë acaulis, foliis undique inermibus spinosis, ascendens; subulato-trigonis; floribus cylindricis. Decand. Plant. grail. 39. Icon. — Thunb. Dissert. n°. 6.

Aloë perfoliata, humilis. Linn. Spec. Plant. pag. 458.

13. *Aloë (elongata), floribus spicatis, subulotriquetris, subringentibus, oblique dependentibus; foliis aggregatis, dentato-spinosis.* Murr. Comm. Goett. 9. pag. 191. tab. 2. (Voyez ALOËS, n°. 12.)

* Feuilles non bordées de dents épineuses.

13. ALOËS araignée. *Aloë arachnoidea.* Linn.

Aloë foliis caespitosus, coarctatis, glaucescentibus, apice pellucido-cornatis, trifariis; angulis spinis inermibus longisque mucinis, lateribus levibus. Decand. Plant. grail. pag. 50. Icon. — Lam. var. n.

Aloë pumila, arachnoidea. var. d. Linn. Spec. 460. (Voyez ALOËS, n°. 13, var. n.)

14. ALOËS vert livide. *Aloë atrovirens.* Decand.

Aloë foliis caespitosus, parulis, atrovirentibus, apice trifariis; angulis spinis herbaceis brevibusque minutis, lateribus subulotuberculosis. Decand. Plant. grail. pag. 51. Icon.

Aloë pumila, varié n. Linn. Spec. Plant. pag. 460.

Aloë herbacea. Mill. Dict. n°. 18. (Voyez ALOËS, n°. 13.)

15. ALOËS perlé. *Aloë margaritifera.* Lam.

Aloë acaulis, foliis subtrigonis, acuminatis; tuberculis cartilagineis, undique adpressis. Decand. Plant. grail. pag. 57. Icon. — Lam. Ill. tab. 236. fig. 2.

Aloë pumila, var. n. & p. Linn. Spec. 460. (Voyez ALOËS, n°. 14.)

16. ALOËS écarlé. *Aloë retusa.* Linn.

Aloë acaulis, foliis quinquemariis, deltoidibus. Thunb. Diss. de aloë, n°. 15. (Voyez ALOËS, n°. 15.)

17. ALOËS veinéux. *Aloë venosa.* Lam.

Aloë acaulis, foliis oblongis, acutis, venosis, margine subdentatis; pedunculis reflexis. (N.) (Voyez ALOËS, n°. 16.)

18. ALOËS bordé. *Aloë marginata.* Lam.

Aloë acaulis, foliis oblongis, rigidis, apice triangularibus, margine albidis; scapo ramosis, floribus minimis. (N.) (Voyez ALOËS, n°. 17.)

19. ALOËS visqueux. *Aloë viscosa.* Linn.

Aloë subcaulescens, foliis imbricatis, trifariis, ovatis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis, subulabatis. Decand. Plant. grail. pag. 16. Icon. — Linn. Spec. Plant. pag. 460. (Voyez ALOËS, n°. 18.)

20. ALOËS cylindrique. *Aloë cylindrica.* Lam.

Aloë (spiralis), subcaulescens, foliis inermibus, ovato-acutis, imbricatis, odifariis, adpressis; floribus cylindricis, transversis rugosis. Decand. Plant. grail. pag. 56. Icon. — Linn. Spec. 459. (Voyez ALOËS, n°. 19, var. n.)

21. ALOËS roide. *Aloë rigida.* Decand.

Aloë foliis inermibus, caespitosis aut subspiralibus, petalis, rigidis, lanceolato-acutis. Decand. Plant. græff. pag. 62. Icon. (Voyez ALOËS, n°. 19, var. A.)

22. ALOËS panaché. *Aloë variegata.* Linn.

Aloë subcaulis, foliis trifariis, piliis, canaliculatis; ungulis cartilagineis, ternis. Thunb. Diff. de aloë, n°. 12. — Decand. Plant. græff. pag. 21. Icon. — Linn. Spec. Plant. pag. 459. — Sabbat. Hort. roman. vol. 6. tab. 76. (Voyez ALOËS, n°. 20.)

23. ALOËS oblique. *Aloë obliqua.* Decand.

Aloë foliis junioribus distichis, tandem sparsis, inaequaliter trigonis, acutis, patentibus, pidiis; corollis ventricosis, cernuis. Decand. Plant. græff. pag. 91. Icon.

Aloë maculata, pulchra. Thunb. Dissert. n°. 10, & Prodr. Gr. 12. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 469.

Aloë foliis linguiformibus, variegatis; floribus pedunculatis, cernuis, ore inaequali. Miller, Icon. 195. tab. 292.

Aloë africana, flore rubro; folio maculis ab utraque parte ex albo-viridibus notato. Till. Hort. Pif. pag. 7. tab. 9.

Il se rapproche de l'*aloë panaché*, dont il diffère par les feuilles point disposées sur trois rangs, inégalement triangulaires, à peine denticulées sur leurs angles, d'abord placées sur deux rangs, puis séparées, bigarrées de vert & de blanc, terminées par une pointe cornée. Les fleurs sont d'un rouge-incarnat, pédicellées, disposées en un épi lâche, allongé, accompagnées de très-petites bractées aiguës; la corolle ventrue à sa base, courbée & plus pâle au milieu, tubulée & verdâtre au sommet. Le fruit est une capsule oblongue, cylindrique, à six canelures, à trois valves, à trois loges, contenant des semences planes, noisettes, disposées sur deux rangs dans chaque loge.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle fleurit au printemps. h

24. ALOËS en carène. *Aloë carinata.* Lam.

Aloë acaulis, foliis subdistichis, verrucosis, carinatis, apice triquetris, acutis; floribus reflexis, clavatis. Decand. Plant. græff. pag. 63. Ic.

Aloë disticha. Thunb. Diff. de aloë, n°. 9. Linn. Spec. 459. var. 9.

a. *Aloë (carinata acinaciformis), foliis acinaciformibus, profunde carinatis.* Decand. l. c. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 469.

β. *Aloë (carinata ensiformis), foliis ensiformi-*

bus, planiusculis. Decand. l. c. — Till. Hort. Pif. pag. 7. tab. 8.

Aloë verrucosa. Ait. Kew. 1. pag. 468.

Aloë disticha, variétés β. Linn. Spec. Plant. pag. 459.

Aloë acuminata. Lam. Diâ. 1. pag. 90. (Voyez ALOËS, n°. 21 & 22.)

25. ALOËS en langue. *Aloë linguiformis.* Lam.

Aloë acaulis, foliis distichis, linguiformibus, obsoletis, macronatis, maculatis aut verrucosis. Decand. Plant. græff. pag. 68. Icon.

Aloë lingas. Thunb. Diff. n°. 11.

a. *Aloë (linguiformis angustifolia), foliis angustioribus, longioribus, maculatis.* Decand. l. c. — Ait. Kew. 1. pag. 469. var. a. — Miller, Diâ. n°. 13.

Aloë disticha. Linn. Spec. Plant. pag. 459. — Sabbat. Hort. rom. 6. tab. 71. — Weinm. Phytogr. Icon. tab. 57.

β. *Aloë (linguiformis latifolia), foliis latioribus, brevioribus, maculatis.* Decand. l. c. — Ait. Kew. 1. pag. 469. var. β.

γ. *Aloë (linguiformis verrucosa).* Decand. l. c. — Miller, Diâ. n°. 20. (Voyez ALOËS, n°. 23.)

26. ALOËS éventail. *Aloë plicatilis.* Lam.

Aloë caule fruticoso, dichotomo; foliis distichis, inermibus, levibus, longis, linguiformibus; floribus laxis racemosis, cylindricis. Decand. Plant. græff. pag. 75. Icon. — Ait. Kew. 1. pag. 70. — Curtis, Magaz. tab. 457.

Aloë disticha plicatilis. var. α. Linn. Spec. 459. (Voyez ALOËS, n°. 24.)

27. ALOËS à longues feuilles. *Aloë longifolia.* Lam.

Aloë (alectris uvaria), acaulis, foliis ensiformibus, canaliculatis, carinatis. Linn. Syst. veget. pag. 277.

Eleochemia uvaria. Willd. Spec. 2. pag. 182. (Voyez ALOËS, n°. 25.)

28. ALOËS peint. *Aloë picta.* Decand.

Aloë foliis crassis, margine spinosis, maculatis; maculis oblongis, in fascias transversales dispersis; racemis conicis. Decand. Plant. græff. pag. 97. Ic. — Thunb. Diff. n°. 4. — Willdenow, Spec. 2. pag. 186. (Exclus. synonym.) (Voyez ALOËS, n°. 9, var. β.)

29. ALOËS à épines rouges. *Aloë rhodocantha.* Decand.

Aloë

Alœ foliis potulis, amplexicaulis; margine finis rubris, inferis rarioribus munita; pedunculo à basi bracteâ ouglo, Decand. Plant. graff. pag. 44. Icon.

Alœ africana, finis rubris ornata. Véném. Phytogr. Icon. 71. (Voyez ALOËS, n° 11, var. 4.)

30. ALOËS en nacelle. *Alœ cymbasfolia*. Schrad.

Alœ acaulis, foliis lato-ovatis, concavis, mucronatis, dorso apicem versus carinatis; floribus racemosis, erectis, cylindricis, bilabiatis. Schrad. N. W. Journ. bot. pag. 17. tab. 2.

Cette espèce, rapprochée de l'*alœ retusa*, est principalement remarquable par ses feuilles larges, ovales, concaves, mucronées, courbées en carène sur le dos, vers leur sommet. Ses fleurs sont presque labiées, disposées en grappes droites, cylindriques.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

Quant aux autres espèces moins bien connues, voyez page 91.

ALONSOA. Flor. peruv. (Voyez HÉMI-MÉLIDE, Suppl.)

ALOPECURUS. (Voyez VULPIN.)

ALOYSIA. (Voyez ZAPANE, n° 19.)

ALPES. (Plantes des). « Dans les Alpes & les Pyrénées, dit M. Ramond en parlant de la végétation sur les montagnes (Annales du Muséum d'histoire nat. vol. 4, pag. 497), les arbres s'arrêtent vers deux mille quatre cents ou deux mille cinq cents mètres d'élévation absolue, comme ils font vers la soixante-dixième degré de latitude; & la bande des montagnes que ces grands végétaux occupent, se partage en autant de bandes particulières, qu'ils constituent eux-mêmes de genres différents. Les chênes demeurent dans les fonds; les hêtres s'emparent des hauteurs moyennes. Au dessus s'étendent les sapins & les ifs, qui font bien-ôt place aux pins, & ces pins font ceux d'Ecoffe & de Riga, dans les Pyrénées comme dans les Alpes, tandis que cette dernière chaîne possède de plus le cembro & le mélèze, qui font étrangers à la première, comme elle manque elle-même du cèdre qui croît sur le Liban, & qui prospérerait sans doute également sur nos montagnes d'Europe si la nature le leur avoit confié comme aux montagnes de l'Asie; mais tel est le mystère de la dissémination originaire des végétaux, que la nature semble indifférente tour-à-tour à la similitude des lieux & aux distances qui les séparent, tantôt rappelant dans les climats pareils les plantes des contrées les plus éloignées, & tantôt refusant cette conformité de Botanique. Supplément. Tome I.

productions à des régions qui réunissent toutes les conformités du sol & de la température.

« Dans la zone des arbres se montre un arbrisseau commun à toutes les montagnes de l'Europe, & qui leur est en même tems particulier; il n'en sort point. Indocile à la culture, il languit dans nos jardins; il lui faut le sol, l'air, les eaux, les neiges de sa patrie; il faut les montagnes, & là même il lui faut une situation particulière & déterminée; c'est le rhododendron. Rien n'est brillant comme cet arbrisseau en fleurs; mais rien n'est à ce point intraitable & délicat. Il paraît dans les Pyrénées à seize cents mètres juste de hauteur absolue; il s'arrête à deux mille six cents justes; mais entre les limites où il s'est confiné, il est si abondant & si vigoureux, qu'il seroit presque aussi difficile de l'y extirper que de l'en faire sortir.

« Le genévrier traverse cette bande, & la laisse bien en arrière. Je l'ai trouvée jusqu'à deux mille neuf cents toises; mais à chaque étage où il s'élève, il perd quelque chose des traits qui le distinguent dans nos plaines. Dans la haute région, c'est le genévrier de la Suède & de la Laponie, bas, étalé, couché. Son tronc rampe à terre pour aller chercher un abri entre les quartiers de roche qui se trouvent à sa portée. Là, conduit par la nature comme il le seroit par l'instinct, il cherche, il trouve, sans se tromper jamais, les faces des rochers qui font exposés au midi & au couchant, se soulève contre elles, & y étale ses rameaux en espalier avec une régularité que l'art atteindroit à peine.

« Plus haut, la rigueur du climat ne souffre plus que des sous-arbrisseaux que les premières neiges peuvent couvrir tout entiers. Encore plus haut, cet abri même est insuffisant contre l'apré du froid & la longueur des hivers: rien ne subsiste que ce que la terre renferme: il n'y a plus que des herbes à racines vivaces, & la nature a presque entièrement banni de ces lieux les plantes annuelles qui tromperaient son espérance lorsque, dans le cours d'un été réduit à quelques jours, & souvent à quelques heures, un coup de vent, un brouillard, peut flétrir les fleurs à peine épanouies, ramener l'hiver & terminer l'année.

« Aucune élévation au contraire n'arrête ces espèces vivaces, qui, aux approches des grands froids, restent tout entières sous le double abri de la neige & de la terre, & renaissent de leurs racines aux premiers beaux jours. Leur durée épuise toutes les chances des saisons pour atteindre, tôt ou tard, l'année favorable à la maturation des semences qui doivent les renouveler.

« La zone végétale n'a réellement d'autres limites que celles de la terre. Le vic du Midi est élevé de trois mille mètres. J'y suis monté vingt-six fois, & jamais je n'y ai vu le thermomètre au Pp

tempéré. Là, sur un rocher nu, j'ai trouvé quarante-huit espèces de plantes phanérogames, dont une seule annuelle, que peut-être je n'y retrouverai plus.

« A Néouvielle, à une élévation qui excède celle du pic du Midi de deux cent cinquante mètres, & où le thermomètre ne monte en été qu'à huit degrés, j'ai recueilli, en cinq voyages, douze espèces toutes vivaces.

« Au sommet du Mont-Perdu, à trois mille cinq cents mètres d'élévation absolue, au sein même des neiges permanentes, mais sur des rochers que l'inclinaison de leur pente en avoit débarrassés, j'ai recueilli six espèces toutes très-vigoureuses. Ici, dans une des journées les plus chaudes d'une année remarquable par sa chaleur, le thermomètre ne montrait qu'à cinq degrés & quelques minutes au dessus du terme de la congélation, & il descend certainement en hiver à vingt-cinq ou trente; & ces plantes que j'ai trouvées ici découvertes dans une année où les neiges avoient subi une diminution extraordinaire, est-il certain même qu'elles s'en repaissent tous les ans? Ailleurs, j'en ai vu se paroître qui, subsistant sur la lisière des neiges permanentes, demeurent presque toujours ensevelies sous leurs extensions; elles ne voient peut-être pas le jour dix fois en un siècle, & parcourent alors le cercle de la végétation dans le court espace de quelques semaines, pour se redormir aussitôt dans un hiver de plusieurs années.

« Des plantes soumises à des conditions d'existence aussi singulières, on ne s'attendra pas à les retrouver au nombre des espèces que nous observons dans nos climats tempérés : ou bien elles appartiennent exclusivement aux plus hautes sommets des montagnes, ou bien elles se représentent uniquement dans les contrées polaires de l'Europe. C'est la Norvège, c'est la Laponie, c'est le Groënland qui fournissent les analogues des plantes qui croissent à la cime des Alpes & des Pyrénées. Ce n'est ni la Sibirie ni le Kamtchatka, & ce ne sont pas plus les contrées polaires de l'Amérique que celles de l'Asie, quoiqu'il soit aussi mal-aisé de concevoir la diversité qui règne entre les productions végétales de contrées si semblables & si voisines, qu'il est difficile d'expliquer la conformité qui existe entre la végétation de l'une d'elles & celle de quelques sommets de montagnes, qui en sont éloignées de quarante degrés.

« Mais l'observation apprend que la propagation des végétaux ne s'est pas toujours faite parallèlement à l'équateur; que si un certain nombre de plantes, confinées, par leur tempérament, dans un climat déterminé, ne se retrouvent jusqu'à quelque distance sous les mêmes latitudes, beaucoup d'autres au contraire semblent avoir été entraînées dans le sens où nos continents se séparent, & s'être répandues dans la direction des méridiens.

Au sud, l'Amérique, l'Afrique & l'Asie; au nord, l'Europe, l'Asie & l'Amérique sont bien loin d'offrir la même végétation sur les mêmes parallèles, tandis qu'une multitude de plantes, fidèles à chacune de ces parties du Monde, fidèles même à certaines subdivisions de ces grandes divisions, bravent tous les obstacles que la diversité des températures leur oppose, pour le propager dans un sens absolument contraire à celui où la conformité des climats les appelle.

« Et pour ne point sortir du sujet qui nous occupe, c'est ainsi, par exemple, que plusieurs végétaux remarquables de la Sardaigne, de la Sicile, de l'Italie, remontent les Alpes, les franchissent, & vont se répandre jusque dans la Basse-Allemagne, sans se livrer aux invitations du climat, qui les porteront de notre côté. C'est ainsi encore que les Pyrénées reçoivent de l'Espagne un grand nombre de plantes de la Barbarie, & les rendent à la France occidentale. La merendère, qui croît au nord de l'Afrique, se montre dans l'Andalousie, la Castille, l'Aragon, les Pyrénées, & descend jusqu'au département des Landes. La jacinthe tardive, le narcisse bulbocœle, ont la même origine & suivent la même route. L'anémone bicolor, parti d'Alger, traverse la même chaîne & arrive jusqu'en Anjou. La scille à ombelles, le safran multicolore, vont des Pyrénées jusqu'en Angleterre, sans qu'aucune de ces plantes se porte latéralement à la rencontre de celles que les Alpes reçoivent de même du Midi pour les rendre aux parties septentrionales des pays germaniques; mais c'est dans les grandes vallées des Pyrénées, dans ces vallées toutes creusées du nord au sud, que ces directions prennent un caractère tout-à-fait frappant & singulier.

« Je trouve le grand orillon frangé (*dianthus superbus*) à l'entrée de la vallée de Campan & de Gavarnie; il les parcourt tout entières, sans s'engager dans aucune des vallées obliques qui y débouchent. Le *verbascum myconi*, cette belle & rare plante, qui n'appartient ni au genre où Linné l'a placée, ni peut-être même à aucune famille de plantes actuellement constituée, & qui, portant un air étranger au milieu de nos végétaux d'Europe, se distingue entre eux, comme l'alcion parmi nos oiseaux indigènes, le *verbascum myconi* affecte la même préférence pour la même direction. On le trouve dans toutes les grandes vallées des Pyrénées; il couvre tous les coteaux, tant du côté de la France que du côté de l'Espagne. Là s'ouvrent devant lui les grandes vallées orientées du nord au midi; il s'y jette, mais c'est pour n'en plus sortir. En vain les embranchemens de ces vallées lui offrent de toutes parts d'autres vallons à peupler; il franchit ces ouvertures, & continuant sa route dans la direction qu'il a adoptée, il monte du nord au midi, s'arrête au pied de la crête de la chaîne, vers deux mille mètres d'élévation

absolue, &c, réparoissant de l'autre côté à la même hauteur, il descend au midi dans cette même direction, dont il a constamment refusé de s'écarter.

« C'est ainsi que les premiers dessins de la nature conservent des traits plus déterminés dans les montagnes, où chaque ordre de végétaux se confine entre des limites plus tranchées, plus difficiles à franchir, & où l'influence des lieux réside plus puissamment à l'influence des causes secondes, qui tendent incessamment à confondre ce que les causes premières avoient séparé; & à ce pendant, combien de modifications n'a pas déjà introduites le laps des siècles, & surtout la présence de l'homme ! Je parcours les immenses déserts des hautes montagnes : tout à coup, parmi les plantes si rares qui en composent les herbages, je reconnois quelques-unes de nos plantes triviales. La verdure prend une teinte foncée qui contraste avec le vert-pâle des gazons alpestres. J'avance : les débris d'une hutte ou un rocher noirci par la fumée m'expliquent ce mystère. Autour de cet asyle de l'homme se sont naturalisées les plantes qui environnent nos habitations rustiques : la mauve commune, l'ortie, le mouron d'oiseaux, les chénopodes & les patiences vulgaires, avec lesquelles je mêle la patience des Alpes, comme on voit le chamois s'approcher des chèvres domestiques. Un berger a séjourné là quelques semaines, il y a peut-être quelques années. En y conduisant ses troupeaux, il a amené, sans le savoir, les oiseaux, les insectes de ses vallées ; il y a porté le germe des plantes de son village. Il n'y reviendra peut-être plus ; mais ces sauvages contrées ont reçu en un instant l'empreinte indélébile de la domination de l'homme, tant un être de cette importance a de poids dans la balance de la nature.

« Ailleurs, c'est par des destructions qu'il a signalé sa présence. En abordant les montagnes, il a déchiré de toutes parts le voile immense des forêts qui en couvroient les bases. Les bois ne sont point la demeure de l'homme : il redoute les détours de ce vaste labyrinthe ; il en suspecte les ombres ; il y regrette le soleil, vers lequel il tourne un regard de respect & d'espérance ; il n'y pénètre que pour y porter le fer & le feu. Le germe des plantes mémorales s'en lève dans une terre desséchée, qui n'est plus propre à leur développement. D'autres végétaux les remplacent. Le climat lui-même a changé, & attire de nouvelles espèces ; la température s'élève ; les pluies sont plus rares ou plus abondantes ; les vents plus inconstants & plus fougueux ; les torrens, les lavanges se multiplient ; les pentes se sillonnent de ravins ; les rochers se dépouillent de la terre qui les couvrait, & des plantes dont ils étoient ornés. Tout vieillit avec une rapidité croissante. Un siècle de l'homme pèse sur la terre plus que vingt siècles de la nature.

« Et cependant c'est encore à la que les lieux & leurs productions ont le plus conservé de leur caractère originain : c'est là que la distribution primitive des végétaux a été moins troublée, que les circoncriptions sont plus fortement tracées, que l'influence du sol & du climat est le plus perceptible : c'est là que le rapprochement des objets en fait ressortir tout-à-tour la symétrie & les contrastes, & que l'œil peut en saisir à la fois tout ce qui provoque l'observation & détermine le jugement ; & si c'est dans la structure des grandes chaînes de montagnes que le géologue doit étudier la structure de la terre & l'histoire des grandes catastrophes qui lui ont imprimé sa dernière forme, c'est dans les montagnes aussi que le botaniste essaiera de pénétrer le mystère de la dissémination originnaire des végétaux & de leur propagation successive. » (RAMOND.)

ALPINIE. *Alpinea*. Genre de Linné, qui a été supprimé par M. de Lamarck, & dont les espèces ont été réunies, les unes aux *AMOMES* (*amomum* Linn.), les autres aux *GALANGAS* (*maranta* Linn.).

ALPISTE. *Phalaris*. En conservant aux *phalaris* le caractère que Linné leur a donné, il est évident qu'il n'y a, parmi les espèces renfermées dans ce genre, qu'un petit nombre qui lui conviennent, & qui en forment alors un genre très naturel, portant essentiellement ce caractère :

Un calice unilobe, à deux valves égales, courbées en carène ; une arête saillante sur le dos.

Toutes les espèces qui offrent ce caractère ont en même tems leurs fleurs disposées en une petite panicule serrée en épi court, ovale ; ce qui forme une première division, à laquelle ce genre devoit rigoureusement être bonté. La division suivante comprend des espèces intermédiaires entre ce genre & les *phleum*. Leurs valves calicinales ne sont plus en carène ni munies d'une aile dorsale, mais la plupart ciliées sur leur dos. Les panicules offrent un épi alongé, cylindrique, très-serré.

La plupart des autres espèces que Linné, & d'autres après lui, ont fait entrer dans ce genre, n'y conviennent que médiocrement, & même plusieurs d'entr'elles forment des genres particuliers, ainsi qu'on le verra dans l'exposition des espèces.

ESPÈCES.

* *Valves calicinales courbées en carène, munies d'une arête & non ciliées sur le dos ; épis ovales.*

1. ALPISTE de Canarie. *Phalaris canariensis*. Linn.

Phalaris paniculata spiciformis, ovata ; glumis calic-

cinis navicularibus, integris; corollâ quadrivalvi. (N.) Lam. Ill. tab. 42. — Retz. Obf. 3. pag. 8. (Voyez ALPISTE, n° 1.)

Ses fleurs sont munies de deux petites écailles courtes, latérales, qui offrent une corolle à quatre valves inégales, renfermées dans celles du calice, dont l'arête n'est point dentée.

2. ALPISTE aquatique. *Phalaris aquatica*. Linn.

Phalaris paniculâ spiciformi, subcylindricâ; glumis calicinis subdentisulatis; corollâ trivalvi; valvula exteriorâ minuatâ, subulatâ. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 56. — Retz. Obf. 3. pag. 8. (Voy. ALPISTE, n° 5.)

Il n'existe qu'une seule écaille courte, subulée entre le calice & la corolle. L'arête des valves calicinales est légèrement dentée vers son sommet.

3. ALPISTE intermédiaire. *Phalaris intermedia*. Boef.

Phalaris paniculâ spiciformi, subovatâ; glumis calicinis acutis, oblongis, integris; corollâ trivalvi. (N.)

Elle paroît avoir de grands rapports avec le *phalaris aquatica*. Ses tiges sont grêles, point bulbueuses à leur base; les feuilles courtes, molles, étroites. Ses fleurs sont réunies en un épi court, un peu ovale; les valves calicinales étroites, aiguës, à peine courbées en carène, point dentées; une seule écaille entre le calice & la corolle; les semences brunes, luisantes, un peu velues.

Cette plante a été découverte dans la Caroline par M. Boef. (V. f. Comm. Boef.)

4. ALPISTE bulbeuse. *Phalaris bulbosa*. Linn.

Phalaris paniculâ spiciformi, subcylindricâ; glumis carinatis, integris; corollâ bivalvi. (N.) Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 46. tab. 64.?

Phalaris Bellardi. Willden. Nov. Act. berol. vol. 3.

Phalaris foetida. Pers. Synopf. 1. pag. 78. (Voy. ALPISTE, n° 2.)

Elle se distingue du *phalaris canariensis* par ses épis cylindriques, plus allongés; par sa corolle à deux valves, sans écailles intermédiaires; par ses tiges plus renflées en bulbes à leur base. Dans la plante de Cavanilles, ses racines sont pourvues de deux ou trois bulbes globuleux, réunies en chapelet; les valves calicinales légèrement crénelées à leur sommet. Est-ce une espèce particulière?

5. ALPISTE bleuâtre. *Phalaris canescens*. Desf.

Phalaris culmo superne nudo; spicâ tereti, laxiusculâ; glumis carinatis, acutis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 56.

Gramen phalaroides, hirsutum, spicâ longissimâ. Buxb. Cent. 4. pag. 30. tab. 33.

Très-voisine du *phalaris bulbosa*, cette espèce en diffère par son épi plus lâche & par ses valves calicinales bleuâtres. Ses tiges sont droites, noueuses, hautes de deux pieds & plus, filiformes, nues à leur partie supérieure, garnies à l'inférieure de feuilles glabres, larges au moins de deux lignes. Les épis sont cylindriques, ramoux, un peu lâches, longs de trois à quatre pouces; les valves du calice presque égales, conniventes, d'un bleu-pâle, membraneuses, acuminées, courbées en carène; celles de la corolle plus courtes, petites, aiguës, presque égales.

Cette plante croît dans les environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Desfontaines.

6. ALPISTE noueuse. *Phalaris nodosa*. Linn.

Phalaris paniculâ oblongâ, foliis rigentibus. Linn. Mant. pag. 557. (Voyez ALPISTE, n° 4.)

7. ALPISTE cylindrique. *Phalaris cylindrica*. Decand.

Phalaris paniculâ arête cylindricâ; glumis glabris, obtusis, integris, margine membranaceis. Decand. Synopf. pag. 122, & Flor. franç. 3. pag. 11.

Phalaris bulbosa. Bell. Ait. Tur. 5. pag. 213.

« Sa racine est fibreuse, dit M. Decandolle, & pousse sept à huit tiges droites, glabres, hautes d'un pied, garnies de feuilles, surtout dans la partie inférieure. Leur gaine est couronnée par une membrane entière, lancéolée, pointue. Ses fleurs forment une panicule si serrée, qu'elle ressemble à un épi cylindrique, long d'environ trois pouces. Les fleurs paroissent imbriquées. Les valves calicinales sont blanchâtres, avec quelques raies verdâtres, courbées en carène, entières sur le dos; les valves de la corolle obtuses, très-petites.

Cette plante a été trouvée à Toulon par M. Flugges, & près de Sevirano par Bellardi.

8. ALPISTE rongée. *Phalaris pramosa*. Lam.

Phalaris (paradoxa), paniculâ oblongâ, spiciformi; glumis calicinis navicularibus, unidentatis; stiloculis infimis pramosis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 86. (Voyez ALPISTE, n° 9.)

Ses valves calicinales sont terminées par un filer roide & téraçe. Ses fleurs stériles s'oblitérent & se durcissent après la maturité.

9. ALPISTE à vesicles. *Phalaris utriculata*. Linn.

Phalaris paniculata ovata, spiciformi; glumis calicinis navicularibus, dorso dilatato; arista receptaculi glumis longiore; vaginâ supremi folii spathiformi. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 86.

Tortesia pratensis. Savi, in A&R. Ital. vol. 8. pag. 477.

Alopecurus utricularius. Pers. Synopf. 1. pag. 80. (Voyez ALPISTE, n°. 8.)

Si l'on en excepte les valves calicinales, munies d'une arête dorsale, cette plante, quant aux autres caractères, appartient aux *alopecurus*, ayant une corolle à une seule valve, munie d'une barbe à sa base.

10. ALPISTE du Cap. *Phalaris capensis*. Thunb.

Phalaris paniculata spicata, ovata; glumis integris; culmo geniculato, decumbente. Thunb. Prodr. 19.

Cette espèce peu connue a ses tiges tombantes, géniculées; les fleurs disposées en une panicule ovale, reserrée en épi; les valves calicinales entières. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. ☉

Observations. Ici se terminent les seules espèces naturelles de ce genre : celles contenues dans la division qui suit, diffèrent des précédentes par la forme de leur épi cylindrique, allongé, semblable à celui des *phleum*; elles s'en rapprochent encore, la plupart, par la pointe particulière qui termine les valves de leur calice; mais ce dernier n'a point la truncature de celui des *phleum*. Son sommet est plus arrondi. D'ailleurs, cet épi est une véritable panicule à ramifications très-courtes & serrées, tandis que les fleurs sont sessiles & disposées en un véritable épi dans les *phleum*. Les valves calicinales sont ciliées sur leur dos, & non prolongées en une aile saillante. Voilà de ces espèces livrées en quelque sorte à l'arbitraire des botanistes, & l'opinion de ceux qui les font passer dans les *phleum* ou qui en forment des genres nouveaux n'est pas plus à blâmer que celle de ceux qui les conservent, au moins comme affiliées aux *phalaris*.

* *Valves du calice non courbées en carène ni prolongées en aile dorsale, mais ciliées sur le dos; épis cylindriques.*

11. ALPISTE stéole. *Phalaris phleoides*. Linn.

Phalaris paniculata cylindrica, spiciformi, basi ramosa; glumis angustis, subciliatis, bicuspidatis. Lam. Ill. n°. 841. — Flor. dan. tab. 331. — Engl. Bot. tab. 459.

Phleum phalaroides. Hœrl. Gram. 51. — Morif. 8. tab. 4. fig. 2. (Voyez ALPISTE, n°. 6.)

12. ALPISTE rude. *Phalaris aspera*. Linn.

Phalaris (phleum) asperum, spica cylindrica,

glabra, basi composita; glumarum brevibus densibus; culmo erecto, subramoso. Lam. Ill. 834. — Reiz. Obf. 4. pag. 14. — Vahl, Symbol. 3. pag. 9. — Villars, Dauph. 2. pag. 61. tab. 2. fig. 4.

Phleum viride. All. Pedem. n°. 2133. (Voyez ALPISTE, n°. 7.)

13. ALPISTE dentée. *Phalaris dentata*. Linn.

Phleum (dentatum), spica subpaniculata, cylindrica; glumis serratis, culmo geniculato. Thunb. Prodr. 19. (Voyez ALPISTE, n°. 14.)

14. ALPISTE des Alpes. *Phalaris alpina*. Willd.

Phalaris paniculata cylindrica, spiciformi; glumis calicinis mucronatis, carinatis, dorso ciliatis. Willd. A&R. Berol. vol. 3. pag. 414.

Phleum Michelii. All. Pedem. n°. 2138.

Phleum hirsutum. Sut. Flor. helv. 1. pag. 34.

Phleum phalaroides. Vill. Dauph. 2. pag. 60.

Phleum paniculata spicata, hirsuta; calice laneculato. Hall. Helv. n°. 1532. — Scheuz. Gram. 69.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles glabres, peu nombreuses, larges d'environ trois lignes, munies à leur orifice d'une membrane large & entière. Les fleurs forment une panicule serrée, cylindrique, semblable à un épi; les deux valves calicinales lancéolées, courbées en carène, point tronquées à leur sommet, mucronées, d'un vert tirant sur le violet, garnies sur leur dos de cils très longs, qui donnent à la panicule un aspect velu.

Cette plante croît dans les Alpes, sur les montagnes du Piémont, dans le Dauphiné, &c.

15. ALPISTE velue. *Phalaris villosa*. Mich.

Phalaris ? paniculata fristia; gluma obovata, valvis exterioribus densè villosis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 43.

Ses panicules sont roides; ses valves en ovale renversé; celles du calice couvertes de poils épais & nombreux. Michaux, qui a découvert cette plante dans les forêts sablonneuses de la Caroline, ne la rapporte qu'avec doute aux *phalaris*.

16. ALPISTE hérissée. *Phalaris hispida*. Thunb.

Phalaris ? spica digitata, glumis scabris, foliis ovatis. Thunb. Flor. jap. pag. 44.

Cette plante, dont les épis sont digités, s'éloigne par son port des *phalaris*. Thunberg lui-même soupçonne que sa corolle est univalve. Les tiges sont tombantes, capillaires, glabres, rameuses, articulées, hautes d'un pied, redressées à leur sommet, garnies de feuilles vaginales, étalées, ovales,

presqu'en cœur, à peine longues d'un pouce, pileules, ciliées & glanduleuses sur leur gaine & à leurs bords. Les fleurs sont disposées en épis digités, au nombre de trois à six, sur lesquels ces fleurs sont alternes, sessiles, imbriquées; les valves calicinales lancéolées, aiguës, hispides, ciliées, uniflores.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

*** Espèces à placer dans d'autres genres.

17. ALPISTE en roseau. *Phalaris arundinacea*. Linn.

Phalaris paniculata oblonga, pyramidata & glumis subcongestis, calice nervoso. Lam. III. n°. 844.

Arundo colorata. Aiton, Kew. 1. pag. 116. — Willd. Spec. 1. pag. 457.

Calamagrostis colorata. Sibthorp, Oxon. 37. (*Voyez ALPISTE, n°. 10.*)

Cette espèce doit être retranchée des *phalaris*, & rangée parmi les *arundo*, à calice uniflore, ou, selon d'autres, dans un genre nouveau, établi sous le nom de *calamagrostis*.

18. ALPISTE lunetière. *Phalaris trucaformis*.

Phalaris paniculata linearis, secundis; calicibus subunifloris, compressis, semiorbiculatis, navicularibus. Lam. III. n°. 845.

Beckmannia. Hoff. Gramin.

Cynofusus trucaformis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 105. — Willden. Spec. 1. pag. 412. (*Voyez ALPISTE, n°. 11.*)

Cette singulière plante a été transportée à tort parmi les *cynofusus*, les épillets étant dépourvus de bractées; elle se rapproche davantage des *phalaris* par la fructification; mais ses calices sont biflores. La disposition de sa panicule à épis courts lui donne l'apparence d'un *paspalum*; elle doit plutôt constituer un nouveau genre, qui a été en effet établi par Hoff, sous le nom de *beckmannia*. Ses fleurs sont sessiles, unilatérales, serrées contre le rachis; ses calices biflores; leurs deux valves courtes, égales, semi-orbiculaires, renflées, rétrécies à leur base, en bosse à l'extérieur; les valves de la corolle presque égales, très-lisses; la corolle des deux fleurs rapprochée, & formant une pointe qui dépasse les valves calicinales. Les semences sont fort petites, jaunâtres, oblongues, obtuses, se détachant de la corolle.

19. ALPISTE asperelle, n°. 13. *Phalaris oryzoides*. Linn.

Elle est décrite dans les *Illustrations*, sous le nom générique d'*asperella*. (*Voyez Supplément.*)

Observations. M. de Lamarck suppose que le *phalaris gigantea* Linn. Suppl. est la même plante que l'*agrostis verticillata* d'après les individus renfermés dans son herbier. Elle parait se rapprocher beaucoup de l'*andropogon muricatum* Herr. Mais l'analyse que j'en ai faite, la panicule est composée de rameaux crepus, simples, filiformes, disposés par verticilles, rapprochés de la tige, sortant d'une feuille semblable à une spathe droite, dure, subulée, au moins aussi longue que la panicule. A chaque dent du rachis on distingue deux fleurs, l'une feible & fertile, l'autre pédicellée & stérile. Dans la première, le calice est uniflore, à deux valves dures, égales, un peu roulées à leurs bords, obtuses, légèrement mucronees, hérissées d'aspérités sur le dos; l'extérieure légèrement velue, renfermant chacune une valve de la corolle, qui est plus courte que le calice, & dont les valves sont transparentes, très-minces, ovales, obtuses. La fleur pédicellée est étroite, aiguë, plus petite, stérile. Le *phalaris pubescens* (ALPISTE, n°. 3), dont les calices renferment d'une à trois fleurs, a été rangé parmi les *aira* par M. Vahl; parmi les *alopocurus* par M. Allioni. Il faut en rapprocher comme variété l'*hokus arenarius*, Ait. Auct. tab. 46. ex Bellard. Aët. Tur. 5, pag. 131. Quant aux espèces de Forskhal (Lam. Diction. n°. 15-21), elles sont encore peu connues, si l'on en excepte le *phalaris disticha*, qui est l'*agrostis pungens* Vahl.

ALSINE. (*Voyez MORGELINE.*)

ALSODÉE. *Alsodeia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, très-voisin du genre des violettes, appartenant à la même famille; il comprend des arbres ou arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, entières, les stipules caduques; les fleurs paniculées, terminales, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions profondes; cinq pétales réunis à leur base; un tube central, portant cinq anthères; un style; une capsule à une seule loge, à trois valves; semences peu nombreuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq divisions profondes, plus courtes que la corolle.

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés, roulés sur eux-mêmes, adhérens par leur base.

3°. Cinq étamines monadelphes; les filaments réunis en un tube urcéolé, central, à cinq lobes; une anthère attachée à la base de chaque lobe, s'ouvrant latéralement.

4°. Un ovaire libre, surmonté d'un style droit, plus long que les étamines, terminé par un stigmate en massue.

Le fruit consiste en une capsule enveloppée par le calice & la corolle, persistants & desséchés, à trois côtés peu marqués, à une seule loge, à trois valves, chaque valve portant une ou deux graines sphériques. L'embryon est horizontal, centrifuge; le périsperme charnu; les cotylédons planes; la radicule courte.

Observations. Ce genre a été établi par M. du Petit-Thouars. « Il présente, dit-il, des particularités qui le distinguent de tous les autres. La forme & la position des étamines sont surtout très-remarquables; elles sont parfaitement analogues à celles des violettes. Les anthères y sont pareillement adnées vers le milieu de languettes isométriques; toute la différence, c'est qu'elles ne sont que contigües. D'autres caractères plus importants viennent confirmer ce rapprochement. 1°. La forme intérieure & extérieure du fruit: dans les deux genres, c'est une capsule à une loge, à trois valves; 2°. L'attache des graines est pariétale dans les deux; 3°. La fabrique de ces graines se ressemble. Dans l'un & l'autre, l'embryon est plane, couché dans un périsperme. La principale différence provient de la régularité ou de l'irrégularité de la corolle; mais on sait que cette conformation est peu importante, d'autant plus que, dans les violettes des pays équatoriaux, la corolle tend à se régulariser & à prendre son épanouissement, comme on peut le remarquer dans le genre *ionidium*. » (Voyez VIOLETTE.)

Parmi les cinq espèces qui composent ce genre, les deux premières ont leur tube ou urcéole staminière simple; dans les trois autres il est évasé, & forme une coupe terminée par un bourrelet. Les lobes staminières prennent naissance de l'intérieur même du tube, un peu au dessous de son bord, qui, par cette disposition, forme une ceinture particulière.

ESPÈCES.

* *Urcéole simple.*

1. *ALSOÉE* à fleurs rares. *Alfodeia pauciflora*. Petit-Thouars.

Alfodeia foliis cuneatis, pedunculis reflexis. Petit-Thouars, Végét. des îles austr. d'Afrique. pag. 57. tab. 17.

Arbuste élégant, qui forme un buisson haut de trois ou quatre pieds. Ses rameaux sont anguleux, garnis de feuilles épaisses, d'un vert-foncé, oblongues, rétrécies en coin à leur base, obtusés & quelquefois échancrés à leur sommet, longues d'environ deux pouces sur un de large, à dentelures un peu écartées, sillonnées de trois ou

quatre nervures latérales, formant un angle aigu avec la principale, soutenues par un pétiole court. Les fleurs sont terminales, réunies trois ou quatre en fascicule, portées chacune sur un pédicelle particulier, renflé sous le calice. Celui-ci est composé de cinq folioles courtes; la corolle de cinq pétales réunis en cylindre, & roulés l'un sur l'autre; les étamines réunies par un urcéole particulier, qui prend naissance à la base des pétales, se divise vers son milieu en cinq lobes aigus & connivens, à la base desquels se trouve une anthère sessile, attachée par les dos, surmontée d'une languette. Le pistil est simple, terminé par un style plus long que l'urcéole, soutenant un stigmate tendu en massue.

Le fruit est une capsule à une seule loge, rétrécie à la base, renflée au sommet, obtusément trigone, acuminée par les vestiges du style. Ses parois sont très-minces. Elle s'ouvre du sommet à sa base, en trois valves qui portent sur leur milieu une ou deux graines sphériques, qui contiennent un embryon composé d'une radicule courte, & de deux cotylédons minces & foliacés. Cet embryon est couché horizontalement dans un périsperme de même forme que la semence.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. *Th* (*Petit-Thouars.*)

2. *ALSOÉE* en arbre. *Alfodeia arborea*. Petit-Thouars.

Alfodeia foliis longè petiolatis, deflexis; floribus paniculatis. Petit-Thouars, Végét. des îles austr. d'Afrique. pag. 57.

Quoique M. du Petit-Thouars ne nous donne aucun détail sur cette espèce, le peu qu'il en dit dans les caractères spécifiques qu'il en présente, suffit pour la faire distinguer de la précédente. Ses tiges sont en arbre; les rameaux garnis de feuilles longuement pétioolées & rabattues; les fleurs disposées en panicule. Elle croît à l'île de Madagascar. *Th*

** *Urcéole à bourrelet.*

3. *ALSOÉE* à feuilles étroites. *Alfodeia angustifolia*. Petit-Thouars.

Alfodeia foliis angustis, lanceolatis; floribus spicatis. Petit-Thouars, Végét. des îles austr. d'Afrique. pag. 57. tab. 18. fig. 11.

Arbuste à tige droite, cendrée, très-ramifiée; les rameaux grêles, cylindriques, marqués des vestiges de deux stipules caduques, petites, triangulaires, situées à la base des feuilles. Celles-ci sont alternes, médiocrement pétioolées, très-rapprochées, oblongues, lanceolées, étroites, terminées par une pointe moussue, dentées & crénelées à leurs bords, fermes, glabres, d'un vert-

foncé, en dessus, gristères en dessous, longues de deux pouces, larges de six à huit lignes, marquées de nervures latérales peu nombreuses, formant un angle un peu ouvert avec la principale, & se réunissant à leur sommet.

Les fleurs viennent sur des épis axillaires, accompagnées chacune d'une bractée en forme d'écaille, très-rapprochées & imbriquées avant la floraison; ce n'est que successivement qu'elles se développent. A cette époque, elles sont portées sur un pédoncule cylindrique, de cinq à six lignes de long, articulé vers son milieu. Le calice est petit, à cinq lobes; la corolle un peu campanulée, à cinq pétales d'un blanc-roussâtre; les anthères attachées par le dos sur cinq écailles transparentes, partant de l'intérieur & un peu au dessous du bord d'un urcéole en forme de loupette, cilié & crénelé. L'ovaire supporte un style terminé par un stigmate en massue. Il en résulte un fruit de la même nature que celui de la première espèce, mais beaucoup plus petit, & ne contenant que trois graines.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. *h*
(*Descript. ex Petit-Thouars.*)

4. *ALSODÉE pubescente. Alsodeia pubescens.*
Petit-Thouars.

Alsodeia foliis basi cuneatis, ramis pedunculisque pubescentibus, floribus laxi spicatis. Petit-Thouars, Végét. des îles austr. d'Afrique. pag. 57. tab. 18. fig. 3.

Elle se distingue de la précédente par ses feuilles beaucoup plus grandes, rétrécies en coin à leur base, denticulées, obtuses, sillonnées par un plus petit nombre de nervures. Ses rameaux sont plus grêles, plus élançés, pubescents, ainsi que les pédoncules. Les fleurs sont disposées en un épi lâche, axillaire.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. *h*

5. *ALSODÉE à larges feuilles. Alsodeia latifolia.*
Petit-Thouars.

Alsodeia foliis ovatis, pedunculis glabris, floribus dense spicatis. — Petit-Thouars, Végét. des îles austr. d'Afrique. pag. 57. tab. 18. fig. 2.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente par la grandeur de ses feuilles; mais elles sont ovales & non cuneiformes, un peu denticulées à leurs bords, obtuses; les épis de fleurs plus courts, glabres, plus serrés. Elle croît à l'île de Madagascar. *h*

M. du Petit-Thouars fait encore mention d'une autre espèce qui forme un petit arbre, & qu'il promet de décrire & de figurer par la suite.

ALSODEIA. (*Voyez ALSODÉE.*)

ALSTONIA. (*Voyez ALSTONE.*) Ce genre doit être supprimé, & rapporté, comme espèce, aux *symplocos*. (*Voyez SYMPLOQUE.*)

ALSTROEMERIA. (*Voyez PÉLÉGRINE & BOMAREA, Suppl.*)

A'TERNANTHERA. (*Voyez ALTERNANTE.*) C'est la même plante que l'*illicium siffle* Linn. (*Voyez CADELARI* seconde, variété α , n^o. 14.) (*Achyranthes.*)

ALTHŒA. (*Voyez GUIMAUVE.*)

ALTHERIA. (*Voyez ALTHÉRIE.*)

ALTHÉRIE. Altheria. Genre établi par M. du Petit-Thouars, dans son *Nova Genera Madagasc.* pag. 19, de la famille des lilacées, qui a de grands rapports avec les *valtheria*, dont il ne diffère que par ses capsules simples. Son caractère essentiel consiste dans :

Un calice double; l'extérieur composé de trois folioles; l'intérieur d'une seule pièce, urcéolé, à cinq découpures; une corolle à cinq pétales roulés à leur base; un tube central adhérent à la base de la corolle, terminé par cinq dents, auxquelles sont attachées cinq anthères à deux lobes, s'ouvrant en dehors; un ovaire simple, à cinq faces, portant cinq styles rapprochés; le fruit consiste en cinq capsules réunies, monospermes, ovales, acuminées; le péricarpe charnu; l'embryon verdâtre; les cotylédons planes.

Ce genre renferme des herbes à riges droites, hérissées, garnies de feuilles alternes, en cœur, dentées en scie; les fleurs petites, axillaires, ramassées par paquets.

ALVARDE spathacée. *Lygeum spathaceum.* Lam. Ill. tab. 39. — Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. pag. 18 tab. 3.

ALYPON. Alypum. Plante décrite & figurée sous ce nom dans Matthioli & Dalechamps (Hist. 2, pag. 1680, Icon. 1.), & qui est peu connue. On lui attribue une qualité acre & brûlante, & une vertu purgative. Son port & son feuillage semblent la rapprocher du genre *thymelæa*. Acturius la confond avec le *turith blanc* des Anciens, en appelant ses racines *turith*, & ses graines *alypoon* ou *alypias*. Il ne faut pas la confondre avec l'*alypum* de pena (*alypum pena, herba terribilis, carbonensis.* Dalech. Hist. 2, pag. 1680, Icon. 2), plante basse & ligneuse, également purgative, & peut-être ainsi nommée à cause de ses rapports dans ses vertus, commune dans le Languedoc & la Provence, rapportée au genre de la *globulaire*, sous le nom de *globularia alypum*. Linn. (*Juss.*)

ALYSSE. Alyssum. Les espèces d'*alysum* à siliques vésiculeuses ont été décrites à l'article *VESTIGIAIRE.* (*Vesicaria.*)

Nées

Nées sur les roches arides ou dans un sol stérile, maigre & pierreux, la plupart des alysses ne prospèrent qu'aux rayons adoucis du sol-til. L'ombre & l'humidité leur sont nuisibles. Quelques espèces décorent les rochers des Alpes; mais le plus grand nombre des espèces sont originaires des îles de la Grèce & du Levant; elles se font remarquer, la plupart, par leurs feuilles douces & cotonneuses, par leurs belles fleurs jaunes, blanches dans quelques espèces, petites, mais quelquefois si nombreuses, qu'elles forment par leur ensemble un massif étalé, en gazon, auquel on a donné le nom de *carpette d'or*, surtout à l'alysses des rochers, la seule espèce que l'on ait admise dans les parterres, & qui ne craint ni les chaleurs de l'été ni la rigueur de nos hivers. Elle fleurit vers la fin de mars, & se conserve long-temps.

E S P È C E S.

1. ALYSSE épineuse. *Alyssum spinosum*. Linn.

Alyssum ramis floriferis, spinosis, perfoliatis; foliis linearis-lanceolatis, obtusis, sericeis. Willd. Spec. 3. pag. 459. — Linn. Spec. 907. (Voyez Alysse, n°. 1.)

2. ALYSSE maritime. *Alyssum maritimum*. Willden.

Alyssum caulis suffruticosus, procumbentibus; foliis linearis-lanceolatis, acutis, subcanis; flaminibus simplicibus; siliculis subrotundis, integris. Willd. Spec. 3. pag. 459.

Alyssum halimifolium. Curtis, Mag. 101.

Lepidium fragrans. Willd. in Uff. Bot. Magaz. 11. pag. 37. (Voyez Alysse, n°. 8.)

3. ALYSSE à feuilles d'halime. *Alyssum halimifolium*. Linn.

Alyssum caulis suffruticosus, procumbentibus; foliis cuneiformi-lanceolatis, obtusis, subhis canis; flaminibus simplicibus, siliculis obovatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 460. — Linn. Spec. Plant. pag. 907.

Lunaria halimifolia. Allion. Flor. pedem. n°. 900. tab. 54. fig. 1, & tab. 86. fig. 1.

Thlaspi halimifolius, sempervirens. Herm. Li. g. d. Bat. 594. tab. 595.

Thlaspi parvum, halimi angusto, incano folio. Bocc. Mus. 45. tab. 39. (Voyez Alysse, n°. 2.)

4. ALYSSE à feuilles menues. *Alyssum tenuifolium*. Willd.

Alyssum caulis erectis, herbaceis; foliis linearibus, acuminatis, villosis; flaminibus simplicibus. Willdenow, Spec. Plant. 3. pag. 460. — Stephan. in Litt.

Botanique, Supplément. Tome I.

Ses racines produisent plusieurs tiges droites, herbacées, velues, hautes d'environ un demi-pied, garnies de feuilles filiformes, épaisses, très-rapprochées, linéaires, velues à leurs deux faces, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont blanches; les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît dans la Sibérie.

5. ALYSSE des rochers. *Alyssum saxatile*. Linn.

Alyssum caulis frutescentibus, paniculatis; foliis lanceolatis, mollissimis, repandis. Linn. — Curtis, Mag. 159. (Voyez Alysse, n°. 3.)

6. ALYSSE lunaire. *Alyssum lunarioides*. Willd.

Alyssum caulis adf. endentibus, suffruticosus, lanceolato-spathulatis, petiolatis, tomentosis; siliculis ellipticis, compressis. Willdenow, Spec. Plant. 3. pag. 461.

Lunaria fruticosa, perennis, incana, leucis foliis. Tournef. Coroll. 16, & Lin. 1. pag. 373. tab. 30.

Ses racines sont épaisses, roussâtres; de la grosseur du pouce, fibreuses; elles produisent une tige ligneuse, haute d'environ un pied & plus, blanchâtre, rameuse, ascendante; les feuilles pétiolées, très-cotonneuses, rousses, lancéolées, spatulées, longues d'un pouce & plus, larges de trois à quatre lignes. Les fleurs sont jaunes, pédonculées, disposées en une sorte d'épi terminal, un peu lâche; il leur succède des silicules grandes, elliptiques, comprimées, longues d'environ un pouce, sur huit à neuf lignes de large, blanches, cotonneuses, entourées d'un bourrelet, contenant une ou deux semences roussâtres, orbiculaires, membraneuses à leurs bords.

Cette plante a été découverte par Tournefort, dans les îles de l'Archipel. 7

7. ALYSSE argentée. *Alyssum argenteum*. Willd.

Alyssum caulis erectis, suffruticosus; foliis spatulato-oblongis, subhis canis; racemis paniculatis; siliculis obovatis, incanis. Willdenow, Spec. Plant. pag. 461.

Lunaria argentea. Allion. Pedem. n°. 901. tab. 54. fig. 3.

Draba argentea. * Lam. Dict. 2. pag. 329.

Très-rapprochée de l'*Alyssum alpestre*, dont elle n'est peut-être qu'une variété, cette plante en diffère en ce qu'elle est beaucoup plus grande dans toutes ses parties, & par ses fleurs disposées en grappes simples, formant par leur ensemble une panicle étalée & non un corymbe. Ses tiges sont ligneuses, un peu couchées à leur base; les racines droites, couvertes d'un duvet court, ar-

Q q

géné, composé de poils en rayons, & qui se retrouvent également à la surface inférieure des feuilles, sur les pédoncules, les calices & les filiques. Les feuilles sont oblongues, spatulées, vertes en dessus, obtuses au sommet, rétrécies en un pétiole court. Les fleurs sont d'un beau jaune; les filiques planes, elliptiques, couvertes d'un duvet blanc, caduc.

Cette plante croît dans les Alpes, le Piémont, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

8. ALYSSE des Alpes. *Alyssum alpestre*. Linn.

Alyssum caulis adscendentibus, suffruticosis; foliis subrotundo-spatulatis, incanis; racemis corymbosis. Willd. Spec. 3. p. 461. — Linn. Mantill. 92. — Allion. Flot. pedem. n. 888. tab. 18. fig. 2.

8. *Alyssum* (murale), *punctatum*, *echinatum*; *caulis suffruticosus, suavescentis; foliis obovato-cuneiformibus, integerrimis; floribus corymbosis* Walld. & Kneib. Plant. rar. Hungar. 1. pag. 5. tab. 6. (Voyez ALYSSE, n. 4.)

« Cette plante, dit Willdenow, est très variable, selon les localités. Dans les Alpes, ses tiges sont couchées; ses feuilles blanches, petites, arrondies. Ailleurs, ses tiges sont droites, hautes d'un pied; les feuilles lancéolées, spatulées, vertes en dessus, blanches en dessous. Les semences de cette dernière variété se ont produit la première par la culture. »

9. ALYSSE du mont Atlas. *Alyssum atlanticum*. Desfont.

Alyssum caule fruticoso, erecto; foliis lanceolatis, incanis; racemis superioribus ciliatis, calice deciduo; filamentis tenuissimis, stylum aequantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 71. tab. 149.

Alyssum creticum, faxatile, serpillifolium candidissimum, capsulis orbiculatis. Tourn. Coroll. 15.

Elle diffère de la suivante par ses feuilles plus grandes, lancéolées, pileuses & ciliées; par les filiques convexes, de la longueur du style persistant. Ses tiges sont ligneuses, divisées, presque dès leur base, en rameaux nombreux, simples, cylindriques, redressés, rudes, blanchâtres. Les feuilles sont épaisses, lancéolées, un peu spatulées, un peu obtuses, pétioles, hérissées de poils courts, touffus, étalés en étoile; les fleurs disposées en grappes courtes, simples, terminales. Leur calice est caduc; les filiques blanchâtres, arrondies, renfermant deux semences ovales, comprimées.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines sur le sommet de l'Atlas, proche Tiémén. (V. f. la herb. Desfont.)

10. ALYSSE à feuilles de serpolet. *Alyssum serpillifolium*. Desfont.

Alyssum caule fruticoso, erecto, ramofo; foliis spatulatis, subius incanis; calicibus coloratis, deciduis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 70.

Alyssum orientale, serpillifolium, elichrysi capitulo. Tourn. Coroll. 15.

Il se rapproche de l'*Alyssum alpestre*, dont il diffère principalement par les tiges droites, par les feuilles allongées & non orbiculaires, par les fleurs beaucoup plus petites. Il s'élève de la même racine plusieurs tiges droites, ligneuses, cylindriques, presque filiformes, rameuses à leur partie inférieure, blanchâtres dans leur jeunesse, longues d'environ un pied, garnies de feuilles roides, très-entières, spatulées, blanches en dessous, cendrées en dessus, formées de poils très-courts, couchés, étalés en étoile; les feuilles inférieures plus petites. Les fleurs sont petites, terminales, disposées en corymbe, serrées, nombreuses, pédicellées. Le calice est fort petit, caduc, à quatre folioles jaunâtres, elliptiques; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice; les épaves petites, comprimées, blanchâtres, ovales; le style grêle, persistant, trois fois plus court que la filique.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines sur les hauteurs de l'Atlas, proche Tiémén. (V. f. la herb. Desfont.)

11. ALYSSE à fleurs serrées. *Alyssum afflorum*. Desfont.

Alyssum foliis angustis lanceolatis; floribus racemosis, densè congestis; filamentis orbiculatis, monospermis. Desfont. Coroll. Tourn. pag. 65. tab. 48.

Alyssum orientale, serpillifolium, capitulis in spic. m longissimum densè congestis. Tourn. Coroll. Init. 15.

Ses tiges sont grêles, rameuses, cylindriques, hautes de huit à dix pouces, couvertes, ainsi que les feuilles & les filiques, de petits poils étroits, visibles à la loupe; les rameaux un peu étalés, garnis de feuilles alternes, lancéolées, entières, longues de cinq à huit lignes, sur deux ou trois de large. Les fleurs sont petites, pédicellées, nombreuses, très-serrées, disposées en une grappe simple, cylindrique, terminale, longue de trois à quatre pouces; leur calice fort petit, à quatre folioles oblongues; les pétales blancs, arrondis, plus longs que le calice; les filiques rapprochées de la tige, de la grandeur & de la forme de celles de l'*Alyssum calycinum* Linn.

Cette plante croît dans l'Arménie, où elle a été découverte par Tournefort.

12. ALYSSE à feuilles de samole. *Alyssum samolifolium*. Desfont.

Alyssum glabrum, foliis ovatis, obtusis, integerrimis; petalis emarginatis. Desfont. Coroll. pag. 65. tab. 49.

Thlaspi orientale, glabrum, semoli foliis. Tourn. Coroll. 15.

Toute cette plante est glabre. Ses tiges sont cylindriques, hautes d'un pied & plus, divisées à leur partie inférieure en quelques rameaux simples, garnis de feuilles alternes, assez semblables à celles du *semolia*; ovales, obtuses, entières, rétrécies & décurrentes sur un pétiole court, amplicanle; longues de huit à dix lignes, larges de cinq à dix. Les fleurs sont rapprochées, de la grandeur de celles de l'*Alyssum incanum*, pédicellées, disposées en une grappe simple, terminale; les découpsures du calice obtuses, elliptiques; la corolle blanche; les pétales échancrés au sommet; les anthères blanches. La filique n'a point été observée.

Cette plante, découverte par Tournesfort, croît dans l'Arménie. (*Descript. ex Desfont.*)

Nota. L'*Alyssum paniculatum*, Desfont. Coroll. pag. 67, tab. 50, doit être renvoyé au genre *Vesicaria*, à cause de ses filiques tendres. (*Voyez VESICAIRE, Suppl.*)

13. ALYSSE d'Orient. *Alyssum orientale.* Lam.

Alyssum (clypeola tomentosa), *filiculis orbiculatis; obovularibus; foliis subtomentosis.* Linn. Mant. 92. — Willd. Spec. 3. pag. 463. (*Exclus. synon. Tournesf.*) (*Voyez ALYSSE, n° 9.*)

14. ALYSSE d'Amérique. *Alyssum hyperboreum.* Linn.

Alyssum caulis herbaceis; foliis incanis, dentatis; staminibus quatuor biforcatis. Linn. Spec. 910.

Lunaria foliis ellipticis, inconditis dentatis. Krasch. Ad. Petrop. 1747. pag. 381. tab. 15. fig. 1.

Ses tiges sont herbacées, garnies de feuilles alternes, blanchâtres, elliptiques, dentés à leur contour. Les fleurs rentrent à six étamines, dont deux plus courtes, munies à la base du filament d'une dent aiguë; les quatre autres pourvues à leur base d'une écaille échancrée.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale; elle est encore peu connue.

15. ALYSSE changeante. *Alyssum mutabile.* Vent.

Alyssum caulis erectis, foliis lineari-lanceolatis, petalis bifidis; filiculis ovato-oblongis, compressis, glabris. Vent. Hort. Cels. pag. 8. tab. 85.

Elle a des rapports avec l'*Alyssum incanum*; elle

en diffère par ses filiques glabres, ovales & comprimées. Ses tiges sont droites, nombreuses, presque ligneuses, légèrement pileuses, rudes au toucher; les rameaux alternes, peu étalés; les feuilles sessiles, lineaires-lanceolées, très-entières, obtuses, un peu ondules à leurs bords, couvertes de poils couchés, en étoile, longues d'environ un pouce & demi, larges de quatre lignes. Les fleurs sont disposées en grappes terminales; les folioles calicinales pubescentes, caduques, obtuses; la corolle d'abord blanche, puis couleur de rose; les pétales bifides, une fois plus longs que le calice; les deux filaments plus courts, munis à leur base d'une petite dent crochue; les anthères vacillantes, échancrées à leur base; les filiques ovales, munies dans chaque loge de trois à six semences brunes, orbiculaires, à rebords membraneux.

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été découverte par M.M. Bruguière & Olivier. 5

16. ALYSSE blanchâtre. *Alyssum incanum.* Linn. (*Voyez DRAVE à feuilles de giroflée, n° 12. MARCHIA incana. Roth, G. rm. 1. pag. 273, & 2. pag. 73.*)

17. ALYSSE d'Espagne. *Alyssum minimum.* Linn. (*Voyez ALYSSE, n° 5.*)

18. ALYSSE à grappes roides. *Alyssum striatum.* Willd.

Alyssum caulis herbaceis, ascendenti; foliis linear-lanceolatis, t. mucronatis; filiculis tomentosis, ovatis, adpressis. Willd. Spec. 3. pag. 464. (*Exclus. synon. Tournesf.*)

Cette espèce, qui a des rapports avec l'*Alyssum densiflorum*, Desfont., paroît en différer par son port & par plusieurs autres caractères. Ses tiges sont courtes, herbacées, ascendantes; ses feuilles alternes, lineaires-lanceolées, tomentueuses. Ses fleurs sont fort petites, disposées en une longue grappe roide, terminale; les filiques petits, ovales, velues, rapprochées des tiges, point échancrées, surmontées d'un style persistant. Elle croît dans l'Arménie.

19. ALYSSE calicinales. *Alyssum calicinum.* Linn.

Alyssum caulis herbaceis, staminibus omnibus dentatis; calicibus persistantibus (filiculis orbiculatis, emarginatis). Linn. Spec. 908. — Lam. Ill. tab. 559. fig. 1. — Jacq. Vind. 114. — Haller, Helv. n° 494.

Adyeton calicinum. Scop. Carn. 802.

Clypeola alyssoides. Crantz. Austr. pag. 19.

Alyssum minimum. Clus. Hist. 2. pag. 133. — Camerl. Epitome. pag. 558. fig. 1.

Alyssum campestris. Hoffm. Germ. 4. pag. 43. — Lam. Dict. var. β .

20. ALYSSE des champs. *Alyssum campestris*.

Alyssum caule herbaceo, flaminibus stipatis parietarum; calicibus deciduis (filiculis orbiculatis, integris). Linn. Spec. 909. — Lam. var. α .

Minchia campestris. Roth, Germ. 1. pag. 274.

β . *Alyssum* (simplex), caule simpliciter, subramoso; foliis laeo-lanceolatis, stylo filicula brevissimo. Willd. l. c. — Rudolph, in Schrad. Journ. 2. pag. 291. (Voyez ALYSSE, n°. 7, var. α , β .)

Quoique très-rapprochée de l'*alyssum calcicinum*, cette dernière espèce en diffère bien certainement par ses tiges plus élevées, par ses feuilles plus larges & moins blanches, par les calices qui tombent peu après la floraison, & surtout par les filiques point échancrées à leur sommet, couvertes de poils rameux, plus roides, plus hérissés.

21. ALYSSE de montagne. *Alyssum montanum*. Linn.

Alyssum caulibus herbaceis, diffusis; foliis sublanco-latis, punctato-echinatis. Linn. Spec. 907. — Lam. ill. tab. 359. fig. 2.

Clypeola montana. Crantz. Austr. 19.

Alyssum montanum. Scop. Carn. 803.

β . *Alyssum* (arenarium), foliis rotundatis. Lnf. Flor. gall. 401, & Journ. bot. 2. pag. 352. (Voyez ALYSSE, n°. 6.)

Les feuilles sont plus arrondies dans la variété β .

22. ALYSSE de Sibérie. *Alyssum sibiricum*. Willd.

Alyssum caulibus herbaceis, ascendentibus, superne ramosis; foliis obovatis; filiculis suborbiculatis, integris, canis. Willd. Spec. 3. pag. 465.

Ses tiges sont herbacées, ascendantes, redressées, longues de trois à quatre pouces, rameuses vers leur sommet, garnies de feuilles blanchâtres, en ovale-renversée, couvertes à leurs deux faces de poils étoilés. Les fleurs sont jaunes, disposées en grappes simples, terminales; la corolle un peu plus longue que le calice; les pétales entiers à leur sommet; les filiques arrondies, un peu plus étroites à leur base, point échancrées à leur sommet, blanches, couvertes de poils en étoile, surmontées d'un style perliftant, de la longueur des filiques.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Description, ex Willd.)

23. ALYSSE tortueuse. *Alyssum tortuosum*. Willd.

Alyssum caulibus herbaceis, tortuoso-diffusis; foliis incanis, sublanco-latis; racemis terminalibus, corymbosis. Willd. Spec. 3. pag. 466. — Waldst. & Kitaib. Plant. rar. Hung.

Elle ressemble le beaucoup à l'alyssé des montagnes par la forme de ses feuilles & la couleur de la corolle; elle en diffère par ses tiges tortueuses, diffusées, herbacées. Les feuilles sont blanchâtres, presque lancéolées; les fleurs disposées à l'extrémité des rameaux en grappes non simples, mais formant un corymbe. Les pétales sont presque entiers; les filaments des étamines dépourvus de dents.

Cette plante croît dans la Hongrie & la Sibérie, aux lieux stériles & sablonneux. (Willd.)

24. ALYSSE à feuilles de lin. *Alyssum linifolium*. Willd.

Alyssum caule herbaceo, erecto, ramoso, divaricato; foliis linearibus, incanis; filiculis obovatis, integris, glabris. Willden. Spec. 3. pag. 467. — Stephan. in Litt.

Alyssum orientale, angustissimo folio, fructu ovato. Tournef. Coroll. 15.

Ses tiges sont herbacées, hautes de quatre à six pouces, droites, rameuses; les rameaux divariqués; les feuilles blanches, entières, obtuses; les inférieures bien moins longues, plus larges, spatulées, rétrécies en pétiole à leur base; les caulinaires & supérieures très-étroites, linéaires, longues d'un pouce & plus, larges d'une à deux lignes, aiguës à leur base, un peu obtuses à leur sommet. Les fleurs sont pédicellées, disposées en grappes courtes, simples, terminales; la corolle petite, à peine plus longue que le calice; les pétales blanchâtres, lancéolés; quatre des filaments munis dans leur milieu d'une petite dent; les deux autres pourvus d'une écaille stécée, séparée de l'ovaire. Les filiques sont planes, très-glabres, ovales, très-entières, surmontées d'un style très-court, contenant environ six semences petites, comprimées.

Cette plante croît dans l'Arménie & la Tauride. (V. f. in herb. Desfont.)

25. ALYSSE en bouclier. (Voyez DRAVE, n°. 14.)

26. ALYSSE à feuilles de giroflée. *Alyssum cheiranthifolium*. Willd.

Alyssum caule erecto, herbaceo; foliis lanceolatis, hirsutis, integerrimis; filiculis oblongis, compresso-planis; stigmate bifido, petalis spatulato linearibus. Willd. Spec. 3. pag. 468.

An *alyssum orientale leucis folio, candidissimo, caule sessipedali*? Tournef. Coroll. 15.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'*Alyssum elypestrum*, dont elle diffère par les feuilles moins blanches, quoique couvertes de poils longs, épais; par le stigmate bifide & non en tête; enfin, par les pétales, une fois plus longs que le calice.

Cette plante croît dans le Levant. (Willd.)

17. ALYSSE spatulée. *Alyssum spathulatum*. Willd.

Alyssum caulis herbaceis, erectis; foliis tomentosis, radicalibus orbiculato-spathulatis, cauliculis lanceolatis. Willd. Spec. 3. pag. 465. — Stepan. in Litt.

Cette espèce me paroît avoir de grands rapports avec l'*Alyssum linifolium*. Ses racines produisent plusieurs tiges simples, droites, longues d'environ quatre pouces, garnies de feuilles blanchâtres, tomenteuses; les radicales pétiolées, orbiculaires, spatulées; celles des tiges lancéolées, obtuses. Les fleurs sont disposées en une grappe simple, terminale; le calice une fois plus court que la corolle; celle-ci d'un jaune-pâle; les pétales obtus; les filiques très-glabres, orbiculaires, point échancrées, surmontées d'un style persistant. Elle croît sur les monts altaïques, en Sibérie. x (Descript. ex Willd.)

ALYSSOIDE. Tournefort donnoit ce nom à des plantes crucifères, qui ne différoient des *alysum* que par leur silicule renflée; ce qui n'a pas empêché Linné de les réunir à ce genre. Nous les en avons séparées dans cet ouvrage, & décrites sous le nom de *vesicaires* (*vesicaria*). Ventenat désigne encore sous la dénomination d'*alyssoïdes*, la section entière des crucifères, à fruit siliculé.

ALYSSUM. (Voyez ALYSSE.)

ALZATÉE. *Alzatea*. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. peruv. pag. 40. tab. 7. Arbre du Pérou, dont Ruiz & Pavon n'ont donné jusqu'à présent que le caractère générique. Il consiste en un calice coloré, à cinq divisions persistantes, alternes; cinq étamines insérées sous l'ovaire; celui-ci surmonté d'un style & d'un stigmate. Le fruit consiste en une capsule en forme de cœur, s'ouvrant en deux valves, dont chacune porte dans son milieu la moitié de la cloison, sur le bord de laquelle sont attachées des semences un peu membraneuses à leur contour.

Cette capsule est coniforme comme celle de la famille des pédiculaires; mais l'absence de la corolle, l'infériorité & le nombre des étamines ne permettent pas d'y rapporter ce genre, dont les véritables affinités ne sont pas connues. (Juss.)

AMADOU: substance spongieuse, répandue

dans le commerce, très-utile pour se procurer du feu avec une pierre à fûil & un briquet. On s'en sert aussi très-avantageusement en chirurgie pour arrêter les hémorragies. Cette substance provient d'un champignon solide, qui croît sur les chênes & sur plusieurs autres arbres, que l'on nomme vulgairement *agaric de chêne*. C'est le *boletus ignarius* Linn. (Voyez AGARIC amadouvier, Lam. Dict. 1. pag. 50.) Ce n'est que depuis 1770 que l'on se sert de l'agaric de chêne pour les hémorragies. Cette découverte est due à M. Brossard, chirurgien de la Chaire en Berry. Après des expériences répétées, il annonça que cette substance étoit le meilleur astringent, & capable de suppléer à la ligature qu'on est obligé de faire dans les amputations. Depuis ce tems on s'en sert avec succès.

AMAGA: petite espèce d'ébénier des Philippines, dont le bois, suivant Camélin, est noir comme celui de l'ébénier ordinaire. J.

AMAIIOUA. Aubl. (Voyez HAMEL, n°. 2.)

AMANDIER. *Amygdalus*. Nous n'avons que deux espèces à ajouter à ce genre. La première est cultivée au Jardin des Plantes de Paris.

1. AMANDIER de Géorgie. *Amygdalus georgica*.

Amygdalus foliis lanceolatis, basi attenuatis, levissime serratis; floribus polygamis. Desfont. Arbr. & Aubl. vol. 2. pag. 221.

« Cet amandier, dit M. Desfontaines, a une si grande ressemblance avec l'*Amygdalus nana*, qu'il est assez difficile de l'en distinguer au premier coup d'œil: il s'élève davantage; ses feuilles sont plus lisses, plus légèrement dentées, & il a des fleurs polygames. Il fleurit également au printemps, & passe l'hiver en pleine terre. » Nous devons ce joli arbrisseau d'ornement à MM. Olivier & Bruenière. Il est encore peu répandu dans les jardins. Ses amandes sont très-amères, & ne sont pas mangeables.

6. AMANDIER cotonneux. *Amygdalus incana*. Pall.

Amygdalus foliis lanceolatis, serratis, rugosis, subsessilibus, subtus albo-tomentosis. Pall. Flor. ross. 1. pag. 13. tab. 7. — Willd. Spec. 2. pag. 984.

Cette espèce a également le port de l'amandier nain; mais elle s'en distingue aisément par ses feuilles beaucoup plus étroites, presque sessiles, ridées, glabres & vertes en dessus, tomenteuses & d'un blanc de neige à leur face inférieure. Elle croît sur le mont Caucase. y

Les espèces mentionnées sous les nos. 3 & 4.

fans phrase spécifique, se caractérisent ainsi qu'il suit :

3. AMANDIER argenté. *Amygdalus argentea*, Lam.

Amygdalus (orientalis), foliis lanceolatis, integerrimis, argenteis, permanentibus; petiolo brevior. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 162.

4. AMANDIER nain. *Amygdalus nana*. Linn.

Amygdalus foliis ovatis (lanceolatifve), basi attenuatis, simpliciter argutis serratis. Willd. Spec. 2. pag. 83. — Pall. Flor. ross. 1. tab. 6.

On trouve figuré dans les *Illustr. Gen.* tab. 431, fig. 1, l'*Amygdalus persica* Lam., & fig. 2, l'*Amygdalus communis* Linn.

AMANITE. (Voyez AGARIC, Suppl.)

AMANOË. (Voyez AMANOLIER, & Illustr. tab. 767.)

AMANSIE. (Voyez AMANSIE.)

AMANSIE. *Amanfia*. L'étude particulière que M. Lamouroux a faite des *fuscs*, lui a fourni les moyens d'établir plusieurs genres, confondus d'abord en un seul. De ce nombre se trouve l'*Amanfia*, qu'il dédie à M. de Saint-Anans. Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Le feuillage (la fronde), parsemé par une nervure; la substance réticulée, les mailles du réseau représentant des hexagones allongés & très-réguliers.

La fructification consiste dans des capsules renfermées dans une enveloppe commune, remplie d'une mucosité transparente & gélatineuse, située au sommet des rameaux & des petits rameaux.

Ce genre ne renferme jusqu'alors que deux espèces, tellement caractérisées, qu'il est impossible de les confondre avec les autres algues, & de les réunir aux différents genres de cette nombreuse famille.

ESPÈCES.

1. AMANSIE multifide. *Amanfia multifida*, Lamour.

Amanfia fronde ramosa, ramis ramulifque dentato-multifidis. Lamour. Journ. Philom. 10. mai 1809. pag. 332. tab. 6. fig. C. D. E., & Journ. butan. vol. 2. pag. 133.

L'amanfie diffère des ulves & des varecs par la fructification & la substance réticulée; des dictyotes & des dictyopéries (autres genres de M. Lamouroux), par la fructification; la forme des mailles & la couleur, qui est rose dans l'amanfie, est brune, verte ou fauve dans les deux

autres genres. Il ne faut pas confondre, avec la fructification, les extrémités des petits rameaux, qui, se recourbant sur eux-mêmes, rendent cette partie de la plante entièrement opaque, presque semblable, pour un œil peu exercé, à une véritable fructification.

Cette plante a été recueillie aux Antilles par M. Poiteau. (Lamour.)

2. AMANSIE à demi pennée. *Amanfia semipennata*. Lamour.

Amanfia frondibus membranaceis, uno latere integris, altero semipennatis; foliolis linearibus, denticulatis, subsalsiformibus. (N.)

Cette singulière espèce se présente sous un aspect très-remarquable. D'une racine tuberculeuse s'élève une tige nue, cylindrique, divisée en ramifications prolifères, membraneuses, semblables à des feuilles étroites, linéaires, minces, transparentes, d'un vert-olive; d'un côté la membrane est entière, & nervures fines, simples, parallèles, très-régulières, coupées à angles droits par des lignes extrêmement fines, visibles à la loupe, très-serrées; l'autre côté de la membrane est divisé, jusqu'à la nervure du milieu, en petites folioles, en forme d'aile, très-rapprochées, linéaires, un peu courbées en faux, légèrement denticulées à un de leurs bords. La fructification, d'après les observations de M. Lamouroux, placée à la base des folioles, ne diffère de celle de l'espèce précédente que par sa situation : ce sont des capsules granifères, réunies dans une matie gélatineuse & transparente.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. M. Lamouroux a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

AMARACUS. Suivant la fable, un prince, Amaraeus de Chypre, avoir été changé, après sa mort, en une plante odorante, à laquelle on donna son nom; c'est la marjolaine ordinaire, espèce d'origan, *origanum majorana*. Linn. (Juss.)

AMARANTHE. *Amaranthus*.

* Feuilles à trois éminences. Ajoutez avant le n°. 1.

1. AMARANTHE à feuilles menues. *Amaranthus tenuifolius*, Willd.

Amaranthus glomeratis axillaribus, triandris; foliis linearibus-lanceolatis, cuneatis, reuatis; caule ramoso, diffusis. Willden. Spec. 4. pag. 381. — Roxburg.

Ses tiges sont très-rameuses, étalées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, linéaires-lancéolées, obtuses à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base en forme de coin, très-étroites,

longues de quatre ou six lignes. Les fleurs sont disposées en petits paquets axillaires, accompagnées de bractées lancéolées, obtuses, plus courtes que les fleurs ; les calices obtus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○

1. AMARANTHE blanche. *Amaranthus albus*, Willden. Amar. pag. 9. tab. 1. fig. 2.

2. AMARANTHE à feuilles étroites. *Amaranthus gracilis*, Willdenow, Amar. pag. 8. tab. 4. fig. 7.

2.* AMARANTHE mucronée. *Amaranthus mucronatus*.

Amaranthus (angustifolius), glomerulis axillari-bus, triandris; foliis linear-lanceolatis, acutis, mucronatis; caule ramofo, erecto. Willd. Spec. 4. pag. 381. — Marschall. ab Bichtert.

Amaranthus græcus, silvestris, angustifolius. Tourn. Coroll. 17.

Cette espèce se distingue par ses tiges droites, rameuses, hautes d'un pied & demi, garnies de feuilles longues de douze à dix-huit lignes, fort étroites, linéaires-lancéolées, aiguës, mucronées à leur sommet. Les fleurs sont réunies en petits paquets axillaires. Les divisions du calice sont aiguës, ainsi que les bractées qui les accompagnent. Willdenow pense qu'il faut rapporter à cette espèce, & non à l'*Amaranthus græcus*, le synonyme de Tournefort.

Cette plante croît dans le Levant, & sur les bords de la mer Caspienne. ○

2.** AMARANTHE à feuilles de persicaire. *Amaranthus persicarioides*, Hort. Paris.

Amaranthus foliis oblongis, lobato-sinuatis; floribus cæcis in spicâ nuda, subramosa. (N.)

Ses tiges sont glabres, rameuses, élevées, d'un blanc-verdâtre ; les rameaux étalés, axillaires ; les feuilles alternes, pétiolées, allongées, de forme ovale, tant dans leur grandeur que dans leurs découpures, vertes, très-glabres, un peu blanchâtres en dessous dans leur jeunesse, obtuses à leur sommet, légèrement décourbées sur le pétiole, irrégulièrement sinués ou lobés à leur contour ; les lobes obtus. Les fleurs sont axillaires, latérales & terminales, d'un vert-jaunâtre, disposées par petits paquets sur un épi étroit, cylindrique, obtus, simple ou rameux, dépourvu de feuilles, excepté à la base de ses divisions ; les calices obtus ; trois étamines dans chaque fleur mâle.

On cultive cette Amaranthe au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est point connu. ○ (V. v.)

2.*** AMARANTHE à feuilles rondes. *Amaranthus circinnatus*, Hort. Paris.

Je n'ai pu observer, ni dans les jardins, ni dans les herbiers, cette plante que M. Desfontaines a vue vivante au Jardin des Plantes, & qui paroitroit devoir se distinguer par ses feuilles rondes.

2.*** AMARANTHE des champs. *Amaranthus campestris*, Willd.

Amaranthus glomerulis triandris, axillari-bus, sessilibus; foliis ovatis, emarginatis; caule ramofo, erecto. Willd. Spec. 4. pag. 382.

Quai-totu-kara. Tamul.

Ses tiges sont droites, rameuses, de la grosseur d'une paille de pigeon à leur partie inférieure, un peu anguleuses, garnies de feuilles assez semblables à celles de l'*amblyum*, mais plus petites, alternes, pétiolées, ovales, à peine longues d'un demi-pouce, vertes, glabres, obtuses, échancrées & mucronées à leur sommet ; les pétioles de la longueur des feuilles ; les fleurs presque nées, ramassées par petits paquets ; les calices & les bractées sont de couleur blanche, membraneux, mucronés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○ (Descript. ex Willd.)

2.* AMARANTHE mélancolique. *Amaranthus melancholicus*, Linn.

Amaranthus glomerulis triandris, axillari-bus, pedunculatis, subrotundis; foliis ovato-lanceolatis, coloratis. Willd. Amarant. pag. 15. tab. 9. fig. 18. — Lam. III. tab. 767. fig. 1. — Linn. Spec. 1403. — Miller, Dict. n°. 2.

Amaranthus tricolor, n°. 3, variété 2. Linn. pag. 115.

Cette plante ne doit pas être confondue avec l'*Amaranthus tricolor*, quoiqu'elle en soit très-rapprochée, ainsi que la précédente. Ses tiges sont dures, élevées ; ses feuilles longuement pétiolées, ovales, aiguës, cuivrées en dessus, d'un rouge-noirâtre en dessous ; celles du haut d'un tinte mélangé de pourpre à leurs deux faces. Les fleurs sont légèrement pédicellées & non sessiles, réunies en petits paquets dans l'aisselle des feuilles. Sa floraison est tardive.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○ (V. f.)

3. AMARANTHE tricolor. *Amaranthus tricolor*, Linn.

Amaranthus glomerulis triandris, sessilibus; foliis oblongo-lanceolatis, coloratis. Willd. Amar. pag. 19. (Voyez AMARANTHE, n°. 3.)

Elle diffère de la précédente par ses feuilles plus allongées, vertes à leurs deux faces; les dernières panachées de pourpre; les fleurs un peu feilées.

4.* AMARANTHE bicolor. *Amaranthus bicolor*. Willd.

Amaranthus glomerulis triandris, sessilibus, capitatis; foliis ovatis, acuminatis, obtusis, coloratis. Willd. Spec. 4. pag. 364.

Malgré ses grands rapports avec l'espèce précédente, celle-ci en diffère par ses feuilles ovales, terminées par une pointe obtuse, vertes, teintées en pourpre depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, quelquefois marquées d'une tache jaunâtre à la base des feuilles inférieures, rétrécies en un pétiole presque aussi long que les feuilles, excepté aux supérieures. On la soupçonne originaire de la Chine. ○

4.** AMARANTHE grêle. *Amaranthus gracilis*. Hort. Paris.

Amaranthus glomerulis triandris, spicato-paniculatis; foliis ovatis, obtusis; caule simplici, erecto. (N.)

Chenopodium (caudatum), foliis ovatis, integerrimis; caule erecto; spica ramosa, terminali, cretula. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 344, & Collect. 2. pag. 325.

Cette plante offre dans ses fleurs tous les caractères des amarantes, & ne pouvant rester parmi les *chenopodium*. Ses tiges sont droites, simples ou à peine rameuses, garnies de feuilles glabres, alternes, pétioletées, ovales, très-entières, obtusées à leur sommet. Ses fleurs sont moniques, à trois étamines, disposées par paquets sur des épis droits, rameux, dépourvus de feuilles, situés à l'extrémité des tiges.

On la soupçonne originaire de la Guinée. ○ (P. f.)

5.* AMARANTHE du Gange. *Amaranthus gangeticus*. Linn. — Willdenow, Amar. pag. 16. tab. 6. fig. 11.

5.* AMARANTHE à plusieurs épis. *Amaranthus polythyus*. Willd.

Amaranthus glomerulis triandris, spicatis; foliis axillaribus & terminalibus; foliis ovato-lanceolatis, emarginatis. Willd. Spec. 4. pag. 385.

Kuppei-kirei. Tamul.

Ses tiges sont foibles, rameuses à leur base, ascendantes, garnies de feuilles alternes, longuement pétioletées, longues d'un pouce, ovales-lanceolées, échancrées avec une pointe, un peu rétrécies en coin à leur base, vertes à leurs deux

faces. Les épis sont grêles, longs de douze à dix-huit lignes, situés à l'extrémité des tiges & dans l'axilla des feuilles supérieures; les fleurs pédonculées; les calices, ainsi que les bractées, aigus, membraneux.

Cette plante croit dans les Indes orientales. ○ (Willd.)

6. AMARANTHE trifide. *Amaranthus trifidis* Linn. — Willd. Amarant. pag. 21. tab. 5. fig. 10.

7. AMARANTHE livide. *Amaranthus lividus*. Linn. — Willdenow, Amarant. pag. 20. tab. 1. fig. 1.

7.* AMARANTHE rebuzante. *Amaranthus inermis*. Willd.

Amaranthus glomerulis subspicatis, triandris triphyllisque, axillaribus, geminis; foliis rhombo-lanceolatis. Willdenow, Amar. pag. 14. tab. 7. fig. 14.

Amaranthus japonicus. Houttuyn. — Linn. Flor. Syll. 10. pag. 198. tab. 72. fig. 1.

Elle a beaucoup de rapport avec l'*amaranthus mangifanus*; elle en diffère par ses calices à trois folioles, par ses paquets de fleurs geminés, formant un épi terminal, droit, plus grêle; par ses feuilles rhomboïdales-lanceolées, plus longues que les pétioles. Ses tiges sont droites, glabres, striées, cylindriques, hautes d'un pied & demi, divisées à leur partie inférieure en rameaux courts; les feuilles vertes, traversées par des veines blanches, obtuses, un peu échancrées, terminées par un poil foyeux; les pétioles canaliculés, foliacés à leurs bords; les paquets de fleurs légèrement pédonculés; les folioles du calice oblongues, acuminées, blanchâtres, membraneuses, environnées de bractées oblongues, membraneuses, de même forme.

On soupçonne que cette plante est originaire du Japon. ○

8. AMARANTHE potagère. *Amaranthus oleraceus*. Linn. — Willdenow, Amar. pag. 17. tab. 5. fig. 9.

9. AMARANTHE du Mangostan. *Amaranthus mangifanus*. Linn. — Willdenow, Amar. pag. 13. tab. 12.

10. AMARANTHE blette. *Amaranthus blitum*. Linn. — Willdenow, Amarant. pag. 22. (Exclaf. variété β.)

10.* AMARANTHE couchée. *Amaranthus prostratus*. Balb.

Amaranthus glomerulis triandris, floribus trifidis, foliis

foliis rhombéo-ovatis ; caule procumbente. Balbis, Miscell. Botan. pag. 44. tab. 10. — Willd. Spec. 4. pag. 387.

Amaranthus silvestris. Desfont. Cat. Hort. Paris. pag. 44.

Amaranthus viridis. Vill. Plant. Dauph. vol. 2. pag. 567.

Blitum silvestre, spicatum. Tourn. Herb. Paris. 2. pag. 273.

Blitum rubrum, minus. Camerar. Epit. 233. Icon.

Cette espèce a tout-à-fait le port de la précédente, à un tel point, qu'il seroit facile de les confondre si l'on ne portoit son attention sur les fruits très-nombreux, ramassés en épis, non-seulement dans les aisselles des feuilles, mais encore à l'extrémité des rameaux. Les feuilles sont ovales, rhomboïdales à leur base ; les tiges rameuses, étalées sur la terre. Les capsules sont membraneuses, vésiculeuses, d'un gris-rouffêtré, un peu comprimées, ovales, aiguës ; elles ne s'ouvrent point en travers, mais elles se crèvent irrégulièrement, & laissent échapper une graine fort menue, lenticulaire, d'un beau noir-luisant.

Cette plante croît en France, aux environs de Paris, &c. (V. v.)

11. AMARANTHE à épis. *Amaranthus spicatus.* Lam.

Amaranthus floribus triandris, densè spicatis, lateralibus vel terminalibus ; foliis ovato-oblongis ; caule erecto, subramoso. Decand. Synops. pag. 199.

Amaranthus viridis. Allion. n°. 2. 93. Non Linn. (Voyez AMARANTHE, n°. 11.)

11.* AMARANTHE verte. *Amaranthus viridis.* Linn.

Amaranthus glomerulis axillaribus, geminatis, triandris ; floribus masculis triphyllis ; foliis ellipticis, emarginatis, margine unguatis. Willdenow, Amar. p. 18. tab. 8. fig. 16. — Linn. Spec. 1405. — Mill. Dict. n°. 16.

Blitum minus, album, polyspermum, folio subrotundo. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 145. tab. 92. fig. 1.

Cararu. Pis. Brasil. 241. tab. 241.

Ses tiges sont droites, rougeâtres, striées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, ovales, quelquefois un peu arrondies ou elliptiques, entières, échancrées à leur sommet, vertes dans leur milieu, membraneuses, rougeâtres & ondulées à leurs bords. Les épis sont axillaires, d'un beau vert, composés de petits

Botanique. Supplément. Tome I.

paquets globuleux, épars, gémés ; les fleurs mâles à trois folioles calicinales.

Cette plante croît à la Jamaïque & au Brésil. ○

12.* AMARANTHE à épis rabattus. *Amaranthus deflexus.* Linn.

Amaranthus floribus triandris ; spica brevissima, pauciflora ; foliis rhombéo-lanceolatis, capsulis non deficientibus. Willd. Amar. pag. 10. tab. 10. fig. 20. — Linn. Mant. 295.

Elle a le port de l'espèce précédente. Ses tiges sont couchées, nombreuses, herbacées, longues d'un pied, divisées en rameaux alternes, striés, presque lisses, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales ou rhomboïdales-lanceolées, un peu ondulées, nerveuses, souvent échancrées au sommet dans leur jeunesse, terminées par un filament sétacé. Les épis sont courts, à peine rameux, composés de quelques fleurs agglomérées ; ils deviennent plus épis, presque charnus & inclinés après la fleuraison. Les fleurs sont verdâtres ; les anthères jaunes ; les semences ovales, plus longues que le calice, renfermées dans une capsule qui ne s'ouvre point.

On ignore le lieu natal de cette plante. ○

13.* AMARANTHE polygonée. *Amaranthus polygonoides.* Linn. — Willd. Amar. pag. 11. tab. 6. fig. 12.

*** Fleurs à cinq étamines.

14. AMARANTHE bâtarde. *Amaranthus hybridus.* Linn. — Willd. Amar. pag. 26. tab. 9. fig. 17.

3. *Amaranthus* (hélicis), *floribus pentandris, simpliciter spicatis, axillaribus, glomeris 2 ; foliis ovatis, dentatis.* Willd. Amar. pag. 25. tab. 7. fig. 13, & tab. 11. fig. 22. — Barrel. Ic. tab. 643.

Amaranthus retroflexus, n°. 15, & Willd. Amar. pag. 35, tab. 11, fig. 21, paraît être la même plante que l'amarante précédente ou une autre variété.

15.* AMARANTHE à tige toide. *Amaranthus frigidus.* Willd.

Amaranthus racemis pentandris, compositis, erectis, frigidis ; foliis ovatis, concavis. Willd. Amar. pag. 27. tab. 5. fig. 5.

Elle se distingue par ses grappes étroites, très-serrées contre la tige ; par les fleurs à cinq étamines, par la roideur de toutes les parties. Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, glabres, vertes, médiocrement cannelées, rougeâtres à leur base, chargées de feuilles ovales, vertes, concaves, prolongées à leur sommet en une petite pointe. Les fleurs sont disposées en grappes

R r

rameuses, compactes, cylindriques, verdâtres ; les calices divisés en cinq folioles ovales, acuminées, accompagnées de bractées subulées, ovales, mucronées. Son lieu natal n'est point connu. ○

15. AMARANTHE paniculée. *Amaranthus paniculatus*. Willd. Amar. pag. 32. tab. 2. fig. 4.

16. AMARANTHE sanguin. *Amaranthus sanguineus*. Linn. — Willden. Amar. pag. 31. tab. 2. fig. 4.

16.* AMARANTHE élégante. *Amaranthus latus*. Willd.

Amaranthus racemis compositis, pentandris, erectis; foliis ovatis, obtusis, mucronatis. Willd. Amar. pag. 28. tab. 8. fig. 15.

On la distingue de l'amarante hybride par son port bien moins élevé, & par les feuilles obtuses à leur sommet. Ses tiges sont glabres, vertes, presque cylindriques, striées, hautes d'un pied ; ses feuilles alternes, pétioles, glabres, ovales, obtuses, un peu mucronées ; les pétioles rougeâtres à leur base. Quelquefois les feuilles & les tiges prennent une couleur rougeâtre. Les fleurs sont disposées en grappes droites, terminales, rameuses, un peu étalées, verdâtres ; les involucres presque simples. Les calices se divisent en cinq folioles oblongues, obtuses. Les bractées qui environnent les paquets de fleurs, sont subulées, vertes, mucronées. Aux fleurs succèdent des capsules oblongues, ridées à leur partie intérieure, contenant des semences luitantes, d'un brun noirâtre. Son pays natal est inconnu. ○

18. AMARANTHE jaune. *Amaranthus flavus*. Linn. — Willd. Amar. pag. 35. tab. 3. fig. 6.

18.* AMARANTHE pâle. *Amaranthus chlorostachys*. Willd.

Amaranthus racemis pentandris, compositis, nutantibus; foliis lanceolatis. Willd. Amar. pag. 34. tab. 10. fig. 19.

Ses tiges sont glabres, un peu comprimées, striées, cannelées, hautes de quatre pieds, garnies de feuilles lancéolées, glabres, planes, aiguës, longuement pétioles, & les grappes lâches, rameuses, verdâtres, les supérieures recourbées, un peu pubescentes. Les calices sont divisés en cinq folioles oblongues, transparentes, acuminées ; les bractées écartées, oblongues, acuminées, verdâtres. On ne connoit point son lieu natal. ○

19. AMARANTHE fasciculée. *Amaranthus hypochondriacus*. Linn. — L'Infr. tab. 767. fig. 3. — Willd. Amar. 3.

20. AMARANTHE enfangantée. *Amaranthus cruentus*. Linn. — Willd. Amar. pag. 29.

21. AMARANTHE épineuse. *Amaranthus spinosus*. Linn. — Willd. Amar. pag. 38. tab. 4. fig. 8.

* AMARANTHE à grosses tiges. *Amaranthus macrocaulos*.

Amaranthus racemis compositis, filiformibus; foliis lanceolatis, acuminatis; caule crassissimo. (N.)

Ses tiges sont hautes de huit à dix pieds, de la grosseur de la cuisse, rameuses, charnues ; les rameaux très-glabres, un peu rougeâtres, garnis de feuilles alternes, pétioles, lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base ; les pétioles grêles, longues ; les fleurs fort petites, disposées en grappes axillaires, ramifiées ; les rameaux filiformes ; les calices angus. Je n'ai pu m'assurer du nombre des étamines.

Cette plante a été découverte dans la Caroline par M. Bosc, qui m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

AMARANTHINE. *Gomphrena*. Nous avons peu d'observations à joindre à ce genre, la plupart des espèces étant désignées par des phrases spécifiques.

Après le n°. 3, ajoutez :

4. AMARANTHINE du Brésil. Ill. Gen. tab. 180. fig. 1.

4.* AMARANTHINE à feuilles étroites. *Gomphrena angustifolia*. Vahl.

Gomphrena foliis linearilanceolatis, glabris; capitulis terminalibus, oblongis, subtriplyllis. Vahl, Symb. 3. pag. 45.

Ses tiges sont droites, tétragones, pileuses ; les rameaux simples, opposés, presque bisiformes, plus longs que les tiges, munis de deux feuilles sessiles, étroites, rétrécies, longues d'un pouce & demi, pileuses, entières. Les pédoncules sont longs, terminaux, soutenant des fleurs en têtes oblongues, cylindriques, ayant ordinairement à leur base trois folioles, quelquefois deux, plus longues que les têtes de fleurs ; les écailles florales ovales, concaves, mucronées, un peu ciliées ; les divisions du calice concaves, lancéolées, pubescentes en dehors. L'ovaire est glabre, oblong, surmonté d'un seuil style & d'un stigmate simple.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Vahl.)

5.* AMARANTHINE vermiculaire. *Gomphrena vermicularis*. Linn.

Gomphrena caulibus repentibus; foliis subteretibus, carnosiss; capitulis foliatis, terminalibus, oblongis. Swartz, Obf. pag. 101. — Vahl, Egl. 1. pag. 32. — Linn. Spec. 1. pag. 215.

Illecebrum verticillatum. Linn. Spec. 2. pag. 300.

Amaranthoides humile, turaffovicum, epera foliis lucidis; capitulis albis. Herm. Paradis. pag. 15. tab. 15. — Plukenet, Almag. pag. 27. tab. 75. fig. 9.

Parexil. Martgr. Brasil. 14.

Caoponga. Piñon. Brasil. 243.

Ses tiges sont glabres, rampantes, articulées; elles poussent à leurs nœuds des rameaux courts, assez nombreux, un peu renflés à leurs articulations. Les feuilles sont grasses, charnues, semblables à celles des joubarbès, étroites, linéaires, obtuses; quelques-unes légèrement cylindriques. De l'aisselle des feuilles supérieures sortent une, quelquefois deux têtes de fleurs ovales-oblongues, composées d'écaillés d'un blanc argenté & luisant. Quand les têtes sont geminées, l'une est stérile, l'autre pédonculée.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de l'Amérique méridionale. (V. f.)

§. ** AMARANTHINE laineuse. *Gomphrena lanata.*

Gomphrena caule basi prostrato, suff-utricoso; foliis ovatis, acutis, supra pubescentibus, subius incano-tomentosis; capitulo terminali, solitario, longè pedunculato. (N.)

p. Eadem, foliis multò minoribus, rotundatis.

Belle espèce, dont les tiges sont presque ligneuses & un peu couchées à leur base, blanches, velues, garnies de feuilles distantes, opposées, à peine pétiolées, ovales, très-aignies, pubescentes en dessus, blanches & cotonneuses en dessous, très-entières, longues d'environ un pouce; les inférieures plus petites. Les fleurs sont portées à l'extrémité d'un très-long pédoncule, droit, terminal, réunies en une tête globuleuse, un peu ovale, pubescente; les écaillés extérieures roussâtres; le calice très-velu d'une blancheur éclatante. Dans la variété p., les feuilles sont beaucoup plus petites, presque rondes.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerçon. (V. f. in herb. Desfont.)

7. AMARANTHINE à épi. *Gomphrena spicata.* Lam.

Gomphrena (interrupta), caule erectiusculo; floribus spicatis, sessilibus, intercapis, monogynis. Swartz, Obf. 108. — Lam. Ill. tab. 180. fig. 2. — Lhérit. Scirp. tab. 3.

Celosia proceriens. Jacq. Icon. 1. tab. 51, & Misk. 2. pag. 344.

Observations. Je n'ai point distingué comme espèce le *Gomphrena prostrata*, Hort. Paris., qui ne m'a paru différer du *Gomphrena globosa* que par ses tiges couchées, plus allongées; par ses têtes de fleurs plus petites, panachées ordinairement de blanc & de rouge.

AMARANTHUS. (Voyez AMARANTHE)

AMARILLIS. Ce genre a été enrichi de plusieurs belles espèces, dont quelques-unes sont cultivées dans les jardins.

ESPÈCES.

* *Spathé à une seule fleur.*

1. AMARILLIS jaune, n°. 3. *Amaryllis lutea.* Linn. Syst. veget. 329. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 9.

2. AMARILLIS de Virginie, n°. 4. *Amaryllis atamasco.* Linn. — Lhérit. Sert. Angl. 10. — Redouté, Liliac. tab. 31.

3. AMARILLIS du Pérou. *Amaryllis peruviana.* *Amaryllis (aurea), spathâ uniflorâ; corollâ campanulatâ, patentissimâ; flammulis erectis, stylo declinato, bulbo bulbis ovallato.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 56. tab. 186. fig. A.

Ses hampes sont cylindriques, légèrement striées, sortant d'une bulbe arrondie, accompagnée à sa base d'autres petites bulbes nombreux. Les feuilles sont en lames d'épée, striées, canaliculées, un peu recourbées. La spathe est oblongue, divisée en dix découpures profondes, lancéolées, aiguës, divergentes, d'où sort une seule fleur d'un jaune d'or, campanulée. Son tube est court; son limbe à six découpures lancéolées, étalées & un peu réfléchies à leur partie supérieure. Ses étamines sont droites, toutes égales; les anthères mobiles; le style incliné.

Cette plante croît au Pérou, dans les champs, parmi les moissons. (p.)

4. AMARILLIS flambee. *Amaryllis flammea.* Ruiz & Pav.

Amaryllis spathâ uniflorâ; corollâ laciniis semicircumvolutis, superne patentibus, reflexis; genitalibus brevibus, erectis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 56. tab. 186. fig. B.

Lilio-narcissus, monanthus, soccineus. Feuillée, Obf. vol. 3. pag. 29. tab. 21.

Amaryllis (chilensis), spathâ uni seu biflorâ, subsessilâ; floribus pedunculatis, foliis linearibus. Lhérit. Sert. Angl. pag. 21.

D'un oignon ovale, garni de racines fibreuses en dessous, s'élève une hampe droite, longue au plus d'un pied, d'un vert gai, cylindrique, terminée par une seule fleur, quelquefois deux, d'un très-beau rouge, dont le tube, un peu campanulé, se divise à son limbe en six découpures lancéolées, aiguës, longues d'environ deux pouces, larges de quatre lignes, étalées, puis rabattues en dehors; de petites écailles tronquées, crénelées, membraneuses, à la base de chaque découpure. Les étamines sont courtes, droites; les filaments rougeâtres; les anthères jaunes; le style plus long que les étamines. Les feuilles sont radicales, étroites, linéaires, au nombre d'une à deux, ensiformes, réfléchies, plus courtes que la hampe.

Cette plante croît sur les montagnes du Chili. Son oignon passe pour vulnérinaire, détersif & résolutif. Les Indiens le pilent & l'appliquent en cataplasme sur la partie malade. ♀

5. AMARILLIS pumilio. *Amaryllis pumilio*. Aiton.

Amaryllis spathâ diphyllâ, uniflorâ; corollâ infundibuliformi, aequali; laciniis revolutis; filamentis inclinatâ, alternis, brevioribus. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 415.

Ses hampes sont cylindriques, verdâtres, munies d'une feuille radicale linéaire, rétrécie à sa partie inférieure. La fleur est solitaire, terminale, garnie d'un spathe à deux découpures linéaires, subulées, veitres, plus longues que le tube de la corolle. Celle-ci a un tube en entonnoir, long d'un pouce, blanchâtre, marqué en dehors de six lignes saillantes, & de six autres en dedans, de couleur rouge, alternes avec les premières; les découpures du limbe ovales-oblongues, aiguës, réfléchies, plus longues que le tube, blanches en dehors, d'un rouge de brique en dedans; les filaments insérés à l'orifice du tube, recouverts à leur sommet; trois alternes plus courts; les anthères oblongues, inclinées; l'ovaire oblong; le style filiforme, plus long que les étamines, surmonté d'un stigmate trifide; les découpures rougeâtres, linéaires, blanches à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

6. AMARILLIS à spathe tubulée, *Amaryllis tubiflora*. Lhérit.

Amaryllis spathâ monophyllâ, tubulosâ, bifidâ, uniflorâ; pedunculo spathâ duplô longiore. Lhérit. Seit. Angl. pag. 9.

Ses hampes sont droites, grêles, hautes de quatre à huit pouces, à une seule fleur, sortant d'une spathe tubuleuse, cylindrique, partagée en deux découpures étroites, profondes, aiguës, opposées. La fleur est droite à l'extrémité d'un

long pédoncule; elle contient six filaments moins longs que la corolle; trois alternativement plus courts. La corolle est purpurine, infundibuliforme; le tube court; le limbe à six découpures égales, veinées, élargies à leur sommet, obtuses; les trois extérieures légèrement mucronées. Je n'en ai point vu les feuilles.

Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a été recueillie par Commerlon. ♀ (V. f. in herb. Desfont.)

7. AMARILLIS à long tube. *Amaryllis tubiflora*. Lhérit.

Amaryllis spathâ uniflorâ, diphyllâ; corollâ infundibuliformi, tubo longissimo. Lhérit. Seit. Angl. pag. 10.

Lilio-narcissus, croceus, monanthos. Feuill. Petuv. 3. pag. 29. tab. 10.

Son oignon est ovale, d'un beau blanc, long d'un pouce & plus, couvert d'une pellicule grise; il en sort deux feuilles radicales, linéaires, aiguës, du milieu desquelles s'élève une hampe haute d'un pi. d, un peu plus longue que les feuilles, terminée par une seule fleur d'un beau jaune-auréole, longue de plus de trois pouces. La corolle est en forme d'entonnoir; son tube très-long; les découpures lancéolées, un peu aiguës; les filaments presque égaux en longueur.

Cette plante croît dans les campagnes, aux environs de Lima, au Pérou. ♀

8. AMARILLIS à deux feuilles. *Amaryllis bifolia*. Lam.

Amaryllis spathâ bivulvi, uniflorâ; corollâ laciniis ovato-fimbriatis; foliis geminis, valde inequalibus. (N.) (Voyez AMARILLIS, n°. 2.)

9. AMARILLIS maculée. *Amaryllis maculata*. Lhérit.

Amaryllis spathâ uniflorâ, diphyllâ, lineari; flore pedunculata, geminibus declinatis. Lhérit. Seit. Angl. pag. 10.

Ses hampes sont droites, simples, parsemées de points en forme de petites lignes; la spathe disséquée en deux folioles linéaires, ne contenant qu'une seule fleur campanulée, soutenue par un pédoncule; les étamines & le pistil recourbés.

Cette plante croît au Chili. ♀

10. AMARILLIS en massue. *Amaryllis clavata*. Lhérit.

Amaryllis spathâ uniflorâ, diphyllâ, subulata; corollâ clavata. Lhérit. Seit. Angl. pag. 11.

Ses hampes sont terminées par une seule fleur pédicellée, sortant d'une spathe à deux folioles

subulées. La corolle est en forme de massue ; le tube rétréci à sa base, point dilaté ; le limbe très-court. Les feuilles & les étamines n'ont point été observées.

Cette plante croît dans l'Afrique méridionale. ♀

11. AMARILLIS à fleur en croix. *Amaryllis formosissima*. Linn.

Amaryllis spathâ indivisâ, uniflorâ; corollâ bibrâtiâ, sexpartitâ; petalis inferioribus, genitalibusque dependentibus. Lhérit. Sert. Angl. pag. 11. — Redoué, Liliac. tab. 4. (Voyez AMARILLIS, n°. 5.)

* * Spathé à plusieurs fleurs.

12. AMARILLIS de la reine. *Amaryllis regina*. Linn.

Amaryllis spathâ subbiflorâ, pedicellis divaricatis; corollis campanulatis, brevè tubulosis, nutantibus; fauce tubi hirsutâ; foliis lanceolatis, patulis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 416. — Redoué, Liliac. tab. 9. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 12.

An amaryllis rosea? Lam. Dict. 1. pag. 122. n°. 6.

Cette espèce est remarquable par la beauté des fleurs d'un rouge-ponceau. Leur corolle est campanulée ; le tube court ; l'orifice barbu ; les divisions ovales, un peu rétrécies à leur base, d'un beau rouge, avec un onglet blanc au milieu & verdâtre sur les bords ; les trois divisions extérieures calleuses à leur sommet ; les filamens redressés ; les antères vacillantes. Les feuilles sont oblongues, lancéolées, toutes radicales, plus longues que les hampes ; celles-ci portent de deux à quatre fleurs.

Cette plante croît aux Antilles. ♀

13. AMARILLIS écarlate. *Amaryllis punicea*.

Amaryllis (equestris), spathâ subbiflorâ; pedicellis erectis, sparsis, brevioribus; tubo filiformi, horizontali; limbo oblique patulo, sursum curvo; fauce pilosâ. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 417. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 33. tab. 69.

Amaryllis dubia. Linn. Amœn. Acad. 8. pag. 254? (Voyez AMARILLIS, n°. 7.)

14. AMARILLIS à fleurs purpurines. *Amaryllis purpurea*. Ait.

Amaryllis spathâ subbiflorâ; corollis erectis; seulis, brevè tubulosis; fauce tubi glabrâ, foliis linearilanceolatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 417.

Amaryllis elata. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 32. tab. 62.

Amaryllis speciosa. Lhérit. Sert. Angl. 12.

Crinum speciosum. Linn. Suppl. 195. — Thunb. Prodr. 59. — Lam. Dict. 2. pag. 190. *

Ses feuilles sont toutes radicales, presque enfiliformes, linéaires-lancéolées, glabres, entières. Les hampes sont droites, nues. La spathe contient ordinairement deux fleurs étalées. La corolle est presque campanulée, redressée, purpurine, d'un rouge de sang, tubuleuse à la base ; glabre à l'orifice, divisée à son limbe en six découpures, dont trois alternes, calleuses, onguiculées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

15. AMARILLIS réticulée. *Amaryllis reticulata*. Ait.

Amaryllis spathâ subbiflorâ; corollis basi tubulosis, nutantibus; fauce tubi glabrâ, seapo compressâ; foliis oblongis, basi attenuatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 417. — Lhérit. Sert. Angl. 12.

Ses hampes sont comprimées, munies à leur base de feuilles oblongues, rétrécies à leur partie intérieure. La spathe ne renferme guère que deux fleurs. La corolle est tubuleuse & inclinée à sa base, glabre à l'orifice de son tube ; ses découpures marquées de lignes transversales, réticulées.

Cette plante croît au Brésil. ♀

16. AMARILLIS de Tartarie. *Amaryllis tatarica*. Pall.

Amaryllis spathâ subbiflorâ; corollis subcampanulatis, profunde sexpartitis; lacinaâ supremâ angustissimâ; inferiore obovatâ, acuminatâ; foliis linearibus, seapo longioribus. Willd. Spec. 2. pag. 54. — Pallas, Itin. 3. Append. n°. 85, t. b. 2. fig. 1. Mita.

Ses feuilles sont linéaires, plus longues que la hampe. Sa spathe ne produit qu'environ dix fleurs. La corolle est légèrement campanulée, profondément divisée en six découpures ; la supérieure très-étroite ; l'inférieure en ovale renversé, acuminée à son sommet ; les étamines plus courtes que la corolle ; trois filamens plus courts.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♀

17. AMARILLIS de Broussonet. *Amaryllis broussonetii*. Decand.

Amaryllis spathâ biflorâ, corollâ tubo longo, fauce glabrâ, laciniis medio fasciatis. Decand. Liliac. tab. 62.

Ses bulbes, épaisses, arrondies, produisent plusieurs feuilles linéaires-oblongues, canaliculées, d'abord planes, puis plissées & ondulées. Sa hampe est comprimée, un peu rougeâtre ; la spathe com-

posées de deux folioles opposées, lancéolées, obtuses, fluides de lignes purpurines. Elles produisent ordinairement deux fleurs pédonculées, qui ont quelques rapports avec celles de l'amarillis rayée, par les bandes purpurines qui les décorent. Le tube de la corolle est droit, cylindrique, verdâtre à sa base, fort long, glabre à son orifice; le limbe un peu incliné, à six découpures profondes, ovalis-oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités; les étamines un peu inclinées. L'ovaire, adhérent avec la corolle, est presque triangulaire; le style terminé par trois stigmates étalés, de couleur purpurine.

Cette plante croît en Afrique, aux environs de Sierra-Leona; elle a été envoyée par M. Broussonet à M. Cels, &c.

18. *AMARILLIS belledame. Amaryllis belladonna. Ait.*

Amaryllis corollis erectisculis, hexapetalis; laciniis planis, seapo compresso; foliis acutis canaliculatis, obtusis carinatis, glaberrimis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 417. — Lhérit. Sert. Angl. 12. — Linn. Hort. Cliff. art. 135. — Mill. Dict. n. 6, &c. Icon. tab. 23.

Lilio-narcissus polyanthus, flore incarnato, fundo ex luteo-albescente. Sloan, Jam. 115. Hill. 1. pag. 241. — Sebas. Thef. 1. pag. 25. tab. 17. fig. 1.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec l'*amarillis punicea*. Ses bulbes sont verdâtres; ses hampes légèrement comprimées; ses feuilles très-glabres, canaliculées, aiguës à leur sommet, faillantes sur le dos en une carène obtuse. Ses fleurs sortent d'une spathe biffée, algue, membraneuse; elles sont au nombre de trois ou quatre en forme d'ombelle, pédonculées. La corolle est régulière, campanulée, d'une belle couleur pourpre, incarnate, d'un jaune-verdâtre ou blanchâtre dans le fond; les trois découpures extérieures recourbées en dedans à leur sommet; les trois intérieures ciliées à leur base; les étamines inclinées, plus courtes que la corolle; les anthères d'un jaune-clair, épaisses, obtuses à leurs deux extrémités, le style rougeâtre.

Cette plante croît en Amérique, aux Antilles, à Surinam. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. &c. (V. v.)

19. *AMARILLIS à bandes. Amaryllis vittata. Lhérit.*

Amaryllis spathâ multiflorâ; floribus pedunculatis, subhexapetalis; petalis exterioribus margine liberis. Lhérit. Sert. Angl. 13. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 418. — Curtis, Magaz. 129. — Redouté, Liliac. tab. 10.

Cette espèce, remarquable par la couleur de ses

pétales, d'un rouge-pourpre dans leur milieu, avec deux bandes d'un blanc-jaunâtre à leurs bords. Ses hampes sont cylindriques, terminées par des fleurs pédicellées; les divisions de la corolle lancéolées, aiguës, presque acuménées; les trois intérieures réunies en tube, &c. adhérentes à leur partie inférieure; les extérieures libres jusqu'à leur base; les étamines un peu plus courtes que la corolle; les anthères d'un vert-jaunâtre, épaisses, obtuses à trois filaments un peu plus courts; le pistil plus long que les étamines; le stigmate à trois divisions recourbées en dehors, filonnées en dedans.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. &c. (V. v.)

20. *AMARILLIS à faucille. Amaryllis falcata. Lhérit.*

Amaryllis floribus umbellatis, longius pedunculatis, sexpartitis; foliis falcatis; margine cartilagineo, muricato, difforme. Lhérit. Sert. Angl. 13. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 418.

Crinum falcatum, Jacq. Hort. 3. p. 34. tab. 60.

Hamanthus falcatus. Thunb. Prodr. 58.

Ses hampes sont glabres, comprimées, de la longueur de l'ombelle qui les termine; les feuilles planes, étalées sur la terre, courbées en faucille, glabres, linéaires, rugées, cartilagineuses &c. presque dentées à leurs bords. Les fleurs sont longuement pédonculées; la corolle droite, à six divisions profondes, lancéolées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. &c.

21. *AMARILLIS carmin. Amaryllis miniata. Ruiz & Pav.*

Amaryllis spathâ bi seu quadriflorâ, corollis campanulatis, ringentibus; laciniis supremâ retroflexâ, infimâ angustiori; genitalibus decumbentibus. Ruiz & Pav. Fior. peruv. pag. 57.

Ses bulbes sont grosses, ovales, arrondies. Dès qu'elles sont exposées à l'air, elles deviennent d'un rouge-carmin; il en sort des feuilles glabres, enfiliformes, recourbées à leur sommet. La spathe est de couleur pourpre, à deux ou quatre fleurs, se divisant en autant de découpures inégales, oblongues, lancéolées, aiguës. Les fleurs sont grandes, pédonculées, inclinées; la corolle de couleur incarnate, longue de trois pouces; le tube court; le limbe campanulé, à six découpures étalées, lancéolées, oblongues; six écailles blanchâtres, à poils soyeux, placées au fond de l'orifice de la corolle; les filaments de la longueur du style, courbés à leur sommet; trois atermes plus courtes; le stigmate à trois lobes.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes. 7

22. AMARILLIS bicolor. *Amaryllis bicolor*. Ruiz & Pav.

Amaryllis spathâ 6-12 florâ, corollis subcampanulatis, rubris, apice viridiflavis; nectariis bicoloribus. Ruiz & Pav. Flot. peruv. vol. 3. pag. 57.

Ses hampes sont droites, à deux angles; ses feuilles érigées, rectilignes, étalées. La spathe contient six à douze fleurs; elle se divise en autant de découpures inégales, membraneuses, filices. La corolle est presque campanulée, longue d'un pouce & demi; son tube court; son limbe à six découpures droites, lancéolées, rouges, vertes à leur sommet; les filaments droits, plus courts que la corolle; la capsule brune & trigone; les semences noires.

Cette plante croît au Pérou, sur les collines. 7

23. AMARILLIS élégante. *Amaryllis ornata*. Aiton.

Amaryllis floribus sessilibus, corollis basi tubulosis; tubo spathe limboque longiore, curvo & limbi laciniis oblongis, aristatis; laciniâ infimâ divaricatâ, concava. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 418.

Cette espèce se distingue par ses fleurs sessiles. Sa corolle est tubuleuse à la base; le tube recourbé, plus long que les spathe & le limbe; celui-ci divisé en six découpures oblongues, terminées par une longue pointe; la découpure inférieure concave, écartée. Elle croît en Guinée. 7 (Aiton.)

24. AMARILLIS à longues feuilles. *Amaryllis longifolia*. Linn.

Amaryllis floribus umbellatis, pedunculatis, basi tubulosis, sexpartitis; foliis scapo duplâ longioribus. L'héritier, Sert. Angl. 13. (Voyez AMARILLIS, n°. 10.)

25. AMARILLIS de montagne. *Amaryllis montana*. Labill.

Amaryllis corollis campanulatis, aequalibus; laciniis alternis, aristatis; genitalibus rectis, corollâ duplâ brevioribus; scapo foliis scapo duplâ longioribus. Willd. Spec. 2. pag. 56. — Labill. Syst. 2. pag. 5, tab. 1.

Ses tiges sont droites, un peu flexueuses, souvent rameuses, garnies de feuilles longues, alternes, étroites, linéaires, tubuleuses, vaginales & membraneuses à leur base; les fleurs terminales, paniculées, presque en ombelle; la spathe divisée ordinairement en autant de folioles qu'il y a de fleurs; la corolle bleuâtre, à six découpures égales, profondes; trois alternes; uncinées; les

autres obtuses; les filaments droits, insérés sur les onglets de la corolle; trois plus courts; les anthères oblongues, à quatre sillons; l'ovaire inférieur turbiné; le style plus long que les étamines; trois stigmates recourbés; une capsule ovale-oblongue, à trois loges, à trois valves, renfermant plusieurs semences ovales oblongues, noires.

Cette plante a été découverte par M. Labillardière, sur les hautes montagnes du Liban. 7 (V. f.)

26. AMARILLIS rayée. *Amaryllis lineata*. Lam.

Amaryllis (zeylanica), spathe multiflorâ, corollis reclinois; tubo filiformi, longissimo; laciniis ancistatis. L'hérit. Sert. Angl. 13. (Voyez AMARILLIS, n°. 13.)

27. AMARILLIS réfléchie. *Amaryllis revoluta*. L'hérit.

Amaryllis spathe multiflorâ, corollis breviter pedicellatis, basi tubulosis, reclinois; laciniis corollâ revolutis, foliis linearibus. L'hérit. Sert. Angl. 14. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 419.

Ses tiges sont longues d'un pied; ses feuilles longues de deux, larges de six lignes, molles, linéaires, canaliculées. Les fleurs sont très-odorantes; réunies cinq à six en ombelle, médiocrement pédicellées; le tube de la corolle court, filiforme, verdâtre, courbé; les découpures du limbe longues de deux pouces, blanches en dedans, d'un rouge-clair en dehors, réfléchies depuis leur milieu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7

28. AMARILLIS vivipare. *Amaryllis vivipara*. Lam. (Voyez n°. 14.)

Quelques auteurs pensent que cette plante est la même que l'amarillis rayée. Gærtner en a fait un genre particulier, sous le nom de bulbine. De Fruct. & Sem. 1, pag. 41, tab. 13.

29. AMARILLIS à feuilles larges. *Amaryllis latifolia*. Lam.

Amaryllis spathe multiflorâ, floribus pedicellatis, basi tubulosis; foliis oblongo-lanceolatis. L'héritier, Sert. Angl. 14. — Radd. Elyf. 2. pag. 91. fig. 12. (Voyez AMARILLIS, n°. 15.)

30. AMARILLIS jaune d'or. *Amaryllis aurea*. L'hérit.

Amaryllis spathe multiflorâ; corollis basi tubulosis, sexpartitis; laciniis linearibus, undulatis; genitalibus corollâ longioribus. L'hérit. Sert. Angl. 14. — Redout. Liliac. tab. 61. — Ait. Hort. Kew. 1.

pag. 419. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 38. tab. 73.

An Amarillis africana? Lam. Dict. 1. pag. 124. n° 17.

Ses hampes sont légèrement comprimées, presque longues de deux pieds; ses feuilles droites, linéaires, canaliculées, glabres, réfléchies à leurs bords, longues d'un pied & demi, à peine larges d'un pouce; la spathe divisée en deux folioles lancéolées, longues de trois pouces, contenant cinq à neuf fleurs, soutenues par des pédicelles inégaux, longs d'environ un pouce, accompagnés à leur base d'une bractée de même longueur, membraneuse, lancéolée. La corolle est jaune, en entonnoir; le tube trigone, d'un demi-pouce de long; le limbe à six découpures linéaires-lancéolées, épaissies à leur sommet, verdâtres sur leur carène; les filaments droits, inférés à l'orifice du tube; trois plus longs que la corolle; trois autres plus courts, soutenant des anthères linéaires, oblongues; l'ovaire ovale, à trois faces peu marquées; le style droit, filiforme, plus long que les étamines; le stigmate rouge, à trois lobes.

Cette plante croît en Chine. ✕ (Aiton.)

31. AMARILLIS orientale. *Amaryllis orientalis*, Linn.

Amaryllis umbellâ multiflorâ; floribus longissimè pedunculatis, sexpartitis; germinibus cuneiformi-triangularibus. L'hérit. Sert. Angl. 14. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 420. (Voyez AMARILLIS, n° 11.)

32. AMARILLIS grenobienne. *Amaryllis farnesii*, Linn.

Amaryllis spathâ multiflorâ, corollis subhexapetalis, linearis-lanceolatis; genitalibus rectiusculis, exsertis. L'hérit. Sert. Angl. 15. — Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 420.

Amaryllis spathâ multiflorâ; corollis potentissimis, apice reflexis; genitalibus rectiusculis, corollâ longioribus; foliis cuneiformi-linearibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 34. tab. 66. (Voyez AMARILLIS, n° 9.)

33. AMARILLIS bordée. *Amaryllis marginata*, Jacq.

Amaryllis petalis oblongis, revolutis; genitalibus rectiusculis, corollâ longioribus; foliis singulatis, hemi appressis, cartilagineo-marginatis. Willd. Spec. 2. pag. 59. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 34. tab. 65.

Ses feuilles ont beaucoup de ressemblance avec celles de l'*Amanthus coccineus*; elles sont étalées sur la terre, oblongues, en forme de langue, entourées d'une bordure cartilagineuse & colorée, ondulée vers le sommet. La spathe produit plu-

sieurs fleurs d'un beau rouge vif, soutenues par des pédoncules redressés. La corolle est très-étalée, divisée en six découpures profondes, oblongues, réfléchies en dehors à leur sommet; les étamines redressées, plus longues que la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

34. AMARILLIS fothergill. *Amaryllis fothergillii*, Andr.

Amaryllis spathâ multiflorâ; corollâ hexapetalâ, revolutâ; genitalibus erectis; foliis linearibus, subcanaliculatis, abtusis, glaucis. Andr. Bot. Depos. tab. 163.

Ses bulbes produisent plusieurs feuilles linéaires, légèrement canaliculées, glauques, obtuses à leur sommet. Les hampes se terminent par plusieurs fleurs sortant d'une spathe biffée. La corolle est droite, très-ouverte, divisée en six découpures profondes, réfléchies en dehors. Les étamines sont droites, ainsi que le style.

Cette plante croît en Chine. ✕

35. AMARILLIS à feuilles recourbées. *Amaryllis curvifolia*, Jacq.

Amaryllis petalis oblongis, undulatis, revolutis; genitalibus corollâ longioribus, rectiusculis; foliis stridis, lineariformibus, canaliculatis. Willd. Spec. 2. pag. 57. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 33. tab. 64.

Ses feuilles sont roides, linéaires, presque en lame d'épée, canaliculées, courbées en faucille. La spathe produit plusieurs fleurs pédonculées; les pédoncules redressés; la corolle divisée en six découpures profondes, oblongues, ondulées, réfléchies en dehors; les étamines redressées, plus longues que la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

36. AMARILLIS ondulée. *Amaryllis undulata*, Linn.

Amaryllis spathâ multiflorâ, corollis subhexapetalis, linearibus, canaliculatis, undulatis; genitalibus deflexis, corollâ brevioribus. L'hérit. Sert. Angl. 16. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 420. — Jacq. Hort. 3. pag. 11. tab. 13. (Voyez AMARILLIS, n° 8.)

37. AMARILLIS radiée. *Amaryllis radiata*, L'hérit.

Amaryllis spathâ multiflorâ, corollis subhexapetalis, linearibus, undulatis, revolutis; genitalibus deflexis, divergentibus, corollâ duplâ longioribus. L'hérit. Sert. Angl. 16. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 421. — Andrew, Depos. tab. 95.

Lilio-narcissus

Lilio-narcissus quintus, Sillig. Aves. tab. 35.

La spathe produit plusieurs fleurs, dont la corolle est divisée en six découpures linéaires, lancéolées, ondulées, réfléchies en dehors. Les étamines sont divergentes, rabattues, du double plus longues que la corolle. Son lieu natal n'est pas connu. ✕

38. AMARILLIS basse. *Amaryllis humilis*, Jacq.

Amaryllis fœpis paucifloris; petalis patentibus, infimo divaricato; foliis linearibus, obtusis, planis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 36. tab. 69.

Ses tiges sont peu élevées; ses feuilles courtes, planes, glabres, linéaires, nues, très-lisses, obtuses à leur sommet. Les spathe ne produisent que trois ou quatre fleurs. La corolle est très-étalée, divisée en six découpures lancéolées, ouvertes presque en lèvres, réfléchies & ondulées à leur sommet; la découpure inférieure divariquée; les filaments des étamines ascendants, plus courts que la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

39. AMARILLIS flexueuse. *Amaryllis flexuosa*, Jacq.

Amaryllis spathâ multiflorâ, petalis patentibus, infimo divaricato; foliis linearibus, punctatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 35. tab. 67.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle en diffère par ses tiges & ses feuilles une fois plus grandes, & par quelques autres caractères qui lui sont particuliers. Les feuilles sont linéaires, concaves, à peine obtuses, couvertes, dans leur jeunesse, de pustules blanchâtres, ponctuées dans un âge plus avancé: ces points deviennent insensibles par la dessiccation. Il sort plusieurs fleurs de la spathe. La corolle se divise en six découpures lancéolées, étalées, ondulées & réfléchies à leur sommet; la découpure inférieure plus écartée; les étamines ascendantes, plus courtes que les pétales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

40. AMARILLIS ratissoire. *Amaryllis radula*, Jacq.

Amaryllis spathâ multiflorâ, petalis patentissimis, infimo divaricato; foliis facie ad oras mucato-asperis, prostratis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 36. tab. 70.

Ses bulbes produisent des feuilles elliptiques, étalées sur la terre, rudes & couvertes de pustules à leurs bords. Les hampes portent plusieurs fleurs terminales. La corolle est très-étalée, divisée en

Botanique. Supplément. Tome I.

six découpures planes, lancéolées; l'intérieure écartée; les étamines ascendantes, de la longueur de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

41. AMARILLIS nerveuse. *Amaryllis nervosa*.

Amaryllis (tristis), spathâ multiflorâ; corollis campanulatis, aequalibus, apice reflexis; foliis subovatis, dorso striatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 36. tab. 70.

Ses feuilles sont elliptiques, un peu ovales, redressées, striées sur leur dos, bordées à leur contour. La spathe produit plusieurs fleurs dont la corolle est campanulée, à peine tubulée à la partie inférieure, divisée en six découpures planes, réfléchies à leur sommet. Les étamines sont ascendantes, de la longueur de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

42. AMARILLIS crépue. *Amaryllis crispâ*, Jacq.

Amaryllis spathâ pauciflorâ; petalis patentissimis, crispis; foliis linearibus, angustissimis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 37. tab. 72.

Ses feuilles sont étalées, étroites, linéaires, presque filiformes. La hampe ne supporte qu'un petit nombre de fleurs, les plus petites de ce genre. La corolle est divisée en six découpures très-ouvertes, oblongues, obtuses, ondulées. Les étamines sont étalées, plus courtes que la corolle; le style droit.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

43. AMARILLIS étoilée. *Amaryllis stellaria*, Jacq.

Amaryllis spathâ multiflorâ; petalis patentissimis, tribus alternis infra medium barbatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 37. tab. 71.

Il sort de ses bulbes plusieurs feuilles linéaires, redressées. Sa hampe se termine par plusieurs fleurs, dont le tube est très-court; les divisions du limbe planes, très-étalées, presque ouvertes en étoile; les étamines plus courtes que la corolle; les filaments étalés, inégaux; le style droit.

AMASONIA. (Voyez AMASONE & TALGALE.)

AMBAIBA. Marcgr. (Voyez COULEQUIN. Cécropia.)

AMBARVATE, AMBREVATE, AMBARVATSI, VOTREVATE; noms sous lesquels

habitans de Madagascar connoissent le *Cytisus cajan* Linn. (voyez CYTISE, n°. 12.), & que les colons des îles de France ont changé en *ambrevades*. Dans la langue malgache, ce mot désigne aussi le mois de juillet. « Il doit paroître singulier, dit M. du Petit-Thouars, de lui trouver deux significations aussi éloignées ; mais en remontant au sens précis de ce mot, on en trouve la raison ; car ces peuples, ainsi que beaucoup d'autres que nous regardons comme sauvages, ont beaucoup de justesse & de logique dans leur langue. Ce nom est composé de deux mots, *ambar*, qui, dans quelque canton, signifie pluie ou eau élevée, & de *vate* ou *vato*, p. t. r. e. s. ce qui exorime très-précisément la grêle, mot à mot *pluie de pierre*. Comme, dans la partie du sud de Madagascar, au fort Dauphin, les habitans sont souvent témoins, dans la saison de l'hiver, en juillet surtout, de ce phénomène, ils ont désigné ce mois par ce mot. D'un autre côté, ils ont comparé les graines du *cajan* aux grains mêmes de la grêle, ce qui est devenu son surnom ; car son vrai nom est *ang foutri*. Ces graines, accommodées fort simplement, sont dans quelques cantons, surtout en tems de disette, une principale partie de la nourriture des habitans. Dans certains cantons de l'intérieur, on élève sur cet arbuste une chenille vivante en société, qui produit une belle soie. Il seroit à désirer qu'elle fût plus connue. » (*Petit-Thouars*.)

AMBAVILLE. (Voyez MILLEPERTUIS lan-
céolé, n°. 3.)

AMBEL : espèce de nénuphar de l'Inde (*Nymphaea lotus* Linn.), qui croit abondamment dans les rizières. C'est la même que Prosper Alpin a observée en Egypte, & qu'il croit être le *lotus* des Egyptiens, figuré sur leurs monumens. Cette assertion, confirmée par M. Delile, a été depuis combattue par M. Neéoux dans un Mémoire présenté à l'Institut. (Juss.)

AMBELANIA. (Voyez AMBELANIER.)

AMBELANIER acide. *Ambelania acida*. (Voyez Illustr. Gen. tab. 169.)

AMBLYODE. *Amblyodum*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des mousses, établi par M. Pallisot-Beauvois, qui se compose de plusieurs espèces de *mnium* & de *bryum* Linn., & de *mespha* d'Hedwig & de Bridel. Son principal caractère consiste dans :

Un opercule court, conique, obtus ; seize dents courtes & obtuses ; cils libres ou réunis par des fibres transversales & comme réticulées ; l'urne ovale, oblongue, un peu oblique & arquée ; tube long & droit ; point de périche.

Ce sont des plantes terrestres, dont les riges

sont simples ou presque simples ; les feuilles frangées ; les fleurs terminales ou presque latérales. « Ce genre, dit M. Pallisot-Beauvois, ne me paroît pas définitivement établi. Les dents obtuses sont-elles effectivement des dents ou l'urne frangée ? Les espèces dont les cils sont libres ne doivent-elles pas être d'un genre différent de celles qui les ont réticulés ? Les principales espèces rapportées à ce genre sont :

1°. *Amblyodum dealbatum*. (*Bryum dealbatum*. Dickf. Fasc. 2. tab. 5. fig. 3. — *Mespha dealbata*. Hedw. Op. Port. tab. 41. fig. 6.)

2°. *Amblyodum longisetum*. (*Mnium trigetum*. Linn. — *Mespha longifeta*. Brid. — Hedw. Musc. Frond. 1. tab. 21. 22.)

3°. *Amblyodum minus*. (*Mespha minor*. Bridel, Musc. 4. tab. 2. fig. 13.)

4°. *Amblyodum hygium*. (*Mespha hygia*. Brid. — *Cinclidium hygium*. Swartz.)

5°. *Amblyodum uliginosum*. (*Bryum trichodes*. Linn. — Dickf. — Linn. Det. — *Mnium uliginosum*. Gmel. — *Mnium trichodes*. Hnflin. — *Bryum*. Hill. Musc. tab. 49. fig. 58. — *Mespha uliginosa*. Swartz. — Brid. — Hedw. Musc. Frond. 1. tab. 1. 2.) (Voyez MASSIE, Suppl.)

AMBORA. (Voyez TAMBOUL.)

AMBRETTE. (Voyez CENTAURÉE musquée & KETMIE musquée.)

AMBOISIE. (Voyez ANSERINE, n°. 10.)

AMBROMA. (Voyez AMBROME.)

AMBROME à feuilles anguleuses. *Ambroma angulosa*. Ill. tab. 636-637.

AMBROSIA. (Voyez AMBROSIE.)

AMBROSIE. *Ambrosia*. Quelques nouvelles espèces, originaires de l'Amérique, ont été ajoutées à ce genre.

1. AMBROSIE à feuilles entières. *Ambrosia integrifolia*. Willd.

Ambrosia foliis ovatis, sessilibus, acuminatis, serratis, basi ciliatis. Willd. Spec. 4. pag. 375. — Mühlent. in Litr.

Ses riges sont herbacées, garnies de feuilles opposées, sessiles, longues de trois pouces, larges d'un pouce & demi, ovales, entières, dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, hispides à leurs deux faces, munies de longs cils vers leur base. Les grappes sont terminales, ordinairement au nombre de trois.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ○ (Willd.)

2. AMBROSIE bidenté. *Ambrosia bidentata*. Mich.

Ambrosia hirsutissima, foliis aridis sessilibus, simplicibus, oblongis, supra basin laevem utrinque unidentatis, fructu tetragono, infra apicem quadrifido. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 182.

Ses tiges, ainsi que toute la plante, sont hérissées de poils roides; les feuilles simples, sessiles, oblongues, munies, un peu au dessus de leur base, d'une dent de chaque côté. Les calices des fleurs mâles se prolongent en une pointe plus longue que la fleur. Le fruit est tétragone, armé de quatre épines un peu au dessous de son sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au pays des Illinois. (V. f.)

3. AMBROSIE trifide. *Ambrosia trifida*. Linn. — Lam. Ill. tab. 765. fig. 3. & Dict. o. 1.

♂. *Eadem, foliis simplicibus.*

Cette espèce offre quelques variétés, soit dans le nombre des lobes des feuilles, qui varient de trois à cinq, soit dans l'absence de ces mêmes lobes, plusieurs individus ayant des feuilles entières, quelquefois mélangées avec d'autres feuilles lobées. Les tiges sont plus ou moins hérissées.

4. AMBROSIE paniculée. *Ambrosia paniculata*. Mich.

Ambrosia foliis glabris, bipinnatifidis, summis pinnatifidis; racemis terminalibus, foliis tarsi; ramis frigidissimis. Willden. Spec. 4. pag. 376. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 183.

Iva monophylla. Walter. Carol. 232.

Eadem, foliis simpliciter pinnatifidis.

5. *Ambrosia maxima, inodora, maritima aquatica foliis, tenuiter laciniatis, virginiana*. Pluk. Almag. 27. tab. 10. fig. 5.

Ses tiges se divisent en rameaux nombreux; les supérieurs réunis en panicle, un peu v. las, ainsi que les pétioles. Les feuilles sont glabres, pétioles, presque deux fois ailées, vertes à leurs deux faces; leurs découpures lancéolées. Les épis sont axillaires, latéraux & terminaux; les fruits agrégés, petits, ovales, presque globuleux, à peine épimeux. Les feuilles varient dans leurs divisions; elles sont quelquefois simplement ailées, comme dans la variété 5; d'autres fois, presque trois fois ailées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ○ (V. f.)

5. AMBROSIE à feuilles d'armoïse, n°. 2. *Ambrosia artemisiifolia*. Linn. — Lam. Illustr. tab. 765. fig. 1.

M. de Lamarck a réuni ici, comme variétés, les deux espèces mentionnées dans Linné sous le nom d'*artemisia elatior* & *artemisiifolia*.

6. AMBROSIE maritime, n°. 3. *Ambrosia maritima*.

Elle diffère de la précédente par ses feuilles molles, par ses découpures obtuses, par ses épis presque sessiles. L'*Ambrosia asynanthifolia*, Mich. 2, pag. 183, paroît être très-voisine, & peut être une simple variété de cette espèce.

7. AMBROSIE du Pérou. *Ambrosia peruviana*.

Ambrosia foliis inferioribus bipinnatifidis; intermediis pinnatifidis, summis oblongo-lanceolatis, indivisis; racemis terminalibus, foliatis; caule virgato. Linn. Spec. 4. pag. 377.

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Ses tiges sont hautes d'un pied & demi à deux pieds, redressées, munies à leur base de quelques rameaux effilés, cylindriques, presque glabres, garnies de feuilles molles, vertes, plus pâles en dessous, couvertes à leurs deux faces de poils très-petits; les feuilles inférieures deux fois ailées, assez semblables à celles de la précédente; les intermédiaires simplement pinnatifides à leur partie inférieure; les supérieures longues d'un pouce, très-simples, lancéolées, oblongues, entières, routes pétioles; les épis solitaires & terminaux. On soupçonne cette espèce originaire du Pérou. x

8. AMBROSIE hétérophylle. *Ambrosia heterophylla*. Willd.

Ambrosia foliis caulinis pinnatifidis, subdentatis, petiolatis; ramis summis lanceolatis, sessilibus; petiolis longis ciliatis; racemis terminalibus, foliatis; caule paniculato. Willden. Spec. 4. pag. 378. — Muhlénb. in Lint.

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente; elle en diffère par ses feuilles supérieures sessiles, & par les pétioles ciliés aux feuilles inférieures. Les feuilles caulinaires sont pétioles, pinnatifides, longues d'environ un pouce & demi; les pinnules lancéolées, obtuses, pileuses à leurs deux faces, un peu blanchâtres en dessous; les feuilles des rameaux sessiles; celles du bas munies d'un ou de deux lobes; les supérieures très-entières, oblongues, lancéolées, obtuses, à peine ciliées; les pétioles munis de longs poils.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (Willd.)

Observations. L'*ambrosia arborefcens* Lam. a été réuni à un nouveau genre établi par Cavanilles. (Voyez FRANSERIA, Suppl.)

AMBROSINIA. (Voyez AMBROSINIE.)

1. AMBROSINIE nerveuse. *Ambrosinia Bassii*. Linn.

Ambrosinia foliis ovatis, planis. Willd. Spec. 4. pag. 178. — Lam. III. tab. 737.

2. AMBROSINIE maculée. *Ambrosinia maculata*. Willd.

Ambrosinia foliis maculatis, undulatis. Urt. in Roem. Arch. pag. 70. n°. 31.

Elle diffère de la précédente par ses feuilles maculées & ondulées. Elle croit en Sicile.

Observations. Bassi, directeur du Jardin botanique de Bologne en 1763, dédia ce genre aux frères Barthélemi & Hyacinthe Ambrosini, morts environ un siècle auparavant. Ces deux frères avoient été l'un après l'autre professeurs de botanique à Bologne; ils ont laissé plusieurs ouvrages qui sont absolument oubliés.

AMBULIA. (Voyez AMBULI.)

AMÉLANCHIER. (Voyez ALISIER, n°. 7.)

AMELLE. *Amellus*. On a retranché de ce genre l'*amellus umbellatus*, dont Willdenow a fait celui de *Starkea*. (Voyez ce mot, & pour l'*amellus pedunculatus* Oiteg. voyez BALBISIA, Suppl.)

1. AMELLE lichnite. *Amellus lychniis*. Linn. — Lam. III. tab. 682. fig. 1. — Jacq. Collect. 5. pag. 551. tab. 10. fig. 1.

Verbascina asteroides. Linn. Spec. 1. pag. 902.

2. AMELLE diffuse. *Amellus diffusus*. Forst.

Amellus caule fruticoso, ramosissimo; foliis ob-ovato-lanceolatis, alternis, subulis tomentosis. Willd. Spec. 3. pag. 2214. — Forst. in Comment. Soc. Reg. Gœtt. 9. pag. 39.

Joli arbrisseau, dont les tiges se divisent en un très-grand nombre de rameaux diffus, blanchâtres, cylindriques, pubescents, garnis d'un grand nombre de petites feuilles lancéolées, obtuses, éparées, très-entières, retrécies à leur base, blanches & un peu tomenteuses en dessous. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des petits rameaux supérieurs, rapprochées presque en panicule; leur pédoncule court, coronneux; les écailles calicinales pubescentes, oblongues, imbriquées; les corolles un peu purpurines; les demi-fleurs obtus & entiers à leur sommet.

Cette plante croît au détroit de Magellan. (V. f. in herb. Desfont.)

3. AMELLE annuelle. *Amellus annuus*. Willd.

Amellus caule herbaceo; foliis alternis, linearibus, pilosis; caubnis medio in utroque latere unidentatis. Willd. Spec. 3. pag. 2215.

Amellus (alternifolius), *foliis alternis, linearibus; caulibus supra medium bidentatis, pedunculatis unifloris*. Roth, Catal. Bot. 2. pag. 111.

Toute la plante est hérissée de poils. Ses tiges sont droites, hautes d'un pied, rameuses, cylindriques, garnies de feuilles linéaires, linéaires, alternes, un peu obovées, très-entières; celles des tiges nues dans leur milieu, de chaque côté, d'une dent allongée, lancéolée. Les fleurs sont solitaires, pédonculées à l'extrémité de chaque rameau; les demi-fleurs du la circonférence d'un bieu-foncé. Son lieu natal n'est pas connu. (Willd.)

AMELLUS. (Voyez AMELLE.)

AMENTACÉES. (Voyez JULIFÈRES.)

AMERIMNUM. (Voyez PTÉROCARPE.)

AMÉRIQUE (Plantes de l'). « C'est, dit M. Humboldt, *Traité de la nature*, vol. 1, pag. 60, &c., sous les rayons ardents du soleil de la zone torride que se déploient les formes les plus majestueuses des végétaux. Au lieu de ces lichens & de ces mousses épaisses qui, dans les frimas du Nord, revêtent l'écorce des arbres, sous les tropiques le *cyamidium* & la vanille odorante animent le tronc de l'*anacardium* (l'acajou) & du figuier gigantesque. La verdure fraîche des feuilles du *pothos* contraste avec les fleurs des orchidées, si variées en couleurs. Les *banhania*, les grenadilles grimpanes & les *banisteria* aux fleurs d'un jaune-doré englacent le tronc des arbres des forêts. Des fleurs délicates naissent des racines du *theobroma* (le cacaoier), ainsi que de l'écorce épaisse & rude du *ercentia* (le calebasier) & du *gustavia*. Au milieu de cette abondance de fleurs & de fruits, au milieu de cette végétation si riche & de cette confusion de plantes grimpanes, le naturaliste a souvent de la peine à reconnoître à quelle tige appartiennent les feuilles & les fleurs. Un seul arbre, orné de *paullinia*, de *bignonia* & de *dendrobium*, forme un groupe de végétaux, qui, séparés les uns des autres, couvriraient un espace considérable.

« Dans la zone torride, les plantes sont plus abondantes en fucs, d'une verdure plus fraîche, & parées de feuilles plus grandes & plus brillantes que dans les climats du Nord. Les végétaux qui vivent en société, & qui rendent si monotone

« Les campagnes de l'Europe, manquent presque entièrement dans les régions équatoriales. Des arbres deux fois aussi élevés que nos chênes s'y parent de fleurs aussi grandes & aussi belles que nos lis. Sur les bords ombragés de la rivière de la Magdeleine, dans l'Amérique méridionale, on voit une aristolochie grimpance, dont les fleurs ont quatre pieds de circonférence. Les enfans s'amusent à s'en couvrir la tête.

« La hauteur prodigieuse à laquelle s'élèvent sous les tropiques, non-seulement des montagnes isolées, mais même des contrées entières, & la température froide de cette élévation, procurent aux habitants de la zone torride un coup-d'œil extraordinaire. Outre les groupes de palmiers & de bananiers, ils ont aussi autour d'eux des formes de végétaux qui semblent n'appartenir qu'aux régions du Nord. Des cyprès, des sapins & des chênes, des épine-vinettes & des aulnes qui se rapprochent beaucoup des nôtres, couvrent les cantons montagneux du sud du Mexique, ainsi que la chaîne des Andes, sous l'équateur. Dans ces régions, la nature permet à l'homme de voir, sans quitter le sol natal, toutes les formes de végétaux répandus sur la surface de la terre, & la voûte du ciel, qui se dépeint d'un pôle à l'autre, ne lui cache aucun des mondes resplendissans.

« Ces jouissances natur. Illes, & une infinité d'autres, manquent aux peuples du Nord. Plusieurs constellations & plusieurs formes de végétaux, surtout les plus belles, celles des palmiers & des bananiers, les graminées arborescentes & les *mi-mosa*, dont le feuillage est si finement découpé, leur restent inconnus pour toujours. Les individus languissans que renferment nos foyers chaudes ne peuvent s'offrir qu'une faible image de la majesté de la végétation de la zone torride; mais le perfectionnement de nos langues, la verve brûlante des poètes & l'art imitateur des peintres nous ouvrent une source abondante de dédommagemens. Notre imagination y puise les images vivantes d'une nature exotique. Sous le climat rigoureux du Nord, au milieu de la bruyère déserte, l'homme solitaire peut s'approprier ce que l'on a découvert dans les régions les plus éloignées, & se créer ainsi, dans son intérieur, un monde qui, ouvrage de son génie, est comme lui libre & immortel.

« Qu'il seroit intéressant & instructif pour le peintre de paysages, l'ouvrage qui représenteroit les formes principales des végétaux les plus tropicaux des tropiques, d'abord isolées, puis en contraste les unes avec les autres! Quoi de plus pittoresque que les fougères en arbre, qui au Mexique étendent leurs feuilles d'un tissu léger, au dessus des chênes à feuilles de laurier? Quoi de plus charmant qu'un massif de bananiers ombragé par des bambous?

« Celui qui fait d'un regard embrasser la nature & faire abstraction des phénomènes locaux, voit comme, depuis le pôle jusqu'à l'équateur, à mesure que la chaleur vivifiante augmente, la force organique & la vie augmentent aussi graduellement; mais dans le cours de cet accroissement, des beautés particulières sont réservées à chaque zone: aux climats du tropique, la diversité de formes & la grandeur des végétaux; aux climats du Nord, l'aspect des prairies, & le réveil périodique de la nature aux premiers souffles de l'air printanier. Outre les avantages qui lui sont propres, chaque zone a aussi son caractère. Si l'on reconnoît dans chaque individu organisé une physionomie déterminée, de même on peut distinguer une certaine physionomie naturelle qui convient exclusivement à chaque zone. Si des espèces semblables de plantes, telles que les pins & les chênes, couvrent également les montagnes de la Suède & celles de la partie la plus méridionale du Mexique, cependant, malgré cette correspondance de formes & cette similitude des contours partiels, l'ensemble de leurs groupes présente un caractère entièrement différent.

« C'est de cette variété de caractères & de l'influence du climat que dépendent presque entièrement les dispositions gaies ou sérieuses des hommes. Combien puissamment le ciel de la Grèce n'a-t-il pas agi sur les habitans! Comment les peuples établis dans les belles & heureuses régions qu'enferment l'Oxus, le Tigre & la mer Egée ne se feroient-ils pas élevés les premiers à l'amenité des mœurs & à la délicatesse des sentimens? Nos ancêtres ne rapporteroient-ils pas des mœurs plus douces de ces vallées délicieuses lorsque l'enthousiasme religieux ouvrit tout à coup l'Orient sacré à l'Europe tombée dans la barbarie? Les compositions poétiques des Grecs & les chants rudes des peuples primitifs du Nord doivent presque tout leur caractère à la configuration des animaux & des plantes que voyoit le poète aux vallées qui l'environnoient, à l'air qu'il respirait; & pour rappeler des objets plus rapprochés de nous, qui ne se sent différemment disposé à l'ombre épaisse des hêtres, sur les collines couronnées de sapins épars; enfin, sur la pelouse, où le zéphyre murmure dans les feuilles tremblantes du bouleau? La figure de ces plantes de notre pays rappelle souvent en nous des images gaies, sérieuses ou mélancoliques. L'influence du monde physique sur le moral, cette action réciproque & mystérieuse du matériel & de l'immatériel, donnent à l'étude de la nature, quand on la contemple du point de vue le plus sublime, un attrait particulier encore trop peu connu. On ne peut nier que la masse des plantes ne soit une des principales causes des impressions diverses que nous éprouvons; elles agissent sur notre imagination par leur immobilité & leur grandeur. Leur masse indique leur âge, & c'est dans les végétaux

feuls que s'unit à l'âge l'expression d'une force qui se renouvelle sans cesse.

« La grandeur & le développement des organes dans les plantes dépendent du climat qui les favorise. Dans l'impuissance de peindre complètement les plantes de l'Amérique, nous hasarderons de tracer les caractères des groupes les plus saillans. Nous commencerons par les palmiers.

« Entre tous les végétaux, ils ont la forme la plus élevée & la plus noble : c'est à elle que les peuples ont adjugé le prix de la beauté. Leurs tiges, hautes, élancées, cannelées, quelquefois garnies de piquans, sont terminées par un feuillage luisant, tantôt ailé, tantôt disposé en éventail. Les feuilles font fréquemment frisées, comme celles de quelques graminées. Le tronc lisse atteint souvent une hauteur de cent quatre-vingts pieds. La grandeur & la beauté des palmiers diminuent à mesure qu'ils s'éloignent de l'équateur pour se rapprocher des zones tempérées. Un caractère frappant dans les palmiers, & qui en varie l'aspect très-agréablement, c'est la direction des feuilles. Les folioles sont placées comme les dents d'un peigne, très-ferrées les unes contre les autres, & couvertes d'un parenchyme très-roide : c'est ainsi qu'on les voit dans le cocotier & le dattier, & c'est ce qui produit ces beaux reflets de lumière sur la surface supérieure des feuilles, d'un vert plus frais dans le cocotier, plus mat & comme cendré dans le dattier ; ou bien le feuillage ressemble à celui des roseaux par son tissu composé de fibres minces & souples, & se recourbant sur lui-même. Plus les feuilles sont redressées, plus l'aigle intérieur qu'elles forment par le bas avec l'extrémité supérieure du tronc est aigu, plus la figure de l'arbre a un caractère élevé. Quelle différence d'aspect entre les feuilles pendantes du *palma de caviya* de l'Orénoque, même entre celles du dattier, du cocotier, & entre les blanches du *jagua* & du *pirijao*, qui pointent vers le ciel ! La nature a prodigué toutes les beautés de formes au palmier *jagua*, qui couronne les rochers granitiques des cataraïcs d'Aturès & de Maypures. Leurs tiges, élancées & lisses, atteignent une hauteur de cent soixante à cent soixante-dix pieds ; de sorte que, suivant l'expression de Bernardin de Saint-Pierre, elles s'élèvent en portique au dessus des forêts. Cette cime aérienne contraste d'une manière surprenante avec le feuillage épais des *ceiba*, avec les forêts de lauriers & de mélalomes qui l'entourent. Dans les palmiers à feuilles palmées, le feuillage toujours est souvent posé sur une couche de feuilles desséchées ; ce qui donne à ces végétaux un caractère mélancolique.

« La conformation & la couleur des fruits offrent plus de diversité qu'on ne le croit en Europe. Le *mauritia* porte des fruits semblables à deux œufs, dont l'enveloppe, écaillée, brune & lisse, leur

donne de la ressemblance avec les jeunes pommes de pin. Quelle différence entre l'énorme coco triangulaire, la datte & le petit fruit dur du *cerox* ! Mais aucun fruit de palmier n'égale en beauté celui du *pirija* de San-Fernando de Atabapo & de San-Baltazar ; il est ovale & coloré comme les pêches, moitié en jaune-doré, moitié en rouge-facé. On voit des grappes de ces fruits pendre du haut de la tige d'un palmier majestueux. C'est lorsque la chaleur & l'humidité agissent en même tems, que la végétation des palmiers est la plus vigoureuse, & que les formes sont les plus variées : c'est pourquoi l'Amérique du Sud est la patrie des plus beaux palmiers.

« Dans toutes les parties du Monde, la forme des palmiers se réunit à celle des bananiers. Leur tige, plus basse, mais plus succulente, est presque herbacée, & couronnée de feuilles d'une courbure mince & lâche, avec des nervures délicates & luisantes comme de la soie. Les bosquets de bananiers sont la parure des cantons humides. C'est dans leurs fruits que repose la subsistance de tous les habitans des tropiques ; ils ont accompagné l'homme dès l'enfance de sa civilisation. Si les champs vastes & monotones que couvrent les céréales répandues par la culture dans les contrées septentrionales de la Terre embellissent peu l'aspect de la nature, l'habitant des tropiques au contraire, en s'établissant, multiplie, par les plantations de bananiers, une des formes de végétaux les plus nobles & les plus magnifiques. On trouve dans tous les pays de la zone torride la culture du bananier établie depuis les tems les plus anciens, dont parlent les traditions & les hilloires. Il est certain que les esclaves américains ont porté en Amérique quelques variétés de la banane ; mais il ne l'est pas moins qu'elle étoit cultivée dans le Nouveau-Monde avant l'arrivée de Colomb.

« Les feuilles finement ailées des *mimosa*, des *acacia*, des *gleditsia*, des *tamaris*, &c. sont une forme que les végétaux affectent particulièrement entre les tropiques ; cependant on en trouve ailleurs que dans la zone torride : ils ne manquent pas aux États-Unis d'Amérique, où la végétation est plus variée, plus vigoureuse qu'en Europe, quoiqu'à une latitude semblable. Le bleu-foncé du ciel de la zone torride, qu'on aperçoit à travers leur feuillage délicatement ailé, est d'un effet extrêmement pittoresque.

« Les *cañas* se montrent presque exclusivement en Amérique. Leur forme est tantôt sphérique, tantôt articulée ; tantôt elle s'élève, comme des tuyaux d'orgues, en longues colonnes cannelées. Ce groupe forme, par son extérieur, le contraste le plus frappant avec celui des lilacées & des bananiers ; il fait partie des plantes que Bernardin de Saint-Pierre a si heureusement nommées les *forces végétales des déserts*. Dans les plaines d'immenses d'eau

de l'Amérique du Sud, les animaux, tourmentés par la soif, cherchent le *melocactis*, végétal sphérique à moitié caché dans le sable, enveloppé de piquans redoutables, & dont l'intérieur abonde en sucs rafraîchissans. Les riges de *cactus* en colonne parviennent jusqu'à trente pieds de hauteur, & forment des espèces de candelabres : leur physionomie a une ressemblance frappante avec celle de quelques euphorbes d'Afrique.

« Quand on est habitué à n'observer les *cactus* que dans nos terres chaudes, on est frappé d'étonnement en voyant à quel degré de densité peuvent parvenir les vaisseaux ligneux des vieilles riges de *cactus*. Les naturels de l'Amérique savent que le bois de *cactus* est incorruptible, & qu'il est excellent pour faire des rames & des feuil de porce. Aucune physiologie de plantes ne produit sur un étranger une impression plus extraordinaire que celle que lui fait éprouver une plaine aride, comme celles que l'on voit près de Canana, de Nueva-Barcellona, de Coro & de la province de Jien de Bracamoros, couvertes de nombreuses riges de *cactus* qui s'élèvent comme des colonnes, & se divisent par le haut en forme de candelabres.

« Tantis que les euphorbes forment des *causis* dispersées dans le désert privé de végétation, que les orchidées, sous la zone torride, animent les fentes des rochers les plus sauvages, & les troncs des arbres noircis par l'excès de la chaleur, la forme des vanilles se fait remarquer par des feuilles d'un vert-clair, remplies de suc, & par des fleurs de couleurs panachées, d'une structure singulière. Ces fleurs ressemblent à un insecte ailé ou à cet oiseau si petit qu'arrête le parfum des nectaires. La vie d'un peintre ne suffirait pas pour représenter toutes ces orchidées magnifiques qui ornent les vallées profondément sillonnées des Andes du Pérou.

« Les casuarinées, qu'on ne trouve que dans les Indes & les îles du grand Océan, sont dénuées de feuilles, comme la plupart des *cactus*. Ce sont des arbres dont les branches sont articulées comme celles des prèles; cependant on trouve, dans d'autres parties du Monde, des traces de ce type, plus singulier qu'il n'est beau. L'*equisetum aleuticum* de Plumier, l'*ephedra* du nord de l'Afrique, le *colletia* du Pérou & le *calligonum pallidum* de Sibérie approchent beaucoup de la forme des casuarinées. C'est dans les bananiers que le parenchyme est le plus prolongé : c'est au contraire dans les casuarinées & les arbres résineux, qu'il est le plus rétréci. Les pins, les thuyas, les cyprès, appartiennent à une forme septentrionale qui est peu commune dans la zone torride. Leur verdure continue & toujours fraîche égale les paysages aridifiés par l'hiver, & annonce en même temps aux peuples voisins des pôles, que, lors même que la

neige & les frimats couvrent la terre, la vie intérieure des plantes, semblable au feu de Prométhée, ne s'éteint jamais sur notre planète.

« Les mousses & les lichens dans nos climats septentrionaux, les ardoles sous les tropiques, sont parties aussi bien que les orchidées, & revêtissent les troncs des arbres vieillissans; ils ont des riges charnues & herbacées, des feuilles sagittées, digitées ou alongées, mais toujours avec des veines très-grasses. Les fleurs font renfermées dans des spathe. Ces végétaux appartiennent plutôt au nouveau continent qu'à l'ancien. Le *caladium* & le *pothos* n'habitent que la zone torride. Leur parenchyme prend quelquefois tant d'extension, que la surface des feuilles est percée, comme dans le *dicotylum parvisum*.

« A cette forme des ardoles se joint celle des lianes, d'une vigueur remarquable dans les contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale : telles sont les *paulinia*, les *banisteria*, les *ignonlia*, &c. Notre homme si fertile & nos vignes peuvent nous donner une idée de l'élégance des formes de ces groupes. Sur les bords de l'Orénoque, les branches sans feuilles des *bauhinia* ont souvent quarante pieds de long : quelquefois elles tombent perpendiculairement de la cime élevée des arbres; quelquefois elles font tendues en diagonales d'un arbre à l'autre, comme les cordages d'un navire. Les chats-tigres y grimpent & y descendent avec une adresse admirable.

« La forme roide des aloès bleuâtres contraste avec la forme souple des lianes sarmentueuses, d'un vert franc & léger. Leurs riges, quand ils en ont, sont la plupart sans divisions, à nœuds rapprochés, torces sur elles-mêmes, comme des serpens, & couronnées à leur sommet de feuilles succulentes, charnues, terminées par une longue pointe, & disposées en rayons serrés. Les aloès à riges hautes ne forment pas des groupes, comme les végétaux qui aiment à vivre en société; ils croissent isolés dans des plaines arides, & donnent par-là aux régions du tropique un caractère particulier de mélancolie.

« Une roideur & une immobilité triste caractérisent la forme des aloès. Une légèreté riante & une souplesse mobile distinguent les graminées, & en particulier la physiologie de celles qui sont arborescentes. Les bosquets de bambous forment, dans les deux Indes, des allées ombragées. La riges lisse, souvent recourbée & flottante des graminées des tropiques, surpasse en hauteur celle de nos aulnes & de nos chênes.

« La forme des fougères ne s'ennoblit pas moins que celle des graminées dans les contrées chaudes de la terre. Les fougères arborescentes, souvent hautes de trente-cinq pieds, ressemblent à des palmiers; mais leur tronc est moins élancé,

plus raccourci & très-raboteux. Leur feuillage, plus délicat, d'une texture plus lâche, est transparent, légèrement dentelé sur les bords. Ces fougères gigantesques sont presque exclusivement indigènes de la zone torride; mais elles y préfèrent à l'extrême chaleur, un climat moins ardent. L'abaissement de la température étant une conséquence de l'élévation du sol, on peut considérer comme le séjour principal de ces fougères les montagnes élevées de deux à trois mille pieds au dessus du niveau de la mer. Les fougères à hautes tiges accompagnent, dans l'Amérique méridionale, l'arbre bienfaissant dont l'écorce guérit la fièvre. La présence de ces deux végétaux indique la heureuse région où règne continuellement la douceur du printemps. » (Humb.)

AMETHYSTEA. (Voyez AMÉTHYSTÉE.)

AMÉTHYSTÉE à fleurs bleues. *Amethystea caerulea*. (Voyez III. Gen. tab. 18.)

AMIROLA. Pet. (Voyez LAGUNOA, Suppl.)

AMMANNIA. (Voyez AMMANE.)

AMMANE. *Ammannia*.

1. AMMANE à larges feuilles. *Ammannia latifolia*. Linn.

♂. *Eadem*, floribus solitariis. Lam. III. n°. 1551, & tab. 77. fig. 1.

Ses fleurs, réunies ordinairement au nombre de trois dans chaque aisselle des feuilles, sont quelquefois solitaires.

2. AMMANE pourpre. *Ammannia purpurea*. Lam.

Il me paroît hors de doute que cette plante est la même que l'*ammannia ramiflora*. Linn.

3. AMMANE du Sénégal. *Ammannia senegalensis*. Lam.

Ammannia foliis sessilibus, basi subauriculatis; floribus pedicellatis, aggregatis; calice quadridentato. Lam. III. n°. 1553. tab. 77. fig. 2.

Ses tiges sont glabres, très-rameuses; les rameaux grêles, opposés; les feuilles sessiles, opposées, lancéolées, aiguës, rétrécies & légèrement auriculées à leur base, glabres, très-entières, étroites, longues d'un pouce & plus. Les fleurs petites, pédicellées, réunies au nombre de trois ou quatre dans chaque aisselle des feuilles; leur calice nuni de quatre petites dents très-courtes.

Cette plante croît au Sénégal. ○ (V. f. Comm. *Dupuis*.)

4. AMMANE verticillée. *Ammannia verticillata*. Lam.

Ammannia foliis subsessilibus, lanceolatis; floribus cuneato-verticillatis, sessilibus; calice quadridentato. Lam. III. n°. 1554. tab. 77. fig. 3.

Elle a de grands rapports avec la précédente; mais ses fleurs sont plus nombreuses, sessiles, & comme verticillées autour des rameaux.

5. AMMANE des Indes. *Ammannia indica*. Lam.

Ammannia foliis linearibus, sessilibus, decurrentibus; umbellis axillaribus, brevissimis; calice quadridentato. Lam. III. n°. 1555. tab. 77. fig. 4.

Ammannia baerifera. Linn. — Burm. Ind. tab. 15. fig. 3. — Pluken. tab. 357. fig. 5.?

Ses tiges sont glabres, divisées en rameaux opposés, étalés, garnis de feuilles opposées, sessiles, linéaires, un peu decurrentes, très-entières, glabres, obtuses. Les fleurs sont ramassées dans l'aisselle des feuilles, disposées en ombelles courtes; elles n'ont que quatre étamines, & les capsules paroissent être à une seule loge, avec un placenta central, selon M. de Lamarck.

Elle croît dans les Indes orientales (V. f.)

6. AMMANE foible. *Ammannia debilis*. Ait.

Ammannia foliis lanceolatis, basi attenuatis; caule ramoso; floribus fasciculatis, axillaribus; capsulis bilocularibus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 163.

Ses tiges sont grêles, rameuses; les feuilles glabres, opposées, lancéolées, rétrécies à leur base; les fleurs rassemblées par paquets dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est anguleux; la corolle d'un pourpre-pâle; les filamens plus courts que le calice; les anières ovales, jaunâtres; la capsule ovale, à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○ (Aiton.)

7. AMMANE oëlandrique. *Ammannia oëlandria*. Linn. f.

Ammannia foliis amplexicaulis, linearilanceolatis; floribus petaloides, oëlandria. Lam. III. n°. 1556. — Linn. Suppl. 127.

Ammannia coccinea. Roettb. Progr. 1773. n°. 4.

♂. *Ammannia* (sanguinolenta), foliis sessilibus, linearilanceolatis, basi cordatis; pauciculis brevissimis, multifloris; floribus oëlandria, petaloides. Willden. Spec. 1. pag. 679. — Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 121.

Ses tiges sont droites, très-élevées, lisses, divisées en rameaux étalés, garnies de feuilles opposées,

opposées, sessiles, amplicaulaires, linéaires, lancéolées, lisses à leurs deux faces, très-entières. Les pédoncules sont axillaires, très-courts; ils portent d'une à trois fleurs d'un rouge de sang; les étamines sont au nombre de huit. La variété est beaucoup plus petite dans toutes les parties. Les pédoncules portent deux à trois fleurs dans les aisselles des feuilles inférieures; ils n'en ont qu'un dans les autres.

Cette plante croît dans les Indes orientales, & la variété dans l'Amérique méridionale.

8. AMMANE à tige basse. *Ammania humilis*. Mich.

Ammania humilis, procumbens, foliis lanceolatis, inferius in petiolum angustatis; floribus pentaphoris, solitariis oppositis, aëre sessilibus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 99.

Ammania ramifera, Walt. Flor. carol.

Cette plante a le port de l'*Ammania debilis*; mais les capsules sont divisées en quatre lobes. Ses tiges sont basses, couchées, rameuses; ses feuilles opposées, glabres, lancéolées, rétrécies en pétiole à leur base; les fleurs sessiles, axillaires, opposées, solitaires dans chaque aisselle.

Elle croît à la Caroline, dans les marais.

9. AMMANE à grappes. *Ammania racemosa*. Destont.

Ammania foliis sessilibus, lanceolatis, basi auriculatis; floribus racemoso-paniculatis. (N.)

Espèce remarquable par la disposition de ses fleurs. Ses tiges se divisent en rameaux grêles, nombreux, striés, légèrement rétrécies, garnis de feuilles opposées, sessiles, glabres, entières, lancéolées, aiguës, munies à leur base de deux petites oreillettes arrondies, point prolongées. Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, opposées, un peu paniculées, plus courtes que les feuilles; les pédoncules & les pédicelles presque tétracés; la corolle d'un bleu-vif; les étamines au moins de la longueur de la corolle; les capsules globuleuses, un peu rougeâtres, de moitié plus longues que le calice persistant, à quatre dents.

Cette plante a été recueillie dans les rivières du Delta, par M. Delile. (V. f. in herb. Desfont.)

10. AMMANE rose. *Ammania rosea*.

Ammania foliis linearibus, floralibus minimis; floribus roseis, sessilibus, subsolitariis, parvis. (N.)

C'est une fort petite espèce, dont les tiges sont glabres, tendres, herbacées; les rameaux filiformes, garnis de feuilles sessiles, linéaires, long-

Botanique. Supplément. Tome I.

gues à peine de trois lignes, glabres, entières, un peu aiguës; celles qui accompagnent les fleurs beaucoup plus petites, très-étroites. Les fleurs sont petites, sessiles, solitaires & opposées dans l'aisselle des feuilles; la corolle de couleur rosé-pâle; le fruit globuleux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Desfont.)

AMMI. Il faut ajouter à ce genre :

1. AMMI commun. *Ammi majus*. Linn. — Lam. III. tab. 193. — Gertn. de Fruct. & Sem. tab. 12. fig. 8.

2. AMMI à feuilles glauques. *Ammi glaucifolium*. Willd.

Ammi foliis omnibus multifidis, linearibus; umbellâ patulâ. Villars, Dauph. 2. pag. 592. — Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 137. — Linn. Spec. 349. ? — Guett. Stamp. 2. pag. 433. ?

Daucus petraus, glaucifolius. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 58.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente, & n'en est peut-être qu'une variété, dont elle diffère par ses feuilles inférieures, dont les folioles sont divisées en découpures linéaires, ainsi que les feuilles supérieures, lui ressemblant d'ailleurs dans toutes les autres parties. Elle croît en France, sur les coteaux, dans les prés & les champs. O

3. AMMI divariqué. *Ammi divaricatum*. Walth.

Ammi seminibus striatis, ovatis; caule ramoso, divaricato; umbellarum radiis fibr. flor. Gm. L. Syst. Nat. 1. pag. 474. Sub dauco. — Walther, Flor. carol. pag. 114.

Ses tiges sont droites, roides, glabres, striées, cylindriques, hautes d'un pied; les rameaux très-étalés; les feuilles plusieurs fois ailées, à découpures très-fines, presque capillaires. Les fleurs petites, disposées en ombelles peu garnies; les pédoncules filiformes, lâches; l'involucre pinnatifide, caduc, très-finement découpé; les ombelles à trois fleurs & plus. Les semences font petites, ovales, un peu aiguës, glabres, profondément striées.

Cette plante croît dans la Caroline. (V. f. Comm. Bos.)

4. AMMI capillaire. *Ammi capillaceum*. Mich.

Ammi foliis omnibus capillaceo-multifidis, seminibus glaberrimis; caule pumilo, ab imo ramoso. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 164.

Ses tiges sont peu élevées, rameuses dès leur base, garnies de feuilles ailées, composées de

T c

pinnules à plusieurs divisions capillaires; les involucres pinnatifides, une fois plus courts que les ombelles; les femences glabres.

Cette plante croît dans les champs, à la Caroline. Elle paroît avoir de très-grands rapports avec la précédente. (Mich.)

Observations. Willdenow a rangé le *crithmum pyrenaicum* Linn. parmi les ammi, sous le nom d'*ammi daucifolium*, d'après Scopoli, Carn. n°. 342, tab. 10. M. de Lamarck pense que c'est la même plante que l'*athamantha libanotis* Linn. L'*ammi copticum* Linn. est un véritable *daucus*, ayant des femences hérissées.

AMORPHA. *Amorpha.* Les feuilles des *amorpha* sont parsemées de petites vésicules transparentes comme celles des millepertuis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Les ailes & la carène obliquées, presque nulles; les gouffes courbées en faucille.

ESPÈCES.

1. **AMORPHA faux indigo.** *Amorpha fruticosa*. Linn.

Amorpha foliolis pedicellatis, obtusa; dentibus quatuor colicinis, obtusis; unico acuminato. Poir. in Duham. edit. nov. vol. 3. tab. 36. — Willd. Spec. 3. pag. 970. — Il. Gen. tab. 621.

2. **AMORPHA nain.** *Amorpha pumila*. Mich.

Amorpha (pubescens), humilis, foliolis subsessilibus, mucronatis; calicibus pubescentibus, dentibus acuminatis, forte minore. Poir. in Duham. l. c. — Willd. Spec. 3. pag. 970. & Arb. 17. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 64. — Desfont. Arb. 2. pag. 301.

Amorpha herbacea. Walter. Carol. 179.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, en diffère en ce qu'elle s'élève peu, ses tiges ayant à peine deux ou trois pieds de haut; elle perd ses rameaux tous les ans. Ses feuilles paroissent presque filuleuses, étant garnies, jusqu'à leur base, de folioles à peine pédicellées, pubescentes, ainsi que les rameaux, parsemées de points transparents; la plupart entières & mucronées à leur sommet. Les épis sont plus grêles & plus longs, romment, un peu blanchâtres; les calices pubescens, à cinq dents routes acuminées; la corolle à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît à la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (P. v.)

3. **AMORPHA glabre.** *Amorpha glabra*. Hort. Paris.

Amorpha glabra, foliolis pedicellatis, obtusis; dentibus colicinis omnibus obtusis, brevissimis. (N.)

Cette espèce se distingue des deux précédentes en ce qu'elle est parfaitement glabre dans toutes ses parties. Les tiges sont cylindriques, striées, lisses, presque luisantes; les feuilles alternes, composées de folioles nombreuses, alternes, pédicellées, point ponctuées, très-obtusées à leurs deux extrémités, entières, d'un vert-gai à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées en épis simples, serrés, quelquefois un peu ramifiés à leur base. Le calice est très-pauvre, verdâtre, stérile, à cinq petites dents égales, obtuses; la corolle d'un pourpre foncé, une fois plus longue que le calice.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de Paris, est originaire de l'Amérique septentrionale. h (P. f.)

AMOURETTE. On donne ce nom en Amérique à plusieurs arbrisseaux épineux qui accrochent les passans, tels qu'une espèce de volkammer (*volkammeria aculeata* Linn.), qui est l'amourette de Saint-Christophe; une espèce d'acacia (*mimosa tenuifolia* Linn.), qui est le bois d'amourette; une morelle épineuse, appelée *amourette bâtarde*; une autre espèce du même genre, non épineuse, que son rapport avec la précédente a fait nommer *amourette franche*. La luzerne en arbre (*medicago arborea* Linn.) porte aussi à Cayenne le nom d'*amourette*, peut être à cause de ses gouffes recourbées en crochets. Le même nom est donné à de petites plantes d'une forme élégante, telles qu'une jolie saxifrage (*saxifraga hypnoides* Linn.) cultivée dans les jardins; à une brize (*briza media* Linn.) commune dans les prairies, & à quelques autres graminées du même genre. L'amourette des prés est une lychnide (*lychnis flosculi* Linn.), également abondante dans les prairies. (Juss.)

AMOURIÉ : nom languedocien du murier. On le donne aussi à la ronce des haies, dont le fruit est vulgairement nommé *mûre sauvage*.

AMPA : nom malgache d'une espèce de figuier. « Ce mot, dit M. du Petit-Thouars, paroît générique, & a sûrement une signification dans cette langue. » (Voyez AMPE & AMPALI.)

AMPA. (Voyez AUBERTIA, Suppl. & FAGARIER, n°. 9.)

AMPALATANGH VARI : nom malgache qui signifie pied de singe ou de vari, donné dans l'île de Madagascar, suivant Flacourt, à un arbre assez grand, dont les feuilles sont astringentes; ils sont digités, composés de sept folioles; ce qui leur donne l'apparence d'un pied. On nomme aussi cet arbre *fiou-raven*; ce qui veut dire sept feuilles.

AMPALI. AMPALT. Suivant M. Rochon, c'est un arbre de Madagascar, ayant une feuille ronde qui polit le fer. Il y a plusieurs arbres de ce nom à Madagascar, qui se distinguent par la rudesse de leurs feuilles, tels qu'un figuier, nommé ailleurs *ampelos* ou *ompelous*, &c le mûrier rape (*morus ampalis*, Poir. Encycl.). Celui-ci est cultivé à l'île-de-France, sous le même nom d'*ampali*, par curiosité, à cause de son fruit vert, quoique mûr, & fémblable, pour la forme, à une chenille. C'est le *voa telots* de Flacourt. (*A. P.*)

AMPANA : nom malabar du lontar (*borassus flabelliformis* Linn.), genre de la famille des palmiers.

AMPA THROUTS : nom malgache d'une espèce de *grosia* de Madagascar.

AMPE. Ce nom désigne, dans la langue malgache, d'après M. du Perit-Thouars, une espèce de *tragia* de Madagascar, piquante comme nos orties, & d'autres plantes qui ont la même propriété.

AMPELOPSIS. Mich. (*Voyez VIGNE.*)

AMSONIA. Walther désignoit sous ce nom une plante apocinée de la Caroline, qui, selon la plupart des botanistes, n'est qu'une espèce de *taberne*. Elle se distingue de ses congénères par son stigmate orbiculaire, par ses follicules droites, & non horizontales ni pulpeuses dans leur intérieur, & par ses semences tronquées obliquement. D'ailleurs, les feuilles sont alternes, & les tiges herbacées. Ces caractères suffisent pour en faire un genre distinct de *tabernemontana*, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. (*Voyez TABERNE.*)

AMULI. Ce nom brame a été donné, soit à une gratiole (*gratiola chamadrifolia* Lam.), que Rheed, Hort. Malabar. 9, pag. 165, tab. 85, décrit sous celui de *isera-mangoari*, soit à l'hyssopie de l'Inde, qui est le *ispidum-isera* du même auteur, vol. 12, pag. 71, tab. 36. Ces plantes herbacées ont ensemble quelques légers rapports, & sont toutes deux monopétales; mais la première appartient à la famille des perfonnées, la seconde à celle des primulacées. (*Juss.*)

AMVALLIS : nom brichmane du cheramelier (*cicca disticho* Linn.), qui est le *acli-fouli* décrit & figuré dans Rheed. Hort. Malabar. 3, pag. 57, tab. 47 & 48.

AMUYONG : fruit d'une espèce de cardamome des Philippines.

AMYGDALUS. (*Voyez AMANDIER.*)

AMYRIS. (*Voyez BALSAMIER.*)

ANABASF. *Anabasis.* (*Voyez* mes observations à la suite de l'exposition du caractère des SOUDES, vol. VII, pag. 284.) L'*Anabasis aphylla*, n°. 1, est figurée dans les *Illustrations des Genres*, tab. 182. Pallas fait mention d'une autre espèce très-voisine de celle-ci, dont les tiges sont dépourvues de feuilles, très-simples, point rameuses, ramalées en gazon, articulées, & portant des fleurs aux articulations inférieures. Ces articulations sont échanquées. Il la nomme *anabasis cretacea*, caractérisée ainsi qu'il suit :

ANABASE crétacée. *Anabasis cretacea.* Pall.

Anabasis aphylla, caulibus numerosis, caespitosis, simplicifloris, articulatis, basi floriferis; articulis emarginatis. Willd. Spec. 1, pag. 1318. — Pallas, itin. 1. Append. n°. 109, tab. N.

L'*Anabasis spinosissima* a été reportée aux SOUDES (*salsola echinus*, n°. 35).

ANABASIS. (*Voyez ANABASE.*)

ANACARDE à feuilles longues, n°. 2. *Anacardium longifolium.* Lam. Ill. tab. 208.

Observations. La noix d'acajou, qui avoit été réunie à ce genre, en forme un distinct, mentionné sous le nom d'ACAJOU (*cassivium*).

ANACARDIUM. (*Voyez ANACARDE & ACAJOU.*)

ANACOLUPPA : nom malabar d'une plante rampante, figurée dans le *Hortus malabar.* vol. 10, tab. 47, qui paroît être le *zoponia aoidiflora*, Lam. Ill. 1, pag. 59, auparavant rapportée par Linné au genre *verveine*. Rheed dit que son suc, mêlé avec le poivre en poudre, guérit l'épilepsie, & qu'il est le seul remède connu contre la morsure du serpent *cobra-capella*. (*Juss.*)

ANACYCLE. *Anacyclus.* Ce genre a le port des camomilles (*anthemis* Linn.), dont il ne diffère que par l'absence des demi-fleurs; il se distingue des *corula* par son réceptacle garni de paillettes.

1. **ANACYCLE** de Crète, n°. 1. *Anacyclus creticus.* Linn. — Desfont. Coroll. de Tourn. pag. 48, tab. 37.

2. **ANACYCLE** dorée. *Anacyclus aureus.* Linn. — Lam. Ill. tab. 700, fig. 2.

3. **ANACYCLE** velue. *Anacyclus valentinus.* Linn. — Lam. Ill. tab. 700, fig. 1.

4. **ANACYCLE** d'Alexandrie. *Anacyclus alexandrinus.* Willd.

Anacyclus foliis bipinnatis; foliolis linearibus, planis; caule prostrato; floribus axillaribus, subsessilibus; terminali pedunculato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2173.

Il fort des mêmes racines plusieurs tiges couchées, étalées, longues de trois à quatre pouces, garnies de feuilles pétiolées, deux fois ailées, composées de folioles planes, linéaires, aiguës; les pétioles linéaires, un peu élargis à leur base. Les fleurs sont axillaires, solitaires, à peine pédonculées; la terminale pourvue d'un pédoncule plus allongé. Les calices sont blanchâtres, cotonneux.

Cette plante croît en Égypte, aux environs d'Alexandrie. (Willd.)

Observations. L'*Anacyclus orientalis* Linn. est une plante douteuse, qui paroit devoir être exclue de ce genre, ayant le réceptacle dépourvu de paillettes. M. Perfoon, dans son *Synopsis Plantarum*, a introduit dans ce genre quelques espèces d'*anthesis*, qui ont les semences entourées d'un rebord membraneux.

ANACYCLUS. (Voyez ANACYCLE)

ANAGALLIS. (Voyez MOURON.)

ANAGIRE fétide. *Anagyris fetida*. Linn. — Lam. Ill. tab. 328.

ANAMENIA. Ventenat. (Voyez ADONIDE, Suppl.)

ANANAS. *Bromelia*. On a ajouté à ce genre plusieurs belles espèces, les unes découvertes à la Jamaïque par M. Swartz, les autres au Pérou par MM. Ruiz & Pavon. Avant de les faire connoître, je remarquerai que le *bromelia ananas*, n°. 1, est figuré dans les *Illustrations*, tab. 223, fig. 1, & le *bromelia pinguin*, n°. 4, tab. 223, fig. 2.

8. ANANAS à fleurs d'or. *Bromelia chrysantha*. Jacq.

Bromelia foliis serrato-spinosis; bracteis lanceolatis, densatis; racemo subcomposito, foliis brevioribus; floribus pedunculatis. Willden. Spec. 2. pag. 9. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 28. tab. 55.

Ses racines produisent des feuilles allongées, lancéolées, ciliées, épineuses à leurs bords, mucronées à leur sommet; les fleurs pédonculées, de couleur jaune, réunies en une grappe droite, rameuse à sa base, longue d'un pied, plus comble que les feuilles; les pédoncules glabres, accompagnés de bractées lancéolées, jaunâtres, dentées, persistantes en se desséchant. Les baies sont glabres.

Cette plante croît en Amérique, aux environs de Caracas. H.

9. ANANAS à panicules. *Bromelia paniculigera*. Swartz.

Ananas foliis serrato-spinosis, bracteis lanceolatis, racemo composito, racemulis subdivisis, floribus pedunculatis. Swartz, Prodr. 56, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 585.

Ses feuilles s'élèvent droites des racines; elles sont lancéolées, dentées, épineuses à leurs bords. De leur milieu sort une hampe droite, longue d'un pied & plus, couverte de bractées élargies, lancéolées, alternes, membraneuses, d'un rouge-écarlate, longues de six pouces. Les fleurs sont pédonculées, disposées en une grappe longue de deux pieds, droite, rameuse, paniculée; les rameaux un peu ramifiés, etalés; les pédoncules longs d'un pouce, cylindriques, blanchâtres & tomenteux.

Cette plante croît à la Jamaïque. H. (Swartz)

10. ANANAS à grandes bractées. *Bromelia bracteata*. Swartz.

Bromelia foliis serrato-spinosis, bracteis ovato-lanceolatis, seapo elongato, racemo composito, racemulis subdivisis, floribus sessilibus. Swartz, Prodr. 56, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 585.

Alia americana, arboribus innascent, foliis latis, membranaceis, ad margines spinosis. Hoult. Reliq. pag. 7. tab. 16.

Il fort de ses racines des feuilles longues d'un pied, larges de trois pouces, épaisses, rondes, droites, dentées, épineuses à leurs bords. De leur centre s'élève une hampe un peu plus longue que les feuilles, couverte de bractées élargies, ovales-lancéolées, membraneuses, persistantes, d'un rouge-écarlate, soutenant une grappe longue d'un pied, divisée en rameaux nombreux, étalés, chargés de fleurs sessiles, séparées par de petites bractées subulées. Les trois découpures extérieures de la fleur sont petites, ovales, terminées par une pointe un peu crochue; les trois intérieures lancéolées, obtuses; le stigmate à trois découpures. Le fruit est une baie ovale, couronnée par le calice persistant, à trois lobes, contenant plusieurs semences petites, oblongues, comprimées.

Cette plante croît sur les rochers, à la Jamaïque. H. (Swartz.)

11. ANANAS incarnate. *Bromelia incarnata*. Flor. peruv.

Bromelia foliis serrato-spinosis, obtusis cum acumine; racemo simpliciter, flexuoso; bracteis inferioribus maximis, lanceolatis. Ruiz & Pav. Fl. peruv. 3. pag. 32. tab. 252.

Ses tiges sont droites, cylindriques, noueuses, très-simples, garnies à leur base de feuilles amples, imbriquées, striées, un peu coriaces, glabres, blanchâtres en dessous, épineuses à leurs bords, depuis leur milieu jusqu'au sommet; les inférieures oblongues, obtuses; les supérieures oblongues, ensiformes; les hampe garnies de bractées alternes, lancéolées, obtuses, assez grandes, de couleur écarlate, à demi amplexicaules. Les fleurs sont faibles, éparpillées, de couleur rouge-incarnate, disposées en une grappe terminale; flexueuses, pulvérulentes; les trois divisions extérieures de la corolle lancéolées, très-aiguës, droites; les trois intérieures quatre fois plus longues, lancéolées, aiguës, étalées, d'un pourpre-violet, longues de deux pouces & plus; fixées à la base de chaque division interne; les filamens plus courts que la corolle; les anthères droites, linéaires, à deux loges. L'ovaire est turbiné, tomenteux; le style filiforme, plus long que la corolle, surmonté de trois filamens roulés en spirale. Le fruit est une baie turbinée, de la grosseur d'une olive, pulpeuse, un peu charnue, tomenteuse en dehors, blanchâtre, à trois loges, contenant plusieurs semences brunes, fort petites.

Cette plante croît dans les forêts, sur les montagnes des Andes, où elle fleurit aux mois d'octobre & de septembre. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

12. ANANAS en bourse. *Bromelia sphecelata*. Fior. peruv.

Bromelia foliis ensiformibus, acutissimis, ciliato-aculeatis; spicis axillaribus; conico-truncatis; bracteis medio sphecelatis. Ruiz & Pav. Fior. peruv. 3. pag. 32.

D'une même racine sortent plusieurs individus dépourvus de tiges, & garnis de feuilles toutes radicales, droites, nombreuses, ensiformes, très-aiguës, ciliées, armées à leurs bords d'aiguillons recourbés, très-courts. Les fleurs sont faibles, imbriquées, disposées en épis axillaires, solitaires, coniques, tronqués, munis de bractées lancéolées ou linéaires-lancéolées. La corolle est purpurine; les trois découpures extérieures à demi lancéolées, droites, aiguës, concaves; les intérieures d'égale longueur, droites, purpurines, lancéolées; les écailles à peine sensibles; les filamens de la longueur de la corolle, subulés, un peu comprimés; les anthères linéaires, un peu bifides à leur base; l'ovaire cunéiforme; le style trigone, de la longueur des étamines; trois stigmates aiguës. Il leur succède une baie à trois loges, cunéiforme, contenant plusieurs semences brunes, oblongues.

Cette plante croît au Chili, dans les lieux humides & ombragés. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

13. ANANAS bicolor. *Bromelia bicolor*. Fior. peruv.

Bromelia foliis ensiformibus, ciliato-aculeatis; interioribus panicatis; floribus aggregato-conicis; bracteis oblongis. Ruiz & Pav. Fior. peruv. vol. 3. pag. 33.

Ses feuilles, toutes radicales, sont ensiformes, étalées, ouvertes en étoile, parsemées d'un duvet blanchâtre, tomenteux; les intérieures rouges, ciliées & munies d'aiguillons à leurs bords. De leur centre s'élève un cône de fleurs aggrégées, accompagnées de bractées imbriquées; les unes oblongues; les autres cunéiformes, ciliées. Les trois divisions extérieures de la corolle sont droites, ovales, persistantes, un peu pulvérulentes; les trois intérieures un peu plus longues, rétrécies à leur base, oblongues, de couleur bleue; deux petites écailles à la base de chacune d'elles; les filamens plus courts que la corolle; les anthères droites, presque sagittées, bleuâtres. Le fruit consiste en une baie trigone, cunéiforme, blanchâtre, à trois loges, renfermant plusieurs semences oblongues, fort petites.

Cette plante croît au Chili, où elle fleurit en avril & en mai. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

ANANTALY-MARAVARA. Nom malabar de l'*epidendrum ovatum* Linn., dont Rhoez donne une bonne figure, vol. 12, tab. 7. Ses fleurs, qui sont très-belles, durent long-temps, & se développent même sur la tige, séparée de la racine, comme cela arrive à plusieurs autres plantes grasses qui, laissant échapper moins de sève par la transpiration insensible, emploient la sève subsistante dans la tige coupée, à la nourriture des fleurs. On suspend dans les appartemens les rameaux prêts à fleurir, & l'on prolonge ainsi sa jouissance sans frais & sans soins. (*Just.*)

ANARRHINE. *Anarrhina*. Desfont. Genre de plantes dicoryllédonées, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des srophiulaires, qui a des rapports avec les muftiers (*antirrhinum* Linn.), dont il est un démembrement; il comprend des herbes, quelquefois des arbrustes, dont les feuilles radicales sont grandes, étalées; les caulinaires étroites, nombreuses; les fleurs petites.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures profondes; une corolle tubuleuse, munie d'un éperon ou d'un renflement faisant à sa base, ouverte à son orifice, sans pulvériser; une capsule arrondie, percée à deux trous à son sommet, s'ouvrant en plusieurs valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, divisé en cinq découpures profondes, plus ou moins inégales.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, rubuleuse, munie d'un éperon à sa base ou quelquefois d'une bosse faillante; l'orifice constamment ouvert; le limbe divisé en deux lèvres inégales; la supérieure droite, à deux lobes obtus; l'inférieure à trois lobes.

3°. Quatre étamines didynames; les filaments subulés, renfermés dans la corolle; les anthères rapprochées.

4°. Un ovaire ovale, libre, surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit est une capsule presque ronde, à deux filons, percée de deux trous à son sommet, à deux loges, s'ouvrant en plusieurs valves, renfermant un grand nombre de semences fort petites.

Observations. Ce genre a été établi par M. Desfontaines dans sa *Flora du mont Atlas*; il diffère de l'*Antirrhinum* & du *Linaria* par son port, par la forme de la corolle, dont l'orifice est ouvert, & dépourvue d'un palais proéminent. Il faut y rapporter l'*Antirrhinum belliaefolium* Linn. & l'*Antirrhinum canadense* Linn., ainsi que les espèces suivantes. (Voyez MUELLER, n°. 50 & 51.)

1. ANARRHINE arbuſte. *Antirrhinum fruticosum*. Desfont.

Antirrhinum frutescens, ramis virgatis, filiformibus; foliis perennantibus, imis spatulatis; racemis interruptis, corollis caudatis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 52. tab. 142.

Arbuſte de trois à quatre pieds, dont les tiges sont droites, rameuses, très-glabres; les rameaux longs, grêles, cylindriques, effilés, anguleux, garnis de feuilles alternes, persistantes, entières, un peu épaisses; les inférieures spatulées, obtuses, décourtes sur le pétiole, munies l'ouverture de quelques dentelures à leurs bords; les supérieures linéaires-lancéolées, étroites, un peu aiguës. Les fleurs sont petites, sessiles ou à peine pédicellées, disposées en un long épi grêle, alongé, terminal, un peu interrompu, accompagnée de bractées petites, oblongues, plus courtes que le calice. Celui-ci est fort petit, à cinq découpures ovales, aiguës, membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, fort petite; la lèvre supérieure courte & biffée; l'inférieure à trois lobes arrondis; le tube oblong, cylindrique, dépourvu d'éperon; les anthères blanches. La capsule est petite, arrondie, légèrement échanquée, à deux loges, s'ouvrant à son sommet par une double ouverture, contenant des semences nombreuses, fort petites, brunes, oblongues, convexes, rudes, ponctuées.

Cette plante a été découverte par M. Desfont-

aines sur le mont Atlas, aux environs de Tlemſen, Maſcar & Caſſa. h (V. f. in herb. Desf.)

2. ANARRHINE pédicée. *Antirrhinum pedatum*. Desfont.

Antirrhinum foliis radicalibus oblongis, serratis, nervosis; caulinis pedatis; foliolis angulo-lanceolatis; floribus hirsutis, racemosis, sessilibus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 51. tab. 141.

Ses tiges sont droites, fermes, presque ligneuses, glabres & cylindriques à leur partie inférieure, rarement simples, plus souvent rameuses à leur partie supérieure. Les rameaux sont droits, grêles, paniculés, hérissés, chargés de fleurs; les feuilles radicalles étalées en rosette, élargies, lancéolées, quelquefois ovales ou elliptiques, aiguës ou obtuses, hérissées, à nervures longitudinales, décourtes sur le pétiole, munies à leurs bords de dentelures inégales, distantes; les feuilles caulinaires glabres, éparſes, nombreuses, profondément divisées en plusieurs folioles inégales, étroites, lancéolées, aiguës, ordinairement entières, quelquefois munies d'une ou de deux dents. Les fleurs sont presque sessiles, disposées en un épi terminal plus ou moins lâche, cylindrique, chargé de bractées velues, lancéolées, très-aiguës, plus longues que les fleurs. Le calice est petit, hérissé, à cinq découpures inégales, subulées, un peu lâches; la corolle blanche, velue, dure & trois fois plus longue que le calice; son limbe à deux lèvres; l'inférieure à trois lobes ovales; celui du milieu plus grand; le tube terminé à sa base par un très-petit éperon grêle, relevé & courbé en arc. L'ovaire est ovale; le stigmate en tête, un peu recourbé; la capsule petite, arrondie.

Cette plante croît sur les collines, aux environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Desfontaines. (V. f. in herb. Desfont.)

3. ANARRHINE à trois nervures. *Antirrhinum duriminum*. Broth.

Antirrhinum foliis radicalibus obovato-lanceolatis, trinerviis, serratis, hirsutis; caulinis tripartitis; lacinia media lato-lanceolata; bracteis imis similibus, summis simplicibus. Broth. Flor. lusit. pag. 199.

D'après une plante que je possède en herbier, recueillie par Broussonnet dans le royaume de Maroc, je suis porté à croire que celle-ci n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Ses feuilles radicalles sont ovales-lancéolées, rétrécies à leur base, velues, dentées en scie à leur contour, marquées de trois nervures longitudinales. Les feuilles caulinaires sont divisées en trois découpures profondes; celle du milieu élargie, lancéolée. Les fleurs sont d'un jaune de toulain, un peu blanchâtres, accompagnées de bractées. Celles

qui accompagnent les fleurs inférieures : les unes sont simples.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales du Portugal, aux lieux humides & stériles. (V. f.)

4. ANARRHINE à feuilles épaisses. *Anarrhinum crassifolium*. Cavan.

Anarrhinum foliis oppositis, ovatis, acutis, glabris; caule ascendente, racemis corymbofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 261.

Antirrhinum (crassifolium), foliis oppositis, ovatis, crassiusculis; limbo reflexo, floribus laxis, spicatis, fauce perispermatis. Cavan. Icon. Rar. 2. p. 11. tab. 114.

Oronium saxatile, thymifolio, flore rubello. Barrel. Icon. Rar. 1315.

Ses tiges sont rameuses, ascendantes, pubescentes à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, ovales, aiguës, entières, un peu épaissies, glabres à leurs deux faces, un peu repliées à leurs bords, assez semblables à celles du serpolet. Les fleurs sont pédonculées, formant des grappes lâches, disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux ; les pédoncules de la longueur des fleurs ; la corolle d'un blanc teint de pourpre, munie d'un éperon.

Cette plante croît sur les fentes des rochers, aux environs de Valence en Espagne. ○

5. ANARRHINE fluette. *Anarrhinum tenellum*. Cavan.

Anarrhinum foliis oppositis, cordato-ovatis, acutis, caule procumbente villosis; pedunculis axillaribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 261.

Anarrhinum (tenellum), caulis procumbentibus, tenuissimis; floribus axillaribus, solitariis; pedunculis folio longioribus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 61. tab. 180. fig. 1.

Cette plante est chargée sur toutes ses parties de poils abondants. Ses tiges sont couchées, rameuses à leur base ; les rameaux étalés, très-floides, velus, chargés de feuilles opposées, ovales, un peu arrondies, légèrement en cœur à leur base, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont blanches, solitaires, axillaires, munies d'un éperon, soutenues par un pédoncule beaucoup plus long que les feuilles. Elle croît sur le sommet des montagnes, aux environs de Valence en Espagne. ○

ANARRHINUM. (Voyez ANARRHINE.)

ANASTATICA. (Voyez JÉROSE.)

ANATOMIE DES PLANTES. L'étude de la

structure & des organes internes des plantes est aussi essentielle pour la connoissance intime des végétaux, qu'elle l'est pour celle des animaux. C'est assez généralement des organes intérieurs que dépendent les formes externes, & ces dernières ne pourraient recevoir d'explication convenable ni être soumises à des principes fixes qu'à l'aide des premiers. Si ces connoissances ne sont pas d'une nécessité absolue pour apprendre à distinguer les plantes les unes des autres, elles le sont pour tous ceux qui ont pour but de les classer dans un ordre méthodique, approchant, le plus possible, de celui de la nature. L'anatomie végétale se borne à la considération de la structure ou composition générale des organes des végétaux ; & si l'on considère ensuite le jeu ou l'action de ces mêmes organes dans les forces vitales, cette nouvelle considération prend le nom de *physiologie végétale*. Quoique ces deux parties laissent encore beaucoup à désirer, elles offrent néanmoins, dans l'état actuel de nos connoissances, des faits très-curieux & d'une grande importance.

Grew & Malpighi (dit M. Desfontaines, dans le rapport fait à l'Institut d'un Mémoire sur l'anatomie végétale de M. Mirbel, & dont je vais présenter l'extrait) sont les premiers qui aient traité de l'anatomie des plantes, & leurs ouvrages sont encore ce que nous avons de plus complet en ce genre. Si les progrès de cette belle partie de la botanique n'ont pas été aussi rapides qu'on eût été en droit de l'espérer d'après les découvertes de ces deux hommes célèbres, il faut cependant avouer qu'elle a fait quelques pas vers la perfection. On doit à Duhamel de belles observations sur les greffes, sur les bourgeons, sur les couches ligneuses. Daubenton a publié des faits intéressants sur les prolongemens médullaires & sur la structure du bois. On a découvert les pores de l'épiderme : les bourgeons ont été beaucoup mieux observés par Rammeau. Cuvier a enrichi la science d'un grand nombre d'observations nouvelles sur l'organisation des fruits, & M. Desfontaines lui-même, qui a la modeste de ne pas se citer, a donné, sur la disposition des couches ligneuses, des observations neuves & de la plus grande importance, d'après lesquelles on distingue très-facilement les plantes monocotylédones de celles à deux cotylédons, & les divise naturellement en deux grandes classes, dont le caractère essentiel est appuyé sur la structure, la disposition & le développement des organes intérieurs ; enfin, M. Mirbel, par une suite de plusieurs Mémoires lus à l'Institut, a aussi contribué à l'avancement de l'anatomie végétale. Il pense, avec raison, qu'elle doit servir de base à la physiologie des plantes, parce qu'il est impossible d'avoir une idée juste des fonctions organiques, sans une connoissance parfaite des organes qui les produisent ; & comme les végétaux ont des rapports très-

marqués dans leur structure. M. Mirbel a cru devoir fixer d'abord son attention sur une seule espèce. Il a choisi le fureau de préférence, parce que son tissu, plus lâche que celui de beaucoup d'autres végétaux, lui a paru plus facile à observer. Après en avoir étudié l'organisation, il a porté comparativement ses recherches sur plusieurs autres plantes de familles différentes.

Le travail de M. Mirbel est partagé en neuf articles. Il traite, 1°. des organes qu'on distingue à l'œil; 2°. du tissu membraneux; 3°. du tissu cellulaire; 4°. du tissu rubané; 5°. des lacunes; 6°. des glandes; 7°. des pores; 8°. de l'épiderme; 9°. enfin, de la substance organisatrice que Duhamel a désignée sous le nom de *cambium*.

Tous les végétaux, à l'exception des varecs & des champignons, dont la substance est homogène, sont composés de parties molles & de parties dures, & leur tige est revêtue d'une écorce plus ou moins épaisse. Cette enveloppe a communément plus de mollesse que le tissu qu'elle entoure, & on peut l'en séparer facilement, surtout dans le tige de la fève. Sous l'écorce se trouve le bois, composé de fibres longitudinales étroitement unies. Dans les monocotylédons, il n'est formé de filets distincts, enveloppés par la moëlle, qui en remplit tous les intervalles. Le bois des dicotylédons, au contraire, est toujours recouvert d'une écorce, & les fibres ne sont ni isolées ni entourées de moëlle. Cette substance est renfermée dans un canal placé au centre du cylindre, & lorsqu'on l'a scié perpendiculairement à l'axe, on voit, sur la coupe des tronçons, un grand nombre de prolongemens disposés comme les rayons d'une roue ou comme les lignes horaires d'un cadran. Ils forment de la moëlle, & n'existent point dans les monocotylédons.

Après cet exposé succint, l'auteur passe à l'examen des organes élémentaires, qui forment les organes visibles à l'œil, dont on vient de parler. Suivant lui, toutes les parties des plantes ne sont qu'un tissu membraneux différemment modifié; & les fibres, même les plus compactes, sont un assemblage de lamelles longitudinales qu'on peut séparer à volonté.

Deux sortes d'organes bien distincts, savoir, le tissu cellulaire & le tissu rubané, sont formés par le tissu membraneux. Le premier, observé au microscope, offre une suite de petites cellules contiguës, composées de membranes qui, en se dédoublant, laissent entr'elles des vides égaux, lorsqu'elles n'éprouvent aucune pression, & qui, soit qu'on les coupe en travers ou dans leur longueur, présentent constamment des formes hexagones, assez semblables aux alvéoles des abeilles. Chaque pan est commun à deux cellules, & tout ce tissu est d'une régularité admirable; mais, s'il

vient à être comprimé par une force étrangère, alors les cellules se déforment, & le changement en parallélogrammes plus ou moins allongés.

Les parois des cellules sont minces & diaphanes comme du verre. Leur tissu est si fin, qu'on ne peut le distinguer, même avec le secours des meilleurs microscopes; mais on y découvre communément une multitude de pores dont il est criblé. Le tissu cellulaire est spongieux, chassé & sa consistance. Plongé dans l'eau pendant quelque temps, il s'altère, se détruit, & se convertit en mucilage. Les pores dont on vient de parler s'établissent une communication entre les cellules, & laissent passer les sucs, dont le mouvement a nécessairement beaucoup de lenteur dans un pareil tissu.

Il est bon d'observer que les cellules ne sont transparentes & sans couleur que quand elles sont dégagées de tout corps étranger. Quelquefois elles sont enduites des sucs visqueux, qui en ternissent l'éclat & la transparence. Ce tissu, commun à tous les végétaux, ne s'y trouve pas toujours en même proportion. Les champignons & les varecs en sont entièrement formés, & l'écorce des autres végétaux en contient beaucoup. Sous l'épiderme, il est peu comprimé, & rempli de sucs ordinairement verts, quelquefois rouges, jaunes & même améthyllés, qui communiquent leurs teintes, du moins en apparence, à cette membrane.

Le tissu cellulaire est charnu dans les racines bulbeuses, ferme & cassant dans les corymbes, aride & sec dans l'albumen (le perispermé) des graines. Celui des feuilles, des bractées, des stipules, des calices est ordinairement gonflé d'un suc vert. Les corolles ne sont que des lames minces du même tissu, & c'est aux sucs colorés, contenus dans ces cellules, qu'elles doivent leur fraîcheur & tout l'éclat dont elles brillent; mais ce tissu est si délicat, que la pression la plus légère suffit pour le ternir ou le détruire. Il entre aussi pour beaucoup dans la structure des étamines & des pistils. Le pollen, qui renferme le fluide subtil & vivifiant qui va porter la vie dans l'embryon, n'est qu'un amas de petites cellules formées par ce tissu.

Les fruits charnus & pulpeux ne sont aussi, suivant Duhamel, qu'un tissu cellulaire très-âlé, & gonflé de sucs de différente nature. L'embryon en est presque entièrement formé; enfin, les rayons médullaires, qui distinguent les plantes à deux feuilles séminales d'avec celles qui n'en ont qu'une, ne sont encore que des prolongemens du même tissu.

Après avoir décrit l'organisation du tissu cellulaire, l'auteur traite de celle des tubes ou vaisseaux des plantes, qu'il divise en deux classes, les grands & les petits.

Les

Les grands tubes ne sont que des ouvertures pratiquées dans la longueur du tissu cellulaire, & formées par l'écartement de ses membranes, ou, pour mieux dire, de véritables lacunes, & l'organisation des végétaux est si simple, que toutes les différences qu'offrent leur structure ne sont que des modifications du tissu cellulaire; mais comme les parois des tubes sont fins cesse abreuvées de fluides nourriciers, elles prennent, avec le tems, de la consistance, & quand leur densité surpasse de beaucoup celle des membranes environnantes, elles se séparent du reste du tissu. M. Mibrel n'a jamais pu découvrir, avec les meilleurs microscopes, de grands tubes dans les champignons, les lichens & les varecs, tandis qu'on peut en distinguer facilement l'ouverture sur la coupe transversale des racines, des tiges & des branches des monocotylédons. Dans ceux-ci, ils occupent le centre des filets ligneux, tandis que ces tubes, dans les dicotylédons, sont répandus dans le bois. On les y voit aussi souvent réunis par groupes placés régulièrement d'espace en espace, ou bien disposés par zones concentriques; ils sont très-nombreux autour du canal médullaire, & on en découvre également dans l'écorce.

Si on suit ces grands tubes dans leur marche, on les voit monter parallèlement de la racine dans le tronc, puis se joindre, se ramifier, se détourner de leur direction verticale, pour pénétrer dans les boutons placés à la surface de l'écorce. Ils s'allongent à mesure que les jeunes pousses se développent, en parcourant tous les rameaux, passent dans les pétioles, suivent les nervures des feuilles, & y forment un réseau extrêmement divisé. On les distingue également dans les calices, dans les pétales, dans les étamines, dans les styles & jusque dans la pulpe des fruits. Ils existent dans l'embryon; & enfin, ce qui est extrêmement remarquable, dans les tiges des prêles ils tiennent lieu de rayons médullaires. L'auteur en distingue de quatre sortes; les tubes simples, les tubes poreux, les fausses trachées & les trachées proprement dites.

Les tubes simples, qu'on connoît généralement sous le nom de *vaisseaux propres*, n'ont ni pores ni fentes à leur surface; ils contiennent des sucs de différente nature & diversément colorés dans un grand nombre de plantes; on les observe facilement dans les pins, les sapins, les euphorbes, les chélidoines, les apocins, &c., & ils sont beaucoup plus larges, plus apparens dans l'écorce que dans le bois.

Les tubes poreux, ainsi nommés parce que leur surface est criblée de pores distribués en séries transversales & parallèles, se trouvent en grande quantité dans le chêne, le sureau, & dans presque tous les bois durs. Ceux-ci ne paroissent pas destinés aussi particulièrement que les précédents, à renfermer des sucs propres.

Botanique. Supplément. Tome I.

Les fausses trachées sont faciles à distinguer par leurs fentes transversales & parallèles, & l'on croiroit au premier coup-d'œil qu'elles sont formées de lames roulées en spirales comme les véritables trachées; mais quand on les observe avec attention, on voit l'union intime des bords de la lame aux deux extrémités de chaque fente, & on ne peut jamais les dérouler. Ces vaisseaux sont de même nature que les précédents, dont ils ne diffèrent que par la grandeur de leurs ouvertures transversales. On les trouve communément dans les bois peu compacts; ils existent aussi dans les monocotylédons, & même dans les plantes herbacées. Les lycopodes, les fougères, les vignes, &c. en renferment une très grande quantité.

Les trachées sont des tubes formés par une petite lame ou filet roulé de droite à gauche, de manière que les circonvolutions se touchent par les bords. Lorsqu'on les tire en sens contraire par les deux extrémités, elles se déroulent en forme de tire-bourre, & se resserrent sensiblement sur elles-mêmes quand on cesse de les allonger, si on en excepte cependant celles du *batusum*, dont les contours ne se rapprochent plus dès qu'une fois ils ont été écartés. Si on veut les voir bien distinctement, il suffit de briser à moitié une jeune pousse de l'année, en pliant doucement les deux extrémités dans un sens opposé; elles ressemblent, à la vue, à des fils d'araignée; mais quand on les observe avec une bonne loupe, on distingue nettement les bords de la spirale qui ont été écartés, & en rapprochant les deux extrémités de la fracture on voit les petites circonvolutions se resserir sur elles-mêmes par un mouvement de ressort. Leur surface est unie ou inégale, & quelquefois poreuse. M. Mibrel assure n'y avoir jamais vu les étranglemens dont Malpighi & Reichel ont parlé.

Dans les monocotylédons elles occupent le centre des filets ligneux; dans les dicotylédons elles entourent la moëlle, & sont souvent mêlées avec de fausses trachées. On ne les trouve pas dans l'écorce; mais elles existent dans les pétioles & les nervures des feuilles. Ces quatre ordres de vaisseaux, qui ne sont que des modifications les uns des autres, se rencontrent souvent réunis dans les mêmes plantes; ce sont eux qui distribuent la nourriture & la vie à toutes les parties du végétal.

Les petits tubes, que l'auteur a pareillement observés & décrits avec soin, ne sont autre chose que des cellules très-longées, d'un diamètre inégal dans leur longueur, & fermés aux deux extrémités. Leurs parois sont souvent criblées de pores; elles ont beaucoup plus de dureté que celles du tissu cellulaire proprement dit. On ne les coupe communément en travers qu'avec assez de difficulté; mais ils se divisent facilement, sui-

V V

vant leur longueur, en filets plus ou moins déliés. Ils entrent dans la formation des couches ligneuses, & la solidité du végétal dépend de leur quantité & de leur densité; ils contiennent des suc plus ou moins épais, & diversément colorés. Dans la vigne ils sont remplis d'eau: ceux des pins & des sapins regorgent de suc résineux, & on ne les observe bien que dans les plantes développées. Certains lichers rameux, ainsi que les tiges des mousses, en sont abondamment pourvus. Dans les monocotylédons ils entourent les grands tubes: ceux des dicotylédons sont placés autour de la moelle & des grands tubes qui environnent cette substance; cependant ces deux ordres de vaisseaux peuvent exister indépendamment les uns des autres. Les fibres qui sillonnent la surface des plantes sont des faisceaux de perites tubus: on les rencontre aussi dans les nervures des feuilles, dans les pétales, les étamines & les pistils; mais ils perdent leur rigidité dans ces organes délicats.

L'auteur a donné le nom de *lacunes* à des cavités régulières & symétriques, formées dans l'intérieur de plusieurs végétaux par le déchirement des membranes. Ces lacunes ne se rencontrent ordinairement que dans les plantes d'un tissu très lâche, telles que les plantes aquatiques, & particulièrement dans les monocotylédons; & suivant M. Mirbel, ces déchirements, loin de nuire au végétal, en augmentent les forces en les concentrant davantage. Les plantes d'un tissu lâche, & particulièrement celles qui vivent dans l'eau, reçoivent une plus grande quantité de suc qu'elles ne peuvent en élaborer, parce que leurs organes ne sont ni assez multipliés ni assez vigoureux relativement à leur volume. Si donc, par des ruptures intérieures, les organes devenus inutiles sont détruits, les organes conservés, recevant seuls toute la nourriture, acquerront une vigueur nouvelle. Les lacunes n'existent point dans l'embryon, parce que ces déchirements sont une véritable désorganisation, qui ne peut avoir lieu que quand la plante a pris de l'accroissement. Les lacunes se trouvent dans les périoles des fougères, dans les potamogetons & une multitude d'autres plantes; elles ressemblent à des tubes longitudinaux, placés çà & là dans le tissu cellulaire. Celles des prêles offrent beaucoup de régularité; celles des feuilles des monocotylédons sont souvent coupées par des cloisons de tissu cellulaire amassé de distance en distance. On voit bien cette singulière conformation à travers les feuilles des massettes & de beaucoup d'autres monocotylédons à feuilles eo épee.

Les plantes ont-elles des glandes analogues à celles des animaux? Cette question n'est pas encore éclaircie. Cependant les suc blancs & corroifs des euphorbes, les suc visqueux qui enluisent les tiges & les feuilles de certains cistes, de plusieurs silènes, les diverses sortes de manne que

produisent le siéne, le méisse, l'alhagi; les résines, les gommes & autres substances analogues; le suc brûlant des orties, de quelques *rugia*, de plusieurs *jatropha*; l'atmosphère inflammable qui entoure la fraxinelle, la gomme élastique de l'*herve* ou caoutchoux; la liqueur acide qui se réunit en gouttelettes à l'extrémité des poils du poichiche; les huiles de différente nature renfermées dans les graines ou dans certains périscarpes; l'opium, substance vénéneuse, filtrée dans les capsules du pavot des jardins, tandis que les graines contiennent une huile douce & salubre; l'huile caustique de la noix d'acajou, dont le noyau est agréable au goût; la qualité délétère des euphorbes, & une infinité d'autres faits semblables, ne prouvent-ils pas qu'il existe un système d'organes sécrétoires dans les végétaux?

On donne le nom de *pores* à de petites ouvertures pratiquées dans les membranes, & destinées à l'absorption & à la transpiration des plantes. M. Mirbel en distingue de trois sortes. Les uns, qu'il nomme *insensibles*, ne se laissent pas même apercevoir à l'œil armé des plus forts microscopes: toutes les parties des végétaux en sont criblées, & on ne peut douter de leur existence. Les autres, désignés sous le nom de *pores alangés*, de *pores corticaux*, de *glandes corticales*, &c., ont été très-bien observés & décrits par M. Decandolle dans un Mémoire présenté à l'Institut. On les distingue avec le microscope sur l'épiderme des parties tendres & herbacées, exposées à l'air & à la lumière. Les plantes grasses en ont moins que les autres. Les plantes aquatiques plongées dans l'eau en sont privées, tandis que les mêmes espèces en sont pourvues quand elles végètent hors de l'eau, & ils disparaissent de dessus celles qu'on élève dans l'obscurité. Leur usage est de servir à la transpiration, & sans doute qu'elles absorbent aussi l'humidité dans certaines circonstances.

Enfin, M. Mirbel a nommé *pores glanduleux*, de petites ouvertures bordées de bourrelets opaques, qu'il a observés sur les vaisseaux intérieurs: ils sont, comme nous l'avons déjà dit, ou épars ou arrangés par séries, & de différentes grandeurs; ils donnent passage aux fluides contenus dans les vaisseaux, & servent à expliquer comment la sève se porte en tout sens dans l'intérieur du végétal, & pourquoi les tiges auxquelles on fait des entailles en sens contraire jusqu'à la moelle, peuvent encore vivre pendant long-temps.

M. Mirbel pense, avec Malpighi, que l'épiderme, membrane mince & transparente qui recouvre les végétaux, n'est autre chose que la réunion des parois extérieures des cellules du tissu cellulaire, placée à la surface des plantes, & il assure qu'un grand nombre d'observations l'ont convaincu de cette vérité.

Enfin, dans le dernier article, M. Mirbel traite

de la substance organifatrice, & donne une hypothèse sur la formation & le développement du tissu cellulaire & du tissu tubulaire. La substance organifatrice se forme pendant la durée de l'accroissement. Dans les monocotylédons elle se dépose autour des filers ligneux : dans les dicotylédons, c'est à la surface de l'aubier & du canal médullaire. Elle est d'autant plus abondante, que le végétal est plus jeune, plus sain, & que le sol & la saison sont plus favorables à la végétation. Mais pourquoi cette substance prend-elle toujours des formes confluantes & déterminées? C'est là le noeud du problème que l'auteur tente de résoudre, & contre lequel tous les raisonnemens des physiciens ont échoué.

Le Mémoire de M. Mirbel, ajoute M. Desfontaines, présente une suite d'observations intéressantes sur l'organisation des plantes, qu'il ramène à des principes clairs, simples, & exposés avec méthode & précision. On y trouve plusieurs faits nouveaux sur le tissu cellulaire & vasculaire. Il prouve que les grands & les petits tubes, ceux qui sont poreux, ainsi que les fausses trachées & les trachées, ne sont qu'un seul & même système de vaisseaux différemment modifiés. La découverte des tubes poreux & des fausses trachées lui appartient toute entière. On peut, d'après les faits établis dans ce Mémoire, se rendre compte de la belle observation de M. Coulomb sur l'ascension de la sève par les couches ligneuses voisines de la moëlle, puisque c'est là que les grands tubes & les trachées se trouvent réunis en plus grande quantité.

Dans un autre Mémoire, dont je vais également présenter l'analyse d'après M. Desfontaines, M. Mirbel présente une anatomie exacte de la graine du haricot, avec des faits intéressans sur son développement & sur la formation des vaisseaux. Il a observé le premier que la racine n'avait pas de vraies trachées; il prouve qu'elles se trouvent toujours au centre des tiges dans l'anneau qui entoure la moëlle; qu'elles s'y conservent long-temps sans s'altérer; que les autres couches formées successivement autour de cet anneau n'en ont point; que les tubes poreux, fendus ou mixtes, naissent tout formés dans les végétaux, & que conséquemment ce ne sont pas des trachées soudées. Il fait voir que la trachée, dans sa jeunesse, n'est point roulée autour d'un tube; que ce prétendu tube n'est qu'un enduit de substance nutritive qui encroûte quelquefois l'intérieur de la trachée. Enfin, M. Mirbel nie que la lame spirale soit un vaisseau, & il réfute l'opinion d'Hedwig sur l'ascension de l'air & de la sève dans les plantes. Il fait suivre l'auteur dans la série intéressante de ces observations.

Quoiqu'il ait porté ses recherches sur plusieurs espèces de semences, il a cru cependant devoir

se borner à en décrire & à en représenter une seule, & il a choisi de préférence le haricot cultivé, parce qu'il germe & se développe avec beaucoup de facilité. Cette graine a des caractères communs à toutes celles des légumineuses. On y voit une glande saillante, placée au sommet de la cicatrice, & à sa base un petit alvéole qui aboutit à la pointe de la radicule. Ces deux organes n'avoient échappé ni à Gärner ni à Gleichen. L'enveloppe des cotylédons est formée de trois lames étroitement réunies. L'extérieure a une consistance presque cornée; elle est criblée de pores cylindriques qui en traversent l'épaisseur. La seconde offre à peu près la même organisation que la première, & la troisième ou interne n'est qu'un tissu cellulaire assez lâche, parsemé d'un grand nombre de vaisseaux dirigés en tour sans; ils naissent d'un tronc principal, qui forme un anneau autour de la cicatrice. La glande placée à son sommet n'est qu'un renflement des deux lames extérieures; elles sont fendues en long à l'endroit de la cicatrice, & c'est par cette fisure que les vaisseaux ombilicux pénètrent dans la graine sans s'aboucher avec ceux de la lame cellulaire.

De la base de la graine naît un faisceau de tubes qui se prolonge jusqu'à l'alvéole de la radicule; là il se partage en deux petites branches qui en bordent l'ouverture, se réunissent à sa partie supérieure, puis se divisent encore en deux rameaux, lesquels montent, l'un à droite, l'autre à gauche de la cicatrice, en décrivant un arc, & vont se plonger dans la glande placée à sa partie supérieure, d'où ils sortent réunis en un seul faisceau. Ce tronc principal jette un grand nombre de branches latérales dans la lame cellulaire, qui ne communiquent pas avec les vaisseaux de l'ombilic, & qui se teignent constamment quand on met germer la graine dans des liqueurs colorées.

La grosse glande du sommet de la cicatrice est de même nature que les deux lames cornées; mais le bord des pores dont elle est criblée a une forme hexagone, comme si elle eût été primitivement formée d'une maille de tissu cellulaire, dont les cellules se fussent en partie comblées de manière à n'avoir plus dans leur centre qu'un petit vide cylindrique; & les deux lames extérieures de l'enveloppe, observées peu de temps après la fécondation, ne sont évidemment qu'un tissu cellulaire.

Le pois, la fève, le faux acacia & autres légumineuses ont une organisation analogue à celle du haricot; mais on trouve des différences remarquables dans les graines des plantes qui appartiennent à d'autres familles. L'étude approfondie de la structure des graines est minutieuse & difficile; cependant elle peut servir à expliquer plusieurs phénomènes curieux, relatifs à la germi-

nation. Ainsi, par exemple, on peut savoir, d'après ce qui a été dit, pourquoi le haricot germe lorsque son ombilic est enduit de cire & de vernis.

M. Mirbel, après avoir donné la description anatomique des membranes extérieures, traite des organes qu'elles recouvrent, & du développement de la jeune plante. Quand on a dépouillé le haricot de ses tégumens, on aperçoit les cotylédons de l'embryon. Les premiers sont formés d'une masse de tissu cellulaire, entre-mêlé de vaisseaux qui vont se rendre à l'embryon. Bonnet les a nommés *vaisseaux mammaires*, parce qu'ils allaient pour ainsi dire la jeune plante. Les cotylédons des cotylédons sont remplis d'une sécule composée de petits grains ronds & blanchâtres, qu'on retrouve dans tous les cotylédons charnus. Quand ils sont minces, cette même substance est contenue dans une masse de tissu cellulaire, distincte de la plante & de ses cotylédons : c'est ce que les botanistes ont nommé *périsperme*; mais le périsperme est entièrement dépourvu de tubes.

La sécule dont on vient de parler, soit qu'elle se trouve dans les cotylédons mêmes ou qu'elle en soit séparée, est la première nourriture de l'embryon, & sa masse diminue à mesure qu'il prend de l'accroissement. M. Mirbel a observé une matière nutritive analogue à celle du périsperme dans le tissu de l'écorce & dans la moelle; il pense que cette substance, dissoute & réduite en émulsion, pénètre dans la jeune plante par les vaisseaux mammaires, & qu'elle s'identifie avec les organes qu'elle nourrit & développe. Les vaisseaux communiquent avec la radicule, & le lait des cotylédons se porte d'abord dans cet organe, qui croit le premier; puis il remonte dans la plumule par des vaisseaux formés tout à coup pour le recevoir. L'observation & l'anatomie prouvent que le premier effort de la végétation se passe dans la radicule. Lorsqu'on observe cet organe à cette époque, on voit à sa partie supérieure quatre faisceaux de tubes placés entre l'écorce & la moelle, à des distances égales, d'où sortent plusieurs petites racines.

Avant la germination on ne distinguait, entre la moelle & l'écorce, qu'une lame glaireuse, analogue à la substance que Duhamel a nommée *cambium*.

Les quatre faisceaux de tubes s'abouchent avec les vaisseaux mammaires, & peu de tems après, en leur voir entourés de vaisseaux nouvellement formés, qui vont se perdre dans les feuilles primordiales.

C'est au point de réunion de la radicule avec la plumule, que les vaisseaux de la jeune plante sont les plus nombreux & les plus gros; ils diminuent insensiblement en nombre & en grosseur à

mesure qu'ils s'éloignent de ce point, & enfin, à leur extrémité, on ne distingue qu'une glaire transparente. Les vaisseaux une fois formés n'ont qu'un développement très-limité, & ils perdent même bientôt la faculté de croître; ils sont d'abord très-grêles, & marqués de stries transversales très-rapprochées. Lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement, au lieu de stries en remarque à la surface des rangées de pores ou de fentes transversales plus ou moins prolongées : ce sont les vaisseaux poreux, les fausses trachées & les trachées. Les trachées n'existent point dans la racine; elle ne renferme que des tubes poreux & de fausses trachées. Ce caractère établit une différence remarquable entre elle & la tige. Ces vaisseaux contiennent des fluides qui diffèrent tant dans les diverses espèces de plantes. Celui du haricot est rouge au moment où l'on coupe les vaisseaux; mais aussitôt qu'il est exposé à l'air, il se teint d'un bleu très-foncé. Cette liqueur disparaît bientôt, & les vaisseaux ne charient plus que de l'air & de la sève. On peut leur faire pomper de l'eau colorée; elle pénètre jusque dans les dernières ramifications des nervures des feuilles.

À l'époque du développement de la jeune plante dont il vient d'être fait mention, il n'existe encore que quelques faisceaux de tubes entre la moelle & l'écorce, dont les intervalles sont remplis par une substance glaireuse qui s'organise bientôt, & se change en tubes ou cellules allongées; tel est le premier feuillet de fibres ou de vaisseaux dans une plante à deux feuilles feminales.

À la seconde époque, lorsque le haricot a deux ou trois pouces de longueur, que ses premières feuilles sont épanouies, & qu'on distingue à leur point de réunion le bouton d'où la jeune pousse doit sortir, si l'on fend verticalement la plante dans toute sa longueur, on voit les vaisseaux plus apparens & mieux formés. Ceux de la tige sont pour la plupart des trachées que l'on peut dérouler, & on ne rencontre que des tubes poreux ou des tubes fendus dans la racine; ils partent tous de son collet, communiquent par leur base, & marchent en sens contraire; ils vont toujours en diminuant vers le sommet, & l'on ne distingue plus, même avec l'œil armé du meilleur microscope, qu'une matière glaireuse.

La première couche de vaisseaux, placée autour de la moelle, est alors entourée d'une autre couche de vaisseaux tout nouvellement formés; mais parmi ceux-ci on ne trouve point de trachées; ce ne sont que des tubes poreux ou de fausses trachées.

M. Mirbel a découvert dans la racine de longues cellules placées bout à bout, & partagées par les diaphragmes, dont les membranes ont moins de transparence que celles du tissu cellulaire; elles sont toutes criblées de pores, & sem-

blent tenir le milieu entre le tissu cellulaire & les vaisseaux. Il a aussi retrouvé les mêmes tubes à la base des branches & des feuilles, ainsi que dans les bourgeons.

Le haricot, observé à une troisième époque, lorsque le bourgeon est développé, que la tige a pris un accroissement de quatre à cinq pouces, & que les rameaux sont sortis des aisselles des feuilles primordiales, le haricot alors offre une troisième couche de vaisseaux autour des deux précédentes, laquelle est parfaitement semblable à la seconde. Si on les coupe en travers, on voit que l'intérieur est souvent enduit d'une substance qui en rétrécit l'ouverture. Malgré cet enduit intérieur, les trachées ne changent pas de nature : on en distingue toujours la lame spirale ; mais elle est soudée sur le cylindre, qui se remplit & s'obstrue même avec le tems : c'est ce qui a donné lieu à un système d'Hedwig, dont il sera fait mention plus bas. Il est bon néanmoins d'observer que, dans le haricot & beaucoup d'autres plantes, il y a toujours des trachées qui ne s'obstruent pas, & qu'on peut dérouler. On en trouve aussi dont les spirales sont écartées, tandis que celles des autres se touchent par les bords. Dans les jeunes pousses, les circonvolutions sont toujours serrées ; mais dans les anciennes on les voit souvent allongées comme un ressort à boudin. C'est sans doute ce qui a fait croire à Muelle que les trachées, en s'allongeant & se déroulant, forment les fibres ligneuses, & occasionnoient l'accroissement des organes ; idée absolument fautive, parce que les trachées tendent toujours à se resserrer. Cela vient de ce que certaines trachées, ayant cessé de croître avant les parties environnantes, celles-ci, en s'allongeant, ont forcé les premières de se dérouler.

L'auteur a vérifié l'observation de Sprengel ; savoir : que les trachées se divisent souvent en deux ou trois lames. Dans le haricot il ne se forme que trois couches de vaisseaux. Celles des arbres sont infiniment plus nombreuses ; mais, quel qu'en soit le nombre, leur formation est toujours la même.

Le tissu cellulaire, qui joue un si grand rôle dans tous les êtres vivans, se montre d'abord sous la forme de bulles d'air plongées dans un fluide visqueux. Ses petites cellules se dilatent & se développent avec les autres organes.

Les observations de M. Mirbel ont été répétées sur des végétaux malades, étioles & mal nourris. Leur organisation étoit toujours la même. Les membranes avoient seulement plus de transparence, & aucune des trachées de la couche du centre d'étoit obstruée, quoique les plantes eussent végété pendant long-tems.

Après cet exposé des organes des végétaux &

de leur développement, l'auteur résume plusieurs faits avancés par Hedwig dans son *Traité de la flore végétale*. Suivant ce célèbre observateur, les tubes poreux & les fausses trachées ont été primitivement des trachées dont les contours se sont fondus ; mais les trachées se retrouvent dans la couche intérieure des tiges, même après plusieurs années, & les tubes poreux, ainsi que les fausses trachées, existent dès la première époque de l'accroissement, tels qu'on les voit dans les anciennes tiges.

D'ailleurs, si l'opinion d'Hedwig étoit fondée, elles se trouveroient dans la couche externe du bois. Or, il est démontré qu'elle n'en contient pas.

Hedwig croit que la lame spirale de la trachée est un vaisseau roulé en hélice autour d'un tube membraneux. Selon lui, les liqueurs montent par la spirale, tandis que le cylindre du centre contient de l'air. « La spirale est creuse, dit-il, parce que ses circonvolutions se teignent quand la plante pompe des liqueurs colorés. » Mais M. Mirbel assure que le tube de cette lame, calculé au microscope, n'auroit pas un trois centième de millimètre, & l'expérience lui a prouvé que la partie colorante ne peut monter dans les vaisseaux du bois, dont le diamètre est beaucoup plus grand que celui que l'on suppose à la lame spirale. Fût comment concevoir que les liqueurs se portent de préférence dans l'hélice de la trachée plutôt que dans le tube, autour duquel elle est enroulée ? Pourquoi ne suivroit-elle pas la route la plus directe & la plus ouverte ? C'est une hypothèse dénuée de fondement. Le tube membraneux d'Hedwig n'existe pas dans la jeune plante : cela est évident pour peu qu'on veuille observer des trachées nouvellement formées. Avec le tems il se dépose un enduit sur la paroi intérieure de certaines trachées : c'est cet enduit qu'Hedwig a pris pour un tube.

Dans un autre travail, M. Mirbel a dirigé ses recherches sur les différentes parties de la fleur, & ses observations lui ont fourni des faits infiniment intéressans, & qui méritent d'être connus.

Tous les organes de la fleur sont formés par le développement des vaisseaux du pédoncule qui la soutient ; ils se groupent, se ramifient & s'épanouissent suivant la forme, la situation & le nombre des parties auxquelles ils donnent naissance. Dans les monocotylédons ils sont disposés en filets distincts & parallèles, enveloppés par la moëlle : dans les dicotylédons ils forment un étau autour du cylindre médullaire, & on y aperçoit déjà les traces des rayons divergens de la moëlle, qui se prolongent vers la circonférence. Les caractères particuliers des monocotylédons se trouvent dans le nombre & la disposition des filets vasculaires. Ainsi, par exemple, il y a constamment

trois faisceaux placés en triangle équilatéral dans le pédoncule de la fleur de l'*Aleuris* du Cap, & il s'en trouve régulièrement cinq à neuf dans les pédoncules des aloës.

Les caractères des dicorylédons sont dans les formes de l'étui qui emboîte la moëlle du pédoncule. Le plus grand nombre des vaisseaux de cet organe sont des trachées qui ne se développent que dans les parties molles, où la végétation est très-active, tels que les jeunes rameaux de l'année, les feuilles, les fleurs, &c. La largeur & la forme de leur tube, coupé en hélice, facilitent singulièrement la marche des fluides : de là ces développemens rapides des parties où les trachées s'organisent.

L'auteur, en disséquant l'enveloppe colorée de la fleur de plusieurs monocorylédons, a remarqué que dans les unes, telles que celles de la jacinthe & de l'*Aleuris capensis*, le tissu du pédoncule est intimement uni & continu avec l'enveloppe florale, & que dans d'autres de la même série, comme les lis & les aloës, ce même tissu s'arrête tout à coup à la base de la fleur, où il forme un bourrelet qu'on seroit tenté de prendre pour un rudiment du calice.

Les botanistes ne sont pas d'accord sur les caractères distinctifs du calice & de la corolle. On avoit espéré que l'anatomie végétale parviendrait à tracer la limite qui sépare ces deux organes : c'est tout le contraire : elle les unit & les confond, puisqu'elle, dans un grand nombre de plantes, les vaisseaux du calice & de la corolle sont disposés de la même manière. Quelques auteurs ont dit que l'épiderme du calice étoit criblé de pores allongés, & que celui de la corolle n'en avoit point ; mais ce caractère n'est pas général à beaucoup près, car il existe des calices sans pores, & il y a des filets d'étamines qui en ont de semblables à ceux des calices. Tout le monde sait que les étamines ont les plus grands rapports d'organisation avec la corolle. Suivant Linné, le calice est un prolongement de l'écorce, & la corolle une production des lames internes du liber ; mais cette opinion n'est pas admissible. L'écorce & le liber n'ont pas de trachées, & il en existe dans les corolles & dans un grand nombre de calices.

L'enveloppe florale de plusieurs monocorylédons, tels que celle des lys, des jacinthes, des alétris, des irisées, &c., contient beaucoup de trachées. Dans les dicorylédons, il est souvent facile de distinguer, à la simple vue, les calices qui ont des trachées, de ceux qui n'en ont pas. Les premiers ont des nervures faibles, ou bien donnent naissance aux pétales & aux étamines. Ceux qui en sont privés, sont minces, sans nervures apparentes, & leur base n'est point dirigée vers le centre du pédoncule. Ainsi le calice du *coëus*, sur lequel on voit de grosses nervures ;

celui de la rose de Noël, qui a la consistance & la couleur d'une corolle ; ceux des roses & des fixifragres, sur lesquels reposent les pétales & les étamines, &c., ont toujours des trachées ; au contraire, les calices des œillets, des anagallis, &c., en sont privés. La définition de Linné ne peut donc être applicable qu'à ces derniers. Il faut conclure, de ces observations, que nous ne connoissons aucun caractère tranché, au moyen duquel on puisse distinguer, dans tous les cas, le calice d'avec la corolle, à moins qu'on n'emploie un caractère de convention.

Les filets des étamines ont, à leur centre, un faisceau de trachées, lequel part du réc ptacle dans les aloës, les *rhododendrum*, les *anagallis*, &c. ; mais dans l'*Aleuris capensis*, il naît de l'enveloppe florale ; de la corolle, dans le *coëus* ; du calice, dans les fixifragres, les roses, &c. Ces observations sont d'une grande importance pour déterminer avec précision, & d'une manière invariable, dans certains cas, la véritable insertion des étamines. Ainsi, quand les vaisseaux du réceptacle produisent les filets, ils sont nécessairement posés sous l'ovaire : d'où il suit que les étamines des *rhododendrum* & des aloës ne sont pas péripètes, mais bien hypogynes ; & lorsque les filets des étamines sont formés par des vaisseaux du calice ou de la corolle, ils en fixent l'insertion à l'un ou à l'autre de ces organes. M. Mirbel en conclut que cette insertion ne donne pas toujours des divisions naturelles ; car l'*alors* & l'*Aleuris capensis* sont évidemment d'une même famille, & cependant leurs étamines, comme on vient de le dire, n'ont pas la même insertion.

L'anthère est ordinairement fixée au sommet du filet ; c'est une petite boîe à plusieurs loges, qui contient le pollen. Sa forme la plus commune est oblongue, & elle est ordinairement partagée, dans sa longueur, en deux lobes inégaux, séparés par un sillon qui indique l'endroit par où les loges doivent s'ouvrir. Les deux lobes de l'anthère sont réunis par un corps charnu, dans lequel pénètre la pointe du filet, & le faisceau de trachées est placé à son centre. On croiroit que l'anthère est à deux loges, mais elle en a réellement quatre. Les valves de chacun de ces lobes se replient jusqu'au fond de chaque loge, avant l'émission du pollen, & y forment une cloison qui la partage en deux dans sa longueur.

Duhamel avoit soupçonné que la rupture de l'anthère dépendoit d'une cause mécanique, & il ne s'étoit pas trompé. La surface de cet organe est revêtue d'une lame de tissu cellulaire très-lâche, dont les membranes sont d'une finesse extrême. Au dessous se trouve une seconde lame également cellulaire, mais d'un tissu ferme, élastique, & susceptible de se contracter par le dessèchement. Cette contraction a lieu dans un sens

déterminé par la forme & la disposition du tissu ; quelquefois elle est si rapide, qu'en un clin-d'œil les valves s'ouvrent, l'anthère est repoussée en arrière, & le pollen lancé vers le stigmate. Ce mouvement n'est dû qu'à l'élasticité du tissu, & la vacillation de l'anthère sur le filet dépend de deux causes mécaniques ; la première est le poids inégal de ses deux moitiés. Lorsqu'elle vient à s'ouvrir par une de ses deux extrémités, & qu'une partie du pollen en est sortie, l'autre, devenue plus pesante, imprime un mouvement à ce corps léger, suspendu en équilibre sur la pointe du filet.

La seconde cause dépend de la contraction des trachées qui unissent l'anthère au filet. Ces vaisseaux élastiques, contournés en tire-bourre, resserrent leur spire lorsque les fluides qu'ils contiennent, viennent à s'échapper avec le pollen, & contribuent aussi à faire vaciller l'anthère sur son pivot.

Les vaisseaux qui entrent par le pistil se partagent en plusieurs faisceaux qui suivent différentes directions. Les uns pénètrent dans la paroi de l'ovaire, les autres dans le placenta. On trouve trois faisceaux de tubes dans les parois de l'ovaire des lilacées, dont le pistil est libre, & chaque faisceau est placé dans la suture par où le péricarpe doit s'ouvrir. Les ovaires des *rhododendrum* ont cinq faisceaux de tubes, situés également dans les cinq sutures de la capsule. Il y en a six dans le *cobaea*, dont trois dans les sutures, & trois au milieu des valves.

M. Mirbel pense que, lorsqu'un ovaire, surmonté d'un style, n'adhère pas au calice, les faisceaux de tubes, qui en nourrissent les parois, s'arrêtent brusquement à la base du style ; c'est ce qu'on observe, dit-il, dans plusieurs lilacées, dans le *rhododendrum*, le *cobaea*, &c. Quand, au contraire, le calice fait corps avec le pistil, les vaisseaux des parois de l'ovaire montent dans le style, & vont jusqu'au stigmate. Cette organisation se remarque dans les narcisses, la campanule dorée, &c. Les vaisseaux qui se rendent aux ovules se partagent souvent en autant de faisceaux distincts qu'il y a de placentas. Dans l'anagallis, il n'y a qu'un faisceau : on en trouve deux dans les crucifères, & trois dans les lilacées, divisés chacun en deux branches, qui se séparent & restent fixées à chaque valve quand elles sont ouvertes. Dans la saxifrage à feuilles épaisses, il y a quatre paquets de faisceaux ramifiés comme un tronc d'arbre, & il existe quatre placentas dans l'ovaire de cette plante. On trouve cinq faisceaux dans le *rhododendrum*, & ces faisceaux donnent autant de cordons ombilicaux qu'il y a d'ovules.

Il y a des plantes où on ne trouve qu'un seul faisceau de tubes pour plusieurs placentas réunis ; mais alors ils jettent des ramifications qui répondent à chacun. Cette organisation est très-remar-

quable dans le *cobaea* : un cordon central de vaisseaux monte vers le sommet de l'ovaire, & produit, dans sa route, des rameaux qui redescendent vers la base de la fleur, & jettent, de distance en distance, des cordons ombilicaux qui vont aboutir aux graines. De chaque placenta monte un faisceau de tubes dans le style, & quelquefois il y en a un plus grand nombre, parce que, dans certains cas, comme on l'a dit, les vaisseaux des parois de l'ovaire y parviennent aussi. Un style qui a plusieurs faisceaux de tubes est, en quelque sorte, une réunion de styles sous un même épiderme. Beaucoup de céréales, qui passent pour avoir deux styles, n'en ont réellement qu'un. Si on les dissectionne, on verra qu'ils ne sont que les divisions d'un seul faisceau plongé dans le tissu de l'ovaire.

• Quelquefois les vaisseaux suivent la route la plus courte pour se rendre au stigmate ; d'autres fois, comme dans l'anagallis, ils se divisent en plusieurs branches, qui se réunissent au sommet en un seul corps qui se prolonge jusqu'au stigmate. Ces vaisseaux sont sans doute les conducteurs de l'aura seminalis, mais ils se perdent dans le tissu cellulaire, & l'œil, armé du microscope, ne peut suivre les derniers rameaux, tant ils sont déliés ; ainsi l'observateur est arrêté dès les premiers pas, & le phénomène de la fécondation reste environné de ténébrés.

Le stigmate est en outre formé de tissu cellulaire. Sa surface est tantôt mamelonnée, tantôt couverte de papilles où les vaisseaux vont aboutir. Quand les fleurs sont nouvellement écloses, aucun stigmate n'offre de canal central ; mais, au bout d'un certain tems, il se perfore souvent par le déchirement du tissu cellulaire placé au centre.

Après avoir examiné anatomiquement les fleurs de plusieurs plantes, l'auteur s'est occupé de la structure des glandes. Suivant lui, on a entendu ce nom à des organes dont la nature & les usages sont inconnus. L'organisation des corps glanduleux qui se trouvent dans un grand nombre de fleurs appartenantes à des familles très-distinctes, lui a suggéré quelques idées qu'il croit utiles de développer. Il y a de ces glandes qui sont uniquement composées du tissu cellulaire, & d'autres qui renferment du tissu cellulaire & des vaisseaux.

Le fond du calice de la saxifrage à feuilles épaisses est tapissé par une lame jaune qui distille une liqueur sucrée ; cette lame est sans vaisseaux. Ceux qui entrent dans le calice, les pétales & les étamines, passent au dessous sans communiquer avec elles ; pareillement les filers des deux plus courtes étamines du *cheiranthus cheiri*, ou giroflee jaune, sont entourés à leur base d'un anneau glanduleux, formé d'un tissu cellulaire très-fermé. Les vaisseaux des étamines passent au centre de la glande, & n'ont aucune communication avec elle. Il en est de même de ces soûcettes qui se trouvent

sur la base des divisions de la couronne impériale : les vaisseaux passent au-dessus, sans y jeter de ramifications : elles sont remplies d'une liqueur un peu trouble, d'une odeur pénétrante, & d'une saveur assez semblable à celle de l'eau, dans laquelle on auroit délayé de l'ail & du sucre.

Il y a, à la base du pistil du *coïwa*, un bourrelet épais & blanchâtre, ayant cinq replis très-apparens. Tous les vaisseaux qui vont à l'ovaire, se plongent dans ce bourrelet, s'y ramifient, s'y courent en plusieurs sens, reviennent sur leurs pas, & montent enfin dans l'ovaire. Cette organisation est très-différente de celle des glandes cellulaires dont on vient de parler. On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que le nombre, la disposition, les ramifications des vaisseaux des fleurs offrent des caractères très-différens & très-variés, & qu'il ne seroit peut-être pas impossible d'établir un système d'anatomie comparée dans les végétaux.

ANAVINGA. (Voyez ANAVINGUE.)

ANAVINGUE. *Anavinga*. Plusieurs arbrisseaux de divers pays sont réunis sous ce nom en un genre apétale ou sans corolle, dont le calice est à cinq divisions profondes. Les étamines, attachées à la base ou sous le pistil, sont au nombre de huit ou dix, entre lesquelles s'élèvent autant d'écaillés ou appendices filiformes, ou velues ou frangées. L'ovaire, surmonté d'un style ou d'un stigmate, devient une capsule coriace, légèrement anguleuse, uniloculaire, s'ouvrant en trois valves remplies de semences enfoncées dans une pulpe, & portées sur le milieu des valves. D'autres admettent dans les trois loges séparées par des cloisons insérées sur le milieu des valves, que la pulpe peut faire disparaître. Les feuilles sont alternes ; les fleurs axillaires, en paquet nu ou en corymbe.

L'*iroucana* d'Aublet, que Schreber a nommé *athenea*, appartient aux *anavinga*.

L'exposition du caractère des *anavinga*, tel que nous venons de le présenter d'après quelques formes faites par M. de Jussieu, annonce la grande affinité de ce genre avec les *samyda*. Ce dernier s'en distingue par un calice tubuleux, par l'absence des écaillés & la réunion des filamens des étamines en un tube. Divers genres, offrant tous les mêmes caractères, avec de légères différences dans le nombre & la forme des parties, ont été réunis en un seul, & la dénomination de *caesaria* a été substituée, on ne sait trop pourquoi, à celle d'*anavinga*. Nous l'avons présentée à la suite des *samyda*. (Voyez SAMYDE.)

ANAXETON. Nom d'un genre de plantes, de la famille des corymbifères, établi par Gærtner, sur les espèces du genre *gnaphalium* Linn., qui ont le réceptacle des semences muni de poils ou de

paillettes à la circonférence, au lieu de l'avoir tout-à-fait nu. Ce caractère est trop faible pour devenir seul la base du genre particulier. (Voyez GNAPHALE. Suppl.)

ANAZÉ. Arbre de Madagascar, dont Flacourt donne une description très-incomplète : malgré cela on peut y reconnoître l'*adansonia bouab*, d'autant qu'il est certain que cet arbre singulier croit dans quelques parties de cette île.

ANAZUE. NANACHUE : noms arabes de l'ammi (*ammi perenne* Linn.).

ANBLATUM. Plante du Levant, dont Tournefort avoit fait un genre que Linné a réuni aux *lathras*, sous le nom de *lathraea anblatum*. (Voyez CLAUDESTINE, n. 4.)

ANCHOAS : nom mexicain du gingembre (*amomum zingiber* Linn.).

ANCHOVY. Sloane, dans son *Histoire de la Jamaïque*, donne ce nom à l'arbre connu des botanistes sous celui de *grias*.

ANCHUSA. (Voyez BUGLOSSE.)

ANCISTRE. *Ancistrum*. (Voyez ACÈNE.) Ce genre, évidemment le même que l'*acana*, a pour caractère essentiel :

Un calice adhérent, à quatre lobes mucronés & réfléchis à leur sommet ; quatre pétales insérés à l'orifice du calice ; deux, quatre ou cinq étamines ; un stigmate en pinceau ; une semence enveloppée par le calice, à pointes presque épineuses.

Observations. Ce genre a de grands rapports avec les *poterium* & les *jaugiforba*. Les fleurs sont réunies en épis ou en têtes globuleuses, hérissées de pointes presque épineuses, recourbées en dehors. Les feuilles sont alternes, pétiolées, nombreuses à la base des tiges, qu'elles enveloppent par imbrication par la base de leur pétiole. Ce pétiole se dilate souvent dans les feuilles caulinaires en une membrane amplexicaule, qui se divise ensuite en deux découpures quelquefois dentées, formant une sorte de stipule bifide. Ces feuilles sont ailées avec une impaire ; les folioles sessiles ; l'impairie pétiolée ; les extérieures opposées & plus grandes ; les intérieures alternes ; insensiblement plus petites ; un des côtés du leur base souvent plus étroit.

ES PÈCES.

1. **ANCISTRE à crochets.** *Ancistrum lappaceum*.

Ancistrum (*acna* lappace), caule erecto, foliis impari-pinnatis ; foliolis oblongis obtusiusculis ; racemis paucifloris.

paucifloris. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 66. tab. 103. fig. A. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 293.

Ses tiges sont nombreuses, presque ligneuses, médiocrement rameuses, hautes d'un pied, velues, cylindriques; les feuilles nombreuses, composées de quatre paires de folioles médiocrement pétiolées; quelques-unes alternes, oblongues, profondément dentées en scie, velues, glabres dans les individus cultivés. Les pédoncules sont axillaires, quatre fois plus longs que les feuilles, cylindriques, foueant cinq à sept fleurs en épi, pédicellées; à la base de chaque pédicelle, une bractée lancéolée, entière ou trifide; une ou deux autres vers le milieu du pédicelle. Le calice se divise quelquefois en cinq lobes ovales, concaves; les étamines au nombre de quatre ou cinq; le stigmate pelté, finement laciné. Le fruit est oblong, à trois ou quatre faces, hémisphérique de pointes crochues.

Cette plante croît au Pérou, sur les roches arides & brûlantes. (Description. ex Ruiz & Pav.)

2. ANCISTRE allongée. *Ancistrum elongatum*.

Ancistrum (acæna elongata), foliis oblongis, serratis, subtus pubescentibus; spicis elongatis, fructibus unguiculatis armatis, caule erecto. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 293. — Linn. Mantiss. 200. (Voyez ACÆNA du Mexique, vol. 1. pag. 25.)

3. ANCISTRE couchée. *Ancistrum decumbens*.

Ancistrum (acæna latibrosa), foliis oblongis, incis; pedunculis scopiformibus; spicis elongatis, fructibus unguiculatis armatis, caulis demersis. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 16. — Lam. Illustr. vol. 1. n°. 349. tab. 22. fig. 4.

Ancistrum (decumbens), foliis pinnatis, hirsutis; fructibus tomentosis, glochidiis armatis. Thunb. Prodr. pag. 6.

Agrimonia decumbens. Linn. f. Suppl. pag. 251.

Ses tiges sont longues d'un pied, couchées, presque dépourvues de feuilles, très simples; les feuilles radicales assez semblables à celles de l'argentine, composées d'environ vingt folioles égales, légèrement velues. Les découpures du calice sont cotonneuses; l'ovaire velu, hérissé de pointes en crochet, ainsi que le fruit, qui est une sorte de drupe; les semences lacuneuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

4. ANCISTRE pinnatifide. *Ancistrum pinnatifidum*.

Ancistrum (acæna pinnatifida), scapis erectis, Botanique. Supplément. Tome I.

foliis impari-pinnatis; foliolis obovatis, pinnatifidis; spicis longis, interruptis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 68. tab. 104. fig. B.

5. *Acæna* (pinnatifida), foliolis linearilanceolatis, serratis-incis, subpinnatifidis, subtus hirsutis; spicis cylindricis, caule erecto. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 294.

Ses tiges sont droites, très simples, striées, cylindriques, pileuses à leur base, blanchâtres & très-velues à leur partie supérieure; les feuilles radicales nombreuses, ailées; deux inférieures caulinaires, deux autres supérieures; les terminales entières; environ dix paires de folioles linéaires-lancéolées; les inférieures alternes, très-entières; les extérieures opposées, profondément dentées en scie ou incisées, glabres en dessus, velues en dessous. La tige se termine en un épi cylindrique, long d'un pouce & plus; les fleurs inférieures souvent distantes; les fruits hérissés de pointes en crochets. La variété 5 est plus petite dans toutes ses parties.

Cette plante croît au Chili, sur les collines, & la variété 6 au détroit de Magellan, où elle a été recueillie par Commerçon. (V. f.)

5. ANCISTRE à feuilles d'argentine. *Ancistrum anserinifolium*. Lam.

Ancistrum foliolis cuneiformibus, profunde serratis, fuscis incanis; capitulo globose. Lam. Ill. 1. n°. 345. tab. 22. fig. 1. — Furr. Gen. 4. tab. 2.

Ancistrum driandrum. Forst. Prodr. n°. 52.

Ancistrum sanguisorbe. Linn. f. Suppl. pag. 89.

Acæna (sanguisorbe), foliis remotis; foliolis cuneatis, serratis, subtus sericeis; spicis globosis, caule decumbente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 249. (Voyez ANCISTRE, vol. 1. pag. 145.)

6. ANCISTRE rampante. *Ancistrum repens*. Vent.

Ancistrum caulis repentibus; foliolis ovato-oblongis, argute serratis, linearis; epistylis globose. Vent. Hort. Cels. pag. 6. t. b. 6.

Acæna (ovalifolia), caule repente, foliis impari-pinnatis; foliolis ovalibus, profunde serratis, linearis; spicis globosis. Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 103. fig. C.

Acæna ovalifolia, foliolis oblongis subnervatis, subtus villosis; spicis globosis, caule repente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 295.

Elle se rapproche beaucoup de la précédente. Ses tiges sont très-rameuses, pileuses, cylindriques; les feuilles du bas nombreuses, composées de quatre paires de folioles ovales-oblongues, un peu cuneiformes à leur base, dentées en scie, glabres en dessus, plus pâles & velues en dessous.

principalement sur leurs nervures. Les pédoncules sont axillaires & terminaux, velus, munis d'une ou de deux folioles à leur partie supérieure; ils supportent une petite tête de fleurs, pubescente & blanchâtre; chaque fleur accompagnée à sa base de deux bractées linéaires. Le calice se termine par trois ou quatre pointes crochues.

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux humides & ombragés. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. ANCISTRE argentee. *Ancistrum argenteum*.

Ancistrum (acana arnerea), foliis ovato-oblongis, serratis, subius sericeis; spicis globosis, caule repente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 295. — Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 103. fig. 8.

Proquin. Feuill. Chili, vol. 3. pag. 55. tab. 41.

Ses tiges sont grêles, purpurines, cylindriques, velues, très-rameuses; les rameaux longs de deux pieds; les feuilles composées de trois ou quatre paires de folioles; quelquefois une autre paire plus petite entre les dernières, ovales-oblongues, sessiles, glabres & luisantes en dessus, foyeuses & argentees en dessous. Les pédoncules sont solitaires, axillaires & terminaux, une fois plus longs que les feuilles, cylindriques, blanchâtres, velus, accompagnés de deux ou trois folioles alternes, trifides, soutenant une tête de fleurs arrondie; deux bractées linéaires à la base de chaque fleur. Les calices sont tétragones, surmontés de deux, trois ou quatre pointes épineuses; les pétales velus en dehors; les étamines au nombre de deux, quelquefois de quatre.

Cette plante croît au Chili, dans les lieux humides. (V. Descript. ex Ruiz & Pav.)

8. ANCISTRE luisante. *Ancistrum lucidum*, Lam.

Ancistrum foliolis minimis, bipartitis, acutis, fuscis nitidis; spicis ovatis, calicibus muticis. Lam. Ill. vol. 1. n°. 347. tab. 22. fig. 3. — Air. Hort. Kew. vol. 1. pag. 15.

Acana (lucida), foliis tri-quinquapartitis; laciniis linearibus, subius villosis; spicis oblongis, caule subdemerso. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 296.

Cette plante a des tiges très-courtes, renversées; elles portent plusieurs feuilles longues de deux pouces, composées de huit à neuf paires de folioles, longues d'environ trois lignes, un peu ovales; les extérieures à cinq dents profondes; les intérieures à deux ou trois découpures; quelques-unes entières, glabres & luisantes en dessus, un peu réfléchies à leurs bords, un peu blanchâtres, velues en dessous, terminées par quelques poils. Le pédoncule est cylindrique, velu, long de trois pouces, souvent muni d'une ou de

deux folioles à sa partie supérieure, portant quelques fleurs dans leurs aisselles. Les épis sont ovales, plus ou moins grêles, à peine longs d'un demi-pouce; les calices pileux, à quatre pointes, mutiques dans les individus cultivés; les pétales oblongs, pileux en dehors.

Cette plante croît aux îles Malouines. (V. f. in herb. Juss.)

9. ANCISTRE trifide. *Ancistrum trifidum*.

Ancistrum (acana trifida), tomentum-canescens, foliolis cuneiformibus, tri-quingefidis; spicis globosis, caule erecto. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 296. — Flor. per. vol. 1. pag. 67. tab. 104. fig. C.

Toute la plante est couverte d'un duvet tomenteux. Ses racines produisent plusieurs tiges droites, inégales, longues d'environ un pied, cylindriques, légèrement flexueuses, un peu striées; les feuilles composées de sept à huit paires de folioles cuneiformes, à trois ou à cinq découpures; les inférieures presque entières. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité d'un pédoncule terminal, en une ou deux têtes sessiles; chaque fleur accompagnée d'une seule bractée linéaire. Le calice se divise souvent en cinq lobes. Ses étamines varient de deux à cinq. Les fruits sont ovales, velus, à quatre ou cinq angles, terminés par autant de pointes crochues.

Cette plante croît dans les pâturages & sur les collines, au Chili. (V. Descript. ex Ruiz & Pav.)

10. ANCISTRE de Magellan. *Ancistrum magellanicum*, Lam.

Ancistrum foliolis ovatis, inciso-pinnatifidis; spicis capitato-globosis. Lam. Illustr. vol. 1. n°. 346. tab. 22. fig. 2.

Acana (magellanica), foliis obovatis, serrato-incisis, trifidis, subius canescentibus; spicis globosis; caule erecto, glabro. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 297.

On la distingue de la précédente par ses tiges glabres, par ses rameaux enveloppés, par les gaines des feuilles, par les feuilles caulinaires plus rapprochées, & par ses bractées glabres. C'est un petit arbuste, dont les tiges sont basses, à peine hautes de trois à quatre pouces, glabres, rameuses, souvent un peu blanchâtres à leur partie supérieure; les feuilles frisées vers l'extrémité des rameaux, composées de cinq à six paires de folioles, longues d'environ trois lignes, ovales, un peu blanchâtres en dessous, glabres en dessus; les unes à dentelures profondes, presque pinnatifides; d'autres à trois dents, quelques-unes entières. Le pédoncule est droit, de couleur purpurine, placé dans les aisselles des feuilles supé-

rieurs, un peu velu vers son sommet, soutenant un petit épi globuleux.

Cette plante a été recueillie par Commerçon au détroit de Magellan. (V. f. in herb. Juss.)

11. ANCISTRE ascendante. *Ancistrum ascendens*.

Ancistrum (acæna ascendens), foliis oblongis obovatis, serratis, glaberrimis; spicis globosis, caule decumbente. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 297.

Ancistrum magellanicum, var. β , foliis latioribus, serratis. Lam. l. c.

Cette plante, d'après M. Vahl, paroît devoir continuer une espèce distincte. Ses tiges sont glabres, cylindriques, striées, hautes de trois pouces; les feuilles composées de cinq à sept paires de folioles opposées ou alternes, veinées, un peu pileuses sur leur principale nervure, à dentelures obtuses. Le pédoncule est terminal; il supporte une tête de fleurs de la grosseur d'une cerise. Leur calice est terminé par quatre pointes épineuses.

Cette plante a été recueillie par Commerçon au détroit de Magellan. (Descript. in Vahl.)

12. ANCISTRE à épi cylindrique. *Ancistrum cylindricum*.

Ancistrum (acæna cylindrichia), foliis oblongis, serratis, subhis sericeis; pedunculis scopiformibus, spicis cylindricis, caulibus demisso. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 297. — Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 63. tab. 104. fig. A.

Toute la plante est couverte de poils tomenteux & soyeux. Ses tiges sont couchées; ses feuilles radicales nombreuses, composées de dix à onze paires de folioles sessiles, oblongues, obtuses, pilées, nerveuses à leurs deux faces, blanches & argentées en dessous: il s'élève plusieurs pédoncules d'un à trois pouces, garnis de deux à cinq folioles distantes, simples, dentées en scie, soutenant un épi cylindrique, long d'environ un demi-pouce; trois bractées linéaires à la base de chaque fl. Les découpures du calice sont oblongues, étalées, striées, purpurines en dedans; deux éramines. Le fruit est tétragone, ovale, souvent à une seule loge, quelque fois à deux, surmonté de quatre pointes recourbées.

Cette plante croît au Pérou. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

13. ANCISTRE naine. *Ancistrum pumilum*.

Ancistrum (acæna pumila), foliis ovalibus, serratis, glaberrimis, supra nitidis; pedunculis scopiformibus, spicis testibus, caule demisso. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 298.

Ses tiges sont à peine hautes d'un pouce, gar-

nées à leur partie supérieure de feuilles longues de trois pouces, composées d'environ douze paires de folioles, à peine plus grandes que celles du ferpolet, ovales, très-grandes, luisantes en dessus, veinées, à dentelures obtuses, trois d'un côté, deux de l'autre. Le pédoncule est long de trois pouces, glabre, pourpre, blanchâtre, velu vers son sommet, muni de deux ou trois folioles pinnées; les inférieures opposées; terminé par un épi cylindrique, accompagné de bractées linéaires; les fruits hérissés de pointes.

Cette plante croît au détroit de Magellan, d'où elle a été envoyée par Commerçon. (Herb. Juss.)

14. ANCISTRE bleue. *Ancistrum barbatum*. Lam.

Ancistrum foliolis linearisubulatis, apice barbatis; floribus axillaribus. Lam. lll. vol. 1. pag. 77. n°. 348.

Empetrum pinnotum. Lam. Diâ. n°. 3. (Voyez CAMARINE pinnée, n°. 3.)

ANCISTRUM. (Voyez ANCISTRE.)

ANCOLIE. *Aquilegia*. Nous n'avons d'autre espèce à réunir à ce genre que l'ANCOLIE à fleurs vertes, d'Aiton (*aquilegia viridiflora*), dont les fleurs sont remarquables par leur couleur verte, ayant leur corne droit, un peu recourbe & tendue à son sommet. Les étamines sont à peine égales à la longueur de la corolle; la lame des pétales marquée de rides. Quelquefois le corne prend une couleur bleueâtre.

Cette plante croît en Sibérie; elle est caractérisée ainsi qu'il suit :

Aquilegia (viridiflora), nectariis rectis; apice incrassato, subinflexo; flaminibus corollam subaequantibus. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 248. — Pallas, Aët. Petrop. 1779. pag. 260. tab. 11. — Murr. Comm. Goett. 1780. pag. 8. tab. 2. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 102. & Collect. 1. pag. 35. — Retz. Observ. 3. pag. 34.

ANCOLIE vulgaire. *Aquilegia vulgaris*. Lam. (Voyez lll. tab. 488. fig. 1 & 2.)

ANDARA : nom que porte à Ceilan le *mimosa cinerea* Linn., très bien figurée dans Burman, Thesaur. zeylan. tab. 2.

ANDARÈSE. *Premna*. On attribuoit au *fremna* un fruit composé de quatre noyaux monospermes, renfermés dans un brou; mais, suivant Gærtner, ces noyaux sont réunis en un seul, à quatre loges; ce qui distingue mieux ce genre du *callicarpa*. Willdenow y rapporte le *coronaria corymbosa* Lam., nommé depuis, par le même auteur, *callicarpa lanata*. Il faut encore y rapporter, d'après M. de Jussieu, le *cyathoxylum melanocarpum*.

dium de Swartz, qui a de même le noyau à quatre loges, & qui s'éloigne du *Cyathoxylum*, tant par ce caractère que par les fleurs disposées en corymbe, & non en épi. Ainsi, les espèces à ajouter à ce genre furent :

1. ANDARÈSE réticulée. *Premna reticulata*. Juss.

Premna foliis subius venosis, reticulatis; floribus paniculatis, ramis tetragonis.

Cyathoxylum menalo-cardium. Swartz, Prodr. 91. & Flor. Ind. occid. 2. pag. 1046.

Cyathoxylum paniculatum. Gærtn. de Frucl. & Sem. 1. pag. 270. tab. 56.

Cyathoxylum foliis rugosis, ovatis, oppositis; petiolis geniculatis, racemis terminalibus, calice quadriplo. Brown, Jam. pag. 265.

Arbre d'une médiocre grandeur, dont le tronc, épais d'environ six pouces, se divise en rameaux tétragones, cannelés, blanchâtres, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales-oblongues, acuminées à leur sommet, longues de cinq à six pouces, entières ou quelquefois finement crénelées, un peu ridées, glabres, nerveuses en dessus, rudes, un peu tomenteuses, cendrées & à veinules réticulées en dessous; les pétioles pubescens, longs d'un à deux pouces. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale & axillaire, à ramifications opposées, plus courtes que les feuilles. Le calice est petit, d'un blanc-jaunâtre, à quatre dents; la corolle régulière; son tube de la longueur du calice; le limbe à quatre découpures perites, égales, étalées; les étamines à peine plus longues que la corolle; le style bise à son sommet; les stigmates réfléchis. Le fruit est une baie arrondie, de la grosseur d'un grain de poivre, rougeâtre, contenant un noyau divisé en quatre loges.

Cette plante croît à la Jamaïque, au milieu des champs. *h*

2. ANDARÈSE jaunâtre. *Premna flavescens*. Juss.

Premna tomentosa, flavescens, foliis ovato lanceolatis, integerrimis; paniculâ trichotomâ. Pers. Synop. 1. pag. 143. — Juss. Annal. Mus. Paris. vol. 7. pag. 77.

Arbrisseau dont les rameaux, les feuilles & les panicules sont chargés d'un duvet tomenteux & jaunâtre; les feuilles pétiolées, ovales-lanceolées, très-entières à leurs bords. Les fleurs sont petites, disposées en panicule dans l'aisselle des feuilles, vers le sommet des rameaux & les ramifications trichotomes. Le fruit est un drupe presque sec, divisé en quatre loges, à quatre semences, dont plusieurs avortent fréquemment.

Cette plante croît sur les rivages du Coromandel. *h* (*V. f.*)

3. ANDARÈSE verticille. *Premna verticillata*.

Premna foliis ovatis, longè acuminatis, suprà venoso-reticulatis, subius nervosis, utrinque glabris; ramis panicula verticillata. (N.)

Ses tiges sont ligneuses; les rameaux garnis de feuilles pétiolées, ovales, presque en cœur, longues de trois à quatre poices, larges de deux pouces & plus, membraneuses, entières, glabres à leurs deux faces, presque luisantes, veinées & finement réticulées en dessus, plus pâles & nerveuses en dessous, acuminées à leur sommet, élargies & arrondies à leur base; les pétioles longs d'un pouce, presque cylindriques, un peu pubescens. Les fleurs sont disposées en une panicule droite, rameuse; les rameaux opposés & verticillés, plusieurs fois ramifiés; les pédicelles très-courts; les fruits globuleux, de la grosseur d'un petit grain de poivre.

Cette plante croît dans l'Inde. *h* (*V. f. in herb. Desfont.*)

4. ANDARÈSE à feuilles entières, n°. 1. *Premna integrifolia*. Linn. — Lam. Ill. tab. 543.

ANDIRA. (*Voyez* ANGELIN.)

ANDRACHNE à feuilles de téleph. *Andrachne telephoides*. Linn. — Lam. Ill. tab. 797.

ANDRÉE. *Andraea*. Genre de plantes de la famille des mousses, que M. Palisot-Beauvois place, d'après sa méthode, dans la section des apogones, & qui d'abord avoit été confondu par Dillenius & Linné avec les jungermanes.

La coiffe est campaniforme, & ne couvre que le sommet de l'urne ou capsule. Celle-ci est pédonculée, ovale, allongée; elle se divise en quatre segments égaux, attachés par le sommet à l'opercule, & par la base à un gossier qui ressemble à une petite capsule. Ces segments ne sont que s'ouvrir & se plier sur eux-mêmes, pour laisser un passage libre aux poussières & aux semences. Les feuilles du périchet sont très-longues, au nombre de trois à cinq, & couvrent les pédoncules souvent en entier.

L'ouverture de la capsule en quatre valves ressemble parfaitement à celle d'un jungermane; ce qui a causé l'erreur de Dillenius & de Linné. Ehrhart, Hedwig & Hoffman ont reconnu l'existence de l'opercule & de la coiffe dans ces plantes, & ont ainsi reconnu qu'elles devoient appartenir à la famille des mousses. Les fleurs mâles sont encore inconnues.

Ce genre se compose de deux espèces de jungermanes, décrites n°. 26 & n°. 28. La première prend le nom d'*andraea rupestris*. Hedw. Spec. 47,

tab. 7, fig. 1; & la seconde, celui d'*andraea alpina*. Hedw. Spec. 49.

ANDREUSIE. *Andrusia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des plauqueminets, qui comprend des arbustes exotiques à l'Europe, à feuilles glabres, alternes, à fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq découpures; une corolle en soucoupe; cinq étamines; un ovaire libre; un style; un drupe, contenant un noyau à quatre loges monospermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, divisé en cinq découpures profondes.

2°. Une corolle monopétale, hypocratériforme, attachée au fond du calice; le tube cylindrique; l'orifice fermé par des poils; le limbe étalé, à cinq lobes.

3°. Cinq étamines insérées vers le milieu du tube; les filaments subulés, soutenant des anthères vacillantes, échançrées à leur base, s'ouvrant latéralement.

4°. Un ovaire libre, ovale, surmonté d'un style de la longueur des étamines, terminé par un stigmate concave & dilaté.

Le fruit consiste en un drupe ovale, entouré par le calice, contenant un noyau osseux, divisé en quatre loges; une seule semence dans chaque loge.

Observations. M. Ventenat a donné à ce genre le nom d'*andrusia*, qu'il a cru devoir substituer à celui de *pogonia*, employé d'abord par Andrews, mais qui l'avait été déjà par M. de Jussieu pour désigner un genre de la famille des orchidées.

ESPÈCES.

1. ANDREUSIE glabre. *Andrusia glabra*. Vent.

Andrusia ramis erectis, levibus; foliis ovali-lanceolatis, floribus pendulis. Vent. Jard. de la Malm. pag. 108. tab. 108.

Pogonia (glabra), foliis elliptico-lanceolatis, glabris; floribus pendulis, minutis, albis. Andrew. Bot. Repof. tab. 185.

Arbuste dont le port a quelque ressemblance avec celui d'un laurier, & qui s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds sur une tige droite, cylindrique, divisée en rameaux alternes, peu ouverts, articulés au point de leur insertion, garnis de

feuilles glabres, alternes, pétiolées, ovales-lanceolées, luisantes, d'un vert-foncé, parsemées en dessous, lorsqu'on les observe à la loupe, de petits points blanchâtres; les pétioles articulés.

Les fleurs sont blanchâtres, pendantes, d'une grandeur médiocre, axillaires, rarement solitaires, soutenues par des pédoncules simples, cylindriques, unifiés, plus longs que les pétioles. Leur calice est glabre, à cinq découpures profondes, droites, linéaires, aiguës; la corolle hypocratériforme, une fois plus longue que le calice, pubescente à l'intérieur; le tube cylindrique, de la longueur du calice; l'orifice fermé par des poils; le limbe divisé en cinq lobes ovales-arrodis, très-entiers; les étamines de la longueur du tube; l'ovaire ovale, comprimé, d'un vert-pâle; il lui succède un drupe enveloppé par le calice persistant, contenant un noyau osseux, à quatre loges monospermes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande; elle fleurit au commencement du printemps, & passe l'hiver dans l'orangerie. *h* (*Descrip. en Vent.*)

2. ANDREUSIE rabattue. *Andrusia debilis*. Vent.

Andrusia ramis decumbentibus, glandulosis; foliis lanceolatis, floribus erectis. Vent. Jard. de la Malm. pag. 108.

Pogonia (debilis), foliis lanceolatis, apicibus sufferrulatis, distichis; floribus solitariis, axillariis, caruleis; corice scabroso. Andr. Repof. Bot. tab. 212.

Ses riges sont sarmenteuses, divisées en rameaux foibles, rabattus, couverts d'une écorce glanduleuse, raboteuse; garnis de feuilles alternes, pétiolées, presque disposées sur deux rangs, lanceolées, glabres à leurs deux faces, entières, un peu dentées en scie vers leur sommet. Les fleurs sont bleues, solitaires, rectesses, pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, aux environs du port Jackson. *h*

ANDROGYNETTE. *Stachygynandrum*. Genre de plantes crytogames, de la famille des lycopodes, établi par M. Palifor-Beauvois, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Les fleurs mâles portées sur un épi chargé de bractées colorées comme les feuilles, & au bas de ce même épi une fleur femelle.

Les fleurs mâles sont composées de bractées lanceolées, ovales, très-aiguës, finement dentées en scie, sous chacune desquelles se trouve, comme dans presque tous les lycopodes, une anthère sessile, bivalve, réniforme, contenant un amas de

poussière jaune très-inflammable, & impenétrable à l'eau.

La fleur femelle est composée de quatre ou cinq folioles calcinales, lancéolées, aiguës, finement dentées en scie, plus longues que les bractées des fleurs mâles. Ces folioles enveloppent une capsule à une seule loge, à trois valves presque ovales, obtuses, contenant ordinairement trois semences sphériques, blanches, & remplies d'une substance gelatineuse. La plupart des espèces de ce genre ont les feuilles placées sur deux rangs, & naissent dans les climats chauds, sous la zone torride. Ces espèces étoient pour la plupart renfermées parmi les *Lycopodium* de Linné.

Celles que M. Palisot-Beauvois y rapporte, sont : le *Lycopodium rupestre* — *alpinum* — *stellatum* — *plum* — *sum* — *canaliculatum* — *circinale* — *versicillatum* — *sanguinolentum* Linn. — *ciliare* — *myrsinitifolium* — *japonicum* Gmel. — *penisylvanicum* Lam. — *porretifolium* Lam. — *prostratum* Lam. — *ornithogalloides* Lam. — *levigatum* Lam. — *obliquum*. Magaz. Encycl. n.º 20.

La plupart de ces espèces ont été décrites à l'article LYCOPODE. M. de Beauvois y ajoute les suivantes :

1. ANDROGYNETTE amplexicaule. *Stachygnandrum amplexifolium*. Pal. Beauv.

Stachygnandrum foliis distichè imbricatis, amplexicaulis. Dillen. tab. 66. fig. 9.

Cette espèce est très-reconnoissable par ses feuilles, si serrées contre les tiges, qu'elles paroissent amplexicaules, & se rapprochées entr'elles au sommet des rameaux, qu'elles semblent perforées. Elle croit dans les îles orientales. (Palisot-Beauvois.)

2. ANDROGYNETTE obtuse. *Stachygnandrum obtusum*.

Stachygnandrum caule repente, ramofo; ramis ramosis; ramulis dichotomis, spiciferis; scie a brevibus; bracteis basi rotundatis, apice acuminatis, margine subintegris; foliis distichis, minutè serratis, obtusis. Palis. Beauv. Ætheog. pag. 113.

Cette espèce, recueillie à l'île-de-France par M. Bory-Saint-Vincent, a des tiges rampantes & rameuses. Ses rameaux sont dichotomes, soutenant des épis courts, accompagnés de bractées arrondies à leur base, acuminées à leur sommet, presque entières à leur base; les feuilles disposées sur deux rangs, finement denticulées, obtuses à leur extrémité.

3. ANDROGYNETTE grimpance. *Stachygnandrum scandens*.

Stachygnandrum caule volubili, ramofo; ramis

pinnatis; foliis alteris, oblongis, apice serratis; spicis terminalibus. Palis. Beauv. Flor. d'Orléans. pag. 10. tab. 7.

Cette belle espèce s'élève, en tournant autour des plus gros arbres, à la hauteur de trois ou quatre pieds. Elle s'en distingue par les tiges grimpances, rameuses; par les rameaux alternés, érales en forme d'aile, assez semblables à ceux d'une fougère, garnis de feuilles alternes, oblongues, disposées sur deux rangs, un peu denticulées vers leur sommet. Des stipules ou folioles plus petites, imbriquées, règnent le long des côtes. Les épis sont sessiles & terminaux.

Cette plante croit dans le royaume d'Orléans. (Pal. Beauv.)

ANDRIALE. *Andryala*. Ce genre, tel que Linné l'avait établi, étoit composé d'espèces qui, par leur port & leur rapprochement, en formoient un genre assez naturel; mais on a remarqué que quelques espèces avoient, outre le réceptacle velu, quelques paillettes aux bords de ce réceptacle, l'aigrette pileuse, nulle à la circonférence, & l'on s'est dès-lors empressé de les séparer des andriales, & d'en former un genre particulier, d'où sous le nom de VOIGTIA, que l'on auroit dû au moins conserver, mais auquel, pour aider à embrouiller un peu plus la nomenclature de la science, on a substitué celui de *rothia*. Ce dernier nom a été employé par M. de Lamarck pour un autre genre. (Voyez VOIGTIA & ROTHIA.) Les espèces qui appartiennent aux voigtias sont :

1. ANDRIALE à corymbes. *Andryala corymbosa*. Lam.

Andryala (integrifolia, variété a), foliis inferioribus runcinatis, superioribus ovato-oblongis, tomentosis. Linn. Syst. veget. 600. — III. tab. 657. fig. 2. — Gzert. de Fruct. & Sem. tab. 118.

Andryala lanata. Villars, Dauph. 3. pag. 65.
Andryala parviflora, var. a. Lam. Flor. franç. 2. pag. 117.

Rothia runcinata. Willd. Spec. 3. pag. 161. — Roth. Catalect. bot. t. pag. 167.

2. ANDRIALE laciniée. *Andryala laciniata*. Lam. III. tab. 657. fig. 3.

Andryala integrifolia, var. 3. Linn. Syst. veget. pag. 600.

Andryala sinuata. Linn. Spec. 1137.

Andryala lyrata. Pourret, A&T. Tolos. 3. pag. 368.

Andryala parviflora, var. 3. Lam. Flor. franç. 2. pag. 117.

Rothia cheiranthifolia, Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1611. — Roth. Catal. bot. 1. pag. 1051.

Observations. Nous avons fait mention du *rothia andryaloides*, Willden. 3. pag. 1612, à l'article *voigia tomentosa*. Les espèces suivantes appartiennent aux véritables *andryala*.

3. ANDRIALE de Raguse, n°. 2. *Andryala ruginosa*, Linn.

4. ANDRIALE glanduleuse, n°. 5. *Andryala glandulosa*, Lam. Ill. tab. 157. fig. 1.

Andryala (*cheiranthifolia*), *foliis runcinatis; summis lanceolatis, integris; villo glandulifero*. L'herit. Strep. pag. 35. tab. 18. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 129. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1609.

Andryala tomentosa, Scopoli. Infub. 2. pag. 12. tab. 6.

5. ANDRIALE à tige nue. *Andryala nudicaulis*, Lam.

Andryala nemausensis, Villars, Dauph. 3. pag. 66. tab. 26.

Crepis nemausensis, Gouan, Illustr. 60. — Allion. Pedem. n°. 89. tab. 75. fig. 1. — Willden. Spec. 3. pag. 1592.

An hieracium sanctum? Linn. Spec. Plant. pag. 1127.

6. *Eadem, caule ramosissimo, multiflora, subuloso*. Decand. Flor. franc. 4. pag. 38.

Elle paroît se rapprocher un peu des *rothia* (*voigia*). Les semences, placées à la circonférence des fleurs, sont enveloppées par les folioles du calice, en forme de paillettes; elles font quelquefois dépourvues d'aigrettes. Dans quelques individus, les tiges, au lieu d'être simples, se divisent en deux ou trois rameaux; quelquefois elle se ramifie au point de porter dix à douze fleurs, & alors elle offre quelques feuilles éparpillées çà & là sur la tige. (Decand.)

6. ANDRIALE noirâtre. *Andryala nigricans*, Poir.

Andryala foliis inferioribus lyrato-pinnatis, pedunculis ramosis, tomento superiorum partium nigricante. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 228.

Andryala foliis pinnatifido-lyratis; floribus corymbosis, aggregatis; pedunculis calicibusque villosis-viscidis. Desfontaines, Flor. atlant. vol. 2. pag. 176.

Toute la plante a un aspect noirâtre. Ses tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, légé-

rement striées, très-rameuses, quelquefois presque simples, pubescentes, chargées, à leur partie supérieure, de poils glanduleux & visqueux. Les feuilles sont pétiolées, glabres ou à peine pubescentes, profondément pinnatifides; les décou-pures linéaires, lancéolées, un peu obtuses, entières, rarement denticulées; le lobe terminal plus grand. Les fleurs forment un corymbe terminal. Les pédoncules sont velus & rameux, accompagnés à leur base d'une foliole linéaire, subulée. Le calice est d'un brun-noirâtre, velu, cylindrique; ses écailles subulées, disposées sur deux rangs; les semences brunes, oblongues, petites; l'aigrette scissile, simple, blanchâtre, velue; le réceptacle pubescent & velu.

J'ai découvert cette plante en Barbarie, dans les environs de Lacalle. (V. v.)

7. ANDRIALE pinnatifide. *Andryala pinnatifida*, Ait.

Andryala foliis tomentosis, pinnatifidis; calicibus tomentosis, pilosis; piliis rigidissimis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 129.

a. *Andryala foliis pinnatifidis; pinnis distantibus, dentatis*. Ait. l. c.

b. *Andryala foliis profundè pinnatifidis; pinnis brevibus, integris*. Ait. l. c.

Ses tiges se divisent en rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, tomenteuses & pinnatifides; les pinnules sont distantes & dentées dans la variété a; elles sont profondes, courtes & entières dans la variété b; les calices tomenteux, chargés de poils roides. La première croît à Madère, la seconde aux Canaries. (V. f.)

8. ANDRIALE à feuilles de basilic. *Andryala erichmifolia*, Ait.

Andryala foliis pinnatis, linearibus, tomentosis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 129.

Dans cette espèce, les feuilles sont ailées & non pinnatifides, composées de folioles linéaires, tomenteuses; elles ressemblent à celles du *erichmum*.

Cette plante croît à l'île de Madère. (V. f.)

ANDROMÈDE. *Andromeda*. Une suite de jolis arbrutes, qui s'élèvent graduellement jusqu'à la hauteur des arbres de médiocre grandeur, compose le genre des andromèdes. Nées la plupart dans les contrées du Nord, sur des roches stériles, les unes habitent le sommet des hautes montagnes, & semblaient aux autres plantes alpines, elles nous étonnent par leur petitesse, par la délicatesse de leur feuillage, par la singularité de leur port, qui les a fait comparer à certaines espèces de mousses, dont elles portent le nom, telles que

Pandorædæ hypnoides, lycopodioides, &c. Elles ont aussi l'aspect de quelques bruyères, avec lesquelles elles ont en effet une grande affinité; mais à mesure qu'elles quittent les hautes Alpes, & qu'elles descendent sur les coteaux moins élevés ou dans les plaines, ces espèces ont un aspect tout différent: il faut l'œil exercé du botaniste pour les reconnoître comme appartenant au même genre: elles prennent la forme de grans arbrisseaux. Leurs feuilles ne sont plus serrées, petites, imbriquées; elles deviennent alternes, distantes, planes, ovales ou allongées, & s'affincent avec les arborescentes, dont elles ne diffèrent que par leurs fruits: tels nous voyons les saules, pygnées sur les Alpes, ombrager dans les plaines, par leur cime touffue, les bords des ruisseaux. Quoique les andromèdes ne se rencontrent la plupart que vers les cercles polaires, des voyageurs modernes en ont cependant découvert plusieurs belles espèces sur les montagnes des contrées équatoriales & australes. Toutes brillent par leurs jolies fleurs & par un feuillage élégant: elles ont l'ornement de ces plages désertes & de ces rochers arides, sur lesquelles la nature les a fixées. L'idée de ces belles fleurs relègues loin des plaines tantes, presque solitaires sur une pierre nue & glacée, a rappelé à Linné l'image de la belle Andromède sur son rocher; il leur en a donné le nom. On en cultive plusieurs espèces dans nos jardins, que l'on tient à l'ombre & au nord, dans un tertre un peu humide. Quelques-unes conservent leurs feuilles toute l'année. Nous ne trouvons dans les Anciens aucune indication qui fasse soupçonner que la connoissance des andromèdes ait eu lieu parmi eux. Les botanistes qui en ont parlé avant Linné les prennent pour des bruyères, des arbrisseaux ou des aînelles, trompés par le port de quelques unes & par les fleurs des autres, sans porter leur attention sur les autres parties de la fructification.

1. ANDROMÈDE tétragone, n°. 1. *Andromeda tetragona*. Linn. — Pallas, Flor. ross. 2. pag. 56. tab. 73. fig. 4.

2. ANDROMÈDE à feuilles de bruyère. *Andromeda coccinea*. Pall.

Andromeda foliis imbricatis, convexis, margine fetacco-silicatis; pedunculis foliariis, axillariis; corollis globosis. Willd. Spec. 2. pag. 608. — Pall. Flor. ross. 2. pag. 56. tab. 73. fig. 3.

Ce petit arbrisseau a le port d'une bruyère; il s'élève à la hauteur de dix à douze pouces. Ses tiges sont droites, rameuses, revêtues d'une écorce griseâtre; les rameaux épars, presque tétragons; les feuilles opposées, ovales-obtus, convexes, lissées & ciliées à leurs bords; les cils rougeâtres ou couleur de toulie; les fleurs pédonculées, solitaires, axillaires; les pédoncules courts, inclinés, le calice petit, verdâ-

tre, à quatre divisions; la corolle blanche, globuleuse; son limbe partagé en quatre lobes arrondis, très-courts, réfléchis; les étamines de huit à dix; les anthères bifides, l'ovaire globuleux. Le fruit consiste en une capsule à quatre ou cinq loges; aurant de valves, contenant des semences nombreuses, fort petites.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur les collines & les montagnes de la Daurie. 7

3. ANDROMÈDE de Stellère. *Andromeda stelleriana*.

Andromeda floribus terminalibus, subsessilibus, cernuis; foliis ellipticis, confertis. Pall. Flor. ross. 2. pag. 58. tab. 74. fig. 2.

Erica stelleriana. Willd. Spec. 2. pag. 387.

Cette espèce, ainsi que la précédente, a de grands rapports avec les bruyères. Leurs divisions variant de quatre à cinq, & ce dernier nombre étant le plus commun, elles semblent convenir davantage aux andromèdes. Celle-ci a ses tiges d'un brun-noirâtre, chargées de rameaux nombreux, cylindriques, inclinés; les feuilles opposées par paires ou ternées, presque sessiles, très-rapprochées, oblongues, elliptiques. Les fleurs sont terminales, presque sessiles, rougeâtres, inclinées; le calice, ainsi que la corolle, à quatre ou cinq divisions; celles de la corolle très-profondes, ovales, concaves; huit à dix étamines; les anthères à deux pointes; les capsules ovales, à cinq faces, à quatre ou cinq loges; autant de valves.

Cette plante croît au Kamtchatka.

4. ANDROMÈDE hypnoïde, n°. 2. *Andromeda hyaroides*. Linn. — Willd. Spec. 2. pag. 608.

5. ANDROMÈDE lycopode. *Andromeda lycopodioides*. Pall.

Andromeda foliis imbricatis, subulatis, globosis; pedunculis subgeminatis, axillariis; corollis campanulatis. Willd. Spec. 2. pag. 608. — Pall. Flor. ross. 2. pag. 55. tab. 75. fig. 1. — Gmel. Sibir. 4. pag. 150. tab. 57. fig. 1.

Peu différente de la précédente, elle est plus grande dans toutes ses parties; elle ressemble au lycopode, & forme des gazons touffus. Ses tiges sont érales & rampantes; les feuilles glabres, petites, imbriquées sur quatre rangs, en forme d'écaillés subulées; les fleurs blanches, solitaires ou gemmees; les pédoncules droits, filiformes; la corolle inclinée, campanulée, à cinq lobes aigus, très-ouverts; huit à dix étamines; les anthères rougeâtres, bifides; les capsules brunes, globuleuses, à cinq valves, s'ouvrant par le sommet.

Cette

Cette plante croît sur le penchant des montagnes, en Sibérie & au Kametchatka.

6. ANDROMÈDE à fleurs bleues, n°. 3. *Andromeda caerulea*. Linn.

Andromeda taxifolia. Pall. Flor. ross. 2. pag. 54. tab. 72. fig. 2.

Erica carulea. Willd. Spec. 2. pag. 387.

7. ANDROMÈDE musciforme, n°. 7. *Andromeda briantha*. Linn. — Pallas, Flor. ross. tab. 74. fig. 1.

Eisa bryantha. Willd. Spec. 2. pag. 386. — Thunb. Monogr. de Erica.

8. ANDROMÈDE couchée. *Andromeda prostrata*. Cavan.

Andromeda caule fruticofo, humifuso; foliis ovato-acutis, glabris, sparsis, subferratis; pedunculis axillaribus, foliatis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 43. tab. 362.

Ses tiges sont grêles, très-rameuses, étalées sur la terre, cylindriques, à peine longues d'un pied; ses feuilles glabres, éparfes, un peu charnues, petites, très-nombreuses, ovales, aiguës, longues d'environ deux lignes, larges d'une demi-ligne, vertes en dessus, veinées & de couleur de rouille en dessous, à peine denticulées à leurs bords, soutenues par des pétioles très-courts. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules simples, uniflores, plus courts que les feuilles, accompagnés de deux écailles à leur base. Le calice est glabre, divisé jusqu'à sa moitié en cinq découpures ovales; la corolle ovale-tubulée, de couleur rose-clair; le limbe divisé en cinq lobes courts, ovales; dix étamines; les filaments un peu velus; les anthères à trois pointes; la capsule un peu globuleuse, à cinq cannelures.

Cette plante croît sur les montagnes, au Pérou. (Description, ex Cavan.)

9. ANDROMÈDE à feuilles de camarine, n°. 4. *Andromeda campetrisolia*. Lam. — Commerf. Herb. — Willd. Spec. 2. pag. 609.

D'après les observations faites par l'auteur de l'ariste ANDROMÈDE, dans la nouvelle édition des arbres & arbruttes de Duhamel, cette plante est la même que l'*Arbutus pumila* Forst. Elle doit être conservée dans ce dernier genre, ayant pour fruit une baie succulente, & non une capsule.

10. ANDROMÈDE myrsine, n°. 5. *Andromeda myrsinites*. Lam. Ill. Gen. tab. 363. fig. 2.

Arbutus (microphylla), caule fruticofo; foliis ovatis, serratis, mucosis; pedunculis axillaribus, lioanque. Supplement. Tome I.

unifloris. Forst. Comm. Acad. Gœtt. vol. 9. p. 1787. pag. 32.?

11. ANDROMÈDE du Maryland, n°. 8. *Andromeda mariana*. Linn. — Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 466. & Collect. 2. pag. 326. — Duham. Arb. edit. nov. 1. pag. 177. tab. 37.

Cette espèce varie dans la forme de ses feuilles, qui sont tantôt ovales, tantôt plus allongées & oblongues.

12. ANDROMÈDE ferrugineuse. *Andromeda ferruginea*. Ait.

Andromeda pedunculis aggregatis, axillaribus; corollis subglobosis; foliis ellipticis, integerrimis, subius squamoso-farinosis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 67. — Vent. Hort. Malm. tab. 80. — Michx. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 252. — Walp. Flor. catol.

« Eadem (arborescens), foliis confertioribus, revolutis, convexis; floribus numerosis. Michaux, l. c.

β. Eodem (fruticosa), ramis sapiis flexuosis; foliis asperius alternis, acutioribus, planiusculis; subius prominulè reticulatis; floribus paucioribus. Michx. l. c.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, cylindriques, revêtus d'une écorce brune, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, aiguës ou un peu obtuses, très-entières, fêtrées en coin à leur base, d'un vert-foncé, presque glabres en dessus, parsemées en dessous de petites écailles pulvéreuses, de couleur de rouille, un peu velues sur leurs nervures & sur les jeunes pousses, longues de deux à trois pouces; les pétioles courts. Les fleurs sont blanchâtres, sans odeur, axillaires, aggrégées, soutenues par des pédoncules filiformes, longs de quatre à six lignes. Le calice est pulvéreux, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle globuleuse, à cinq dents; dix étamines une fois plus courtes que la corolle; les filaments velus, subulés. La capsule est ovale, blanchâtre, à cinq faces, à cinq valves, à cinq valves; les cloisons longitudinales, adhérentes au milieu des valves; les semences brunes, fort petites, nombreuses.

Cette plante, d'après Michaux, varie par son port & par sa grandeur. Dans la première, α, les tiges s'élèvent en arbre à la hauteur de douze à quinze pieds; elles sont droites, presque toujours simples; ses rameaux nombreux, rapprochés en faisceaux; les feuilles droites, nombreuses, rapprochées des rameaux, en très-grand nombre. La variété β est un arbruste à peine haut de deux ou trois pieds, dont les rameaux sont écartés, lâches & divergens; les feuilles moins nombreuses, formant avec la tige un angle très-ouvert; les fleurs rares, plus petites.

Y y

Cette plante est originaire de l'Amérique septentrionale. On la cultive dans les jardins de l'Europe. Ses fleurs se montrent pendant tout l'été. (V. v.)

13. ANDROMÈDE à feuilles de cassine. *Andromeda cissi-folia*. Vent.

Andromeda pedunculis aggregatis; corollis campanulatis; foliis ovatis, dentatis, utrinque glabris. Vent. Hort. Cels. pag. 60. tab. 60.

Andromeda (speciosa, var. *n.*, nitida). Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 256.

Andromeda (pulverulenta), *foliis subint niveo pulvere confectis*. Travels of Barrtram. vol. 2. tab. 2. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. 2. pag. 610. — Vent. Hort. Malm. tab. 79.

Cette plante a beaucoup de rapport avec l'*Andromeda mariana*; elle s'en distingue par ses corolles en cloche & par ses feuilles dentées. Ses tiges sont glabres, droites, rameuses, cylindriques, roussâtres vers leur sommet; les rameaux alternes, garnis de feuilles pétioles, glabres, ovales, dentées, munies d'une glande au sommet de chaque dent; planes, coriaces, veinées, à peine aiguës, d'un vert-foncé, subsistants pendant l'hiver; les pétioles courts, très-ouverts. Les fleurs sont axillaires, fasciculées; les pédoncules glabres, cylindriques, longs de six lignes, d'abord recourbés, puis redressés après la floraison. Le calice est d'un vert-blanchâtre, à cinq divisions ovales, aiguës; la corolle d'un blanc de lait, peu odorante, insérée sur un disque glanduleux; campanulée, à cinq lobes ovales, réfléchis à leur sommet; dix étamines de moitié plus courtes que la corolle; les anthères vacillantes, linéaires, surmontées de quatre aètes. L'ovaire est libre, globuleux, entouré de dix glandes à sa base; la capsule globuleuse, pentagone, ombiliquée à son sommet, divisée en cinq loges, s'ouvrant en cinq valves; les cloisons membracées, adhérentes au milieu des valves; les semences glabres, noirâtres, adhérentes à un placenta central, dont les angles sont faillants dans les loges. La variété *n* ne diffère de la précédente qu'en ce que ses feuilles sont couvertes en dessous d'une poussière blanchâtre, & parsemées de quelques poils.

Cette plante croît dans la Caroline & à la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

14. ANDROMÈDE fasciculée. *Andromeda fasciculata*. Swartz.

Andromeda pedunculis aggregatis; foliis alternis, ovato-lanceolatis, obtusis, subcrenatis, coriaceis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 836.

Elle se distingue de l'*Andromeda mariana* par ses feuilles plus longues, plus obtuses, coriaces. Son tronc s'élève à la hauteur d'un arbre de médiocre grandeur. Ses rameaux sont lisses, cylindriques, un peu anguleux; ses feuilles ovales-lancéolées, longues de deux ou trois pouces, à peine crenelées, glabres, persistantes. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, solitaires, plus courtes que les pétioles. Leur calice est fort petit, à cinq découpures courtes, aiguës; les capules oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, obscurément pentagones, à cinq cannelures, à cinq loges, s'ouvrant au sommet; les semences oblongues, fort petites.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque. (Swartz.)

15. ANDROMÈDE de la Jamaïque. *Andromeda jamaicensis*. Swartz.

Andromeda pedunculis aggregatis; corollis ovatis, diaphanis; foliis alternis, lato-lanceolatis, obtusis, integerrimis, subius cinereis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 838.

Ses tiges sont droites, lisses, hautes de six à sept pieds; les rameaux anguleux, striés, pubescents, blanchâtres; les feuilles alternes, pétioles, élargies, lancéolées, obtuses, très-entières, presque luisantes en dessus, cendrées & couvertes d'écaillés rouillées en dessous; les pétioles courts, un peu comprimés; les fleurs aggrégées, axillaires; les pédoncules courts, simples, réfléchis, uniflores. Le calice est terminé par cinq dents courtes; la corolle ovale, point cylindrique, transparente, de couleur aqueuse, parsemée de petites écaillés blanchâtres, luisantes; l'orifice resserré; le limbe à cinq lobes très-courts, un peu réfléchis; dix étamines insérées à la base du tube de la corolle; les anthères bifides; l'ovaire arrondi; il lui succède une capsule ovale, pentagone, contenant des semences brunes, nombreuses, fort petites.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque. (Swartz.)

16. ANDROMÈDE octandrique. *Andromeda octandra*. Swartz.

Andromeda pedunculis aggregatis; corollis cylindricis, quadrifidis; foliis alternis, ovato-lanceolatis, integris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 840.

Arbuste dont les tiges s'élèvent à douze ou quinze pieds, divisées en rameaux lâches, érales, glabres, striés, cylindriques, un peu roussâtres, garnis de feuilles alternes, pétioles, lancéolées, ovales, acuminées, étalées, très-entières, soutenues par des pétioles glabres, courts, un peu comprimés. Les fleurs sont réunies dans les aisselles des feuilles; les pédoncules très-courts, réfléchis. Le calice est

divisé en quatre dents presque planes; la corolle cylindrique, blanche, de la grandeur de celle de l'*Andromeda polifolia*, à quatre faces peu marquées; le limbe divisé en quatre lobes très-courts, aigus, un peu recourbés; huit filemens; les anthères bifides; l'ovaire un peu hérissé, tétragone, ovale, acuminé: il lui succède une capsule oblongue, acuminée, un peu tétragone, à quatre loges polyspermes.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les montagnes les plus élevées. *h* (Swartz.)

17. ANDROMÈDE à feuilles repliées, n°. 6. *Andromeda polifolia*. Linn. — Mich. Flor. borcal. Amer. 1. pag. 154. — Duhm. Arb. edit. nov. 1. pag. 183. tab. 38. — Pall. Flor. ross. pag. 53. tab. 71. — Lam. Ill. Gen. tab. 365. fig. 1.

Rhododendron polifolium. Scopul. Catn. n°. 482.

a. *Andromeda* (latifolia), foliis oblongis; corollis ovatis, incarnatis; laciniiis calicinis patentibus, ovatis, albis, interdum apice rubicundis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 68. — Lam. var. *β*.

β. *Andromeda* (media), foliis lanceolatis; corollis oblongo-ovatis, rubicundis; laciniiis calicinis magis erectis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 68.

γ. *Andromeda* (angustifolia), foliis lanceolato-linearibus; laciniiis calicinis oblongis, rubris. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 68.

Andromeda canadensis, &c. Lam. var. γ.

δ. *Andromeda* (subulara), foliis lineari-subulatis. Duhm. Arb. edit. nov. 1. pag. 183.

Elle varie dans la grandeur & la forme de ses feuilles. Ces variétés sont moins dépendantes de la culture que du lieu natal de cette plante, qui croît également en Europe, en Asie & en Amérique.

18. ANDROMÈDE crépue. *Andromeda crispata*. Hort. Paris.

Andromeda foliis lineari-lanceolatis, punctatis, crispis, subsulcatis; floribus subsiliatis, spicatis. (N.)

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, alternes, cylindriques, presque glabres, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, linéaires-lanceolées, longues d'un pouce & plus, larges de deux ou trois lignes, entières, crépues à leurs bords, un peu pileuses, principalement dans leur jeunesse; obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, vertes, & parsemées en dessus de points blanchâtres, tuberculeux, d'une couleur cendrée obscure en dessous; les feuilles supérieures graduellement plus petites. Il sort de l'aisselle de chacune d'elles une fleur médiocrement pédonculée, presque droite, formant par leur ensemble un épi terminal. Le calice est dur, cendré, à cinq découpu-

res droites, étroites, persistantes; la corolle d'un blanc-jauvâtre, petite, tubuleuse, une fois plus longue que le calice, divisée à son limbe en cinq lobes courts, obtus, réfléchis en dehors; dix étamines plus courtes que la corolle; un style droit, plus long que les étamines; le stigmate obtus. Les fruits ne me sont point connus.

J'ignore le lieu natal de cette plante, qui a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. f. in herb. Desfont.)

19. ANDROMÈDE à feuilles de saule, n°. 16. *Andromeda foliolifolia*. Lam. — Smith, Icon. Plant. ined. 1. tab. 38.

20. ANDROMÈDE à feuilles de buis, n°. 17. *Andromeda buxifolia*. Lam. — Smith, Icon. Plant. ined. 1. tab. 59.

21. ANDROMÈDE à feuilles de poirier. *Andromeda pyrifolia*. Persl.

Andromeda arborescens, cortice sulcato-striato, foliis ovato-acuminatis. Persl. Synops. Plant. vol. 1. pag. 481.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ vingt pieds. Elles sont revêtues d'une écorce striée, profondément sillonnée; les rameaux garnis de feuilles glabres, alternes, ovales, entières, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont d'une couleur pourpre très-foncée, disposées en une panicule glabre. Elle a été observée à l'île de Bourbon par M. du Petit-Thouars. *h*

22. ANDROMÈDE à feuilles d'yeuse. *Andromeda ilicifolia*. Persl.

Andromeda foliis cordatis, latis, coriaceis, subdentatis; floribus racemoso-paniculatis. Persl. Synops. Plant. 1. pag. 481.

Ses rameaux sont alternes, chargés de feuilles légèrement pétiolées, alternes, ovales & entières dans leur jeunesse, puis plus grandes, élargies, coriaces, échancrées en cœur, munies à leur base de quelques dents écartées. Les fleurs sont disposées en grappes rameuses, presque paniculées. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante croît au Pérou, où M. Lagasca en a fait la découverte. (*Persl.*)

23. ANDROMÈDE pubescente. *Andromeda pubescens*.

Andromeda foliis ovatis, coriaceis, obtusis, subtus pubescentibus; racemis brevissimis, subsajciulatis; capsulis quinquecostatis. (N.)

Andromeda (rubiginosa), foliis ovatis, coriaceis, integerrimis, obtusis, subtus pubescentibus, junioribus rubiginosis; racemis lateralibus, erectis; *Y y 2*

corollis cylindricis. ? Petfoon, Synopf. Plant. 1. pag. 481.

Tout me porte à croire que cette plante est la même que celle mentionnée par M. Petfoon. Ses jeunes feuilles, dans les individus que je possède, ne sont point rouillées, mais seulement parsemées de petits points roussâtres & nombreux. C'est un arbrisseau de huit à dix pieds de haut. Ses rameaux sont glabres, élanés, rougeâtres, un peu comprimés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, res-coriacées, obtuses ou à peine aiguës, très-entières, glabres, réticulées, presque luisantes en dessus, nerveuses & pubescentes en dessous, longues de deux ou trois pouces, larges d'un pouce & plus. Les fleurs sont axillaires, presque fasciculées, disposées en petites grappes simples, d'abord inclinées, puis redressées, un peu plus longues que les pétales. Les capsules sont dures, un peu cendrées, presque cylindriques, obtuses, à cinq côtes saillantes; les semences petites, orbiculaires, attachées à un placenta central.

Cette plante a été découverte par M. Ledru à l'île de Saint-Thomas. Elle croît sur les rochers. (V. f. Comm. Ledru.)

24. ANDROMÈDE du Japon. *Andromeda japonica*. Thunb.

Andromeda racemis paniculatis, cylindricis, bracteatis; foliis ellipticis, reflexis, apice serratis. Thunb. Flor. jap. 181. tab. 22.

C'est un arbre d'un port agréable, dont les rameaux sont réunis presque en ombelle, trois par trois & plus, glabres, striés, rougeâtres, anguleux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, rassemblées par touffes au sommet des petits rameaux; ovales-lancéolées, glabres, nerveuses, réfléchies, longues de deux pouces, légèrement dentées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes simples, terminales, pédicellées. Le calice est pentagone, à cinq divisions profondes, lancéolées; la corolle blanche, presque cylindrique, trois fois plus longue que le calice, monopétale, à cinq lobes; dix étamines; une capsule presque globuleuse, à cinq angles convexes.

Cette plante croît au Japon. b

25. ANDROMÈDE en arbre, n°. 13. *Andromeda arborea*. Linn. — Air. Hort. Kew. 2. pag. 69. — Desfont. Arb. 1. pag. 257. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 255.

Ses feuilles ont une saveur acide, comme celles de l'oselle. Les habitants des États-Unis de l'Amérique les emploient en décoction pour calmer la soif, & tempérer l'ardeur de la fièvre dans les maladies inflammatoires. Son bois est fort dur, & pourroit être employé avec avantage.

26. ANDROMÈDE paniculée. *Andromeda paniculata*. Linn.

Andromeda floribus paniculato-racemosis, pubescentibus, nudifloris; foliis ovatis, acutis, integris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 254. — Air. Hort. Kew. 2. pag. 59.

Andromeda racemosa. ? Lam. Dict. n°. 11. — Walth. Carol. 138.

a. *Andromeda (nudiflora), racemis nudis; floribus subsessilibus, laxis seu congestis*. Mich. l. c.

b. *Andromeda (foliosiflora), racemis foliosis, floribus glabellis seu subtomentosis*. Mich. l. c.

Andromeda (parabólica), foliis parabolicis obovatisque, integerrimis, subtus serratis; floribus paniculatis, foliosis; pedunculis aggregatis; corollis sphaericis, villosis. Duhamel, Arb. edit. nov. 1. pag. 191.

D'après les observations de Michaux, l'Andromède à grappes (Lam. n°. 12) est celle que Linné a nommée *andromeda paniculata*, qui offre des difficultés par ses variétés nombreuses. Les feuilles sont membraneuses, plus ou moins pubescentes à leurs deux faces, quelquefois nues, très variables dans leur forme & leur grandeur, souvent obicurement denticulées. Les fleurs font disposées en grappes légèrement ramifiées ou paniculées, nues ou feuillées, plus ou moins pédicellées; les corolles glabres ou pubescentes.

27. ANDROMÈDE à grappes. *Andromeda racemosa*. Linn. — Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 255.

Andromeda racemis secundis, bracteatis, subsimplicibus, nudis; corollis gibbois cylindricis; foliis oblongis, serratis.

Andromeda paniculata. Walth. Flor. carol. 138. — Lam. Dict. n°. 11. ? (Exclus. Catesb. synon.) — Duham. Arb. edit. nov. 1. pag. 179.

Ces deux espèces ont tant de rapport, que leur distinction offre de grandes difficultés pour la synonymie. J'ai suivi l'opinion de Michaux. Les feuilles sont ovales-lancéolées, quelquefois simplement ovales, membraneuses, légèrement denticulées; les épis presque sessiles, nus, unilatéraux, alongés; les corolles cylindriques; les étamines terminées par quatre arêtes; chaque fleur munie en dessous de deux petites bractées.

28. ANDROMÈDE axillaire, n°. 10. *Andromeda axillaris*. Lam. — Duham. Arb. edit. nov. 1. pag. 186. tab. 39. — Air. Hort. Kew. 2. pag. 69. — Lam. Ill. tab. 365. fig. 3.

Andromeda (Catesbii), racemis ovatis, axillaribus, simplicibus; corollis oblongis; foliis ovatis, acutis, serrulatis. Walth. Flor. carol. pag. 137.

Elle varie à feuilles ovales & à feuilles oblongues, acuminées.

29. ANDROMÈDE à feuilles de peuplier, n°. 14. *Andromeda populifolia*. Lam.

Andromeda (laurina), glaberrima, foliis oblongo-ovalibus, superne sessilem angustatis, integris serrulatis; racemulis axillaribus, nudis; corollâ cylindricâ; antheris muticis, basi sessile gibbis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 254.

Andromeda acuminata. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 70. — Willd. Arb. 22. — Duham. Arb. 1. pag. 194. tab. 42.

Andromeda reticulata. Walth. Flor. carol. t. 37.

Andromeda lucida. Jacq. Ic. Rar. t. tab. 79, & Coll. Ct. t. pag. 95.

Andromeda formosissima. Bartram.

Les feuilles se présentent sous deux aspects différents, & donnent lieu à deux variétés. Dans la première elles sont ovales-lancéolées, rétrécies à leur base, crénelées ou profondément dentées en scie; dans la seconde elles sont ovales-acuminées, arrondies à leur base, lisses, luisantes, très-entières. Ces deux sortes de feuilles se retrouvent quelquefois sur le même individu. Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, nues, sessiles, inclinées, pédicellées; une petite écaille aiguë à la base des pédicelles. Elles répandent une odeur très-suave, approchant de celle du miel. Leur calice est fort petit, d'une seule pièce, glabre, à cinq divisions aiguës; la corolle très-blanche, cylindrique, à cinq dents réfléchies; dix étamines plus courtes que la corolle; les filaments velus; les anthères bifides; les capsules globuleuses, pentagones, contenant des semences jaunâtres, oblongues, fort petites.

Les peuplades sauvages de la Floride, les Chiroquois & les Natchez se servent des riges & des rameaux pour faire leurs *calumets*. Un habitant des États-Unis, qui a voyagé chez ces nations à demi civilisées, nous assure que, dans leur idiôme, ils donnent le nom d'*arbre de calumets* à cette espèce d'*andromède*, à cause de l'usage qu'ils en font. (Duham. édit. nov.)

30. ANDROMÈDE luisante, n°. 9. *Andromeda lucida*. Lam.

Andromeda nitida. Bartram. Walth. Flor. carol. pag. 137. — Mich. Flor. bot. Amer. 1. pag. 252.

Andromeda coriacea. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 70.

Andromeda marginata. Duham. édit. nov. t. pag. 188. tab. 40.

31. ANDROMÈDE caliculée. *Andromeda calyculata.* Linn. — Lam. Ill. tab. 365. fig. 4. — Pallas, Flor. ross. pag. 53. tab. 72. fig. 1. — Mich. Flor.

borel. Amer. 1. pag. 254. — Duham. Arb. édit. nov. 1. pag. 189. tab. 41.

32. ANDROMÈDE veinée, n°. 18. *Andromeda anaphomifans.* Linn. Suppl.

3. *Andromeda (glomerata), foliis ovato-acutis; racemis axillaribus, glomeratis; corollis glabris, bracteis pedunculo longioribus.* Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 41.

La plante & de Cavanilles a de tels rapports avec celle de Linne, qu'elle paroît n'en être qu'une variété. Ses tiges sont cylindriques, hérissées de poils roussâtres; ses feuilles ovales-aiguës, à peine denticulées, coriaces, vertes & luisantes en dessus, ponctuées, pileuses & couleur de rouille en dessous. Les fleurs sont disposées en grappes courtes, axillaires, presque agglomérées, séparées par des bractées glabres, ovales, aiguës. Le calice est velu; la corolle glabre, ovale-tubuleuse, d'un rouge-tendre; le limbe divisé en cinq lobes courts, ovales.

Cette plante croît au Pérou. h (Cavan.)

33. ANDROMÈDE à grandes bractées. *Andromeda bracteata.* Cavan.

Andromeda foliis ovato-acutis; racemis terminalibus, bracteatis; caule hirsuto. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 42. tab. 362. fig. 1.

Cette espèce, très-rapprochée de la précédente, en diffère par ses grandes bractées, très-différentes des feuilles. Ses tiges sont longues d'un pied & demi, munies de rameaux alternes, cylindriques, hérissées de poils caducs, couleur de rouille; les feuilles ovales-aiguës, obscurément denticulées, coriaces, longues d'un pouce & demi, sur un de large; couvettes en dessous, principalement dans leur jeunesse, de poils roux, sortant d'un point tuberculé; les pétioles courts, très-velus. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, souvent longues de deux pouces, fourrées chacune par un pédoncule simple, uniflore, velu, muni à la base d'une bractée ovale, aiguë, concave, scarieuse à ses bords; deux autres petites bractées sur ces mêmes pédoncules. Le calice est tomenteux, couleur de rouille; la corolle tubulée, d'un rose-clair, à cinq découpures droites, ovales, aiguës; dix filaments courts, un peu velus; les anthères à deux loges, à deux pointes. Le fruit est une capsule globuleuse, à cinq sillons, à cinq loges, renfermant des semences glabres, ovales, comprimées, fort petites, acuminées à leur base, d'un jaune de rouille.

Cette plante croît sur les montagnes au Pérou. h (Descript. ex Cavan.)

34. ANDROMÈDE des rochers, n°. 20. *Andromeda rostrata.* Linn. Suppl.

Andromeda racemis simplicifolia, bracteatis; corollis campanulatis; foliis alternis, oblongis, serratis. Forst. Prodr. n°. 195. — Duh. m. Arb. edit. nov. 1. pag. 182.

Arbusteau dont les tiges sont droites, rameuses, cylindriques, revêtues d'une écorce d'un gris-brun, garnies de feuilles glabres, oblongues, dentées en scie, fourmues par des pétioles très-courts. Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, disposées en petites grappes simples, très-courtes, munies de bractées. Le calice est d'une seule pièce, persistant, à cinq découpures; la corolle campanulée; le limbe divisé en cinq lobes courts; dix étamines; un ovaire globuleux; le style de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate simple. (Duh. m. edit. nov.)

35. ANDROMÈDE rhomboïdale. *Andromeda rhomboïdalis.*

Andromeda ramis floriferis, triquetris; foliis rhomboïdatis lanceolatisque, integerrimis, cartilagineis, glabris; glandulis terminatis; pedunculis axillaribus, aggregatis. Duh. m. Arb. edit. nov. 1. pag. 192.

Arbusteau à tiges droites, cendrées, chargées de rameaux nombreux, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, épaisses ou alternes, presque imbriquées, rhomboïdales ou ovales-lancéolées, cartilagineuses, très-entières, recouverts à leurs bords, glabres & luisantes en dessus, souvent rouillées en dessous, terminées par une glande calcaire & mucronée. Les fleurs sont réunies au nombre de trois à six dans l'aisselle des feuilles, fourmues par des pédoncules filiformes, blanchâtres. Le calice est roufféâtre, pulvérescent, à cinq divisions courtes, ovales, aiguës; la corolle blanche, ovoïde, glabre, à cinq dents; dix étamines plus courtes que la corolle; les anthères oblongues, sans arêtes; l'ovaire arrondi, lanugineux; le style glabre; le stigmate obtus; la capsule ovoïde, pentagone, brune, laineuse vers sa base; les semences brunes, minces, allongées.

Cette plante croît dans la Caroline méridionale & la Floride. (Duh. m. edit. nov.)

36. ANDROMÈDE ériophylle. *Andromeda eriophylla.* Vand.

Andromeda racemis secundis, terminalibus, bracteatis; corollis ovatis; foliis alternis, ovatis subrotundis, integerrimis, supra tomentosis, infra lanatis, glandulis cylindricis terminatis. Vandell. Flor. lusit. & bras. Spec. — Duh. m. edit. nov. 1. pag. 196.

Arbusteau dont les tiges se divisent en rameaux alternes, cylindriques, un peu pubescents, d'un gris-cendré, garnis de feuilles pétioles, alternes, très-entières, planes, ovales, presque rimbées, entières à leurs bords, tomenteuses à leur face supérieure, lanugineuses & cendrées en dessous, longues

d'environ deux pouces, terminées par une glande cy'in lrique, fourmues par des pétioles courts & vultus. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, unilatérales, pédonculées, munies de bractées. Le calice se divise en cinq découpures ovales-aiguës. La corolle est urcéolée, à cinq divisions courtes; dix étamines plus courtes que la corolle; l'ovaire légèrement anguleux; le style filiforme; le stigmate obtus.

Cette espèce a été découverte au Brésil par M. Vellozo, botaniste portugais. (5)

ANDROPOGON. (Voyez BARBON.)

ANDROSACE. Les androsaces sont la plupart des plantes originales des hautes montagnes des Pyrénées & des Alpes. La nature les a destinées à couvrir la nudité de ces roches arides & glacées. Quel que soit l'aspect sauvage de ces lieux si élevés au dessus des plaines fertiles, si long-temps enlevés sous une couche uniforme de neiges, dès que celles-ci viennent à disparaître, l'œil est flatté tout à coup d'un spectacle inattendu, en contemplant ces gazonz touffus composés de différentes espèces d'androsaces, qui remplacent les frimats; plantes naines, mais qui dans leur petitesse ont une élégance qui leur est particulière. M. de Lamarck a réuni les *arecia* aux *androsaces*.

* Fleurs disposées en ombelles. ANDROSACE. Linn.

1. ANDROSACE à grand calice. *Androsace maxima.* Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 1.

3. ANDROSACE septentrionale. *Androsace septentrionalis.* Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 2. (Exclus. Gmel. synonym.)

4. ANDROSACE filiforme. *Androsace filiformis.* Retz.

Androsace foliis ovatis, dentatis, petiolatis; umbellae radis capillaribus; corollis calicem campanulatum excedentibus. Retz. Observ. 2. pag. 10. — Willd. Spec. 1. pag. 797.

Androsace foliis petiolatis, rotundioribus. Gmel. Sibir. 4. pag. 81. tab. 44. fig. 4.

Il paroît que cette plante avoit été confondue avec la précédente; elle en diffère par ses feuilles ovales, par la corolle plus longue que le calice, & par plusieurs autres caractères. Ses racines sont courtes & fibreuses; ses feuilles pétioles, ovales, denticulées, de couleur glauque. De leur centre s'élèvent deux ou quatre hampes filiformes, striées, terminées par une ombelle simple, de six à seize fleurs, dont l'involute est composé de plusieurs folioles filiformes, très-courtes. Le calice est court, campanulé, pentagone; la corolle

petite, blanchâtre, surpassant le calice par un limbe à cinq lobes entiers.

Cette plante croît dans la Sibérie. ○ (Descript. ex Retz.)

5. ANDROSACE odorante. *Androsace odoratissima*. Willd.

Androsace foliis triquetris, lanceolatis, ciliatis; umbellæ radiis brevibus; perianthiis angulatis, corollæ brevioribus. Willd. Spec. Plant. pag. 758.

Androsace orientalis, foliis coriis, flore odoratissimo. Tournef. Coroll. 5.

Androsace foliis triquetris, ciliatis; perianthiis hirsutis. Schreb. Decad. pag. 7. tab. 4.

Cette plante a de petites feuilles routes radicales, lancéolées, à trois faces, ciliées à leurs bords. Les hampes se terminent par une petite ombelle à rayons courts. Les fleurs sont très-odorantes; les calices anguleux, hérissés de poils, plus courts que la corolle.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Cappadoce. ♀

6. ANDROSACE velue, n°. 4. *Androsace villosa*. Linn. — Jacq. Collect. t. pag. 195. tab. 12. fig. 3. (Excluf. synonym. Jacq. Austr. tab. 332, & Cluf.)

7. ANDROSACE trompeuse. *Androsace chamajasma*. Jacq.

Androsace foliis lanceolatis, basi angustatis, marginibus ciliatis; perianthiis hirsutis. Willd. Spec. t. pag. 799.

Androsace (chamajasma), foliis ciliatis, perianthiis hirsutis. Hoff. Synopf. 95. — Jacq. Collect. t. pag. 194.

Androsace villosa. Jacq. Austr. tab. 332.

Chamajasma alpina. Bauh. Hist. 3. pag. 869. Ic.

Sedum minus decimum, alpinum quartum. Cluf. Hist. 2. pag. 62. Icon.

Sedum alpinum, atherum, quartum, latæ flore. Cluf. Pann. 489. Ic.

Elle peut se confondre assez facilement avec l'androsace velue : on l'en distingue par ses feuilles bien moins velues, simplement ciliées à leurs bords, lancéolées, rétrécies à leur base, disposées en rosette. Les hampes sont plutôt pubescentes que velues, ainsi que les calices, de moitié plus courts que les corolles. Les poils sont rameux sur les pédoncules, simples sur les feuilles. Les fleurs sont blanches, disposées en ombelle. Elle croît sur les rochers, dans les Hautes-Alpes. ♀. (V. f.)

8. ANDROSACE à feuilles obtuses. *Androsace obtusifolia*. All.

Androsace foliis lanceolatis, basi angustatis, glabris; perianthiis angulatis, pubescentibus. Willd. Spec. t. pag. 799. — Allion. Pedem. n°. 326. tab. 46. fig. 1, & Spec. t. pag. 22. tab. 4. fig. 2.

Androsace laeta. Villars, Dauph. 2. pag. 476. (Excluf. Linn. synonym.)

Androsace foliis ellipticis, lanceolatis, glabris; seapis umbellatis. Haller, Helv. n°. 621.

9. *Androsace (brevifolia), foliis petiolatis, lanceolatis, hispidis; pedunculis involucri quadruplo longioribus*. Willars, Dauph. vol. 2. pag. 480. tab. 15.

Quoique très-rapprochée de la précédente par son port, cette espèce s'en distingue par ses feuilles glabres, lancéolées, plus longues, obtuses, rétrécies en pétiole à leur base. De leur centre s'élèvent une ou plusieurs hampes droites, longues, presque glabres, filiformes, cylindriques, terminées par une petite ombelle à rayons pubescens. L'involucre est composé de plusieurs folioles lancéolées, droites, aiguës, pubescentes, un peu plus courtes que les rayons. Le calice est anguleux, verdâtre, pubescent; la corolle blanchâtre, une fois plus longue que le calice. Dans la variété 9, les feuilles sont plus courtes, un peu hispides; les rayons beaucoup plus longs que les involucre.

Cette plante croît en Suisse, en Italie & dans les Alpes du Dauphiné. ○ (V. f.)

9. ANDROSACE blanche. *Androsace incana*. Lam.

Androsace piloso-incana, foliis lanceolatis, minimis, sericatis, glomerato-aspidosis; pedicellis involucri longioribus. Lam. Ill. tab. 1. pag. 432. n°. 1947.

An androsace? Gmel. Sibir. 4. pag. 82. n°. 27.

Du collet de ses racines sort un petit paquet de feuilles agglomérées, ramassées en gron, blanchâtres, foyeuses, fort petites, lancéolées. De leur centre s'élèvent des hampes droites, pileuses & blanchâtres, qui soutiennent une petite ombelle accompagnée d'une collerette plus courte que les pédoncules; les calices sont pubescens, coronneux.

Cette plante a été découverte en Sibérie par M. Patrin.

10. ANDROSACE laïcée, n°. 5. *Androsace laïcea*. Linn. Non Allion.

Androsace (pauciflora). Villars, Dauph. 2. pag. 477. tab. 15.

11. *ANDROSACE* couleur de chair, n°. 6. *Androsace carnea*, Linn.

6. *Aretia* (Halleri), *foliis ciliatis*, Linn. Spec. 1. pag. 142. — Hal. Helv. n°. 719. tab. 17.

7. *Androsace fœpis unifloris*, Decand. Flor. franç. 3. pag. 442.

Cette espèce offre deux variétés, remarquables toutes deux par leurs feuilles bordées de petits cils. La seconde, découverte dans les Alpes par M. Decandolle, au sommet du col Saint-Remi, à environ 3,500 mètres de hauteur, se distingue par l'absence totale de la hampe & de l'involuture, de sorte que ses fleurs sont pédicellées, nombreuses & entre-mêlées avec les feuilles. A mesure qu'on s'élève dans les montagnes, on voit la hampe diminuer de longueur, & on arrive ainsi, dit M. Decandolle, à réunir dans la même espèce, des plantes que quelques botanistes ont placées dans des genres différents.

12. *ANDROSACE* spatulée. *Androsace spatulata*, Cavan.

Androsace foliis caespitosis, spatulatis; floribus corymbo-racemosis, Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 56. tab. 484. fig. 1.

Ses racines sont fasciculées, cylindriques; les feuilles étalées en rosette, glauques, spatulées, longues d'un demi-pouce, rétrécies en pétiole, toutes radicales; il s'en élève une hampe cylindrique, d'un rouge-foncé, haute de six à huit pouces, terminée par des fleurs presque disposées en corymbe. Les pédoncules sont alternes, simples, filiformes, nus à leur base, munis, un peu au dessous du calice, d'une petite bractée linéaire, aiguë. Le calice est rougeâtre, divisé jusque vers sa moitié en cinq découpures presque linéaires, aiguës; la corolle d'un rouge-incarnat, en forme de soucoupe; son tube ovale, un peu plus long que le calice; le limbe à cinq lobes ovales, une petite pointe subulée entre chaque lobe; cinq étamines insérées dans le tube, plus courtes que la corolle; les anthères ovales; l'ovaire ovale-conique; le style de la longueur de deux étamines; le stigmate globuleux; la capsule plus grande que le calice, à une loge, à cinq valves; plusieurs semences attachées à un réceptacle central.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Cavan.)

* *Fleurs solitaires*. *ARETIA*, Linn.

13. *ANDROSACE* imbriquée, n°. 7. *Androsace imbricata*, Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 4.

Androsace diaphana, Villars, Dauh. h. vol. 2. pag. 472.

Androsace helvetica, Allion. Pedem. n°. 327.

Diapensia helvetica, Linn. Spec. 103.

6. *Aretia tomentosa*, Schleich. Centur. Ext. n°. 22.

Dans la variété 6 le duvet est plus abondant, & les fleurs sont latérales & terminales.

14. *ANDROSACE* des Alpes, n°. 8. *Androsace alpina*, Linn. — Lam. Ill. tab. 98. fig. 3. — Jacq. Ault. 5. tab. 18.

Androsace aretia, variété 8 & 9. Vill. Dauph. 2. pag. 473.

Les fleurs, d'un bleu lilas, sont quelquefois blanches. Les capsules renferment dix à douze graines, selon M. Villars. La gorge de la corolle est bordée d'un cercle jaune; les lobes souvent échançrés à leur sommet.

15. *ANDROSACE* des Pyrénées. *Androsace pyrenaica*, Lam.

Androsace foliis linearibus, subius carinatis, ciliato-hispidis; floribus pedunculatis, calice glabro, Lam. Ill. vol. 1. pag. 432. n°. 1953.

Androsace diaphanoides, Lapeyr. Flor. Pyren. 1. n°. 3. tab. 3.

Cette espèce ressemble à l'*Androsace pubescente* par son port & ses feuilles hérissées de poils simples; mais ses feuilles sont relevées en carène, plus longues, ciliées à leurs bords, étalées, & presque recourbées vers le bas de la plante. Les fleurs sont solitaires, soutenues par des pédoncules allongés, un peu recourbés à l'époque de la maturité, légèrement pubescentes. Leur calice est glabre, à cinq découpures droites, obtuses; la corolle blanche; la capsule de la longueur du calice.

Cette plante croît dans les Pyrénées, sur les rochers couverts de mousse. (V. f.)

16. *ANDROSACE* pubescente. *Androsace pubescens*, Decand.

Androsace foliis oblongis, planis, pubescentibus; pilis simplicibus; pedunculis axillaribus terminalibusque, folio brevioribus, Decand. Synopf. pag. 206. n°. 1352.

Androsace aretia, variété 8. Villars, Dauph. 2. pag. 474.?

Cette plante a été jusqu'ici confondue avec l'*Androsace* de Alpes, dont elle a en effet le port; mais elle en diffère, dit M. Decandolle, en ce qu'elle est pubescente & non tomenteuse, ainsi que par ses poils simples & non tam ux. On peut encore la confondre, lorsqu'elle n'est pas en fleurs, avec l'*Androsace chamaejasme*; mais elle se distingue de longs pédoncules de poils rameux, tandis que la nôtre a des pédicell. très-courts & garnis

garnis de poils simples. Sa racine, bruyante & presque ligneuse, pousse plusieurs tiges rameuses, nues à leur partie inférieure, garnies de feuilles sèches & étalées dans le milieu, terminées par une rosette de feuilles étalées, point serrées ni imbriquées; elles sont oblongues, planes, pubescentes. Les fleurs sont solitaires, latérales ou terminales, portées sur un pédoncule plus court que les feuilles. Les calices font divisés en cinq lobes aigus & pubescens. La corolle est blanche, avec la gorge jaune & glanduleuse. La capsule s'ouvre en cinq valves renversées en dehors, plus longues que les lobes du calice; elle contient quatre à cinq semences.

Cette plante croît sur les montagnes alpines. π (Decand.)

17. ANDROSACE cylindrique. *Androsace cylindrica*. Decand.

Androsace foliis oblongis, pilosis; pilis simplicibus; pedunculis subterminalibus, longis, pilosis; calice simpliciter. Decand. Synopf. pag. 206. n°. 2354.

Elle se distingue par ses feuilles oblongues & non linéaires, étalées en rosettes, hérissées de poils simples; elles sont persistantes après leur dessiccation; & comme la tige s'allonge chaque année sans se ramifier, elles forment une colonne serrée & cylindrique. Les fleurs naissent vers le sommet des tiges, portées sur des pédoncules grêles, hérissés, longs d'un pouce environ. Le calice est pubescent, à cinq découpures aiguës; la corolle blanche, peu saillante hors du calice.

Cette plante croît dans les Pyrénées. π (Descript. ex Decand.)

18. ANDROSACE faux-bry. *Androsace bryoides*. Decand.

Androsace foliis oblongis, imbricatis, pilosis; pilis simplicibus; floribus sessilibus, terminalibus. Decand. Synopf. pag. 206. n°. 2356.

Aretia helvetica. Hoffm. Germ. 3. pag. 91. (Exclus. Synon. ?)

Cette espèce, qui a la port de l'androsace imbricquée, en diffère parce qu'elle est hérissée & non couenneuse, & que tous ses poils sont simples & nullement rameux; caractère constant, mais qu'on ne peut bien voir qu'à la loupe. Sa racine est une tige brune & ligneuse, qui se ramifie par le collet en une foule de tiges réunies en gazon, & garnies de feuilles mortes, de manière à former une colonne cylindrique; elles sont oblongues, petites, toutes serrées & imbriquées; celles du sommet d'un vert-clair; les autres brunes, persistantes. Les fleurs sont solitaires, terminales & sessiles. Le fruit est une capsule globuleuse, qui devient latérale par le prolongement des tiges.

Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante croît dans les Alpes, parmi les rochers. π (Decand.)

19. ANDROSACE ciliée. *Androsace ciliata*. Decand.

Androsace foliis oblongis, planis, margine ciliatis; pilis simplicibus & furcatis; pedunculis folio longioribus, lobis corollae integris. Decand. Synopf. pag. 206. n°. 2358.

Elle paroît avoir été confondue avec l'androsace des Alpes & l'androsace pubescente; elle diffère de l'une & de l'autre par ses poils simples ou bifurqués, mais point rameux. Sa tige se divise en trois ou quatre rameaux grêles, allongés, terminés par des feuilles redressées, planes, oblongues, munies à leurs bords de cils courts. Les fleurs sont solitaires, soutenues par un pédoncule un peu plus long que les feuilles. Leur calice est divisé en cinq lobes profonds, allongés, garnis de poils courts, légèrement rameux; la corolle d'un violet-pâle, plus grande que dans la plupart des androsaces uniflores. Le tube est de la longueur du calice; le limbe à cinq lobes entiers. La capsule se divise en cinq valves de la longueur des lobes du calice.

Cette plante croît dans les Pyrénées, où elle a été observée par M. Mirbel. π (Decand.)

ANDROSÈME. *Androsamum*. Espèce de millepertuis en arbrisseau, distincte de toutes les autres par son fruit charnu & non capsulaire; ce qui a déterminé Tournefort à en faire un genre séparé. Linné ne trouvant pas ce caractère suffisant, l'a réunie au millepertuis. (Voyez ce mot.)

ANDRYALA. (Voy. ANDRIALE.) Les Anciens avoient d'abord employé ce nom pour désigner le laitron (*sonchus*); il a été depuis appliqué par Linné pour un autre genre.

ANEMIA. (Voyez OSMONDE, Suppl.)

ANÉMONE. *Anemone*. Rivaux des renoncules, dont elles ne diffèrent que par la privation du calice; les anémones sont au printemps le plus bel ornement de nos parterres. Nous ne devons qu'à une ou deux espèces primitives (*l'anémone coronaria-hortensis* Linn.) cette belle suite de variétés que la culture est parvenue à obtenir. On prétend que cette anémone est originaire de l'Inde; qu'elle a été apportée dans le dix-septième siècle par Bachelier; qu'elle croît également aux environs de Constantinople. On trouve cependant aux environs de Nice & de Montpellier cette même anémone à fleurs simples. Son nom vient d'un mot grec *anemos*, qui signifie vent, parce que, suivant Pline, cette fleur ne s'ouvre qu'au souffle du vent: *Nunquam se aperit, nisi vento spirante*; ce qui la fait

Zz

aussi appelé par quelques-uns, *herbe du vent* (*herba venti*).

Aux espèces déjà décrites dans cet ouvrage, j'ajouterai, pour quelques-uns, des observations particulières, & d'autres espèces découvertes depuis.

1. ANÉMONE pulsatille. *Anemone pulsatilla*. Linn. — Lam. Ill. Gen. 496. fig. 2.

Anemone pratensis. Wither. Flor. brit. 498. Non Linn.

5.* ANÉMONE de Haller. *Anemone Halleri*. Allion.

Anemone pedunculo involucreto, foliis pinnatis; foliolis tripartitis, acuminatis, villosis; flore erecto Willden. Spec. 2. pag. 1173. — Allion. Pedem n°. 1922. tab. 80. fig. 2.

Anemone (Halleri), *foliis pinnatis, foliolis multifidis*. Vill. Dauph. 3. pag. 745.

Anemone tubis caudatis, involucri multifidis; foliis hirsutis, pinnatis; pinnis acutis lobatis. Hall. Helv. n°. 1148.

Cette espèce le rapproche, par son port & ses feuilles, de l'anémone pulsatille; par ses fleurs, de l'anémone printanière; elle se distingue de cette dernière par les découpures de ses folioles, plus profondes, plus étroites, lancéolées, aiguës, couvertes, ainsi que les autres parties des feuilles, d'un duvet blanc, soyeux, épais, alongé. Les hampes sont droites, hautes de six à huit pouces, tomenteuses, terminées par une grande fleur redressée, velue en dehors, d'un bleu gris de lin un peu violet. L'involucre est très-velu; ses folioles découpées en lanières étroites, linéaires.

Cette plante croît dans les Alpes, le Dauphiné, le Piémont, dans les pics des montagnes. ♀ (V. f.)

6.* ANÉMONE penchée. *Anemone cernua*. Thunb.

Anemone pedunculo involucreto, foliis pinnatis, flore cernuo. Thunb. Flot. jap. pag. 238.

Toutes ses feuilles sont radicales, pétioles, aîlées, en digitations; les pinnules opposées, profondément incisées; leurs découpures nombreuses, alternes, légèrement dentées en scie, velues principalement à leur face inférieure. Les hampes font tomenteuses, géniculées à leur sommet, terminées par une seule fleur inclinée, munies dans leur milieu d'un involucre velu.

Cette plante croît au Japon. ♀ (Thunb.)

8.* ANÉMONE jeune de soufre. *Anemone sulphurea*. Linn.

Anemone pedunculo involucreto; foliis triplicatopinnatis, pilosis, planis, acutis incis; seminibus caudatis. Linn. Mant. 78.

Anemone (apertifolia), *foliis caulinis ternis, connatis, supra decompositis, villosis; foliolis pinnatis-fido-dentatis, acuminatis; seminibus hirsutis, caudatis*. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1276. — Wulf. in Jacq. Miscell. 2. pag. 77. tab. 4. — Scop. Carn. n°. 663. — Hall. Helv. n°. 1149. var. β. — Murr. Syst. veget. edit. 14. pag. 510.

Anemone (myrtillofolia), *foliis triangulariter decompositis; laciniis confluentibus, petalis acutis, tubis rectis*. Vill. Dauph. 3. pag. 727.

Anemone alpina, var. β. Lam. Dict. n°. 8.

Quelques auteurs, tels que Haller & Linné, ont cru devoir réunir, comme variétés de la même espèce, l'anémone *baldenfis-alpina-sylvestris*; elles diffèrent entre elles par leur port, par la grandeur & la couleur de leur corolle, par la forme des pétales. Dans l'anémone *baldenfis* les semences sont laineuses, surmontées d'un style très-court, persistant, & non pas d'une longue queue plumée. Celle dont il est ici question a ses feuilles moins larges, à découpures plus fines, très-abondamment velues; sa fleur grande ordinairement d'un beau jaune de soufre; les pétales ovales, élargis, très-rapprochés, arrondis au sommet, & surmontés d'une pointe courte.

Cette plante croît dans les prairies des hautes montagnes, dans les Alpes, le Dauphiné, &c. ♀ (V. f.)

9. ANÉMONE des fleuristes. *Anemone coronaria*. Linn. — Lam. Ill. tab. 496. fig. 1.

12.* ANÉMONE à trois lobes. *Anemone trilobata*. Juss.

Anemone foliis subcordatis, trilobis; involucre triplicato; laciniis bi feu trifidis, corollis subdecepalis. Jussieu. Annal. Mus. Paris. vol. 3. pag. 248. tab. 21. fig. 1.

Elle se rapproche de l'anémone palmato. Sa racine est tubéreuse; ses feuilles toutes radicales, longuement pétioles, presque en cœur, profondément trilobées, glabres, veinées; les lobes sinués ou trifides à leur sommet, obtus, quelquefois légèrement crénelés. Les hampes font grêles, pubescentes, uniflores, munies d'un involucre paragé en trois feuillets sessiles, canéiformes, entières à leur base, divisées vers leur sommet en découpures étroites, lancéolées, aiguës. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'un blanc-jaunâtre en dedans, quelquefois un peu purpurine en dehors, composée de dix à douze pétales mégaux, étroits, oblongs, obtus, couverts en dehors d'un duvet argenté.

Cette plante a été recueillie par Commerçon auprès de Monte-Video, à l'embouchure de la rivière de la Plata. (V. f. in herb. Desfont.)

13.* ANÉMONE à feuilles en coin. *Anemone cuneifolia*. Juss.

Anemone foliis trifoliatis; foliis cuneiformibus, truncato-crenatis; involucri triphylo, cuneato; seminibus lanatis, acuminatis. Juss. Annal. Mus. Paris. vol. 3. pag. 246. tab. 21. fig. 1.

Anemone (parviflora), caulibus simplicissimis, unifloris; foliis simpliciter trifoliatis; foliis sessilibus, cuneatis; pedunculo longissimo, nudo; seminibus lanatis, muticis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 319.

Cette espèce, remarquable par la petitesse de ses fleurs, l'est encore par ses feuilles longuement pétiolées, composées de trois folioles sessiles, d'une grandeur médiocre, cuneiformes, tronquées, crénelées & lobées à leur sommet, glabres à leurs deux faces. Les hampes sont droites, simples, hautes d'un pied, filiformes, presque glabres, munies d'une colletette à trois folioles presque sessiles, cuneiformes, obtuses, incisées. La corolle est petite, jaunâtre, foliaire; les pétales lancéolés, obtus, pubescens en dehors, ainsi que l'extrémité du pédoncule. Les semences forment une petite tête ovale, très-lanugineuse, blanchâtre, hérissée de petites pointes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à l'embouchure des fleuves qui se jettent dans la baie d'Hudson. (V. f.)

13.** ANÉMONE blanche. *Anemone alba*. Juss.

Anemone caule simplici, uniflora; foliis quinque-partitis, lobis apice serratis dentatis; involucri triphylo, conformi. Juss. Annal. Mus. Paris. vol. 3. pag. 249. tab. 20. fig. 2.

« Cette plante, dit M. de Jussieu, n'est peut-être qu'une variété de l'anémone silvestris, intermédiaire entre cette espèce & l'anémone fibrifera, distincte par quelques légères nuances dans les formes, & par une moindre proportion dans toutes ses parties. Sa racine est fibreuse. Ses feuilles, toutes radicales, sont pétiolées, presque digitées, à cinq lobes obtus ou aigus, irrégulièrement sinués à leur sommet; les trois feuilles de l'involucre semblables aux précédentes, plus longues que les pétiotes qui les supportent. La tige, élevée de cinq à six pouces au dessus de l'involucre, est terminée par une fleur blanche, à cinq pétales, plus arrondis & plus petits de moitié que ceux de l'anémone silvestris. Quelquefois une seconde fleur, plus basse, sort du milieu du même involucre. Les semences n'ont point été observées. »

Cette plante a été recueillie par M. Perrin dans

les prairies touffues de la Daourie ou Sibérie orientale, près de Tchita. (V. f. in herb. Juss.)

14.* ANÉMONE à feuilles de fumeterre. *Anemone fumariifolia*. Juss.

Anemone caule uniflora, brevi; foliis bi seu triternatis, foliolis lobatis; involucri triphylo, multifido; seminibus lanatis. Juss. Annal. Mus. Paris. vol. 1. pag. 247. tab. 20. fig. 1. — Lam. Ill. tab. 496. fig. 3.

Anemone (triternata), foliis ternatis; foliolis cuneatis, serratis; involucri multifidis. Vahl. Symb. 3. pag. 74. tab. 65.

Petite plante, dont les racines, épaisses, noires, poussent de leur collet plusieurs feuilles menues, pétiolées, deux & trois fois ternées, composées de folioles sessiles ou légèrement pédiolées, fort petites, obtuses ou aigües, inégalement lobées, glabres, étalées. Les tiges ou hampes sont courtes, simples, filiformes, uniflores, soutenant un involucre à trois folioles sessiles, déchiquetées à leur sommet; les découpures étroites, aigües. La fleur est petite; les pétales d'un jaune-pâle, lancéolés, alternativement plus courts, légèrement pubescens en dehors. Les ovaires sont nombreux, portés sur un axe ou réceptacle allongé, auxquels succèdent des semences couvertes de duvet, & terminées par une petite pointe.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Video, à l'embouchure de la rivière de la Plata. (V. f.)

17. 18. ANÉMONE à feuilles d'aconit. *Anemone acutifolia*. Mich.

Anemone caule ramoso, foliis radicalibus palmatis, caulinis amplexicaulis; lobis acutis lanceolatis, inciso-serratis; seminibus capsulato globosis, lenticularibus, nudis sessilibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 320.

Anemone persilvanica & dichotoma. Linn.

Anemone dichotoma & irregularis. Lam. Dict. 1. pag. 167.

Michaux, qui a observé ces deux anémones dans leur lieu natal, les regarde comme appartenant à la même espèce, quoique Linné ait cru devoir les distinguer.

20. ANÉMONE à feuilles de pigamon. *Anemone thalictroides*. Linn. — Jussieu, Annal. Mus. Paris. tab. 21. fig. 2. A. B.

Thalictrum anemonoides. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 322.

Ses semences, ramassées en une tête ovale, sont oblongues, lisses, striées comme celles du thalictrum, caractère qui a probablement déterminé

Michaux à la ranger dans ce dernier genre. Parmi les individus qu'il en a recueillis dans l'Amérique, les uns présentent des feuilles assez grandes avec de petites fleurs; d'autres, de grandes fleurs avec de petites feuilles. C'est à cette dernière variété qu'il faut rapporter la figure de Plukenet, tab. 106, fig. 4, quoiqu'elle en diffère par des pétales plus allongés, & au nombre de huit au lieu de cinq ou six.

20.* ANÉMONE ombellée. *Anemone umbellata*. Willd.

Anemone floribus umbellatis, involucriatis; foliis radicalibus tripartitis; laciniis trifidis, integerrimis. Willd. Spec. 2. pag. 1284.

Anemone (fasciculata), floribus umbellatis, congestis; foliis tripartitis, trifidis. Vahl, Symb. 3. pag. 74. (Exclus. synonym.)

Ranunculus orientalis, nupellifolius lanuginosus, flore albo. Tourn. Corol. 20.

Ses racines sont fasciculées; elles produisent des feuilles radicalles, partagées en trois ou cinq découpures, divisées chacune en trois autres, aiguës, très-entières, chargées de longs poils blancs, particulièrement à leurs bords. Du centre des feuilles s'élève une hampe nue d'environ un demi-pied, munie de longs poils épars. L'involucre est composé de trois folioles pileuses, conniventes à leur base, à trois découpures entières. Les fleurs sont blanches, semblables à celles de l'anémone narcissiflora, au nombre de trois ou quatre, pileuses en dehors, soutenues par des pédoncules en ombelle, un peu plus longs que les involucres.

Cette plante croît dans le Levant, la Cappadoce, &c. (V. f. in herb. Desfont.)

25.* ANÉMONE réfléchie. *Anemone reflexa*. Willd.

Anemone caule subfiflora; foliis caulinis ternis, ternatis; foliolis subtripidis, apice dentatis; petalis lanceolatis, obtusis, reflexis. Willd. Spec. 2. pag. 1281. — Stephan. in Litt.

Elle a de grands rapports avec l'anémone ranunculoides. Ses feuilles, caulinaires, ternées, se divisent en trois autres folioles légèrement trifides, dentées à leur sommet. Les tiges se terminent par une ou deux fleurs, soutenues par des pédoncules hérissés de poils, une fois plus courts que les feuilles, à peine plus longs que les périoles. La corolle est réfléchie; les pétales lancéolés, très-entiers, obtus.

Cette plante croît dans la Sibirie. (V. Descript. ex Willd.)

25.* ANÉMONE à feuilles d'isopyre. *Anemone isopyroides*. Juss.

Anemone foliis longis petiolatis, bitermatis; foliolis subcuneiformibus, fixato-crenatis; involucri triphylo, ternato; petalis oblongis. Juss. Annal. Mus. Paris. vol. 3. pag. 249. tab. 20. fig. 3.

Cette espèce se rapproche encore de l'anémone ranunculoides; elle en diffère par ses feuilles portées sur des pétioles beaucoup plus longs, divisés par le haut en trois ramifications, portant chacune trois folioles minces, irrégulièrement cuneiformes, tantôt divisées profondément en lobes obtus, tantôt simplement crénelées. Les tiges sont simples, peu élevées, garnies vers leur milieu d'un involucre à trois feuilles pétiolées, divisées chacune en trois folioles ovales, allongées, finées & crénelées à leur sommet. Les fleurs sont solitaires, terminales, composées de quelques pétales étroits, allongés. Ses semences, ramassées en tête, sont arrondies, terminées par une petite pointe.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (V. f. in herb. Juss.)

ANÉMONE multifide. *Anemone multifida*.

Anemone pilosa, foliis subternatis, multifidis; laciniis linearibus, acutis; involucri triphylo, coniformi; floribus solitariis; seminibus lanatis, mucronatis. (N.)

Elle a presque le port du *ranunculus acris*. Toutes ses parties sont couvertes de poils fins, épars, rares, blanchâtres. Ses feuilles radicales sont longuement pétiolées, redressées, divisées en trois folioles déchiquetées en plusieurs découpures inégales, linéaires, lancéolées, aiguës, glabres ou à peine pileuses, excepté sur les pétioles. Les tiges sont droites, herbacées, striées, pileuses, munies d'une collerette à trois feuilles à peine pétiolées, conniventes à leur base, semblables, pour le reste, aux autres feuilles. De leur centre s'élève un pédoncule, quelquefois deux & même trois, un peu cotonneux à leur sommet, munis chacun d'un involucre partiel, semblable au précédent, mais plus petit; terminés par une seule fleur d'un blanc jaunâtre, assez petite, composée d'environ six pétales & plus, lancéolés, un peu inégaux, obtus, pubescents en dehors. Les semences sont réunies en une tête ovale-arrondie, lanugineuse, hérissée de petites pointes courtes, très-aiguës.

Cette plante a été recueillie par Commerçon au détroit de Magellan. (V. f. in herb. Desfont.)

Observations. Waltherius fait mention d'une autre espèce d'anémone (*anemone caroliniana*, Flor. cork. pag. 156), qui paroit se rapprocher de l'anémone buldenisa. Elle est trop peu connue, trop brièvement décrite pour la mentionner avec quelques détails.

ANETH. *Anethum*. Linné a réuni dans un seul genre l'aneth & le ferouil, qui se trouvent séparés dans Tournefort. Dans l'aneth de ce dernier, les ailes marginales du fruit sont membraneuses ; il est borné à une seule espèce.

1. ANETH odorant. *Anethum graveolens*. Linn. — Lam. Il. tab. 204. fig. 2. — Cært. de Fruct. & Sem. 1. pag. 91. tab. 21.

3. ANETH doux, fenouil. *Anethum foniculatum*. Linn. — Lam. III. tab. 204. fig. 1.

Feniculum vulgare. Cært. de Fruct. & Sem. 1. pag. 105. tab. 23. fig. 5.

Ligisticum foniculatum. Roth, Germ. 1. pag. 124.

ANETHUM. (Voyez ANETH.)

ANGA. « C'est un mot malgache, dit M. du Petit-Thouars, qui se change dans la composition en *angan* & *angh* par élision. » Il désigne toutes les herbes que l'on mange à Madagascar, & dans beaucoup d'autres pays où le riz fait la base de la nourriture. On les accommode fort simplement en les faisant bouillir dans l'eau : alors elles ressemblent à nos épinards. C'est le *sijor* des Malais, la *bréte* ou *brède* de l'île-de-France & de l'Inde. Parmi un grand nombre de ces plantes, M. du Petit-Thouars cite les suivantes comme les principales.

ANGA-MAFAETS, espèce de caryophyllée voisine du *pharnaceum*, assez bonne, quoiqu'elle ait un petit goût d'amertume que désigne son nom *mafaets*, qui signifie amer.

ANGA-MALÈME : espèce de *ruellia*.

ANGA-MALAO (*spilanthus*) : brède, cresson à l'île-de-France, voisin de l'*acemella*. Elle a un goût piquant, qui la fait rechercher de plusieurs personnes.

ANGA-N-BALAZA. C'est l'*villosa* sessile, cité par Rumphé sous le nom de *olus squillaram*. Herb. Amb. vol. 6. pag. 37. tab. 15.

ANGA-N-BAMBOU : espèce de conyze.

ANGA-N-SINGOUT : espèce de fougère grimpante du genre des *acrostichum* Linn. On en mange les jeunes pousses : c'est une des meilleures espèces, au goût même des Européens. En général, les fougères ne sont point au nombre des plantes alimentaires ; cependant, au rapport de Rumphé, les Malais en emploient aussi quelques-unes de la même manière.

ANGA-TA-HORICAC : espèce d'épervière, *hieracium* Linn., qui vient dans les marais.

ANG-HIVÉ. C'est la plante qu'on appelle *brède* par excellence à l'île-de-France. C'est un solanum ou morelle, très-voisin du *solanum nigrum* Linn. Malgré cela elle fait la base de la nourriture des colons des îles de France & de Bourbon (la Réunion), où elle paraît sur les meilleures tables, sans qu'on en ait jamais reconnu de mauvais effets.

ANG-HIVIBÉ. On appelle simplement cette plante *ang-hive* à l'île-de-France, où elle a été apportée de Madagascar. Ses fruits sont élimés par beaucoup d'habitants : on les fait entrer comme assaisonnement dans les ragoûts indiens, qu'on appelle *carri*. C'est le *solanum ang-hivi* Lam. MORELLE, n°. 72.

ANG-SOUTRI : nom malgache du *cyrtus calan* L., le même que l'*ambarvaie*. (Voyez ce mot.)

ANG-SOUTRI-MOUBOU : espèce d'*hedyformum* ou sainfoin qui vient dans les marais, & dont les feuilles ont quelque ressemblance avec celles du caian.

ANG-SOUTRI-MOUBOU-VARE. Ce dernier mot, qui signifie *fenelle*, distingue une autre espèce plus molle. (Du Petit-Thouars.)

ANGARI : nom malais d'une espèce de plante connue des botanistes sous celui de *sida asiatica* Linn.

ANGELICA. (Voyez ANGÉLIQUE.)

1. ANGÉLIQUE des jardins. *Angelica archangelica*. Linn. — Lam. III. tab. 193. — Garidel, Aix. tab. 55.

2. ANGÉLIQUE de Rasouls. *Angelica Raoulia*. Gouan.

Angelica foliis bipinnatis ; foliis lanceolatis, serratis, decurrentibus. Gouan, Il. 13. tab. 6.

Panax alpina ebuli, laciniatis foliis. Boccon. Mus. tab. 99.

Angelica silvestris, var. β . Villars, Dauph. 2. pag. 618.?

Cette espèce est très-rapprochée de la précédente, dont elle a le port. Sa racine, longue, épaisse, produit une tige haute de trois pieds & plus, lisse, à peine rameuse, garnie de grandes feuilles, approchant de celles du fureau, trois fois ailées, composées de folioles lancéolées, oblongues, aiguës, dentées en scie, décurrentes sur le pétiole, un peu conniventes à leur base, légèrement pubescentes, ainsi que les tiges. Les ombelles sont grandes, hémisphériques, composées de cinquante ou soixante rayons inégaux, dont quel-

ques-uns semblent ne porter que des fleurs femelles. L'involucre général est formé d'une à six folioles fines, la plupart avortées. Les involucre partiel ont de quatre à six folioles menues. Les corolles, de couleur pourpre avant leur épanouissement, deviennent blanches. Les fruits sont pubescents, ovales-oblongs, à trois côtes dorsales.

Cette plante croît dans les Pyrénées, où elle a été découverte par M. Rafouls. On la trouve aussi en Dauphiné & dans le Piémont. ♀

3. ANGÉLIQUE trifide. *Angelica triquinata*. Mich.

Angelica petiolo tripartito; foliis quinis, incisodentatis, lateraliibus, decursivis; impari rhomboidali, sessile. Mich. Flor. boreal. Amer. t. 1. pag. 167.

Ses tiges sont glabres, garnies de feuilles, dont les pétioles sont partagés en trois, pubescents, blanchâtres, ainsi que les pédicelles, qui supportent cinq folioles dentées, incisées; les latérales un peu décourcées; la terminale rhomboïdale.

Cette espèce a été découverte au Canada par Michaux.

ANGIOPTÈRE. *Angiopteris*. Genre de plantes de la famille des fougères, qui a des rapports avec les *myriophyta*, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Des caules sessiles, presque ovales, s'ouvrant en dessus dans leur longueur, placés sur deux rangs très-rapprochés, & formant une ligne presque marginale.

ES P È C E.

ANGIOPTÈRE en arbre. *Angiopteris evaia*. Hoffm.

Angiopteris frondibus bipinnatis, pinnis oppositis; pinnulis alternis, subsessilibus, linearibus lanceolatis; caule arboreo.

Angiopteris evaia. Hoffm. Comm. Gotter. vol. 12. pag. 29. tab. 5. (Synon. *Plumier exaltata*.) — Swartz, Fil. pag. 166 & 395.

Polygodium evaia. Forst. Prodr. n°. 438. — Encycl. vol. 5. pag. 556.*

Clementia (palmiformis), caule arboreo, foliis bipinnatis coronato. Cavan. Przl. 1801. n°. 1164. — Hort. Reg. Matr. Icon.

Cette fougère a l'aspect d'un palmier. Ses tiges s'élevant à la hauteur de cinq à six pieds, sur sept à huit pouces de diamètre, un peu blanchâtres, feuillues à leur sommet, couronnées de feuilles longues de six pieds, étalées horizontalement, deux fois ailées; les pinnules opposées, longues de deux pieds, composées de folioles alternes, presque sessiles, longues de six à neuf pouces,

larges d'un pouce, linéaires-lancéolées, arrondies, inégales à leur base, rétrécies à leur sommet en une longue pointe, grossièrement dentées en scie, glabres, d'un vert-gai, roussâtres en dessous, légèrement ondulées & dentées à leurs bords, marquées de veines transverses, rapprochées à leur base, puis bifides.

La fructification est placée non loin des deux bords, depuis la base des folioles jusque sous leur sommet, composée de capsules sur un double rang, rapprochées en une ligne continue, ovales, dépourvues d'anneau, contenant des semences brunes, sphériques, lenticulaires.

Cette plante croît aux îles Mariannes & de la Société.

ANGOLAN. *Alangium*.

1. ANGOLAN à dix pétales. *Alangium decapetalum*. Lam.

C'est la même plante que le *grewia subulfolia*. Linn. f. Suppl. pag. 409. (Voyez GREUVIER, n°. 6.)

ANGOPHORA. Ce genre, établi par Cavanilles, n'est distingué des *metrosideros* que par les semences, foliaires dans chaque valve de la capsule. Comme il est probable que ce n'est qu'un simple avortement, & que d'ailleurs les deux espèces renfermées dans ce genre n'offrent point d'autre différence avec les *metrosideros*, j'ai cru devoir les réunir à ce genre. (Voyez METROSIDEROS, Suppl.)

ANGREC. *Epidendrum*. Depuis l'établissement de ce genre par Linné, les espèces se sont tellement multipliées, qu'on a senti la nécessité de les séparer en plusieurs genres. Ce travail ne pouvoit être exécuté que par des voyageurs éclairés, qui se trouvoient à portée d'observer ces plantes vivantes dans leur lieu natal, les individus secs, conservés dans les herbiers, pouvant induire en erreur sur les parties de la fructification. M. Swartz, qui a séjourné long-temps en Amérique, d'ailleurs très-bon observateur, a entrepris ce travail; il a établi ses nouveaux genres d'après la forme de la corolle, principalement d'après celle du pétale inférieure, que Linné nomme *neuraire*. Les genres *vanilla* & *stelis* ont déjà été décrits en leur lieu dans cet ouvrage. Pour ne point trop écarter des plantes très-rapprochées, je joins ici aux vrais *epidendrum* Sw. les genres *cymbidium*, *oncidium*, *aerides*. Les autres, tels que les *dendrobium*, *lepanthes*, composés d'espèces plus récemment découvertes pour la plupart, seront traités à leur place. Parmi les *epidendrum* de M. de Lamarck, celles qui ne se trouvent pas rappelées dans ce Supplément le seront, les unes aux *dendrobium*, telles que celles des

numéros 24, 36, 41, 43 & 44; les autres se trouvent dans les *limodorum*, tels que les numéros 6, 40 & 47. Le n°. 12 est le *malaria caudata* Willden. n°. 15. La plupart des autres doivent être maintenues, du moins jusqu'à ce qu'elles puissent être observées sur le vivant.

E S P È C E S.

1. *Cymbidium*. Swartz. Six pétales, dont cinq droits, égaux; le sixième inférieur, concave à sa base, plane à son limbe, point éprouvé.

* *Especies parasiticae; pétales au peu redressés.*

1. *ANGREC écarlate*, n°. 8. *Epidendrum coccineum*. Linn.

Cymbidium (coccineum), subcaulescens, foliis terminalibus, alisque raciculis bulbo innatis, subcylindricis, obtusis; scapis filiformibus, axillaribus, unifloris. Swartz, Nov. Act. Upsal. 6. pag. 70.

8. *Epidendrum* (sessile), foliis basi compressis, soperis latioribus, lanceolato-linearibus, obtusis, unis; pedunculis radicalibus, brevissimis, unifloris. Swartz, Prodr. 122. — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1472.

2. *ANGREC à trois ailes*. *Epidendrum tripterum*. Smith.

Epidendrum foliis bulbo innatis, radicalibusque ensiformibus; scapis radicalibus, multifloris; gemme triolata, labio petalis aequali. Smith, Icon. Pl. pag. 14. tab. 14.

Cymbidium (tripetrum), acule, foliis bulbo innatis, radicalibus, vaginatis; scapis multifloris, gemme triolata. Swartz, Nov. Act. Ups. vol. 6. pag. 70.

Ses feuilles sont toutes radicales, en gaine à leur base, sortant d'une bulbe, glabres, en forme de lame d'épée. De leur centre sort une hampe droite, garnie de plusieurs fleurs, dont les cinq pétales inférieurs sont redressés; l'inférieur concave à sa base, plane à son limbe, de la longueur des pétales supérieurs. L'ovaire est triangulaire, muet de trois ailes sur ses angles.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. ♀

3. *ANGREC hérissé*. *Epidendrum hirsutum*.

Epidendrum (cymbidium hirsutum), caulibus simplicibus, foliisque lanceolatis, plicato-nervosis, hirsutis; spica terminali, ovata; bracteis flore longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 94.

Serapias carayata. Aubl. Guian. 2. pag. 816. tab.

320. (Voyez *ELLÉBORINE* parasite, vol. 2, pag. 351, n°. 7.)

4. *ANGREC engainé*. *Epidendrum vestitum*. Sw.

Epidendrum (cymbidium vestitum), caule dichotomo, vaginis undique imbricatis; apice axilliferae bulbiferis; bulbis monophyllis; floribus confertis, vaginis caulinis. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 70, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1443.

Epidendrum vestitum. Swartz, Prodr. 124.

Ses racines sont filiformes; les tiges ascendantes, souvent radicanes, cylindriques, hautes d'un pied, entièrement couvertes de gaines imbriquées, ovales, aiguës, glabres, membraneuses. On distingue, dans l'aisselle des gaines opposées, des bulbes axillaires & terminales, grandes, solitaires, d'où sort de chacune d'elles une feuille redressée, élargie, lancéolée. Les fleurs sont presque sessiles, rapprochées, placées dans les gaines des tiges, de couleur purpurine, formant une sorte d'épi par leur ensemble. Les pétales très-courts, accompagnés de deux bractées spatulées; en capuchon; les cinq pétales supérieurs presque égaux, ovales, lancéolés; l'inférieur une fois plus court; une capsule ovale, presque trigone.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. ♀ (Swartz.)

5. *ANGREC prolifère*. *Epidendrum proliferum*. Swartz.

Epidendrum (cymbium proliferum), caule ascendente, prolifero; foliis distichis; ovato-lanceolatis; floribus axillaribus, sessilibus; bulbis à vaginis foliorum distichis. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1450.

Epidendrum proliferum. Swartz, Prodr. 124.

Ses tiges sont couchées, puis ascendantes, radicanes à leur partie inférieure, prolifère par les bulbes situés dans l'aisselle des feuilles; celles-ci sont alternes, très-rapprochées, disposées sur deux rangs, ovales-lancéolées, obtuses, obliquement échancrées à leur sommet, avec une soie très-fine dans l'échancrure, glabres, striées; les gaines ovales, imbriquées, comprimées, contenant dans leurs aisselles des bulbes qui donnent naissance à deux feuilles sessiles, semblables aux précédentes. Les fleurs sont petites, sessiles, solitaires dans les gaines, purpurines; les cinq pétales supérieurs à demi ouverts, presque égaux, lancéolés, obtus; l'inférieur concave, redressé. La capsule est allongée, cylindrique, un peu anguleuse, s'ouvrant longitudinalement par cinq sillons. Les valves restent adhérentes à leur sommet & à leur base.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de

la Jamaïque, sur les arbres. π (Descript. ex Swartz.)

6. ANGREC à fruits hérissés. *Epidendrum echinocarpon*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium echinocarpon), caule compresso, decumbente, pendulo, imbricato; foliis bifariis, ovatis, acuminatis; capsulis muricatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1472.

Epidendrum echinocarpon. Swartz, Prodr. 124.

Limodorum pendulum. Aubl. Guian. 2. pag. 819. tab. 321.

Ses tiges sont simples, pendantes, comprimées; les feuilles alternes, presque imbriquées, placées sur deux rangs, glabres, ovales-oblongues, aiguës, formant à leur base une gaine membraneuse, à demi amplexicaule. Les fleurs sont latérales, axillaires, solitaires, d'un jaune-pâle, soutenues par des pédoncules courts, accompagnés à leur base d'une bractée blanchâtre, & d'une autre sous la fleur; les pétales ovales, concaves, aigus, presque connivens à leur sommet; l'intérieur plus court, oblong, d'un bleu d'azur, avec des taches purpurines. L'ovaire est blanchâtre, hérissé: il lui succède une capsule ovale, trigone, à six stries, couronnée par la corolle, hérissée de petites pointes à son sommet.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les arbres. π (Descript. ex Swartz.)

7. ANGREC hérissé. *Epidendrum muricatum*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium muricatum), caule compresso, erectifido, imbricato; foliis bifariis, oblongis, acutis, linearibus; capsulis muricatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1474.

Elle diffère de l'espèce précédente par son port; par ses tiges plus élevées, érigées, comprimées; par la grandeur de ses fleurs & de ses fruits. Ses feuilles sont oblongues, glabres, entières, mucronées à leur sommet; les gaines larges, comprimées, membraneuses, un peu lâches, frisées, aiguës, sailantes en carène. Les fleurs sont placées vers le sommet des tiges, presque solitaires, axillaires, presque filiformes; les pétales glabres, acuminés; les capsules grandes, oblongues, presque planes d'un côté, en carène & relevées en bosse de l'autre, hérissées à leur sommet de poils flexibles.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. (Descript. ex Swartz.)

8. ANGREC à poils toides. *Epidendrum trichocarpon*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium trichocarpon), caule tereti-compresso, radicante, imbricato; foliis bifariis, linearibus, subreflexis, capsulis pilosis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1474.

Epidendrum trichocarpon. Swartz, Prodr. 124.

Ses tiges sont presque filiformes, cylindriques, un peu comprimées, pendantes, un peu rameuses, radicales en dessous, couvertes de feuilles linéaires, un peu réfléchies, glabres, entières, aiguës, longues d'un demi-pouce, vaginales à leur base; les gaines membraneuses, un peu comprimées. Les fleurs sont presque solitaires, axillaires; leur pédoncule plus court que les feuilles, muni à sa base de quelques petites bractées, & de deux autres ovales, petites, placées sous la fleur. Les pétales sont égaux, convexes, un peu hérisés, connivens à leur sommet; le pédale inférieur concave, arrondi, redressé. La capsule est petite, presque ronde, hérissée de poils blanchâtres, d'abord mous, puis roides.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les arbres couverts de mousses. π (Descript. ex Swartz.)

9. ANGREC glauque. *Epidendrum glaucum*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium glaucum), caule compresso, erectifido, imbricato; foliis bifariis, lanceolatis, subius glaucis; capsulis nudis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1477.

Epidendrum glaucum. Swartz, Prodr. 124.

Ses tiges sont filiformes, rampantes; ses tiges simples, comprimées, longues d'un à deux pieds, couvertes de feuilles elliptiques, lancéolées, d'un vert-gai, glauques en dessous, entières, légèrement mucronées. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules plus courts que les gaines des feuilles; deux bractées petites & blanchâtres sous chaque fleur; la corolle petite, blanchâtre; les pétales ovales, acuminés, peu ouverts; les capsules oblongues, luisantes, très glabres, trigones, s'ouvrant en trois parties, contenant de très-petites semences.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque. π (Descript. ex Swartz.)

10. ANGREC à feuilles de gramin. *Epidendrum graminoides*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium graminoides), caule compresso, effusente, multiflora, imbricato; foliis bifariis, linearibus, lanceolatis, remotifolius; capsulis glabris, pedicellis elongatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1479.

Epidendrum graminoides. Swartz, Prodr. 125.

On

On la distingue des précédentes par ses tiges plus courtes, simples, comprimées; par ses feuilles étroites, linéaires-lancéolées; les gaines blanchâtres. Les fleurs font plus écartées, lâches, unilatérales; les pédoncules presque capillaires, allongés, de moitié plus courts que les gaines; deux petites bractées blanchâtres sous chaque fleur. La corolle est petite, blanchâtre, inclinée; les pétales ovales, concaves, acuminés, très-souvent connivens à leur sommet; le pétale inférieur concave à sa base, acuminé & redressé à son sommet. La capsule est glabre, oblongue, pendante, en bourse, marquée de six sillons.

Cette plante croît sur le tronc des arbres, à la Jamaïque. (Description ex Swartz.)

11. ANGREC à feuilles grasses. *Epidendrum testifolium*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium testifolium), caule repente; foliis incumbens, subrotundis, acutis, convexo concavis, carinatis; floribus subsiliis, sessilibus. Swartz, Act. Upf. 6. pag. 71, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1451.

Epidendrum testifolium. Swartz, Prodr. 121.

Ses tiges sont rampantes, filiformes, radican-tes; les feuilles presque rondes, un peu charnues, rétrécies en pétiole à leur base, presque imbriquées, glabres, convexes en dessus, concaves en dessous, légèrement acuminées. Les fleurs sont solitaires, axillaires, presque sessiles, purpurines; trois pétales extérieurs plus grands, ovales, concaves, obtus, connivens, un peu velus; deux intérieurs plus petits, glabres, oblongs, d'un rouge-sanguin; l'inférieur de même forme, concave, redressé, cilié à ses bords. La capsule est ovale, hérissée.

Cette plante croît sur les rochers & les troncs des arbres couverts de mousse, à la Jamaïque. (Description ex Swartz.)

12. ANGREC en sabot. *Epidendrum calceolaria*. Retz.

Epidendrum (cymbidium calceolaria), caulibus simplicibus, erectis, flexuosis; foliis distichis, remotis, subulatis; sepalis erectis, terminalis; floribus remotis. Willd. Spec. 4. pag. 97.

Epidendrum calceolaria. Retz, Observ. botan. 6. pag. 45.

Ses tiges sont flexueuses, droites, simples, articulées, hautes de six à sept pouces; les feuilles très-étalées, distantes, glabres, épaisses, subulées, en petit nombre; les fleurs presque sessiles, disposées en une grappe terminale, peu garnie; les bractées oblongues, panachées de blanc & de rose; le pétale inférieur rubule à sa partie inférieure, élargi à son limbe, divisé en trois lobes; Botanique. Supplément. Tome 1.

celui du milieu plus étroit, lancéolé; les latéraux élargis; les autres pétales blancs, presque égaux, échancrés, un peu crépus; l'anthère globuleuse, à deux lobes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (x)

13. ANGREC linéaire, n°. 10. *Epidendrum lineare*. Linn.

Epidendrum (cymbidium lineare), caule simpliciter, erecto; foliis distichis, linearibus, obtusis, apice emarginatis; floribus terminalibus, subspicatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 72, & Obs. 326.

14. ANGREC embrassant. *Epidendrum equitans*. Forst.

Epidendrum (cymbidium equitans), caule simpliciter, inferius flexuoso; foliis compressis, ensiformibus, basi equitantibus; racemo terminali, spicato. filiformi, nutante. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 72. — Willd. Spec. 4. pag. 97.

Epidendrum equitans. Forst. Prodr. n°. 316.

Ses tiges sont simples, flexueuses à leur partie inférieure, nues à leur partie supérieure, garnies inférieurement de feuilles disposées sur deux rangs, s'engainant par leurs bords vers leur base, comprimées, ensiformes, saillantes en carène, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont disposées vers l'extrémité des tiges en un épi terminal, filiforme, incliné.

Cette plante croît dans les Indes orientales & aux îles de la Société. (x)

15. ANGREC à feuilles cylindriques. *Epidendrum teretifolium*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium teretifolium), caule simpliciter, foliis semiteretibus; floribus solitariis terminalibus apice trigonatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 72, & Flor. Ind. occident. 3. pag. 1463.

Epidendrum teretifolium. Swartz, Prodr. 121.

Ses racines sont courtes, filiformes, blanchâtres & crépues; les tiges simples, droites, hautes d'un pied, glabres, cylindriques, à deux angles, garnies de feuilles alternes, glabres, charnues, à demi cylindriques, disposées sur deux rangs; leur gaine serrée, légèrement striée. Une feuille accompagne une seule fleur solitaire, située vers le sommet des tiges, d'un vert jaunâtre, munie de deux petites bractées membraneuses; les trois pétales extérieurs étalés, lancéolés, aigus, un peu convexes; les deux intérieurs un fois plus petits, verdâtres, redressés, elliptiques, épaissis à leur sommet; le pétale inférieur de la longueur des plus grands, en carène à sa base,

redressé, aigé à son sommet, concave dans son milieu. La capsule est allongée, cylindrique, striée, à trois lignes saillantes, longuement rétrécie à sa base, obtuse à son sommet.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque. χ (*Descript. ex Swartz*.)

16. ANGREC denticulé. *Epidendrum ferrulatum*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium *ferrulatum*), caule simpliciter, f. diphyllo; foliis lanceolatis, carinatis, serratis; spicis terminalibus, laxis, filiformibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1465, & Nov. Act. Upl. 6. pag. 72.

Epidendrum ferrulatum. Swartz, Prodr. 121.

Plante basse, dont les racines fasciculées produisent plusieurs tiges simples, à peine hautes d'un pouce, à deux angles, garnies d'une ou de deux feuilles lancéolées, acuminées, en carène sur leur dos, roides, un peu épaisses, souvent courbées, cartilagineuses & légèrement denticulées à leurs bords, quelquefois rougeâtres en dessous. De leur centre sortent un ou deux épis filiformes, de la longueur des feuilles, munis de fleurs alternes, rapprochées, petites, d'un brun-rougeâtre, accompagnées de bractées comprimées, petites, acuminées. Les pétales sont concaves, ovales-lancéolés, acuminés; les extérieurs plus grands, denticulés à leurs bords; l'inférieur redressé, concave dans son milieu, épaissi & rétréci à son sommet; les anthères à deux loges, contenant un pollen pédicellé; la capsule ovale, trigone, à six lignes saillantes; les semences blanchâtres, très-petites.

Cette plante croît sur le sommet des montagnes, à la Jamaïque. χ (*Descript. ex Swartz*.)

17. ANGREC globuleux. *Epidendrum globosum*. Jacq.

Epidendrum (cymbidium *globosum*), caule simpliciter, subunisporo; foliis tereti-canaliculatis, lobello ovato, capsulis globosis. Swartz, Nov. Act. Upl. 6. pag. 72, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1467.

Epidendrum globosum. Jacq. Amer. pag. 222. tab. 133. fig. 1. — Swartz, Prodr. 121.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges droites, simples, presque filiformes, cylindriques, un peu comprimées, hautes de deux ou trois pouces, garnies de feuilles roides, à demi cylindriques, glabres, aiguës, un peu recourbées. Les fleurs sont terminales, presque solitaires, petites, axillaires, un peu pédicellées; quelques bractées sont petites à la base des pédicelles & sous l'ovaire. Les trois pétales extérieurs sont ovales, rougeâtres, concaves, un peu étalés; les

deux intérieurs plus courts, jaunes, redressés; l'inférieur concave, ovale, aigu, de la longueur des premiers; les anthères à deux loges. Les capsules sont globuleuses, de la grosseur d'un pois, glabres, hexagones, s'ouvrant dans leur milieu longitudinalement.

Cette plante croît à la Martinique & à la Jamaïque, sur les branches des arbres. χ (*Descript. ex Swartz*.)

* * Espèces parasites; pétales très-étalés.

18. ANGREC d'automne. *Epidendrum autumnale*. Forst.

Epidendrum (cymbidium *autumnale*), caulis à radice reptante simplicibus, acutibus; foliis confertis, lanceolatis; spicis subpaniculatis, terminalibus. Swartz, Nov. Act. Upl. 6. pag. 72. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum autumnale. Forst. Prodr. n°. 319.

Ses racines sont rampantes; il s'en élève plusieurs tiges simples, un peu comprimées, à deux angles, garnies de feuilles très-rapprochées, lancéolées, vaginales à leur base, glabres, nerveuses. Les fleurs sont disposées en un épi terminal, presque paniculé; les pedoncules parsemés de petites bractées en écailles; le pétale intérieur redressé, obtus à son sommet.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. χ

19. ANGREC à feuilles de lycopode. *Epidendrum lycopodioides*. Retz.

Epidendrum (corymbium *lycopodioides*), caulis simplicibus, pendulis, acutibus; foliis distichis, carnosis, lanceolatis, basi equitantibus; spicis terminali, simpliciter; bracteis ciliatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum lycopodioides. Retz. Observ. bot. 6. pag. 55.

Il sort de ses racines plusieurs tiges pendantes, très-simples, planes, comprimées, longues d'environ un pied, garnies dans leur partie supérieure de gaines lancéolées, aiguës, glabres, longues d'un pouce, & à leur partie inférieure de feuilles alternes, charnues, lancéolées, vaginales, disposées sur deux rangs. Les fleurs sont sessiles, très-rapprochées, disposées en épis solitaires, terminaux, semblables à ceux des lycopodes, munis de bractées courtes & ciliées; la corolle d'un jaune-orangé; les cinq pétales supérieurs ovales, un peu aigus, ouverts, inégaux; l'inférieur plane, en cœur, plus petit que le pétale supérieur. La capsule est en ovale renversé.

Cette plante croît dans les Indes orientales, sur les tamarins. χ (*Descript. ex Retz*.)

20. ANGREC musqué. *Epidendrum moschatum*. Sym.

Epidendrum (cymbidium moschatum), caule ramoso, scandente; foliis distichis, lanceolatis, obtusifoliis; racemis nudis, lateralibus; petalis ovatis, interioribus rufis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 98.

Epidendrum moschatum. Symes, itin. edit. gall. pag. 92. tab. 26.

Ses tiges sont grimpantes & rameuses, garnies de feuillets disposés sur deux rangs, glabres, lancéolés, vaginales à leur base, un peu obtusés à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes nues, latérales; les deux pétales intérieurs obtus, comme tronqués à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Asie. h

21. ANGREC des montagnes. *Epidendrum montanum*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium montanum), caule simplicifolio; foliis lato-lanceolatis, apice subrecurvis; racemo terminali, floribus secundis, laminis labelli reflexis. Swartz, Nov. Act. Upsal. 6. pag. 72, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1469.

Epidendrum montanum. Prodr. pag. 121.

Ses racines sont blanches, simples, épaisses; sa tige très-simple, cylindrique, haute d'un à deux pieds, nue à sa partie inférieure, geniculée, garnie à sa partie supérieure de feuilles alternées, amplexicaules à leur base, vaginales, élargies, lancéolées, un peu obtusées, recourbées à leur sommet, striées, d'un brun-verdâtre. Les fleurs sont blanches, alternes, pédicellées, un peu grandes, distantes, en grappes terminales, droites, longues d'un demi-pied, flexueuses, un peu comprimées, purpurines, munies de bractées concaves, acuminées; les cinq pétales supérieurs presque-gaux, concaves, ovales-lancéolés, aigus; l'inférieur plus long, dilaté; son limbe tridenté; le lobe du milieu plus alongé, marqué de points sanguins dans son milieu; la capsule glabre, oblongue, trigone.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. x (Descript. ex Swartz.)

22. ANGREC bouclier. *Epidendrum clypeolum*. Forst.

Epidendrum (cymbidium clypeolum), folio radicali subrotundo-cordato, basi cucullato, apice reflexo, acuto; seapo erectifolio, racemoso; nectarii labio inferiore orbiculato, maximo. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 99.

Epidendrum clypeolum. Forst. Prodr. n.º. 323.

Il s'élève de ses racines une feuille radicale presque ronde, en cœur, croisée en capuchon à

sa base, aiguë & réfléchie à son sommet. Les hampe sont redressées, terminées par une grappe de fleurs; le pétale inférieur orbiculaire.

Cette plante croît dans l'île de la Société. x

23. ANGREC triste. *Epidendrum triste*. Forst.

Epidendrum (cymbidium triste), foliis teretibus, cyathicis, inanis; vaginis fistulosis; pedunculis oppositifoliis, corymbosis, vagina perforantibus; nectarii labio integro, spatulato, cordiformi. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 99.

Epidendrum triste. Forst. Prodr. n.º. 323.

Ses tiges sont garnies de feuilles creuses, cylindriques, alternes, toulées à leur base en une gaine fistuleuse. Les pédoncules sont opposés aux feuilles, traversent les gaines, & forment un corymbe latéral. Le pétales inférieur est entier, spatulé, en forme de cœur.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédonie. x

24. ANGREC NOUVEUX, n.º. 23. *Epidendrum nodosum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium nodosum), caule simplicifolio, monophyllo; tuberculo radicato; folio semicylindraceo, subulato; laminis labelli integris. Sw. Nov. Act. Ups. 6. pag. 73, & Obf. bot. 328. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 99.

24. ANGREC ÉCARTÉ, n.º. 28. *Epidendrum scriptum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium scriptum), foliis bulbis innatis, ovato-lanceolatis, uninerviis; seapo multifloro, petalis maculatis. Swartz, in Schrad. Diar. bot. 1799. pag. 218.

On trouve dans l'Herbarium matabaricus, t. 1. p. 69, tab. 35, une plante très-voisine de celle-ci, sous le nom de *beta-pota*. (Voyez ce mot, Suppl.)

26. ANGREC à capuchon, n.º. 18. *Epidendrum cucullatum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium cucullatum), caule simplicifolio, unifloro, aphyllis; foliis subulatis, sulcatis; laminis labelli ciliatis. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 100.

27. ANGREC sans feuilles. *Epidendrum aphyllum*.

Epidendrum (cymbidium aphyllum), caule simplicifloro, aphyllis, tereti, orisulato; floribus lateralibus, subsessilibus; lobelli basi convolato. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 73.

Limodorum aphyllum. Roxb. Cotom. 1. pag. 344. tab. 41.

Cette espèce est remarquable par ses tiges en-

tièrement privées de feuilles, cylindriques, articulées; elles supportent à leur partie supérieure des fleurs presque sessiles, latérales. Le pétale inférieur est roulé à sa base.

Cette plante croît aux Indes orientales, sur les rochers. x

28. ANGREG à feuilles de plantain. *Epidendrum plantaginifolium*. Retz.

Epidendrum (cymbidium plantaginifolium), caule, foliis distichis, linearis-triquetris, canaliculatis, acutis; seapo foliis longiore; floribus spicatis, distichis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 101.

Epidendrum plantaginifolium. Retz. Observ. 6. pag. 60.

Cette espèce, dépourvue de tige, pousse de ses racines des feuilles redressées, linéaires, à trois faces, un peu canaliculées, glabres, charnues, rétrécies vers leur gaine, à peine longues de deux pouces; s'emboîtant les unes les autres à leur base; les gaines membraneuses, striées: il sort de leurs aisselles un épi très-simple, plus long que les feuilles, muni de petites bractées caduques, soutenant des fleurs pédicellées, alternes, disposées sur deux rangs. La corolle est blanche; les pétales très-ouverts; les trois extérieurs plus grands, concaves, membraneux. Les capsules sont ovales, oblongues, glabres, un peu anguleuses; les semences blanchâtres, très-nombreuses, attachées par des fils capillaires très-courts, qui les lancent au loin avec élasticité.

Cette plante croît sur les rameaux supérieurs des arbres, dans les Indes orientales. x (Descript. ex Retz.)

29. ANGREG à feuilles d'aloès, n°. 25. *Epidendrum aloisifolium*. Linn.

Epidendrum (cymbidium aloisifolium), foliis radicalibus lato-linearibus, canaliculatis, carnosiss, apice retusis; seapis multifloris, erectis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 73.

Epidendrum aloisifolium. Jacq. Hort. Schoenb. 3. pag. 69. tab. 385.

30. ANGREG pendant. *Epidendrum pendulum*. Roxb.

Epidendrum (cymbidium pendulum), foliis radicalibus, distichis, lato-linearibus, concavis, apice retusis; seapis declinato-pennatis, multifloris. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 101.

Epidendrum pendulum. Roxb. Corom. 1. pag. 35. t. b. 44.

Cette plante ressemble parfaitement à l'*epiden-*

drum aloisifolium; elle n'en diffère essentiellement que par les hampes pendantes & non redressées; par sa corolle verdâtre, par le pétale inférieur à trois lobes, mais dont le lobe du milieu est échancré.

Cette plante croît dans les Indes orientales. x

31. ANGREG à feuilles ovales, n°. 13. *Epidendrum ovatum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium ovatum), caulibus simplicibus, flexilibus; foliis ovatis, planis; seapis paniculatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 101. — Swartz, Obs. 317.

32. ANGREG taché, n°. 16. *Epidendrum guttatum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium guttatum), foliis radicalibus, lanceolatis, canaliculatis; seapo tereti; petalis cuneiformibus, retusis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 102.

33. ANGREG à feuilles de jonc, n°. 27. *Epidendrum juncifolium*. Linn.

Epidendrum (cymbidium juncifolium), foliis radicalibus, linearis-subulatis; seapo petalisque maculatis; labello unicolore, tripartito; lacinia media transversim dilatata. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 102.

34. ANGREG en treillage. *Epidendrum tessellatum*. Roxb.

Epidendrum (cymbidium tessellatum), caulescens, foliis imbricato-distichis, linearis-canaliculatis, carnosiss, apice tridentatis; racemo axillari. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 75.

Epidendrum tessellatum. Roxb. Corom. 1. pag. 14. tab. 42.

Ses tiges sont garnies de feuilles imbriquées, sur deux rangs, linéaires, canaliculées, glabres, charnues, tridentées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes, placées dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. x

35. ANGREG jaune-obscur, n°. 7. *Epidendrum furvum*. Linn.

Epidendrum (cymbidium furvum), caulescens, foliis imbricato-distichis, lanceolatis, canaliculatis, carnosiss, acutis; racemo axillari. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 103.

36. ANGREG mordu. *Epidendrum prxmorsum*. Roxb.

Epidendrum (cymbidium prxmorsum), caulescens, foliis remotiusculis, distichis, lato-linearibus;

bus, canaliculatis, apice praeformis; spicis oppositifoliis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 75.

Epidendrum praeformis. Roxb. Corom. 1. p. 34. tab. 43.

Thalia-marsavara. Rheed. Malab. 12. pag. 6. tab. 4. — Rudb. Elyf. 2. pag. 122. fig. 8. — Rai, Suppl. 590.

Ses racines produisent des tiges droites, glabres, simples, garnies de feuilles distiques, disposées sur deux rangs, linéaires, un peu élargies, glabres à leurs deux faces, canaliculées en dessous, échancrées & comme rongées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en épis latéraux, opposés aux feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. x

37. ANGREC en éventail. *Epidendrum flabelliforme.* Swartz.

Epidendrum (cymbidium flabelliforme), acaule, compressum, foliis basi attenuatis, carinatis, superae plantis, ovato-lanceolatis, nervosis; supis abbreviatis, unifloris. Swartz, Nov. Act. Upfal. 6. pag. 73, & Flor. Ind. occid. 4. pag. 1471.

Epidendrum flabelliforme. Swartz, Prodr. pag. 123.

Toutes les feuilles sont radicales, disposées & ouvertes en éventail; les extérieures plus petites, comprimées, embrassant les autres en forme de gaine; les intérieures droites, longues d'un pied, rétrécies en pétiole & comprimées à leur base, puis planes, allongées, ovales-lancéolées, glabres, aiguës. Les hampes sont radicales, une fois plus courtes que les feuilles, glabres, cylindriques, garnies de quelques écailles, terminées par une feuille fleur assez grande, médiocrement pédicellée, accompagnée de deux bractées ovales, aiguës; les pétales supérieurs presque égaux, longs d'un pouce, blanchâtres, ovales-lancéolés, aigus, veinés, un peu charnus; les intérieurs ondulés à leurs bords. L'intérieur est peu différent des premiers, ondulé à ses bords, plane vers son sommet. La capsule est pédicellée, longue d'un pouce & demi, un peu recourbée, glabre, trigone, à six stries; les semences entourées d'un arille blanchâtre & diaphane.

Cette plante croît sur les arbres des montagnes, à la Jamaïque. x (*Descript. ex Swartz.*)

38. ANGREC subulé. *Epidendrum subulatum.* Swartz.

Epidendrum (cymbidium subulatum), acaule, foliis subulatis, sulcatis; racemis radicalibus. Sw. Nov. Act. Upf. 6. pag. 73, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1473.

Epidendrum subulatum. Prodr. pag. 123.

Ses racines sont rampantes, filiformes; toutes les feuilles radicales, longues d'un pied, cylindriques, subulées, glabres, charnues, un peu recourbées; des gaines membraneuses proche les racines, environnant la base des feuilles. Les fleurs sont alternes, pédicellées, disposées en grappes longues de deux pouces, sortant des racines, lâches, peu garnies. Les pétales supérieurs sont presque égaux, linéaires, élargis; l'intérieur ovale, concave, aigu. La capsule est oblongue, trigone, à six stries, rétrécie à ses deux extrémités.

Cette plante croît dans les forêts, sur le tronc des arbres, à la Jamaïque. x (*Descript. ex Swartz.*)

39. ANGREC à feuilles menues, n°. 7. *Epidendrum tenuifolium.* Linn.

Epidendrum (cymbidium tenuifolium), caulescens, foliis linearibus subulatis, canaliculatis, distichis; spicis oppositifoliis, paucifloris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 103.

40. ANGREC à feuilles triangulaires. *Epidendrum triquetrum.* Swartz.

Epidendrum (cymbidium triquetrum), acaule, foliis subtriquetris, canaliculatis, recurvatis, marginibus dorso apiceque compressis; seapis simplicifloris, floribus tetrapetalis, labello cordato. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 74, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1475.

Epidendrum triquetrum. Swartz, Prodr. 122.

Ses feuilles sont toutes radicales, disposées sur deux rangs, longues de deux à quatre pouces, vaginales & comprimées à leur base, roides, glabres, canaliculées, ensiformes, presque triangulaires, terminées par une petite pointe. De leur centre s'élève une hampe simple, roide, d'un pourpre-foncé, munie de quelques écailles distantes, lancéolées, soutenant six à dix fleurs un peu pédicellées, d'une grandeur médiocre; les pétales supérieurs presque en croix, inégaux, panachés de rouge & de blanc, ovales, corcaves, recourbés à leur sommet; l'inférieur une fois plus grand, ovale, en cœur. La capsule est pendante, presque longue d'un pouce, pédicellée, trigone, s'ouvrant par ses six stries.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. x (*Descript. ex Vahl.*)

41. ANGREC nain, n°. 37. *Epidendrum pusillum.* Linn.

Epidendrum (cymbidium pusillum), foliis radicalibus ensiformibus, basi equitantibus; seapis paucifloris; labello basi angustiore, laminâ trilobâ. Sw. Nov. Act. Upf. 6. pag. 74. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 104.

42. ANGREG élégant. *Epidendrum pulchellum*. Willd.

Epidendrum (cymbidium pulchellum), foliis radicalibus efformibus, nervosis; scapo paucifloro; labello erecto, basi attenuato; lamina expansa; disco concavo, piloso. Swartz, Nov. Act. Upl. 6. pag. 75. — Willdenow, Spec. Plant. 4. pag. 105.

Limodorum pulchellum. Salisb. Prodr. 8.

Limodorum tuberosum. Linn. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 159.

Limodorum borbotum. Lam. Dict. 3. pag. 515. (Voyez LIMODORE barbu, n°. 2.)

43. ANGREG pudique. *Epidendrum verecundum*. Swartz.

Epidendrum (cymbidium verecundum), foliis radicalibus lato lanceolatis, plicato-nervosis; scapo multifloro, petalis interioribus conniventibus, labello ventricoso; lamina emarginata, crispo, sulcata. Swartz, Nov. Act. Upl. 6. pag. 75. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 105.

Limodorum (verecundum), petalis exterioribus recurvatis, interioribus orlité conniventibus; lobis basi conico, superne recurvo, suborbiculati, emarginato, crenato, crispo; disco septemfimbriato. Salisb. Prodr. 9.

Limodorum tuberosum. Jacquin, Collect. 4. pag. 108.

Limodorum obtusum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 602. — Swartz, Observ. bot. 323.

Limodorum (trifidum), foliis lanceolatis; scapo aphytto; labello trifido, longitudinally lamellato. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 159.

Helleborine americana, radice tuberosa; foliis longis, angustis; caule nudo, floribus ex rubro pallide purpureis. Mart. Censur. tab. 50. — Mill. Dict. & Icon. 145.

Cette espèce, confondue avec la suivante, à laquelle elle ressemble par son port, en est distinguée par ses fleurs d'un pourpre-pâle & rougeâtre. Les pétales extérieurs sont ouverts, un peu recourbés; les intérieurs connivents; le pétale inférieur un peu conique & ventru à sa base; son limbe presque orbiculaire, légèrement courbé, échancré à son sommet, filiforme, crépu & frange à son contour.

Cette plante croît dans l'île de Bahama. (V. f.) Elle est cultivée dans plusieurs jardins d'Europe, sous le nom de *limodorum tuberosum*. Linn.

44. ANGREG élevé. *Epidendrum altum*.

Epidendrum (cymbidium altum), foliis radicalibus lato-lanceolatis, plicato-nervosis; scapo multifloro, petalis erectis, labello luteo. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 105.

Limodorum altum. Linn. & Lam. Dict. 3. pag. 515. (Voyez LIMODORE élevé, n°. 3.)

Ses fleurs sont d'un blanc-jauâtre; les pétales supérieurs tous redressés, l'inférieur très-filé.

45. ANGREG à fleurs jaunes. *Epidendrum luteum*. Willd.

Epidendrum (cymbidium luteum), foliis radicalibus oblongis, acatis; scapo erecto, simpliciter, paucifloro; labello oblongo, obtuso, petalis brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 106.

Epipollis omphalo flore luteo, vulgo govilu. Feuill. Per. 2. pag. 719. tab. 20.

Limodorum (luteum), floribus sessilibus, alternis, conferto-floccatis. Lam. Dict. 3. pag. 516. *

Ses racines sont composées de bulbes fasciculées, d'où s'élève une tige droite, cylindrique, haute de deux pieds, garnie à sa base de quelques feuilles très-glabres, d'un beau vert, oblongues, aiguës, assez sensiblement à celles du lis, longues d'environ sept poices sur un & demi de large, vaginales à leur base. La partie supérieure de la tige est enveloppée de gaines alternes, cylindriques, un peu aiguës. Les fleurs sont grandes, d'un beau jaune, alternes, sessiles, ramassées à l'extrémité des tiges en un épi court, accompagnées chacune d'une bractée lancéolée, aiguë, plus longue que l'ovaire; les cinq pétales supérieurs inégaux; médiocrement ouverts, lancéolés, aigus; l'inférieur plus court, oblong, à peine aigu.

Cette plante croît au Chili, dans les lieux un peu humides. Les femmes indiennes nouvellement accouchées mêlent le suc de cette plante avec du bouillon; elles boivent ce mélange pour faire venir leur lait en plus grande abondance. (Feuille.)

46. ANGREG à feuilles verdâtres. *Epidendrum virens*.

Epidendrum (cymbidium virens), foliis radicalibus lanceolatis; scapo erecto, simplici; spica coarctata; petalis tribus exterioribus lanceolatis, obovatis; binis interioribus oblongis, obtusis; lobello ovato, obtuso, elevato-sulcato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 106.

Epipollis flore virente & variegata, vulgo piquichen. Feuill. Per. 2. pag. 127. tab. 19.

Limodorum (piquichen), foliis erectis, brevibus; spica ovata; corollam labio erecto, apice recurvo. Lam. Dict. 3. pag. 516. *

Ses racines sont composées de bulbes oblongues, épaisses, fasciculées, contenant une substance blanchâtre, aqueuse, d'une saveur douceâtre, un peu piquante. Ses tiges sont hautes de trois pieds, givrées, cylindriques, spongieuses, droites, très-simples, munies de gaines alternes, courtes, aiguës. Les feuilles sont toutes radicales, courtes, redressées, concaves, lancéolées, rigides. Les fleurs sont grandes, d'un blanc verdâtre, sessiles, forment à l'extrémité des tiges un bel épi ovale, touffu; les trois pétales extérieurs lancéolés, aigus; les deux intérieurs oblongs, obtus; le pétale inférieur ovale, obtus, traversé de lignes ondulées. La capsule est longue d'un pouce & plus, très étroite, à trois valves, contenant des semences nombreuses, fort petites.

Cette plante croît au Chili, sur le revers des montagnes. ♀ (Feuille.)

47. ANGREC diurne. *Epidendrum diurnum*.

Epidendrum (cymbidium diurnum), foliis radicalibus linearilanceolatis, carinatis; seapo paniculato, petalis patensibus, labello erecto, laminâ trilobâ. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 221. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 106.

Limodorum (diurnum), floribus imberbibus; fricis paniculatis, ex centro bulbî ortis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 603, & Coll. c. 4. pag. 107.

Ses racines sont nombreuses, blanchâtres, cylindriques; les bulbes charnues, agrégées, ovales-oblongues, comprimées, chacune d'elles donnant naissance à deux ou trois feuilles radicales, presque linéaires, fermes, coriaces, un peu obtuses, presque longues d'un pied & demi. De leur centre s'élève une hampe droite, flexueuse, haute de deux pieds, se ramifiant à son sommet en une panicule très-étalée, soutenant des fleurs pédicellées, odorantes seulement pendant le jour. La corolle est d'un vert jaunâtre; les pétales supérieurs très-étalés; l'inférieur redressé, à trois lobes.

Cette plante croît dans les forêts, en Amérique, aux environs de Caracas. ♀

48. ANGREC à feuilles canaliculées. *Epidendrum canaliculatum*.

Epidendrum (cymbidium rigidum), subcaulescens, foliis lanceolatis, canaliculatis, d'istichis; seapo erecto, simpliciter foliis adpressis, lanceolatis, vaginatis, carinatis recto; labello obovato, acuto. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 106.

Helleborine foliis rigidis, angustis. Plum. Spec. 9, & Icon. tab. 181. fig. 1.

Ses racines sont simples, filiformes, étalées; ses tiges droites, très-simples, feuillées seulement à leur partie inférieure, revêtues de gaines fer-

rées, oblongues, lancéolées. Les feuilles sont roides, alternes, allongées, étroites, canaliculées, très-aiguës, disposées sur deux rangs; les fleurs alternes, pédicellées, formant un épi lâche, droit & terminal; les cinq pétales supérieurs presque ovales, étalés; trois plus grands; les deux autres conviennent; le pétale inférieur aigu, en ovale renversé. Le fruit est une capsule pendante, oblongue, cannelée, à trois valves, couronnées par les pétales persistants & desséchés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. ♀

49. ANGREC d'hiver. *Epidendrum hyemale*.

Epidendrum (cymbidium hyemale), foliis radicalibus geminis, ovatis, quinque nervis; seapo simplici, vaginato, erecto; petalis erectis; labello obovato, margine undulato erecto. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 107. — Mühlb. in Linn.

Ses feuilles radicales sont au nombre de deux, amples, glabres, ovales, assez semblables à celles du veratrum, à plusieurs nervures en dessus, à cinq nervures en dessous, rudes à leurs bords; il en sort une hampe droite, simple, haute de six à sept pouces & plus, couverte de gaines, supportant vers son sommet plusieurs fleurs accompagnées de bractées lancéolées, longues de trois lignes, plusieurs fois plus courtes que les ovaires. Les trois pétales extérieurs sont lancéolés; les deux inférieurs oblongs; le pétale inférieur en ovale renversé, plissé longitudinalement à sa partie supérieure, crénelé, ondulé à ses bords.

50. ANGREC urticulé. *Epidendrum urticulatum*.

Epidendrum (cymbidium urticulatum), acaule, foliis geminis, lanceolato-ovatis, seapoque multiflora, vaginâ inflatâ basi ciliis; petalis subconnatis; radice maximâ, tuberosâ. Swartz. Nov. Act. Ups. pag. 75. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 107.

Limodorum urticulatum. Swartz, Prodr. 119.

Ses racines sont tubéreuses, irrégulières, charnues, succulentes, surmontées d'une bulbe arrondie, environnée de pellicules sèches; il en sort deux feuilles presque longues d'un pied, élargies, lancéolées, glabres, aiguës, entourées à leur base de gaines écailleuses, dont une très-grande, venimeuse, acuminée, l'ouvre à file & remplie d'une eau limpide. De leur centre s'élève une hampe cylindrique, deux fois plus longue que les feuilles, couverte de quelques écailles épaisses; elle se termine par des fleurs blanches, alternes, distantes, sessiles, un peu grandes, caduques, accompagnées de bractées courtes, lancéolées. Le pétale supérieur externe est concave; les deux inférieurs lancéolés, courbés en faucille, rapprochés en casque; les latéraux extérieurs en bourse à leur base externe, rapprochés, par leur sommet, des

supérieures internes; le pétale inférieur élargi à sa base, ovale, concave; son limbe redressé, obtus & recourbé au sommet, marqué de trois taches purpurines; les anthères presque coniques, à quatre loges; une capsule grande, oblongue, acuminée & un peu tordue à ses deux extrémités, à trois failles & six cannelures.

Cette plante croît sur la terre, dans les forêts, à la Jamaïque & à la Nouvelle-Espagne. ✕ (Descript. ex Swartz.)

51. ANGREC géant. *Epidendrum giganteum*.

Epidendrum (cymbidium giganteum), foliis radicalibus, equitanti-ensiformibus, subrecurvis; scapo tereti, floribus remotis, labello hystato; lacinia intermedia ovata, plicata. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 224.

Limodorum (giganteum), foliis ensiformibus, recurvis; floribus spicatis, remotis. Thunberg, Prodr. 4.

Satyrium giganteum. Linn. Suppl. — Poir. Dict. 7. pag. 582. ✕

Ses tiges s'élèvent au moins à la hauteur de six pi. ds; elles sont nues, cylindriques, pourvues de bulbes arrondies, couvertes dans leur longueur d'écailles vaginales. Les feuilles sont toutes radicales, glabres, ensiformes, un peu recourbées, s'emboîtent les unes les autres par leur base. L'extrémité des tiges supporte de grandes fleurs distantes, d'un jaune-orangé, disposées en épi; les pétales supérieurs médiocrement ouverts; l'inférieur halfé & non sagitté, point éperonné, seulement renflé en bosse à sa base, en dessous, à trois découpures inégales, deltoides & saillantes vers leur base; celle du milieu fort ample, ovale, plissée.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

52. ANGREC du Cap. *Epidendrum tabulare*.

Epidendrum (cymbidium tabulare), folio radicali, lineari; scapo erecto, paucifloro; lamina labelli trifida; lacinia ovata, integra. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 2. 4.

Serapias (tabularis), folio radicali, lineari; floribus spicatis, cernuis. Thunb. Prodr. 3.

Satyrium tabulare. Linn. Suppl. — Poir. Dict. 7. pag. 582. ✕

Ses racines sont bulbueuses; elles produisent une feuille radicale, linéaire. Les tiges sont droites, privées de feuilles, munies d'écailles alternes; elles supportent à leur extrémité un épi incliné de fleurs lâches, peu nombreuses. Le pétale inférieur est divisé en trois lobes à son limbe; le lobe du milieu entier & non échancré.

Cette plante croît sur la montagne de la Table, au Cap de Bonne-Espérance. ✕

53. ANGREC pédicellé. *Epidendrum pedicellatum*.

Epidendrum (cymbidium pedicellatum), folio radicali, lineari-lanceolato-nervoso; scapo angulato; floribus subpedicellatis, mutatis; petalis erectis. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 224.

Serapias (pedicellata), folio radicali, ensiformi, striato; floribus subracemosis. Thunberg, Prodr. pag. 3.

Satyrium pedicellatum. Linn. f. Suppl. 402. (F. 97 SATIRION pédicellé, Dict. vol. 7. p. 580. n. 11.)

54. ANGREC à aiguillons. *Epidendrum aculeatum*.

Epidendrum (cymbidium aculeatum), foliis radicalibus subternis, ensiformibus; scapo vaginato, styca ovata. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 225.

Serapias (aculeata), foliis radicalibus subternis, ensiformibus, striatis; styca ovata. Thunb. Prodr. pag. 3.

Satyrium aculeatum. Linn. Suppl. — Poir. Dict. 7. pag. 582. ✕

Ses racines sont bulbueuses, arrondies; il en sort deux ou trois feuilles en forme de lame d'épée, striées longitudinalement. Les tiges sont droites, hautes de trois à quatre pouces, garnies dans leur longueur de gaines alternes, foliacées. Les fleurs sont disposées en un épi ovale, terminal. Les pétales sont redressés; le pétale inférieur en bosse à sa base, trifide à son limbe; la découpeure du milieu hérissée de petites pointes blanches & purpurines.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

55. ANGREC écailléux. *Epidendrum squamatum*.

Epidendrum (cymbidium squamatum), foliis radicalibus oblongis, imbricatis; scapo elongato, apophyllo; labello obsexo, trifido; barbato. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 109. — Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 238.

Ophrys squamata. Forst. Prodr. pag. 310. — Poir. Dict. 4. pag. 575. ✕

Ses racines sont composées de bulbes fasciculés; elles produisent des feuilles toutes radicales, oblongues, imbriquées, aiguës, saillantes en carène sur leur dos. De leur centre s'élève une hampe droite, dépourvue de feuilles, terminée par des fleurs disposées en épi. Le pétale inférieur est rabattu, bas, à trois découpures.

Cette

Cette plante croît dans la Nouvelle-Calédonie. 7

56. ANGREC corail. *Epidendrum corallorhizon*.

Epidendrum (cymbidium corallorhizon), *scapo vaginato*, *aphyllo*; *floribus pedicellatis*; *petalis lanceolatis*, *basis inferioribus linearibus*, *reflexis*; *labello oblongo*, *curvo*. Willd. Spec. Plant. 4. p. 109. — Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 258.

Ophrys corallorhiza. Linn. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 912. — Poiteb. Dict. 4. pag. 167. n°. 2. (Exclus. Pluken. synonymo.) (Voyez OPHRISSE, n°. 2.)

Il n'y a qu'une seule étamine, dont l'anthère est divisée en quatre loges. Le pétale inférieur est oblong, aigu, presque entier, n'offrant que deux petits lobes peu sensibles au dessus de la base.

57. ANGREC racines en dents. *Epidendrum odontorhizon*.

Epidendrum (cymbidium odontorhizon), *scapo vaginato*, *aphyllo*; *floribus pedicellatis*; *petalis lanceolatis*, *aqualibus*; *labello obovato*, *obtus*. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 110.

Ophrys corallorhiza. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 158.

Orobanchæ autumnalis, virginiana, radice dentat. Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2.

Orobanchæ verna, radice dentat, *virginiana*. Pluken. Almag. 273. tab. 211. fig. 2.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la précédente; elle en diffère par les pétales lancéolés, l'inférieur ovale, obtus. Ses racines sont grumeleuses, ramifiées, semblables à de petites dents enchaînées les unes dans les autres, hérissées de petites pointes à leurs bords. Ses hampes sont dépourvues de feuilles enveloppées de gaines alternes, presque obtuses; les fleurs petites, pédicellées, réunies en un épi terminal peu garni, pourvu de très-petites bractées.

Cette plante croît au Canada, dans la Pensilvanie, la Virginie & à la Nouvelle-Angleterre. 7

58. ANGREC à grandes fleurs. *Epidendrum grandiflorum*.

Epidendrum (cymbidium grandiflorum), *scapo subtrifloro*, *vaginato*; *vaginis remotis*, *foliaceis*, *ovato-lanceolatis*; *labello trilobo*, *intermedio emarginato*. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 221. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 110.

Limodorum (grandiflorum), *radice tuberosa*; *fiore amplo*, *luteo*. Aublet, Guian. 2. pag. 818. tab. 321.

Ses racines sont pourvues d'un tubercule arborescent. Supplément, Tome I.

rondi & charnu, d'où s'élève une tige anguleuse, haute d'environ deux pieds, garnie de trois ou quatre feuilles toutes radicales, ovales-oblongues, lancéolées, aiguës; elles ne forment plus ensuite que des gaines distantes, qui enveloppent les tiges. Celles-ci ne supportent à leur sommet que deux ou trois fleurs, enveloppées chacune d'une bractée longue, élargie, ovale, aiguë. La corolle est jaune, fort grande; les cinq pétales supérieurs ovales-lancéolés, inégaux; l'inférieur ponctué de rouge, à trois lobes; celui du milieu échancré.

Cette plante croît dans les prés, à la Guiane. 7

59. ANGREC enfiliforme, n°. 40. *Epidendrum ensifolium*. Linn.

Epidendrum (cymbidium ensifolium), *foliis radicalibus ensiformibus*, *nervosis*; *scapo tereti*, *paniculato*; *labello ovato*, *subcurvato*, *maculato*. Sw. Nov. Aët. Upf. 6. pag. 77.

Epidendrum (ensifolium), *scapo tereti*, *levi*; *foliis ensiformibus*, *petalis lanceolatis*; *nectarii lobis lanceolatis*, *recurvo*, *punctato*. Smith, Spic. bot. pag. 12. tab. 24.

Limodorum ensatum. Thunb. Flor. japon. 29. — Bank. Icon. Kœmpf. tab. 3. — Lam. Dict. 3. pag. 516. *

60. ANGREC strié. *Epidendrum striatum*. Thunb.

Epidendrum (cymbidium striatum), *foliis radicalibus ensiformibus*, *nervosis*; *scapo angulato*, *paniculato*; *labello oblongo*; *laminis planis*, *crispatis*. Sw. Nov. Aët. Upf. 6. pag. 77. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 111.

Limodorum striatum. Thunb. Flor. jap. pag. 28, & Icon. Plant. japon. tab. 9. — Lam. Diction. 3. pag. 516. *

Epidendrum striatum. Thunb. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 327.

Ses feuilles sont toutes radicales, en forme de lame d'épée, glabres, nerveuses, stries. De leur centre s'élève une hampe droite, glabre, anguleuse, munie de quelques fleurs à son extrémité. Les pétales sont lancéolés; l'inférieur oblong; son limbe plane, à trois lobes.

Cette plante croît au Japon. 7

61. ANGREC de Chine. *Epidendrum sinense*. Andrew.

Epidendrum (cymbidium sinense), *foliis radicalibus ensiformibus*, *nervosis*; *scapo paniculato*, *floribus secundis*, *petalis striatis*, *tribus exterioribus reflexis*; *labello oblongo*, *obtus*; *reflexo*. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 111.

B b b

Epidendrum (linense), foliis ensiformibus, nervosis, radicalibus; nechario revolutio, punctato; petalis striatis. Andrews, Repof. botan. 3. pag. 216. tab. 216.

Quoique très-rapprochée par les feuilles de l'espèce précédente, celle-ci en est très-distincte; elle en diffère par la forme & la disposition de ses fleurs peu nombreuses, toutes tournées du même côté à l'extrémité des hampes; les pétales striés. Les trois extérieurs sont beaucoup plus étroits, réfléchis en dehors; les deux intérieurs connivens; le pétale inférieur rabattu, ponctué, oblong, obtus.

Cette plante croît à la Chine. 7

* *ANGREC terrestre. Epidendrum terrestre*. Gært. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 47. tab. 14. fig. 6. — Lam. Ill. tab. 730. fig. 3.

Angracum terrestre primum. Rumph. Amboin. 6. pag. 112. tab. 51. fig. 1. ? *Od stylum*.

Il est très-difficile de pouvoir prononcer sur cette espèce, dont Gærtner ne donne que la description du fruit, & qu'il ne rapporte qu'avec doute à la figure qu'il cite de Rumph.

II. *ONCIDIUM*. Swartz. Corolle à cinq ou six pétales; le pétale inférieur plane, tuberculeux à sa base; antière operculée, caduque.

61. *ANGREC de Carthage. Epidendrum carthagenense*. Swartz.

Epidendrum (oncidium carthagenense), caule, foliis ellipticis, planiusculis, carnosis; seapo ramiformi; petalis unguiculatis, subrotundis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. p. 1479. & Aët. Holm. 1800. pag. 240.

Epidendrum (carthagenense), foliis radicalibus lanceolato-oblongis, acutis, planis; racemo composito. Jacq. Amer. pag. 223. tab. 133. fig. 4. ?

Epidendrum undulatum. Swartz, Prodr. 122.

Vifcum radice majus & elatius, delphinii flore ferrugineo, guttato. Sloan, Hist. 250. tab. 142. fig. 1. (*Ramus panicula*.)

Satyrium parajanicum, foliis oblongis, radicalibus, maculatis; seapo effurgente, longo, sermentoso, nudo, ad apicem ramofo; floribus miscellis. Brown, Jam. 126. 15.

Epidendrum crispum, var. g. Lam. Dict. n°. 54.

Ses racines sont brunes, épaisses, filiformes, très-roides; ses feuilles toutes radicales, longues d'un pied, larges de deux pouces, planes, elliptiques, un peu obtuses, quelquefois tachetées de noir. De leur centre s'élève une hampe de trois à quatre pieds, cylindrique à sa partie inférieure,

un peu brune, rameuse vers son sommet; les racines nombreux, alternes, étalés, un peu flexueux, chargés vers leur sommet de fleurs grandes, alternes, légèrement pédicellées, accompagnées de bractées acuminées; cinq pétales supérieurs étalés, un peu spatulés, ovales, obtus, panachés de blanc, de pourpre & de brun; les trois extérieurs connivens à leur base; les deux intérieurs un peu plus grands, veinés, ondules; leurs onglets plus élargis; le pétale inférieur divisé en trois lobes inégaux; celui du milieu très-grand, en forme de rein, ondule; les anthères fort grandes, à deux loges. La capsule est grande, pédicellée, longue d'un pouce & demi, ovale, à six failles, s'ouvrant longitudinalement dans son milieu en trois valves hérissées en dedans de poils crépus, contenant de très-petites semences nombreuses, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités.

Cette plante croît sur les troncs & les rameaux des arbres, à la Jamaïque. 7 (*Descript. ex Swartz*.)

63. *ANGREC élevé, n°. 33. Epidendrum altissimum*. Jacq.

Epidendrum (oncidium altissimum), foliis radicalibus lanceolatis; seapo paniculato, corollis pentapetalis, petalis lanceolatis, labello emarginato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 112. — Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 240. & Flor. Ind. occident. 3. pag. 1481.

Epidendrum altissimum. Swartz, Prodr. 123.

Cymbidium altissimum. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 74.

64. *ANGREC à quatre pétales, n°. 39. Epidendrum tetrapetalum*. Jacq.

Epidendrum (oncidium tetrapetalum), foliis radicalibus subulatis, carinatis; seapo simplici, corollis tetrapetalis; petalis ovatis, repandis; labello obovato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 112.

Oncidium quadripetalum. Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 240.

Cymbidium (tetrapetalum), foliis radicalibus subulatis, dorso angulatis, scabris, margine integris; petalis acuminatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 74.

65. *ANGREC panaché. Epidendrum variegatum*. Swartz.

Epidendrum (oncidium variegatum), foliis radicalibus lanceolatis, carinatis, cartilagineo-ferrugineis; seapo simplici, corollis tetrapetalis, petalis obovatis, labello bilobo. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 113. — Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 240. & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1483.

Epidendrum variegatum. Swartz, Prodr. 122.

Cymbidium variegatum. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 74.

Viscum delphinii, flore albo, gustato, minus; radice fibrâ. Sloan. Jam. 120. Hist. 1. pag. 251. tab. 148 fig. 2.

Helleborine foliis variegatis, carinatis & sulcatis. Plum. Spec. 9. lc. 181. fig. 2.

Ophrys guianensis. Aubl. Guian. 2. pag. 816.

Cette plante se rapproche de la précédente; elle s'en distingue par ses feuilles recourbées, point subuléet, lancéolées, canaliculées, cartilagineuses & légèrement denticulées à leurs bords, plus anguleuses par leur dos, maculées dans leur sillon. Les racines sont longues, nombreuses, rampantes; les tiges roides, filiformes, glabres, nues, parsemées de quelques écailles, quelquefois ramifiées en panicule vers leur sommet. Les fleurs sont très-belles, d'une grandeur médiocre, presque sessiles, accompagnées de petites bractées ovales-lancéolées; quatre pétales ouverts en croix; deux plus petits, rouges, concaves, rétrécis à leur base; deux autres plus grands, spatulés, obtus, ondulés; le cinquième beaucoup plus grand, à trois lobes inégaux; celui du milieu très-large, réniforme, blanc, racheté de rouge vers sa base; les deux latéraux plus courts, oblongs, courbés en faucille. La capsule est cannelée, allongée, torse à sa base.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne, sur les arbres, particulièrement sur le *erescentia*. ☞ (Descript. ex Swartz.)

66. ANGREC cébollet. *Epidendrum cebolleta*. Jacq.

Epidendrum (oncidium *cebolleta*), folio tereti, subulato; scapo simplici, striato; racemis pendulis, multifloris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 113.

Epidendrum cebolleta. Jacq. Amer. 230. tab. 131. fig. 2.

Oncidium cebolleta. Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 240.

Ses racines ne produisent qu'une seule feuille radicale, cylindrique, subulée. Ses hampes sont roides, simples, glabres; elles supportent des grappes ramifiées, pendantes, composées de fleurs assez nombreuses.

Cette plante croît dans les environs de Cartagène, au milieu des forêts, le long des bords de la mer. ☞

III. EPIDENDRUM. Swartz. Corolle à six pétales; les cinq supérieurs ouverts; l'inférieur tubulé à sa base, privé d'éperon; anthère caduque, operculée.

67. ANGREC en coquille, n°. 21. *Epidendrum cochleatum*. Linn.

Epidendrum foliis geminis, oblongis, bulbo innatis; scapo elongato; lamella labelli cordata, ovata. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 67. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 605, & Collect. 3. pag. 214. — Andr. Repos. bot. 1. pag. 13. tab. 13. — Lam. Ill. Gen. t. b. 730. fig. 2.

68. ANGREC odorant. *Epidendrum fragrans*. Swartz.

Epidendrum folio lato, lanceolato; bulbo innato; scapo indiviso, multifloro, abbreviato; lamina labelli cordato-acuta. Swartz, Prod. 122. & Fior. Ind. occid. 3. pag. 1487. — Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 67. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 304.

Epidendrum lineareum. Salisbur. Stirp. pag. 10.

Epidendrum cochleatum. Curtis, Magaz. tab. 152.

Ses racines sont courtes, filiformes, blanchâtres, accompagnées d'une bulbe oblongue, charnue, environnée à la base d'une ou de deux gaines membraneuses; il n'en sort qu'une seule feuille, longue d'un pied, lanceolée, élargie, plane, entière, acuminée, quelquefois un peu échancrée au sommet. De la base de la feuille s'élève une hampe un peu cylindrique, striée, plus courte que la feuille, accompagnée de deux gaines alternes, ovales; elle supporte environ dix à douze fleurs, grandes, blanches, alternes, avec de petites bractées étroites. Les pétales sont recourbés à leur sommet; les trois extérieurs linéaires, lancéolés, allongés; les deux intérieurs ovales, aigus; le pétale inférieur rétréci à sa base, dilaté, en cœur à son limbe, aigu, redressé à son sommet, marqué dans sa longueur de stries d'un rouge de sang; les anthères à quatre loges. Les capsules sont grandes, oblongues, trigones, presqu'à trois ailes.

Cette plante croît sur les vieux troncs des arbres, dans la Jamaïque. Ses fleurs répandent, au lever & au coucher du soleil, une odeur très-agréable. ☞ (Descript. ex Swartz.)

69. ANGREC bifide, n°. 35. *Epidendrum bifidum*. Aubl.

Epidendrum foliis subternis, bulbo innatis, lanceolatis; scapo ramofo; lamina labelli tripartita; lobo intermedio reniformi, bifido. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 67.

Epidendrum (papilionaceum), foliis subradicalibus lanceolatis; racemis terminalibus; labio obcordato, petalis lanceolatis longiore. West. St. Cruc. pag. 230.

70. ANGREC à feuilles de lis. *Epidendrum liliifolium*. Retz.

Epidendrum foliis subternis, lineari-lanceolatis, Bbb 1

bulbo innatis; scapo simplici, laminis lobellii lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 115. — Retz. Obs. bot. 6. pag. 61.

Ses racines produisent plusieurs bulbes, d'où sortent deux ou trois feuilles presque sessiles, linéaires-lancéolées, glabres, un peu aiguës, d'un vert-obscur, membraneuses, en carène sur leur dos. Les hampe s'élève de la base des bulbes; elles sont simples, solitaires, courtes, filiformes, articulées, terminées par une grappe simple, soutenant des fleurs nombreuses, alternes, pédicellées, blanches, purpurines vers leur sommet; les cinq pétales supérieurs presque égaux, concaves, un peu recourbés à leur sommet, aigus, linéaires; le pétale inférieur lancéolé. Les capsules sont longues d'un pouce, ovales, presque trigones, à trois siliques, presque glabres.

Cette plante croît sur les arbres, dans les Indes orientales. (Descript. ex Retz.)

71. ANGREC à plusieurs bulbes. *Epidendrum polybulbon.* Swartz.

Epidendrum caule repente, bulbifero; bulbis distichis, unifloris; flore pedunculato, laminis lobellii cordatis. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 67. Prodr. 124, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1491.

Ses tiges sont longues, articulées & rampantes, poussant à des articulations de petites racines blanches, filiformes, par lesquelles la plante adhère fortement à l'écorce des arbres; pourvues de bulbes ovales, presque sessiles, enveloppées de deux gaines opposées: il en sort deux petites feuilles lancéolées, ovales, obtuses. De leur centre s'élève des peduncules solitaires, très-courts, soutenant une fleur assez grande, blanche, inclinée. Les cinq pétales supérieurs sont presque égaux, lancéolés, linéaires, aigus; l'inférieur redressé; son limbe arrondi, en cœur, échancré à son sommet; l'anthère ovale, à deux loges; la capsule étroite, oblongue, brune, obscurément trigone.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque. (Descript. ex Swartz.)

72. ANGREC sessile. *Epidendrum sessile.* Retz.

Epidendrum caule scandente, bulbifero; foliis lanceolatis, crispis, subsessilibus, bulbo innatis; floribus geminis, subsessilibus; laminis lobellii lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 15. — Retz. Obs. bot. 6. pag. 66. (Non Swartz Prodr.)

Ses tiges sont grimpantes, cyndriques, filiformes, couvertes d'écaillés petites, ovales, oblongues, pourvues de bulbes d'où sortent des feuilles éparées, presque sessiles, lancéolées, obtuses à leur sommet, glabres en dessus, d'un vert-jauâtre, longues à peine d'un pouce, larges de

trois à quatre lignes. Les fleurs sont petites, geminées, rarement solitaires, presque sessiles, axillaires, accompagnées chacune d'une bractée courte, blanchâtre, enfiée, membraneuse. La corolle est blanche; les trois pétales extérieurs ovales à leur base, prolongés à leur sommet en une longue pointe; les deux latéraux ovales, oblongs, très-entiers; le pétale inférieur ascendant, lancéolé, jaunâtre, plus long que les précédents. La capsule est glabre, petite, obscurément trigone.

Cette plante croît dans les Indes orientales, sur le tronc des arbres.

73. ANGREC labié. *Epidendrum labiatum.*

Epidendrum foliis radiceolibus oblongis; bulbo medio solitario, monophyllo; seapis paucifloris; laminis lobellii obovatis, incurvis. Swartz, Nov. Act. Ups. 6. pag. 67. Prodr. 124, & Flor. Ind. occident. 3. pag. 1495.

Ses racines sont blanches, simples, filiformes; les feuilles radicales oblongues, entières, glabres, luisantes, un peu réfléchies à leur sommet, d'un vert très-foncé, longues d'un pouce & demi. Dans leur centre croît une bulbe arrondie, d'où s'élève une feuille semblable aux premières. Du milieu des feuilles s'élèvent plusieurs nappes filiformes, simples, plus longues que les feuilles, peu garnies de fleurs, accompagnées de bractées lancéolées. La corolle est petite; les trois pétales supérieurs oblongs, étalés, concaves, obtus, de couleur purpurine, striés de jaune; deux antérieurs, connivés à leur base; le pétale inférieur une fois plus grand; son limbe s'abaisse, un peu échancré au sommet; l'anthère arrondie, à deux loges; la capsule oblongue, à six côtes, acuminée à ses deux extrémités, plane à un de ses côtés.

Cette plante croît sur les arbres, à la Nouvelle-Espagne. (Descript. ex Swartz.)

74. ANGREC d'un pourpre-foncé. *Epidendrum atropurpureum.* Willd.

Epidendrum foliis subternis, lanceolatis, bulbo innatis; scapo simplici, laminis lobellii obcordatis, lobis remotis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 115.

Heliconia floribus atropurpureis. Plum. Spec. 9. lc. 178. fig. 1.

An limodorum purpureum? Lam. Dict. 3. pag. 515.

Cette plante est privée de tige: il sort d'une bulbe radicale deux ou trois feuilles lancéolées, vaginales à leur base, du centre desquelles s'élève une hampe très-simple, qui supporte des fleurs d'un pourpre-foncé. Le pétale inférieur de la corolle est large, en forme de cœur renversé, à trois lobes écartés.

Cette plante croît dans l'Amérique. 4

75. ANGREC blanc, n°. 30. *Epidendrum amabile*. Linn.

Epidendrum foliis radicalibus lato-lanceolatis; scapo surdiviso; petalis lateralibus orbiculatis; lamina labelli tripartita; lacinia intermedia hastata, apice bifida. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 67.

76. ANGREC étalé. *Epidendrum patens*. Swartz.

Epidendrum caule simpliciter, foliis oblongis; panícula terminali, simplici; diffusa; lamina labelli tripartita; lobo intermedio bipartito. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1495.

Ses tiges sont simples, hautes à peine d'un pied, comprimées & à deux angles vers leur sommet; les feuilles toutes radicales, glabres, oblongues-lancéolées, un peu striées, longues de deux à quatre pouces. Les fleurs sont d'une couleur pâle, légèrement pédicellées, disposées en une panicule étalée, à ramifications peu nombreuses, alternes, distantes, munies de bractées linéaires, lancéolées; les cinq pétales supérieurs presque égaux, oblongs, concaves, aigus; l'inférieur redressé; son limbe à trois lobes; les deux latéraux arrondis; celui du milieu plus étroit, bifide à son sommet.

Cette plante croît sur les arbres, dans les forêts, à la Jamaïque. 4 (Description. ex Swartz.)

77. ANGREC verruqueux. *Epidendrum verrucosum*. Swartz.

Epidendrum caule simpliciter, verrucoso, foliis; foliis lanceolatis, nervosis; scapo paniculato corollisque impunctatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1497.

Ses racines produisent plusieurs tiges droites, cylindriques, hautes de deux pieds, simples, stériles, garnies de feuilles alternes, lancéolées, nerveuses, longues de six à sept pouces; les gaines striées, brunes ou purpurines, parsemées de tubercules & de points noirs; il s'élève des racines une hampe plus longue que les tiges, lisse, écailleuse, paniculée, à ramifications étalées, soutenant vers leur sommet des fleurs alternes, pédicellées, point pointues, pâles ou d'un jaune-foncé, d'une grandeur médiocre, accompagnées de bractées ovales, aigües; les trois pétales extérieurs ovales, oblongs; les deux intérieurs linéaires, concaves; l'inférieur rubule, divisé à son limbe en trois découpures; les latérales lancéolées, obtuses; l'intermédiaire linéaire, plus longue, bifide; trois callosités linéaires à l'orifice du tube; l'anthere à deux loges.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronc des arbres. 4 (Description. ex Swartz.)

78. ANGREC poncé, n°. 11. *Epidendrum punctatum*. Linn.

Epidendrum caule simpliciter, vaginis imbricato; foliis lanceolatis, nervosis; scapo paniculato corollisque punctatis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. p. 68.

Il diffère de la précédente par ses gaines plus lâches, plus imbriquées; par ses panicules moins étalées; par les pedoncules & les corolles, chargés de points rougeâtres.

79. ANGREC penché. *Epidendrum nutans*. Sw.

Epidendrum caule simpliciter; foliis ovato-lanceolatis, amplexicaulis; floribus subsessilibus, nutantibus; lamina labelli trilobata, lobo intermedio tripartito. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68. Prodr. 121, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1499.

Ses tiges sont simples, cylindriques, hautes de deux pieds, garnies de feuilles amplexicaules, ovales-lancéolées, planes, aigües, rougeâtres à leur base. Les fleurs sont jaunes, sessiles, assez grandes, réunies au nombre de vingt à trente en un épi solitaire, terminal, incliné, muni de quelques bractées distantes, lancéolées, d'un pourpre clair; les trois pétales extérieurs ovales-lancéolés, aigus; les deux intérieurs linéaires, acuminés; l'inférieur à trois lobes; les deux lobes latéraux ovales, entiers; celui du milieu à trois dents; deux redressées; celle du milieu rabattue; l'anthere à quatre loges. La capsule est grande, oblongue, à six failles.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque. 4 (Description. ex Swartz.)

80. ANGREC difforme, n°. 21. *Epidendrum difforme*. Jacq.

81. *Epidendrum (umbellatum), caule simpliciter; foliis oblongis, submarginatis; floribus terminalibus, confertis; lamina labelli trilobata, lobo intermedio emarginato*. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1501.

La plante décrite par Swartz ne diffère, d'après ce même auteur, de l'*Epidendrum difforme* Jacq. que par le pétales inférieur, divisé en trois lobes; les deux latéraux convexes, ondules; celui du milieu plus petit, échancré à son sommet; son tube ou sa partie intérieure une fois plus court que les pétales.

Cette plante croît à la Jamaïque. 4

81. ANGREC diffus. *Epidendrum diffusum*. Swartz.

Epidendrum caule simpliciter, apiculis; foliis oblongis; panícula terminali, ramossissima; lamina labelli cordata, acuminata. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68. Prodr. 121, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1503.

Ses racines sont filiformes; les tiges droites, simples, à deux angles, nues de six pouces, garnies à leur partie supérieure de feuilles oblongues, nerveuses, à peine aiguës, longues d'un pouce & demi, striées sur leur gaine. Les fleurs sont petites, un peu pédicellées, d'un rouge de sang, disposées en une panicule terminale, longue d'un pied, très rameuse; les rameaux diffus, étalés, à ramifications filiformes, purpurines, accompagnées de très-petites bractées; les cinq pétales (supérieurs presque égaux; les deux intérieurs plus étroits; le pétale inférieur redressé, en cœur, acuminé, veiné; deux callosités à l'orifice du tube. La capsule est pendante, trigone, elliptique.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les arbres.
 (D. script. ex Swartz.)

82. ANGREG rameux, n°. 19. *Epidendrum rosmosum*. Jacq.

Epidendrum caule simpliciter; foliis linearibus, obtusis, emarginatis; spicis terminalibus, laxis; floribus aëstichis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68. Prodr. 120, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1505.

Les trois pétales extérieurs de la corolle sont ovales, lancéolés; les deux intérieurs linéaires, aigus; l'inférieur redressé, son limbe en cœur, de la longueur des autres pétales, roide, un peu concave, acuminé. Cette plante varie dans la largeur de ses feuilles & dans la grandeur de ses autres parties. (Swartz.)

83. ANGREG roide, n°. 20. *Epidendrum rigidum*. Jacq.

Epidendrum caule simpliciter; foliis oblongis, obtusis; spicis terminalibus, laxis; floribus distichis; laminis labelli cordato-ovatis, obtusis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 68. Prodr. 121, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1507.

Trois pétales oblongs; deux plus étroits & plus courts. Le sixième est redressé, de la longueur des autres, muni à son tube de deux petites dents; son limbe plane, ovale, en cœur, terminé par une très-petite pointe; l'anthère à deux loges. La capsule est trigone, oblongue, acuminée, très-glabre. (Swartz.)

84. ANGREG à feuilles obtuses *Epidendrum obtusifolium*. Willd.

Epidendrum caule simpliciter; foliis oblongis, obtusis, amplexicaulis; racemo terminali, labello subtriangulari; lacinia media elongata, bifida; operibus revolutis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 118.

Helleborine amplissimum flore var. Plum. Spec. 9. Ic. 180. fig. 2.

Ses tiges sont simples; ses feuilles oblongues,

amplexicaules; ses fleurs grandes, panachées, disposées en une grappe terminale; le pétale inférieur divisé en trois lobes; celui du milieu plus alongé, bifide; les découpages toulées en dehors.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de l'Amérique. ¶

85. ANGREG à deux rangs. *Epidendrum bifurcum*. Swartz.

Epidendrum caule simpliciter; foliis cordato-lanceolatis, horizontalibus; spicis terminalibus, laxis, ancipiti; floribus distichis; laminis labelli tripartitis. Sw. Nov. Act. Upf. 6. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1509.

Epidendrum oncop. Swartz, Prodr. 121. Non Jacq.

Ses racines sont filiformes; les tiges droites, simples, longues de deux à quatre pouces; ses feuilles lancéolées, en cœur au dessus de leur gaine, glabres, roides, roulées à leurs bords; les fleurs d'un vert-blanchâtre, distantes, alternes, disposées sur deux rangs, formant un épi terminal, plus long que les tiges, un peu flexueux. Les trois pétales extérieurs sont ovales, lancéolés, convexes; les deux intérieurs plus courts & étacés; l'inférieur élargi, à trois lobes; les deux lobes latéraux entiers, arrondis; celui du milieu bifide; l'anthère à quatre loges. La capsule est oblongue, camélé, acuminée à ses deux extrémités.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Jamaïque. ¶ (Descript. ex Swartz.)

86. ANGREG nocturne, n°. 16. *Epidendrum nocturnum*. Linn.

Epidendrum caule simpliciter; foliis oblongis, avenis; floribus terminalibus; laminis lobelli tripartitis, integris; lacinia intermedia linearis-elongata. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69, & Observ. botan. pag. 327.

87. ANGREG cilié, n°. 15. *Epidendrum ciliare*. Linn.

Epidendrum caule simpliciter; foliis binis, oblongis, avenis; laminis lobelli tripartitis; lacinia intermedia linearis. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69.

88. ANGREG unilatéral, n°. 9. *Epidendrum secundum*. Linn.

Epidendrum caule simpliciter; foliis oblongis, emarginatis; pedunculo terminali, longissimo; spica laxa, secundis; columnis longitudine petalorum. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69.

89. ANGREG brun. *Epidendrum fuscum*. Sw.

Epidendrum caule simpliciter; foliis oblongis acumi-

natif; pedunculo terminali, elongato; spica globosa, columnâ petalis breviori. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. 4. p. 120.

Epidendrum (fulcatum), caulibus simplicibus, foliis ovalibus; pedunculo terminali, elongato, squamato; spica globosa; labio quinquelobato, intermedio obsoleto. Smith, Spicil. bot. pag. 21. tab. 23.

Epidendrum anops. Jacq. Amer. pag. 224. tab. 138. — Lam. Dict. t. pag. 189. *

Epidendrum secundum. Swartz, Observ. botan. pag. 325. (*Exclusis synonymis.*)

Ses tiges sont simples, à deux angles opposés, garnies de feuilles alternes, ovales, oblongues, acuminées; les fleurs disposées à l'extrémité d'un long pédoncule écaillé, en un épi globuleux; le pétale inférieur presque à cinq lobes, celui du milieu à peine sensible; la base tubulée, plus courte que les pétales.

Cette plante croît à la Martinique & à la Jamaïque, dans les forêts des montagnes. ✕

90. ANGREG en soc. *Epidendrum vomeriforme.* Swartz.

Epidendrum caulescens, foliis bulbis innatis, ear-nosis, ovato-acuminatis, convexis, canaliculatis, s-fibus curvatis; scapo & fimo foliorum. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69. Prodr. pag. 124, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1511.

Très-petite plante, à peine haute d'un pouce, dont les racines sont rampantes, radicantes, pourvues de bulbes ovales, sessiles, enveloppées de gaines, d'où sort une seule feuille charnue, ovale, acuminée, faillante en carène sur le dos, imitant presque le soc d'une charrue, glabre, un peu recourbée à son sommet. Du sein des feuilles s'élèvent des hampe solitaires, filiformes, plus longues que les feuilles, munies de gaines distantes, fort petites. Les fleurs n'ont point été observées.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur le tronc des arbres. ✕ (*Descript. ex Swartz.*)

91. ANGREG à feuilles étroites. *Epidendrum angustifolium.*

Epidendrum folio lineari, bulbo innato, scapo paniculato. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 70. Prodr. 123, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1512.

Ses racines sont simples, blanchâtres, filiformes, allongées, pourvues de bulbes ovales, charnues, enveloppées de gaines membranées. De chacune d'elles sort une feuille sessile, plane, linéaire, longue de six pouces, un peu relevée en carène sur le dos, obtuse. La hampe est radicale, une fois plus longue que les feuilles, droite, cylindrique, terminée par une panicule à ramifi-

cations éparées, étalées, purpurines, un peu flexueuses, chargées de fleurs nombreuses, fort petites. Les capsules sont oblongues, petites, pendantes, tétrecées à leurs deux extrémités.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les branches des arbres. ✕ (*Descript. ex Swartz.*)

92. ANGREG allongé. *Epidendrum elongatum.* Jacq.

Epidendrum caule simplici, foliis oblongis; pedunculo terminali, elongato; spica laxa, lamina labelli dentato-ciliatâ. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 120. — Lam. Ill. Gen. tab. 730. fig. 1.

Epidendrum (elongatum), caule erecto, foliis oblongis, floribus spicatis; nectarii labio trifido; lacinia media bilobâ. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 604, & Coll. 3. pag. 260.

Ses tiges sont droites, glabres, longues, striées, garnies à leur partie inférieure de feuilles alternes, amplexicaules, vaginales à leur base, ovales, allongées, glabres, striées, à peine aiguës; elles sont remplacées, dans la partie supérieure des tiges, par de petites écailles distantes, éparées, lancéolées, aiguës. Les fleurs sont petites, presque sessiles, disposées à l'extrémité des tiges en un épi droit, simple, un peu lâche, muni de petites bractées. Les cinq pétales supérieurs sont presque égaux, très-ouverts, un peu aigus, striés, rétrécis en onglet à leur base; le pétale inférieur tubulé à sa base, divisé à son limbe en trois lobes élargis, tronqués, dentés & laciniés à leur sommet; le lobe du milieu profondément bifide; l'ovaire grêle, allongé.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux environs de Caracas. ✕ (*V. f.*)

Observations. Les espèces suivantes, citées par MM. Ruiz & Pavon, sans description, dans leur *Systema vegetabilium Flora peruviana*, pag. 242 & seq., forment un groupe particulier, qui paraît appartenir au *epidendrum*, & auxquelles ces auteurs ont donné pour caractère générique :

Cinq pétales supérieurs ovales-oblongs, d'égale longueur; les trois extérieurs plus larges; un sixième pétale en aile, diversement laciné, connivent avec le style tubuleux, en massue; un filament bifide; quatre anthères (ou une anthère à quatre loges).

En attendant que nous ayions sur ces espèces des détails plus étendus, je me bornerai à les mentionner ici.

* *Epidendrum (cotonatum), foliis ovato-lanceolatis; racemis dependentibus; nectarii labio trilobato; lacinia bifida, intermedia minori.*

* *Epidendrum (maculatum), foliis lanceolatis,*

subtus lineatis; racemo longo, petalis maculatis, nectario subsessato.

* *Epidendrum* (crissatum), foliis lanceolatis, racemo dependente; nectarii labio tripartito; lacinia mediâ bifida; lateralibus tripartitis.

* *Epidendrum* (panicularum), foliis oblongo-lanceolatis; floribus paniculatis; nectarii lacinia intermediâ, bifida; lacinulis extorsum flexis.

* *Epidendrum* (cordatum), foliis cordatis, amplexicaulis; panicula flexuosa; nectarii labio bifido; lacinia acuminata, recurvis.

* *Epidendrum* (viride), foliis lanceolatis, acutis; racemo terminali; nectarii labio trilobo, intermedio bifido.

* *Epidendrum* (parviflorum), foliis lanceolato-linearibus; racemo brevi; nectarii labio trilobo; lacinia subrotunda; intermedia bipartita, acuta.

* *Epidendrum* (nutans), foliis lanceolatis, obtusis, emarginatis; racemo composito, nutante; nectarii labio trifido; lacinia crenulatis, intermedia integrâ.

* *Epidendrum* (ferrugineum), foliis oblongo-lanceolatis, emarginatis; racemo simplici, erecto; nectarii labio acuminato, integro.

* *Epidendrum* (corymbosum), foliis ovato-oblongis, emarginatis; floribus terminalibus, subcorymbosis; racemo cristato.

* *Epidendrum* (croceum), foliis oblongis; racemo terminali, subsessato, multifloro; nectario trilobo.

* *Epidendrum* (volubile), foliis oblongo-obovatis, ramis volubilibus; nectarii labio bifido; lacinia lanceolatis.

* *Epidendrum* (emarginatum), foliis ligulatis, emarginatis, crenulatis; racemo terminali, nectario integro.

* *Epidendrum* (biflorum), foliis oblongis, emarginatis; ramis radicantibus; racemo terminali, pedunculis bifloris, nectario trilobo.

* *Epidendrum* (tribotum), foliis lanceolatis, erigentibus; pedunculis terminalibus, trifloris; nectario trifido.

* *Epidendrum* (acuminatum), foliis lanceolato-linearibus, racemo terminali; nectarii labio subhastato, acuminato, basi utrinque acuminato.

* *Epidendrum* (scabrum), foliis ovato-lanceolatis, marginibus vaginisque scabris; racemo terminali; nectarii labio cruciformi.

* *Epidendrum* (lineare), foliis linearibus; racemo terminali, subpaniculato; nectarii labio obcordato-cuneiformi, basi utrinque dentato.

* *Epidendrum* (equitans), foliis acinaciformibus, carinatis, diploche equitantibus; seapibus unifloris; nectarii labio maximo, trilobo.

IV. AERIDES. SWARTZ. Cinq pétales supérieurs égaux; l'inférieur en forme de chauve; une anthere terminale.

93. ANGREC à feuilles rétales, n°. 29. *Epidendrum retusum*. Linn.

Epidendrum (aerides retusum), foliis subradicalibus, linearibus, apice bifarium retusis; racemis longissimis. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 233.

Limodorum retusum. Swartz, Nov. Act. Upf. 6. pag. 80.

94. ANGREC des Indes. *Epidendrum indicum*.

Epidendrum (aerides prismorum), foliis radicalibus, linearibus, canaliculatis, apice obliquè prismatis; racemis longissimis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 130.

Biti-marum-marawara. Rheed. Malab. 12. pag. 5. tab. 2.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente; elle en diffère par ses feuilles canaliculées, tronquées & comme mordues obliquement à leur sommet, toutes radicales & linéaires. Ses fleurs sont disposées en très-longues grappes terminales. Les capsules qui leur succèdent, sont lisses, cylindriques, point ovales ni anguleuses.

Cette plante croît sur les arbres, dans les Indes orientales. ✕

95. ANGREC à pétales laineux. *Epidendrum lasiopetalum*.

Epidendrum (aerides lasiopetalum), caule ramoso, radicante; foliis ovato-oblongis, bulbo innatis; petalis lanceolato-acutis, tribus exterioribus externe lanuginosis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 130.

Epidendrum flos aeris. ? Retz. Observ. bot. 6. pag. 64.

Ses racines sont surmontées d'une bulbe qui donne naissance à des feuilles ovales, oblongues. Les tiges sont rameuses, & poussent des racines à leurs articulations; elles sont terminées par des fleurs, dont les pétales sont lancéolés, aigus; les trois extérieurs laineux en dessus.

Cette plante croît sur les arbres, dans les Indes orientales. ✕

96. ANGREC du matin. *Epidendrum matutinum*.

Epidendrum (aerides maritimum), caule ramoso, radicante; foliis lanceolatis; petalis tribus inferioribus

inferioribus lanceolatis, acutis; binis superioribus difformibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 131.

Epidendrum flos acris vel suavonicum. Retz. Obf. bot. 6. pag. 58.

Ses tiges sont glabres, rameuses, articulées, radicales, presque grimpantes; les rameaux nombreux, étalés; les feuilles alternes, lancéolées, un peu planes, légèrement striées, longues d'un à deux pieds. Les fleurs sont disposées en grappes terminales très-simples, toutes pédicellées, alternes, inclinées; les deux pétales supérieurs inégaux, très-ouverts, lancéolés; les trois autres beaucoup plus courts, lancéolés, aigus, blancs, mélangés de jaune; le pétale inférieur court, à demi cylindrique, à trois dents; les deux latéraux plus étroits & plus longs; celui du milieu élargi. La capsule est glabre, oblongue, à cinq angles inégaux, de l'épaisseur du doigt, s'ouvrant en trois valves.

Cette plante croît sur les arbres, dans les Indes orientales. (Descript. ex Retz.)

97. ANGREC odorant. *Epidendrum odoratum.*

Epidendrum (aerides odoratum), caule erecto; foliis linearibus, reflexis; petalis ovatis; sacco labelli antici bifido; proceffu erecto, conico. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 131.

Aerides (odorata), foliis linearibus, reflexis; racemis simplicibus, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 642.

Ses racines sont composées de bulbes linéaires, allongées, entortillées; ses tiges droites, longues d'un pied, presque ligneuses, garnies de feuilles linéaires, fort grandes, épaisses, échancrées, un peu recourbées, rétrécies à leur base en un pétiolo vaginal. Les fleurs sont d'un blanc-pâle, un peu charnues, d'une odeur très-agréable, disposées en grappes longues, axillaires, recourbées.

Cette plante croît sur les arbres, dans les forêts de la Cochinchine. ? (Descript. ex Retz.) Transportée des forêts dans les maisons, suspendue à l'air libre, sans être arrosée ni plantée, elle se conserve pendant plusieurs années, croît, fleurit & germe, d'après l'expérience qu'en a faite Louteiro.

98. ANGREC araignée, n°. 4. *Epidendrum flos aridis.* Linn.

Epidendrum (aerides arachnites), caule subramoso, radicante; foliis lanceolatis, petalis apice dilatatis; sacco labelli antici bifido; proceffu erecto, bidentato. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 233, & Aët. Holm. 1800. pag. 244.

Limodorum flos aeris. Swartz, Nov. Aët. l'pl. 6. pag. 80.

Botanique. Supplément. Tome I.

99. ANGREC coriace. *Epidendrum coriaceum.*

Epidendrum (aerides coriaceum), foliis caulinis ovatis, acuminatis, subcoriaceis, lineatis; spicis paniculatis. Swartz, in Schrad. Journ. bot. 1799. pag. 234. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 131.

Ses tiges sont droites, presque cylindriques, garnies de feuilles alternes, coriaces, ovales, acuminées à leur sommet, marquées de nervures longitudinales. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en épis paniculés. Elle croît sur les arbres, à l'île de Madagascar. ?

ANGOURIE. *Anguria.*

1. ANGOURIE pédière. *Anguria pedata.* Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 747.

ANGUILLARIA. (Voyez TINELIER.)

ANGUINE. *Trichosanthes.* Le nom latin de ce genre est composé de deux mots grecs, qui signifient fleur chevelue; il exprime très-bien le caractère le plus apparent de ce genre, dont les divisions de la corolle sont bordées de cils ou de franges très-remarquables. Quelques nouvelles espèces doivent être ajoutées à ce genre.

1. ANGUINE à longs fruits. *Trichosanthes anguina.* Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 794.

Cette espèce, au rapport de M. du Petit-Thouars, est cultivée à l'île de France pour ses fruits. On les cueille lorsqu'ils sont à demi mûrs: dans cet état, étant coupés en petits morceaux, cuits & assaisonnés convenablement, ils forment un légume sain & agréable au goût.

8. ANGUINE lacinée. *Trichosanthes laciniosa.* Willd.

Trichosanthes pomis ovatis, acutis; foliis cordatis, quinque vel septemlobo-palmatis, cernatis, glabris. Willd. Spec. 4. pag. 601. — Klein. in Litt.

Ses tiges sont filiformes, grimpantes, glabres, anguleuses, garnies de feuilles longues de deux ou trois pouces, profondément échancrées en cœur, palmées, à cinq ou sept lobes, glabres à leurs deux faces, à dentelures écartées. Les fleurs mâles sont axillaires, au nombre de six environ, réunies sur des pédoncules en corymbe; les pétales ovales, dentés; les fleurs femelles également axillaires, solitaires, pédunculées; les pétales ciliés & frangés. Les fruits font des pommes ovales, aigües.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Willd.)

Observations. Willdencw cite plusieurs espèces d'anguine, décrites par M. de Lamarck; mais il en change les noms. Ainsi le *trichosanthes cuspidata*

C c c

Lam. n°. 3, est le *trichosanthes caudata* Willd. n°. 5. Le *trichosanthes corniculata* Lam. n°. 7, est le *trichosanthes tuberosa* Willd. n°. 10. L'espèce que Jacquin décrit dans les *Icones rarioris*, 3, tab. 624, & Collet. 2, pag. 341, sous le nom de *trichosanthes foetissima*, a été placée dans cet ouvrage parmi les *melothia*, n°. 2.

9. ANGUINE à feuilles rudes. *Trichosanthes scabra*. Lour.

Trichosanthes foliis subrotundis, scabris, rugosifloris; pedunculis unifloris (pomis subrotundis). Lour. Flor. cochin. 2. pag. 723.

Ses tiges sont ligneuses, cannelées, grimpantes, munies de vrilles biniées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, rudes, très-rilées, en cœur, presque tantes. Les fleurs sont blanches, monoïques, pourvues de cils courts. Le fruit est une pomme petite, rougeâtre, presque ronde, à douze lobes, divisée en cinq loges, contenant plusieurs semences planes, oblongues.

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochinchine. (Lour.)

10. ANGUINE à trois pointes. *Trichosanthes tricuspidata*. Lour.

Trichosanthes foliis tricuspidatis, glabris, polynerviis; stipulis subrotundis, crassis, crenatis; spicis axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 723.

On la distingue à ses feuilles en cœur, glabres, entières, denticulées, terminées par trois pointes, traversées par plusieurs nervures, accompagnées de stipules épaisses, un peu arrondies, crénelées à leur contour. Les tiges sont grimpantes, ligneuses, munies de vrilles trifiées. Les fleurs sont blanches, monoïques, disposées en épis axillaires; les bractées grandes & dentées; la corolle chargée de cils à ses deux faces. Le fruit consiste en une petite pomme jaunâtre, aligée, à deux loges, à deux semences.

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.)

11. ANGUINE pileuse. *Trichosanthes pilosa*. Lour.

Trichosanthes caule & foliis pilosis; spicis axillaribus; bracteis lanceolatis, serratis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 723.

Ses tiges sont fort longues, pileuses, grimpantes, un peu ligneuses, munies de vrilles biniées; les feuilles en cœur; les inférieures palmées; les supérieures à trois lobes, veinées, pileuses, denticulées. Les fleurs sont blanches, monoïques, disposées en épis longs & latéraux, accompagnés de bractées lancéolées, dentées en scie, placées sous les fleurs. La corolle est à cinq divisions, garnie de très-longs cils; il lui succède une pomme

ovale, aligée, d'un rouge-vif, à une seule loge, contenant des semences rhomboïdales, comprimées, brunes, lobées.

Cette plante croît dans les champs, à la Cochinchine. (Descript. ex Lour.)

12. ANGUINE à feuilles de tamnus. *Trichosanthes tamnifolia*.

Trichosanthes foliis ovato-subrotundis, sublobatis, integris, supra scabris; floribus laxè racemosis; corollis villosis, reflexis. (N.)

Ses tiges sont glabres, cannelées, munies de vrilles presque simples, garnies de feuilles alternes, pétiolées, larges, ovales ou un peu arrondies, minces, glabres, veinées, rudes à leur face supérieure, très-entières, quelquefois à deux ou trois lobes peu prononcés, terminées par une petite pointe. Les fleurs sont petites, blanchâtres, pédicellées au dessus de l'ovaire par le rétrécissement du tube du calice & de la corolle; disposées en grappes lâches, étalées, axillaires; chaque fleur pédicellée; la corolle à cinq coupures un peu réfléchies en dehors, un peu velues; l'ovaire glabre, ovale.

Cette plante croît à Porto Ricco, où elle a été recueillie par M. Riedlé. (V. f. in herb. Desfont.)

ANGULOEA. Ce genre, établi par MM. Ruiz & Pavon, est très-voisin des *epidendrum*; il se distingue par ses cinq pétales supérieurs, connivens & renversés; par le pétale inférieur, pétiolé, & dont le limbe est urcéolé. Les auteurs cités ci-dessus n'en indiquent qu'une seule espèce sans description, qu'ils nomment :

Anguloea (uniflora), *bulbis ovatis, ancipitibus; foliis lanceolatis, septem-nerviis, plicatis; scapis unifloris*. Syst. veget. Flor. peruv. pag. 228.

Ses bulbes sont ovales, un peu comprimés, à deux angles opposés; les feuilles plissées, lancéolées, marquées de sept nervures longitudinales, toutes radicales. De leur centre s'élève une hampe étroite, terminée par une seule fleur. Elle croît au Pérou.

ANGURIA. (Voyez ANGOURIE.)

ANIBA. (Voyez ANIBE, & Ill. Gen. tab. 298.) C'est la même plante que le *cedrota longifolia* Willd. 2. pag. 338.

ANICTANGIE. *Ani-langium*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des mousses, établi par Hedwig, réformé par M. Palisot Beauvois, & qui d'après lui se compose de plusieurs espèces de *sphagnum* & de *hypnum* Linn. Il a pour caractère essentiel :

Une enfilée campaniforme; l'opercule mamillaire; une arête droite, ovale; le tube court, droit; la gaine cylindrique, large, o-verte, presque aussi longue que le tube; point de périckète.

Ce sont des plantes aquatiques ou terrestres, dont les tiges sont simples ou rameuses, les feuilles éparpillées, les fleurs latérales.

Ce genre contient les cinq espèces suivantes, déjà décrites en partie dans cet ouvrage; savoir:

- 1°. *Sphagnum alpinum*, Linn. 2°. *Sphagnum aquaticum*, Linn. 3°. *Sphagnum simplicissimum*, Bril. 4°. *Anidangium cirrhosum*, Hedw. Op. puth. tab. 5, fig. 1-3. 5°. *Anidangium setosum*, He. w. Op. polih. tab. 5, fig. 4-6.

M. Paliér-Biauvais exclut de ce genre:

- 1°. L'*anidangium bulbosum* Hedw., dont il fait le *cyathophorum pteridoides*; 2°. l'*anidangium ciliatum* He. w., qui est le *hedwigia diaphana*; 3°. l'*anidangium lapponicum* Hedw., qui est le *gymnostomum laiponicum*; 4°. l'*anidangium planifolium* Hedw., qui est l'*hypnum planifolium*.

ANICTANGIUM. (Voyez ANICTANGIE.)

ANIGOSANTHE roufféâtre. *Anigosanthos rufa*, Labill.

Anigosanthos foliis linearibus, striatis; floribus paniculato-corymbofis, pilis rufis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 119, & Voyag. de la Peyr. vol. 1. p. 411. tab. 22.

Anigosanthos foliis sublinearibus, caule à basi tomentoso, corymbo desfo, tomento rufo. Redout. Lilac. vol. 3. pag. 76.

Cette plante, très-rapprochée de la famille des iris, tient le milieu entre les *dilatatis* & les *argolusa*; elle forme un nouveau genre, établi par M. de Labillardière, dont le caractère essentiel est d'avoir:

Un calice nul; une corolle tubulée, irrégulière, divisee en six parties inégales, recourbées; un seul style; le stigmate obtus; une capsule à trois loges polysperme, couronnée par la corolle.

Ses tiges sont hautes d'un pied & plus, légèrement cylindriques, à peine rameuses, hérissées de poils, surtout à leur partie supérieure, garnies de feuilles linéaires, aiguës, finement striées. Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe paniculé, chargé de poils épais, roufféâtres, plumuleux. La corolle est tubulée, adhérente par sa base avec l'ovaire. La partie tubulée est recourbée, ve nue en dehors; le limbe divisé en six découpages lancéolées, inégales, recourbées, puis étalées; les découpages inférieures plus profondes. Les éranimes sont au nombre de six, situées sur le tube, au dessus des découpages du limbe; les su-

périeures un peu plus longues que les autres; les anthères oblongues, à deux loges; le sty-le plus long que la corolle, presque trigone, soutenu par un stigmate obtus. Le fruit consiste en une capsule presque globuleuse, couronnée par la corolle persistante, roufféâtre, tomenteuse, à trois loges, contenant des semences nombreuses & anguleuses.

Cette plante croît dans les lieux arides, à la terre de Van Lœwin, où elle s'est découverte par M. de Labillardière. Elle a fleuri dans le jardin de M. Cels. (V. f.)

* *Anigosanthos (Rufida), foliis ensiformibus; caule subglabro, corymbo laxo, tomento ochroleuco*. Redout. Lilac. pag. 176, & tab. 176.

Cette plante, obtenue par culture dans le jardin de M. Cels, de graines rapportées de la Nouvelle-Hollande par le capitaine Baudin, ne paroît être qu'une variété de la précédente; elle en diffère par ses feuilles vraiment ensiformes, & quatre ou cinq fois plus larges; par sa tige presque glabre, excepté vers le sommet, & non entièrement tomenteuse; par son duvet de couleur jaunâtre, & non de couleur roux-brun ou chiné; par son corymbe beaucoup plus lâche, à rameaux plus divergens & à fleurs moins nombreuses; enfin, par ses fleurs d'un tiers environ plus longues. Cette plante est peut-être réellement une espèce distincte; mais il est difficile de prononcer, n'ayant été obtenue que par culture.

ANINGA: nom brésilien de quelques espèces de plantes indiquées dans Pison, Bras. pag. 225, qui paroissent appartenir à l'*arum* ou au *dracontium*. (Juss.)

ANINGA-IRA: nom donné par les Brésiliens à un arbrisseau peu connu des botanistes, décrit & figuré par Marcgrave. On le trouve abondamment dans les marécages, où il s'élève jusqu'à cinq ou six pieds. Sa tige est simple, & terminée par un faisceau de grandes feuilles lancéolées, portées sur des pétioles longs d'un pied & demi, & gros comme le petit doigt, entre lesquels naissent les fleurs, qui, d'après la figure de Marcgrave & de Pison, paroissent être réunies plusieurs ensemble sur un même spadice, à la manière des arctées, & l'on peut présumer que cet arbrisseau appartient à cette famille. Le fruit, selon Pison, ressemble à l'ananas. Les naturels du pays le mangent dans des temps de disette. Les tiges, qui sont très-légères, leur servent à construire des radeaux pour traverser les rivières. (Maff.)

ANISSILO ou MOUCHU. Herbe du Chili, décrite par Feuillée (*Hist. des plant. méd. du Pérou*, pag. 5, tab. 2, fig. 1). Elle pousse de sa racine des tiges simples, longues de deux pieds,

C c c 2

garnies de quelques feuilles alternes & trilobées, terminées par une petite tête de fleurs, entourée d'un involucre à six folioles dentées. Chaque fleur a un calice anguleux & cinq pétales jaunes, recourbés en dedans. Ce petit nombre de caractères paroit fuffire pour rapporter cette plante à la famille des ombellifères, près de l'Hernia & de l'Alfrance. (Juss.) Étant mâchée, elle chasse les ventosités, & elle est d'un grand secours parmi les Indiens.

ANODE. *Anoda*. Ce genre, de la famille des malvacées, a été établi par Cavanilles sur quelques espèces de *sida* de Linné, qui s'écartoient des autres par leurs fruits. Dans les *sida*, les fruits sont composés de plusieurs capsules disposées orbiculairement ; dans les *anoda*, le fruit est simple, unicapsulaire, à plusieurs loges.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice simple, à cinq découpures ; cinq pétales un peu connivens à leur base ; des anthères nombreuses, situées à l'extrémité du tube des filamens ; plusieurs stigmates ; une capsule à plusieurs loges monospermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, divisé jusque vers sa moitié en cinq découpures aiguës, très-ouvertes à l'époque de la maturité des fruits.

2°. Une corolle composée de cinq pétales élargis à leur sommet, rétrécis à leur base, & légèrement connivens avec le tube des étamines.

3°. Des étamines nombreuses ; les filamens réunis en un tube un peu conique, supportant à son sommet des anthères fécondes ou pédicellées.

4°. Un ovaire renfermé dans le tube des étamines, ovale ou sphérique, surmonté d'un style droit, plus ou moins profondément divisé en plusieurs découpures filiformes, terminées par des stigmates simples, en tête.

Le fruit est une capsule hémisphérique en dessus, plane & en étoile en dessous, à plusieurs loges monospermes.

Observations. Les anodes ressemblent beaucoup par leur port, par la disposition de leurs fleurs, aux *sida*. Les espèces connues jusqu'à ce moment ont leurs fleurs solitaires, axillaires, longuement pédonculées. Les pédoncules ne sont point articulés, comme ceux des *sida*. Leur principale différence consiste dans leurs fruits. Dans les *sida*, les capsules font seulement rapprochées les unes des autres, point adhérentes ; dans les *anoda* elles adhèrent entr'elles, & forment alors une seule

capsule à plusieurs loges. Quoique ce caractère paroisse d'abord fuffisant pour distinguer ces deux genres, il est cependant bien foible, les fruits pouvant être rigoureusement considérés dans l'un & l'autre genre, comme une seule capsule à plusieurs loges plus ou moins adhérentes entr'elles, renfermées dans un calice commun ; ou bien si on considère les loges comme autant de capsules, celles-ci seront, dans les *anoda*, adhérentes seulement à leur partie inférieure ; d'où il résulte des doutes pour quelques espèces intermédiaires entre ces deux genres, telles que le *sida criquetra*.

ESPÈCES.

1. ANODE haillée. *Anoda hastata*. Cavan.

Anoda foliis cordatis, angulatis, superioribus elongatis, hastatis ; pedunculis longissimis, unifloris, axillaribus. Cavan. Diss. bot. 1. pag. 38. tab. 11. fig. 2.

Sida (cristata, var. β), *foliis angustatis ; inferioribus cordatis, superioribus panduriformibus ; capsulis multilocularibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 964.

Sida (hastata), *foliis inferioribus cordatis, acuminato-quinqueangolis, subdentatis, obtusis ; superioribus hastatis, acuminatis, basi subdentatis ; pedunculis foliariis, axillaribus, longitudine foliorum*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 763. n°. 89.

Sida foliis inferioribus cordato-angulatis, superioribus hastatis ; petalis integerrimis. Roy. Lugd.-Bat. 349.

β . *Anoda caule atro purpureo, decumbenti ; foliis vix cordatis, latis, quinque ad septem angulatis, inaequaliter crenatis*. Cavan. 1. c.

γ . *Anoda foliis cordatis, inferioribus quinquelobatis, acutis ; lobis medio obtuso ; floribus albis, fructu decapsulato*. Cavan. 1. c.

Sida cristata. Lam. Dict. 1. n°. 31.

Cette espèce se rapproche beaucoup des deux suivantes ; elle s'en distingue par ses feuilles, les inférieures élargies, à cinq angles, acuminées à leur sommet, échancrées en cœur à leur base, à peine dentées ; les supérieures haillées, acuminées, allongées, un peu dentées à leur base, vertes, presque glabres ; les pétioles plus courts que les feuilles, les stipules subulées, arquées, redressées, cinées à leurs bords ; les tiges & les rameaux très-pileux à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutennues sur des pédoncules droits, très-pileux, plus longs que les feuilles. Le calice est d'abord globuleux ; il se divise ensuite en cinq découpures velues, lancéolées, aiguës, ouvertes en étoile ; la corolle

affez grande, purpurine; les pétales échanrés à leur sommet; l'ovaire globuleux; le style à dix ou seize découpures filiformes; les stigmates en tête. Le fruit, plus court que le calice, consille en une capsule plane, à dix ou seize loges monospermes; chaque loge prolongée par une pointe droite, horizontale, fortement ciliée.

Dans la variété 3, les riges sont tombantes; les feuilles moins nombreuses, à peine échanrées en cœur à leur base, plus larges, à cinq ou sept angles; les crénelures inégales. La variété 4 a des fleurs blanches. Les fruits ont à dix loges; les feuilles en cœur; les inférieures à cinq lobes aigus; celui du milieu obtus. (Voyez ABUTLON du Mexique, n°. 31.)

Cette plante croît au Mexique & aux environs de Lima, dans les lieux humides. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

1. ANODE à trois lobes. *Anoda triloba*. Cavan.

Anoda foliis inferioribus cordatis, subangulatis, crenatis; superioribus trilobatis; lobo medio lanceolato, longiori, reliquis inaequalibus; floribus solitariis, axillaribus, longissimis pedunculatis. Cav. Diff. bot. t. pag. 39. tab. 10. fig. 3.

Sida (cristata), foliis omnibus crenatis; inferioribus subrotundo-cordatis, obtusis, suaequinquantibus; superioribus rotundo hastatis, acuminatis; pedunculis solitariis, axillaribus, folio longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 763. n°. 50.

Quoique cette plante soit très-rapprochée de l'espèce précédente par sa fructification, & qu'elle ait été considérée par quelques auteurs comme une variété de cette dernière, elle paroît cependant devoir en être distinguée par la forme de ses feuilles & par quelques autres caractères.

Ses riges sont fermes, droites, anguleuses, un peu scabres, hautes de deux pieds, à peine pileuses; les feuilles alternes, longuement pétiolées, vertes, un peu pileuses, crénelées ou anguleuses; les angles ou crénelures aiguës; les feuilles inférieures élargies, un peu arrondies, à peine échanrées en cœur, obtuses à leur sommet, la plupart à cinq angles; les crénelures presque obtuses; les feuilles supérieures la plupart à trois lobes; les deux inférieures larges, inégaux; celui du milieu plus long, lancéolé, acuminé; les pétioles légèrement pileux; les stipules linéaires, oblongues, ciliées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, pédonculées; les pedoncules simples, droits, plus longs que les feuilles, plus ou moins pileux, quelquefois presque glabres; le calice pileux, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle purpurine; les pétales un peu étroits, redressés presque en tube, garnis de quelques poils vers leur base; les

anthers réniformes; l'ovaire presque rond, un peu plane; le style simple, à plusieurs divisions; de quinze à vingt-cinq stigmates globuleux. Le fruit consille en une capsule ciliée en dessus, à quinze ou vingt loges, monospermes, terminées chacune par une pointe horizontale, quelquefois très-courte, & alors les loges paroissent obtuses.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

3. ANODE de Dillen. *Anoda dilleniana*. Cav.

Anoda foliis triangularibus; inferioribus lato crenatis, superioribus obolet crenatis, longis petiolatis; pedunculis axillaribus, unisporis, longissimis. Cavan. Diff. bot. t. pag. 40. tab. 11. fig. 1.

Anoda dilleniana, foliis inferioribus triangularibus hastatis, crenatis; superioribus ovato-lanceolatis, subintegerrimis; pedunculis foliariis, axillaribus, longitudine foliorum. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 764. n°. 50.

Abutilon lavatera flore, fructu cristato. Dillen. Hort. Eltham. pag. 3. tab. 1. fig. 2.

Cette espèce diffère des deux précédentes par ses feuilles supérieures ovales-lancéolées, & non point hastées, ni à trois lobes, ni anguleuses; par ses feuilles inférieures allongées, à trois, rarement à cinq angles, mais point arrondies ni échanrées en cœur. Les riges sont droites, cylindriques, herbacées, un peu cannelées, rameuses, hautes de deux pieds & plus, très-pileuses, surtout à leur partie supérieure; garnies de feuilles alternes, pétiolées, presque glabres à leurs deux faces, vertes, à larges crénelures obtuses, arrondies & non échanrées à leur base, ovales-oblongues, aiguës ou acuminées à leur sommet; les pétioles velus; les inférieurs presque de la longueur des feuilles, les supérieurs plus courts; les stipules linéaires, lancéolées, arquées, redressées.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, soutenues par des pedoncules droits, cylindriques, unisporis, pileux, au moins aussi longs que les feuilles. Le calice est d'abord globuleux, hérissé de poils nombreux, à cinq divisions lancéolées, très-aiguës, ouvertes en étoile; la corolle un peu plus grande que dans les deux espèces précédentes, d'un pourpre-violet, très-étalée; les pétales élargis, obtus, presque tronqués à leur sommet, à peine échanrés ou légèrement finies; les étamines pédicellées, très-nombreuses, réunies en une tête globuleuse à l'extrémité du tube; l'ovaire un peu arrondi. Le fruit consille en une capsule plane, pileuse, divisée en quinze ou vingt loges, terminées chacune par une pointe horizontale.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

4. ANODE à petites fleurs. *Anoda parviflora*. Cavan.

Anoda foliis hastatis, calicis laciniis erectis. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 19. tab. 431.

Anoda crassiflora. Octeg. Decad. 8. pag. 96.

Cette plante, distinguée des précédentes par ses petites fleurs, a des tiges droites, cylindriques, hautes d'environ six pieds, hérissées de quelques poils, garnies de feuilles glabres, alternes, pétiolées, les inférieures en cœur, à lobes peu marqués; les supérieures en fer de pique, à trois lobes; les deux inférieures courtes, ovales; celui du milieu lancéolé, aigu, lâchement denté en scie; les pétioles plus courts que les feuilles, accompagnés à leur base de stipules subulées, caduques.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par des podanques glabres, plus longs que les pétioles, articulés vers leur sommet. Le calice est divisé jusque vers la moitié en cinq découpures ovales, aiguës, droites, point ouvertes en étoile, même lorsqu'elles accompagnent les fruits. La corolle est d'un bleu-clair; les pétales crénelés, orbiculaires, rétrécis en onglet à leur base; le tube des étamines court; les anthères arrondies. L'ovaire est hémisphérique & tronqué; le style simple, filiforme, divisé à son sommet en neuf ou dix découpures réfléchies; les stigmates blanchâtres, en tête. La capsule est un peu plus courte que le calice, hémisphérique, plane, étalée en étoile en dessus, à plusieurs loges presque obtuses, dont les cloisons disparaissent, à plusieurs valves; les loges en nombre égal à celui des stigmates; les semences solitaires dans chaque loge, noires, tuberculeuses, un peu comprimées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

ANOMÉ. *Anoma*. Lour. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui comprend des arbres ou arbrustes exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, alternes ou opposées, & dont les fleurs sont disposées en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; une corolle irrégulière à dix découpures; dix étamines, cinq alternes, plus courtes; un style; une gousse droite, pulpeuse, allongée.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq folioles semblables aux divisions de la corolle. (Un calice nul; dix divisions à la corolle, selon Loureiro.)

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, profondément divisée en cinq découpures presque d'égale longueur, oblongues, ascendantes.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont subulés, insérés à la base de la corolle, plus courts que la corolle; cinq alternes, plus courts; les anthères un peu arrondies.

4°. Un ovaire libre, linéaire, surmonté d'un style plus long que les étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit consiste en une gousse droite, allongée, pulpeuse, à une seule loge, à plusieurs valves, contenant plusieurs semences arrondies.

Observations. Ce genre est le même que le *moringa* Juss., décrit par M. de Lamarck sous le nom de *sen*. Je ne l'ai mentionné ici que parce que Loureiro annonce avoir observé ce genre sur la nature vivante, qu'il y joint quelques observations particulières & deux espèces nouvelles. Il ne doit faire qu'un avec le *moringa* (Voyez B. v.) Vahl a décrit le même genre sous le nom de *hyperanthera*.

ESPÈCES.

1. ANOMÉ à feuilles alternes. *Anoma moringa*. Lour.

Anoma foliis alternis, bipinnatis; siliquis polygonis, seminibus triquetro-alatis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 342.

Moringa oleifera. Lam. Dict. 1. pag. 398, & Ill. tab. 337.

Gutkindina moringa. Linn.

Hyperanthera dandara. Willden. Spec. 1. pag. 535.

Moringa zeylanica, siliorum pinnis pinnatis; flora majore, fructu anguloso. Burm. Zeyl. pag. 162. tab. 71.

Moringa acuta. Arom. apud. Clus. Exot. pag. 278. c. 35.

Arbre de médiocre grandeur, qui se divise en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées avec une impaire, composées d'environ trois paires de folioles glabres, ovales, pétiolées, petites, très-nervées; les inférieures souvent rétrécies. Les fleurs sont blanches, disposées en une panicule presque terminale, étalée, redressée. Les étamines, au nombre de dix, sont toutes fertiles; les anthères arrondies. Le fruit consiste en une gousse étroite, longue, subulée, presque à huit faces, s'ouvrant en trois valves, contenant plusieurs semences un peu arrondies, disposées sur un seul rang, à trois faces, à trois ailes membraneuses.

Cette plante croît dans les Indes orientales & au Bengale. *h* (Description, ex Lour.)

2. ANOME à feuilles opposées. *Anoma moringa*. Lour.

Anoma foliis oppositis, bipinnatis; siliquis tripartitis, seminibus triquetris-alatis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 343.

Hyperanthera moringa. Vahl, Symb. 1. pag. 30.
Morunga. Rumph. Amb. lib. 1. cap. 73. tab. 74. 75.

Cet arbre, très-rapproché du précédent, est peu élevé, muni de rameaux aëiaux. Ses feuilles sont opposées, deux fois ailées avec une impaire, composées de folioles ovales, petites, glabres, très-entières, opposées, pédicellées. Les fleurs sont pâles, disposées en une panicule presque terminale; elles contiennent dix étamines, dont cinq alternes, plus courtes & stériles; les anthères ovales, vacillantes. Le fruit est une gouille longue d'un pied & plus, à trois faces, à trois & quelquefois à quatre valves, à une seule loge, contenant des semences triangulaires, ailées sur leurs angles, disposées sur un même rang.

Cette plante croît à la Cochinchine. *h* Les naturels de l'île d'Amboïne se nourrissent de ses feuilles. Les Africains font usage des fleurs. Au Ma'abar on mange les gouilles quand elles sont jeunes.

3. ANOME de la Cochinchine. *Anoma cochinchinensis*. Lour.

Anoma foliis oppositis, bipinnatis; siliquis subcompressis, bivalvibus; seminibus nudis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 343.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix pieds. Ses rameaux sont aëiaux; ses feuilles opposées, deux fois ailées; les folioles fort petites, en ovale renversé, tomenteuses, très-entières. Les fleurs sont blanches, éparpillées sur une panicule presque terminale; dix étamines; cinq alternes, stériles; les autres surmontées d'anthères grosses, ovales. Les gouilles sont oblongues, épaisses, un peu comprimées, amincies à leurs deux extrémités, à une seule loge bivoive, contenant plusieurs semences presque rondes, sans ailes.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine. *h* (Lour.)

Observations. M. Vahl rapporte encore à ce genre, sous le nom de *hyperanthera semidecandra*, le *gymnocleus arabica*. Lam. Dict. (Voyez Cistocot, n° 2.)

ANONA. (Voyez CRUSOL.)

ANOPTERUS. (Voyez UROLLIS.)

ANREDERA. (Voyez ANRÈDRE.)

ANRÈDRE. *Anredera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des attachées, qui a des rapports avec les *basella*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges grimpantes, & dont les fleurs sont disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice partagé en deux lobes, saillans en carène sur leur dos; point de corolle; une semence recouverte par le calice comprimé, membraneux, à deux ailes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en deux lobes persistans, relevés en carène sur leur dos.

2°. Une corolle nulle.

3°. Cinq étamines.... filamens.... anthères.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, comprimé, surmonté d'un style bifide & de deux stigmates.

Le fruit est composé d'une seule semence ovale, un peu comprimée, recouverte par le calice persistant, membraneux, comprime, un peu vésiculeux, à deux ailes, échancré à ses deux extrémités.

Observations. Ce genre, affilié aux baselles par son port, en diffère par son calice, par les divisions de son style, de son stigmate, & par l'enveloppe de sa semence.

ESPÈCE.

ANRÈDRE vésiculeuse. *Anredera vesiculosa*.

Anredera foliis ovato-lanceolatis, pedunculis simplicibus; stratis orbiculato-compressis, vésicariis.

Fagopyrum scandens, DC. Sloan. Jam. vol. 1. tab. 50. (Voyez BASSELLE vésiculeuse, vol. 1. n° 6, & id. Geo. tab. 215. fig. 2. *Sub basella*.)

ANSERINE. *Chenopodium*. J'ai déjà présenté sur ce genre & sur les rapports avec les *salsola*, quelques observations à l'article SOURCE, vol. 7. Je ne ferai ici qu'indiquer quelques espèces qui doivent y être réunies.

1. ANSERINE bon-henri. *Chenopodium bonum henricum*. Linn. — Lam. III. tab. 18. fig. 1.

1. ANSERINE mucronée. *Chenopodium mucronatum*. Thunb.

Chenopodium foliis triangulari-hastatis, obtusis,

mucronatis ; racemis foliosis. Thunberg , Prodr. pag. 48.

Cette espèce paroît très-rapprochée de la précédente ; elle en diffère par ses grappes entremêlées de feuilles ; par ses feuilles triangulaires , haïssées & non sagittées , obtuses & mucronées à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

1.* ANSERINE à trois étamines. *Chenopodium triandrum*. Forst.

Chenopodium foliis cordato sagittatis ; spicis terminalibus , aphyllis , interruptis. Forster , Prodr. n.º 129.

Cette plante , qui n'est connue que d'après la courte notice qu'en donne Forster , est remarquable par ses fleurs , pourvues seulement de trois étamines , disposées en épis terminaux , interrompus , privés de feuilles. Ces dernières sont sagittées , échancrées en cœur.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande.

3. ANSERINE rougeâtre. *Chenopodium rubrum*. Linn. — Lam. III. tab. 181. fig. 2.

4.* ANSERINE de Guinée. *Chenopodium guineense*. Jacq.

Chenopodium foliis ovatis , inaequaliter dentatis , acutis ; racemis subramosis , natis , erectis ; caule simplici , erecto. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1301.

Chenopodium (guinéense) , *foliis ovatis , acutis argutis dentatis , glabris ; racemis axillaribus & terminalibus*. Jacq. Ic. Rat. 2. tab. 145 , & Collect. 1. pag. 346.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *chenopodium murale* , dont elle offre les principaux caractères ; elle en diffère par son port , par ses tiges simples , par ses feuilles ovales , mais point luisantes ; par les fleurs disposées en grappes étalées , à peine rameuses , & non en corymbe.

Cette plante croît dans la Guinée. ☉

7.* ANSERINE à feuilles de figuier. *Chenopodium ficifolium*.

Chenopodium foliis hastato-finnatis , erectis , postice integris ; superioribus oblongis , integerrimis ; seminibus punctatis. Smith , Flor. brit. 1. pag. 276.

Chenopodium viride. Curtis , Flor. lond. tab. 16.

Chenopodium ficifolium. Hudf. Angl. 106.

Cette plante ressemble beaucoup au *chenopodium album* & *viride* , avec lesquelles on l'a souvent confonduë ; elle en diffère essentiellement en ce que ses semences , au lieu d'être lisses , sont

portulques ou chagrinées. Ses feuilles sont plus profondément lobées , souvent divisées en trois segments , assez semblables , par leur forme , à un fer de lance.

Cette plante croît dans les terres cultivées.

8.* ANSERINE incisée. *Chenopodium incisum*. Hort. Paris.

Chenopodium foliis ovatis , inciso-angularis , acutis ; racemis axillaribus , minimis , paucifloris. (N.)

Elle répand une odeur forte , pénétrante. Ses tiges sont glabres , blanchâtres , un peu anguleuses , très-rameuses , étalées ; ses feuilles ovales , verices , glabres à leurs deux faces , profondément dentées ou incisées , aigues à leur sommet. Les fleurs sont extrêmement petites , disposées en grappes axillaires , très-courtes , nombreuses , peu garnies , presque filiformes.

J'ai observé cette espèce au Jardin des Plantes. Son lieu natal ne m'est point connu. ☉ ? (V. v.)

14. ANSERINE pourprée. *Chenopodium purpurascens*. Lam.

Chenopodium (atriplicis) , *foliis rhombico-ovatis lanceolatisque , inferioribus fissato-dentatis ; paniculis axillaribus , ramosis ; caule erecto*. Ait. Hort. Kew. t. pag. 311. — Linn. Suppl. 171.

14.* ANSERINE quinoa. *Chenopodium quinoa*.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis , obsolete dentatis , junioribus pulverulentis ; racemis confertis , petiolo brevioribus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1301.

Chenopodium folio fissato , saturate virente , vulg. à quinoa. Feuill. Pérou , 2. pag. 15. tab. 10.

Elle se rapproche du *chenopodium purpurascens* , qui est le *chenopodium atriplicis* Ait. ; mais sa couleur est d'un vert-foncé. Ses tiges sont droites , hautes de deux pieds & plus , rameuses , garnies de feuilles longuement pétioles , ovales , un peu triangulaires , n'ayant souvent que deux fortes dents un peu au dessus de leur base ; les supérieures lancéolées , plus étroites , un peu pulvérulentes dans leur jeunesse. Ses fleurs sont disposées en grappes touffues , serrées , axillaires , plus courtes que les pétioles. Ses semences sont petites & blanchâtres.

Cette plante croît au Chili. ☉ (V. f.)

« Les semences de cette anserine sont excellentes dans la soupe , dit Feuillée. On en fait au Pérou & dans toute l'Amérique le même usage que nous faisons du riz en Europe. Elles sont très-échauffantes. Les insulaires de l'Amérique en donnent à leurs poules pour avancer leur ponte. On cultive

cultive soigneusement cette plante dans les jardins. »

17.* ANSERINE à baies. *Chenopodium hoccatum*. Labill.

Chenopodium polygamum, foliis lanceolatis; glomerulis florum in racemis compositis, terminalibus, subsupphylis. Labill. Nov. Holl. vol. 1. pag. 71. tab. 96.

Arbresque de quatre à cinq pieds & plus, dont les rameaux sont striés; les feuilles alternes, pétiolées, glauques en dessous, pulvérolentes, lancéolées, entières, sans nervures apparentes. Les fleurs sont polygams; les hermaphrodites ramassées par paquets, mêlées avec d'autres fleurs mâles ou femelles, formant toutes, par leur réunion, des grappes terminales, ramifiées, presque dégarries de feuilles. Les découverts du calice sont ovales; les filaments des étamines subulés, un peu élargis, barbus à leur partie inférieure, insérés au fond du calice, opposés à ses divisions; les anthers à deux loges, à deux lobes, un peu globuleuses. L'ovaire est libre, presque orbiculaire; le style bifide, rarement trifide; les stigmates aigus. Le fruit est une baie un peu comprimée, pulpeuse, orbiculaire, à une loge, à moitié entourée par le calice, contenant une semence lenticulaire, noirâtre, luisante.

Cette plante croît au cap Van-Diemen, où elle a été découverte par M. Labillardière.

Observations. Le *chenopodium album* & viride de Linné sont très-souvent difficiles à distinguer l'un de l'autre; ils produisent un grand nombre de variétés, soit dans la couleur, la grandeur & la forme des feuilles, vertes ou plus ou moins glauques & pulvérolentes. Je pense qu'il faut également réunir le *chenopodium concusnotum*. Thuill. Flor. Paris. édit. 2. pag. 125. J'ai décrit parmi les amarantes, le *chenopodium caudatum* Jacq. Le *chenopodium ovifolium* Allion. tab. 38, fig. 4, & le *chenopodium camphorosfolium* Pourr. Act. Tolos. 3. pag. 311, appartiennent au *salsola prostrata* Linn.

Les espèces suivantes ne me sont point connues.

* *Chenopodium punctatum*, foliis albo-punctatis, imis rhombo-ovatis, striatis; supremis ellipticis; racemis lateralibus, spicatis, foliosis. Scop. del. Insul. vol. 1. pag. 26. tab. 11.

* *Chenopodium acuminatum*, foliis ovatis, acuminatis, integerrimis; panicula nuda, terminali. Willd. Nov. Act. Berol. 2. tab. 5. fig. 2.

* *Chenopodium laterale*, foliis caulinis lanceolatis, obtusis; ramorum oblongis; pedunculis lateralibus, solitariis, unifloris. Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 113.

Botanique. Supplément. Tome 1.

* *Chenopodium (oppositifolium)*, foliis oppositis, fasciculatis; glomerulis foliosis, axillaribus. Willd. Spec. 1. pag. 1377. — Linn. Suppl. 172.

Salsola oppositiflora, Pallas, Itin. 2. pag. 735. tab. C.

ANSJELI: nom malabare d'une espèce de jacquier (*artocarpus hisfuta* Lam.), figuré & décrit par Rhéede, Hort. Malab. 3. pag. 25, tab. 32. Son fruit est bon à manger; mais pris en trop grande quantité, il donne le vomissement, que l'on atténue avec l'écorce & la racine du même arbre. (Voyez JACQUIER, n.º 5.)

ANTAC. « Ce sont, dit Flacourt, des espèces de haricots assez bons. » On cultive sous ce nom, à l'île de France, deux plantes légumineuses grimpantes, dont les graines le mangent en purée: l'une plus commune, à fleurs blanches; l'autre à fleurs rouges. D'après M. du Petit-Thouars, elles sont parties du genre *dolichos*. Linn.

ANTELEE. *Antelas*. Gærtner a décrit & figuré sous ce nom (vol. 1, pag. 277, tab. 58, fig. 2) un fruit ériqué *luna-maella* dans une collection de graines de Java. C'est un brou, de la forme & de la grosseur d'une olive, contenant un noyau osseux, à trois loges monospermes, réunies par le fruit en une cavité vide. Les graines contenues dans chacune de ces loges sont ovales, noirâtres, glabres, luisantes. Leur embryon est aplati, entouré d'un périsperme peu épais. « Ce caractère, dit M. de Justieu, est insuffisant pour déterminer sûrement la famille à laquelle il faut rapporter ce fruit. » Il parait cependant avoir quelque affinité avec l'olivier (*oleodendrum* Linn.) & le *castine*, dans la famille des nerpruns.

ANTENNA. On donne ce nom, dans l'île de Ceylan, au *datura metel* Linn., espèce de stramoine. C'est le *humata* de Rhéede, Hort. Malab. vol. 2, tab. 28.

ANTENNARIA. Gærtner, de Fruch. & Sem. vol. 2. pag. 410. tab. 167. fig. 3. Gærtner, examinant les graines des différentes espèces du genre *gnaphalium* Linn., en a remarqué plusieurs, portées sur un disque hérissé de petites dents, & couronnées par une aigrette composée de poils nus par le bas, & plumeux seulement vers leur extrémité, représentant en quelque sorte des antennes d'insectes; il en a formé un genre particulier, sous le nom d'*antennaria*, auquel peuvent se rapporter, selon lui, les *gnaphalium dioicum-alpinum-seriphoides-mucronatum-muricatum*, &c., & le *plugo leonopodium*; mais ce caractère n'a point paru suffisant à plusieurs botanistes pour former une distinction générique, & ce genre de Gærtner n'a pas encore été adopté. (Luff.)

D d d

ANTHEDON. Théophraste a mentionné sous ce nom le nésier azétoier.

ANTHEMIS. (Voyez CAMOMILLE.)

ANTHERIC. *Anthierum*. Ce genre a subi plusieurs réformes, amenées par la découverte de beaucoup d'espèces nouvelles, & par des observations importantes sur les parties de la fructification. Il en a été fait mention à l'article ABAMA, Suppl., au mot NARTHÈCE, & à la suite de l'article PHALANGÈRE. On trouve figuré dans les *Illustrations*, tab. 240, l'*anthierum frutescens*, fig. 1, & l'*anthierum aloides*, fig. 2.

ANTHERICUM. (Voyez ANTHERIC.)

ANTHEROSPERMA. (Voyez XYPHALIER.)

ANTHERURA. (Voyez ANTHERURE.)

ANTHERURE. *Antherura*. Louréiro a décrit sous ce nom, dans la *Flore de la Cochinchine*, un petit arbre de la famille des rubiacées, dont la fructification, dans le nombre, la situation & la structure de ses parties, se trouve parfaitement la même que dans le *psychotria*, genre auquel il doit être réuni comme espèce. (Voyez PSYCHOTRIE, Suppl.) Louréiro rapporte cette plante au *caryophyllifera*. Rumph. Amboin. vol. 3, pag. 211, tab. 136.

ANTHÉRYLIE. *Antherylium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des salicaires, établi par Vahl, qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à quatre divisions ; une corolle à quatre pétales ; plusieurs étamines insérées sur le calice ; un ovaire libre ; un style ; une capsule à une loge, à trois valves polyspermes.

Ce genre ne comprend jusqu'alors que la seule espèce suivante :

ANTHÉRYLIE de Rohrer. *Antherylium Rohrii*. Vahl.

Antherylium ramis folisque suboppositis ; petalis subcuneatis ; pedunculis aggregatis, axillaribus, unifloris. (N.)

Antherylium Rohrii. Vahl, Aét. Soc. Hist. Nat. Hafn. 2. 1. pag. 212. tab. 8. Id. Symb. 3. pag. 66. — Wild. Spec. Plant. 2. pag. 980.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, pâles, cendrés ; ceux-ci en autres plus courts, la plupart opposés, cylindriques à leur base, comprimés ou presque tétragones, anguleux à leur partie supérieure, munis à

chaque côté opposé de deux lignes rapprochées, saillantes, décurrentes, aboutissant à l'insertion des pétiotes, où elles se renflent & forment quatre petites dents épineuses. Les feuilles sont opposées ; quelques-unes alternes, pétiolées, ovales, enseres, obtuses, souvent un peu échancrées à leur sommet, glabres à leurs deux faces ; les nervures confluentes vers les bords ; les pétiotes courts, presque tétragones, munis à leur base d'un tubercule épineux, persistant après la chute des feuilles. Ce même tubercule existe à l'insertion des rameaux. Les pédoncules sont filiformes, axillaires, latéraux, agrégés, au nombre de trois à huit, à peine longs de six lignes, soutenant une seule fleur assez petite, d'un blanc-faïe, composée d'un calice à quatre divisions ovales, concaves, caduques ; quatre pétales un peu plus longs que le calice, ovales, ondulés à leurs bords, insérés à la base des divisions calicinales ; douze à seize étamines, fixées sur le calice ; les filaments filiformes, beaucoup plus longs que la corolle ; les anthères presque globuleuses. L'ovaire est libre, ovale, surmonté d'un style droit & d'un seul stigmate obtus, au moins de la longueur des étamines. Le fruit est une capsule arrondie, à une seule loge, à trois valves, contenant un grand nombre de petites semences attachées autour d'un axe central.

Cette plante croît à l'île de Saint-Thomas, observée par M. Ledru, qui m'en a communiqué un exemplaire. h (V. f.)

ANTHERYLUM. (Voyez ANTHÉRYLIE.)

ANTHISTIRE. *Anthistiria*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, polygames, de la famille des graminées, qui a de grands rapports avec les andropogon, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont pour la plupart disposées en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs polygames ; les fleurs mâles ordinairement au nombre de six, dont quatre sessiles, disposées en verticilles ; deux autres pédicellées ; une, quelquefois deux fleurs hermaphrodites centrales, accompagnées d'une arête insérée dans le fond du calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont polygames, les uns mâles, stériles, pourvus seulement d'étamines ; une seule hermaphrodite.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice à une ou deux valves toides, sinueuses, roulées à leurs bords, quelquefois ciliées.

2°. Une corolle à deux valves minces, trans-

parentes; l'extérieure ovale, étroite; l'intérieure beaucoup plus courte & plus petite.

3°. Trois étamines stériles; point d'ovaire ni de style.

Chaque fleur hermaphrodite offre :

1°. Un calice coriace, à deux valves dures, oblongues, presque égales, un peu obtuses.

2°. Une corolle souvent nulle ou à peine sensible.

3°. Trois étamines; les filaments courts, filiformes; les anthères droites, oblongues.

4°. Un ovaire oblong, accompagné à sa base d'une arête torse, alongée; deux styles; les stigmates pileux & en masse.

Une seule semence glabre, oblongue, renfermée dans les valves calcinales.

ESPÈCES.

1. ANTHISTIRE glauque. *Anthistiria glauca*. Desfont.

Anthistiria culmo ramofo, compresso; paniculata, glumis imberbibus; arista inferne villosa, geniculata. D. sf. Flor. atlant. 2. pag. 380. tab. 254.

Stipa (paleacea), arista contorta, tomentosa, calice multo longioribus glumis subsacculatis. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 101.

Stipa arista seminuda, panicula simplici; foliis convolutis, subulatis, inanis pubescentibus. Vahl, Symbol. 2. pag. 24.

Ses racines sont tortueuses, filiformes; ses tiges hautes de deux ou trois pieds, rameuses, articulées, souvent coudées à leur base; les feuilles glauques, un peu roulées sur elles-mêmes, & ciliées vers leur base; les fleurs disposées en une panicule lâche, réunies par paquets de deux à cinq épillets, portés sur des pédoncules axillaires, filiformes; chaque épillet sortant d'une feuille en gaine, en forme de sparhe. Il est composé de six fleurs mâles, stériles, dont quatre inférieures, sessiles & verticillées, & deux supérieures opposées, pédicellées; une seule fleur hermaphrodite, sessile, centrale. Les fleurs mâles n'ont qu'une seule valve calcinale, glauque, roide, aiguë, concave, enveloppant une corolle à deux valves membraneuses, inégales. Dans la fleur hermaphrodite, le calice est à deux valves oblongues, très-roides, obtuses, roulées sur elles-mêmes, velues à leur base. Une membrane simple, mince, transparente & très-croûteuse tient lieu de corolle. Du fond du calice s'élève une arête brune, longue, torse, pubescente. Les semences sont oblongues, enveloppées par le calice.

J'ai recueilli cette plante sur les collines sablon-

neuses, en Barbarie, aux environs de Lacalle & de Bonne. ♀ (V. v.)

2. ANTHISTIRE cilié. *Anthistiria ciliata*.

Anthistiria glumis barbato-glandulosa, vaginibus glabris. Desfont. Journ. de Phys. vol. 40. pag. 292. — Linn. Suppl. 113. — Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 36. tab. 459. — Retz. Obs. 3. pag. 11. — Lam. III. tab. 47, & tab. 341, fig. 1 & 2.

Andropogon nutans. Linn. Mantiss. 303. — Lam. Dict. vol. 1. pag. 373. n°. 5.

Andropogon quadrivalve. Linn. — Lam. Dict. l. c. n°. 6.

3? *Anthistiria (barbata), glumis vaginifque barbato-glandulosis*. Desfont. l. c. — Gzert. de Frucht & Sem. 2. pag. 465. tab. 175.

Anthistiria (japonica), culmo ramofo; panicula coarctata, nutante; involucri pilosis, aristis hirtis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 901.

Andropogon (ciliatum), panicula cernua; calice exteriori multifloro, ciliato; aristis contortis, pilosis. Thunb. Flor. japon. 40.

Stipa arguens, japonica. Houttuyn, Linn. Pfl. Syst. 12. pag. 455. tab. 92. fig. 1. (Voy. BARBON, n°. 5 & 6.)

Les tiges sont droites, glabres, articulées; les feuilles glabres, rudes à leurs bords, ciliées à leur gaine; les valves calcinales des quatre fleurs, sessiles & stériles, roulées à leurs bords, munies de cils blanchâtres, droites, glanduleux; les valves de la corolle très-irrégulières, deux fleurs pédicellées, stériles, très-étroites; la fleur hermaphrodite à deux valves glabres, dures, obtuses, velues à leur base; la corolle à une valve, à peine sensible; les gaines des épillets glabres (ciliées dans la variété 3?). Cette dernière plante parait avoir tant de rapport avec la première, que je la soupçonne une simple variété. Ses épillets sont plus fournis; les fleurs plus grandes. Les arêtes sont, dans les deux, torseuses & pubescentes; les semences brunes, dures, oblongues, enveloppées par les valves du calice.

Cette plante croît dans les Indes, & la variété 3 au Japon. ○ (V. f.)

3. ANTHISTIRE nu. *Anthistiria imberbis*. Retz.

Anthistiria foliis involucrique nudis. Retz. Obs. 3. pag. 11.

Ses feuilles sont glabres, ainsi que celle qui accompagne les épillets; ses tiges comprimées. Les fleurs ressemblent à celles de l'espèce précédente. Les pédoncules sont solitaires, capillaires, plus courts que la feuille vaginale supérieure; ils supportent deux fleurs (deux épillets?). Cette

D d 2

plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Retz.) Elle auroit besoin d'un nouvel examen pour être bien déterminée. Il me paroît très-probable que Retzius a voulu parler de deux épillets au lieu de deux fleurs.

4. ANTHISTIRE velu. *Anthistiria villosa*.

Anthistiria foliis involucrique nudis; peribus duobus hermaphroditis, villosissimis; arista brevi. (N.) Lam. Ill. Gen. tab. 841. fig. 3.

Ses tiges sont droites, fort hautes; ses feuilles glabres, ainsi que les gaines florales. Les fleurs sont réunies en une panicule épaisse, touffue, longue, fort ample. De l'axille de chaque gaine supérieure sortent deux à quatre pédoncules & plus, glabres, canaliculés, pendans, terminés par un ou deux épillets au moins aussi longs que les gaines qui les accompagnent; quatre fleurs mâles, filiformes, lancéolées, aiguës; deux autres pédicellées, plus longues, plus étroites, roides, mucronées. Les fleurs hermaphrodites sont au nombre de deux, dures, roides, coriaces, d'un brun-noirâtre, ainsi que le duvet abondant qui les recouvre; elles sont pourvues d'une arête très-fine, droite, dépassant les valves à peine d'une à deux lignes.

Cette plante a été recueillie à Java par Commerçon. (V. f. in herb. Lam. & Desfont.)

5. ANTHISTIRE géant. *Anthistiria gigantea*. Cavan.

Anthistiria culmo arundinaceo, disticho; foliis canaliculatis; callicibus valde pilosis, floribus paniculatis. Cavan. Ic. Rar. vol. 5. pag. 36. tab. 458.

Anthistiria (gigantea), culmo erecto, foliis infirmè aculeato-denticulatis, panicula potulâ, involucri villosa, flosculis mucicis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 502.

C'est une grande & belle espèce, dont les tiges sont très-glabres, cylindriques, nouvelles, hautes d'environ dix pieds, épaisses d'un ponce, terminées par une très-belle panicule longue de deux pieds, composée d'autres panicules partielles, axillaires. Les feuilles sont glabres, canaliculées, longues de trois pieds & plus, larges d'une ligne & demie, denticulées à leurs bords vers leur base; leurs gaines striées, piluleuses & ciliées à leur orifice; les feuilles florales élargies, concaves, rougeâtres, puis rétrécies & longuement acuminées. Les fleurs stériles sont couvertes de poils rouffâtres; les deux pédicellées velues à leur base. La fleur hermaphrodite est dépourvue d'arête.

Cette plante croît dans les îles Philippines. (Descript. ex Cavan.)

Observations. Outre les espèces ci-dessus mentionnées, il faut encore rapporter aux *anthistiria* les *andropogon* de Linné, qui ont quatre fleurs mâ-

les féelles & deux autres pédicellées, telles que l'*andropogon cymbarium* Linné, l'*andropogon prostratum*, & d'autres que l'analyse peut faire découvrir.

ANTHISTIRIA. (Voyez ANTHISTIRE.)

ANTHOCERCIS. (Voyez URALIER.)

ANTHOCÈRE. *Anthoceros*. Ce sont des plantes très-faciles à distinguer par les organes de leur fructification, l'un desquels est allongé, cylindrique, fendu au sommet, que Linné regardoit comme la partie femelle, & que les auteurs modernes prennent pour l'organe mâle. Le nom de ce genre en exprime très-bien le caractère, étant composé des mots grecs *antos*, fleur, & *cheras*, corne. L'*anthocère ponctué*, n°. 1, est figuré dans les *Illustrations*, tab. 876. fig. 1, & l'*anthocère lifé*, fig. 2. — Hoffm. tab. 5. M. Swartz a présenté une nouvelle espèce d'*anthocère*, sous le nom de :

4. ANTHOCÈRE crispé. *Anthoceros crispus*. Swartz.

Anthoceros fronde sinuato-laciniatâ, undulatâ; margine crispâ, non punctatâ. Swartz. Nov. Plant. Gen. & Spec. pag. 146.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de l'*anthoceros levis*, dont elle ne diffère que par les bords crispés de son feuillage.

5. ANTHOCÈRE de Caroline. *Anthoceros carolinianus*. Mich.

Anthoceros frondibus breviter rotundato-lobatis, margine subintegris, suprà vix punctulatis; corniculis subsemiuncialibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 280.

Cette espèce a ses feuilles étalées, médiocrement lobées, arrondies; les lobes presque entiers à leurs bords, à peine légèrement ponctués à leur face supérieure. Les cornes sont droites, longues d'environ un demi-pouce. Elle croît à la Caroline, dans les lieux humides. (Mich.)

ANTHOCEROS. (Voyez ANTHOCÈRE.)

ANTHOCONE. *Anthoconum*. Genre nouveau, de la famille des hépatiques, que M. Palifor-Beauvois a établi pour le *marattia conica* de Linné. D'après cet auteur, le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Les fleurs mâles (femelles, Juss.) renfermées dans une ombelle conique, portée sur un long pédoncule membraneux, blanc, enroulé à sa base d'un péricète d'une seule pièce, presque circulaire. Les fleurs, ordinairement au nombre de cinq, sont renfermées chacune dans une loge, &

forte, par la partie inférieure de l'ombelle, d'une enveloppe particulière qu'on peut regarder comme un calice partiel; elles sont supportées par un filet, dont l'extrémité est garnie de quatre ou cinq divisions égales, contenant un amas de filaments élastiques, auxquels adhèrent des grains d'une poussière très-fine, que M. de Beauvois regarde comme la poussière fécondante, & qui s'en détachent, comme dans les jungermanes, par les secousses d'irritabilité qu'éprouvent les filaments qu'ils sont frappés du contact immédiat de l'air atmosphérique.

Les fleurs femelles (mâles, Juss.) sont séparées sur le même pied, en forme de godet, & contiennent des semences plates & échancrées. Il n'existe encore qu'une seule espèce de ce genre, l'anticone conique (*aniconum conicum*). (Voy. HÉPATIQUE conique, n° 3.)

ANTHOCONUM. (Voyez ANTHOCONE.)

ANTHODON. On trouve sous ce nom générique, dans la Flore du Pérou de Ruiz & Pavon, vol. 1, pag. 45, tab. 74, b, la description d'un arbrisseau qui ne diffère de l'*hippocratea* ou du *rontelea*, que par son calice & ses pétales ciliés. Le fruit n'a point été observé. Il peut seul déterminer auquel de ces deux genres on doit le rapporter : au premier si c'est une capsule; au second si c'est une baie.

ANTHOLOME de montagne. *Antholoma montana*. Labill.

Antholoma foliis sparsis, elliptico oblongis; racemis axillaribus, subumbellatis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 122, & Voyag. Peyr. vol. 2. pag. 236. tab. 41.

Cet arbrisseau, découvert & observé par M. de Labillardière, lui a fourni un genre nouveau de la famille des plaqueminiers, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice caduc, à quatre folioles; une corolle monopétale; des étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle; un style; un fruit supérieur, à quatre loges, à une seule semence.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quinze ou dix-huit pieds. Ses rameaux, nus à leur partie inférieure, sont chargés vers leur sommet de feuilles éparées, oblongues, elliptiques, coriaces, un peu réfléchies à leurs bords, deux fois plus longues que les pétioles qui les soutiennent. Les fleurs sont disposées en grappes recourbées, axillaires, presque en ombelle. Chacune d'elles offre :

1°. Un calice composé de deux à quatre folioles ovales, souvent caduques après l'épanouissement des fleurs.

2°. Une corolle d'une seule pièce ovale-cylindrique, en forme de godet, inégalement crénelée à ses bords.

3°. Des étamines nombreuses, attachées à un réceptacle charnu, soutenant des anthères oblongues, acuminées, de la longueur des filaments, à deux loges, s'ouvrant à leur sommet.

4°. Un ovaire libre, ovale-oblong, de forme pyramidale, quadrangulaire, légèrement enfoncé dans le réceptacle, surmonté d'un style plus long que les étamines, terminé par un stigmate aigu.

Le fruit consiste en une capsule? à quatre loges, remplies d'un grand nombre de semences.

Cette plante croît sur les hauteurs dans la Nouvelle-Calédonie. (Voy. *Descript. ex Labill.*)

ANTHOLISE. *Antholyza*. Ce genre est si peu distinct des glayeux, que M. de Lamarck n'a pu s'empêcher de l'y réunir dans les *Illustrations des Genres*. On y trouve figuré l'*antholyza aethiopica*, tab. 32, fig. 1, sous le nom de *gladiolus aethiopicus*.

ANTHOLYZA. (Voyez ANTHOLISE.)

ANTHONOTHA. (Voyez ANTHONOTHE.)

ANTHONOTHE. *Anthonotha*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec le *vouapa* & l'*esperia* d'Aublet. Il comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, sans impaire; les fleurs axillaires, disposées en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles; cinq pétales irréguliers; dix étamines libres; trois plus grandes; ovaire sessile; gousse large, comprimée, à une seule loge; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice partagé en deux folioles égales, concaves, coriaces, obtuses, persistantes. (Deux bractées, selon quelques-uns.)

2°. Une corolle irrégulière, composée de cinq pétales; trois égaux, lancéolés, aigus; un quatrième plus large, échancré, presque bifide (calice à quatre divisions); le cinquième pétale longuement onguiculé, élargi à son limbe, divisé en deux lobes, recourbé en forme de cuiller. (Une corolle à un seul pétale, selon quelques-uns.)

3°. Dix étamines; filaments droits, cylindriques, libres, inégaux; trois beaucoup plus longs, à

anthères plus grosses, peut-être les seules fertiles; trois autres filaments de grandeur moyenne; les quatre derniers plus courts, à anthères plus petites, ovales, obtusés.

4°. Un ovaire libre, sessile, ovale, comprimé, convexe d'un côté, velu; un style filiforme, incliné, un peu plus long que les étamines moyennes; stigmate petit, en rete, presque bifide.

Le fruit consiste en une gousse grande, élargie, comprimée, à une seule loge, renfermant plusieurs semences larges, aplaires, arrondies.

Observations. Ce genre, établi par M. Palifor-Bauvois, se rapproche d'une part de l'outrea & vouopa d'Aublet (*macrobolium* Schreb. & Willd.) de l'autre, du *perivoua* & *esperua* d'Aublet (*dimorpha* Schreb. & Willd.). Il diffère du *vouopa* par ses dix étamines libres, par l'ovaire sessile; de l'outrea par le même caractère, ce dernier genre n'ayant que quatre étamines, dont une stérile. Dans le *perivoua* & l'*esperua*, les étamines sont diadelphes, l'ovaire pédicelle; la forme du calice & de la corolle différente.

Dans les quatre genres cités plus haut comme très-rapprochés de l'*anthorotha*, M. de Jussieu désigne sous le nom de *bractée* leur enveloppe extérieure; il appelle *calice* les divisions pétales & colorées; *placées* intérieurement, & *corolle* le seul pétale inséré plus intérieurement que les autres divisions. L'assimilation de l'*anthorotha* avec ces quatre genres semble exiger la même dénomination, qui en effet a été employée par M. Palifor-Bauvois.

« Mais dans ce genre, dit ce savant, la bractée est un corps d'une seule pièce, persistant, qui se divise profondément en deux lobes égaux; elle est une continuité de l'écorce. Les quatre divisions intérieures paroissent avoir le même point d'insertion que les étamines; elles sont inégales. La division échancrée semble remplacer l'étendard, & les autres divisions tiennent lieu des ailes, si ce n'est qu'il s'en trouve trois. Quant au pétale onguiculé, il a, comme la carène de toutes les légumineuses, un point d'insertion plus intérieur; il n'embrasse pas, comme elle, aussi immédiatement les étamines & l'ovaire, mais seulement ce dernier, qu'il entoure plus immédiatement dans sa jeunesse.

« D'après cette observation, continue le même auteur, ne pourroit-on pas regarder la bractée comme un vrai calice bide, les divisions pétales & le pétale onguiculé comme une corolle irrégulière, à cinq pétales, dont ce dernier est analogue à la carène, & la division échancrée, à l'étendard? Si cette idée est susceptible d'être adoptée, n'en peut-on pas conclure par analogie, qu'il en est de même des quatre autres genres *esperua*, *perivoua*, *ouuca*, *vouopa*, dont le pétale

unique remplace la carène, & qui tout se distinguant entre eux par des différences, soit dans le nombre des étamines, soit dans la forme & le nombre des autres parties accessoires de la fleur. »

ES P È C E S.

1. ANTHOROTHE à grandes feuilles. *Anthorotha macrophylla*. Palif.

Anthorotha foliis abruptè pinnatis, bi seu trigjvis; foliolis oblongis, acuminatis; floribus paniculatis, axillaribus.

Anthorotha macrophylla, folia bi seu trigjvis; petiolo basi tumido; foliolis oblongis, acuminatis; floribus paniculatis, axillaribus. Palifor-Bauvois, Flor. d'Oware, pag. 77. tab. 41.

Arbrisseau divisé en rameaux glabres, alernes, cylindriques, garnis de feuilles alernes, pétiolées, ailées sans impaire, composées de quatre ou six folioles grandes, oblongues, pédicellées, opposées, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, à nervures latérales, simples, obliques; les pédicelles courts, un peu élargis; le pétiole commun renflé à sa base.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en panicules médiocrement ramifiées, beaucoup plus courtes que les feuilles. Ces fleurs sont assez petites, alernes ou épaissies, soutenues par des pédicelles courts, simples, filiformes; les étamines les plus grandes, & même plusieurs des autres saillantes hors de la corolle. Les gousses sont grandes, oblongues, arrondies à un de leurs côtés, comprimées, brusquement rétrécies d'un côté à leur base, terminées par une pointe un peu courbée; elles contiennent quelques semences larges, arrondies, comprimées.

Cette plante a été recueillie par M. Palifor-Bauvois dans le royaume d'Oware, entre la ville de ce nom & Buonopozo, sur le bord des rivières. 77

ANTHORA. Espèce d'aconit à fleurs jaunes (*aconitum anthora* Linn.), ainsi nommée parce qu'on prétend qu'elle corrige l'action pernicieuse du *thora*, autre aconit à fleurs bleues. (Voyez ACONIT.)

ANTHOSPERME. *Anthospermum*. Ce genre appartient à la famille des rubiacées; il comprend des plantes exotiques à l'Europe, à tige ligneuse, dont les feuilles sont verticillées; les fleurs petites & axillaires, dont les ovaires ou les étamines avortent assez fréquemment, surtout dans les jardins.

Il a pour caractère essentiel :

Un calice fort petit, à quatre dents; une corolle à

sabre court; le limbe à quatre divisions; quatre étamines; un ovaire inférieur; le fruit oblong, partagé en deux graines à sa maturité.

Observations. Aux trois espèces décrites par M. de Lamarck, on peut en ajouter une quatrième, à la vérité peu connue, mentionnée par Thunberg sous le nom d'*anthospermum* (scabrum), *foliis convolutis, canaliculato-subulatis, scabris*. Thunb. Prodr. pag. 32.

Le même auteur a nommé *anthospermum lanceolatum* la plante décrite par Linné fils, & qu'il a appelée *anthospermum herbaceum*.

ANTHOSPERMUM. (Voy. ANTHOSPERME.)

ANTHOXANTHUM. (Voyez FLOUVE.)

ANTHRISCUS. Perf. Synopf. Plant. t. p. 320. M. Persoon a réuni dans ce genre plusieurs espèces de *scandix* Linn., en particulier le *scandix anthriscus*. Ce nom avoit été employé par Plin & Dalechamp pour désigner la même plante. Jean Bauhin l'a également adopté. M. de Lamarck l'a décrite sous le nom de *charyophyllum anthriscus*. (Voyez CERFEUIL, nos. 12, 13 & 14.) Ce sont les trois espèces dont M. Persoon a formé son nouveau genre, & auquel il donne pour caractère essentiel:

Un involucre partiel droit, lancéolé; les semences ovales, chargées de poils rudes; surmontées d'un long bec glabre.

ANTHYLLIDE. *Anthyllis*. Les anthyllides aiment les lieux arides, élevés & solitaires. Les unes (*anthyllis barba Jovis*) se font distinguer par le brillant argenté & soyeux de leurs nombreuses folioles, par l'effet de leurs fleurs, ramassées en bouquets d'un beau jaune-doré; d'autres (*anthyllis cretica*) brillent sur le sommet des montagnes, où elles étalent leur corolle d'un rouge-pourpre, & leur feuillage riche & argenté; quelques autres (*anthyllis erimacea-iragaeanthoides*) ont fixé leur séjour dans les gorges affreuses & solitaires de l'Atlas, dans celles du Liban, où quelquefois, par leurs rameaux hérissés de pointes épineuses, elles semblent prendre le caractère sauvage des lieux qu'elles habitent; d'autres enfin, fuyant de plus en plus les plaines fertiles & riantes, ont pénétré jusque dans les sables du désert. Elles y deviennent d'autant plus hipides & rustiques, qu'elles s'éloignent davantage des terrains cultivés. L'*anthyllis vulneraria* forme de charmans parterres sur les pâturages secs des montagnes, où leurs grosses têtes de fleurs jaunes, blanches, mêlées de pourpre & de rouge, offrent je ne sais quoi de riant & de gai. C'est dans les sols arides & pierreux que l'on rencontre l'*anthyllis tetraphylla*, & sur les revers des collines de l'Atlas que j'ai recueilli l'*anthyllis hamata*. Une autre, l'*anthyllis Gerardi*, croît à l'om-

bre des pins, sur les côtes élevées & maritimes de la Provence. Ces observations prouvent la justesse du coup-d'œil de cet homme de génie, qui a réuni en un seul genre, des plantes que les Anciens avoient presque isolées, quoique très-rapprochées dans l'ordre naturel, tant par leur fructification que par leur lieu natal. Tournefort, génie par sa division des plantes en herbe & en arbres, avoit été forcé de faire un genre à part des espèces ligneuses, sous le nom de *barba Jovis*; il donne aux espèces herbacées le nom de *vulneraria*.

M. de Lamarck a réuni aux anthyllides le genre *ebanus*, Linn., qui n'en diffère en effet que par son calice à cinq arêtes plumeuses, un peu plus longues que la corolle; par les ailes très-courtes, par le fruit à une seule semence velue. D'ailleurs, ce nom d'*ebanus* pouvoit induire en erreur, & porter à croire qu'il étoit question de cet arbre dont le bois fournit ce bel ébène noir, si agréablement employé dans les ouvrages de mosaïque & de marqueterie, & qui est une espèce de *diospyros*. Quelques espèces de ce genre ont subi une réforme nécessaire. Ainsi l'*anthyllis aspalatoides* a été renvoyé aux *aspalates*, n°. 33, & l'*anthyllis hermannia* au n°. 29. L'*anthyllis involuerata* a été rappelé parmi les lotiers, n°. 22. L'*anthyllis quinqueflora* Linn. Suppl. paroît être la même plante que l'*ononis parvispora* Thunb.

Le nom d'*anthyllis* a été employé par les Anciens & appliqué à plusieurs plantes différentes, toutes plus ou moins velues; il paroît formé de deux mots grecs, qui signifient *fleurs velues*. En effet, la plupart des espèces d'*anthyllide* ont leur calice couvert de poils. M. de Lamarck a donné dans les *Illustrations*, tab. 615, la figure de l'*anthyllis vulneraria*, fig. 1; de l'*anthyllis montana*, fig. 2, & des détails sur la fructification tirés de Gärner; de l'*anthyllis tetraphylla*, fig. 3, & de l'*anthyllis barba Jovis*, fig. 4.

* Plantes herbacées.

8. ANTHYLLIDE à plusieurs têtes. *Anthyllis polycéphala*. Desfont.

Anthyllis villosissima, foliis pinnatis, foliolis equalibus, longè ellipticis; capsulis dissimilis, sessilibus, alternis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 150. tab. 195.

Ses tiges sont simples ou à peine rameuses, hautes de deux ou trois pieds, couchées, cylindriques, très-velues; ses feuilles composées de cinq à huit paires de folioles elliptiques, oblongues, obtuses, velues, blanchâtres, munies à leur base de deux stipules de même forme. Les fleurs sont réunies en quatre ou sept gros paquets alternés, sessiles, distans, arrondis en tête. Le calice est oblong, un peu ensilé, très-velu, à cinq dents dentées; la corolle jaune, de la grandeur de celle

de l'anthyllis *vulneraria*; l'étendard entier, un peu plus long que les ailes; les ailes linéaires, de la longueur de la carène; la gouffe à une seule semence, recouverte par le calice.

Cette plante croît dans les fentes des rochers du mont Atlas, proche l'émisen, où elle a été découverte par M. Desfontaines. γ (V. f.)

9.* ANTHYLLIDE à crochets. *Anthyllis hamosa*. Desfont.

Anthyllis foliis pinnatis, capitulis pedunculatis; leguminibus hamosis, calice hirsutissimo longioribus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 151.

Anthyllis cornicina. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 211.

Elle a de très grands rapports avec l'*anthyllis cornicina* Linn.; elle en diffère par ses têtes de fleurs épaisses, nombreuses, latérales & terminales, ramassées à l'extrémité d'un long pédoncule velu, axillaire; par ses corolles petites, d'un jaune-pâle, & par ses gouffes grêles, glabres, fubulées & fortement courbées en hampeçon, beaucoup plus longues que le calice, qui est très-velu, arqué, à cinq dents; elles renferment plusieurs semences planes, fort petites. Les tiges sont pileuses, couchées; les feuilles médiocrement velues.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de la Barbarie, aux environs de Lacalle. (V. v.)

10.* ANTHYLLIDE à feuilles de sainfoin. *Anthyllis onobrychioides*. Cavan.

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis, aequalibus; ramis ternatis; pedunculis lateralibus, folio longioribus; capitulis aphyllis, stipulis obsoletis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1016.

Anthyllis (onobrychioides), caule fruticoso, brevi; ramis erectis, foliis pinnatis, pinnis sublinearibus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 40. tab. 150.

Cette plante ressemble beaucoup à l'*anthyllis Gerardii*; elle en diffère par ses folioles presque toutes d'égale grandeur; par les feuilles des rameaux, ternées; par les stipules point foliacées, peu durables; par ses têtes de fleurs bien moins garnies; enfin, par ses corolles plus grandes. Les tiges sont herbacées, presque ligneuses, courtes, rameuses; les pédoncules latéraux, alongés, soutenant une petite tête de fleurs dépourvues de bractées.

Cette plante croît sur les montagnes, en Espagne. γ

11.* ANTHYLLIDE incisée. *Anthyllis incisifolia*. Willd.

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis, inaequalibus.

ternatisque, cuneiformibus, inciso-dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 117.

Barba Jovis græca, humillima, cæcis folio; flore purpureo, violaceo. Tournef. Coroll. 44.

C'est une fort petite plante, haute d'environ deux ou trois pouces. Ses racines donnent naissance à plusieurs tiges droites, rameuses, légèrement pubescentes, garnies de feuilles composées de cinq ou trois petites folioles cuneiformes, longues d'environ deux lignes, tridentées à leur sommet, avec une ou deux dents, accompagnées à leur base de stipules ovales, de la grandeur des folioles. Les fleurs sont d'un pourpre-violet, réunies en une petite tête à l'extrémité des rameaux, portant une petite feuille à leur base.

Cette plante croît dans les îles de l'Archipel. γ (Descript. ex Willd.)

12.* ANTHYLLIDE soyeuse. *Anthyllis sericea*. Willd.

Anthyllis herbacea, foliis pinnatis, aequalibus, sericeis; spica pedunculata, ovariis. Willd. Spec. 3. pag. 1014.

Ehennus (pinnata), foliis pinnatis, quadrifidis; spicis axillaribus, longissimis pedunculatis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 27. — Desfont. Ait. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. pag. 21. tab. 3.

Ehennus (pinnata), caule herbaceo; foliis imparipinnatis, sericeis, incanis; pedunculis axillaribus, longissimis, aphyllis; spica ovata, villosissima. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 152.

Hedysarum (sericeum), foliis pinnatis; leguminibus monospermis, rugosis; spicis ovatis, pilosissimis; caulibus erectis, pilosis. Vahl, Symb. 2. pag. 83. tab. 41.

Belle espèce, dont les racines tortueuses, presque simples, produisent plusieurs tiges droites, très-pileuses, cylindriques, herbacées, garnies de feuilles composées de quatre à dix folioles soyeuses, luisantes, argentées, presque opposées, linéaires, lancéolées, accompagnées de deux stipules sèches, ovales, concaves, aiguës. Les fleurs sont placées à l'extrémité d'un très-long pédoncule grêle, velu, tridenté; réunies en un épi ovale-oblong, épais, soyeux, très-velu; chaque fleur munie à sa base d'une petite écaille concave, aiguë. Le calice est velu, plus long que la corolle, terminé par cinq filaments longs, plumeux, sétacés; la corolle petite, de couleur de rose. Les gouffes sont petites, un peu plus longues que le calice, comprimées, un peu arquées, à une seule semence lisse, jaunâtre, arrondie.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines sur les collines incultes du mont Atlas. γ (V. f.)

** Plantica

15. ANTHYLLE visqueuse. *Anthyllis visciflora*. Linn.

Anthyllis foliis digicato-pinnatis, calicibus hirsutis. Linn. f. Suppl. pag. 325.

Ses tiges sont couchées, ligneuses, hautes de six à sept pouces; les feuilles pétiolées, ailées, presque digitées; les folioles globes, ovales, inégales; deux féssiles, opposées; trois pétiolées; les latérales ternées, celle du milieu ailée. Les pédoncules sont simples, aussi longs que les feuilles; ils supportent une petite tête de cinq à six fleurs. Les calices sont petits, chargés de poils visqueux. La corolle est jaune, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

16. ANTHYLLE épineuse. *Anthyllis tragacanthoides*. Desfont.

Anthyllis fruticosa, petioli spinoscentibus, foliis pinnatis; floribus axillaribus, subsessilibus; calice viscoso. Desfont. Flot. atlant. vol. 2. pag. 150. tab. 194.

Astragalus armatus. Willd. Spec. 3. n°. 162.

Ce joli petit arbuste a le port de l'*astragalus tragacanthoides*, mais il est plus élevé. Ses tiges sont hautes d'un à deux pieds, droites, rameuses; leur écorce crevassée sur les anciennes branches; les feuilles pétiolées, alternes, ailées; les folioles nombreuses, fort petites, linéaires-lancéolées, aiguës, d'un vert-blanchâtre, pubescentes; les pétiolés qui les supportent, très-durs, roides, cylindriques, persistans, terminés par une épine roide, piquante; velus dans leur jeunesse, ayant l'apparence d'anciens rameaux lorsqu'ils sont dépouillés de feuilles.

Les fleurs sont axillaires, solitaires ou agrégées, légèrement pédonculées, munies à leur base de bractées solitaires, membraneuses, ovales, caduques, bifides; les découpures aiguës. Leur calice est grand, renflé, ovale-oblong, membraneux, velu, blanchâtre ou de couleur purpurine, rétréci à son orifice, terminé par cinq petites dents serrées; la corolle d'un jaune-pâle ou blanchâtre, d'un tiers plus longue que le calice; l'étendard entier, obtus, longuement onguiculé; les ailes linéaires, étroites, un peu arquées, plus courtes que l'étendard; leur ongle long & filiforme; la carène petite, de la longueur des ailes; dix étamines; les filamens courbés à leur sommet; le style arqué, aigu. Le fruit est une gousse pédicellée, petite, un peu comprimée, arquée, renfermée dans le calice; une seule semence en forme de rein.

Botanique, Supplément, Tome I.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les sables du désert, aux environs de Caffa. *h* (*V. f.*)

La plante que M. de Labillardière a décrite sous le même nom est différente, qui n'a guère semblable par le port. Willdenow l'a rangée parmi les astragales.

17. ANTHYLLE laillante. *Anthyllis splendens*. Willd.

Anthyllis foliis pinnatis, aequalibus, sericeo-tomentosis; bracteis capitulis demissatis, paucifloris longioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1018.

Elle diffère peu de l'*anthyllis de barbe de Jupiter* & l'on ne considère que la forme & la disposition de ses feuilles; mais elle s'en distingue aisément par ses fleurs. Elles sont peu nombreuses, réunies en une petite tête courte, divisée en deux, plus courte que la bractée qui l'accompagne; celle-ci est ou ternée ou ailée.

Cette plante croît à l'île de Crète. *h*

18. ANTHYLLE des Indes. *Anthyllis indica*. Lour.

Anthyllis fruticosa, foliis pinnatis, aequalibus, glabris; racemis oblongis, subterminalibus. Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 521.

C'est un grand arbrisseau, dont les tiges sont droites, les rameaux grimpans, dépourvus d'épines, garnis de feuilles ailées avec une impaire, composées de folioles glabres, ovales, très-entières, presque toutes égales. Les fleurs sont blanches, disposées en plusieurs grappes allongées, presque terminales. Le calice est ventru, rougeâtre, à cinq dents; tous les filamens réunis. Le fruit est une gousse courte, renfermant deux semences reniformes.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Cochinchine. *h* (*Descript. ex Lour.*)

ANTHYLLIS. (*Voyez ANTHYLLE*.)

ANTICHORE comprimée. *Antichorus depressus*. Linn. Esc. Plant. pag. 3. tab. 2. — Lam. lil. tab. 295. — Vahl, Synb. 1. pag. 27. Il faut y rapporter le

Jussia (edulis), caulibus prostratis, foliis longipetiolatis, ovatis; margine serrato-serrato; floribus tetrapetalis, obandris. Forsk. Fl. aegypt-arab. pag. 210.

Cette plante, au rapport de Forskhal, est employée en Egypte & dans l'Arabie comme plante potagère; elle appartient à la famille des lilacées, & se rapproche des *corymbes*.

ANTICHORUS. (*Voyez ANTICHORE*.)

E e e

ANTIDESMA. (Voyez ANTIDESME.)

ANTIDESME. La famille de ce genre n'a pas encore pu être déterminée. Les *stilago* de Linné en diffèrent si peu, que M. de Jussieu a proposé de les réunir, & cette opinion est d'autant mieux fondée, que les plantes de ces deux genres ont le même port, les mêmes propriétés, & qu'ils ne diffèrent entr'eux que par le nombre de quelques-unes des parties de la fructification, les *stilago* n'ayant que deux ou trois étamines, deux stigmates, un calice un peu tubulé, à quatre ou cinq dents.

1. **ANTIDESME alexitère.** *Antidesma alexiteria*. Linn. — Lam. Illustr. Gener. tab. 811. fig. 1. — Gært. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 183. tab. 39. fig. 5.

2. **ANTIDESME de Madagascar.** *Antidesma madagascariensis*. Lam. Ill. tab. 811. fig. 3.

5. **ANTIDESME acide.** *Antidesma acido*. Retz. *Antidesma foliis obovatis, spicis solitariis*. Retz. Obf. bot. 5. pag. 30.

Cette plante paroît très-rapprochée de l'*antidesma sivevria* Lam. n°. 4; mais ses feuilles sont en ovale renversé, bien moins aiguës; ses épis solitaires, axillaires ou latéraux vers l'extrémité de rameaux très-courts. Les calices sont divisés en cinq dents; les fleurs femelles ordinairement pourvues de trois styles réfléchis. Elle croît dans les Indes orientales. \mathfrak{H}

6. **ANTIDESME pubescent.** *Antidesma pubescens*. Roxb.

Antidesma foliis ellipticis, utrinque acutis, subtus pubescentibus; racemis paniculatis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 763. — Roxb. Corom. 2. pag. 35. tab. 167.

p. Arbor india, ovali folio; flosculis plurimis in foliis summo ramulo dispositis, aciniferis. Pluken. Phyt. 22. tab. 339. fig. 1.

Ses feuilles sont alternes, légèrement pétiolées, elliptiques, un peu aiguës à leur base, arrondies & mucronées à leur sommet, entières, longues d'environ un pouce & demi, glabres en dessus, pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, terminales, réunies en panicule. La variété \mathfrak{p} en diffère par les feuilles arrondies à leur base, & quelquefois légèrement échancrées en cœur.

Cette plante croît sur les montagnes, dans les Indes orientales. \mathfrak{H}

7. **ANTIDESME paniculée.** *Antidesma paniculata*. Roxb.

Antidesma foliis subarundo-ellipticis, utrinque rotundatis, obtusis, apice emarginatis, subtus pubescentibus; racemis terminalibus, paniculatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 764. — Roxb.

Cette espèce se distingue à la forme de ses feuilles presque rondes, elliptiques, arrondies à leurs deux extrémités, échancrées & obtuses à leur sommet, longues d'un pouce & demi, presque glabres en dessus, pubescentes en dessous. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en grappes paniculées, longues d'environ quatre lignes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. \mathfrak{H} (Willd.)

Observations. Gærtner a ajouté à ce genre : *ribesoides* Linn. Flor. zeyl. n°. 403; il le nomme

* *Antidesma ghesambilla*. Gært. vol. 1. p. 189. tab. 39. — Lam. Ill. Gen. tab. 812. fig. 2.

Ghesambilla zeylanica, major, ghesambilla, zeylonensis dicta. Burm. Zeyl. 112.

Ghesambilla. Herm. Zeyl. 36.

Le fruit, d'après Gærtner, est parfaitement semblable à celui de l'*antidesma alexiteria*; mais il est une fois plus petit, plus arrondi, quelquefois à deux lobes & à deux semences. Le calice & les ligaments sont les mêmes. Linné dit que les feuilles sont glabres, pétiolées, alternes, très-entières, en ovale renversé, un peu obtuses. Les fleurs sont disposées en une grande panicule terminale, composée de plusieurs grappes partielles; elles ont cinq pétales, selon Linné. Le calice est fort petit, à cinq dents; les étamines au nombre de cinq; un pistil, il s'ensuivroit, d'après Linné, que cette plante a des fleurs hermaphrodites & une corolle, caractères qui ne conviennent point aux antidesmes.

Cette plante croît à l'île de Ceylan. \mathfrak{H}

Le *valambilla* Herm. Zeyl. 8, que Linné donne comme une variété de *Valaagnus latifolia*, Flor. zeyl. n°. 58, se rapproche encore beaucoup des antidesmes par ses fruits, selon Gærtner; ils n'en diffèrent qu'en ce qu'ils sont moins pulpeux.

* **ANTIDESME grimpant.** *Antidesma scandens*. Lour.

Antidesma foliis palmatis, serratis; caula scandente. Lour. Flor. coch. n. vol. 2. pag. 757.

Ses tiges sont longues, ligneuses, grimpantes, sans aiguillons & sans vrilles, garnies de feuilles pétiolées, alternes, glabres, palmées, dentées en scie. Les fleurs sont dioïques. Le calice, dans les fleurs mâles, est divisé en cinq découpures; il n'y a point de corolle. Les étamines sont courtes, au nombre de cinq; les anchères droites,

baillantes à leur sommet. Les fleurs femelles n'ont point été observées.

Cette plante croît en Chine, aux environs de Canton. *h*

Observations. Cette espèce est douteuse, les fleurs femelles n'ayant point été observées; elle s'écarte de ce genre par son port, par les feuilles palmées.

8. ANTIDESME filago. *Antidesma filago.*

Antidesma foliis ovato-oblongis, glabris; floribus triandris. (N.)

Stilago (bunius), *floribus triandris.* Willden. Spec. Plant. 4. pag. 714. — Linn. Mant. 122. — Burm. Ind. 16.

Bunius fistulosus. Rumph. Amboin. 3. pag. 204. tab. 131.

Stilago (diandra), *floribus diandris.* Willd. Spec. Plant. 4. pag. 714. — Roxb. Corom. 2. pag. 35. tab. 166.

Arbre de médiocre grandeur, divisé en rameaux p. u. nombreux, garnis de feuilles pétiolées, alternes, simples, très-embrassées, ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces; longues de cinq à sept pouces, sur trois ou quatre de large. Les épis sont grêles, nus, alternes, très-longs, réunis deux ou quatre sur un pédoncule commun, soutenant de petites fleurs diques, sessiles, éparées. Le calice est un peu tubuleux, à trois ou quatre dents dans les fleurs mâles, à cinq dans les femelles; il n'y a point de corolle. Les étamines sont au nombre de trois ou de deux dans la variété *g*. L'ovaire est environné d'un anneau à sa base, surmonté d'un style & de deux stigmates: il lui succède une baie arrondie, de la grosseur d'un pois, d'abord rouge, puis noirâtre, d'une saveur douce, acidulée, que l'on mange dans les Indes, & qui se vend sur les marchés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h*

ANTIRRH. EA. Juss. Genre de plantes de Comerson, qui a été réuni aux *malanea*. (Voyez MALANI verticillée, n°. 4.)

ANTIRRHINUM. (Voyez MUELLER.)

ANTITRAGUS. Gertn. vol. 2. pag. 7. tab. 80. La plante graminée que Gertner a décrite sous ce nom, & dont il avoit fait un genre, est celle que Linné avoit successivement rapportée aux genres *seturus*; *phleum*, *anthoxanthum*, & qui est enfin devenue une espèce du genre *crystis*. (Voy. FLORE, n°. 6, & CRYPTIS, Suppl.)

ANTOLANG. BALASBAS. Camelli cite sous ces noms un arbrisseau des Philippines, cultivé

dans les jardins, où on le plante en palissades. D'après sa description & sa figure, c'est certainement une espèce de carmentine (*justicia* Linn.). très-voisine du *justicia pida* Linn. (Juss.) (Voyez CARMENTINE, n°. 6.)

ANTOLFE. *Antiohyllus* C'est le nom que l'on donne au fruit mûr du giroflier, qui porte également ceux de *mère* ou *matrice* de girofle. Ce fruit est rempli d'une gomme ou résine dure & noire, très-odorante & aromatique.

ANTSJAC: nom que porte à Java un figuier figuré dans Rumphé, Amb. 3. tab. 91, sous le nom d'*arbor conciliatorum*, & que Burman regarde comme une variété du *ficus religiosa*. Il est remarquable par son tronc très-régulier & sinué profondément; par ses rameaux très-entrelacés, & quelquefois réunis dans leur point de contact. Les habitants mangent les fruits. Son feuillage sert de nourriture aux animaux. (Juss.) (Voyez FIGUIER, n°. 4.)

ANTURA. Ce genre de plantes, établi par Forskhal dans sa *Flora de l'Arabie*, pag. 16, a été réuni, ainsi que l'*ardua*, au genre *carissa* Linn. (Voyez CALAC, Suppl. à *Carissa edulis* Vahl.)

ANVALI: nom brame de l'emblème ou noix emblème, petit arbre de la famille des euphorbes, que Linné a réuni au genre *phyllanthus*, & que Gertner en sépare sous le nom générique d'*emblica*, dont le caractère distinctif principal est d'avoir la coque renfermée dans une baie, & les loges occupées par deux semences. (Voy. PHYLLANTHE, n°. 19.)

ANYCHIE. *Anychia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des amarantées, qui a de grands rapports avec les *ilicetrum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, fort petites, à feuilles opposées, manières de stipules, & qui portent des fleurs fasciculées, séparées par des bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice à cinq découpures creusées en voûte, conniventes à leur sommet; point de corolle; deux stigmates; une capsule utriculaire, monosperme, qui ne s'ouvre point.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice d'une seule pièce, oblong, connivent, à cinq découpures alongées, creusées en voûte sous leur sommet, surmontées d'une petite pointe.

2°. Une corolle nulle.

E e e 2

3°. Cinq *étamines*, quelquefois moins par avortement; les filaments droits, sétacés, insérés au fond du calice, plus courts que lui, opposés à des divisions; point de filaments stériles, soutenant des anthères presque en cœur.

4°. Un *ovaire* libre, un peu arrondi, surmonté d'un style simple, terminé par deux stigmates oblongs, recouverts.

Le fruit est une capsule qui ne s'ouvre point, enveloppée par le calice persistant, scarieuse à son sommet, renfermant une semence presque en rein, adhérente au fond du calice par un pédicelle suspendu au sinus latéral.

ESPÈCES.

1. *ANYCHIE herniaire*. *Anychia herniarioides*. Mich.

Anychia humifusa, pubescens, foliis oblongo-ovatis, ciliatis. Mich. Flor. boreal. Amer. t. pag. 113.

Petite plante, dont les tiges sont très-rameuses, couchées, nombreuses, étalées sur la terre, pubescentes, garnies de feuilles petites, opposées, sessiles, pubescentes, oblongues, ovales, ciliées à leurs bords, terminées par un filet sétacé, accompagnées de stipules. Les fleurs sont ramassées en petits paquets dans l'aisselle des feuilles, séparées chacune par une petite bractée scarieuse. Les découpures du calice sont tubulées, surmontées d'une pointe sétacée.

Cette plante croît dans les plaines arides & sablonneuses de la Caroline. (Mich.)

2. *ANYCHIE argentée*. *Anychia argirocoma*. Mich.

Anychia cespitosa, procumbens, subpubescens; foliis linearibus, acutifimis; capitulis fasciculato-terminalibus, argenteis; calicibus apice barbatis. Mich. Flor. boreal. Amer. t. pag. 113.

Cette espèce a l'aspect agréable de l'*Illecebrum paronychia*. Ses tiges sont couchées, rameuses, légèrement pubescentes, ramassées en gazon, garnies de feuilles sessiles, opposées, linéaires, légèrement pileuses, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont réunies en petites têtes fasciculées, terminales, d'un blanc-argenté; les calices barbus à leur sommet & longuement acuminés.

Cette plante croît sur les rochers, à la Caroline. (Mich.)

Observations. Il faut, d'après Michaux, rapporter à ce genre le *queria canadensis* Linn., qui a presque toujours cinq étamines dans son état sauvage, & seulement deux par avortement lorsqu'il est cultivé. Sans doute Michaux aura également

observé que les capsules étoient d'une seule pièce, & qu'elles ne s'ouvraient point en trois valves, autrement il devroit être conservé parmi les *querias*. (Voyez QUERIE, n°. 2.)

AOTUS. (Voyez AOTE.)

AOUARA. Espèce de palmier, dont Aublet a figuré le fruit. Frontisp. n°. 5. Il pousse plusieurs riges de sa racine, qui s'élèvent à la hauteur de quinze pieds, plus ou moins; il croît au bas des coreaux humides de la Guiane. Il paroît mentionné dans Plumier sous le nom de *palma dactylifera, aculeata, minima*. Gen. pag. 3.

AOUAROUCHI. *Voirouchi*. Suif jaunâtre, végétal, extrait de la graine nommée à Cayenne *icaïemadou*, fourni par le voirouchi ou virola des Galibis (*virola sebifera*, Aubl. Guian. 2, p. 904, tab. 345), qui est une espèce de mulsadier que j'ai décrit dans ce genre, n°. 7, sous le nom de *myristica sebifera*. Pour retirer ce suif on pile les graines, auparavant séchées, netoyées & séparées de leur coque: on les réduit en une pâte, sur laquelle on verse de l'eau bouillante. Le suif s'en sépare, s'élève à la surface, & s'y durcit lorsque l'eau est refroidie. On le fond de nouveau, & après l'avoir passé à travers d'un tamis, on en forme des chandelles, employées dans la colonie de Cayenne.

APACARO: nom brachinane d'un petit arbre figuré dans Rhéde, Hort. Malab. vol. 5, pag. 31, tab. 16, sous celui de *sternou-panel*, qui réunit tous les caractères de l'*uvaria*, & qui paroît même devoir se rapporter à l'*uvaria cerasoides* de Roxburg. (Voyez CANANG, Suppl.)

APACTIS du Japon. *Apactis japonica*. Thunb.

Apactis foliis alternis, simplicibus, ovatis, glabris; floribus racemosis, subterminalibus.

Apactis japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 191. — Willd. Spec. 2. pag. 845.

Genre de plantes dicotylédones, établi par Thunberg, à fleurs incomplètes, polyptéales, dont les rapports naturels, ainsi que la famille, ne sont pas encore bien connus, & qui offre pour caractère essentiel:

Une corolle à quatre phaltes; point de calice; seize à vingt étamines; un ovaire libre, surmonté d'un style.

Ce genre ne comprend encore qu'une seule espèce. C'est un arbrisseau dont la tige se divise en rameaux très-nombreux, glabres, alternes, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, excepté vers leur base. Les fleurs sont situées vers

l'extrémité des dernières ramifications, disposées en grappes ovales dans leur jeunesse, puis allongées à mesure que les fleurs s'épanouissent; elles n'ont point de calice. Les pédoncules, ainsi que les pétiolles, sont un peu velus, rudes au toucher. La corolle est composée de quatre pétales crénelés, inégaux. Les étamines sont au nombre de seize à vingt. L'ovaire est libre, surmonté d'un style. Le fruit n'a pas encore été observé, ainsi que le stigmate.

Cette plante croît au Japon. *h* (Descript. ex Thunb.)

APALACHINE. Arbrisseau de l'Amérique septentrionale, ainsi nommé parce qu'il croît sur les monts Apalaches. L'infusion de ses feuilles est recommandée dans la Louisiane, pour soulager l'estomac, faciliter la digestion, relâcher doucement le bas-ventre, & faire couler les urines. On l'a vanté aussi dans les douleurs néphrétiques, & dans les autres affections des reins & de la vessie. Quoiqu'il en soit, il fait mention dans divers traités de drogues, cette plante n'est pas usitée en Europe, peut-être à cause de la difficulté de s'en procurer. On n'a pas même bien connu la vraie apalachine, qui avoit été regardée tantôt comme un *eanothus*, tantôt comme un *prinos*, ou *caffine*. Maintenant elle est rapportée sûrement au genre *Houx* (*ilex*), sous le nom d'*ilex vomitoria* Ait., qui est peut-être impropre, puisque cette plante n'a pas jusqu'à présent été regardée comme émétique. (*Juss.*) (Voyez *CASSINE*, n°. 3, & *Houx*, Suppl.)

APALANCHE. *Prinos*. Les deux espèces d'apalanches décrites dans cet ouvrage sont les seules cultivées depuis un certain tems dans les Jardins botaniques de l'Europe. La première, *prinos verticillatus* Linn. (*prinos Gronovii*, Mich. Flor. bor. Amer. 2, pag. 236), est gravée dans les *Illustrations des Genes*, tab. 255, fig. 1, ainsi que la seconde, *prinos glaber*, fig. 2. Les suivantes ont été découvertes depuis peu d'années par différents voyageurs.

3. **APALANCHE des montagnes.** *Prinos montana*. Swartz.

Prinos foliis ovatis, ferratis, utrinque nitidis. Swartz, Flor. Ind. occid. t. pag. 622, & Prodr. 58. — Willd. Spec. 2. pag. 225.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt à trente pieds, chargé de rameaux glabres, cylindriques, & de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, glabres, nerveuses, luisantes à leurs deux faces, longues d'un pouce & demi, garnies à leur contour de dentelures écarénées, aiguës; les pétioles courts, glabres, cylindriques. Les fleurs sont petites & blanches, fou-

tenues par des pédoncules solitaires, axillaires, beaucoup plus courts que les feuilles, chargés de trois ou quatre fleurs pédicellées. Le calice est partagé en six découpures petites, ovales, convexes; la corolle en six lobes ovales-lancéolés, ouverts en roue, réfléchis à leur sommet; les anthères arrondies, insérées à leur base; le stigmate en tête, comprimé, à six lobes peu sensibles. Le fruit est une petite baie arrondie, presqu'octogone, noire dans la maturité, à six loges, contenant chacune une semence comprimée, oblongue, noirâtre, luisante.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les montagnes. *h* (Swartz.)

4. **APALANCHE** à feuilles d'argan. *Prinos fiduciosyoides*. Swartz.

Prinos foliis subrotundis, incrimis. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 624, & Prodr. 58.

C'est un arbre dont le bois est très-dur; les rameaux cylindriques, cendrés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, un peu arrondies, glabres, très-entières, obtus; un peu coriaces, plus pâles en dessous. Les fleurs sont blanchâtres, petites, réunies de quatre à huit, dans les aisselles des feuilles, sur des pédoncules simples, plus longs que les pétioles. Leur calice est fort petit, à six dents; la corolle à six découpures ouvertes, ovales, persistantes; les anthères oblongues; le stigmate sessile, presqu'en tête, à six filies. Le fruit est une baie arrondie, couronnée par le stigmate, contenant six semences oblongues, sillonnées, très-rapprochées.

Cette plante croît dans l'île Saint-Christophe, au mont Serrat, &c. *h* (Swartz.)

5. **APALANCHE dioïque.** *Prinos dioicus*. Vahl.

Prinos foliis oblongo-ovatis, subserratis, glabris, coriaceis; pedunculis axillaribus, subsinifloris; floribus dioicis, tetrandris. Vahl, Egl. 2. pag. 25. tab. 14.

Ses rameaux sont glabres, ponctués, un peu anguleux, garnis de feuilles nombreuses, alternes, pétiolées, larges de deux pouces, ovales, arrondies sur les individus mâles, avec une petite pointe courte; oblongues-ovales, & souvent échanquées sur les individus femelles, glabres à leurs deux faces, à peine denticulées, entières vers leur base, luisantes en dessus, plus pâles & parsemées de petits points en dessous. Les fleurs sont dioïques; les mâles axillaires, réunies environ au nombre de vingt, soutenues par des pédoncules presque simples, très-courts, de la longueur des pétioles. Leur calice est fort petit, à quatre découpures; quatre pétales, autant d'étamines; un ovaire avorté; les fleurs femelles moins

nombreuses, un peu plus grandes que les fleurs mâles; l'ovaire oblong, obtus.

Cette plante croît au mont Serrat. *h* (Vahl.)

6. APALANCHE luisante. *Prinos nitidus*. Vahl.

Prinos foliis oblongo-ovatis, serratis, nitidis, membranaceis; pedunculis axillaribus, unifloris; floribus tetrandris. Vahl, Egl. 2. pag. 26.

Rapprochée de la précédente, cette plante en diffère par ses rameaux fleuris, plus grêles, bruns & non blanchâtres; par ses feuilles plus petites, plus luisantes, ordinairement rétrécies en pointe vers leur base; les pédoncules moins nombreux, & tous uniflores; toutes les fleurs hermaphrodites, une fois plus grandes. L'ovaire est arrondi; le style presque nul; le stigmate aigu. Le fruit consiste en une baie ovale, un peu ronde, de la grosseur d'un grain de poivre.

Cette plante croît au mont Serrat. *h* (Descript. ex Vahl.)

7. APALANCHE douteuse. *Prinos ambiguus*. Mich.

Prinos foliis ovalibus, utrinque acuminais; pedicellis masculis unifloris, ad imos ramunculos numero congestis; femineis solitariis; florum partitione quaternaria. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 236.

1. *Idem, florum partitione quinaria*. Mich. l. c.

An cassine caroliniana? Walch. Flor. carol.

Cette plante offre tous les caractères des *prinos*. Ses fleurs, comme dans la plupart des autres espèces, sont dioïques par avortement. Ses feuilles sont alternes, ovales, rétrécies en pointe à leurs deux extrémités. Les fleurs mâles, rapprochées en grand nombre vers la base des jeunes rameaux, sont soutenues par des pédoncules uniflores; les fleurs femelles solitaires. Ordinairement les parties de la fructification sont partagées en quatre, quelquefois en cinq, & dans ce dernier cas elle parait être la même plante que la *cassine caroliniana* de Waltherius.

Cette plante croît dans la Caroline. *h* (Mich.)

APAL ATOU. *Apulatoa*. Aubl. Ce genre d'Aubl., qu'il distinguait du *cochiroa*, lui a été réuni, & se trouve dans Willdenow, ne formant qu'un seul genre sous le nom de *crudia*. Cette réunion avait été indiquée par M. de Jussieu dans ses Familles des plantes.

APAMA. (Voyez ALPAN, & Illustr. Gener. tab. 42.)

APARGIA. Genre de Schrebère, & dans lequel Willdenow, d'après lui, a réuni plusieurs espèces

de *leontodon* Linn., quelques *hieracium*, &c. qui ont pour caractère essentiel :

Un réceptacle nu; une aigrette sessile, plumeuse; un calice imbriqué.

MM. de Lamarck & de Jussieu avoient déjà, bien auparavant, divisé le genre *leontodon* Linn. en deux autres, sous les noms de *leontodon* & de *taraxacum*, en leur assignant les mêmes caractères. (Voy. LONDENT & PENSELET.)

APARINÉ : nom sous lequel Tournefort, & d'autres avant lui, désignoit le gratteron & d'autres plantes analogues, semblables par leur fructification au gailler, dont elles ne diffèrent que par l'aspérité de la tige, des feuilles, & quelques fois du fruit.

APEIBA. Ce genre porte le nom d'*aublata* dans Schrebère & Willdenow. M. de Lamarck a donné dans les *Illustrations* la figure des fruits de plusieurs espèces contenues dans ce genre, tab. 470. *Apeiba glabra*, fig. 1; *apeiba petiolo*, fig. 2; *apeiba aspera*, fig. 3. Ces deux dernières figures sont de Gærtner, ainsi que la quatrième, *apeiba echinata* Gærtner, dont il n'y a de connu que le fruit.

APHACA. APHACÉ. Ces noms, tirés par Théophraste, Dioscoride & d'autres anciens auteurs, ont été appliqués à différentes plantes. Les uns ont cru que c'étoit l'orobanche; d'autres, une plante chicoracée qui, d'après les figures qu'on en donne, parait être une espèce de *crepis*. Dioscoride parle d'un *aphaca*, qui est un arbrisseau légumineux. Enfin, l'*aphaca* de Lobel & des Modernes, que Dodonée nommoit *orobanche*, est une herbe légumineuse, dont Tournefort a fait son genre *aphaca*, & que Linné a réuni à celui de la gesse, sous le nom de *lathyrus aphaca* Linn., distinct de ses congénères parce qu'il n'a pas de feuilles, mais seulement des vrilles, garnies à leur base de larges stipules. (Juss.)

APHANES. (Voyez PERCEPIER.)

APHARCA. Théophraste désignoit sous ce nom un arbre que plusieurs auteurs croient être l'alatene, rugé maintenant parmi les nerptuns.

APHITÉE parasite. *Aphytia hydnora*. Linn. — Lam. Ill. tab. 568.

APHYLANTHES. (Voy. JONCIELE & NON-FEUILLEE.)

APHYLLOCARPA. Cavan. Præl. C'est l'*osmunda regalis*, dont Cavanilles avoit fait un genre particulier. (Voyez OSMONDE, n°. 21.)

APHYTEIA. (Voyez APHITÉE.)

APIOS : espèce de tithymale ou d'euphorbe, *euphorbia apios* Linn. (Voyez EUPHORBÉE, n°. 63), dont la racine tubéreuse, en forme de poire, lui avoit fait donner le nom de *pyraria* dans l'île de Candie, & d'*apios* dans la Grèce, où elle étoit encore nommée *ischas*, c'est-à-dire figue, pour la même raison. Dioscoride ; Plin. & Théophraste annoncent sa propriété hydragogue, purgative ou émétique, selon les parties de la plante que l'on emploie. Dalechamp, en parlant de l'*apios*, cite les divers passages de ces auteurs qui lui sont relatifs. On a donné postérieurement le même nom à la terre-noix (*huniun bulbocastanum* Linn.), à la gesse tubéreuse (*lathyrus tuberosus* Linn.) & à une espèce de glycine (*glycine apios* Linn.), probablement parce que leur racine est également tubéreuse, & à peu près de la même forme. (Juss.)

APIUM. (Voyez PERSIL.)

APLUDA. (Voyez APLUDE, & les Illustrations des Genres, tab. 841, où l'*apluda nutica* est représentée fig. 1, & l'*apluda arifata* fig. 2.)

APOCIN. *Apocynum*. Ce genre, qui renferme des plantes d'un très-bel aspect par la disposition, le nombre & souvent la couleur de ses fleurs, a été très-peu augmenté. L'*apocynum androsamifolium* est figuré tab. 176, fig. 1.

10.* APOCIN à feuilles de millepertuis. *Apocynum hypericifolium*. Ait.

Apocynum caule cretisculo, herbaceo; foliis oblongis, cordatis, glabris; cymis folio brevioribus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 304.

Apocynum (sibiricum), caule erecto, herbaceo; foliis obovatis, umbellulis terminalibus. Murr. Syth. veg. pag. 158. — Jacq. Hort. 3. pag. 37. tab. 66.

Ses tiges sont glabres, herbacées; ses rameaux opposés, redressés, un peu anguleux, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, glabres, vertes, plus pâles & un peu pubescentes en dessous dans leur jeunesse, entières à leurs bords, à peine aiguës, souvent obtuses, terminées par une petite pointe spinuliforme. Les fleurs sont disposées en une petite ombelle axillaire, terminale, plus courte que les feuilles.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. 2 (V. f.)

L'*apocynum minus* Linn. f. & Didl. n°. 11, est l'*apocynum hastatum* Thunb. Prodr. pag. 47. L'*apocynum indicum* Lam. a été renvoyé par ce même auteur au *cynanchum indicum*, vol. 1, pag. 236.

Observations. L'*apocynum indicum*, n°. 4, a été

replacé parmi les *cynanchum* avec celles qui ne sont encore que très-imparfaitement connues.

* *Apocynum (cordatum), caule volubili, hirsuto; foliis ovatis, subtus villosis.* Thunb. Prodr. 47.

* *Apocynum (lanceolatum), caule volubili, herbaceo, striato, glabro; foliis lanceolatis, umbellulis trifloris.* Thunb. Prodr. 47.

Ces deux espèces sont originaires du Cap de Bonne-Espérance; elles ne sont encore connues que par la phrase spécifique de Thunberg.

15. APOCIN aggloméré. *Apocynum agglomeratum*.

Apocynum foliis ellipticis, utrinque obtusis, submucronatis; floribus cymosis, agglomeratis; corollâ foveâ pilosâ. (N.)

Nummularia laeta, major? Rumph. Amb. 5. pag. 470. tab. 175. fig. 1.

Ses tiges sont ligneuses, grimpantes; ses rameaux glabres, allongés, cylindriques; les feuilles distantes, opposées, pétioles, longues d'un pouce & plus, larges au moins de quatre lignes, elliptiques, obtuses, arrondies à leurs deux extrémités, souvent terminées par une petite pointe, glabres en dessus, blanchâtres & un peu pubescentes en dessous, finement réticulées; les nervures fines, confluentes vers les bords. Les fleurs sont nombreuses, réunies en cime axillaire, plus courte que les feuilles. Les ramifications sont si courtes, que les fleurs paroissent agglomérées. Leur calice est à cinq découpures ovales, obtuses, blanchâtres, membraneuses, & presque ciliées à leurs bords. La corolle se divise en cinq lobes obtus; chaque lobe garni en dedans, vers sa base, d'une bande de poils grêles. Les fruits ne me sont pas connus.

Cette plante a été découverte à Saint-Domingue par M. Poiteau. 5 (V. f. in herb. Desfont.)

16. APOCIN réticulé. *Apocynum reticulatum*. Lour.

Apocynum caule volubili, feraciori; foliis ovatis, venosis. Linn. Spec. 5. ? — Lour. Flor. cochina. 1. pag. 108.

Olea erudum minus. Rumph. Amb. lib. 7. c. 41. tab. 40. fig. 1.

Cette espèce, que Loureiro croit être l'*apocynum reticulatum* Linn., a des tiges grêles, ligneuses, grimpantes, pileuses, cylindriques; des feuilles ovales, presque acuminées, très-entières, glabres, luisantes, recourbées à leurs bords; les fleurs jaunes, disposées en petites ombelles axillaires. Le calice est divisé en cinq découpures; la corolle campanulée, à cinq lobes; cinq étamines; point de filaments alternes, stériles; un ovaire oblong, contenant les embryons de plusieurs

semences. (Voyez APOCIN, n° 4, l'observation qui le termine.)

Cette plante croît parmi les buissons, à la Cochinchine. *h* (Descript. ex Lour.)

17. APOCIN de la jeunesse. *Apocynum juvenus*. Lour.

Apocynum caule fruticoso, volubili; foliis ovatis, pilosis; racemis dichotomis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 208.

Abrutisseau dont les tiges sont grimpantes, grêles, pileuses, rougeâtres, munies d'une racine entière, grosse, cylindrique, charnue. Les feuilles sont opposées, pileuses, ovales, très entières. Ses fleurs sont petites, d'un jaune-verdâtre, disposées en grappes dichotomes, axillaires. Leur calice se divise en cinq découpures oblongues, pileuses, étalées. La corolle est campanulée, à cinq découpures lancéolées, trois fois plus longues que le calice; dans l'intérieur, cinq corpuicules connivens, en forme de lobes; cinq filamens stériles, redressés; cinq anthères fécondes, en forme d'écaillés, adhérentes aux cinq corpuicules internes. L'ovaire est oblong, à deux lobes, surmonté d'un stigmate sessile, concave, bifide; deux follicules remplis de semences aigrettées.

Cette plante croît aux lieux agrestes, à la Cochinchine. *h* (Lour.) Les médecins du pays reconnoissent dans les racines de cette plante une telle force pour ranimer les esprits vitaux, qu'ils prétendent que son usage habituel peut rappeler dans les vieillards la vigueur de la jeunesse.

18. APOCIN à fleurs alternes. *Apocynum alterniflorum*. Lour.

Apocynum caule fruticoso, scandente; foliis ovatis, acuminatis, glabris; axillis alternis, umbelliferis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 209.

Ses tiges sont longues, grimpantes, rameuses, ligneuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, planes, ovales, glabres, acuminées, très entières. Les fleurs sont pâles, inodores, disposées en ombelles alternes & axillaires. Leur calice est à cinq folioles lancéolées, redressées; la corolle plus longue que le calice; cinq corpuicules profondément bifides, droits, oblongs, adhérents au tube de la corolle, & rapprochant les étamines du stigmate. Le fruit consiste en deux follicules polyspermes.

Cette plante croît en Chine, dans les îles peu éloignées de Canton. *h* (Lour.)

19. APOCIN d'Afrique. *Apocynum africanum*. Lour.

Apocynum caule fruticoso, suberecto; foliis ovato-oblongis, pedunculis suberectoribus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 209.

Cette plante paroît se rapprocher beaucoup de l'*apocynum triflorum* Linn. Ses tiges sont longues de huit pieds, redressées, ligneuses; les rameaux ascendants; les feuilles ovales-oblongues, très entières, petites, glabres, épaisses; les fleurs pâles, axillaires, au nombre de trois environ sur le même pédoncule. Le calice est à cinq divisions droites, aigues; la corolle à cinq découpures lancéolées, torces, réfléchies; cinq corpuicules subulés, alternant avec cinq glandes colorées; cinq étamines; un style subulé, de la longueur des étamines, termine par un stigmate bifide, aigu; deux follicules coniques, contenant des semences aigrettées.

Cette plante croît sur les côtes de l'Afrique orientale, dans les plaines sablonneuses. *h* (Lour.)

APOCYNUM. (Voyez APOCIN.)

APOGONES. C'est, dans l'œcénogamie de M. Palifot-Beauvois, la première section de la famille des mouffes, correspondant aux apéritomes de Hedwig & aux gymnospermatites de Bridel. Le caractère différentiel des mouffes de cette section est d'avoir l'orifice de l'urne nu, c'est à-dire, privé de dents & de cils.

Cette section contient sept genres, distingués ainsi qu'il suit :

* Urne pédonculée.

1. ANDRÉE. (Suppl.) *Andraea*. Urne divisée en quatre portions, comme dans les jongermanes.

2. TOURBETTE. (Suppl.) *Turbesia*. Opercule caduc.

3. PHASC. (Suppl.) *Phascum*. Opercule persistant.

* * Urne subulée.

4. TÉTRAPHIE. (Suppl.) *Tetraphis*. Opercule persistant, à quatre dents.

5. GYMNOTOME. (Suppl.) *Gymnostomum*. Opercule caduc; gaine dépourvue de péricet; fleurs terminales.

6. ANICTANGIE. (Suppl.) *Aniæangium*. Même caractère; fleurs latérales.

7. HEDWIGIE. (Suppl.) *Hedwigia*. Gaine renfermée dans un péricet.

« Les apogones, dit M. de Beauvois, établissent le passage qui lie les mouffes à la famille des hépariques, qui les précèdent dans l'ordre naturel. En effet, l'andrée porte une urne qui se divise en quatre portions égales, & qui est portée
sur

sur un pédoncule blanc, mou & membraneux, comme dans les jongnerans. Le même pédoncule se retrouve dans la tourbette; enfin, il devient plus solide dans le phacé, & se rapproche d'autant plus du tube de l'urne des autres mousses.

« Cette famille, extrêmement naturelle, n'avait pas été saisie par Linné. C'est à Hedw. que nous sommes redevables de la nouvelle distribution des mousses par la présence, par l'absence & par les différences du péristème ou orifice de l'urne. Cet habile observateur a le premier publié ses recherches. Depuis ce tems, l'étude des mousses est devenue plus simple & plus facile. Il resteroit très-peu de choses à désirer s'il n'étoit pas lui-même compliqué la méthode en y faisant entrer, comme caractères, ce qu'il appelle les fleurs mâles de ces plantes. » (Pal. bot. Beauv.)

APONOGET. *Aponogeton*. Ajoutez aux numéros :

1. *APONOGET* à épi simple. *Aponogeton monophyllum*. Linn. — Lam. Illustr. tab. 276. fig. 1. — Thunb. Diff. nov. Plant. Gen. 4. pag. 73. Icon.

Spathium chinense. Lout. Flor. cochin.

2. *Aponogeton* (linéaire), *spéc. simplicis, foliis linearibus*. Vahl, Symbol. 3. pag. 51.

La variété 2, dont les fleurs sont également disposées en un épi simple, terminal, diffère par ses feuilles linéaires & non ovales, en cœur.

3. *APONOGET* à double épi. *Aponogeton distachyon*. Linn. — Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 495. — Thunb. Diff. nov. Plant. Gen. 4. pag. 74. Ic. — Lam. Ill. Gen. tab. 276. fig. 2.

4. *APONOGET* crépu. *Aponogeton crispum*. Thunb.

Aponogeton spéc. simplicis; foliis ensiformibus, crispis. Thunb. Diff. nov. Plant. Gen. pag. 73.

Les racines sont fibreuses; les feuilles pétiolées, ensiformes, longues de six à sept pouces, glabres, crépues, acuminées à leur sommet; les pétioles un peu plus courts que les feuilles. Les hampes sont linéaires, droites, glabres, flexueuses, et à six fois plus longues que les feuilles, terminées par un épi simple, interrompu, long d'un pouce.

Cette plante croît dans les lieux inondés, à Ceilan. (Thunb.)

5. *APONOGET* à feuilles étroites. *Aponogeton angustifolium*. Ait.

Aponogeton spéc. bifid; foliis linearilanceolatis, Botanique. Supplément. Tome 1.

erectis; bracteis bipartitis, floribus hexandris. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 495.

Il paroît que cette espèce avoit été confondue par Linné fils avec l'*aponogeton distachyon*; elle en diffère par ses feuilles plus étroites, & étrecies en pointe à leurs deux extrémités. Les hampes sont d'un rouge-pâle; les fleurs peu nombreuses; les bractées blanchâtres, rouges à leur base, partagées, presque dans toute leur longueur, en deux découpures linéaires, oblongues. Les étamines sont au nombre de six, trois & quatre fois plus courtes que les bractées; l'ovaire surmonté de trois styles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Aiton.)

APOPHYSE. L'apophyse, en terme de botanique, dans la famille des mousses, est un renflement particulier que l'on remarque à la base de l'urne des polytries, des splachs, &c. L'apophyse est plus ou moins apparente, & de formes différentes dans les différents genres; tantôt elle représente une poire ou une bouteille, ou une ombelle; tantôt elle ressemble à un petit bourrelet qui auroit été interposé entre l'urne & son tube, avec lesquels néanmoins elle est continue. L'apophyse est sujette à varier dans quelques genres, non-seulement parmi les espèces entr'elles, mais même parmi les individus de la même espèce; ce qui ne permet pas toujours de faire usage de ce caractère pour les distinguer. Il ne faut cependant pas confondre l'apophyse, dans les mousses, avec une base charnue que l'on remarque intérieurement dans quelques espèces, par exemple, dans plusieurs *minium*, supportant immédiatement la capsule. Cette base charnue donne presque toujours à l'urne une forme de poire, mais ne produit jamais, comme l'apophyse, une saillie extérieure. Les botanistes n'ont pas, jusqu'à présent, fait usage de cette base charnue dans la distribution de leur méthode. « Je ne l'ai pas non plus employée, dit M. de Beauvois, parce que je n'ai pas eu occasion de l'observer sur un grand nombre de mousses qui manquent dans nos collections; mais je me propose d'en faire usage par la suite. En attendant, les botanistes ne doivent pas négliger cette observation, qui paroît devoir mériter leur attention. » (Pal. bot. Beauvois.)

APORETICA. (Voyez APORÉTIC.)

APORÉTIC terné. *Aporetica ternata*. Forst.

Aporetica foliis ternatis; racemis simplicifoliis, axillaribus. Forst. Cat. Gen. n°. 66, & Prodr. n°. 393.

Pomecia ternata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 398.

Cette plante, dont Forst. a fait un genre particulier.

ticulier, paroît, d'après ses caractères, devoir être réunie au genre *ufube* (*ornitrophe* Linn.). Willd. n'en a fait qu'un seul genre avec le *pomeia* du même auteur. Ce dernier a peut être plus de rapport avec les litchi (*euphoria*).

APPENDICE. On a donné ce nom à des prolongemens ou parties ajoutées à la base des feuilles & sur leur pétiole, comme dans l'oranger, tantôt au bas du calice ou dans l'intérieur de la corolle de plusieurs plantes, dans les familles des borraginées, des spoutilliers, des apocins, &c. Ces appendices de fleurs portent aussi le nom d'*écailles*; elles font sous celui de *nectaire* dans les descriptions faites par Linné.

APULEIA. Gærtn. La plante composée que Gærtner désigne sous ce nom, étoit d'abord une espèce du *gorteria* de Linné; puis ce dernier auteur l'a fait passer dans le genre *atractylis*. Le caractère très-différent des paillettes du réceptacle, qui, par leur réunion, forment des cavités alvéolaires, avoir déterminé M. de Jussieu à en faire un genre distinct, qu'il a nommé *agryphyllum* à cause de ses feuilles épineuses, comme celles de l'*ilex*. C'étoit auparavant le *crocodoloides* d'Adanson. Gærtner en a fait son *apuleia*; Schreber, son *berkheya*; Houttuyn, son *bustera*, & Vahl, son *rohrria*. Ces diverses dénominations, faites à peu près dans le même tems, prouvent au moins que ce genre doit être distingué, & que plusieurs auteurs en ont reconnu la nécessité. (Voyez ROHRRIA, Suppl.)

AQUART. *Aquaria*. Ce genre renferme maintenant deux espèces.

1. **AQUART** épineux. *Aquartia aculeata*. Jacq.

Aquaria (tomentosa), foliis densè tomentosis, repandis; aculeis sposis, retrorsum versis. Lam. III. n°. 1605, & tab. 82. fig. 1.

2. **AQUART** à petites feuilles. *Aquartia microphylla*. Lam.

Aquartia foliis minimis, integris, subnudis; aculeis subgeminatis, patentibus. Lam. III. n°. 1604. tab. 82. fig. 2.

Aquartia foliis ovatis, acuminatis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 622.

Cette espèce a le port du *solanum lycioides*. C'est un arbruste épineux, très-rameux, dont les rameaux alternes sont armés, à leur base ou dans l'aisselle des feuilles, d'aiguillons courts, droits, solitaires ou geminés, très-aigus. Les feuilles sont petites, alternes, presque sessiles, de la grandeur de celles du serpolet, presque glabres, verdâtres, ovales, très-entières, aiguës à leurs deux extrémités. Les pédoncules sont unifoires, placés un

peu au dessus de l'aisselle des feuilles, solitaires ou geminés, plus courts que les feuilles. Les divisions du calice sont un peu aiguës; les étamines au moins aussi longues que la corolle; les anthers sagittées.

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue par M. Jof. Martin. (V. f. in herb. Lam.)

AQUARTIA. (Voyez AQUART.)

AQUILARIA. (Voyez GARO.)

AQUILEGIA. (Voyez ANCOLIE.)

AQUILICE des Indes. *Aquilecia sambucina*. Linn. — Lam. III. tab. 139. — Cavan. Dissert. 7. pag. 372. tab. 218.

On a cru que cette plante devoit être la même que le *lica aquata* Linn.; ensuite on les a distingués, & Willdenc. les a réunies dans le même genre. (Voyez LEE, n°. 2.)

AQUILICIA. (Voyez AQUILICE.)

ARABETTE. *Arabis*. L'observation n'a fait que confirmer l'opinion de M. de Lamarck, qui a pensé que les *turtia* Linn. ne devoient former qu'un même genre avec celui-ci.

* Feuilles caulinaires amplexicaules.

1. **ARABETTE** des Alpes. *Arabis alpina*. Linn. — Lam. III. tab. 563. fig. 1.

Arabis incana. Moench. Method. pag. 257.

Cette plante varie beaucoup dans son port. Ses tiges sont tantôt droites & simples, tantôt étalées par touffes, rameuses à leur base; elle est ou pubescente ou presque glabre, selon les localités.

2. **ARABETTE** ochreuse. *Arabis ochroleuca*. Lam.

Arabis (umbrosa), siliquis compressis, latis, uno versu pendulis. Crantz, Austr. pag. 41.

Arabis rugosa. Moench. Method. pag. 259.

Arabis turrita. Linn. Spec. pag. 930. — Smith, Flor. britan. pag. 714.

Ses tiges sont un peu velues, presque simples; ses feuilles radicales d'un vert blanchâtre; les fleurs d'un blanc-jaunâtre; les siliques planes, linéaires, arquées, un peu épaissies sur les bords, droites ou un peu pendantes.

2.* **ARABETTE** pendante. *Arabis pendula*. Linn.

Arabis foliis amplexicaulibus; siliquis anticipitibus,

linearibus; calicibus fuscipilosis. Linn. Spec. p. 930.
— *Æd.* Flor. dan. tab. 62. — *Retz.* Ob. *serv.* 3.
pag. 36.

Arabis foliis amplexicaulibus, dentatis; caule erecto, simplicissimo; siliquis pendulis. Gmel. *Sibir.* 3. pag. 264. tab. 60.

Turritis latifolia, hirsuta, siliquis pendulis. Amm. *Ruth.* 58.

Cette espèce, qui ne paroît être qu'une variété de la précédente, en diffère par ses tiges hérissées de poils roides, épars; par ses feuilles rudes; celles des tiges moins amplexicaules. Les pédoncules sont p's longs; lâches, filiformes; les calices un peu hérissés à leur sommet; les fleurs blanches; les siliques pendantes, linéaires, comprimées en angles à leurs bords; elles sont renflées en bourrelet à leurs bords dans la précédente.

Cette plante croît en Danemarck & dans la Sibérie. ○ (*V. v.*)

3.* ARABETTE étalée. *Arabis patula.* Ehrh.

Arabis (turritis patula), foliis omnibus hirsutis; caulibus amplexicaulibus, apice dentatis; ramis patulis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 544.

Cette plante ressemble à l'ARABETTE velue, n°. 3, par les poils bifurqués qui la recouvrent, par ses feuilles en cœur à leur base, & par les calices glabres; mais elle en diffère par ses racines annuelles, par ses tiges moins élevées, plus flexueuses, & dont les rameaux sont étalés & non redressés, roides; par ses feuilles dentées seulement vers leur sommet.

Cette plante croît sur les collines, dans la Hongrie. ○ (*Descript.* ex Willd.)

3.* ARABETTE d'Allioni. *Arabis Allionii.* Decand.

Arabis foliis glabris, lucidis, radicatis, ovatis, subdentatis; caulibus lanceolatis, argutè dentatis, semi-amplexicaulibus; siliquis compressis, striatis. Decand. Synopf. pag. 375. n°. 4180.

Turritis striata. Allion. *Auct.* pedem. pag. 18. n°. 978.

Elle ressemble par son port à l'arabette velue; mais elle est glabre & lisse sur toute sa surface, & offre à peine quelques cils épars sur le bord des feuilles. Sa tige est simple, droite, haute d'un pied & plus; ses feuilles radicales ovales-oblongues, presque entières, rétrécies à leur base, celles de la tige droites, irrégulièrement dentées, lancéolées, à demi amplexicaules, point auriculées. Les fleurs sont blanches; les siliques grêles, planes, linéaires, droites, serrées contre les tiges, longues d'un pouce.

Cette plante croît dans le Piémont, dans les pâturages un peu humides. (*V. f.*)

4.* ARABETTE lisse. *Arabis levigata.*

Arabis (turritis levigata), foliis glabris; radicalibus obovatis, serratis; caulibus lanceolato-linearibus, integerrimis, amplexicaulibus. Willd. Spec. 3. pag. 543. — Mühlenb. in Litt.

Ses tiges sont très-simples, hautes d'un pied; les feuilles de ses racines glabres, pétiolées, ovales, obtusés, légèrement dentées en scie; celles des tiges glabres, sagittées, amplexicaules; les inférieures longues d'un pouce, lancéolées, obtusés, dentées en scie vers leur sommet; les autres longues d'un pied & demi, lancéolées, linéaires, très-entières; les fleurs un peu plus petites que celles de l'espèce suivante.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. ♂ (*Descript.* ex Willd.)

5. ARABETTE perfoliée. *Arabis perfoliata.* Lam. *III. Gen.* tab. 563. fig. 4. — *Gartn.* de Fruct. & Sem. tab. 143.

Turritis perfoliata. Neck. *Gallob.* pag. 283.

Erysimum glaberrimum. Crantz, *Crucif.* 117.

Dentaria glabra. Scop. *Carn.* n°. 839.

6. ARABETTE oreillée. *Arabis auriculata.* Lam.

Arabis (aspera), caule erecto, flexuoso, ramoso; foliis ovatis, asperis, semi-amplexicaulibus; siliquis erectis. Allion. *Auct.* Flor. pedem. pag. 18. n°. 973. tab. 2. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 542.

8. *Arabis (recta), caule recto; foliis reticulato-dentatis, fistulosis; siliquis erecto-patentibus.* Villars. *Dauph.* 3. pag. 319. tab. 37. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 536.

Les siliques sont écartées de la tige dans la variété 8; elles sont plus rapprochées, plus droites dans la variété 6.

6.* ARABETTE des rochers. *Arabis saxatilis.* Allion.

Arabis foliis amplexicaulibus, obtusis, scabris; siliquis erectis, strigatis, planis, subterragonis, striatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 542. — Decand. *Flor. franç.* 4. pag. 674.

Arabis (saxatilis), caule erecto; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, dentatis; siliquis longiusculis racem. Allion. *Flor.* pedem. n°. 973.

Arabis (nova), caule erecto; foliis amplexicaulibus, dentato-serratis, caulibus; siliquis erectis. Vill. *Dauph.* 3. pag. 319. tab. 37.

Elle se distingue par ses filiques, longues de trois pouces, du double plus longues que celles de l'espèce précédente, droites ou légèrement courbées, comprimées, un peu tétragones. Ses tiges sont presque hautes de deux pieds, droites, garnies de feuilles un peu rudes, amplexicaules, lancéolées, dentées, obtuses à leur sommet, prolongées à leur base en deux oreillettes aiguës. Les fleurs sont blanches.

Cette plante croît sur les rochers, dans les lieux stériles & pierreux du Piémont & du Dauphiné. ♂ (V. f.)

7. ARABETTE à feuilles de paquerette. *Arabis bellidifolia*. Linn. — Lam. Ill. tab. 563. fig. 2. — Jacq. Observ. 1. pag. 22. tab. 12. & Austr. 3. tab. 180 — Giseck. Icon. Fasc. 1. tab. 15.

Turris bellidifolia. Allion. Flor. ped. n°. 980. tab. 40. fig. 1.

7. * ARABETTE tude. *Arabis scabra*. Allion.

Arabis (nutans), foliis subdentatis, radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis & caule folioso; racemo fradifero, nutante; filiquis secundis Willden. Spec. 3. pag. 557. — Moench. Dispos. Method. 258. — Decand. Flor. franc. 4. p. 677.

Arabis (pumila), foliis radicalibus obovatis, subdentatis, obtusis, utrinque scabris; caulinis sessilibus, oblongis, subhirsutis; racemo subnutante. Jacq. Collect. 2. pag. 59, & Austr. tab. 181.

Arabis scabra. Allion. Flor. pedem. n°. 974.

Leucolum foliis radicalibus subrotundis, scabris, dentatis; caulinis amplexicaulibus, hirsutis. Haller. Helv. n°. 447.

Cardamine pumila, bellidis folio, alpina. Sc. guier, Plant. veron. 387.

Presque toujours glabre quand elle est cultivée, cette plante est, dans son sol natal, hétéroclite de poids égaux, simples ou bifurqués, principalement sur ses feuilles radicales & inférieures; ce qui la fait distinguer de la précédente, de laquelle elle diffère encore par ses tiges moins élevées, par ses filiques presque unilatérales, roides, droites, linéaires, comprimées. Les grappes de fleurs sont inclinées, quelquefois droites; les feuilles des tiges peu nombreuses, presque glabres, oblongues, amplexicaules; les radicales en ovale renversé, légèrement dentées, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît dans les lieux pierreux, sur les rochers, en Suisse, en Autriche & dans le Piémont. ♀

7. ** ARABETTE luisante. *Arabis lucida*. Linn. f.

Arabis foliis amplexicaulibus, lucidis. Linn. f. Suppl. 256.

Elle a presque autant de rapport avec les crefons (*cardamine*) qu'avec les arabettes. Ses tiges sont hautes à peine de trois à quatre pouces, lisses, cylindriques, très-simples; les feuilles amplexicaules, luisantes, fermes, très-entières, oblongues, un peu en cœur; les radicales pétioles, obtuses, en ovale renversé. Les fleurs, d'abord en corymbe, forment une grappe terminale à mesure qu'elles se développent. Leur calice est glabre, un peu baillant; la corolle blanche; les pétales linéaires, un peu redressés, du double plus longs que le calice; les éamines de la longueur des pétales; le stigmate obtus.

Cette plante croît dans la Hongrie. ♀ (*Desferp. ex Linn. f.*)

* * Feuilles caulinaires nulles ou amplexicaules.

10. ARABETTE à feuilles de serpolet. *Arabis serpyllifolia*. Lam.

Arabis (serpyllifolia), foliis omnibus ellipticis, integerrimis; caule flexuoso. Vill. Dauph. 3. p. 318. tab. 37.

10 * ARABETTE blene. *Arabis carulea*. Jacq.

Arabis glabra, foliis obovatis, apice dentatis; caule subdiphyllis, racemo cernuo. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 557. — Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 56.

Turris carulea. Allion. Flor. pedem. n°. 981. tab. 40. fig. 2.

Leucolum foliis oblongis, dentatis; spica nutante. Hall. Helv. n°. 445.

Tout la plante est glabre, très-variable dans sa grandeur. Ses tiges, sur le sommet des hautes Alpes, ont à peine deux pouces de long; elles en ont cinq à six sur les montagnes inférieures. Ses racines ligneuses, cylindriques, allongées, se divisent vers leur collet en fourches courtes & ascendantes. Les feuilles radicales sont ovales, entières ou dentées vers leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base. Celles de la tige, au nombre de deux ou trois, sont filiformes, elliptiques ou ovales, oblongues, très-entières. Les fleurs sont d'un bleu-pâle, pédicellées, réunies en une grappe terminale, peu garnie, ordinairement inclinée; il leur succède des filiques grêles, longues de six à sept lignes & plus.

Cette plante croît sur les Alpes, en Suisse & dans le Piémont. ♀

11. * ARABETTE de Crantz. *Arabis crantziana*. Ehrh.

Arabis foliis lanceolatis, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus; caule decumbente, glabro; petalis calice triplo longioribus. Willden. Spec. Plant. 4.

pag. 337. — Ehrh. Herb. 78. — Hoffm. Germ. 139.

Arabis foliis radicalibus petiolatis, lanceolatis, parim integris, parim dentatis. Crantz, Austr. pag. 39. tab. 3. fig. 2.

Elle diffère de l'*arabis thaliana* par ses tiges glabres, plus roides, couchées ou ascendantes; par ses fleurs beaucoup plus grandes. Ses feuilles radicales sont rudes, ovales, un peu arrondies, longuement pétiolées, entières ou dentées, velues, ciliées; les caulinaires sessiles, lancéolées, presque glabres; les fleurs d'un blanc de neige; les petites ondulées; les siliques arquées.

Cette plante croît sur les rochers, en Autriche.

11. ARABETTE hérissée. *Arabis hirta*. Lam.

Arabis (Richt.) *foliis rigida, dentatis, obtusa, hispida; radicalibus sublyratis; pilis saepe bifurcis, caulis hispida, petalis erectis.* Decand. Synopf. pag. 375. n°. 4183. — Hudf. Angl. 2192. — Vellay, Plant. marit. Icon. t. b. 5.

Arabis hispida. Air. Hort. Kew. 2. pag. 400.

Turritis Royi. Villars, Dauph. 3. pag. 316. tab. 38.

Hesperis. Rai, Extr. pag. 296.

p. Turritis (ciliata), *foliis glabris, caulinis sessilibus; basi dentatis; basi & apice pilis furcatis, ciliatis.* Willden. Spec. 3. pag. 544. — Schleich. Catal. 59.

On distingue cette espèce à la rigidité de toutes ses parties; aux poils roides, épars, simples ou bifurqués qui naissent sur la surface & sur le bord des feuilles dans la variété *a*, mais qui ne se trouvent que comme des cils sur le bord des feuilles dans la variété *p*.

12.* ARABETTE pubescente. *Arabis pubescens*.

Arabis (Turritis pubescens), *caule simpliciter, erecto; foliis dentatis, inferioribus spatulato-lanceolatis; superioribus lanceolatis, sessilibus; siliquis strigosis, pubescentibus.* Desf. Flor. atlant. 2. pag. 92. tab. 163. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 544.

Ses tiges sont droites, simples, pubescentes, légèrement fléchies, hautes de deux à trois pieds & plus; les feuilles pubescentes & dentées; les radicales spatulées, obtuses; celles des tiges sessiles, éparées, redressées; les supérieures lancéolées. Les fleurs sont blanches, petites; les pétales une fois plus longs que le calice; il leur succède des siliques étroites, linéaires, comprimées, presque sessiles, pubescentes, longues d'environ deux pouces, rapprochées des riges.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines

sur les montagnes des environs d'Alger. (*V. f. in herb. Desfont.*)

13.* ARABETTE de Virginie. *Arabis virginica*.

Arabis (cardamine virginica), *foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, basi unidentatis.* Linn. Spec. 916. — Gronov. Virg. 99. — Petiv. Gazoph. tab. 105. fig. 18.

Alyssum foliis radicalibus pinnatis, in orbem positis; caulibus lanceolatis, filiculis compressis. Gronov. Virg. 1. pag. 170.

Nasturtium bursa pastoris folio, virginianum, flore albo, siliquis compressis. Pluken. Almag. pag. 251. tab. 101. fig. 4.

Cardamine (virginica), *glabra, erecta, foliis omnibus pinnatis; pinnulis minutis, ovalibus linearibus, subauriculatis; siliquis tenuibus, longis, strigosis erectis.* Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 29.

Autant & plus rapprochée des arabettes que des cressons, cette plante, d'après M. de Lamarck, doit trouver sa place ici. Ses tiges sont droites, glabres, presque simples; toutes les feuilles ailées, médiocrement pétiolées, glabres à leurs deux faces; les folioles petites, ovales ou linéaires, entières, légèrement ondulées à leurs bords, auriculées ou munies d'une dent à leur base; la terminale ordinairement à trois lobes obtus; les feuilles radicales plus grandes, étalées en rosette; celles des tiges alternes, peu nombreuses, distantes. Les fleurs sont petites, pétiellées, réunies en une grappe lâche, terminale; il leur succède des siliques grêles, allongées, roides, droites, comprimées.

Cette plante croît dans la Virginie.

16. ARABETTE pinnatifide. *Arabis pinnatifida*. Lam. Ill. tab. 563. fig. 3. (*Excl. arabis Halleri*.)

Sisymbrium dentatum. Allion. Flor. pedem. 2°. 1001. tab. 57. fig. 3.

Sisymbrium burffolium. Vill. Dauph. 3. pag. 345. Non Linn.

Cardamine runcinata. Pourq. A&T. Tolos. 3. pag. 310.

16.* ARABETTE de Haller. *Arabis Halleri*. Linn.

Arabis foliis subglabris, caulinis sublyratis; ramis lanceolatis, incis, sessilibus; caule hirta, debili, ramosa; siliquis paucis. Decand. Synopf. pag. 376. n°. 4188. — Linn. Spec. pag. 929. — Plant. rar. Hung. 2. pag. 126. tab. 120.

Cardamine stolonifera. Scopol. Carn. n°. 818. tab. 39.

Sisymbrium foliis imis barbarea; superioribus

integræ, dentatis, Haller. Opusc. pag. 101. tab. 1. fig. 1.

Nasturtium barbarea foliis. C. Bauh. Pin. 105, & Prodr. 46.

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds & plus, sur une tige droite, foible, grêle, rameuse, cylindrique, garnie de poils mous, blanchâtres, simples ou bifurqués, moins nombreux à la base des feuilles & des calices. Ses racines produisent des rejets grêles & ascendants. Les feuilles radicales, assez semblables à celles de l'*erysimum barbarea*, font pétiolées, découpées en lyre, terminées par un grand lobe anguleux; celles des tiges foibles, sessiles, lancéolées, incisées ou anguleuses. Les fleurs sont terminales, disposées en grappes, portées sur de longs pédicelles. Les pétales sont blancs, étroits; les capules droites, grêles, très-écartées de la tige.

Cette plante croît en Suisse, dans le Piémont, aux lieux humides des montagnes. ♂ (V. f.)

16. * ARABETTE de la Carinthie. *Arabis ovirens*. Jacq.

Arabis foliis radicalibus orbiculatis; caulinis subovatis, petiolatis, repando-dentatis; radice repente. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 125. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 540.

Arabis foliis simplicibus, integræ, repando-denticulatis, petiolatis; caulinis oblongis, subovatis; radicalibus orbiculatis. Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 196.

Elle se rapproche beaucoup de l'*arabis Halleri*; mais ses feuilles radicales sont orbiculaires & non découpées en lyre, entières, pétiolées; celles des tiges oblongues ou en ovale renversé, pétiolées, sinuées, légèrement dentées à leur contour; les racines rampantes; les fleurs une fois plus grandes, couleur de rose.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Carinthie. ♀ (Jacq. & Willd.)

18. ARABETTE des sables. *Arabis arenosa*. Lam.

J'ai appelé cette plante parmi les sisymbres, n°. 23. l'*arabis multicaulis*, Bell. ex Bulb. & uniformis, n'est qu'une variété de cette espèce, à tiges plus nombreuses, & dont toutes les feuilles sont en lyre.

* Espèces moins connues ou douteuses.

* ARABETTE à feuilles en lyre. *Arabis lyrata*. Linn.

Arabis foliis glabris, radicalibus lyratis, caulinis linearibus. Linn. Spec. Plant. 929. — Gronov. Virg. 99. — Mill. Dict. n°. 5.

Cheiranthus caule filiformi, levi; foliis lanceolatis, infimis incisis. Gronov. Virg. 1. pag. 76.

Cette plante a le port de l'*arabis thaliana*; mais les feuilles radicales sont découpées en lyre, parfaitement glabres; les feuilles des tiges linéaires; les fleurs plus grandes. Elle croît au Canada. ○

* ARABETTE en faucille. *Arabis falcata*. Mich.

Arabis foliis lanceolatis, utrinque angustatis, obsolete subdentatis, sessilibus; filiquis pendulis, ascapitibus, falcatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 31.

Ses feuilles sont sessiles, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, à peine sensiblement dentées; les filiques pendantes, à deux angles opposés, courbées en faucille.

Cette plante croît au Canada, dans la Nouvelle-Angleterre, la Virginie, sur les rochers. (Mich.)

* ARABETTE tubéreuse. *Arabis tuberosa*. Pers.

Arabis caule simplici, foliis lato-lanceolatis, dentatis, inferioribus subpetiolatis; radice tuberosa, fibrosa. Pers. Synopf. Plant. 2. pag. 24. — Mühl.

Ses racines sont tubéreuses, pourvues de fibres; ses tiges simples, garnies de feuilles élargies, lancéolées, dentées en scie à leur contour, obtuses à leur sommet; les inférieures médiocrement pétiolées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

* ARABETTE rhomboïdale. *Arabis rhomboidea*. Pers.

Arabis foliis glabris, rhomboideis, infimis longè petiolatis; radice tuberosa. Pers. Synopf. Plant. 2. pag. 104. — Turpin.

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapport avec la précédente. Ses feuilles sont glabres, de forme rhomboïdale; les inférieures longuement pétiolées; les fleurs assez grandes, disposées en corymbe; les racines tubéreuses. Elle croît aux lieux humides, dans l'Amérique septentrionale.

* ARABETTE traçante. *Arabis procurrens*.

Arabis foliis ovatis, integerrimis, ciliatis; pilis binatis, divaricatis. Plant. rar. Hung. 2. pag. 154. tab. 144.

Il n'y a que très-peu de différence entre cette espèce & l'*arabis Halleri*. Toutes deux produisent de leurs racines des rejets traçans & redressés. Dans celle-ci les feuilles sont ovales, entières & non découpées en lyre, ciliées à leurs bords par des poils bifurqués presque jusqu'à leur base.

divergens. Elle croît dans la Hongrie, sur les rochers calcaires.

ARABIS. (Voyez ARABETTE.)

ARACHIDE. *Arachis*. Lam. Ill. Gen. tab. 615. M. Poiteau a observé, relativement à cette plante, que ce que l'on prenoit pour le pédoncule du fruit étoit la partie tubulée du calice. Dans le fond de ce tube est un ovaire pédicelle, qui n'est point enveloppé par la gaine des épermines. Le pédicelle s'allonge à mesure que le fruit approche de la maturité.

Ce genre n'a pas seulement intéressé les naturalistes par la singularité de sa fructification; il s'est encore attiré l'attention des cultivateurs par les propriétés économiques & intéressantes de ses fruits. M. Petit-Radel, qui s'est occupé d'une manière particulière de la culture de cette plante, dans la campagne de Rome, nous fournit d'excellentes observations sur les moyens propres à en assurer le succès.

« Cette plante, dit-il, exige un terrain sablonneux, qui le baillé aient pénétrer par les pédoncules des fruits; elle veut, comme toutes les légumineuses, assez d'humidité pendant son accroissement; mais elle exige surtout beaucoup de soleil pour la maturité des graines. L'exposition veut être à l'abri du vent imprévu des vents froids. Il ne faut pas la semer dans un terrain engraissé de fumier frais; les insectes dévoreroient les graines avant leur germination. Un petit ver, de couleur brune, qui à Rome on appelle d'un mot qui correspond dans notre langue à celui de *gimbellette*, en est très-triad. Elle a produit cent pour un sur le territoire de Rome, & peut produire jusqu'à deux cents dans un terrain moins argileux & d'une chaleur égale. On la dit originaire de l'Amérique. Rumphé en donne la description dans son *Herbier d'Amboine*; il représente ses rameaux couchés à terre. Elle se la différence du climat qui cause cette direction, car à Rome elle vient communément dans une direction verticale? Elle commence à fleurir du pied: alors les pédoncules se fient en terre sans le recourber. Ces pédoncules ne graine point hors d'elle; ils s'allongent continuellement pour la chercher. C'est sur cette tendance naturelle qu'est établie la règle qui prescrit de semer l'*arachis* dans de petits sillons. On la rechauffe pour rapprocher la terre des pédoncules de la floraison supérieure de la plante, afin de hâter le moment de la formation des graines. Cette opération se fait en tirant un sillon sur l'ados formé par le fruit précédent où l'on a semé. On ne peut pas fixer généralement l'époque précise de cette façon; elle dépend de celle où les pédoncules du premier & du second rang sont déjà fichés en terre, & de celle où les pédoncules supérieurs sont déjà inclinés pour la recherche. On pourroit croire qu'il est utile de renouveler cette façon

quand les fleurs du sommet sont fécondées; mais dans nos climats, cette façon seroit superflue; car alors la saison est trop avancée pour donner espérance de voir les derniers fruits parvenir à leur maturité.

« Par la même raison on s'est trompé en assignant le mois d'octobre pour la récolte: cela peut être vrai pour l'Espagne; mais cela seroit faux pour nos départements méridionaux, qui sont les seuls où l'on peut en essayer la culture avec quelque espoir de succès. Nous avons observé qu'à l'époque des plus grandes chaleurs, la floraison de cette plante est entièrement suspendue. Ce n'est guère qu'après la canicule qu'elle reconnoît à fleurir; mais quoiqu'alors les gouffes parviennent à quelque grosseur, elles ne graine pas. Ainsi, même sous le climat de Rome, nous nous sommes contentés des fruits produits par les premières fleurs: d'où nous pourrions conclure que le degré de chaleur qui cause une stase dans la floraison, est celui qui communique à la terre le degré convenable à la maturité des graines dont elle est dépositaire, & cette chaleur n'est plus assez forte dans l'arrière-saison pour aider au développement des graines tardives: il faut donc les récolter après les grandes chaleurs, avant les pluies d'automne. Pour cela faire, on donne un coup de bêche à quelque distance de la plante pour la soulever, afin que les graines ne s'arrachent pas. On les laisse sécher quelque temps sur la plante, soit pour qu'elles se détachent facilement, soit pour sécher la plante elle-même, qui fournit un très-bon fourrage pour les bestiaux; ce qui est encore un motif de la récolter dans le temps où la chaleur du soleil a conservé quelque activité.

« Il faut la semer quand le soleil a acquis de la force, & résister à l'envie de le faire aux premiers beaux temps; car alors la germination lente & les insectes la dévorent ou bien elle moisit sous terre. L'époque la plus convenable est du milieu de mai jusqu'à la fin de juin. Les graines doivent être placées à la distance d'environ un pied & demi, & deux à deux, afin que l'une puisse suppléer au défaut de l'autre.

« On sépare les graines des plantes en les battant avec des fléaux légers: on les conserve dans un lieu sec jusqu'au moment où l'on veut en extraire l'huile. Il faut choisir un temps chaud pour cette opération. Les graines se séparent des gouffes en les battant, ou mieux en les faisant passer entre deux cylindres cannelés dans une proportion réglée sur la grosseur de la graine. L'extraction de l'huile est la même que pour celle des amandes douces; elle se fait d'abord sous un cône roulant, puis sous un pressoir, dans des sacs. L'*arachis* donne la moitié de son poids d'huile si on la fait torréfier avant de la presser. Cette huile est bonne à tous les usages auxquels sont propres celles d'olives & d'amandes

douces; elle est excellente à manger, & surtout à la cuisine, car elle se racine difficilement. On fait d'excellentes patelines avec ces graines torréfiées: mêlées dans la proportion de deux tiers sur un de cacao, elles fournissent un chocolat très-bon, qui exige un quart moins de sucre que le chocolat ordinaire.

« Une notice lue à l'Académie de Vaucluse par M. Guérin, & publiée à Avignon en 1803, donne le détail de quelques expériences, parmi lesquelles on doit remarquer les résultats suivans: onze onces trois gros de pâte d'arachis ont produit quatre onces quatre gros d'huile. Deux lampes d'une jauge parfaitement égale ont été remplies, l'une d'huile d'olives, l'autre d'huile d'arachis. La première a duré une heure huit minutes quinze secondes; la seconde, une heure quinze minutes cinq secondes. En mettant l'huile d'olives dans la lampe qui avoit servi à l'huile d'arachis, & l'huile d'arachis dans celle qui avoit servi à l'huile d'olives, laissant les mêmes mèches dans chaque lampe, la même expérience ainsi répétée a donné le résultat suivant: l'huile d'arachis a duré une heure huit minutes quinze secondes; l'huile d'olives a duré une heure huit minutes quinze secondes. Ainsi l'avantage en faveur de l'huile d'arachis est de sept minutes sur une heure environ. La lumière qu'elle produit, est d'ailleurs très-claire, & ne donne point de fumée.

« On conçoit combien la culture de l'arachis mérite d'être encouragée dans nos climats méridionaux, par la double propriété qu'elle a de suppléer à la récolte des amandes & des olives, qui est, comme on le fait, très-casuelle, & de fournir de plus un très-bon furrage, qui est naturellement rare dans les climats chauds qu'elle exige. » (*D. d. des Sciences naturelles.*)

ARACHIS. (*Voyez* ARACHIDE.)

ARALIA. (*Voyez* ARALIE.)

ARALIACÉES. ARALIES. Famille de plantes dicotylédones, polypétales, à étamines inférieures. « Toutes celles qui sont ainsi organisées, dit M. de Jussieu, pourroient former un seul assemblage, sous le nom de *plantes ombellifères*, dont les fleurs sont toujours disposées en ombelle, portées sur des pédoncules propres, partant du même point de la tige ou d'un pédoncule commun. Toutes ont de plus un calice d'une seule pièce, adhérent à l'ovaire; cinq ou six pétales, & un nombre égal ou double d'étamines; un ovaire inférieur adhérent au calice, surmonté de deux ou plusieurs styles, & couronné d'un corps glanduleux qui les entoure, & porte dans son contour les étamines & les pétales. Le fruit est composé de semences en nombre égal à celui des styles; elles sont nues, & seulement au nombre de deux, ap-

pliquées l'une contre l'autre dans le plus grand nombre des genres de cette série, qui sont les ombellifères proprement dites.

« Quelques genres, réunis sous le nom d'*araliacées*, se distinguent des précédens par le fruit, qui est une baie ou une capsule à plusieurs loges monospermes, dont le nombre est toujours déterminé par celui des styles; tels sont les suivans:

Les gallones.	<i>Gastonia.</i>
Les polyscias.	<i>Polyscia.</i>
Les scheffières.	<i>Scheffiera.</i>
* Les lierres.	<i>Hedera.</i>
Les aralies.	<i>Aralia.</i>
Les sciadaphylles.	<i>Sciadaphyllum.</i>
Les cufsones.	<i>Cussonia.</i>
Les gingengs.	<i>Panax.</i>

« Ces genres ont de plus, comme toutes les vraies ombellifères, l'embryon très-petit, cylindrique, placé dans une petite cavité oblongue, au sommet d'un périsperme cartilagineux ou presque ligneux.

« Les feuilles sont alternes, engainées à leur base; les fleurs disposées dans les unes en ombelle simple ou ombellule; dans les autres, en ombelle composée, c'est-à-dire, dans laquelle les pédoncules communs de plusieurs ombellules sont eux-mêmes réunis sur un point commun de la tige. Ces ombelles & ombellules sont nues dans quelques araliacées; dans plusieurs, elles sont entourées à leur base de plusieurs feuilles verticillées ou écailles, dont l'ensemble porte le nom d' *involucre*. La plupart de ces plantes sont des arbrisseaux ou de petits arbres. Quelques-unes sont herbacées. » (*Juss.*)

Je crois pouvoir, sans inconvénient, ajouter les lierres à cette famille, ceux-ci ne différant essentiellement des aralies que par le nombre des styles, & s'en rapprochant tellement par leur port & les autres caractères de la fructification, qu'on peut aisément confondre quelques espèces de ces deux genres, surtout lorsque les styles échappent à l'observation.

ARALIE. *Aralia*. Ce genre, de la famille des araliacées, contient des plantes d'un port très-différent, les unes à tige d'arbrisseau, les autres herbacées. Les feuilles sont simples ou lobées, ou digitées, ailées & même deux fois ailées; mais toutes ces plantes se rapprochent par des fleurs très-nombreuses, petites, sans éclat, disposées en petites ombelles simples, réunies ordinairement sur une grappe touffue, allongée, simple ou paniculée. Leurs propriétés médicales les rendent intéressantes dans les pays où elles croissent. La plupart sont d'excellens sudorifiques. Aux espèces décrites par M. de Lamarck, nous ajouterons les suivantes, en établissant des sous-divisions d'après la forme des feuilles.

* Feuilles

* Feuilles une ou plusieurs fois ailées.

ARALIE hispide. *Aralia hispida*. Vent.

Aralia caule suffruticoso petiolisque hispidis; foliis decompositis. Vent. Hort. Cels. pag. 41. tab. 41.

Aralia (hispida), *humilis*, imd *parte frutescens*; *caulibus foliisque scissis hispidis; foliis d'apleato-pinnatis; foliolis inciso-ferratis; umbellulis paucifloris, longiusculis pedunculatis.* Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 185.

Ses tiges sont simples, hautes d'environ un pied, nues & ligneuses à leur partie inférieure, creusées d'impressions annuelles & circulaires très-rapprochées; striées, hérissées de poils roides, & garnies à leur partie supérieure de feuilles alternes, presque verticillées, deux fois ailées; les pinnules terminées; les folioles ovales, sessiles, opposées, aiguës, dentées en scie, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, parsemées de quelques poils roides, ainsi que les pétioles, accompagnés à leur base de stipules lancéolées, aiguës.

De longs pédoncules unilatéraux, axillaires & terminaux supportent une ou quelquefois plusieurs petites ombelles simples, hémisphériques, composées de seize à vingt rayons filiformes, dont l'involucre est formé par autant de bractées lancéolées, très-aiguës, ciliées, de couleur purpurine. Le calice est à cinq dents très-courtes; les pétales insérés sur un disque glanduleux; l'ovaire adhérent au calice, surmonté de cinq styles. Les baies sont brunes, globuleuses, de la grosseur d'un petit pois, à cinq sillons, à cinq loges; autant de semences d'un brun-clair, ovales-arrondies, attachées par un tubercule au sommet de chaque loge.

Cette plante croît parmi les rochers, sur les hautes montagnes, au Canada. *h* (*V. f.*) On emploie ses racines, dans le Canada, comme sudorifiques.

ARALIE à tige basse. *Aralia humilis*. Cavan.

Aralia caule annuo, foliis impari-pinnatis; foliolis cordatis, serratis, acutis; floribus umbellatis. Cavan. Icon. Rat. 4. pag. 7. tab. 313.

Cette espèce diffère si peu de l'*aralia racemosa*, qu'elle paroît n'en être qu'une variété ou peut-être la même, mais que Cavanilles a jugée différente, d'après la figure de l'*aralia racemosa* de Cornuti, qui représente les fleurs ramassées en petites grappes & non en ombellules. Ou cette figure n'est pas conforme à la nature, ou, dans le cas contraire, elle ne seroit pas celle d'un *aralia*, dont les fleurs sont essentiellement en ombelle. La figure de Morison vaut beaucoup mieux. On doit retrancher celle que Linné cite de Barrelier. Ses tiges sont moins élevées, ayant au plus un pied & demi de

Botanique. Supplément. Tome 1.

long, recouvertes d'une écorce verte ou rougeâtre, parsemée de tubercules d'un brun rougeâtre. Les fleurs naissent par petites ombelles plus distantes, & forment par leur ensemble, sur le pédoncule commun, une sorte de grappe très-lâche.

Cette plante croît dans la Nouvelle Espagne. *h* On la cultive au Jardin de Madrid; elle fleurit au mois d'octobre.

Les espèces suivantes rentrent dans cette division, savoir :

Aralia spinosa, n°. 1.

Aralia chinensis, n°. 2.

Aralia racemosa, n°. 3.

** Feuilles digitées.

ARALIE sciadophylle. *Aralia sciadophyllum*. Swartz.

Aralia foliis digitatis, foliolis numerosissimis, inaequalibus; racemo longissimo, simplici, nutante; pedunculis umbellatis. Willd. Spec. 1. pag. 1519. — Swartz, Prodr. 55.

Hedera (sciadophyllum), *foliis digitato-umbellatis, aliis minoribus centralibus; racemis compositis, longissimis, nutantibus.* Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 519.

Sciadophyllum foliis majoribus, oblongis; petiolis communibus umbellatis, affixis; floribus spicatis. Brown, Jam. 195. tab. 19. fig. 1.

Arbuste de huit à dix pieds, dont les rameaux, lisses, étalés, sont garnis, vers leur sommet, de feuilles éparfes, pétioles, digitées, divisées en huit ou dix folioles pédicellées, ovales-lancéolées, glabres, entières, acuminées; les extérieures trois fois plus petites. Les fleurs sont réunies en grappes terminales, solitaires, axillaires, longues de plus d'un pied, munies à leur base d'une gaine brune, ovale, obtuse; composées d'ombellules rapprochées, très-nombreuses, contenant six à dix fleurs; les folioles des involucre en forme d'écaillés blanchâtres, petites, ovales, aiguës. Le calice est divisé en cinq petites dents; la corolle d'un blanc-pâle ou verdâtre; cinq filaments très-courts; les anthères oblongues, purpurines; cinq styles subulés, rapprochés. Le fruit consiste en une baie oblongue, arrondie, obscurément pentagone, à cinq loges, couronnée par le calice; les semences brunes, oblongues, comprimées, solitaires.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Jamaïque. *h* (Swartz.)

ARALIE à cinq folioles. *Aralia pentaphylla*. Thunb.

Aralia arborea, aculeata, foliis quinatis. Thunb. Flor. jap. 128.

G g g

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux glabres, flexueux, cylindriques, de couleur cendrée, armés, ainsi que les tiges, d'aiguillons solitaires, axillaires. Les feuilles sortent trois ou quatre & plus du même bourgeon; elles sont pétiolées, composées de cinq folioles pédicellées, glabres, ovales, aiguës, dentées vers leur sommet, entières & rétrécies à leur base; les inférieures plus petites, celle du milieu plus grande, longue d'un pouce. Les fleurs forment d'entre les bourgeons, disposées en une ombelle simple, pédonculée; le pédoncule une fois plus court que le pétiole; les pédicelles capillaires, étalés; les étamines plus longues que la corolle.

Cette plante croît au Japon. *Th (Descript. ex Thunb.)*

ARALIE à trois folioles. *Aralia triphylla*.

Aralia triphylla, glabra, foliis trifoliatis; foliis subsessilibus, lanceolatis, serratis; umbellâ minima, centrali. (N.)

Ponax (trifolium), pusillum, radice subrotundobulbosa; foliis ternis, foliolis subsessilibus. ? Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 217.

C'est une petite plante herbacée, que je soupçonne être la même que le *ponax trifolium* de Michaux. Ses tiges sont simples, très-grêles, hautes à peine de cinq à six pouces, nues, glabres, terminées par trois à quatre feuilles disposées comme une ombelle, dont les pétioles, à peine de la longueur des feuilles, se divisent à leur sommet en trois folioles à peine pédicellées, lancéolées, presque obtuses, vertes, glabres, longues d'un pouce & plus, larges de quatre lignes, inégalement dentées en scie à leurs bords. Du centre des pétioles s'élève un pédoncule beaucoup plus court que les feuilles, soutenant une petite ombelle solitaire, presque en tête, composée de fleurs blanchâtres; les pédicelles ferrés & très-courts; les folioles de l'involucre filiformes, aiguës, au moins aussi longues que les pédicelles. Je n'ai pu observer ni le nombre des styles ni les fruits. Dans la plante de Michaux, les racines sont bulbeuses, & les folioles quelquefois au nombre de cinq.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. *○ ? (V. f. in herb. Desfont.)*

On doit faire entrer dans cette division l'*oralia nudicaulis*, n°. 4, & l'*oralia pennata*, n°. 5.

*** Feuilles lobées.

ARALIE du Japon. *Aralia japonica*. Thunb.

Aralia frutescens, foliis lobatis. Thunb. Flor. jap. 128. — Willd. Spec. 1. pag. 1519.

Ses tiges sont droites, ligneuses, sans épines, hautes de cinq à six pieds, garnies, vers leur sommet, de feuilles nombreuses, alternes, pétiolées, à sept ou cinq lobes arrondis, incisés, aiguës, dentés vers leur sommet, vertes en dessus, plus pâles en dessous; les pétioles épais, charnus, amplexicaules, de la longueur des feuilles. Les fleurs forment, par leur ensemble, une panicule composée de petites ombellules simples; les pédoncules accompagnés à leur base de bractées ovales, aiguës, concaves, pubescentes, caduques, longues d'un demi-pouce à un pouce. La corolle est blanche, à cinq pétales égaux, ovales, aigus, réfléchis, caducs, longs d'une ligne; les étamines plus longues que la corolle; cinq styles filiformes, persistants, plus courts que les étamines; une baie presque tétragone, très-obtuse, striée, à cinq loges, contenant des semences fort petites.

Cette plante croît au Japon. *Th (Descript. ex Thunb.)*

*** Feuilles simples, entières.

ARALIE en arbre. *Aralia arborea*. Linn.

Aralia caule arborico, foliis simplicibus, umbella univervifolia radiis uniglandulosis. Linn. Amœn. Acad. 5. pag. 369. — Jacq. Amer. 89. — Swartz. Ouf. 119. — Jacq. Hort. Schoenbr. t. pag. 26. tab. 51.

Aralia arborea, foliis nitidis, oblongo-ovatis; umbellâ laxâ, radiis singulis glandulâ nototis. Brown, Jam. 189.

Hedera arbor, folio hastato. Plum. Spec. 18, & Icon. 148.

Arbrisseau dont les tiges arborescentes se divisent en rameaux glabres, alternes, garnis, surtout vers leur sommet, de feuilles alternes, éparées, rapprochées, pétiolées, amples, ovales, oblongues, très-entières, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, membranueuses, nerveuses, rétrécies à leur base, longues de six à huit pouces & plus, sur quatre environ de large. Les fleurs sont disposées en une panicule, dont les ramifications se divisent & supportent chacune une ombelle très-ouverte; les pédoncules chargés d'une glande; l'involucre composé de bractées un peu scarieuses & concaves, ovales-lancéolées, aiguës, beaucoup plus courtes que le pédicelle. Le style est divisé en cinq parties. Le fruit consiste en une baie à six côtes saillantes, de la grosseur d'un pois. M. de Lamarck avoit d'abord renvoyé cette espèce parmi les lierres; il a depuis changé d'avis. (Voyez les observations à la suite de l'article LIERRE.)

Cette plante croît à la Jamaïque. *Th (V. f.)*

ARALIE en tête. *Aralia capitata*. Jacq.

Aralia arborea, foliis simplicibus, ellipticis, integerrimis; paniculis terminalibus; floribus sessilibus, caritatis. Swartz, Prodr. 55. — Jacq. Amer. 89. tab. 61. — Aiton, Hort. Kew. t. pag. 382. — Lam. Ill. tab. 217.

Hedera (capitata), foliis ellipticis, integris; racemis compositis, terminalibus; floribus sessilibus, capitellatis. Smith, Icon. picl. 1. pag. 4. tab. 4. — Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 516.

Cette espèce est facile à distinguer par ses fleurs sessiles, réunies en une petite tête à l'extrémité des pédoncules particuliers. C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, & se divise en rameaux étalés, ridés, cylindriques, garnis, vers leur sommet, de feuilles éparées, pétiolées, elliptiques, presque rhomboïdales, roides, glabres, luisantes, entières, soutenues par de longs pétioles. Les fleurs forment une grappe droite, terminale, ramifiée; les pédicelles soutenant chacun une petite tête de fleurs sessiles, nombreuses, blanchâtres, accompagnés de petites bractées semblables à des paillettes. Les dents du calice sont à peine visibles; la corolle fort petite; les pétales oblongs, caducs; l'ovaire glabre, surmonté de trois à cinq styles courts, rapprochés. Le fruit est une baie oblongue, glabre, à cinq loges, couronnée par le calice.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, aux Antilles & à la Jamaïque. *H*

ARALIE en cœur. *Aralia cordata*. Thunb.

Aralia herbacea, caule angustato, inermi; foliis simplicibus, cordatis. Thunb. Flor. jap. pag. 117.

Doszei. Kœmpf. Amoen. Fasc. 5. pag. 816.

Ses tiges sont ascendantes, à peine ligneuses, velues, anguleuses, médiocrement rameuses; les rameaux aînés, garnis de feuilles simples, pétiolées, alternes, ovales, en cœur, rudes à leurs deux faces, inégales, dentées en scie, aiguës à leur sommet, longues de deux pouces sur autant de large; les pétioles plus courts que les feuilles. Les fleurs sont disposées en ombelles axillaires; les pédoncules trichotomes, tomenteux, ainsi que les pédicelles. L'ovaire est surmonté de cinq styles divergens.

Cette plante croît au Japon. *H* (*Descript. ex Thunb.*)

* ARALIE grimpante. *Aralia scandens*.

Aralia (palmata), caule scandente, aculeato; foliis quinquelobatis; umbellulis simplicibus, lateralibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 233.

Ses tiges sont nombreuses, grimpantes, ligneu-

ses, armées d'aiguillons éparés, recroisés; garnies de feuilles éparées, longuement pétiolées, palmées, divisées en cinq grands lobes. Les fleurs sont blanches, disposées en ombelles simples, solitaires, latérales, sans involucre; les pétioles & les pédoncules sans aiguillons.

Cette plante croît dans les campagnes, à la Chine. *H* (*Descript. ex Lour.*) Son écorce passe pour résolutive, apéritive. On l'emploie dans la rage & l'hydropisie.

L'*aralia odiphylla* de Loursiro me paroît être la même plante que l'*aralia palmata* Lam. n°. 5.

L'*aralia cochleata*, n°. 6, & l'*aralia umbellifera* se rapportent à cette division.

ARAUCARIA. Juss. Gen. pag. 413. Grand & bel arbre du Chili, qui a l'aspect d'un *protea*, & beaucoup de rapport avec les pins par sa fructification. Molina l'a observé le premier; il l'avait nommé *pinus araucana*; mais des échantillons rapportés ensuite par Dombey firent connaître qu'il devoit constituer un genre particulier, auquel M. de Lamarck donna le nom de *dombeya*, & que depuis M. de Jussieu a nommé *araucaria*, parce qu'il avoit été trouvé dans cette contrée du Chili habitée par les Araucans. (*Voyez Dombey*, vol. II, pag. 371.)

ARBOUSIER. *Arbutus*. Les plantes renfermées dans ce genre ne sont guère en Europe que des arbrisseaux d'ornement. Quelques-uns offrent encore, dans les pays chauds, des fruits bons à manger, quoiqu'ils passent, même dans nos départements méridionaux, pour fades & indigestes. Il n'en est pas ainsi dans les climats d'une température plus élevée, telle que dans la Barbarie, où l'arbousier commun (*arbutus uuedo*) est très-répandu: il est des collines qui en font toutes couvertes. Ses fruits ne sont parfaitement mûrs que dans le courant de l'automne; ils sont alors savoureux, délicats & point du tout indigestes. J'en ai souvent recueilli & mangé presque avec excès, sans en avoir été jamais incommodé. M. Desfontaines a fait la même expérience, & il justifie également l'arbousier du reproche que l'on fait à ces fruits dans des provinces où ils ne mûrissent qu'imparfaitement. Cet arbrisseau est gravé dans les *Illustrations*, tab. 366, fig. 1, aux espèces décrites par M. de Lamarck. Il faut ajouter après le n°. 2.

1°. ARBOUSIER de Canatie. *Arbutus canariensis*.

Arbutus foliis lanceolatis, serratis; paniculis verticillatis, hispido glutinosi. Duham. edit. nov. 1. pag. 80.

Cet arbrisseau se distingue par sa panicule point

G g 2

inclinée, mais toujours droite, hispide & glutineuse; par ses feuilles alongées, glauques en dessous : il a le port de l'*Arbutus unedo*. Ses tiges sont droites, élancées, peu rameuses, revêtues d'une écorce brune, garnies, vers l'extrémité des rameaux, de feuilles réunies en touffes alternes; pétiolées, glabres, oblongues-lancéolées, d'un vert-foncé, luisantes, coriaces, glauques en dessous, aiguës, dentées en scie, persilantes.

Les fleurs sont blanches ou coul. ut de rose tendre, réunies en une panicule droite, terminale, étalée, chargée de poils glutineux, accompagnée de bractées scarieuses, lancéolées; les pédicelles velus, glutineux. Le calice est velu, divisé en cinq lobes; la corolle ovale, urcéolée, beaucoup plus grande que celle de *Arbutus unedo*; l'ovaire globe, arrondi, surmonté d'un style simple, persilant, & d'un stigmate aigu : il lui succède une baie arrondie, à cinq loges polyspermes.

Cette plante croît aux îles Canaries, où elle a été découverte par M. Riedel. η

3. ARBOUSIER à feuilles entières. *Arbutus integrifolia*. Lam.

D'après les observations de M. Veillard, dans la nouvelle édition des *Arbres & Arbustes* de Duhamel, 1, pag. 79, les synonymes, les figures & les descriptions de Clusius, Jean & Galpard Bauhin, citées par Tournefort & par M. de Lamarck, appartiennent à l'*Arbutus andrachne* Linn. & non à cette espèce. M. Desfontaines n'est point de cet avis. « L'*Arbutus integrifolia* est l'*Arbutus folio non serrato* Tournef., & l'*Andrachne Theophrasti* de l'Ecluse, synonyme que Linné a rapporté mal-à-propos à son *Arbutus andrachne*, qui croît dans l'île de Samos & autres lieux, tandis que l'*Andrachne* de Théophraste est indigène à l'île de Candie, & que la description de cet ancien naturaliste convient à l'arboûsier à feuilles entières de Tournefort & de Lamarck. » (*Hist. des Arb.* tom. 1, pag. 267.)

3*. ARBOUSIER à feuilles de laurier. *Arbutus laurifolia*. Linn. f.

Arbutus arborea, foliis oblongis, utrinque acumina- tis, acutis serratis, glabris; racemis axillaribus, secundis, sessilibus, solitariis. Linn. f. Suppl. pag. 238.

Il se rapproche par son port, par la forme de ses feuilles, de l'arboûsier commun. Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, recouvertes d'une écorce brune; ses rameaux garnis de feuilles glabres, oblongues, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, persilantes, dentées en scie, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes sessiles, solitaires, simples, unilatérales, plus

courtes que les feuilles; la corolle blanchâtre; les baies globuleuses, rougeâtres, chatnues, à cinq loges polyspermes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. η (V. f.)

6. ARBOUSIER piquant. *Arbutus mucronata*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 366. fig. 2.

8. ARBOUSIER filiforme. *Arbutus filiformis*. Lam.

C'est bien certainement le *vaccinium hispidulum* Linn. (Voyez AIRELLE, Suppl. n°. 35.)

Observations. L'*Arbutus ferrugifolia* Lam. n°. 7, & Ill. tab. 366, fig. 3, est le *Gaultheria antipoda* Forst. (Voyez PALOMMIER, Suppl.) Willdén. rapporte à tort la plante de M. de Lamarck à l'*Arbutus microphylla* Forst.; elle ne lui convient pas. Cette dernière est l'*Andromeda myrsinites*. (Voyez ANDROMÈDE, Suppl. n°. 10.) Enfin, l'*Arbutus pumila* Linn. Suppl. & Willd. est la même plante que notre ANDROMÈDE à feuilles de camarine, Suppl. n°. 9.

* ARBOUSIER à feuilles de filaria. *Arbutus phyllifolia*. Persf.

Arbutus caule ramossimo; foliis lanceolatis, acumina- tis, acutis serratis; floribus axillaribus. Persf. Synopf. Plant. 1. pag. 483.

Ses tiges se divisent en rameaux nombreux, garnis de feuilles alternes, petites, assez semblables, par leur forme & par leur consistance, à celles du filaria; elles sont glabres, lancéolées, dentées en scie à leur contour; les dentelures très-aiguës. Les fleurs sont axillaires.

Cette plante croît au Pérou. η (Herb. Juss.)

ARBRE. L'arbre est, sous bien des rapports, le plus parfait des végétaux : c'est le complément de la vie végétative. Il l'emporte sur toutes les autres plantes herbacées par sa vigueur, par l'abondance de ses sucres vitaux, par ses moyens de reproduction; il étonne par la longue durée de sa vie, par la grosseur & l'élévation du son tronc, par la cime imposante & majestueuse qui le couronne, enfin par son port & par l'ensemble de toutes ses parties.

Toutes les fois que la végétation s'établit sur un terrain neuf, lorsqu'elle est livrée à elle-même, lorsque ses admirables & longs travaux ne sont point troublés, ou par la hache destructive ou par la dent des animaux, elle finit toujours par produire des arbres, & la surface entière du Globe n'offrirait qu'une vaste forêt sans la réunion des hommes en société. La multiplicité des arbres est le plus grand obstacle qu'éprouvent les

nouveaux colons lorsqu'ils arrivent pour la première fois dans des contrées privées d'habitants. Il en est de même des pays cultivés pendant une longue suite de siècles, dépeuplés ensuite, soit par les ravages de la guerre, soit par la longue durée des maladies pestilentielles. Dès que ces plaines, jadis fertiles, sont abandonnées, les forêts couvrent avec le temps ces campagnes sillonnées par le soc de la charrue, ces prairies broustées par les troupeaux, & même les vastes espaces occupés par les grandes cités.

L'Afrique septentrionale, ce pays autrefois si peuplé lorsqu'il étoit habité par les Carthaginois & les Romains, aujourd'hui presque inculte depuis qu'il est tombé sous le pouvoir du despotisme, est un exemple frappant de cette vérité. Aux travaux des hommes ont succédé ceux de la nature. Celle-ci s'est emparée de ces riches provinces, jadis ouvertes de toutes parts au commerce & à l'industrie, & il n'est arrivé bien souvent, en parcourant ces belles contrées, de retrouver les ruines d'une ancienne & grande ville ou les traces d'un grand chemin dans des bois presque impénétrables : il faut souvent y chercher sous les broussailles les monuments rares & précieux du puissant empire des Carthaginois & des Romains. Une brillante végétation couvre ces terres abandonnées, & la nature, libre de toute contrainte, est rentrée dans ses droits en faisant croître dans chaque sol les végétaux qui y conviennent le mieux.

Ce n'est donc point dans les pays civilisés que l'on peut étudier parfaitement la marche de la nature, qui est cependant si essentiel de connaître, même pour apprendre à diriger la culture de ses productions. Les besoins de l'homme en grande société le forcent de la contrarier à chaque pas : il ne peut permettre à la terre de produire librement ce qu'elle veut ; il est forcé d'arrêter le progrès rapide des forêts, qui bientôt couvriront les plaines destinées aux moissons ; il arrache impitoyablement la plante indigène pour la remplacer par des végétaux exotiques. C'est de ce désordre apparent que résultent les plus précieuses avantages pour l'homme social quand il fait diriger les travaux d'après ceux de la nature, & que l'observation lui fait connaître que les mêmes plantes, les mêmes arbres, ne peuvent croître également bien dans tous les sols ni aux mêmes expositions. D'après la connoissance parfaite des localités, nous saurons fertiliser les sols les plus ingrats, & nous étendrons avec profit le vaste domaine de la culture. En jetant un coup d'œil sur cette belle distribution de végétaux ligneux qui ornent la surface de la terre, nous reconnaitrions bientôt qu'aucun d'eux ne pourroit être mieux que dans les lieux où ils croissent naturellement. Si nous faisons descendre les pins dans les vallons resserrés & brûlants, si nous trans-

portions les platanes sur les hautes montagnes, nous verrions les premiers périr faute d'air & par trop de chaleur, & les seconds par un air trop vif & trop froid. Un observateur exercé saura même, au seul port d'un arbre, à sa forme, à son organisation particulière, reconnaître le sol auquel il doit appartenir : ce fera un trait de lumière de plus pour la direction de leur culture. Il s'apercevra bientôt que l'arbre qui croît sur les hautes montagnes est différent de celui qui on rencontre sur la pente des collines ; que ceux des plaines & des bas-fonds ne se retrouvent plus sur les hauteurs ; que les uns ne se plaisent que dans les sables arides & brûlants ; d'autres, dans les lieux humides ou sur le bord des ruisseaux. Quoique certaines espèces d'arbres paroissent végéter également bien sous tous les climats & à des expositions différentes, chaque contrée néanmoins en possède qui lui sont propres, & qu'on ne peut trouver ailleurs. Il en est dans le Midi qu'on ne rencontrera jamais dans le Nord. Ceux des tropiques, & de l'Amérique ou des Indes ne ressemblent point à ceux de l'Europe ; & quoique la culture parvienne, à force de soins, à s'approprier quelques arbres exotiques, il en est un grand nombre auxquels elle est forcée de renoncer.

Cette variété de productions s'oppose à l'uniformité, & forme de l'Univers le spectacle le plus sublime & le plus imposant. Comme il seroit triste & monotone si partout l'on ne rencontrait qu'un gazon uniforme ! Mais il n'est que le fond du tableau : les forêts en forment les grandes masses, & les animaux lui donnent le mouvement & la vie.

En considérant les arbres sous le double rapport de leur organisation & de leur développement, il faut avant tout se rappeler une distinction essentielle qui avoir échappé aux Anciens, qu'ont établie MM. de Jussieu, si savamment développée ensuite par M. Desfontaines : c'est celle des arbres *monocotylédons* ou dont les semences ne sont pourvues que d'un seul cotylédon, & *dicotylédons* ou dont les semences sont munies de deux cotylédons. M. Mirbel, dans plusieurs Mémoires lus à l'Institut, a confirmé ces observations, auxquelles il a ajouté un grand nombre d'autres qui lui sont particulières. C'est d'après les recherches de ces savans estimables que nous allons exposer la différence qui existe entre ces deux grandes coupes du règne végétal.

Les arbres *monocotylédons*, dont les palmiers forment le plus grand nombre, plus simples dans leur organisation & dans leur développement, sont bien moins nombreux que les arbres *dicotylédons*. « Nés pour habiter les pays chauds, dit M. Mirbel, ils ne végètent avec vigueur qu'entre les deux tropiques. Aucune espèce ne croît spontanément dans les pays du Nord, & ce n'est sou-

vent que par des foins multipliés que l'homme parvient à en conserver quelques-uns dans les climats tempérés. Ordinairement les arbres monocotylédons n'ont point de branches; leur tige, cylindrique & régulière, se soutient, de même qu'une colonne, dans une direction verticale, & leur cime est couronnée d'un vaste faisceau de feuilles, du milieu desquelles naissent les fleurs: tel est le *aracane*, quelques espèces d'aloës, d'yucca, d'agave, munis de feuilles simples, roides, aiguës, en forme de glaive; tels sont encore ces végétaux de la belle famille des palmiers, le sagouier, dont la tige contient une tumeur nourricière; le dattier, non moins intéressant par son utilité que par sa forme majestueuse, & dont les feuilles, connues sous le nom de *palmettes*, ont été consacrées à la gloire d'Athènes; l'araca, dont le fruit entre dans la composition du *betel*; le cocotier, qui fournit à des peuplades nombreuses un aliment sain, une liqueur agréable, des meubles & des vêtements; le chancrep, qui porte des feuilles plissées en éventail; le *corypha*, dont le tronc s'élève à soixante dix pieds, & dont le sommet se couronne de huit à dix feuilles de quarante pieds de diamètre; le *baobab* & le *nipa*, qui donnent une boisson utile; le *lontar*, qui produit ces fameux cocos des Maldives, si remarquables par leur volume & par leur forme singulière, & beaucoup d'autres arbres également intéressants par leurs produits économiques, & qui ont frappé d'étonnement tous les voyageurs qui ont parcouru les pays chauds de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique. En effet, qu'on se transporte en idée sous la zone torride, qu'on se représente ces palmiers sur leur terre natale, soit qu'ils habitent des sables arides ou des plages maritimes, ou le sommet des montagnes, ou le fond des vallées, partout leur aspect à quelque chose de simple & de grand qui frappe l'imagination, & qui annonce dans ces végétaux une organisation particulière, bien différente de celle des arbres qui composent nos forêts de l'Europe.

Ce soupçon s'est converti en certitude par l'attention que l'on a portée au développement & à l'organisation des palmiers. L'embryon, dans ces arbres, est un petit corps cylindrique ou conique, plus ou moins renflé à son sommet. On n'y aperçoit d'abord ni la plante ni le cotylédon. Ces organes ne deviennent sensibles qu'au moment de la germination. A cette époque l'embryon perce la graine, & se relevant toujours engagé dans les téguments par l'une de ses extrémités, il se prolonge par l'autre en un filet qui n'est autre chose que la base développée du cotylédon, dont le sommet plonge dans la graine. Cette base du cotylédon recèle la petite racine & la petite tige, qui ne tardent pas à se développer.

L'une & l'autre ont la forme d'un petit cône: celle qui doit former la racine pointe vers la

terre, & celle de la tige vers le ciel. La première présente une masse solide; la seconde, au contraire, est formée de gaines qui s'emboîtent les unes dans les autres. Chaque gaine est une feuille. La plus extérieure sert d'étui à la seconde; celle-ci à la troisième, la troisième à la quatrième, & ainsi des autres. Le cotylédon lui-même n'est autre chose que la première feuille, qui les enveloppe toutes. Insensiblement les feuilles intérieures prennent plus d'étension: elles repoussent celles qui les environnent, & les forcent à se pencher vers la terre; elles sont repoussées à leur tour par celles qui naissent dans le centre, & sont contraintes de s'incliner vers les premières.

Les feuilles se multiplient & se succèdent dans le même ordre; elles foient, à la surface de la terre, un faisceau dont toutes les branches sont étroitement unies par leur base, & c'est cette base solide qui est l'origine du tronc ou sippo des palmiers; car les feuilles extérieures ne tardent pas à se détacher. Mais leur partie inférieure, plus durable, forme un anneau compacte, du centre duquel s'élèvent de nouvelles feuilles, qui à leur tour sont repoussées à la circonférence, & venant à se détacher, laissent à leur base un second anneau égal au premier, & placé au dessus de lui.

Ce second anneau est bientôt surmonté d'un troisième; ce troisième d'un quatrième, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la vieillesse ou quelque autre cause arrêtant la végétation, l'arbre cesse de produire de nouvelles feuilles, & par conséquent de s'élever.

Il résulte de ce mode de développement, qu'un arbre monocotylédon cesse de croître en épaisseur long-temps avant que sa croissance en hauteur soit terminée; ce qui est d'autant plus évident, que tous les anneaux formés par la base des feuilles, & superposés les uns aux autres, ont un diamètre égal, & que le premier de ces anneaux, celui qui sert pour ainsi dire de soubassement à la colonne, a pris en épaisseur toute la croissance dont il étoit susceptible des premiers temps du développement du végétal. En un mot, le tronc des palmiers a, dès qu'il s'élève au dessus de la terre, toute la grosseur qu'il doit avoir dans toute son étendue, n'importe à quelle hauteur il parvienne, & ce phénomène se conçoit aisément d'après le mode d'accroissement que nous venons d'exposer.

Les cicatrices que les palmiers & autres arbres de cette famille portent à leur superficie, indiquent les places d'où les feuilles se sont détachées, & sont des preuves toujours subsistantes du mode de développement auquel la nature a soumis les arbres pourvus d'un seul cotylédon. L'organisation intérieure de ces arbres n'est pas moins digne d'attention que leur développement. Si l'on coupe transversalement le tronc d'un arbre

à deux cotylédons, comme les saules, les chênes, les peupliers, les tilleuls, les frênes, &c., on aperçoit aisément sur cette coupe un point central & une multitude de zones concentriques, qui forment des cercles d'autant plus grands, qu'ils approchent davantage de la circonférence. La dernière de ces zones constitue l'écorce; mais si l'on coupe également la tige d'un palmier, on n'y remarque ni point central déterminé ni zones concentriques, mais un tissu plus ou moins lâche, dans lequel se montre une multitude de nœuds compacts, d'autant plus rapprochés entr'eux, qu'ils sont plus voisins de la circonférence.

Ce n'est pas la seule différence d'organisation que présentent les grands végétaux à un & à deux cotylédons. Non-seulement la coupe transversale du tronc des arbres monocotylédons offre un tissu lâche & des nœuds d'un tissu plus serré, mais de plus la coupe verticale prouve encore que les nœuds ne sont que l'extrémité de longs filets durs, plus nombreux vers la circonférence. Ces filets parcourent la tige dans sa longueur; ils se réunissent quelquefois en un ou se divisent de distance en distance, environnés d'un tissu mou. C'est cette organisation qui fait que, quoiqu'il soit souvent très-difficile de couper un palmier à coups de hache ou avec une scie, on parviendrait facilement à le rompre si l'on brisoit les uns après les autres les filets qui sont la solidité de sa tige.

« On a donné, dit M. Mirbel, au tissu lâche dont ces filets sont entourés, le nom de *moëlle*; cependant il est certain que cet organe n'a aucun rapport avec la moëlle renfermée dans la cavité des os. L'observation microscopique nous a prouvé que c'est un tissu cellulaire, semblable à celui que nous avons trouvé dans les feuilles, les fruits, les cotylédons.

« Les filets longitudinaux constituent le bois ou corps ligneux des arbres monocotylédons. Ces filets ont en effet la dureté, la ténacité, l'élasticité du bois des autres végétaux, & ils sont, comme lui, formés par une infinité de tubes ou vaisseaux plus ou moins grands, placés parallèlement à côté les uns des autres. Cette organisation interne s'explique par le mode de développement. Nous avons vu les feuilles, en s'unissant par leur base, donner naissance au tronc ou tige; mais chacune de ces feuilles est elle-même formée d'une multitude de filets liés par le tissu cellulaire, & c'est la réunion de tous ces faisceaux particuliers qui constitue le faisceau général. Si les filets sont plus nombreux à la circonférence, c'est que les feuilles anciennes, pressées par celles qui naissent dans le centre, sont sans cesse repoussées vers la circonférence, & forment par conséquent un tissu plus compacte. »

D'après l'exposé qui vient d'être présenté des caractères qui constituent les arbres monocotylé-

dons, il seroit difficile de les les confondre avec les arbres à deux cotylédons, dont nous allons examiner l'organisation. Considérés d'abord dans leurs formes extérieures, nous reconnaissons que leur tige, au lieu d'être également épaisse dans toute sa longueur, va presque toujours en s'aminçant de la base au sommet. Ainsi le diamètre du tronc d'un chêne est plus grand au niveau du terrain qu'à la naissance de ses branches. Il en est de même du châtaignier, du tilleul, du sapin, &c. La cime de ces arbres est couronnée d'une multitude de branches divisées & subdivisées en rameaux. Ces ramifications se portent irrégulièrement de tous côtés, & les jeux de la nature sont tels à cet égard, que la plupart des arbres de même espèce, & à plus forte raison d'espèces différentes, que la main de l'homme n'a point affermis à des formes déterminées, diffèrent absolument par l'aspect & les dimensions. Il est rare aussi que la tige soit parfaitement droite, cylindrique & régulière. Quant aux feuilles, elles sont attachées çà & là sur les branches, & semblent, à la première vue, avoir été placées au hasard. Il n'en est cependant pas ainsi. Leur position est toujours relative au mode d'existence du végétal.

Si de l'examen des formes extérieures nous passons à celui de l'organisation interne, nous trouverons bien d'autres différences entre les arbres monocotylédons & dicotylédons. Pour faire concevoir nettement l'organisation de la tige des arbres monocotylédons, nous avons d'abord tracé l'histoire de son développement, parce qu'en effet l'organisation du tronc est le résultat du développement des feuilles & de l'union de leur base; mais maintenant nous devons suivre une marche inverse, & parler de la structure interne du tronc avant de dire comment il croît & se développe, parce que cette organisation date de l'origine de la plante, que nous en trouvons déjà l'indice dans l'embryon, & que c'est elle qui détermine le mode de développement & de croissance.

Dans les arbres dicotylédons, la tige est composée de trois parties distinctes; savoir: l'écorce, placée à l'extérieur; la moëlle, qui occupe le centre; & le corps ligneux, qui est intermédiaire. On aperçoit facilement ces trois parties en coupant un jeune arbre transversalement ou verticalement.

L'écorce forme une enveloppe plus ou moins épaisse à la superficie. Cette enveloppe est composée elle-même du *tissu herbacé*, qui est la couche la plus extérieure, des *couches corticales*, qui viennent ensuite, & du *liber*, qui est appliqué immédiatement sur le corps ligneux. Il est facile de séparer l'écorce du reste du végétal.

Le corps ligneux présente deux couches principales, dont l'une est extérieure & l'autre intérieure. La première est l'*aubier*; la seconde est le *bois*. L'une & l'autre sont traversées d'une multi-

tu le de lignes on rayons médullaires, qui s'étendent du centre à la circonférence, &c que l'on a comparés aux lignes horaires d'un cadran.

La *moëlle* placée au centre du végétal le parcourt dans toute sa longueur ; elle offre à l'anatomiste l'*évi tubulaire* à la circonférence, &c le *tissu médullaire* au centre. M. Mirbel, s'appuyant des observations microscopiques, a jeté beaucoup de lumière sur toutes ces parties, que nous allons parcourir successivement avec lui.

À la superficie de la coupe transversale, nous trouvons le *tissu herbacé* : c'est une couche assez lâche, toujours imbibée d'une substance résineuse, ordinairement verte, quelquefois brune, jaune, rouge, &c. Cette enveloppe est formée d'un tissu cellulaire, dont les parois les plus extérieures sont connues sous le nom d'*épiderme*. Le *tissu herbacé* a ordinairement une couleur très-intense à la superficie ; mais cette couleur s'affaiblit dans l'intérieur.

Sous cette première couche sont les *couches corticales* ; elles sont composées d'une multitude de tubes, formant de petits faisceaux, se séparant & se réunissant alternativement, de manière à composer des réseaux, dont les mailles s'allongent dans la longueur de la tige. On parvient à diviser en plusieurs lames les couches corticales par un procédé très-simple, qui consiste à les tenir plongées dans l'eau jusqu'à ce que le fluide ait dissous le tissu cellulaire qui unit les différents réseaux, &c qui remplit leurs mailles.

Vient ensuite le *liber* ; il offre, comme les couches corticales, différents réseaux superposés les uns aux autres, &c dont les mailles sont remplies par le tissu cellulaire ; mais le liber a moins de consistance. On peut également le séparer en feuillets distincts, en le faisant macérer dans l'eau. Sa couleur tire toujours plus ou moins sur le vert.

L'*aubier*, que l'on trouve sous le liber, est une suite de couches ou de réseaux placés les uns sur les autres, semblables encore par l'organisation à ceux que nous venons de décrire, mais dont les mailles sont plus allongées, les faisceaux des tubes plus droits, le tissu cellulaire moins abondant, &c formant en conséquence une masse plus compacte, plus dure, plus pesante. L'*aubier*, comme l'indique son nom, dont l'étymologie (*alba*) est latine, a une couleur blanchâtre.

La même organisation se présente encore dans le bois ; mais on remarque entre cette partie & l'aubier la différence que nous venons d'établir entre l'aubier & le liber, c'est-à-dire que les tubes qui composent les réseaux ligneux sont plus droits, que les mailles sont plus longues & plus étroites, &c que le tissu cellulaire est en moindre quantité : d'où il résulte que le bois est nécessairement d'un tissu plus serré, &c que sa dureté & sa

pesanteur spécifique sont plus grandes. La couleur du bois varie ; mais on observe communément qu'elle est rembrunie, en comparaison de celle de l'aubier.

Les couches corticales, le liber, l'aubier & le bois ne diffèrent donc pas par la nature des éléments organiques qui les composent, mais seulement par la quantité proportionnelle de ces éléments. « L'observation microscopique nous a prouvé, ajoute M. Mirbel, que ces quatre parties contenaient les *petits tubes*, les *grands tubes* &c le *tissu cellulaire*, disposés à peu près de la même manière, mais dans des proportions inégales ; & l'œil, sans le secours des verres, apperçoit très-bien sur la coupe transversale d'un tronc de tilleul, de chêne, &c., les zones concentriques qui composent ces diverses parties, &c qui font voir, par leur uniformité, la simplicité du plan de la nature. »

Les rayons que l'on voit sur la coupe transversale, &c que nous avons comparés aux lignes horaires d'un cadran, sont formés par le tissu cellulaire qui remplit les mailles des couches concentriques ; &c comme ces mailles sont souvent placées les unes vis-à-vis les autres, il suit de là que les rayons doivent se prolonger, &c se prolongent en effet, sans déviation, du centre à la circonférence.

Le bois, quand l'arbre est très-jeune, offre un canal longitudinal à son centre : c'est le canal médullaire. La paroi de ce canal est tapissée de grands tubes poreux, de grands tubes simples, de trachées &c de fausses trachées, qui composent ce que nous avons désigné sous le nom d'*évi tubulaire*. C'est dans cet évi qu'est placée la moëlle.

La *moëlle* est formée d'un tissu cellulaire lâche, qui ne contient d'ordinaire qu'un fluide limpide & sans couleur. Ce tissu ne se rencontre que dans les tiges très-jeunes ou dans les branches nouvellement développées.

Il est certain que toutes ces parties ne forment qu'un seul & même tissu, &c cette vérité, qui, d'après son simple énoncé, ne paraît peut-être pas d'une haute importance, jette cependant un si grand jour sur les végétaux, qu'elle explique tout le mystère de leur organisation. Nous devons ajouter que c'est à l'ignorance de ce fait qu'il faut attribuer la plupart des erreurs introduites dans l'anatomie végétale.

Les branches & les rameaux ont la même organisation que le tronc ; mais les racines offrent quelques différences. La moëlle n'existe qu'au sommet de leurs ramifications principales ; on n'en trouve aucune trace dans les rameaux inférieurs. L'écorce est plus tendre, plus succulente, plus épaisse que dans le tronc. Le liber, l'aubier, le bois se confondent davantage. D'ailleurs, on y retrouve les couches concentriques &c les rayons médullaires.

Les

Les couches concentriques du tronc, des branches & des racines n'ont pas toujours existé. Le chêne qui végète depuis deux ou trois siècles en offre un bien plus grand nombre que le chêne de dix ans, & le chêne de l'année en a deux ou trois au plus. Ces couches se forment donc successivement. Observons le végétal dans son origine, & suivons-le jusqu'au moment où il est parvenu au terme de sa croissance; nous parviendrons ainsi à connoître comment la nature opère ses développemens.

Dans l'origine l'arbre est renfermé sous les enveloppes étroites d'une graine. Ces énormes *bois-lés*, dont la masse s'appuie de beaucoup celle des autres espèces du règne organisé, puisque leur tronc acquiert jusqu'à trente pieds de diamètre, & leurs branches soixante pieds de longueur, ont été, dans les premiers jours de leur développement, aussi foibles que l'herbe la plus chétive. L'embryon d'un chêne n'a pas deux lignes de long, sur une demi-ligne de diamètre. Sa tige est renfermée entre deux cotylédons épais & charnus. Sa racine paroît à l'extérieur sous la forme d'un cône.

Si l'on fait l'anatomie de cette petite plante, on voit au centre un filet de moëlle, à la circonférence un tissu herbacé, & entre l'un & l'autre un tissu une série de tubes qui constituent l'étau tubulaire: il n'y a point encore de liber, d'aubier ni de bois. A peine les fluides de la terre développent cette plante délicate, qu'il se dépose une couche de liber, entre le tissu herbacé & l'étau tubulaire. Ce tissu, comme on l'a vu plus haut, est un réseau de tubes, dont les mailles sont remplies par le tissu cellulaire; cependant les tubes s'allongent & se resserrent, les mailles deviennent plus étroites, & le tissu cellulaire qu'elles renferment, est comprimé: il en résulte insensiblement la métamorphose du liber en aubier; mais ce tissu, à mesure qu'il s'allonge, perd de son épaisseur; il se détache du tissu herbacé, & laisse un vide que vient remplir une autre couche de liber. Cette couche est à son tour convertie en aubier, & recouverte d'un nouveau liber, tandis que l'ancien aubier se change en bois.

La jeune tige, parvenue à cette époque, présente trois couches qui n'existoient pas dans l'embryon. La plus intérieure est en même temps la plus anciennement formée, la plus solide, la plus compacte; elle forme le bois. Celle qui la recouvre, est moins ancienne & moins dure; elle forme l'aubier. La plus récente & la plus extérieure est molle & verte: c'est elle qui constitue le liber.

A mesure que les couches du bois se multiplient, celles de l'aubier & du liber se renouvellent, & l'épaisseur de la tige augmente. Ce sont ces couches successives qui forment les zones concentriques que l'on observe sur la coupe transversale des troncs des arbres dicotylédons, & qui

Botanique. Supplément. Tome I.

sont si nombreuses dans les individus, dont la naissance remonte à plusieurs siècles. Quant aux rayons médullaires, on conçoit facilement leur formation. Les mailles des réseaux superposés les uns aux autres se correspondent, & sont comblées par le tissu cellulaire, qui se prolonge par conséquent du centre à la circonférence, & communie d'un côté avec l'étau tubulaire, & de l'autre avec le tissu herbacé.

Mais comment ces végétaux croissent-ils en longueur? Cette question n'est pas difficile à résoudre. La tige des arbres dicotylédons a toujours une forme plus ou moins conique. Si ce caractère s'altère & même s'efface presque entièrement dans un grand nombre d'espèces, il se montre dans d'autres d'une manière bien frappante, tel que dans les peupliers, les sapins, les thuyas, &c. dont la tige verticale s'élève comme une pyramide conique, très-allongée.

La différence de longueur dans le diamètre du tronc, mesuré à différentes hauteurs, s'explique par l'examen de la coupe transversale, qui offre un plus grand nombre de zones concentriques à la base du végétal qu'à son sommet: d'où il faut conclure que les couches ne s'étendent pas également dans toute la longueur de la tige.

En effet, si l'on coupe un tronc verticalement en suivant l'axe de l'arbre, on remarque à la superficie de chaque plan formé par la section, que les lignes des couches s'inclinent les unes vers les autres, & forment des angles dont le sommet regarde le ciel. Ces angles sont placés les uns dans les autres, de telle sorte que l'extrémité de leurs côtés repose sur la racine, & que leurs sommets, qui aboutissent à l'axe de l'arbre, sont d'autant plus élevés, que les angles sont plus extérieurs. Il est évident, d'après cela, que chaque couche représente un cône, & que tous les cônes sont, de même que les angles, placés les uns dans les autres. Pour concevoir maintenant par quels moyens la tige s'élève, il faut examiner comment se produisent ces cônes concentriques. R. venons donc sur nos pas, & considérons de nouveau l'arbre à l'époque de la germination.

Le premier feuillet du liber, formé entre l'étau tubulaire & le tissu herbacé, s'étend d'abord à la base de la petite tige jusqu'à son sommet; qui est formé d'un bouton. Ce bouton s'épanouit & s'allonge; la couche du liber s'allonge également, & se change en un cône ligneux. Arrivée à ce point de développement, elle cesse de croître; mais la couche nouvellement formée, qui recouvre toute la superficie, & qui par conséquent a déjà la même hauteur qu'elle, produit un second bouton, & ne tarde pas à s'élever avec lui. Cette couche, transformée à son tour en cône ligneux, est bientôt recouverte & dépassée par une troisième couche. Une quatrième surmonte celle-ci, & sert

H h h

d'appui à une cinquième. Il se forme ainsi une multitude de couches coniques & concentriques, dont la base repose sur la racine, & dont la hauteur est d'autant plus grande, qu'elles sont plus extérieures. Ces couches se déposent quelquefois pendant plusieurs siècles, & le végétal prend des dimensions prodigieuses. Les arbres des forêts antiques en fournissent une multitude d'exemples. Ces énormes végétaux doivent être de vieux habitants de la terre. Leur origine se perd dans la nuit des tems, & l'imagination doit à peine calculer leur durée. Qui nous dira combien de siècles se seront écoulés avant qu'un boabab ait acquis quatre-vingt-dix pieds de circonférence?

Les branches ont absolument la même organisation que la tige. Les différentes couches de leur tissu forment aussi des cônes concentriques. Les branches naissent à l'extrémité des rayons médullaires, & peuvent être considérées comme des végétaux, dont la taciné seroit placée dans un sol ligneux.

Les tacines croissent comme la tige; elles se ramifient comme elle, & présentent également un certain nombre de cônes emboîtés les uns dans les autres. Elles ont quelques rapports avec les branches; mais elles en diffèrent par la propriété de se diviser & subdiviser en ramifications qui tendent toujours à se terminer en filets déliés, tandis que les branches & les rameaux tendent au contraire à s'élargir en lames. Le chevelu est le terme de la division des racines. Les feuilles sont celui de la division des branches. La situation de ces organes répond parfaitement au but que la nature se propose. Les filets multipliés qui terminent les racines, plongés dans un milieu épais & dense, s'introduisent entre les molécules de la terre, pénètrent dans les moindres vides, & pompent, par le moyen des tubes dont ils sont composés, les fluides nécessaires à la nutrition du végétal; & les feuilles, dispersées sur les branches, présentant à la lumière une grande surface, rejettent, par leurs pores nombreux, des miasmes nuisibles à la végétation, & absorbent des vapeurs qui vont augmenter la masse des fluides nourriciers. Si d'une part cet accord admirable entre les besoins du végétal & la nature de ses organes s'explique aux yeux du philosophe par les grandes considérations d'ordre & d'harmonie générale, d'autre part le naturaliste fluideux doit penser que ces lois de la végétation font subordonnées à des causes physiques qu'il seroit important de connaître, & que l'étude & l'expérience pouront un jour révéler à l'homme. Comment la nature du milieu, dans lequel plonge une partie du végétal, modifie-t-elle cette partie au point de faire naître à la superficie, ou des tacines chargées de chevelus, ou des branches couvertes de feuilles? Voilà la question qu'il s'agit de résoudre, mais sur laquelle les naturalistes n'ont encore aucune donnée.

D'après les principes que nous venons d'établir, relatifs aux organes particuliers & au développement des arbres monocotylédons & dicotylédons, il est facile de saisir la différence qui existe entre ces deux groupes de végétaux, & la nécessité de suivre une culture particulière pour chacun d'eux. Pour en faire mieux ressortir la différence, nous allons exposer les caractères qui les différencient, en les rapprochant par opposition.

Dans les arbres monocotylédons, la tige est cylindrique, composée de petits filets ligneux, enveloppés de tissus cellulaires. Dans les dicotylédons, cette tige est conique, formée, 1°. d'un filet de tissu cellulaire placé au centre; 2°. de couches ligneuses, superposées les unes aux autres & recouvrant l'axe de l'arbre; 3°. d'une couche extérieure de tissu cellulaire.

Dans les premiers, le tissu cellulaire, les tubes, les trachées, les fausses trachées, en un mot tout l'appareil vasculaire, s'allongent dans la même direction que la plante suit en s'élevant. Dans les seconds, l'appareil vasculaire suit deux directions dans son développement. Une partie se dirige vers le sommet des tiges, comme dans les premiers: tels sont les tubes qui forment les couches concentriques. Une autre partie s'étend du centre à la circonférence: telles sont les cellules qui forment les rayons médullaires.

Le centre des tiges est lâche dans les monocotylédons, & la circonférence présente un bois dur & compacte. Dans les dicotylédons, au contraire, la circonférence a peu de consistance; mais l'intérieur offre un tissu ligneux d'autant plus dur, qu'il est plus voisin de l'axe de la tige.

Ceux-ci se couvrent de branches & de rameaux, le long desquels naissent les feuilles; ceux-là ne portent ordinairement à leur cime ni branches ni rameaux, mais seulement une touffe de feuilles qui s'épanouit en rosette.

Les monocotylédons croissent en hauteur par l'allongement des feuilles concentriques les plus extérieures, & ils croissent en épaisseur par la multiplication de ces mêmes feuilles. Les dicotylédons s'élevaient par le moyen des filets ligneux du centre, qui produisent un nouveau bourgeon de feuilles au sommet de l'arbre, & ils s'épaississent par l'écartement de ces mêmes feuilles. Le diamètre des uns se accroît qu'avec lenteur; celui des autres est fixé dès les premiers tems de la vie du végétal.

Il nous resteroit encore beaucoup d'autres considérations à présenter sur les arbres, que nous ne ferons qu'indiquer ici rapidement, la plupart devant trouver place ailleurs. Nous n'essaierons pas non plus d'établir la différence qui existe entre ce que l'on appelle *arbre*, *arbrisseau* & *arbruste*, différence peu importante d'ailleurs pour le bo-

taille & le cultivateur, uniquement fondée sur l'épaisseur & l'élevation de la tige. Il est rare qu'un œil un peu exercé ne puisse les distinguer au premier aspect. Nous remarquerons cependant qu'il est quelquefois des arbres très-bas, & des arbrisseaux très-élevés; mais les premiers ont pour tige un tronc épais, revêtu d'une grosse écorce, presque toujours raboteuse & crevasée, tandis que les arbrisseaux, quelque élevés qu'ils puissent être, ont des tiges grêles, flexibles, recouvertes d'une écorce ordinairement très-mince. Dans l'arbre, le sommet du tronc est couronné d'une cime plus ou moins vaste: dans l'arbrisseau, les tiges, partant souvent plusieurs ensemble de la racine même, forment en quelque sorte une cime placée à la surface de la terre; en sorte qu'on pourroit en ce cas équivoquer les arbrisseaux comme des arbres qui seroient privés de tronc: cependant la plupart des arbres surpassent de beaucoup les arbrisseaux en élévation. Il en est qui s'élèvent à des hauteurs prodigieuses. On a vu des cèdres & des chênes de cent trente pieds & plus; des sapins, des mélèzes de cent vingt; des palmiers de cent, &c. L'épaisseur à laquelle parviennent certains arbres n'est pas moins remarquable: témoin ces fameux *baobabs* du Sénégal, qui, au rapport d'Adanson, ont jusqu'à trente pieds de diamètre; ce qui donne quarante-vingt-pieds de circonférence. Au reste, la distinction entre les arbres & les arbrisseaux est si difficile à fixer d'après des principes rigoureux, qu'il n'est pas rare de voir des arbres réduits à l'état d'arbrisseaux, & ceux-ci parvenir quelquefois à la hauteur & à la grosseur d'un arbre ordinaire. Je connois un individu d'*aubépine* à une lieue de Saint-Quentin, sur la route de Paris, que l'on nomme vulgairement *épine de Dalon*, parce qu'elle indique la position de ce village: c'est un de ces arbres qu'on a désignés sous le nom de *Rosny*. Son tronc a l'épaisseur de celui d'un chêne. Son écorce est épaisse & ridée; la cime ample, touffue: il a au moins trente pieds d'élévation; il est isolé, placé sur un tertre élevé.

Au lieu de ces futilités discussions sur les limites des arbres & des arbrisseaux, qui n'ont que trop occupé des savans spéculatifs, faisons plutôt valoir, au profit de nos semblables, la bonté de leurs fruits, la solidité de leurs bois, les propriétés de leur écorce. Tandis que l'on se dispute pour des mots, pénétrons dans cette antique & sombre forêt. Quel sentiment de révération s'empare de notre âme! Quel calme dans tous nos sens! Quelle douce rêverie transporte nos idées loin de nous! Seuls au milieu du silence de la nature, il semble que l'Univers, que nos semblables sont disparus pour nous: telles sont les impressions qu'excite en nous la seule vue d'une forêt, sans que nous puissions trop en assigner la cause. L'auteur bienfaisant de la nature a voulu diversifier nos plaisirs, nos jouissances, en variant le spectacle de l'Univers

fourni à nos regards; il a voulu que la verdure des prairies, que la vigne qui revêt les coteaux, que les moissons jaunissantes, que les plaines couvertes de bois, excitassent en nous aussi de sensations différentes, qui varient agréablement le mode de notre existence.

Nous aurions un bien foible idée du nombre des espèces d'arbres & d'arbrutes qui existent sur la surface du Globe si nous n'en jugions que d'après celles qui croissent dans notre Europe. C'est peut-être, sous ce rapport, la partie du Monde la plus pauvre. Sur environ douze à quinze cents, soit arbres on arbristes, rant indigènes qu'exotiques, cultivés en Europe, il y en a à peine cinq cents d'indigènes: tantis que dans l'Amérique, dans le climat fertile de l'Inde, sous les tropiques, dans la Nouvelle-Hollande, on peut en compter plusieurs mille. Nous n'avons pas un seul *mimosa*, il en existe plus de deux centes espèces dans les deux Indes. Nous sommes bornés à quelques espèces de chênes: on en connoît environ une centaine d'exotiques. Les figuiers sont encore plus nombreux, tandis que nous ne devons qu'à une seule espèce toutes les variétés obtenues par la culture. Le nombre des Gules va au-delà de cent: il n'y en a pas le tiers d'indigènes à l'Europe. Nous ne connoissons ni les *diospyros* ni les *glédicias*, quelques espèces cultivées exceptées; ni les *cinchona*, ni les *rojanias*, ni aucun de la belle & nombreuse famille des palmiers, excepté le dattier & le latanier, &c. Enfin, je ne croirois pas être fort éloigné de la vérité quand j'assurerois qu'il existe peut-être plus de genres d'arbres dans les trois autres parties du Monde, que d'espèces dans la seule Europe. Revenons à quelques autres considérations.

Outre la faculté qu'ont tous les arbres de se reproduire par graines, comme tous les végétaux, la nature leur a encore accordé d'autres moyens de multiplication qu'ils possèdent presque exclusivement: ils se multiplient de leurs racines par *rejets*, par *dragons*, &c.; de leurs branches par *marottes*, par *boutures*, par *greffes*, &c.

Qu'on juge de l'immense fécondité des arbres d'après ces moyens nombreux de reproduction qu'ils conservent pendant la longue durée de leur vie. Il n'est point de végétaux auxquels la nature ait accordé de plus longues années. Quoique variée, selon les espèces, il en est dont la durée surpassé presque toute croyance. M. Adanson a rencontré aux îles de la Magdeleine, près du Cap-Ver, plusieurs *baobabs* sur lesquels il y avoit des inscriptions de noms hollandais, tels que celui de R. W. & plusieurs noms français, dont les uns datoient du quatorzième, d'autres du quinzième siècle. Ces arbres, quoiqu'âgés de plusieurs centaines d'années, étoient encore très-jeunes, n'ayant alors qu'environ six pieds de diamètre. Le même auteur en a observé beaucoup d'autres qui avoient depuis

vingt-cinq jusqu'à vingt-sept pieds de diamètre, & qui ne paroissent pas être encore arrivés à leur entier développement. « L'arbre appelé en Chine *fiennich*, c'est-à-dire, arbre de mille ans, ajoute ce savant naturaliste, prouve assez que l'on connoit dans ce pays des arbres d'une durée qui passe l'imagination : aussi c'est dans ce pays, dont les peuples paroissent les plus anciens du Monde connu, & qui par conséquent peuvent avoir plus de notes sur l'antiquité, que croissent les plus gros arbres cités jusqu'ici, tel que celui de cent trente pieds de diamètre. L'historien Josèphe rapporte, au livre V, chap. 31 de la *Guerre des Juifs*, que l'on voyoit de son tems, à six stades de la ville d'Ebron, un térébinthe qui existoit depuis la création. » Plin., dans le seizième livre de son histoire naturelle, chap. 44, cite un certain nombre d'arbres, tous remarquables par leur vieillesse.

Enfin, la vie des arbres a un terme, comme celle de tous les êtres organisés. « Les chênes, les sapins, les cèdres, les palmiers & les autres grands végétaux, dit M. Mirbel, témoins pendant une longue suite d'années de la naissance & de la mort de tant de races éphémères, succombent enfin. De jeunes rejetons leur succèdent : ceux-ci passeront à leur tour ; car ce qui fait que l'individu croît & se fortifie, devient tôt ou tard une inévitable cause de mort. Il est aussi des causes accidentelles qui hâtent la fin des individus ; elles engendrent les maladies. Les maladies amènent la mort. Les espèces les plus robustes ne sont pas à l'abri de ces coups imprévus. On voit souvent de grands arbres, rongés par des chancres & des ulcères, périr avant le tems. Les froids excessifs, les chaleurs ardent, les vents violents, les bronillards chargés de vapeurs méphitiques, les longues sécheresses, les tems humides, la présence de légions d'insectes dévorans, les attaques répétées des quadrupèdes, sont autant de causes de maladies & de destruction.

« Lorsqu'un arbre échappe à ces accidens, & qu'il arrive paisiblement à la vieillesse, différents symptômes précèdent & annoncent sa fin. Vers ce tems la végétation se ralentit, l'arbre cesse de croître & de se développer. Le tronc & les branches des dicotylédons ne produisent plus alors de nouvelles couches de liber. Leur écorce, desséchée & fendue, se détache par morceaux. Leurs derniers rameaux, ne recevant plus de fluides nourriciers, se flétrissent aux approches de l'hiver, de même que les tiges des plantes annuelles. A peine voit-on çà & là, sur les branches, quelques boutons tardifs, qui périssent bientôt. A cette même époque, les tiges des monocotylédons ne se chargent plus de nouvelles couronnes de feuihs. Les faisceaux de tubes qui partent de leur base, & s'élèvent jusqu'à leur cime, cessent de s'allonger & de charrier la liqueur nourricière : il ne se développe plus de faisceaux de tubes au

centre du végétal. La moëlle, placée entre les anciens faisceaux, se dessèche & se réduit en poudre ; l'union entre toutes les parties est détruite. Mille causes de destruction, jusqu'alors impuissantes, agissent sur ces vieux arbres ruinés par le tems ; ils tombent de toutes parts, & se changent enfin, après bien des altérations successives, en humus végétal. »

ARBRE A L'AIL. On donne ce nom à plusieurs arbres dont quelques parties exhalent une odeur d'ail, surtout à un arbre du Pérou, dont Ruiz & Pavon font un genre nouveau, sous le nom de *cardana*, Flor. peruv. vol. 2, pag. 46, tab. 184 ; il diffère très-peu du sebestier (*cordia* Linn.), auquel il faudra peut-être le réunir.

ARBRE D'AMOUR, ARBRE DE JUDÉE. C'est le nom vulgaire que l'on donne au gannier (*cercis filiquastrum* Linn.). Durante, auteur italien, emploie le premier. Le second est plus répandu.

ARBRE AUX ANÉMONES. (Voyez CALYCANT.)

ARBRE D'ARGENT. (Voyez PROTÉE ARGENTÉE, n°. 18.)

ARBRE AVEUGLANT. *Arbor cacans*, Rumph. Amb. 2, pag. 237, tab. 79. Ainsi nommé, parce que son bois est rempli d'un suc laiteux très-caustique, qui occasionne l'aveuglement ou au moins des douleurs très-cuivantes lorsqu'on le fait sauter aux yeux en coupant l'arbre, comme des matelots l'ont éprouvé, au rapport de Rumphé. C'est l'*ex-cacaria* Linn. (Voyez AGALLOCHE D'AMBOINE, n°. 1.)

ARBRE A BATON. C'est une espèce de *calamus*.

ARBRE DE BAUME. On donne ce nom à plusieurs arbres, de quels sort une liqueur balsamique ; mais il est plus particulièrement réservé pour le *bursera gummiifera* Linn. (Voyez GOMART, n°. 1.)

ARBRE DU BRÉSIL. (Voyez BRÉSILLET, *Casalpinia* Linn.)

ARBRE DE RUIS. On nomme ainsi, dans l'île de Bourbon, le *gracaria* des botanistes.

ARBRE A CÉLÉBASSIS. (Voyez CÉLÉBASSIER, *Crocentia* Linn.)

ARBRE DU CANADA. C'est le *rhododendrum maximum* Linn.

ARBRE DU CASTOR. C'est le *magnolia glauca* Linn.

ARBRE DU CIEL, ARBRE DE GORDON. (Voyez GINKGO. *Ginkgo biloba* Linn.)

ARBRE DE CIRE. *Myrica cerifera* Linn. C'est le gâlé ou citier de la Louisiane, petit arbrisseau qui croît dans les lieux marécageux de l'Amérique septentrionale. Sa graine est couverte d'un enduit blanc, qui est une véritable cire, facile à séparer dans l'eau chaude, & employée avec succès dans les usages économiques. (Voyez GALE, n°. 2.) Le même nom est donné à un arbre de Chine, sur lequel une espèce d'insecte dépose une véritable cire.

ARBRE A CHAPELETS. (Voyez AZEDARACH, n°. 1.)

ARBRE DE CORAIL. (Voyez ERYTHRINE, n°. 2.)

ARBRE DE CYTHÈRE, cultivé sous le nom de *hévi* dans l'île de l'Inde ou de Cythère, d'où lui vient son nom. Il a été transporté par Commerson à l'île-de-France. Ses caractères le rangent parmi les *spondias*. (Voyez MONBIN, n°. 3.)

ARBRE DU DIABLE, PET DU DIABLE. On nomme ainsi, en Amérique, le *hura crepitans* Linn., dont le fruit, s'ouvrant avec élasticité, fait une assez forte explosion en jetant au loin les valves qui le composent. (Voyez SABLIER.)

ARBRE DE DIEU. Une espèce de figuier de l'Inde pousse de ses rameaux des jets inférieurs qui, se dirigeant vers la terre, y prennent racine, & forment, par leur accroissement, de nouveaux troncs : d'où il résulte qu'un seul arbre peut ainsi former un bosquet, dont les tiges & les rameaux représentent des arcades & des cloîtres. On le cultive pour cette raison autour des temples ; ce qui l'a fait nommer *arbre de Dieu* (*secus religiosus* Linn.), *figuier des pagodes*. (Voyez FIGUIER, n°. 4.)

ARBRE-DRAGON. C'est le sang-dragon ou le dragonier ordinaire (*dracena drago* Linn.).

ARBRE D'ENCENS, LOIS D'ENCENS. (Voyez ICQUIER & BALSAMIER.)

ARBRE A ENIVRER LES POISSONS. Cette propriété est attribuée à divers végétaux : on la trouve surtout dans le *pisidia* Linn., arbre de la famille des légumineuses. (Voyez BOISIVRANT, n°. 1.)

ARBRE DE FER. Les Portugais de l'Inde nomment ainsi le bois de *naghas* (*mesua ferrea* Linn.), dont le bois est très-dur. D'autres, qui ont un

bois pareil, portent également ce nom ou plus communément celui de *bois de fer*.

ARBRE AUX FRAISES. (Voyez ARBOUSIER.)

ARBRE A FRANGES, ARBRE DE NEIGE. C'est une espèce de *chionanthus* Linn. (Voyez CHIONANTHE, n°. 1.)

ARBRE A LA GOMME. On nomme ainsi, dans la Nouvelle-Hollande, *Eucalyptus resinifera* Smith & le *metrosideros costata* Gein. (Voyez EUCALYPTE & METROSIDEROS, Suppl.)

ARBRE A GRIVES. C'est le *forbus aucuparia* Linn. (Voyez SORBIER DES OISELEURS.)

ARBRE D'HUILE. (Voyez ABRASIN.)

ARBRE IMMORTEL. (Voyez ERYTHRINE.) L'endruich de Madagascar porte aussi ce nom.

ARBRE INDÉCENT. « On ne sait, dit Coisigly (*Voyage à Canton*, pag. 45), pour quel motif les habitants des îles Nicobar, dans le golfe du Bengale, surnomment ainsi le *VACOUA* ou *BAQUOIS*, n°. 1 (*pandanus* Linn. f.). »

ARBRE DE JUDÉE ou DE JUDAS. (Voyez GARNIER. *Cercis* Linn.) On donne aussi, dans les Philippines, le nom d'*arbre de Judas* au *kleinhovia* Linn.

ARBRE LAITEUX. On donne ce nom, en divers pays, aux arbres qui donnent par incision un latex ; ils appartiennent la plupart à la famille des apocinées ou à celle des euphorbes. (*Juss.*)

ARBRE DE MAISON DE SAINT-JEAN. Les Créoles de la Guiane nomment ainsi le *morotoni* des Galibis, qui est une espèce de *panax* Linn. Dans la Guiane on préfère cet arbre à tous les autres pour la cérémonie de planter le mai.

ARBRE DE MATURE. C'est l'*uvaria longifolia* (voyez CANANG, n°. 5), figuré & décrit dans le *Voyage de Sonnerat*, vol. 2, pag. 233, tab. 131 ; il est élevé & très-droit : d'où lui vient son nom. On le trouve sur la côte de Coromandel.

ARBRE A LA MIGRAINE. Cet arbre est ainsi nommé, parce qu'il est regardé à l'île-de-France comme le spécifique de la migraine. C'est le *prema integrifolia* Linn. (Voyez ANDARÈSE.)

ARBRE DE MILLE ANS. (Voyez BOABAB. *Adansonia* Linn.)

ARBRE DE MOÏSE. On donne quelquefois ce

nom, ainsi que celui de *baillon ardent*, au *mespilus pyramidalis* Linn., espèce de néflier.

ARBRE A PAIN. Cet arbre, cultivé dans les îles du grand Océan austral ou mer du Sud, porte un fruit qui a la saveur du pain, & dont les habitants font en partie leur nourriture. Cook & d'autres voyageurs parlent beaucoup de cet arbre, qui est encore connu sous le nom de *rimo*. C'est pour les botanistes une espèce d'*artocarpus*. (Voyez JACQUIER, n°. 1.)

ARBRE A PAPIER. C'est le PAPYRIER de cet ouvrage (*papyrus* Lam. III.), plus généralement connu sous le nom de *mûrier de la Chine*, *mûrier à papier*, dont l'écorce est employée à la Chine pour faire du papier, &c. dans l'île d'Orléans, pour la fabrication des rois de ce pays; il a été décrit sous le nom *broussaisia* par L'heritier.

ARBRE POISON. On donne ce nom, dans divers pays, aux arbres qui contiennent, dans quelques-uns de leurs parties, un suc nuisible, tels que le MANCENILIER, le TOXICODENDRON (*rhus toxicodendron* Linn.), l'UPAS, &c.

ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS. (Voyez GINGO.)

ARBRE DE POIVRE. Le garrillier commun (*vitex agnus castus* Linn.) a été ainsi nommé, parce que son fruit a un peu la forme d'un grain de poivre.

ARBRE PUANT. On connoît sous ce nom plusieurs arbres de divers genres : le *Sterculia foetida* Linn., le *pirigata* de la Guiane, le *foetida* ou *fétidier* de l'île Bourbon.

ARBRE SAINT : nom ancien de l'azedarack, dont les noix étoient employées pour faire des chapelets.

ARBRE ou BOIS DE SAINTE-LUCIE. C'est le cetivier odorant (*prunus mahaleb* Linn.)

ARBRE DE SAINT-THOMAS. C'est le *bauhinia variegata* Linn., ainsi nommé, suivant Zannoni, par les anciens Chrétiens de l'Inde, qui croyoient que ses fleurs avoient été teintes du sang de cet apôtre au moment de son martyre.

ARBRE A SANG : nom donné, dans la Guiane, à un millepertuis en arbre, qui donne par incision un suc rouge.

ARBRE DE SEL. Sonnerat, dans son *Voyage aux Indes*, vol. 2, pag. 58, parle d'un arbre de Madagascar, ainsi nommé parce que sa feuille est employée pour assaisonner les aliments; mais il n'en donne aucune description.

ARBRE DE SOIE. On donne ce nom, soit au *mimosa arborea* Linn., soit au *celtis micranthus*, espèce de micocoulier. Le *periploca graca* Linn. est aussi nommé *arbre à soie* de Virginie.

ARBRE A SUIF. C'est le *eroton feisferum* Linn. (Voyez CROTON, n°. 22.) Il doit être réuni au *supium*. (Voyez GLUTIER, Suppl.)

ARBRE TRISTE. C'est le *nyctanthes arbor tristis* Linn., ainsi nommé parce que les fleurs ne se développent que la nuit, & tombent le matin.

ARBRE AUX TULIPES. *Magnolia* Linn. (Voyez TULIPIER.)

ARBRE AU VERMILLON : nom ancien du chêne kermès.

ARBRE DU VERNIS. On donne ce nom à quelques espèces de sumac (*rhus* Linn.), dont on retire, par incision, un suc qui prend, en se séchant, l'aspect du vernis. On avoit même cru que le vernis de la Chine, si célèbre, étoit tiré d'un sumac; cependant, s'il faut en croire Loureiro, il est fourni par l'arbre qu'il nomme *augia*, très-différent du sumac, & faisant partie de la famille des guttifères. (Juss.) (Voyez AUGIA, Suppl.)

ARBRE DE VIE. (Voyez THUYA.)

ARBUTUS. (Voyez ARBOUSIER.)

ARCHANGEL : nom donné par les habitants de la Barbade à l'eupatoire odorante, au rapport de Plukenet, qui l'a figuré, tab. 177, fig. 3.

ARCHANGÉLIQUE. Ce nom a été employé par les Anciens pour plusieurs plantes de genres différens, pour l'angelique cultivée (*angelica archangelica* Linn.), pour le lamier blanc (*lamium album* Linn.), pour la campanule gantelée (*campanula trachelium* Linn.).

ARCHENAS : nom arabe du genévrier, suivant Dalechamp.

ARCHENDA. C'est une poudre faite avec les feuilles du henné (*lasfonia* Linn.), dont les femmes d'Égypte & de Barbarie se servent pour donner aux ongles de leurs mains & de leurs pieds une couleur d'un jaune-doré.

ARCTIO. (Voyez ARCTIONE, & Illustr. Gen. tab. 664.)

Onopordum rotundifolium. Allion. Flor. pedem. n°. 536. tab. 38. fig. 1.

Villaria subacaulis. Guett. Mem. Dauph. 1. pag. 170. tab. 19.

Bernardia subcaulis. Villars, Dauph. 2. pag. 25. tab. 22.

Ce genre tient le milieu entre les onopordes & les bardanes ; il a pour caractère essentiel :

Un calice composé d'écaillés linéaires, imbriquées, point épineuses ; un réceptacle nu, muni d'alvéoles denticulés à leurs bords ; tous les fleurons hermaphrodites ; les semences couronnées par une aigrette persistante, à poils simples, très-souvent contournées en spirale à leur base.

La germination de cette plante est très-remarquable. Ses graines, étant mises en terre, poussent d'abord deux cotylédons dans une position verticale. La plumule croît sur le côté, va sortir à un ou deux pouces de distance, & paroît en quelque sorte appartenir à une autre plante. Cette observation est due à MM. Ch. ix & Villars.

ARCTION. Dalechamp a donné ce nom à la plante décrite dans cet ouvrage sous le nom d'*arctione* ; il avoit été employé plus anciennement par Dioscoride pour désigner la bardane, connue depuis sous celui de *lappa*. Linné avoit adopté la dénomination de Dioscoride. M. de Jussieu, dans ses Familles naturelles, ainsi que M. de Lamarck, ont cru devoir laisser pour la bardane le nom latin *lappa*, soit parce que Tournefort l'admettoit, soit parce que, dans les descriptions des fruits hérislés, on emploie ordinairement l'expression *fructus lappaceus*, c'est-à-dire, fruit semblable à celui du *lappa*.

ARCTIUM. (Voyez ARCTIONE & BARDANE.)

ARCTOCARPUS. (Voyez JAQUIER.)

ARCTOPUS. (Voyez OURSINE.)

ARCTOTHECA. (Voyez ARCTOTIDE, Suppl.)

ARCTOTHIS. (Voyez ARCTOTIDE.)

ARCTOTIDE. *Arctotis*. Plusieurs espèces, renfermées dans ce genre, s'en caractérisent par des caractères très-marqués, ayant leurs semences couronnées par une double aigrette ; l'intérieure à cinq paillettes scarieuses, comme dans les vrais *arctotis* ; l'extérieure à cinq rayons setacés ; le réceptacle chargé de paillettes, & non de poils. Ces considérations ont déterminé Gaertner à réunir ces espèces dans un genre particulier, qu'il a nommé *arctotis*. (Voyez URINIE, vol. VIII.) D'après cette réforme, on ne doit confondre parmi les arctotides que les six premières espèces décrites dans cet ouvrage, & renvoyer les autres aux *urinia*, ainsi que je l'ai fait, & réduire les arctotides aux caractères suivans :

Un calice hémisphérique, composé d'écaillés imbriquées, scarieuses ; les semences couronnées par une seule aigrette, à cinq ou huit paillettes scarieuses ; le réceptacle garni de poils.

ES PÈCES.

1. ARCTOTIDE sang tige. *Arctotis acaulis*. Linn.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, subaequalis ; foliis depauperatis lyratis, utrinque incanis ; squamis calicinis, exterioribus obtusis & erectis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 16. tab. 158. — Willden. Spec. 3. pag. 2349.

Les demi-fleurs de la circonférence sont tous fertiles ; les tiges très-courtes, couchées, à peine longues d'un pouce ; les feuilles très-souvent blanchâtres à leurs deux faces. (Voyez ARCTOTIDE, n°. 1.)

2. ARCTOTIDE rameuse. *Arctotis calendulacea*. Linn.

Arctotis (calendulacea), flosculis radiantibus sterilibus, lanceolatis, indivisis ; foliis runcinatis pinnatifidis, subtus tomentosis. Willd. Spec. 3. pag. 2347. — Linn. Syst. veget. 659. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 16. tab. 157.

3. *Anemaoxerpos africana, foliis cardui benedicti ; florum radiis intus albis, subtus purpureis*. Commel. Hort. Icon. — Lam. Illustr. tab. 715. fig. 1.

Cette plante se distingue de la suivante & de ses variétés par ses tiges, beaucoup plus fermes, dures, velues, striées ; par les demi-fleurs de la circonférence, plus larges, lancéolées, très-entiers à leur sommet. Les fleurs, dans la variété 3, ont les rayons blancs en dessus, d'une teinte purpurine en dessous. (Voyez ARCTOTIDE, n°. 3.)

3.* ARCTOTIDE trifide. *Arctotis trifida*. Linn.

Arctotis (hypochondriaca), flosculis radiantibus sterilibus, tri-quinquepartitisve ; foliis lyrato-pinnatifidis, dentatis, subtus tomentosis. Willd. Spec. 3. pag. 2348.

Arctotis sulphurea.? Gaertn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 439. tab. 172. — Linn. Ill. tab. 715. fig. 3.

4. *Arctotis trifida*.

Arctotis (hypochondriaca), flosculis radiantibus sterilibus, trifidis ; mediis inflexis. Linn. Syst. veget. 659.

Arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis cadiis profunde trifidis. Roy. Lugd.-Bat. 1799.

Arctotis (trifida), flosculis radiantibus vicinis, tripartitis. Linn. Spec. 1306. — Mill. Dict. n°. 1.

Anemonospermum asra, foliis & facie taraxaci incanis. Batyn. Icon. 27. tab. 15.

6. *Arctotis quadripartita*.

Arctotis (triflora), *foveolulis radiantibus fertilibus*, *quadripartitis*. Linn. Mantiss. 479. — Berg. Plant. Capenf. 320.

7. *Arctotis tripartito-trifida*.

Arctotis (coruscans), *foveolulis radiantibus tripartitis*, *exteriore trifida*. Linn. Syst. veget. 659.

8. *Arctotis quinquepartita*.

Arctotis (superba), *foveolulis radiantibus fertilibus*, *quinquepartitis*; *foliis pinnatis*, *dentatis*; *laciniis bipartitis*. Linn. Spec. Plant. 1305. — Amoen. Acad. 4. pag. 331.

Jacobaea africana, *flabes facie*, *flore ampliore*, *petalis radiantibus tripartitis*. Volk. Notib. 224. tab. 224.

Ses racines produisent plusieurs riges étalées, presque couchées, herbacées, très-foibles, médiocrement ramifiées, corneuses, surtout à leur partie supérieure, p. u. élevées. Les feuilles radicales & inférieures sont longuement pétiolées, molles, un peu épaisses, rombées, en forme de lyre, presque pinnatifides, irrégulièrement déchiquetées ou dentées à leur contour, blanches & tomenteuses en dessous; les supérieures plus petites, distantes. Les pédoncules sont fort longs, frisés, laréaux, cotonneux, terminés par une grande & belle fleur, dont le calice est hémisphérique, couvert de flocons cotonneux; les fleurons du centre jaunes, noirs à leur sommet; les demi-fleurons de la circonférence d'un blanc-plombé, jaunes à leur base, quelquefois d'une légère teinte purpurine.

Cette espèce présente plusieurs variétés dans la forme de leurs feuilles, mais que l'on a plus particulièrement distinguées dans les divisions de leurs demi-fleurons, qui sont à trois découpures assez profondes dans la variété *a*, ayant celle du milieu courbée en dedans; à quatre découpures inégales, souvent aiguës dans la variété *6*; à trois profondes divisions dans la variété *7*, celle du milieu trifide; enfin, la variété *8* présente cinq divisions dans ses demi-fleurons.

L'arctotis trifida, var. *8*, *taraxacoides*, Berg. Plant. Cap. 322, rentre très-probablement dans une des variétés précédentes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

6. ARCTOTIDE laciniée. *Arctotis laciniata*. Lam.

Arctotis aspera. Linn. Spec. Plant. pag. 1307, var. *8*.

8. *Arctotis* (undulata), *subtomentosa*, *foliis pinnatifidis*; *pinnis linearibus*, *dentatis*, *marginibus revolutis-undulatis*. Berg. Plant. Capenf. pag. 317. — Gærtn. tab. 172. fig. 5. — Lam. Illustr. tab. 715. fig. 2.

La variété *8* de l'*arctotis laciniata* de M. de Lamarck ne m'est p'int assez connue pour décider si la plante dont Gærtner a figuré le fruit, & qu'il regarde comme l'*arctotis undulata* de Bergius, est bien la même plante, & si, même dans ce cas, elle doit être distinguée comme espèce d'après ses graines. Gærtner les représente couvertes d'un duvet lanugineux, de forme conique, placées sur un réceptacle alvéolaire, les alvéoles munis à leurs bords de poils aussi longs que les semences. Les écailles du calice sont imbriquées, arrondies, très-obtuses; les demi-fleurons fertiles, ovales-lancéolés; trois petites dents à leur sommet. Les semences, à leur côté intérieur, forment deux faillies en forme d'aile, conniventes, creusées en dedans, & qui représentent comme deux loges vides lorsqu'elles sont coupées transversalement.

Observations. Bergius, dans ses Plantes du Cap de Bonne-Espérance, présente de cette plante, ou plutôt de l'*arctotis aspera*, deux variétés, *1. arctotis chioracea*, pour laquelle il cite la figure de Burman, Plant. Afric. p. 158, tab. 57, fig. 1; & *2. arctotis undulata*, à laquelle il rapporte pour synonymie de Boerh. pag. 100, tab. 100.

7. ARCTOTIDE tricolore. *Arctotis tricolor*. Jacq.

Arctotis foveolulis radiantibus fertilibus; *foliis subtomentosa*, *ovatis*, *integerrimis* *lyratifidis*, *dentatis*; *scapo sulcato*, *unifloro*; *squamis calicinis exterioribus reflexis*. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2349.

Arctotis tricolor, *corollulis radiantibus fertilibus*, *acaulis*; *foliis simplicibus*, *ovatis* *sublyratifidis*, *repandis*, *tomentosa*, *supra viridibus*, *subtus incanis*; *rudis utrinque discolor*. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 27. tab. 159.

Cette plante n'a point de tige. Ses racines sont filiformes, de la grosseur du doigt, garnies de fibres; elles donnent naissance à des feuilles pétiolées, étalées, les unes ovales, très-entières, & d'autres échancrées en lyre & dentées, tomenteuses, blanchâtres en dessous, vertes en dessus. De leur centre s'élèvent des hampes filonées, hérissées de poils rougeâtres, hautes d'un pied, uniflores. Les écailles du calice sont pubescentes, réfléchies; les fleurons du centre d'un pourpre-foncé; les demi-fleurons de la circonférence fertiles, d'un blanc de neige en dedans, d'un rouge de sang en dehors; le réceptacle pileux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7

8. ARCTOTIDE

8. ARCTOTIDE ondulée. *Arctotis undulata*. Jacq.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, acutis; foliis simplicibus sublyratique, dentatis, undulatis, subius tomentosis & incanis, supra punctato-hirsutis & virentibus; radio utrinque concolore. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 17. tab. 160. — Willd. Spec. 3. pag. 2349. (Non Berg. & Gertn.)

Arctotis (lanata), foliis obovatis, dentato-lyratis, supra scabris, subius tomentosis; scapis folio longioribus. Thunb. Prodr. 165.

Toutes ses feuilles font radicales, pétiolées, simples, ovales ou légèrement échancrées en forme de lyre, ondulées & dentées à leur contour, blanches & tomenteuses en dessous, verdâtres en dessus & parsemées de points rudes. Il n'y a point de tige. Les hampe partent immédiatement des racines; elles sont droites, simples, plus longues que les feuilles, striées, uniflores. Les calices font composés d'écailles presque nûtres, imbriquées, scarieuses; les extérieures réfléchies, les fleurons du disque d'un pourpre-noirâtre; les demi-fleurons fertiles, jaunes extérieurement, d'un jaune-orangé à l'intérieur; le réceptacle velu.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. 4

9. ARCTOTIDE élégante. *Arctotis speciosa*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; foliis pubescentibus, subius tomentosis, pinnatifidis, dentatis; lobo terminali triangulo, trinervio; scapo foliis brevior; calicinis squamis exterioribus reflexis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2350.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, acutis; foliis longe lyratis, argute serratis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 18. tab. 161.

Arctotis (grandiflora), flosculis radiantibus fertilibus; foliis pinnatifidis, denticulatis, arachnoideis, trinerviis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 272. ?

Arctotis (breviscapo), foliis pinnatifidis, dentatis, subius tomentosis; scapis folio longioribus. Thunb. Prodr. 165.

C'est une espèce remarquable par ses grandes & belles fleurs, placées à l'extrémité d'une hampe plus courte que les feuilles, ayant les écailles extérieures de leur calice hérissées, réfléchies en dehors; les fleurons de la corolle jaunes; les demi-fleurons de la circonférence fertiles, à trois dents, de couleur pourpre à l'extérieur, d'un jaune-foncé à l'intérieur, avec des taches d'un rouge de sang à la base. Les feuilles font toutes radicales, pétiolées, pubescentes, tomenteuses en dessous, allongées, pinnatifides, les découpures dentées; le lobe terminal triangulaire, tra-

Botanique. Supplément. Tome 1.

versé par trois nervures. Les semences font pileuses, ainsi que le réceptacle.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. 4

10. ARCTOTIDE à feuilles glauques. *Arctotis glaucophylla*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; foliis canescentibus, pinnatifidis, repando subdentatis; caule basi ramoso; calicinis squamis exterioribus reflexis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2350.

Arctotis corollis radiantibus fertilibus; foliis pinnatifidis, sublyratis, dentatis, supra glaucis, subius incanis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 22. tab. 170.

Cette plante est légèrement tomenteuse, d'une odeur désagréable. Ses tiges font hautes d'un pied, ramifiées à leur base, garnies de feuilles alternes, pétiolées, pinnatifides, oblongues, presqu'en lyre; les découpures sinuées & légèrement dentées à leurs bords, blanchâtres en dessous, d'un vert-glauque en dessus. Les fleurs font solitaires à l'extrémité de leur pédoncule; les écailles extérieures du calice réfléchies, velues, subules; le disque de la corolle d'un pourpre-noirâtre; les demi-fleurons fertiles, d'un jaune-foncé en dedans, & d'un violet-pâle en dehors.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. 4

11. ARCTOTIDE couchée. *Arctotis decumbens*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule procumbente; foliis oblongo-lanceolatis, inaequaliter dentatis, canescentibus, subius tomentosis, trinerviis; calicinis squamis exterioribus adpressis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2351.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caulis decumbentibus; foliis lanceolatis, dentato-serratis, tomentosis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 68. tab. 381.

Arctotis foliis obovato-oblongis, dentatis, tomentosis; caule decumbente. Thunb. Prodr. 164.

Ses racines produisent des tiges étalées, couchées sur la terre, un peu redressées, garnies de feuilles alternes, oblongues, lancéolées, inégalement dentées en scie à leur contour, blanchâtres & tomenteuses en dessous, marquées de trois nervures. Les écailles extérieures du calice font serrées, verdâtres, lancéolées, acuminées, point réfléchies. La corolle a trois fleurons de couleur jaune; les demi-fleurons fertiles d'un pourpre-cuivreux en dehors, d'un jaune-pâle en dedans; les semences hérissées, couronnées par six paillettes, le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7.

12. ARCTOTIDE flaque. *Arctotis flaccida*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule ramofo, herbaceo, ascendente; foliis spatulato-lanceolatis, integerrimis, trinerviis, pubescentibus; calicinis squamis omnibus reflexis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2352.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, annua; caule ramofo, flaccido; foliis lanceolatis, subintegerrimis, subternatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 19. tab. 163.

Plante annuelle, d'une odeur repoussante, dont les tiges sont molles, renversées, rameuses, à peine ascendantes, garnies de feuilles alternes, lancéolées, spatulées, presque entières, pubescentes, tomenteuses à leur face inférieure, marquées de trois nervures; les écailles du calice tomenteuses, imbriquées, toutes réfléchies à leur sommet. Les fleurons du disque sont d'un pourpre-foncé; les demi-fleurons de la circonférence fertiles, de couleur blanche, jaunâtres vers leur base, teints de rouge à leur sommet; l'ovaire un peu velu, ainsi que le réceptacle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 6.

13. ARCTOTIDE filée. *Arctotis virgata*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule ramofo, erecto, herbaceo; foliis linearis-lanceolatis, subius pubescentibus, trinerviis, basi subcuneatis; calicinis squamis exterioribus patentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2353.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, annua; caule ramisque virgatis, foliis lanceolato-linearibus, integerrimis vel denticulatis, glabrisculis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 32. tab. 307.

Ses tiges sont grêles, droites, annuelles, ramifiées; les rameaux effilés, alongés, garnis de feuilles simples, alternes, linéaires-lancéolées, très-entières ou légèrement denticulées, presque glabres, pubescentes en dessous, traversées par trois nervures; les pédoncules uniflores; les écailles extérieures du calice étalées, mais point réfléchies; le disque de la corolle d'un pourpre-foncé; les demi-fleurons de la circonférence fertiles, de couleur jaune à leurs deux faces.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 6.

14. ARCTOTIDE paniculée. *Arctotis paniculata*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule erecto, paniculato; foliis angust lanceolatis, den-

tatis, subius tomentosis; calicinis squamis exterioribus reflexis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2353.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule fruticoso, toto paniculato; foliis angust oblongis, dentatis, subius incanis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 380.

Cette espèce s'élève droite sur une tige velue, ligneuse, divisée en rameaux étalés, formant une sorte de panicule par leur ensemble. Les feuilles sont oblongues, étroites, lancéolées, dentées en scie à leurs bords, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les écailles extérieures du calice presque glabres, subulées, réfléchies en dehors; la corolle d'un pourpre-noirâtre à son disque; les demi-fleurons fertiles, de couleur blanche en dessus, traversée par des veines d'un rouge de sang, d'un pourpre-foncé en dessous & à la base; les semences de la circonférence couronnées par huit paillettes; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 6.

15. ARCTOTIDE décurrense. *Arctotis decurrens*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule fruticoso; foliis hirsutis, oblongis, indivisis, subternatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2353.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, caule fruticoso; foliis integris, utrinque hirtulis, denticulatis, per petiolum amplexicaulem decurrentibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 10. tab. 165.

Ses tiges sont ligneuses, épaisses, hautes de deux ou trois pieds, garnies de feuilles simples, alternes, oblongues, très-entières ou légèrement denticulées, décurrense sur un pétiole amplexicaule, hirsutes, ainsi que les tiges, de poils roides à leurs deux faces. Le disque de la corolle est jaune; les demi-fleurons fertiles, de couleur blanche, d'un rose-tendre en dessous; les semences glabres; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 6.

16. ARCTOTIDE traînante. *Arctotis reptans*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule herbaceo, ascendente; foliis hirsutis, subius incanis, inferioribus lycto-dentatis, superioribus lanceolatis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2354.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, radice reptante; caulibus fruticoso, ascendentes; ramis erectis; foliis inferioribus sublyctis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 69. tab. 382.

Arctotis interrupta. Thunb. Prodr. 165. ?

Ses racines sont rampantes; les tiges presque ligneuses, cylindriques, hérissées, longues d'un pied & demi, couchées à leur partie inférieure, puis ascendantes & redressées; les feuilles inférieures dentées & échancrées en lyre; les supérieures lancéolées, simplement dentées, blanchâtres en dessous, hérissées de poils roides. Les calices sont glabres, presque globuleux; les écailles extérieures courtes, lancéolées, subulées; la corolle jaune à son disque; les demi-fleurs striées, jaunâtres en dehors, d'un blanc-jaunâtre en dedans, d'un brun-foncé à leur base; les semences couronnées par huit paillettes; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7.

17. ARCTOTIDE auriculée. *Arctotis auriculata*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule fruticoso, novo-tomentoso; foliis lyratiss, amplexicaulis, tomentosis, dentatis; lobis terminalibus rhombeo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2354.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, caule frutescente; foliis sublyratis, dentatis, acutis, tomentosis, incanis, sessilibus; lobis extimis rhombeo. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 22. tab. 169.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ trois pieds, couvertes d'un duvet tomenteux, d'un blanc de neige, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, en forme de lyre, blanches & tomenteuses en dessous, dentées, à lobes aigus; le lobe terminal rhomboïdal. Les fleurs sont pédonculées, solitaires sur chaque pédoncule; la corolle d'un pourpre-foncé à son disque; les demi-fleurs fertiles, d'un jaune foncé; le réceptacle velu. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

18. ARCTOTIDE fastueuse. *Arctotis fastuosa*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule erecto, herbaceo; foliis hirsutis, oblongis, dentatis; calicinis squamis exterioribus reflexis, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2354.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus; ? annua, tota pilosa; caule ramoso, erecto; foliis sinuatis, dentatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 20. t. b. 166.

Cette plante est toute hérissée de poils roides. Ses tiges sont droites, herbacées, annuelles, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles oblongues, dentées, sinuées, pileuses. Les écailles extérieures du calice sont ciliées à leurs bords, terminées en une pointe linéaire, rabattues en dehors; les fleurons du centre d'un pourpre-noirâtre; les demi-fleurs de la circonférence d'un jaune-orangé, avec des taches de sang à leur base;

ils paroissent fertiles, mais ils ont besoin d'être mieux observés. Les semences font glabres, point couronnées; le réceptacle garni de paillettes subulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 0.

19. ARCTOTIDE épineuse. *Arctotis spinulosa*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus; caule erecto, herbaceo; foliis cano-hirsutis, viscosis, oblongis, amplexicaulis, mucronato-dentatis; calicinis squamis exterioribus paucis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2355.

Arctotis corollulis radiantibus fertilibus, annua; foliis amplexicaulis, hirsutis, inciso-dentatis; dentatis mucronatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 21. tab. 167.

Ses tiges sont droites, annuelles, herbacées; les feuilles sessiles, alternes, oblongues, amplexicaules, hérissées de poils blanchâtres & visqueux, incisés, dentées à leur contour; les dentelures terminées par une petite pointe presque épineuse. Les écailles extérieures du calice sont lancéolées, subulées, aiguës, pileuses, très-étalées; le disque de la corolle d'un jaune-foncé; les demi-fleurs de la circonférence d'un jaune-orangé, noires à leur base; le calice couronné par huit folioles blanches, oblongues, inégales; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 0.

20. ARCTOTIDE maculée. *Arctotis maculata*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule suffruticoso; foliis pinnatifido-lyratis, angulato-dentatis, subtus tomentosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2355.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule suffruticoso; foliis pinnatifidis, convertis, subtus tomentosis; corollulis radiis internis albidis, ad apicem maculatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 67. tab. 379.

Arctotis (caulescens), foliis lyrate-pinnatifidis, dentatis, superius scabris; foliis tomentosis, caule erecto. Thunb. Prodr. 165.

Cette espèce a ses tiges droites, un peu ligneuses, courtes, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles nombreuses, très-rapprochées, pinnatifides, presque en lyre; les découpures anguleuses, dentées à leurs bords, tomenteuses à leur face inférieure. Les fleurs sont odorantes; le calice presque glabre; les écailles extérieures subulées à leur sommet. Le disque de la corolle est d'un pourpre

très-foncé; les demi-fleurs de la circonférence fertiles, d'un jaune-orangé en dehors, blanchâtres en dedans, tachetés à leur sommet; les semences un peu velues, surmontées de six pailettes oblongues; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

21. ARCTOTIDE à grandes fleurs. *Arctotis grandiflora*, Jacq.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule suffruticoso; foliis pinnatifidis, dentatis, subius tomentosis; laciniis linearibus; calycinis squamis exterioribus adpressis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2355.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule suffruticoso; foliis pinnatis, subtomentosis, superne recurvatis; pedunculo longissimo. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 67. tab. 378.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, à rameaux alternes, peu nombreux, velus, terminés par un pédoncule long d'un pied; les feuilles pinnatifides, tomenteuses en dessous, les découpures linéaires, dentées à leur contour, recourbées à leur sommet; les écailles calicinales extérieures ferrées & imbriquées; la corolle d'un jaune-obscure à son centre; les demi-fleurs d'un jaune-orangé à leurs deux faces, avec des taches de sang à leur base; les semences velues, couronnées par six pailettes; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

22. ARCTOTIDE en lyre. *Arctotis lyrata*, Willd.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule suffruticoso, erecto; foliis cano pubescentibus, lyrate-pinnatifidis; laciniis oblongis, obtusis, angulato-auratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2356.

Cette plante ressemble beaucoup à l'*Arctotis aspera*, n.º 5; elle en diffère par ses feuilles en lyre, pinnatifides, couvertes, tant en dessus qu'en dessous, d'un duvet blanchâtre, plus larges & plus courtes; les découpures oblongues, obtuses, anguleuses, dentées, point réfléchies à leur bord; les dentelures légèrement mucronées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

23. ARCTOTIDE étalée. *Arctotis elatior*, Jacq.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule suffruticoso, erecto; ramis tomentosis hirsutis; foliis pinnatifidis, subius tomentosis; laciniis lacini-lanceolatis, angulato-auratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2357.

Arctotis corallulis radiantibus fertilibus; caule fru-

tescente, erecto; foliis pinnatifidis, subius tomentosis, incanis, undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 23. tab. 172.

Ses tiges sont hautes de trois à quatre pieds, cylindriques, tomenteuses, droites, ligneuses, divisées en rameaux étalés, tomenteux, hispides, garnis de feuilles alternes, pinnatifides, blanchâtres, tomenteuses en dessous, à découpures linéaires, lancéolées, anguleuses, dentées & ondulées à leurs bords, mais point recourbées; les dentelures point mucronées; les écailles extérieures du calice velues, prolongées en une pointe lancéolée, un peu aiguë, recourbée. Le disque de la corolle est jaune; les demi-fleurs jaunes en dessous, marquées en dessus de nervures purpurines; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

24. ARCTOTIDE arborescente. *Arctotis arborescens*, Jacq.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule fruticoso, erecto; pedunculis pilosis; foliis pinnatifidis, canescentibus, subius tomentosis; laciniis linearilanceolatis, angulatis, mucronato-dentatis, undulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2357.

Arctotis corallulis radiantibus fertilibus; caulibus fruticosis, teretibus; foliis pinnatifidis, subquarrosus, tomentosis, subtus incanis, undulatis, obtusis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 23. tab. 171.

Arctotis (undulata), foliis pinnatifidis, denticulatis, tomentosis; caule fruticoso. Thunb. Prodr. 165.

Cette plante a la forme d'un petit arbrisseau. Ses tiges sont droites, ligneuses, ramifiées, un peu tomenteuses; ses rameaux couverts, dans leur jeunesse, d'un duvet soyeux; les feuilles alternes, pinnatifides, un peu scarieuses, blanchâtres & coruscantes en dessous; les découpures linéaires-lancéolées, anguleuses, ondulées, obtuses à leur sommet, dentées & mucronées à leurs bords. Les pédoncules sont pileux; les écailles extérieures du calice velues, subulées, réfléchies; la corolle jaune dans son disque; les demi-fleurs fertiles, de couleur rose en dehors, d'un blanc de neige en dedans, d'un jaune-orangé à leur base; le réceptacle velu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

25. ARCTOTIDE rabrue. *Arctotis revoluta*, Jacq.

Arctotis bifolius radiantibus fertilibus; caule erecto, herbaceo; foliis pinnatifidis, incanis, subius tomentosis; laciniis lanceolatis, angulato-dentatis, margine revolutis. Willd. Spec. 3. pag. 2357.

Arctotis corollatis radiantibus fertilibus, annua; foliis pinnatifidis, utrinque arancofo-tomentosis, subulis olivis; lobis diffusis, oblongis, ad oras revolutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 24. tab. 173.

C'est une plante annuelle, couverte d'un duvet semblable à une toile d'araignée. Les tiges sont droites, herbacées, garnies de feuilles alternes, pinnatifides, blanchâtres, tomenteuses en dessous; les découpures d'âmes, oblongues, lancéolées, anguleuses, dentées & roulées à leurs bords; les écailles extérieures du calice foliacées, recourbées. Les fleurons du disque sont jaunes; les demi-fleurons de la circonférence fertiles, jaunes à leurs deux faces, noiatrés en dedans à leur base; les pédoncules foyeux à leur extrémité; les semences couronnées par six à sept paillettes; le réceptacle velu.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Espérance. O

26. ARCTOTIDE cuivreuse. *Arctotis cuprea.* Jacq.

Arctotis fusculis radiantibus fertilibus; caule fruticofo, erecto; foliis furvis tomentosis; laciniis linearibus, subpinnatifidis, undulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2358.

Arctotis corollatis radiantibus fertilibus, caule frutescente; foliis pinnatifidis, supra glabrescens, ad oras undulatis & rigidis; pinnis omnibus linearibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 25. tab. 176.

Arctotis denudata. Thunb. Prodr. 165.

Ses tiges sont droites, ligneuses, visqueuses, à peine velues, hautes de quatre pieds, garnies de feuilles alternes, pinnatifides, glabres en dessus, tomenteuses en dessous; toutes les pinnules linéaires, quelquefois découpées, roides, ondulées à leurs bords. La corolle est jaune à son disque; les demi-fleurons fertiles, jaunâtres en dedans, de couleur purpurine en dehors.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Espérance. H

27. ARCTOTIDE scarieuse. *Arctotis squarrosa.* Jacq.

Arctotis fusculis radiantibus fertilibus; caule fruticofo, erecto; foliis glabrescens, pinnatifidis; laciniis linearibus, pinnatifidis, dentatis, undulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2358.

Arctotis corollatis radiantibus fertilibus, caule fruticofo; foliis profundissime pinnatifidis, utrinque glabrescens & viridibus, dentatis, squarrosos, rigidis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 25. tab. 177.

Elle a beaucoup de rapport avec la précédente, dont elle diffère par ses feuilles pétioles, vertes

& glabres à leurs deux faces, roides, scarieuses, profondément pinnatifides; les découpures linéaires, incisées ou dentées, ondulées. Les tiges sont droites, brunes, épaisses, hautes de deux pieds; les fleurons du centre de couleur jaune; les demi-fleurons de la circonférence d'un jaune-orange, tant en dessus qu'en dessous, traversés par des nervures purpurines.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Espérance. H

28. ARCTOTIDE cinéraire. *Arctotis cineraria.* Jacq.

Arctotis fusculis radiantibus fertilibus, caule fruticofo; foliis inono tomentosis, longis petiolatis, pinnatifidis; laciniis lanceolatis, ovatis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2358.

Arctotis corollatis radiantibus fertilibus, caule fruticofo; foliis pinnatifidis, tomentosis, incanis; radice reptante. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 24. tab. 174.

Arctotis candida. Thunb. Prodr. 165.

Cette espèce ressemble un peu au *cineraria maritima* par son port & par sa forme, ainsi qu'à la couleur de ses feuilles. Ses racines sont rampantes & ramufes; les tiges presque ligneuses à leur base, hautes d'un pied & plus, alternes, longuement pétioles, blanches & tomenteuses, pinnatifides, à découpures lancéolées, obtuses, dentées; les écailles extérieures du calice courtes, velues, lancéolées, subulées; les autres ovales; la corolle noirâtre à son disque; les demi-fleurons d'un jaune-orange en dessus, plus foncé à la base, d'un gros jaune en dessous, de couleur brune à la base; les semences presque tétragones, incisées, couronnées par huit paillettes; le réceptacle velu.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Espérance. H

29. ARCTOTIDE glabre. *Arctotis glabrata.* Jacq.

Arctotis fusculis radiantibus fertilibus, caule fruticofo; foliis glabris, pinnatifidis, margine revolutis; laciniis lanceolatis, acutis, acutatis; calicinis squamis exterioribus erectis-fusilis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 2359.

Arctotis corollis radiantibus fertilibus, caule fruticofo, erecto glabrescens; foliis pinnatifidis, acutis; pinnis extendi latiore. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 25. tab. 175.

Arctotis levis. Thunb. Prodr. 165.

Cette plante est glabre sur toutes ses parties. Ses tiges sont ligneuses, cyindriques, un peu striées, garnies de feuilles alternes, pinnatifides, roulées à leurs bords; les découpures lancéolées, dentées, aiguës à leur sommet; la terminale plus grande;

les écailles du calice un peu onvertes & tédreées; la corolle d'un pourpre-foncé à son diſque; les demi-fleurs jaunes en d. hors, teints de pourpre vers leur ſommet; les ſemences couronnées par cinq paillottes; le réceptacle velu.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Eſpérance. 7

* *ARCTOTHECA*. Vendl. Réceptacle alvéolaire, garni de paillottes; ſemences non aigretées; calice imbriqué.

30. *ARCTOTIDE* rampante. *Arctotis repens*. Jacq.

Arctotis floſculis radiantibus ſterilibus, receptaculo paleaceo, ſcapis uniſloris, foliis pinnatifidis, caule repente. Jacq. Hort. Schoenbr. pag. 31. tab. 306.

Arctotis (ſcapigera), foliis interruptè pinnatifidis, tomentofis; ſcapis foliis aequalibus. Thunb. Prodr. 165.

Arctotheca repens. Vendl. Hort. Herrenhuf. pag. 8. tab. 6. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2365.

Cette plante, dont on a fait un genre particulier, reſſemble parfaitement aux arctotides par ſon port: elle ſe rapproche des *uſſia* par ſon réceptacle garni de paillottes; elle diſſère de ces deux genres par ſes ſemences non aigretées. S. s riges ſont dures, rampantes, un peu redreſſées, blanches & tomenteuſes, garnies de touſſes de feuilles pétiolées, pinnatifides, verdâtres, un peu pubeſcentes en deſſus, coronnées & très-blanches en deſſous; les découpages irrégulières, ſinuées ou incisées, dentelées, la plupart lancéolées; la terminale plus large, à pluſieurs lobes inégaux.

Il fort d'entre les feuilles pluſieurs pédoncules ſimples, droits, cotonneux, à peine plus longs que les feuilles, terminés par une fleur d'une grandeur médiocre. Le calice eſt compoſé d'écailles blanchâtres, ſcarieuſes, ovales, imbriquées; les ſteurs du centre un peu jaunâtres; les demi-fleurs de la circonférence ſtériles, d'un jaune-pâle & verdâtre, linéaires, obtus, preſqu'entiers à leur ſommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Eſpérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

* *Eſpèces douteuſes ou moins connues.*

* *Arctotis* (argentea), floſculis radiantibus ſerilibus; foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, tomentofis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 273.

Arctotis foliis lanceolatis, lanatis. Thunb. Prodr. 164.

Ses feuilles ſont lancéolées, linéaires, très-en-

tières, chargées d'un duvet lanugineux; les demi-fleurs de la circonférence rous fertiles.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Eſpérance. 7

* *Arctotis* (linearis), foliis linearibus, tomentofis. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (pinnatifida), foliis linearibus, dentatis, tomentofis. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (glandulosa), foliis cordatis, oblongis, glandulosis, ſcabris. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (grandis), foliis petiolatis, oblongis, ſerratis, tomentofis. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (elongata), foliis obovato-oblongis, dentatis, tomentofis; caule erecto. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (diffusa), foliis obovato-oblongis, dentatis, tomentofis; ſcapis uniſloris. Thunb. Prodr. 164.

* *Arctotis* (scabra), foliis lanceolatis, dentatis, ſupra ſcabris, ſubtus tomentofis; caule erecto, ſtrifcente. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (incisa), foliis oblongis, incisis, biferratis, tomentofis; caule hiſpido. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (muricata), foliis oblongis, tyrao-dentatis, ſupra ſcabris, ſubtus tomentofis; caule levit. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (petiolata), foliis ovatis, incisis, dentatis, ſubtus tomentofis; caule decumbente, rudicante. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (sermola), foliis pinnatifidis, tomentofis; caule baſi decumbente. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (peſtinata), foliis bipinnatifidis, piliferis, glabris; caule frutiſcoſo. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (elegans), foliis lobatis, dentatis, ſubtus tomentofis; caule frutiſcoſo. Thunb. Prodr. 165.

* *Arctotis* (trifida), foliis linearibus, trifidis, pubeſcentibus. Thunb. Prodr. 166.

* *Arctotis* (nodosa), foliis nodosis, pinnatis, glabris; caule frutiſcoſo. Thunb. Prodr. 166.

* *Arctotis* (mediculis), foliis bipinnatis, glabris, punctatis; ſcapo uniſloro. Thunb. Prodr. 166.

* *Arctotis* (cernua), foliis bipinnatis, glabris; caule frutiſcoſo, erecto; floribus cernuis. Thunberg, Prodr. 166.

* *Arctotis* (sericea), foliis bipinnatis, hiſutis. Thunb. Prodr. 166.

Toutes ces eſpèces, dont quelques-unes ſont

lign-ufes, croiffent au Cap de Bonne-Efpérance, où elles ont été obfervées par Thunberg.

* ARCTOTIDE tofe. *Arctotis rofea*. Jacq.

Arctotis flosculis radiantibus fertilibus, caule procumbente; foliis spatulato-lanceolatis, repando-dentatis, incanis; pappo dupliçi. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2351.

Arctotis corollæ radiantibus fertilibus, caudibus procumbentibus; foliis lanceolatis, dentatis, aversis; caliculo perminis geminato. Jacq. Hort. Schoenb. 2. pag. 18. tab. 162.

Cette efpèce, à raifon de la double aigrette qui couronne fes femences, paroît appartenir au moins autant aux *urfoia* qu'aux *arctotis*. Ses racines produifent des tiges couchées, éraïées, garnies de feuilles alternes, lancéolées, prefque fpatulées, alongées, finuées, d-nées à leur contour, blanchâtres, couvertes de filcons cotonneux, refemblant prefqu'à des toiles d'araignées. Les calices font légèrement velus; les écailles inférieures lancéolées, fubulées, recourbées. Les corolles ont leurs demi-fleurs fertiles, couleur de rofe-tendre à leurs deux faces; les fleurs du centre d'un pourpre-foncé; les femences pileufes, furmontées d'une double aigrette, ou plutôt de paillettes oblongues, obtufes, placées fur deux rangs; le réceptacle pileux.

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpérance. ♀

* ARCTOTIDE à feuilles de ftacé. *Arctotis ftacicefolia*.

Arctotis acaulis, foliis cespitofis, anguftiffimis, fubintegris, glabris; foliolis calicinis linearilanceolatis; pappo folitario. (N.)

Cette plante, dont je n'ai point obfervé les femences, eft remarquable par fon calice, composé d'un grand nombre de folioles étroites, oblongues, linéaires-lancéolées, aiguës, légèrement pileufes. Ses feuilles font nombreuses, ramaffées en gazon, torses radicales, très-étroites, longues de deux ou trois pouces & plus, à peine larges d'une ligne, obtufes, très-entières, très-glabres, quelquefois munies à leurs bords de quelques petites dents écartées.

De leur centre s'élève une hampe roide, droite, ftrée, hériffée de poils roides & courts, terminée par une feule fleur, au moins de la grandeur de celle de l'*arctotis trifida*. Les fleurs du centre font d'un jaune-pâle, de couleur brune à leur fomme; les demi-fleurs lancéolées, obtus, à trois dents, blancs en dehors, avec une teinte purpurine vers l'un bafe, d'un jaune-clair en dedeffus. Le réceptacle eft alvéolaire, prefque nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. (V. f. in herb. Desfont.)

* ARCTOTIDE à feuilles menues. *Arctotis tenuifolia*.

Arctotis caule fruticofa, glabra; foliis fufciformibus, glabris, apice trifidis; pedunculis longifimis, urfatis. (N.)

Ses tiges font dures, ligneufes, glabres, cylindriques, médiocrement rameufes, garnies de feuilles éparfes, nombreuses, alongées, prefque filiformes, glabres, prefque tuberculées, divifées à leur fomme en trois découpees courtes, aiguës. Quelquefois, mais très-rarement, on remarque deux autres petites folioles oppofées, de même forme que les découpees terminales, & beaucoup au deffous d'elles. Les rameaux fe terminent par un long pédoncule grêle, cylindrique, très-glabre, foutenant une feule fleur d'une grandeur médiocre.

Le calice eft glabre, composé d'écailles brunes, fcarieuses, imbriquées; les extérieures plus étroites, à peine ouvantes, aiguës. Les fleurs font jaunâtres, cotonneux à leur bafe. Je n'ai point obfervé de demi-fleurs, mais des paillettes à la circonférence, planes & tronquées. Je n'ai pas vu les femences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ♂ (V. f. in herb. Desfont.)

Bergius a fait mention de quelques autres efpèces d'arctotides que je ne trouve citées, ni chez les auteurs modernes, ni dans ce genre, ni dans aucun autre. Son *arctotis bellidifolia*, n°. 9, a les femences velues, furmontées d'une aigrette à cinq paillettes; le réceptacle garni de paillettes; les demi-fleurs à peine plus longs que les fleurs. L'*arctotis populifolia*, n°. 5. Ses femences font couronnées par cinq à fix paillettes. Le réceptacle eft tomenteux. Dans l'*arctotis fackadifolia*, les femences font velues, couronnées par une aigrette membraneufe; le réceptacle pileux. Ces efpèces paroiffent, les uns devoir rentrer dans d'autres genres, les autres fe rapprocher d'autres déjà mentionnés. Il faudroit les mieux connoître pour prononcer.

ARCYRIA. (Voyez SIÉMONTE.)

ARDSIA. (Voyez TIMÉLIER.) *Anguillarja*. « Ce genre, dit M. de Juffieu, qui ne le rapporte à aucune famille connue, doit en former une, voisine des fapotilliers, & qui fera diftinguée par le point d'attache de les étamines, l'unité de fa graine, la difpofition & la forme de fon embryon, qui eft alongé, cylindrique, occupant, dans une direction horizontale, le centre d'un péricérme charnu, très-dur. »

Ce genre a été établi prefqu'en même tems par

plusieurs auteurs, sous des noms différens. C'étoit l'*hebertia* de Banks, mais consigné seulement dans ses manuscrits. Swartz le publia le premier, sous le nom d'*ardisia*; il en décrivit cinq espèces d'Amérique. Gærtner, qui connut les graines de deux autres espèces d'Amérique & de l'Inde, les nomma *anguilaria*, à cause de la forme de leur embryon. Ce nom a été conservé par M. de Lamarck. M. de Jussieu cite, dans son *Genera*, deux des espèces précédentes, auxquelles il ajoute le bois de pinède de l'île Bourbon, sous le nom de *badula*, qui porte l'une d'elles à Ceilan. L'*icaecora* de la Guinée, décrit par Aublet, tab. 368, a été réuni avec raison à ce genre. L'*atriphyllum* de Lourcero, Flor. cochin. pag. 368, doit encore s'y rapporter.

« En examinant de nouveau avec soin le *wal-lenia* de Swartz, ajoute M. de Jussieu; le *rapanea* d'Aublet, tab. 46; le *bladdia* de Thunberg, Flor. jap. tab. 18; le *wedela* d'Adanson ou *viscoides*, Plum. Icon. 258, fig. 5; le *mangilla* de Jussieu ou *caballaria* de Ruiz & Pavon, on sera peut-être forcé de les réunir encore à l'*ardisia*, où, s'ils en restent séparés, ils concourront avec ce genre à grossir la nouvelle famille qu'il convient d'établir. »

ARDUINA. Ce genre, de la famille des plantes apocynées, a été réuni depuis long-temps au calac (*carissa* Linn.), dont il diffère seulement par les lozes de son fruit, remplis d'une seule graine. (Voyez CALAC, n°. 4.)

AREC. *Areca.* Les espèces renfermées dans ce genre ont l'aspect de petits dattiers, qui s'élèvent sur une colonne cylindrique, très-déliée, au sommet de laquelle naissent un faisceau de grandes feuilles ailées, & au dessous d'elles des panicules, chargées, les unes d'un grand nombre de petites fleurs, les autres de fruits. Le tronc est plein de moëlle. Les feuilles sont sans cesse renouvelées au centre du faisceau, à mesure que les plus extérieures périssent: celles-ci laissent sur l'arbre, après leur chute, des inégalités circulaires ineffaçables. Les panicules, enfermées avant leur développement dans une spathe d'une seule pièce, naissent entre les bases des pétioles, très-élargies & creusées souvent en coquette. Les fleurs mâles ont neuf étamines, & les femelles un ovaire à trois stigmates, qui devient un fruit ovale, environné à sa base par le calice persistant, composé à l'extérieur d'une enveloppe épaisse, d'abord charnue, puis sèche, contenant une amande creusée à sa base d'une petite cavité, dans laquelle est logé un embryon inférieur.

M. Bory-Saint-Vincent a découvert à l'île-de-France plusieurs nouvelles espèces d'*areca*, qui doivent être réunies à celles mentionnées dans cet ouvrage.

1. **AREC de l'Inde.** *Areca catheca.* Linn. Spec. 1659. — Roxb. Corom. 1. pag. 54. tab. 75. — Lam. Ill. tab. 895. fig. 1.

Areca faufel. Gærtner. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 18. tab. 7. fig. 2. — Cxalp. 83. — Blackw. Herb. tab. 387.

Fausel. J. Bauh. Hist. 1. pag. 389. Ic. — Stap. Theophr. 356. — Worm. Mus. 199.

4. **AREC globulifère.** *Areca globulifera.* Lam. Ill. tab. 895. fig. 2.

Areca oxytaformis. Gærtner. de Fruct. & Sem. 1. pag. 20. tab. 7.

7. **AREC à tige basse.** *Areca humilis.* Willd.

Areca frondibus pinnatis; foliolis curviformibus, truncatis; stipitibus spadicibusque ramosis, levibus; fructibus globofo-ovatis, acutis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 395.

Pinanga saxatilis, oxytaformis. Rumph. Amb. 1. pag. 41. tab. 7.

Son tronc ne s'élève qu'à la hauteur de cinq à six pieds; il est fort grêle, & se couronne de feuilles ailées, longues de cinq pieds, composées de folioles alternes, sessiles, rétrécies en coin à leur base, tronquées irrégulièrement à leur sommet, qui est en même temps denticulé ou incisé; les dentelures aiguës. Les panicules sont rameuses, très-lisses; les fruits fort petits, ovales, un peu globuleux, aigus.

Cette plante croit sur les rochers, à l'île d'Amboine. Ses fruits, quoique fort petits, sont bons à manger; mais on fait plus ordinairement usage du bourgeon terminal, qui se nomme *chau*, comme dans les autres espèces.

8. **AREC jaunâtre.** *Areca lutescens.* Bory.

Areca petiolis inermibus, glabris; stipitibus inermibus, ramossissimis; ramis flexuosis, fructibus subcylindricis. Bory-Saint-Vinc. Voyag. 2. pag. 296.

Vulgairement palmiste-poison.

Son tronc est d'une hauteur médiocre; son écorce sen lillée, assez lisse, déchiquetée vers la cime de l'arbre. Les pétioles sont glabres, verts, luisans, très-lisses, sans épines, point renflés à leur base; ils supportent des feuilles d'un très-beau vert, très-flexibles, semblables à celles de l'*areca catheca*. Les fleurs sont disposées en panicules presque horizontales, très-ramifiées; les rameaux blancs & flexueux, un peu renflés à leur insertion. Le rachis principal est fort ligneux, élargi à sa base, s'insérant à l'arbre par une sorte d'échancrure, en forme de croissant très-régulier. Toutes les

les fleurs sont petites, très-nombreuses, tombent de bonne heure; il leur succède des fruits arrondis, très-lisses, boscés, d'abord brunâtres, puis rouges.

Cette plante croît à l'Île-de-France. *h* (Description.)

Quoique ce palmier soit nommé par les natuels *palmiste-poisson*, il n'est cependant point dangereux. L'ancreme de son chou, dont la couleur tire sur le jaune, est sans doute la cause qui lui a fait donner le nom qu'il porte. Malgré ce nom, les femmes créoles, qui ont en général des goûts assez bizarres, mangent l'espèce de pulpe grasseuse & verdâtre qui enveloppe ces fruits.

9. AREC blanc. *Areca alba*. Bory.

Areca petiolis glabris, stipitibus inermibus. Bory-Saint-Vinc. Voyag. 1. pag. 306.

Tout cet arbre est glabre, sans poils ni épines. Son tronc s'élève moins que dans les espèces suivantes, & les marques des vieilles feuilles y sont moins sensibles. Ses pétioles sont lisses & verdâtres à leur base, élargis en forme de grande cuvette. Les feuilles, dans les jeunes individus, sont d'abord peu divisées, d'un vert-gai; toutes les nervures d'un rouge agréable. Les rameaux de la panicle sont très-chargés de fleurs, & plus gros que dans les autres espèces.

Cette plante croît à l'Île-de-France, dans les montagnes élevées. *h* (Description.)

10. AREC rouge. *Areca rubra*. Bory.

Areca petiolis glabris, subspinosis; stipitibus spinosis, spinis rectis. Bory-Saint-Vinc. Voyag. 1. pag. 306.

Cette espèce se fait remarquer par sa grande élévation. Son tronc acquiert les dimensions les plus fortes. Dans sa jeunesse, la base des pétioles est d'un rouge brun, très-épineuse. Quelques petites épines filiformes sont dispersées sur les nervures des folioles, qui sont planes en dessous. La base de l'arbre est fort évasée. Les impressions des feuilles tombées sont toujours remarquables sur l'écorce, & forment en quelque sorte des anneaux larges & sensibles dans le haut par une teinte de brique. Le régime est plus horizontal que dans l'espèce précédente. Les rameaux en sont plus grêles, flexueux, coulés à leur insertion sur le rachis, qui est renflé à sa base, & muni d'épines noires, en épingles, assez fortes, divergentes, très-pointues, longues de deux à trois pouces.

Cette plante croît à l'Île-de-France, dans les forêts des monts de hauteur moyenne. *h* (Description.)

11. AREC chevelu. *Areca crinita*. Bory.
Botanique. Supplément. Tome 1.

Areca petiolis hispulo-crinitis; stipitibus spinosis, spinis incurvatis. Bory-Saint-Vinc. Voyag. 1. pag. 307.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de la précédente, avec laquelle elle a de grands rapports; elle s'élève beaucoup moins; sa tige est bien moins belle. L'espèce de crin court & de duvet rude & rouffâtre qui couvre ses pétioles, est souvent si épais, que leur base a l'air d'un animal. Les épines du rachis sont courtes, quelquefois flexueuses, le plus souvent courbées à leur base.

Cette espèce croît à l'Île-de-France, dans les forêts des plus hautes montagnes. *h* (Description.)

ARECA. (Voyez AREC.)

ARENARIA. (Voyez SABLINA.)

ARENCA: nom générique, donné par M. de La-billardière, dans le *Journal philomatique*, frimvire an 11, à la plante nommée par Loureiro *borassia gomutus* (voyez RONDIER, n°. 2), distinguée du genre *borassia* par ses spathe d'une seule pièce, & par ses étamines au nombre de cinquante à soixante. Cet arbre croît abondamment dans les vallons humides des îles Moluques. Son tronc, haut de cinquante à soixante pieds, est marqué de profondes cicatrices circulaires dans sa partie inférieure, & couvert, dans sa partie supérieure, par les bases des anciens pétioles, qui persistent très-longtemps. Les feuilles sont longues de quinze à vingt pieds, soutenues par un pétiole dilaté à sa base, prolongé sur les bords & vers son point d'attache, en un tisseau de longues fibres noires qui enveloppent le tronc; les folioles munies de deux appendices à leur base. Entre les feuilles inférieures naissent des tiges, enveloppées primitivement dans une spathe d'une seule pièce, divisée en nombreux rameaux très-allongés, & dans le long du tronc, & couverts de fleurs sessiles, toutes mâles ou toutes femelles.

C'est avec les fibres noires de la base des pétioles que l'on fabrique, dans l'Inde, des cordes & des cables d'une longue durée. La liqueur qui découle par les incisions faites aux régimes naissants, ainsi que sur le tronc, donne du sucre par la simple évaporation, & par la fermentation, une boisson agréable. En mélangant les incisions, on obtient cette liqueur pendant plus de la moitié de l'année. Cet arbre pourroit offrir de grandes ressources à nos colonies françaises, dont la température approche de celle des Moluques, s'il y étoit transplanté. Rumphie rapporte, au sujet de cet arbre, un fait bien remarquable. Lorsque les fruits sont mûrs, le suc qui contient l'enveloppe charnue cause des démangeaisons insupportables

lorsqu'il touche à la peau ; & si, par mégarde, on porte ces fruits à la bouche pour les manger, les lèvres s'enflent pendant plusieurs jours avec des douleurs d'autant plus affreuses, qu'on n'y connoît point de remède. Profitant de cette découverte, les habitants des Moluques, dans une guerre, se défendirent victorieusement en jetant du haut des murailles, sur les ennemis, de l'eau dans laquelle ils avoient fait tremper la chair de ces fruits. Les malheureux qui la recevoient, éprouvoient des démangeaisons si atroces, qu'ils devenoient furieux. On donna dès-lors à cette liqueur le nom d'eau infernale. (*Dict. des Sciences natur.*)

ARÊTE. BARBE. *Arista*. On a depuis quelque tems substitué, en français, le mot d'arête à celui de barbe, pour exprimer la pointe acuminée qui termine les valves de certaines graminées & autres plantes. (*Voyez BARBE.*)

ARETHUSA. (*Voyez ARÊTHUSE.*)

ARÊTHUSE. *Arethusa*. Ce genre contient de très-jolies plantes exotiques, munies d'une tige simple, garnies de deux ou trois feuilles au plus, remplies ordinairement par une seule fleur, agréable par sa forme & par ses couleurs. Rapprochées des elleborines, plus encote des *epidendrum*, elles participent à leur élégance. Quelques différences dans la division inférieure de la corolle ont déterminé M. de Jussieu à établir un nouveau genre, sous le nom de *pogonia*, dans lequel il renferme toutes les espèces qui ont leur division inférieure barbue. M. Swartz en a fait passer quelques espèces dans son genre *disperis* : ce sont celles dont les divisions latérales de la corolle sont ouvertes horizontalement, presque éperonnées à leur base.

* **ARETHUSA.** Swartz. *Corolle à six divisions profondes ; les cinq supérieures presque canaliculées, rapprochées ; l'inférieure point éperonnée, tubulée à sa partie inférieure, recouvrant l'anthère par son bord intérieur.*

1. **ARÊTHUSE bulbeuse.** *Arethusa bulbosa*. Linn. Spec. 1346. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 160. — Lam. Ill. Gen. tab. 729. fig. 1.

2. **ARÊTHUSE langue de serpent.** *Arethusa ophioglossoides*. Linn. Spec. 1346. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 159. — Lam. Ill. tab. 729. fig. 2. — *Pogonia*. Juss.

3. **ARÊTHUSE de Caroline.** *Arethusa divaricata*. Linn. Spec. 1346. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 160. — Lam. Ill. tab. 729. fig. 3.

5. **ARÊTHUSE à deux barbes.** *Arethusa biplumata*. Linn. f. Suppl. 405. — Smith. Ic. ined. pag. 23. tab. 23. — Lam. Ill. Gen. tab. 729. fig. 4.

Bipinnula. Juss. Gener. pag. 65. — Commerf. Herb.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à Buenos-Ayres, & non dans les terres magellaniques. Ses racines sont fasciculées. La forme singulière de ses fleurs, & surtout les deux pétales inférieurs de sa corolle, la séparent des arêthuses, & confirment le genre de Commerfon, adopté par M. de Jussieu.

6. **ARÊTHUSE ciliée.** *Arethusa ciliata*. Linn. f.

Orchis (pechinata), labello tripartito ; laciniis lateralibus setaceo-multipartitis ; caule unifloro unifolique ; folio cordato-amplexicauli. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 11. — Thunb. Prodr. 4.

Orchis burmanniana. Linn. Spec. pag. 1314. — Amoen. Acad. 6. Afric. 88. — Swartz, in Web. & Mohr. Archiv. 1. pag. 55. tab. 3.

7. **ARÊTHUSE verticillée.** *Arethusa verticillata*. Mühl.

Arethusa foliis quinis, ovatis, verticillatis ; caule unifloro ; petalis tribus exterioribus longissimis, linearibus ; labello trilobo ; laciniis mediâ annulatis. Willd. Spec. 4. pag. 81. — Mühlent. in Litt.

Helleborine affinis, planta mariana, herba paridis facie, quinquefoliata. Pluken. Manr. 101. tab. 348. fig. 1. Bona.

Cette singulière espèce est très-remarquable par ses feuilles, réunies en verticille au sommet des tiges, au nombre de cinq ; elles sont glabres, ovales, nerveuses, très-ouvertes, rétrécies en pétiole à leur base, arrondies, légèrement mucronées à leur sommet. Les tiges sont simples, grêles, terminées par une seule fleur ; les trois divisions extérieures de la corolle très-longues, fort étroites, linéaires, presque subulées ; la division ou le pétale inférieur partagé en trois lobes ; le lobe du milieu ondulé.

Cette plante croît dans la Pensilvanie & le Maryland. 7

8. **ARÊTHUSE pendante.** *Arethusa pendula*. Willd.

Arethusa radice tuberosâ, caule trifloro ; foliis ovatis, alternis ; floribus longè pedunculatis, alternis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 81. — Mühlent. in Litt.

Arethusa (trianthophoros), caule remotè vaginato, aphylo, subquadrisfaro ; vaginis salicatis, pedunculis florum elongatis. Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 230.

Arethusa (parviflora), parvula, scapo salis pluribus alternis, brevi ovalibus, summitate solido plu-

riford; labello integro. Mich. Flor. botcal. Amer. 2. pag. 160.

Helleborine mariana, flore pallido, purpureo, trianthophoros. Pluken. Mantill. 100. tab. 338. fig. 6.

Ses tiges, simples, hautes de quatre à cinq pouces, sont garnies de trois ou quatre feuilles alternes, feuilées, presque amplexicaules, pectinées, ovales, un peu aiguës, distantes. Les fleurs sont pendantes avant leur épanouissement, finies à l'extrémité des tiges, au nombre de trois ou quatre au plus, alternes, longuement pédonculées; les pédoncules inégaux, presque filiformes, munis à leur base d'une bractée semblable aux feuilles. La corolle est petite, d'un pourpre-pâle; ses divisions un peu aiguës; la découpeure inférieure très-entière.

Cette plante croît dans l'Amerique septentrionale, au Kentucky, dans les lieux ombragés. x

9. ARÉTHUSE gentiane. *Arethusa gentianoides.* Swartz.

Arethusa radice tuberosa, aphylla; floribus longissimè pedunculatis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 3. pag. 1436. — Willd. Spec. 4. pag. 82.

Limodorum (gentianoides), radice tuberosa, aphyllum; scapo vaginato, floribus pedunculatis. Swartz, Prodr. 119.

Ses racines sont tubéreuses; ses tiges hautes de quatre à dix pouces, droites, simples, glabres, purpurines, garnies de feuilles en gaine, concaves, arrondies, d'un brun-rougeâtre ou verdâtre, très-courtes. Les fleurs sont terminales, pédonculées, presque réunies en corymbe, au nombre de six à douze, alternes, éparfes; les pédoncules rougeâtres, lâches, simples, filiformes, accompagnées de bractées ovales, acuminées. La corolle est droite, presque fermée; les trois divisions ou pétales extérieurs lancéolés, d'un brun-pourpre; les deux intérieurs de moitié plus courts; le pétale inférieur à trois lobes entiers; celui du milieu arrondi, plissé à ses bords. La capsule est oblongue, trigone, pédonculée, contenant des semences blanchâtres, pulvérolentes.

Cette plante croît à la Jamaïque, à l'ombre, dans les bois. x

* *Arethusa (petraea), caule vaginato, aphylla, uniflora; flore resupinato; labello apice dilatato, ciliis fimbriato.* Persl. Synopf. Plant. 2. pag. 312.

Ses tiges sont munies de quelques feuilles courtes, en gaine. Il n'existe, à l'extrémité des tiges, qu'une seule fleur inclinée sur son pédoncule. Le pétale inférieur est dilaté à son sommet, frangé & cilié à ses bords.

Cette plante croît en Afrique, à Sienna-Leona.

* * DESPERIS. Swartz. Corolle à six divisions profondes; les cinq supérieures ouvertes en gueule; les deux latérales étalées horizontalement, légèrement éperonnées; les anthères recouvertes par une portion de la division inférieure en spirale.

10. ARÉTHUSE du Cap. *Arethusa capensis* Linn.

Arethusa (disperis capensis), caule diphylla, uniflora; foliis lanceolatis. Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 220. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 39. (Voyez ARÉTHUSE, n°. 4.)

11. ARÉTHUSE unilatérale. *Arethusa secunda.* Swartz.

Arethusa caule diphylla, multiflora; foliis linearibus, floribus secundis. Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 220. — Thunb. Prodr. 4. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 60. (Voyez OPHRYS, n°. 25.)

12. ARÉTHUSE ailée. *Arethusa alata.*

Arethusa (disperis alata), bulbis globosis, corollâ tetrapetalâ, stylo alato. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 59. tab. 110.

Ses racines sont filiformes, accompagnées de deux bulbes inégaux; les tiges simples, droites, hautes de six à sept pouces, garnies de feuilles alternes; les inférieures plus courtes; la fleur foliaire, terminale, pédonculée; les pétales supérieurs parachés de vert & de blanc, entr'ouverts en gueule; les deux latéraux intérieurs un peu plus courts, portant, un peu au dessus de leur base, un renflement en forme d'éperon court; l'un des pétales extérieurs dilaté, prolongé par deux pointes en corne; l'autre concave, subulé; le pétale inférieur ovale, lancéolé, très-court, muni d'un pédicelle & d'un appendice barbu. L'ovaire est strié, en masse; le style à demi cylindrique; une anthère oblongue, à deux loges; la capsule oblongue, à six bords, à une loge, à trois valves.

Cette plante a été découverte au cap Van-Diemen par M. de Labillardière.

13. ARÉTHUSE velue. *Arethusa villosa.* Linn.

Arethusa (disperis villosa), caule diphylla, uniflora; bractea germinacea villosa; foliis cordato-ovatis, subulè glabris, margine ciliatis. Swartz, Aët. Holm. 1800. pag. 220.

Arethusa (villosa), pubescens, bulbo rotundo; foliis ovatis, ciliatis. Linn. f. Suppl. 405. — Thunb. Prodr. 3.

Cette espèce a le port d'un *commelina*. Toute la plante est pubescente. Ses racines sont pourvues de bulbes arrondies. Les tiges sont simples, droites, garnies seulement de deux feuilles ova-

Kkk 2

les, en cœur, glabres en dessous, ciliées à leurs bords ; elle n'a qu'une seule fleur terminale. Les bractées & les ovaires fleur velus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

14. ARÉTHUSE en capuchon. *Arethusa cucullata*.

Arethusa (disperis cucullata), caule diphyllus, uniflora ; germinis glabro ; foliis oblongis, bractæque subius pubescentibus. Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 220.

Il paroît que cette plante se rapproche de la précédente ; elle a, comme elle, des tiges garnies de deux feuilles, terminées par une seule fleur ; mais les ovaires sont glabres & les bractées & les feuilles pubescentes à leur base inférieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

15. ARÉTHUSE en cœur. *Arethusa cordata*.

Arethusa (disperis cordata), caule diphyllus, multiflorus ; foliis cordatis, glabris ; floribus asynclisis. Swartz, Act. Holm. 1800. pag. 220.

Ses tiges sont droites, simples, terminées par plusieurs fleurs distinctes. Les feuilles sont glabres à leurs deux faces, en forme de cœur.

Cette plante croît à l'île Maurice. ♀

ARÉTIE. *Arctia*. (Voyez ANDROSACE.) Il y a de si grands rapports entre les *arctia* & les *androface*, que M. de Lamarck les a considérés comme devant appartenir au même genre. Les *arctia* ne se distinguent que par leur port : ils ont des rameaux rampans, comme les *androface*, & non des feuilles radicales & des fleurs portées sur une hampe, comme dans les *androface* ; ils diffèrent encore de ces derniers par le limbe de leur corolle, plus profondément découpé, & par leurs capules à cinq valves distinctes jusqu'à leur base. Ce genre porte le nom d'un botaniste de la Suisse. Haller est le premier qui l'ait établi.

ARGAN. *Sideroxylon*. « Ce nom, dit M. de Jusseu, a été adopté par M. de Lamarck pour désigner en français le *sideroxylon* ; il appartient spécialement à l'arbrisseau que Linné nommoit *sideroxylon spinosum*, qui est l'argan de Maroc, cultivé au Jardin des Plantes de Paris, mais en examinant cette espèce avec plus de soin, Retzius a reconnu que, loin d'appartenir à ce genre, elle devoit passer dans le genre *oleandrum*. Dès-lors on ne peut laisser au *sideroxylon* le nom français ARGAN. » (Jussieu.)

Les *sideroxylon* ont de si grands rapports avec les *chrysophyllum* Linn., avec les *bumelia* Swartz,

& avec quelques autres petits genres, qu'ils ont occasionné des changements fréquents, soit dans les caractères essentiels de ces genres, soit dans les espèces qui les composent. M. de Lamarck, dans les *Illustrations des Genres*, distingue les *sideroxylon* des *chrysophyllum* par les cinq écailles qui, dans les premiers, alternent avec les divisions de la corolle, & renvoie aux *chrysophyllum* toutes les espèces qui n'offrent point ce caractère ; il réunit les *bumelia* de Swartz aux *sideroxylon*. Je les ai mentionnés à la suite des SAPORILLIERS (*achras*), non comme appartenant à ce genre, mais comme ayant avec lui de très-grands rapports, & auquel Swartz les avoit d'abord réunis. Il faut les rapporter à ce genre, ou mieux transporter aux *bumelia* les *sideroxylon* de Lamarck, *Illustr.* Si l'on adopte le caractère établi par M. de Lamarck, il faudra faire rentrer dans les *sideroxylon* toutes les espèces de *chrysophyllum* dont la corolle sera pourvue d'écailles. Swartz & Willdenow donnent aux *chrysophyllum* une corolle à dix découpures, & aux *sideroxylon* une corolle à cinq divisions, munie en outre de cinq écailles à son orifice ; ce qui n'offre guère de différence que dans l'expression ; mais les premiers ont une baie à dix semences, les seconds une baie à cinq semences. Dans les *bumelia*, c'est un drupe à une seule semence. Ce dernier caractère est attribué aux *sideroxylon* de M. de Lamarck. Je n'ai pas pu examiner un assez grand nombre de fruits de ces deux genres pour prononcer affirmativement sur la distinction établie entre leurs fruits, caractère auquel il faudroit seul s'arrêter pour en fixer les limites s'il étoit bien constaté ; mais je crains que, dans quelques espèces, on ne donne le nom de *baies* à des drupes en baie, & que le nombre varié de leurs loges ou de leurs semences ne soit l'effet de l'avortement. Les *bumelia* n'ont qu'une semence ; les *sideroxylon* en ont cinq ; les *chrysophyllum*, dix. Ces trois genres seroient alors parfaitement bien distingués, malgré leurs autres rapports. En donnant à son genre *sideroxylon* un drupe monosperme, M. de Lamarck a de fait remplacé ce genre par les *bumelia* de Swartz, auxquels ne doivent pas être rapportés les *sideroxylon* de Linné, du moins ceux qui ont pour fruit une baie à cinq semences. La présence ou l'absence des écailles est un caractère bien moins important. Les espèces de Michaux sont également des *bumelia*, ayant toutes pour fruit des drupes monospermes, d'après l'examen que j'en ai fait, quoique cet auteur ait adopté le caractère générique de Linné, une baie à cinq semences. L'auteur de Plumier, Mff. 5, tab. 125, appartient aux *sideroxylon*, selon M. de Jusseu. (Voyez AUZUBA, Suppl.)

Au milieu de toutes ces difficultés, que je ne me flatte point de pouvoir lever, je vais présenter quelques nouvelles espèces, ajoutées aux *sideroxylon*, & que l'on pourra ranger dans d'autres

genres, selon les caractères que l'on jugera le plus convenable d'adopter. J'indiquerai également les reformes faites par M. de Lamarck aux genres *Sideroxylon* & *Chrysothylum*, afin de mettre cet ouvrage en accord avec les illustrations.

ESPÈCES.

1. ARGAN à feuilles de laurier. *Sideroxylon melanophloeum*. Linn.

Chrysothylum melanophloeum. Lam. III. n°. 2476.

2. ARGAN à écorce grise. *Sideroxylon cinereum*. Lam.

Ce n'est point le *Sideroxylon inerme* de Linné. (Voyez n°. 4.)

3. ARGAN du Pérou. *Sideroxylon mangillito*. Lam.

Chrysothylum mangillito. Lam. III. n°. 2478.

Cette espèce, d'après M. de Jussieu, paroît se rapporter davantage aux rinéliers (*ardisia* Linn.). Willdenow l'a placée parmi les *Bumelia*; elle a pour fruit un drupe monosperme.

4. ARGAN noirâtre. *Sideroxylon atro-virens*. Lam.

Sideroxylon inerme. Linn. & Lam. III. n°. 2455. tab. 120. fig. 1.

5. ARGAN foyeux. *Sideroxylon senax*. Linn. & Lam. III. n°. 2461.

Sideroxylon (chrysothylloïdes), *spinosum*, *foliis cuneato-lanceolatis, plerumque obtusis, subrâs sericeo nitentibus*. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 125.

Bumelia (senax), *foliis obovatis, obtusis, subrâs argenteo-tomentosis; pedunculis axillaribus, confertis*. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1085.

Chrysothylum (carolinense), *foliis obversè lanceolatis, ovatis*. Jacq. Obf. 3. pag. 3. t. b. 54.

Ses feuilles argentées, foyeuses & luisantes en dessous, distinguent cette espèce de la suivante.

5. ARGAN lanugineux. *Sideroxylon lanuginosum*. Mich.

Sideroxylon spinosum, *ramulis patentissimis, pubescentibus; foliis ovali-lanceolatis, supra glabris, subtus lanuginosis, nec sericeis*. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 125.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la précédente; elle en diffère principalement par ses feuilles lanugineuses à leur face inférieure, & non luisantes & foyeuses; elles sont glabres, lancéolées,

lées, très-entières à leurs bords, très-souvent obtuses à leur sommet. Ses rameaux sont très-étalés, épineux, pubescens dans leur jeunesse; ses fleurs axillaires, réunies par paquets, assez nombreuses, soutenues par des péduncules longs d'un demi-pouce.

Ce se plante croît à la Caroline & dans la Nouvelle-Géorgie, aux lieux humides, parmi les buissons. (V. f. Comm. Boj.)

6. ARGAN à feuilles de saule. *Sideroxylon lycioides*. Linn. — Wangelh. Amer. 117.

Sideroxylon (lycioides), *spinosum, erectum, foliis lato-lanceolatis, utrinque glabris*. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 122.

Sideroxylon (leve), *foliis ellipticis, levibus, subpermanentibus; spinis foetiferis, pedunculis antheris*. Walth. Flor. carol. pag. 100.

Ses fruits consistent en un drupe rougeâtre, ovale, de la grosseur d'un grain de café, accompagné à sa base du calice persistant, contenant, sous une enveloppe peu épaisse, un noyau très-dur, blanc, ovale, très-luisant, à une seule loge monosperme. (V. f.)

6. ARGAN recourbé. *Sideroxylon reclinatum*. Mich.

Sideroxylon spinosum, dumosum, diffusè reclinatum; ramis sterilibus, divaricato-ramulosis; foliis parvis, obovatis, glaberrimis. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 122.

Arbusteau dont les rameaux, nombreux, alongés, diffus, courbés en arc, forment un buisson étalé. Les jeunes rameaux se terminent par une longue épine; ils portent des fleurs assez nombreuses, petites, blanchâtres, réunies par fascicules dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des péduncules inégaux, uniflores, longs de quatre à six lignes. Les feuilles sont petites, alternes ou réunies par petits paquets, un peu pétiolées, ovales, luisantes, très-glabres, entières, obtuses à leur sommet, rétrécies en pointe à leur base, longues de six à huit lignes. Les fruits consistent en un drupe ovale, peu charnu, contenant un noyau oileux, luisant, d'un blanc d'ivoire, à sries peu apparentes, ne renfermant qu'une seule semence. Le *Sideroxylon leve* de Waltherius, rapporté par Michaux à l'espèce précédente, me paroîtroit convenir davantage à celle-ci.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à la Nouvelle-Géorgie, parmi les buissons. (V. f.)

11. ARGAN mastic. *Sideroxylon masticodendrum*. Jacq.

Sideroxylon inerme, foliis perennantibus, lanceo-

latis, acutis; floribus luteis. Lam. Ill. n°. 2456. r. 1b. 120. hg. 2. — Jacq. Coll. Æ. 2, p. 253. tab. 17. hg. 5.

Cornus foliis laurinis; fructu majore, luteo. Catesb. Carol. 2. pag. 75. tab. 75.

Il paroît que cette espèce ne doit pas être confondue avec le *humelia foliicifolia* de Swartz ou avec l'*achras foliicifolia* Linn.; elle en diffère par son port & par la forme de ses feuilles. C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de cinquante pieds. Ses rameaux sont souples, alongés, dépouillés d'épines, glabres, un peu cendrés, garnis de feuilles épaisses, longuement pétioles, coriaces, persistantes, assez larges, lanceolées, un peu aiguës, très-souvent obtusés, luisantes en dessus, glabres, plus pâles en dessous, soutenues par des pétioles grêles, presque filiformes, canaliculés, longs d'un à deux pouces & plus. Les fleurs sont jaunâtres, fasciculées. Le fruit consiste en un drupe jaune, ovale, obtus, de la forme d'une olive, contenant un noyau osseux, monosperme.

Cette plante croît aux îles Bahama, à Saint-Domingue. h (V. f.)

11. * ARGAN à feuilles de saule. *Sideroxylon foliicifolium.*

Sideroxylon inerme, foliis ovato lanceolatis, acumina- tis; superis splendens; floribus confertis, lateralibus. Lam. Ill. n°. 2458.

An achras foliicifolia? Linn. — Encycl. 6. pag. 532. (Exclaf. Jacq. Synon.)

Si cette plante est réellement celle de Swartz & de Linné, elle est très-distincte de la précédente. Ses feuilles sont bien plus étroites, très-aiguës à leurs deux extrémités, luisantes, vernissées en dessus, plus pâles en dessous; les pétioles à peine longs de six lignes; les fleurs plus nombreuses à chaque fascicule; les pédoncules courts. Les fruits, dans l'état où je les ai vus, offrent un drupe ovale, presque rond, de la grosseur d'un pois & plus, très-lisse, d'un brun-jaunâtre, contenant un noyau monosperme.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. h (V. f.)

12. ARGAN pauciflore. *Sideroxylon pauciflorum.* Lam.

Sideroxylon inerme, foliis lanceolatis, acumina- tis, glabris; junioribus subvillosis; floribus axilla- ribus. Lam. Ill. 2459.

Cette plante paroît être la même que le *humelia pentagona* de Swartz. (Voyez SAPOTILLIER, n°. 10.)

13. ARGAN ponctué. *Sideroxylon punctatum.* Lam.

Sideroxylon inerme, foliis oblongo-ovatis, obtusiusculis, glabris, subis punctatis; floribus lateralibus, subsessilibus. Lam. Ill. n°. 2460.

Ses rameaux sont dépouillés d'épines, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, oblongues, ovales, glabres à leurs deux faces, ponctuées en dessous, très-entières, un peu obtusés à leur sommet. Les fleurs sont latérales, presque sessiles. Les fruits consistent en des drupes arrondis, de la grosseur d'un grain de poivre, contenant un noyau monosperme. La corolle & les étamines n'ont point été observées.

Cette plante a été recueillie à la Caroline par Michaux. h (V. f.)

14. ARGAN argenté. *Sideroxylon argenteum.* Thunb.

Sideroxylon inerme, foliis ovatis, retusis, tomentosis; floribus pedunculatis. Lam. Ill. n°. 2461. — Thunb. Prodr. 36, & Rohmeria, id.

C'est encore une plante très-voisine des *humelia*, dont le fruit est une baie à une seule semence, au rapport de Thunberg. Si cependant ce fruit est réellement une baie plutôt qu'un drupe, il appartiendrait plutôt aux *sideroxylon* Linn.; mais il faudroit alors supposer que les semences avortent, à l'exception d'une seule. Ses rameaux n'ont point d'épines; ils sont pourvus de feuilles alternes, ovales, pétioles, tomenteuses. Les fleurs sont axillaires, pédonculées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

15. ARGAN ovoïde. *Sideroxylon obovatum.* Lam.

Sideroxylon spinosum, foliis obovatis, obtusis, basi cuneatis, utrinque glabris. Lam. Ill. n°. 2464.

Humelia cuneata. Swartz, Flor. Ind. occid. t. pag. 496. — Encycl. 6. pag. 534.

Cette plante paroît être la même que le *humelia cuneata* Swartz (voyez SAPOTILLIER, n°. 12); elle offre cependant peu de différence. Ses rameaux sont épineux; ses feuilles en ovale renversé, presque en coin, rétrécies en pétiole à leur base, obtusées, arrondies, quelquefois un peu échancrées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, finement veinées. Les fleurs sont petites, latérales, pédonculées, peu nombreuses à chaque fascicule. Je n'ai pas vu le fruit.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h (V. f.)

16. ARGAN multiflore. *Sideroxylon multiflorum.* Lam.

Sideroxylon spinosum, foliis obovato-cuneatis, obtusis, glabris, coriaceis; pedunculis divisis, fasciculatis, lateralibus. Lam. Ill. n°. 2465.

Cette plante, dont les fruits ne sont pas connus, & dont les fleurs n'ont été qu'incomplètement examinées, n'appartient à ce genre que par son port; encore s'en éloigne-t-elle par ses péduncules divisés. Ses rameaux sont épineux, garnis de feuilles en ovale renversé, rétrécies en coin à leur base, coriaces, glabres, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont nombreuses, petites, latérales & fasciculées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Th (V. f. in herb. Lam.)

Observations. J'ai vu dans l'herbier de M. Desfontaines une plante rapportée de Saint-Dominique par M. Neffoux, qui ressemble beaucoup à celle-ci par la forme de ses feuilles; mais les rameaux n'ont point d'épines, & les fleurs sont presque solitaires: il n'y avoit pas de fruits.

* *Espèces douteuses ou moins connues.*

Les espèces suivantes, rangées parmi les *Sideroxylon* Linn. & Willd. si elles ont le caractère générique établi par Linne, admis par Willdenow, c'est-à-dire, une baie à cinq semences, ne doivent pas appartenir aux *Sideroxylon* Lam. Ill.

* **ARGAN paniculé.** *Sideroxylon cymosum*. Linn. f.

Sideroxylon inerme, foliis oppositis, petiolatis; cymis compositis & decompositis. Linn. f. Suppl. 152. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1090.

Sideroxylon inerme, foliis ovatis, floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 36.

Ce petit arbrisseau, qui croît sur la montagne de la Table, au Cap de Bonne-Espérance, a un port si différent des *Sideroxylon*, que je doute qu'il appartienne à ce genre. Ses feuilles sont opposées & non alternes, ovales, pétiolées. Ses fleurs sont disposées en une panicule plusieurs fois ramifiée, réunies en cime.

* **ARGAN tomenteux.** *Sideroxylon tomentosum*. Roxb.

Sideroxylon inerme, foliis oblongis, acuminatis, obtusis, junioribus tomentosis; paniculis aggregatis, axillaribus, longitudine petioli. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1090. — Roxburg, Corom. 1. pag. 28. tab. 28.

Ses rameaux sont sans épines, garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, acuminées, obtuses, couvertes, dans leur jeunesse, d'un duvet brun, tomenteux. Les fleurs sont réunies par pa-

quets dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des péduncules de la longueur des pétioles; elles produisent des baies jaunâtres, de la grosseur d'une cerise, à deux loges monospermes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Th

* *Sideroxylon (sericeum)*, inerme, foliis ovatis, subtus tomentosis sericatis. Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 262.

Le *Sideroxylon mite* Jacq. Collect. 2, pag. 249, & Mill. Icon. tab. 199, est le *Chrysophyllum millerianum*, Ill. n°. 2477.

ARGEMONE du Mexique. *Argemone mexicana*. Linn. — Lam. Ill. tab. 452.

D'après l'observation de Gærtner, de Fruct. & Sem. vol. 1, pag. 287, le *papaver cambricum* Linn. (voyez PAVOT, n°. 9) doit être placé parmi les argemones, ayant des capsules lisses, oblongues, qui s'ouvrent par cinq valves, & non par des pores, comme dans les pavots.

ARGENTAIRES. *Argyrea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des liférons, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, la plupart grimpeurs, à feuilles alternes, entières; les fleurs disposées en panicule ou en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à cinq folioles; une corolle monopétale, à cinq découpures; cinq crénélures à l'orifice du tube; une baie à quatre loges; une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice coloré, persistant, à cinq folioles concaves; les deux extérieures plus grandes.

2°. Une corolle monopétale; le tube court, muni à son orifice de cinq crénélures; le limbe à cinq découpures oblongues, plissées, tectées.

3°. Cinq étamines; les filaments connexes, plus courts que le limbe, pileux, épaissis à leur base, insérés à l'orifice du tube, soutenant des anthères sagittées.

4°. Un ovaire libre, arrondi, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate en tête, échancré.

Le fruit est une baie sèche, arrondie, à quatre loges, contenant chacune une semence ronde d'un côté, anguleuse de l'autre.

Observations. Ce genre, établi par Loureiro, tire son nom du mot grec *argyrios* (*argenteus*), argenté, à cause de l'éclat de ses feuilles, imitant celui de l'argent.

1. ARGENTAIRE à feuilles obtuses. *Argyrea obtusifolia*. Lour.

Argyrea foliis ovatis, obtusis; paniculis subterminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 166.

Ses tiges sont ligneuses, fort longues, grimpantes, peu ramifiées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, obtuses, très-entières, blanchâtres, luisantes, pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont blanches, disposées en panicules lâches, presque terminales; il leur succède des baies sèches & rougeâtres.

Cette plante croît dans les haies, à la Cochinchine; elle passe pour légèrement astringente. h (Descript. ex Lour.)

2. ARGENTAIRE à feuilles aiguës. *Argyrea acuta*. Lour.

Argyrea foliis ovatis, acutis; corymbis axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 167.

Ses tiges sont érigées & ligneuses; les feuilles alternes, ovales-lancéolées, très-entières, luisantes, tomenteuses. Ses fleurs sont blanches, disposées en corymbes latéraux, sur un long pédoncule commun; les filaments plus courts que la corolle; le calice coloré; les découpures de la corolle plissées.

Cette plante croît à la Chine. h (Descript. ex Lour.)

3. ARGENTAIRE en arbre. *Argyrea arborea*. Lour.

Argyrea caule arboreo, foliis rugosis, racemis terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 167.

Son tronc s'élève à la hauteur de huit pieds, & se divise en rameaux étalés, garnis de feuilles ovales, glabres, ridées, aiguës, très-entières, réfléchies. Les fleurs sont jaunes, disposées en grappes terminales; le calice rougeâtre, renflé, à cinq dents; le tube de la corolle allongé, filiforme; son limbe à cinq découpures plissées, arrondies. Le fruit est une baie à quatre loges monospermes, enveloppée par le calice persistant.

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochinchine. On la cultive aussi dans les Jardins. h On en fait un usage fréquent, comme topique, dans l'inflammation & le gonflement des mamelles. On broie ensemble les feuilles & les racines, & on les applique en cataplasme.

ARGENTINE : nom vulgaire d'une potentille qui croît dans les lieux humides. C'est le *potentilla asperina* Linn. (Voyez POTENTILLE.)

ARGITAME blanchâtre. *Argyramnia candidans*.

Argyramnia foliis ovatis, trinerviis, pilosis, subtus candidantibus; racemis axillaribus, brevissimis. (N.)

Argyramnia frutescens, albidus, foliis oblongis, nervis paucioribus arcuatis. Brown, Jam. 338.

Ricino affinis, odorifera, frutescens, minor, tenero folio; fructu rufo, dilute purpurascens. Sloan. Jam. 44. Hilt. 2. pag. 133. tab. 86. fig. 3. — Rai, Hist. 3. pag. 114.

Argyramnia candidans. Swartz, Prodr. 39, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 336. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 333.

Cet arbrisseau se divise en rameaux effilés, d'un blanc-cendré, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, entières, aiguës, longues d'un pouce, beaucoup plus petites sur les jeunes rameaux; marquées de trois principales nervures, vertes & parsemées en dessus de poils couchés, blanchâtres, blanches & très-pileuses en dessous. Les fleurs sont disposées, le long des rameaux & à leur sommet, en grappes axillaires fort petites; elles sont monogynes. Les fleurs mâles ont un calice à quatre folioles; une corolle à quatre pétales. Dans les fleurs femelles, le calice est à cinq folioles; point de corolle. (Voyez ARGITAME.)

Cette plante m'a été communiquée par M. Ledru, qui l'a recueillie à l'île de Saint-Thomas. h (V. f.)

ARGOLASE laineuse. *Argolepis lanata*. Lam. Ill. tab. 34. — Juss. Gen. pag. 60.

Lanaria plumosa. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 462. — Thunb. Prodr. 63. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 181.

Hyacinthus (lanatus), corollis lanatis, caule ramofo. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 455. — Royen, Lugd. Bat. 27.

Dilatris hexandra? Lam. Dict. 2. pag. 182.

Cette plante, que Linné avoit rangée parmi les jacinthes, en a été retranchée avec raison pour former un genre particulier, que M. de Jussieu a établi sous le nom d'*argolase*, composé de deux mots grecs qui expriment les poils blancs dont les panicules sont chargées. Son caractère essentiel consiste dans :

Une corolle adhérente à l'ovaire, tubuleuse, à six découpures égales; six étamines fertiles, toutes égales, attachées sur les divisions de la corolle; les anthères vacillantes; un stigmate trifide; une capsule à trois loges, contenant chacune deux ou trois semences.

D'après ces caractères, il est facile de reconnaître que ce genre est très-voisin des *dilatris* & de

l'*heritiera*

l'heritiera Gmel., qui n'en diffèrent que par trois de leurs étamines, stériles & beaucoup plus courtes que les trois fertiles. Sa racine est fibreuse; ses tiges simples; droites, anguleuses, garnies de feuilles alternes, glabres, linéaires, canaliculées, faillantes en carène sur leur dos, rudes à leurs bords. Le sommet des tiges porte plusieurs pédoncules épais, alternes, soutenant chacun un gros bouquet de fleurs agglomérées, formant par leur ensemble une panicule touffue, serrée, hérissée, sur toutes les parties, de poils blancs, nombreux, allongés, épais & plumeux, munis de spathe simples. La corolle est colorée & glabre en dedans, divisée en six découpures très-ouvertes, obovées, conniventes en tube à leur partie inférieure; chaque découpure portant une étamine un peu plus courte que la corolle, terminée par une anthère vacillante, bifide à sa base. L'ovaire est adhérent avec le tube de la corolle, surmonté d'un style divisé en trois stigmates: il lui succède une capsule couronnée par le limbe de la corolle, hispide, à trois loges, renfermant chacune deux ou trois semences.

Cette plante paroît être la même que celle décrite par M. de Lamarck, sous le nom de *Dalmanis hexandra*, n°. 4. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

ARGOLASIA. (Voyez ARGOLASE.)

ARGOPHYLLE luisant. *Argophyllum sericeum*. Forst. — Lam. III. tab. 111.

Ce genre, dont la famille, dans l'ordre naturel, n'est pas encore bien déterminée, paroît avoir des rapports avec celle des bruyères.

ARGOPHYLLUM. (Voyez ARGOPHYLLE.)

ARGOUSIER d'Europe. *Hippophae rhamnoides*. Linn. — Lam. III. tab. 808.

ARGUZE. *Messerschmidia*. Les espèces contenues dans ce genre ont le port des *tournefortia*. On n'est point d'accord sur la dénomination de son fruit. Linné le regarde comme une baie sèche. Gærtner est du même avis. M. de Justieu lui donne le nom de *capsule*, & M. Desfontaines celui de *drupe*. Cette variation dépend de l'idée que chaque auteur attache à chacun de ces noms. Il seroit cependant bien essentiel de s'entendre.

1. ARGUZE de Tartarie. *Messerschmidia arguta*. Linn.

Messerschmidia caule herbaceo, foliis sessilibus, corollis infundibuliformibus. Lam. Illustr. Gener. n°. 1870. tab. 95. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 1. pag. 129. tab. 109. fig. 3.

2. ARGUZE arbrisseau. *Messerschmidia fruticosa*. Linn. f.

Botanique, Supplément. Tome I.

Messerschmidia caule fruticoso; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis; corollis hypocrateriformibus. Lam. III. n°. 1871. — Linn. f. Suppl. 132. — Willden. Spec. Plant. 1. pag. 789. — Desfont. Arbr. vol. 1. pag. 175.

Ses tiges sont droites, hautes de cinq à six pieds, rameuses, cylindriques; les rameaux alternes, rudes, étalés, garnis de feuilles longuement pétiolées, alternes, ovales-lancolées, rudes, veinées, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet. Les fleurs font petites, blanchâtres, sessiles, unilatérales, disposées en une panicule très-étalée, située à l'extrémité des rameaux; les ramifications presque dichotomes, en épis grêles. Le calice est fort petit, à cinq dents aiguës; la corolle infundibuliforme, mais renflée, globuleuse vers son limbe, qui s'évase en soucoupe. Le fruit est une baie sèche (un drupe), à peine de la grosseur d'un grain de poivre, comprimée à son sommet, entourée de quelques petites dents faillantes, s'ouvrant en deux longitudinalement, contenant deux semences dans chaque division.

Cette plante croît à l'île de Ténériffe. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (V. v.)

3. ARGUZE à feuilles étroites. *Messerschmidia angustifolia*. Lam.

Messerschmidia foliis petiolatis, angustis, linearilanceolatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 415. n°. 1872.

Quoique cette plante ait le même port que la précédente, elle offre cependant, surtout dans les feuilles, des caractères qui l'en distinguent. Ses tiges sont presque glabres, ligneuses, cylindriques; les feuilles pétiolées, alternes, linéaires, fort étroites, allongées, aiguës, très-entières, chargées d'aspérités à leurs deux faces. Les fleurs ont une teinte blanchâtre, disposées comme dans l'espèce précédente; mais les ramifications à peine allongées en épis, plus ramifiées, & portant, vers leur sommet seulement, des fleurs plus rapprochées.

Cette plante, originaire des Canaries, est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. b (V. v.)

4. ARGUZE cloisonnée. *Messerschmidia cancellata*. Ait.

Messerschmidia foliis lanceolatis, hispida; capsulis cancellatis. Ait. Synops. n°. 162. tab. 1. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 790.

Cerithe foliis lanceolatis, hispida; capsulis cancellatis. Quer. Hérp. 4. pag. 145. tab. 25.

Ses racines sont roussâtres & fibreuses; ses tiges pleuses, herbacées, hautes d'un pied, divisées en rameaux garnis de feuilles sessiles, lancolées, hispides, entières, un peu obovées, larges

de deux lignes; les supérieures plus étroites, linéaires. Les fleurs sont bleues, pédonculées, disposées en grappes. Leur calice est à cinq découpures linéaires; la corolle infundibuliforme; le tube à demi cylindrique; le limbe à cinq découpures; cinq étamines très-courtes, insérées dans le tube; les anthères simples; l'ovaire ovale, aigu, surmonté d'un style court, filiforme, terminé par un stigmate obtus. Le fruit est une capsule coriace, ombiliquée, comprimée à son sommet, avec quatre points saillans, s'ouvrant en deux lèges, contenant chacune une seule semence, convexe d'un côté, anguleuse de l'autre.

Cette plante croît en Espagne. (*Descript. en Anglo.*)

ARGYREIA. (*Voyez ARGENTAIRES.*)

ARGYROCHÆTA. Cavan. Ic. Plant. vol. 4, pag. 54, t. b. 378. Cavanilles a décrit & figuré sous ce nom la plante nommée par Linné *parthenium hysterophorum*. (*Voyez PARTHÈNE*, n°. 1.) Quelques poëtes, omises dans la description de Linné, ont fait croire au botaniste espagnol que sa plante étoit différente. Il s'est en conséquence déterminé à en faire un genre nouveau; mais on a la certitude que c'est la même plante que Linné a mentionnée.

ARGYROCOMA. Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 2, pag. 410, tab. 167. Genre de plantes de la famille des corymbifères, établi par Gærtner sur quelques espèces détachées des genres *gnaphalium* & *xeranthemum* de Linné, & auquel il assigne pour caractère, 1°. des fleurs boscuëuses, les unes mâles, les autres femelles, mêlées ensemble; 2°. le calice commun, formé d'écaillés imbriquées, soches, luisantes; les intérieures plus longues, & formant un rayon coloré autour des fleurs; 3°. le réceptacle nu; 4°. les aigrettes plus meuses dans toute leur longueur ou seulement au sommet.

Les espèces réunies à ce genre sont presque toutes du Cap de Bonne-Espérance, & semblables aux *gnaphalium*. Les fleurs confèrent, après leur dessèchement, comme celles de l'immortelle, l'éclat qu'elles avoient dans leur état de fraîcheur; elles seront mentionnées par une sous-division à la fin du genre GNAPHALIE, *Suppl.*

ARIA : nom que portoit anciennement l'alfiler ordinaire (*eragrus aria* Linn.).

ARIA-BÉPOU : nom malabare de l'azélatach de l'Inde (*melia azadirachta* Linn.), figure dans Rheede, Hort. Malab. 4, tab. 52. (*Voyez AZADIRACHTE*, n°. 2.)

ARIA VIELA : nom malabare du *cleome viscosa* Linn. (*Voyez MOSAMBE*, n°. 6), figuré dans Rheede, Hort. Malab. 9, tab. 23. Cet auteur lui attribue des vertus très-étendues. Selon lui, le suc, pompé par les narines, soulage la tête, & la préserve des effets du poison. Mêlé avec de l'huile, & insinué dans l'oreille, il diminue la fureur. Les feuilles, prises à l'intérieur, sont fortifiantes, stomachiques, & dissipent les vents. Pêlées & mises sous les aisselles à l'insu d'un accès de fièvre, elles diminuent & même suppriment le frisson. Leur simple application adoucit beaucoup mal de tête.

ARILLE. *Arillus*. (*Voyez SEMENCES.*) L'arille est une extension & un développement du cordon ombilical; il n'existe que dans quelques espèces; il forme autour de la graine une enveloppe très-souvent incomplète, & n'a aucune adhérence avec elle. Cet organe disparoit quelquefois après la maturité des semences, comme il arrive dans la *tropha gossypifolia* Jacq. Dans cette plante, l'arille recouvre la graine en totalité; il est très-mince, excepté au point où s'attache le cordon ombilical. Là il forme une sorte de bourrelet en capuchon; mais à mesure que le volume de la graine augmente, ce bourrelet diminue, & l'arille se détache à un tel point, qu'il finit par disparaître entièrement. Dans d'autres plantes, au contraire, on peut observer l'arille sur des graines parfaitement mûres.

L'arille du muscadier est connu dans le commerce sous le nom de *macis*; c'est une enveloppe charnue, odorante, d'un rouge-éclatant, découpée en lanières épaisses. Celui du *ravenala*, arbre voisin des bananiers, est une membrane franche & d'un beau bleu de ciel. Celui des *oxalis* est blanchâtre; il a la forme d'un petit sac. A l'époque de la maturité, il se crève à son sommet, & le retour de la sève en dehors avec élasticité, il lance au loin la graine qu'il recouvrait d'abord. L'arille est une forme de corps glanduleux, dans lequel sont élaborés les sucs qui servent à nourrir & à développer la graine. Cette opinion paroît prouvée par le dessèchement très-vif de cet organe, à mesure que la graine & ses cotylédons prennent de l'accroissement. (*Méth. Diâ. des Sciences naturelles.*)

ARIN-DRANTO. Suivant Flacourt, c'est un arbre de Madagascar, dont le bois étant pourri, rend une odeur merveilleuse en brûlant, & fait un parfum très-agréable. Le même auteur parle ailleurs de l'*arandato*, qui est peut-être le même que celui-ci, & dont la déction sert à faire de l'encre dans le pays. (*Aus. Pet. Th. Diâ. des Sciences naturelles.*)

ARJONE tubéreuse. *Arjona tuberosa*, Cavan.

Arjona tomentosa, foliis sparsis, vaginantibus, apice subulatis, patulis; corymbis terminali. Cavan. Icon. Rat. 4. pag. 57 & 58.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, tubuleuses, qui paroît avoir des rapports avec la famille des rhymélées, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à petites feuilles alternes, sessiles, ayant des fleurs réunies en un corymbe terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Deux petites écailles pour calice ; une corolle tubulée, à cinq lobes ; un ovaire couronné par cinq écailles ; un style alongé ; un stigmate à deux lames ; une baie globuleuse, à deux loges.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, dont les racines sont fusiformes, fibreuses ; les fibres divergentes, terminées par des tubercules ; elles produisent des tiges nombreuses, solitaires ou très-ramifiées à leur base, filiformes, un peu dures, droites, hautes de sept à huit pouces. Les feuilles sont petites, lancéolées, éparées, vaginantes, presque imbriquées, très-aiguës, étalées & un peu réfléchies en dehors, tomenteuses, longues de trois à quatre lignes. Les fleurs sont presque sessiles, réunies en un bouquet terminal, séparées par des bractées qui les recouvrent en partie. Deux folioles ovales, concaves, à trois pointes inégales, tiennent lieu de calice. La corolle est jaune, velue en dehors, tubuleuse, longue de six lignes ; son limbe se divise en cinq lobes ovales, mucronés. Les anthères sont presque sessiles, oblongues, renfermées à l'orifice du tube. L'ovaire est couronné par cinq écailles jaunâtres, du milieu desquelles s'élève un long style rougeâtre, terminé par un stigmate à deux ou trois lames. Le fruit est une petite baie glabre, globuleuse, conservant à son sommet les vestiges des écailles, divisée en deux loges.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (*Descript. ex Cavan.*)

ARISTEA. Ce genre, peu différent des *moraa*, a été établi sur une des espèces de ce genre (*moraa arifolia* Lam. ; *ixia africana* Linn.), dont le stigmate est simple, en forme d'entonnoir & non trifide. On y a ensuite réuni successivement le *moraa carulea*, *spiralis* ; l'*ixia frutescens* Thunb. ; l'*aristea major* Andréw. tab. 160. que Persoon a nommé *aristea spicata*. (*Voyez MORÉE.*)

ARISTIDE. *Aristida*. Ce genre, dont M. de Lamarck n'a d'abord présenté que six espèces, a été depuis considérablement augmenté ; il a de grands rapports avec les *sisya*, que M. de Lamarck nomme *essera* dans cet article, dénomination dont il n'a point fait usage.

1.° ARISTIDE des Antilles. *Aristida Antillarum*.

Aristida caule repente, ramoso ; foliis filiformi-subulatis ; panicula ramis brevibus, subsacundis ; calicibus bifloris. (N.)

Aristida adscensionis, var. p. Lam. Ill. n.° 775.

Ses racines sont fibreuses & blanchâtres ; elles produisent plusieurs tiges rameuses, les unes rampantes, les autres presque droites, articulées, un peu flexueuses, garnies de feuilles filiformes, presque tubulées, glauques, plus courtes que les tiges. Les panicules sont oblongues, légèrement purpurines, composées de ramifications courtes, alternes, presque simples ; les épillets peu nombreux, sessiles, alternes ; les valves calicinales inégales, aiguës, leur pointe courbée en dedans, contenant deux fleurs, l'une sessile, bivalente ; l'autre univalve, légèrement pédicellée, terminée par trois arêtes inégales ; l'intermédiaire plus longue, mais à peine aussi longue que la corolle.

Cette plante a été observée aux Antilles par M. Richard. M. Ledru l'a également recueillie à Porto-Ricco, & m'en a communiqué des exemplaires. (*V. f.*)

3. ARISTIDE plumeuse. *Aristida plumosa*, Linn.

— Vahl, Symbol. 1. pag. 11. tab. 3. — Lam. Ill. Gener. n.° 778. tab. 41. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 109.

6. ARISTIDE hérissée. *Aristida hystrix*, Linn.

Aristida paniculâ trichotomâ, patente ; arifis aqualibus, glabris ; calice aquali. Thunb. Prodr. 19.

Gramen maderasatanum, arcuatum, paniculâ sparsâ, arifis longis ornatis. Pluk. n. Almag. 174. tab. 191. fig. 3.

7. ARISTIDE capillaire. *Aristida capillacea*, Lam.

Aristida humilis, paniculâ compositâ, capillaceâ ; arifis levibus, divaricatis. Lam. Ill. n.° 777.

Cette plante, par sa délicatesse, par la finesse de ses panicules, par la petitesse de ses fleurs, ressemble à un *apogon*. Ses tiges sont grêles, peu élevées ; ses feuilles glabres, capillaires ; ses fleurs disposées en une panicule courte, médiocrement étalée ; ses divisions ramifiées, capillaires ; chaque fleur pédicellée, fort petite, oblongue ; les valves du calice glabres, inégales, très-aiguës ; celle de la corolle beaucoup plus longue, tubulée, terminée par trois arêtes filifères & divergentes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, où elle a été recueillie par M. Richard. (*V. f. in herb. Lam.*)

8. ARISTIDE filiforme. *Aristida filiformis*. Lam.

Aristida paniculâ compoſitâ, effuſâ, capillacâ ; calicibus unifloris ; ariſtis atriſidâ, prælongâ, levi. Lam. III. n.º 781.

Elle reſſemble, par ſa panicule étalée, au *Sipa juncea*. Ses tiges ſont hautes, glabres, cylindriques, noïrâtres à leurs articulations, ſoutenant une panicule très-ample, fort longue, les ramifications preſque verticillées, réunies de deux ou trois aux verticilles inférieurs, preſque ſolitaires aux ſupérieurs ; glabres, très-liſſes, capillaires, fort longues, diviſées en quelques autres ramifications bifurquées, terminées par une fleur ſubulée, étroite, allongée, d'un brun-foncé ; la valve extérieure du calice étroite, ſubulée, l'intérieure obtuſe, une fois plus courte ; la corolle compoſée d'une ſeule valve, plus courte que le calice, velue à ſa baſe, aiguë, roulée ſur elle-même, terminée par trois arêtes longues d'environ trois pouces, caduques, de même longueur, réunies & torſes enſemble à leur partie inférieure. Les ſemences ſont d'un brun-clair, oblongues, cylindriques, obtuſes à leur ſommet après la chute des arêtes.

Cette plante croît au Sénégal ; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

9. ARISTIDE piquante. *Aristida pungens*. Desf.

Aristida culmo perennante ; foliis ſubulatis, rigidis, pungentibus ; paniculâ laxâ ; ariſtis tribus plumoſis, ſubæqualibus. Desf. Flor. atlant. I. pag. 109. tab. 33.

Cette eſpèce eſt remarquable par ſes tiges droites, glabres, ligneuſes, hautes de ſix à ſept pieds, rameuſes à leur partie inférieure, garnies de feuilles glabres, roides, étalées, très-aiguës, longues d'un pied & plus, canaliculées en deſſus. Les fleurs ſont diſpoſées en une longue panicule très-ouverte ; les ramifications ou pédoncules capillaires & rameux. Le calice eſt compoſé de deux valves membraneuſes, preſqu'égales, concaves, aiguës. La corolle n'a qu'une ſeule valve, cortice, aiguë, preſque cylindrique, fendue longitudinalement, terminée par une arête articulée, à trois diviſions plumeuſes, preſqu'égales, deux & trois fois plus longue que les épillets. Les ſemences ſont grêles & allongées.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les ſables humides, aux environs de Sfax, dans les déſerts de la Barbarie. (V. f. in herb. Desfont.)

10. ARISTIDE bleuâtre. *Aristida caulescens*. Desfont.

Aristida foliis glabris ; paniculâ coarctatâ, elongatâ, arcuatâ, ſubſecundâ, interruptâ ; ariſtis leviſſis, ſubæqualibus. Desf. Flor. atlant. I. pag. 109. tab. 21. fig. 2.

gata, arcuatâ, ſubſecundâ, interruptâ ; ariſtis leviſſis, ſubæqualibus. Desf. Flor. atlant. I. pag. 109. tab. 21. fig. 2.

Ses racines ſont compoſées de fibres tortueuſes ; elles produiſent des tiges preſque filiformes, ſouvent rameuſes à leur baſe, noueüſes, très-liſſes, hautes de deux ou trois pieds & plus, garnies de feuilles glabres, étroites. Les panicules ſont étroites, allongées, arquées, unilatérales, interrompues, rudes, de couleur bleuâtre ; les pédoncules capillaires, inégaux ; les épillets grêles, cylindriques, ſubulées, ne renfermant qu'une ſeule fleur, grêle, univalve, aiguë, ſurmontée d'une arête, à peine du double plus longue que la corolle, à trois diviſions très-glabres, capillaires, preſqu'égales. Les ſemences ſont grêles, oblongues, très-glabres.

Cette plante croît dans la Barbarie, aux environs de Korouan ; elle a été découverte par M. Desfontaines. (V. f. in herb. Desfont.)

11. ARISTIDE purpurine. *Aristida purpurescens*.

Aristida foliis anguſtoſubulatis, ſtriatis ; paniculâ longâ ſpicatâ ; ariſtis ſubæqualibus. (N.)

Ses tiges ſont glabres, filiformes, un peu comprimées ; les feuilles étroites, ſtriées, droites, preſque planes, ſubulées à leur partie ſupérieure ; les fleurs diſpoſées en une panicule en forme d'un long épi grêle ; les ramifications courtes, preſque ſimples, ſilantes, ſectées contre les tiges ; les fleurs ſupérieures leſſes. Le calice eſt compoſé de deux valves inégales, étroites, aiguës, purpurines, uſſes ; la corolle à une ſeule valve allongée, très-étroite, terminée par trois arêtes preſqu'égales, une fois plus longues que la corolle, qui renferme une ſemence grêle.

Cette plante m'a été communiquée par M. Boſc, qui l'a recueillie dans la Caroline. (V. f.)

12. ARISTIDE à longs épis. *Aristida longispica*.

Aristida culmo ſubcompreſſo, ſiſiformi, ramoſo ; foliis ſiſiformibus ; ſpicâ gracili, elongatâ ; ariſtis valdè inæqualibus. (N.)

Cette eſpèce eſt très-voisine de la précédente ; elle en diſſe par ſes fleurs beaucoup plus petites, par ſes arêtes très-inégales. Ses tiges ſont rameuſes, glabres, ſiſiformes, un peu comprimées, hautes d'un à deux pieds ; les feuilles glabres, roides, ſiſiformes. Les panicules offrent un épi grêle, très-long, ſiſiforme, peu garni, interrompu ; les ramifications courtes, ſimples, ſectées contre les tiges. Le calice eſt uniſſe, à deux valves étroites, aiguës, preſqu'égales ; la valve de la corolle fort étroite, ſubulée, terminée par trois arêtes & celle du milieu divergente, une fois

plus longue que la corolle; les deux autres beaucoup plus petites.

Cette plante croît dans la Caroline; elle m'a été communiquée par M. Bosc, qui en a fait la découverte. (V. f.)

13. ARISTIDE laineuse. *Aristida lanata*.

Aristida foliis longissimis, scabris; vaginis lanatis; ramis panicula elongatis, subverticillatis; pedunculis basi pilosis, aristis subaequalibus. (N.)

Ses tiges sont cylindriques, élevées, garnies de feuilles roides, très-longues, rudes sur leurs bords, étalées; leurs gaines lisses, laineuses; la panicule allongée, médiocrement étalée; ses ramifications réunies deux par deux en verticille, médiocrement rameuses, resserrées en épi; le rachis, les pédoncules & les pédicelles très-rudes, accompagnés à leur base d'une petite touffe de poils blancs & laineux. Les fleurs sont étroites, tubulées; les valves calicinales unifoires, glabres, très-aiguës; l'extérieure plus longue, un peu purpurine; la valve de la corolle étroite, roulée à ses bords, plus courte que le calice, terminée par trois arêtes presque égales, divergentes, presque deux fois aussi longues que la fleur; les lemmes grêles, allongées.

Cette plante a été recueillie par M. Bosc dans la Caroline. (V. f. Comm. Bosc.)

14. ARISTIDE festuicoïde. *Aristida festuicoides*.

Aristida foliis angusto-subulatis; panicula spicata, subsecunda; aristis subaequalibus. (N.)

Cette espèce ressemble, par sa panicule, au festuca bromoïdes. Ses tiges sont grêles, cylindriques, très-glabres; les feuilles courtes, étroites, aiguës, presque subulées, ouvertes; leur gaine glabre, fort longue. La panicule est peu étalée, ramifiée par verticilles presque unilatéraux, ayant l'aspect d'un épi incliné, long de cinq à six pouces & plus. Les fleurs sont toutes pédicellées, très-étroites, subulées; les valves calicinales inégales, unifoires, très-aiguës; celle de la corolle un peu plus longue, terminée par trois arêtes (ou une arête triède) droites, presque égales, plus longues que la corolle.

Cette plante croît au Sénégal; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

15. ARISTIDE à fleurs rares. *Aristida oligantha*. Mich.

Aristida culmis stridit erectis, subramosis; foliis convolutis-filiformibus, praelongis; floribus aequaliter alternis, solitariis; aristis tribus, glama longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 41.

Ses racines sont courtes & fibreuses; elles pro-

duisent une tige roide, glabre, filiforme, qui souvent se ramifie à ses premiers nœuds, qui sont un peu coudés. Les feuilles sont droites, un peu roides, glabres, filiformes, roulées sur elles-mêmes. Les fleurs sont presque sessiles, unifoires, dilatées, presque scitiformes, assez grands, & se forment un épi lâche, terminal. Lorsqu'il y a deux fleurs, l'une est pédicellée; l'autre sessile, axillaire. Les valves calicinales sont longues, très-aiguës, presque égales; celle de la corolle à peu près de la même longueur, dure, très-glabre, terminée par une très-longue & forte arête, torse à sa base, qui est souvent simple ou triède dans l'individu que je possède; les deux divisions latérales fort courtes, caduques.

Cette plante croît dans les prés, au pays des Illinois. (V. f.)

16. ARISTIDE à tige roide. *Aristida strida*. Mich.

Aristida culmis foliisque stridit erectis; foliis pubescentibus; racemo in spicam longam, angustum, non ita confertim coarctato; aristis glama longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 41.

Ses tiges sont droites, très-roides, garnies de feuilles pubescentes, quelquefois planes, d'autres fois roulées & filiformes. Les fleurs sont disposées en une panicule ou une sorte de grappe longue, étroite, terminale, resserrée en épi, médiocrement touffue; la valve florale surmontée d'une arête très-longue.

Cette plante a été découverte par Michaux dans la Baie Caroline.

17. ARISTIDE dichotome. *Aristida dichotoma*. Mich.

Aristida stridit multicaulis, setacea; culmis dichotomis; floribus parvulis, subsessilibus, subunariatis; aristis glama brevioribus & basi contortis, lateralibus brevissimis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 41.

Ses racines produisent plusieurs tiges roides, dichotomes, setacées, glabres, ainsi que les feuilles. Les fleurs sont fort petites, presque en épi; la valve de la corolle surmontée ordinairement d'une seule arête torse à sa base, plus courte que la corolle, quelquefois accompagnée de deux autres arêtes latérales très-courtes.

Cette plante croît dans la Haute-Caroline, aux environs de Lincoln.

18. ARISTIDE setacée. *Aristida setacea*. Retz.

Aristida culmo erecto, aristis scabrisculis. Retz. Observ. bot. 4. pag. 22. — Willd. Spéc. Plant. 1. pag. 460.

Ses tiges sont ordinairement simples, droites,

roï les ; elles se terminent par une panicule resserree. Le calice est unifi- re, composé de deux valves ; l'intérieure plus longue & plus grêle, surmontée d'une pointe presque en arête ; l'extérieure plus courte, acuminée, un peu sailante en carène ; la corolle univalve, lamineuse à sa base, terminée par des arêtes un peu rudes.

Cette plante croit au Malabar, dans les lieux arides & stériles. (*Descript. ex Retz.*)

19. *ARISTIDE* rabattue. *Aristida depressa*. Retz. *Aristida culmis trifido-ramosis, decumbentibus, aristis fasciculatis*. Retz. Obs. bot. 4. pag. 22. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 461.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la précédente ; elle en diffère par ses fleurs plus petites, par ses arêtes moins divergentes, par les proportions relatives de grandeur des tiges & des valves. Ses tiges sont filiformes, couchées, trifides ou rameuses, longues d'environ un pied & demi, garnies de feuilles très-étroites, médiocrement roulées. La panicule est presque unilatérale ; le calice à une seule fleur ; les valves sailantes en carène, aiguës, blanches, vertes sur leur dos ; l'extérieure une fois plus courte ; les arêtes rudes au toucher.

Cette plante croît dans les lieux stériles, au Malabar. (*Descript. ex Retz.*)

20. *ARISTIDE* du Cap. *Aristida vestita*. Thunb. *Aristida paniculâ trichotomâ, patentî ; aristis equalibus, glabris ; apice inaequali*. Thunb. Prodr. 19.

Cette plante, d'après Thunberg, a des tiges terminées par une panicule ample, étalée, divisée en trois parties. Les valves calicinales sont inégales ; celle de la corolle est surmontée par trois arêtes glabres, d'égale longueur. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

Observations. D'après la remarque de Thunberg, il faut rapporter ici l'*avena capensis* de Linné fils, à cause de ses trois arêtes.

21. *ARISTIDE* pâle. *Aristida pallens*. Cavan. *Aristida paniculâ pauciflorâ ; pedicellis alternis, bifloris, approximatis ; aristis capillaribus, longissimis*. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 43. tab. 468. fig. 2.

Ses racines produisent plusieurs tiges cylindriques, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles radicales, nombreuses, filiformes, très-aiguës, un peu plus courtes que les tiges ; deux ou trois feuilles caulinaires, à longue gaine. La panicule est peu garnie, longue de trois pouces ; les pédoncules alternes, bifides, soutenant deux fleurs ; les

deux valves du calice glabres, très-aiguës ; l'intérieure longue d'un pouce, l'extérieure une fois plus courte ; celle de la corolle oblongue, velue à sa base, terminée par trois arêtes longues de trois pouces & plus.

Cette plante croît au Chili, aux environs de la ville de Cucha-Cucha.

22. *ARISTIDE* à épi ovale. *Aristida marina*. Cavan.

Aristida paniculâ subspicatâ ; ramulis alternatim binis, subquingefloris ; calicibus violaceis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 44. tab. 469. fig. 1.

Ses tiges sont hautes de cinq à six pouces ; ses feuilles longues de trois, roulées à leur partie supérieure. La panicule ressemble à un épi ovale-allongé, de deux pouces de long ; les ramifications alternes deux par deux ; les supérieures très-courtes ; les valves du calice glabres, violettes, très-aiguës ; l'intérieure longue d'un pouce, l'extérieure une fois plus longue ; la valve de la corolle terminée par trois arêtes presque égales, longues de deux pouces.

Cette plante croît dans l'île de Mindanao, proche Samboangan. (*Descript. ex Cavan.*)

23. *ARISTIDE* à tige droite. *Aristida rigida*. Cavan.

Aristida paniculâ contractâ ; foliis rigidis, subulatis, culmo parallelis ; aristarum mediâ duplô longiore. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 44. tab. 469. fig. 2.

Ses tiges sont glabres, hautes de trois pieds, garnies dans toute leur longueur, de feuilles rigides, longues de trois ou quatre pouces, subulées, canaliculées, redressées dans la direction des tiges, un peu épineuses à leur sommet. Les fleurs sont petites, disposées en une panicule resserree, longue d'environ six pouces, composée de plusieurs rameaux placés en verticilles alternes, ramifiés. Les valves du calice sont violettes, presque égales, très-aiguës, longues d'une ligne & demie ; celle de la corolle plus courte que le calice, surmontée de trois arêtes ; celle du milieu une fois plus longue.

Cette plante croît aux îles Philippines. (*Descript. ex Cavan.*)

24. *ARISTIDE* à panicule lâche. *Aristida laxa*. Cavan.

Aristida paniculâ laxâ ; pedicellis nudis, elongatis, bifidis ; spiculis terminalibus, aristis infernè contortis. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 44. tab. 470. fig. 1.

Ses racines produisent des tiges simples, lési-

culées, hautes de deux pieds, garnies, dans leur longueur, de deux ou trois feuilles roulées, subulées, glabres, frisées sur leur gaine; les radicales presque longues d'un pied. Les panicules sont droites, lâches, longues d'un pied & plus; les ramifications distantes, comprimées, bifides, supportant des épillets longs d'un pouce & plus. Les valves du calice sont brunes, presque égales, subulées; celle de la corolle un peu plus courte, velue à sa base, terminée par trois arêtes rorses à leur partie inférieure; celle du milieu beaucoup plus longue. Les semences sont oblongues, cylindriques, luisantes, marquées d'un sillon longitudinal, fortement enveloppées par la corolle.

Cette plante croît aux îles Philippines & à Monte-Video. (*Descript. ex Cavan.*)

25. ARISTIDE de Luzon. *Aristida luzoniensis*. Cavan.

Aristida culmo ramoso, paniculâ contractâ, spiculis alterna im pluribus, aristis subaequalibus. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 45. tab. 470. fig. 2.

Ses tiges sont glabres, nombreuses, ramifiées, articulées, hautes de trois pieds; les feuilles roulées, subulées, peu ouvertes; les radicales nombreuses, longues d'un pied; les caulinaires munies d'une gaine ferrée. Lignée, longue de deux pouces. La panicule est restreinte, longue d'environ quatre pouces, composée de plusieurs épillets épars, alternes; les valves du calice très-aiguës, jaunâtres; l'intérieure un peu plus longue; celle de la corolle oblongue, roulée à ses bords, velue à sa base, surmontée de trois arêtes presque égales, de la longueur des valves; les semences cylindriques, couvertes de points bruns.

Cette plante croît dans l'île de Luzon, l'une des Philippines. (*Descript. ex Cavan.*)

26. ARISTIDE lèche. *Aristida vagans*. Cavan.

Aristida panicula ramulis divaricatis, paucifloris; corollâ calicibus longiore; aristis brevibus, mediâ prodestiore. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 45. tab. 471. fig. 1.

Ses racines produisent des tiges glabres, hautes de deux ou trois pieds, rougeâtres à leurs nœuds; les feuilles subulées, longues d'un demi-pied; les fleurs disposées en une panicule très-lâche, peu rameuse; les rameaux étalés, peu garnis de fleurs; les valves calicinales médiocrement aiguës; l'extérieure plus courte; la corolle velue à sa base, surmontée de trois arêtes; celle du milieu plus longue.

Cette plante croît au port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande. (*Descript. ex Cavan.*)

27. ARISTIDE interrompue. *Aristida interr. pta.* Cavan.

Aristida panicula ramis virgatis; foram fasciculis interruptis; corollâ calicibus longiore. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 45. tab. 471. fig. 2.

Ses tiges sont hautes de trois pieds & plus, renflées & rougeâtres à leurs nœuds; les feuilles droites, subulées, longues d'un pied & plus; les gaines presque de la longueur des deux racines. Les panicules sont composées de longs épis grêles; les épillets médiocrement pedunculés, réunis par fascicules peu épais, distans les uns des autres; les valves du calice très-aiguës, l'intérieure plus longue; celle de la corolle un peu plus longue que le calice, velue à sa base, munie de trois arêtes barbuës; celle du milieu plus longue.

Cette plante croît au Mexique, proche la villa de Chama. (*Descript. ex Cavan.*)

28. ARISTIDE de Panama. *Aristida tenuipes*. Cavan.

Aristida paniculâ contractâ, longissimâ; ramulis alternatim ternis, capillaribus; aristâ intermediâ longiore. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 46.

Ses feuilles sont roulées, subulées, longues d'un pied & demi; ses panicules de même longueur, composées de rameaux capillaires, trois par trois, rapprochés des rachis, portant à leur sommet environ dix fleurs pédicellées, alternes; les valves du calice vertes, subulées; l'extérieure un peu plus courte; celle de la corolle plus longue, velue à sa base; les deux arêtes latérales courtes; celle du milieu longue d'un demi pouce.

Cette plante croît à l'isthme de Panama. (*Descript. ex Cavan.*)

29. ARISTIDE élevée. *Aristida elatior*. Cavan.

Aristida culmo ramoso, altissimo; paniculâ elongatâ, calicibus violaceis (corollâ calice duplâ longiore), aristis aequalibus. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 65. tab. 589. fig. 1.

Ses tiges sont glabres, rameuses, hautes de quatre pieds, renflées & un peu rugeâtres à leurs nœuds; les feuilles linéaires, très-étroites, souvent roulées, très-aiguës, longues de six à douze lignes; les panicules souvent longues d'un pied, interrompues à leur partie inférieure; les rameaux redressés, inégaux, réunis deux ou trois; les fleurs alternes, solitaires, pédicellées; les valves du calice violettes, aiguës; l'intérieure plus longue; celle de la corolle une fois plus longue que le calice, très-glabre, surmontée de trois arêtes presque égales, du double plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans les lieux arides & pierreux, non loin des rivages de la mer, en Espagne, dans le royaume de Valence. (*Descript. ex Cavan.*)

ARISTOLOCHIE. *Aristolochia*. Ce genre est si naturel, qu'il ne peut être confondu avec aucun autre. Les rapports qu'il paroît avoir avec les *pistia* & les *esfara* n'existent que dans quelques parties de ses fleurs. La forme singulière de ces dernières est très-remarquable. Quoiqu'elles aient peu de volume & d'éclat, on en trouve cependant d'assez grandes, variées dans leurs nuances, agréablement portées, & les unes sont même recourbées & étant le modèle parfait d'une pipe de l'Orient (*Aristolochia siphon*); d'autres munies d'un tube ventru ou globuleux à la base, presque droit, surmonté d'une sorte de languette plane, prolongée, dans quelques espèces, en un long filer linéaire ou sésac. Les uns sont herbacées: c'est le plus grand nombre. Quelques-unes sont ligneuses. Parmi celles de ces dernières que nous sommes parvenus à acclimater, la plus intéressante est l'*Aristolochia siphon*, qui vient dans presque tous les terrains, en pleine terre, qui ne craint point les froids de l'hiver, même dans nos départemens méridionaux. Ses grandes & belles feuilles, ses tiges qui s'élèvent jusqu'au sommet des plus grands arbres, tant qu'elles trouvent un appui, peuvent fournir à nos jardins une de leurs plus belles décorations. Ses rameaux se fourmentent à toutes sortes de formes; ils s'étendent en palissades, se courbent en berceaux, se prolongent en guirlandes, retombent en festons, & procurent beaucoup d'ombre & de verdure. Plusieurs *Aristoloches* jouissent, dans l'Amérique, d'une grande réputation, comme efficaces contre la morsure des serpents. On a attribué d'autres propriétés aux espèces européennes, qui leur ont fait donner par les Anciens le nom qu'elles portent. S'il est assez agréable pour l'oreille, il ne l'est guère pour l'imagination lorsque l'on connoît son étymologie grecque.

ESPÈCES.

1.* **ARISTOLOCHIE réniforme.** *Aristolochia reniformis*. Willd.

Aristolochia foliis reniformibus, emarginatis, palmatis; caule volubili; corollis erectis, pendulatis; labio spatulato, retnso, incurvo, levii. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 153.

Aristolochia peltata. Swartz, Obf. 341.

« Elle ressemble beaucoup, dit Willdenow, à l'*Aristolochia peltata* Linn.; mais elle en diffère par l'inflexion du pédoncule sur le bord des feuilles, qui alors ne font point réellement peltées, mais réniformes. Les fleurs ont leur languette lisse & non hérissée, obtuse & recourbée. »

Cette plante croît à Saint-Domingue. *h*

3. **ARISTOLOCHIE trilobée.** *Aristolochia trilobata*. Lam. — Jacq. Obf. 1. pag. 8. tab. 3.

Aristolochia (surinamensis), foliis trilobis, caule

volubili; corollis cylindraceis, incurvis, basi ventricosis; lacinia coracae, plana. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 151.

4. **ARISTOLOCHIE trifide.** *Aristolochia trifida*. Lam.

Aristolochia (trilobata), foliis trilobis, caule volubili; floribus maximis, basi falcatis; linguâ linearilongâ sinâ. Swartz, Obf. bor. 341. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 151.

Aristolochia (trilobata), foliis trilobis, caule volubili, floribus maximis. Linn. Spec. 1361.

Comme j'ignore d'après quelle autorité MM. Swartz & Willdenow ont cru que l'*Aristolochia trifida* Lam. étoit l'*Aristolochia trilobata* de Linné, & non celle décrite sous ce dernier nom par M. de Lamarck, je me borne à mentionner ici cette réforme, sans pouvoir en exprimer les raisons. Ces deux espèces (3 & 4), qui l'une que soit le nom qu'elles portent, seront toujours très-faciles à distinguer par l'appendice de la corolle, en cœur & sans queue dans la première, prolongé, dans la seconde, par une très-longue queue étroite & linéaire.

5.* **ARISTOLOCHIE de Kœmpfer.** *Aristolochia Kœmpferi*. Willd.

Aristolochia foliis cordatis, hastato-subtrilobis; caule volubili; pedunculis unifloris, nudis; corollis infundibulatis, limbo ovato. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 152.

San-kakfo. Kœmpf. Amoen. 884. — Banks, Ic. Kœmpf. tab. 49.

Cette plante ressemble beaucoup à l'*Aristolochia pentandra*; elle en diffère par ses fleurs deux fois plus grandes, par ses pédoncules dépouillés de bractées. Ses tiges sont grimpantes; ses feuilles échancrées en cœur, hautes, presque à trois lobes; ses pédoncules uniflores. Elle croît au Japon. *h*

5.** **ARISTOLOCHIE panduriforme.** *Aristolochia panduriformis* Jacq.

Aristolochia foliis oblongis, acuminatis, cordatis, medio utrinque angustatis; lobis elongatis, obtusis; caule volubili. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 152.

Ce n'est que sur le port de cette plante que M. Jacquin l'a jugée comme devant appartenir aux *Aristoloches*, n'ayant pas pu observer ses fleurs. Elle est d'ailleurs très-reconnoissable par la forme particulière de ses feuilles, ayant de chaque côté, à leurs bords, une échancrure qui leur donne la forme d'un violon; elles sont oblongues, échancrées en cœur, acuminées; les lobes allongés & obtus. Les tiges sont grimpantes & ligneuses.

Cette

Cette plante croît en Amérique, aux environs de Caracas. \S

6. ARISTOLOCHE ridée. *Aristolochia rugosa*. Lam.

Aristolochia (obtusata), foliis cordatis, apice rotundatis, trinerviis, subulis reticulato-venosis, tomentosis; caule volubili, pedunculis solitariis. Sw. Pro fr. 126, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1563. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 155.

10.* ARISTOLOCHE à grandes fleurs. *Aristolochia grandiflora*. Swartz.

Aristolochia foliis lato-cordatis, caule volubili, pedunculis solitariis; limbo corollae maximo, integro; labio longissimè caudato. Swartz, Prodr. 121, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1566. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 155.

Aristolochia scandens, foliis amplioribus, cordatis; florum flabellis maximis, variegatis, in appendicem longam tenuemque desinentibus. Brown, Jam. 329.

La forme de la corolle, quoique très-grande, distingue cette belle espèce de l'*Aristolochia ringens*. Ses tiges sont grimpantes, presque ligneuses; les rameaux filiformes, herbacés; les feuilles en cœur, un peu arrondies, entières, à peine aiguës, glabres, larges de quatre à cinq pouces; les fleurs solitaires, axillaires, pendantes; le tube de la corolle ventru un peu au dessus de sa base, blanc, tomenteux en dehors, puis rétréci, cylindrique, anguleux, fortement coudé, s'élargissant en un limbe entier, presque en cœur, dont le bord inférieur se prolonge en une lèvre acuminée, terminée par un appendice linéaire, long d'un pied. Les capsules sont pendantes, pédicellées, à six angles, à six loges, contenant des semences nombreuses, comprimées, arrondies.

Cette plante crît sur les basses montagnes, à la Jamaïque. \S (Description ex Vahl.)

10.* ARISTOLOCHE en gueule. *Aristolochia ringens*. Vahl.

Aristolochia foliis subrotundo-cordatis; stipulis solitariis, subrotundis, cordatis, amplexicaulis; caule volubili; corollis adscendentibus, bilabiatis; labio superiore spatulato, inferiore lanceolato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 165. — Vahl, Symbol. 3. pag. 99.

Aristolochia grandiflora. Vahl, Symb. 2. pag. 94. tab. 47. (Exclus. synonym.)

Cette belle espèce, distinguée par la grandeur & par la forme de sa corolle, a des tiges glabres, cylindriques, grimpantes; des feuilles pétiolées, presque rondes, échancrées en cœur, larges de trois pouces & plus, glabres à leurs deux fa-

Botanique. Supplément. Tome 1.

ces, glauques en dessous, veinées, réticulées, marquées de cinq nervures; deux stipules larges d'un pouce, axillaires, inégales, pédicellées. La corolle est longue de six à sept pouces, traversée en dehors de veines réticulées & purpurines, tachetée en dedans. Le tube est très-enté, ovale à sa partie inférieure, courbé, puis redressé, dilaté à sa partie supérieure, divisé presque en deux lèvres; l'une en forme de spatule; l'autre inférieure beaucoup plus longue, lancéolée, obtuse.

Cette plante croît à la Jamaïque. (Description ex Vahl.)

11.* ARISTOLOCHE barbue. *Aristolochia barbata*. Jacq.

Aristolochia foliis cordatis, oblongis; caule volubili, corollis rectis, limbo dilatato, labio spatulato, apice barbato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 156. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 608, & Collect. 3. pag. 221.

Ses tiges sont fort longues, ligneuses, grimpantes, divisées en plusieurs rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, glabres à leurs deux faces, oblongues, profondément échancrées en cœur à leur base; les lobes obtus. Les fleurs sont solitaires, pédonculées; la corolle droite, infundibuliforme à sa partie inférieure, dilatée à son limbe; la languette en ovale renversé, presque spatulée, hérissée de poils vers son sommet.

Cette plante croît dans la province de Caracas. \S

11.* ARISTOLOCHE parfumée. *Aristolochia fragrantissima*. Ruiz.

Aristolochia foliis cordatis, acuminatis, nitibus; caule fruticoso, scandente; pedunculis solitariis seu ternis, unifloris, brevibus. Ruiz, Memor. sobre las virtudes de bejuco della Strelli. Madrid, 1805. pag. 46. Icon. — Pers. Synops. Plant. 2. pag. 527.

Ses tiges sont ligneuses & grimpantes, garnies de feuilles alternes, douces au toucher, entières, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont axillaires, très-odorantes; les pédoncules courts, solitaires ou réunis au nombre de deux ou trois, uniflores. La corolle est brune, lavée de rose, velue en dedans; son tube cylindrique; son limbe oblique, prolongé par une languette réfléchie à son sommet.

Cette plante croît dans les forêts du Pérou. Les Indiens emploient les tiges pour fabriquer des cordes grossières & des cables. \S

13. ARISTOLOCHE de l'Inde. *Aristolochia indica*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 733. fig. 2. — Gærtn. de Fruct. & Sem. tab. 14.

M m m

16. ARISTOLOCHE à grandes feuilles. *Aristolochia macrophylla*. Lam.

Aristolochia (lipo), *foliis cordatis, petiolatis; floribus solitariis; limbo trifido, aequali; bracteis ovatis; caule volubili, frutescente*. L'herit. Stirp. 13. tab. 7. — Alt. Hort. Kew. 3. pag. 311. — Mich. Flor. boreal. Amet. 2. pag. 161.

16.* ARISTOLOCHE élevée. *Aristolochia altissima*. Desfont.

Aristolochia caule fruticoso, scandente; foliis pennatis, cordatis, undulatis; floribus solitariis; incurvis; pedunculis petiolo longioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 324. tab. 149.

Aristolochia cretica, scandens, altissima, pistilochia foliis. Tourn. Coroll. pag. 8. — Schaw. Spec. n°. 49.

Cette espèce se rapproche de l'*Aristolochia sempervivens*, dont elle diffère par ses riges ligneuses, grimpantes, très-élevées; par ses feuilles trois fois plus grandes; elle parvient à la hauteur de dix-huit à vingt pieds; elle est soutenue par les arbres, autour desquels elle s'entortille. Sa tige est de la grosseur du pouce, divisée en rameaux grêles, soibles, tortueux, striés, fort longs, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales-oblongues, échancrées en cœur à leur base, fermes, luisantes, d'un vert-foncé, émettes, légèrement ondulées à leurs bords, un peu olivées, longues de deux pouces & plus, larges d'un pouce & demi; les pétioles à peine longs d'un pouce.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par un pédoncule filiforme, incliné, plus long que les pétioles. La corolle est courbée, arquée, d'un pourpre-foncé en dehors, jaune & sillonnée de lignes brunes en dedans; le limbe prolongé en une languette droite, lancéolée, un peu obtuse, entière; les capules pendantes, cylindriques, obtuses, de la grosseur du pouce, à six pans, à six loges; les lances lisses & en forme de cœur.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines sur le mont Atlas & aux environs d'Alger. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (P. v.)

Observations. L'*Aristolochia glauca* (Desf. Flor. atlant. tab. 250), que M. Desfontaines dit être très-rapprochée de la précédente, & n'en diffère que par ses feuilles plus courtes & obtuses, par ses corolles d'un pourpre-violet & par son limbe ovale & trois fois plus large, ne paroît être la même plante que l'*ARISTOLOCHE glauque*, n°. 22.

18. ARISTOLOCHE de Crète. *Aristolochia cretica*. Lam. — Desfont. Coroll. Tourn. pag. 12. tab. 7.

18.* ARISTOLOCHE à bractées. *Aristolochia bracteata* Retz.

Aristolochia foliis cordatis, obtusis; caule infirmo, floribus solitariis; bracteis cordatis, petiolatis Retz. Observ. 5. pag. 29. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 160.

Ses tiges sont soibles, herbacées, flexueuses, striées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, arrondies, échancrées en cœur à leur base, obtusées à leur sommet. Les fleurs sont solitaires, axillaires, portées sur des péduncules simples, uniflores, plus courts que les feuilles, les bractées en cœur, pétiolées. La corolle se prolonge à son limbe en une languette allongée & courbée.

15. ARISTOLOCHE ronde. *Aristolochia rotunda*. Linn.

Var. p. Linn. — *Aristolochia pallida*. Willd.

Aristolochia foliis cordatis, ovatis, obtusis, emarginatis, petiolatis; lobis divaricatis; caule flexuoso, erectifloro; pedunculis solitariis, unifloris; corollis erectis; labio lanceolato, retuso. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 162.

25.* ARISTOLOCHE jaune. *Aristolochia lutea*. Desfont.

Aristolochia caule erecto, non scandente; foliis cordatis; floribus solitariis, luteis; calicis limbo incurvo, fornicato; capsulis cernuis. Desfont. Coroll. Tourn. pag. 13. tab. 8.

Aristolochia orientalis, rotunda, folio oblongo, cordiformi; flore tubulato, luteo. Tourn. Coroll. 9.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec l'*Aristolochia* ronde; elle en diffère par ses fleurs jaunes, dont la languette est plus écartée, un peu pointue. Ses racines sont dures, charnues, arrondies, quelquefois cylindriques; il s'en élève une rigle grêle, soible, striée, rameuse à la base, garnie de feuilles glabres, en cœur, entières, obtuses, souvent échancrées au sommet, longues d'un à deux pouces; les pétioles courts. Les fleurs sont solitaires, axillaires, presque sessiles; les corolles jaunes, tendues à leur base, inflexibles, élargies vers leur sommet, terminées par une languette voûtée, recourbée & un peu pointue; l'entrée du tube d'un violet-foncé; les capules pendantes, pyriformes, sillonnées, à six loges polypermes.

Cette plante croît dans le Levant. (Descript. ex Desfont.)

26. ARISTOLOCHE longue. *Aristolochia longa*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 753. fig. 2.

* *Aristolochia* (arborescens), *foliis cordato-lanceolatis; caule erecto, fruticoso*. Linn. Spec. 1362. — Hort. Cliff. 433. — Mill. Dict. n°. 7.

Aristolochia polyrhiza, *auriculatis foliis*, *virginiana*, Pluken. Almag. 52. tab. 68. fig. 1. ?

An aristolochia serpentaria var. ? Lam. n.º 21.

Ses tiges sont droites & ligneuses ; ses feuilles lancéolées, échancrées en cœur. Elle croît dans l'Amérique. h

ARISTOLOCHIA. (Voyez ARISTOLOCHE.)

ARISTOTELEA. Lour. Flor. cochin. Genre de plantes monoclérodées, de la famille des orchidées, établi par Loureiro, & qui doit rentrer dans le genre *neottia* de Swartz. (Voy. NEOTTIA, Suppl.)

ARISTOTELIA. Lam. Ill. tab. 399. (Voyez MAQUI, Suppl.)

ARMARINTE. *Cachrys*. Ce genre est distingué par ses fruits, assez grands, ovales, cylindriques, anguleux, velus dans la plupart des espèces, recouverts d'une écorce épaisse & fongueuse.

1. ARMARINTE à fruits lisses. *Cachrys levigata*. Lam. — Pourr. Aët. Tolos. 3. pag. 309.

Cachrys Marifonti. Allioni, Auct. pag. 23. — Vahl, Symb. 3. pag. 49.

Cachrys libanotis. Gouan, Illustr. pag. 12. Non Linn.

Cachrys (pencedanoides), *foliis filiformibus*, *levibus* ; *involucris pinnatifidis* ; *semine levi*, non *saucato*, *semiseroti*. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 250.

3. ARMARINTE de Sicile. *Cachrys ficula*. Linn. — Lam. Ill. tab. 205.

5. ARMARINTE à feuilles de panais. *Cachrys poffinacea*. Lam.

Cachrys (tomentosa), *foliis lobatis*, *villofis*, *dentatis* ; *semine tereti*, *tomentoso*. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 249.

Myrrhis annua, *luscianica*, *semine villoso*, *poffinacea* *suavia folio*. Tournef. Inst. R. Herb. 315.

Cachrys (panacisfolia), *foliis pinnatis ternatifque* ; *foliolis oblongis*, *crenatis* ; *feminibus hirsutis*. Vahl, Symb. 1. pag. 25.

7. ARMARINTE de la Tauride. *Cachrys taurica*. Willd.

Cachrys foliis bipinnatis ; *foliolis linearibus*, *acutis* ; *feminibus sulcatis*, *tuberculatis*. Willden. Spec. Plant. 1. pag. 1410.

An cachrys libanotis ? Pall. Ind. Flor. taur.

Cette plante se distingue des autres espèces par

les fruits, beaucoup plus petits, chargés de gros tubercules ; par ses fleurs dioïques ; elle ressemble d'ailleurs beaucoup au *cachrys ficula*. Ses feuilles sont plus étroites, deux fois ailées ; les folioles linéaires, aiguës. Les ombelles n'ont point d'involucre universel. Celui des ombelles est composé de huit à dix folioles linéaires. Les semences sont trois fois plus petites que celles du *cachrys ficula* ; elles sont filonnées, garnies de plusieurs rangs serrés de tubercules globuleux, quelquefois rougeâtres.

Cette plante croît dans la Tauride & dans la Sibérie. (Descript. ex Willd.)

8. ARMARINTE à petits fruits. *Cachrys microcarpos*.

Cachrys foliis tripartito-decompositis, *foliolis setaceis*, *feminibus glabris*, *striis crenatis*. Tabl. de la mer Casp. n.º 9.

Elle paroît se rapprocher, par son port & par ses feuilles, du *cachrys glabrata*. Ses semences sont également glabres, mais cannelées & crénelées sur leurs angles ; elles sont d'ailleurs beaucoup plus petites ; les feuilles à trois principales divisions, plusieurs fois ailées ; les folioles sétacées.

Cette plante croît sur les bords pierreux des ruisseaux, dans les lieux montagneux, entre Cuba & Schamachie. x

* ARMARINTE à tige basse. *Cachrys humilis*. Schousb.

Cachrys foliis supra decompositis, *glabris* ; *foliolis linearibus*, *trifidis*, *macronatis* ; *feminibus glabris*, *trifidis*. Schousb. Maroc. edit. germ. pag. 119.

Ce n'est peut-être encore qu'une variété du *cachrys levigata*, à tige plus basse, & dont les semences sont un peu moins glabres. Les feuilles sont glabres, plusieurs fois ailées ; les folioles linéaires, trifides & mucronées.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, proche le cap Sparrel.

* *Cachrys* ? (crispa), *foliis multifidis*, *dichotomis* ; *foliolis linearibus* ; *caulis humilis*, *subdichotomis* ; *feminibus* (parvulis) ; *alvis tenuibus*, *undulato crispis*. Pers. Synops. Plant. 1. pag. 311.

An laserpitium ? Ex horto Lemonnier.

ARMENIACA. (Voyez ABRICOTIER.)

ARMOISE. *Artemisia*. Tournefort avoit divisé en trois genres plusieurs des plantes que Linné a réunies en un seul. On pourroit très-bien le diviser en deux, rangeant avec Tournefort, parmi les armoises, toutes les espèces dont le réceptacle est nu, & parmi les absinthées celles qui ont leur

M m m 2

réceptacle hérissé de poils. Les *aurones* (*abrotanum*) appartiennent à la première division. Tournefort n'en a fait un genre que d'après leur port.

Plusieurs plantes, renfermées dans ce genre, portent des noms vulgaires qui en ont fait la réputation. L'armoise commune (*artemisia vulgaris*), vulgairement *herbe de la Saint-Jean*, que Lobel appelle encore la *mière des herbes* (*mater herbaram*), porte le nom d'une plante ainsi nommée par Dioscoride, mais que bien certainement nous ne connoissons point, & qu'il nous sera toujours impossible de reconnoître d'après le peu qu'il en dit, & malgré ses nombreux & diffus commentateurs. Quoi qu'il en soit, la plante de Dioscoride a été nommée *artemisia*, au rapport de Plin., par la reine Artémise, épouse de Mausole, roi de Carie, qui lui a donné son propre nom, au lieu de celui de *porthenis* qu'elle portoit auparavant. Peut-être aussi a-t-elle été ainsi nommée du mot grec *Archemis*, surnom de Diane, qui passoit pour favoriser les accouchemens, cette plante ayant, dit-on, les mêmes vertus. Ce qu'il y a de plus remarquable, & sur quoi il est bon d'éclaircir le lecteur, c'est qu'en employant le nom *armoise* de Dioscoride pour une plante qui n'est point la sienne, mais bien celle qu'a fait graver son commentateur Matthioli, nous lui avons en même tems attribué les mêmes propriétés, & l'erreur s'est conservée depuis Dioscoride jusqu'à nos jours. Il fust, pour s'en convaincre, d'ouvrir tous les livres de matière médicale, & tous ceux qui traitent des propriétés des plantes : il est même des provinces où on lui rend une sorte de culte superstitieux. Si on la ramasse la veille de la Saint-Jean, & qu'on ait soin de la placer au dessus de la porte des maisons ou au plancher d'une chambre, elle en écarte les enchanteemens & la foudre. J'ai vu les habitans de quelques contrées, en Picardie, se livrer avec confiance à ce genre de superstition.

L'*absinthe*, dont la signification, en grec, annonce qu'elle n'est point potable, que d'autres appelloient aussi *bathypieros* à cause de son extrême amertume, est mentionnée dans Théophraste en trois ou quatre endroits, qui ne fait que la nommer en parlant des lieux où elle croît, & de son extrême amertume. Dioscoride en dit davantage, & l'on est autorisé à croire qu'il a parlé de l'*absinthe* commune & de la Pontique (*artemisia vulgaris-pontica* Linn.), & probablement de l'*absinthe* maritime ou d'une espèce voisine. Ses propriétés & ses usages sont encore à peu près les mêmes que ceux qui ont été indiqués par les Anciens. Les Modernes n'ont presque fait que répéter ce qu'ils en avoient dit. Son odeur forte & aromatique, sa faveur amère, annonçoient assez qu'elle devoit avoir une action puissante sur nos organes. L'*aurone* (*artemisia abrotanum* Linn.), d'une odeur pénétrante, très-agréable, se trouve dans Théophraste sous le nom d'*abrotanon*, qui

signifie *immortelle*, parce qu'elle conserve ses feuilles une partie de l'année, ou qui ne peut se manger, à cause de sa faveur amère & pleine d'acreté. Dioscoride en cite deux espèces. Les Anciens n'ont pas manqué de lui attribuer un très-grand nombre de propriétés, parmi lesquelles il peut s'en trouver quelques-unes de réelles. Il n'existe chez les Anciens aucune description qui puisse le rapporter à l'*ellragon* (*artemisia dracunculula* Linn.). On doit croire qu'ils n'ont point parlé de cette plante.

1. ARMOISE argentée. *Artemisia argentea*. Lhér.

Artemisia fruticosa, sericea, foliis subpalmatis pinnatisve; laciniis lato-linearibus, remotis. Lhér. Sert. Angl. 22. tab. 28.

Artemisia fruticosa, foliis bipinnatifidis, sericeis, candidis; foliis lanceolato-linearibus, floribus globosis; ramulis floriferis, virgatis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 170. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1810.

C'est un fort bel arbrisseau, remarquable par les duvet soyeux & argenté qui recouvre ses feuilles, ainsi que par ses tiges & par ses rameaux d'un blanc-éclatant, raboteux après la chute des feuilles. Celles-ci sont alternes, pétiolées, presque palmées ou pinnatifides; les folioles distantes, linéaires-lancéolées, un peu obtuses, entières ou à découpures rares. Les fleurs sont jaunâtres, globuleuses, pédonculées, placées sur les jeunes tigeaux, formant, par leur ensemble, une panicule allongée, médiocrement étalée. Le réceptacle est velu.

Cette plante croît aux îles Canaries & à Madère. On la cultive, comme plante d'ornement, au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

2. ARMOISE commune. *Artemisia absinthium*. Linn.

Absinthium vulgare. Lam. Illustr. Gen. tab. 695. fig. 1.

A. absinthium inspidum. J. Bauh. 3. pag. 173.

Artemisia (inodora), foliis compositis, tomentosis; floribus subglobosis, receptaculo villosis. Mill. Dict. n°. 16.

Artemisia (liveriana), foliis sublinearis, caulibus bipinnatifidis; floribus trifidis lanceolatisve, ramos panicula subaequantibus; floribus globosis, pedunculatis, mutatis; calicibus fereis. Willden. Spec. 3. pag. 1845. — Ehrh.

Millet regarde comme une espèce distincte la variété *β*, qui se multiplie par semences; elle est inodore, & quoique très-sensible, par son port, à l'armoise commune, elle s'en distingue par les découpures de ses feuilles plus larges. Le réceptacle est velu.

Quant à la variété δ , originaire de Sibérie, également très-rapprochée de l'armoise commune, Willdenow la regarde comme devant en être distinguée comme espèce, par ses racines bifurquées, par ses feuilles dures trois aillées, par ses folioles moins blanches, toutes aiguës; celles qui accompagnent les fleurs, très-longues, trifides; les calices scarieux & le réceptacle pileux. Ces deux derniers caractères existent dans l'armoise commune.

2.* ARMOISE caule abstinthe. *Artemisia abstinthioides*. Hort. Paris.

Artemisia foliis pinnatis, subviridibus; pinnis pinnatifido-incis, acutis; floralibus subsimplicibus; floribus nutantibus, globosis. (N.)

Cette espèce a quelques rapports avec l'armoise commune; elle répand une odeur piquante, approchant de celle de l'*anthemis cotula*. Ses tiges sont droites, herbacées, cannelées, fistuleuses, hautes d'environ deux pieds, très-rameuses; les feuilles vertes, ailées, un peu plus pâles en dessous; les folioles presque pinnatifides, incisées, aiguës; les feuilles florales simples ou quelquefois trifides, plus longues que les fleurs. Celles-ci sont jaunes, globuleuses, pendantes, pédonculées, formant une très-longue panicule droite. Les calices sont scarieux; le réceptacle pileux. Serait-ce la même que l'*Artemisia siberiana* Willd.?

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. J'ignore son lieu natal. γ (V. v.)

3.* ARMOISE rampante. *Artemisia repens*. Willd.

Artemisia foliis albedo-sericeis, pinnatis; pinnis tripartitis, linearibus, acutis; ramis pinnatis, floralibus simplicibus, caule erecto; floribus subrotundis, paucenatis, cernis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1840. — Pallas.

Cette plante répand une odeur agréable; elle se rapproche de l'*Artemisia pontica*. Ses racines sont rampantes; les tiges fertiles couchées; les fertiles redressées, soyeuses, à rameaux paniculés. Les feuilles sont soyeuses & blanchâtres; les caulinaires simplement ailées; les folioles à trois découpures étroites, linéaires, aiguës; les feuilles florales sessiles, étroites, linéaires, simples ou trifides. Les fleurs sont arrondies & pendantes, soutenues par des pédoncules uniflores. Leur calice est blanchâtre, composé d'écaillés obtuses & velues, accompagnées ordinairement de trois petites feuilles, plus courtes que les pédoncules; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Sibérie. γ (Descript. ex Willd.)

5.* ARMOISE d'Orient. *Artemisia orientalis*. Willd.

Artemisia foliis incano-sericeis, inferioribus pinnatis; pinnis tripartitis, superioribus pinnatis; pinnis linearibus indivisis; caule erecto, paniculato; panicula virgata; floribus pedunculatis, subrotundis, nutantibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1836.

Artemisia austriaca, var. β . Lam.

Cette plante, d'après Willdenow, diffère de l'*Artemisia austriaca* Jacq. par son port, par son odeur, par les feuilles toutes ailées, par ses panicules étroites, allongées. Ses tiges sont droites, blanchâtres, hautes d'un pied ou d'un pied & demi, garnies de feuilles d'un blanc soyeux; les racines & inférieures deux fois ailées; les pinnules trifides, linéaires; les supérieures sessiles, ailées; leurs pinnules entières, linéaires. La panicule est composée de rameaux droits, simples, courts, très-rapprochés des tiges; les calices composés d'écaillés obtuses, blanchâtres; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans l'Orient. γ (Descript. ex Willd.)

5.** ARMOISE de la Tauride. *Artemisia taurica*. Willd.

Artemisia foliis incanis, inferioribus bipinnatis, superioribus pinnatis; pinnis linearibus-filiformibus, caule erecto; floribus oblongis, sessilibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1837.

Artemisia Messerschmidii. Stechm. Artem. 19. n°. 9.

Ses tiges sont droites, blanchâtres, hautes d'un pied & plus; les feuilles blanches; les inférieures deux fois ailées, à peine pétioles, presque longues d'un pouce; les pinnules linéaires, filiformes; les feuilles supérieures ailées, sessiles, à pinnules linéaires, filiformes. La panicule est composée de rameaux étalés & d'autres ramifications plus petites, sous-divisées, supportant des fleurs sessiles, redressées, accompagnées à leur base, non de feuilles, mais de petites écaillés verdâtres, ovales. Les calices sont oblongs, jaunâtres, luisants, une fois plus petits que ceux de l'*Artemisia dracunculæ*, composés d'écaillés scarieuses, obtuses, ne renfermant guère que trois fleurs. Le réceptacle est nu.

Cette plante croît dans la Tauride. γ (Descript. ex Willd.)

5*** ARMOISE froide. *Artemisia frigida*. Willd.

Artemisia foliis incanis, pinnatis; pinnis tripartitis, linearibus, acutis; floralibus pinnatis tripartitis; caule ascendente; floribus globosis, nutantibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1838.

Ses tiges sont ascendantes, hautes d'un demi-pied ou d'un pied, rameuses, glabres à leur partie

inférieure, blanchâtres vers le haut, garnies de feuilles blanches; les caulinaires aîlées, composées de folioles linéaires, aiguës, sessiles, longues de trois lignes; les radicales pétiolées, de la même forme & de la même grandeur; les feuilles florales sessiles, trois fois plus petites, aiées ou simplement trifolies. La panicule est simple; les rameaux droits, effilés; les fleur. globuleuses, inclinées, médiocrement pédonculées, de la grandeur de celles de l'absinthe commune; le réceptacle velu.

✓ Cette plante croît aux lieux froids & arides, dans la Daourie. ♀ (Descript. ex Willd.)

6. ARMOISE de roche. *Artemisia rupestris*. Lam.

Artemisia (spicata), foliis radicalibus bitermatis; caule ascendente, spicato; floribus cretatis. Linn. Syst. veg. pag. 744. — Jacq. Austr. 5. Append. tab. 34. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1824.

Artemisia boeocana. Allion. Ped. n°. 616. tab. 8. fig. 1, & tab. 9. fig. 1.

Artemisia genipi. Stechm. Artem. pag. 17. n°. 7.

Artemisia (rupestris), foliis tripartito-multifidis, caulinis pinnatis; floribus spicatis, receptaculis nudis. Villars. Dauph. 3. pag. 246.

9. Eadem, foliis caulinis, linearibus, indivisis. Decand.

Vulgairement genipi noir.

Dans la variété 7, les feuilles caulinaires, au lieu d'être incisées, rithées ou palmées, sont entières & linéaires. Cette espèce se distingue de la suivante par le réceptacle des fleurs nu.

7. ARMOISE ombelliforme. *Artemisia umbelliformis*. Lam.

Artemisia rupestris. Linn. Spec. 1186. var. a. — Allion. Flor. pedem. n°. 615.

Artemisia (mutellina), foliis omnibus palmato-multifidis; floribus terminalibus axillaribusque; calicibus angulatis, receptaculis hirsutis. Vill. Dauph. 3. pag. 244. tab. 35. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1821.

Abfynthium laxum. Lam. Flor. franç. 2. pag. 46.

Artemisia (glacialis), sericeo-villosa, incano-virens; foliis radicalibus subbinnatis; pinnis folisque caulinis subpalmato tri quinque partitis, longè petiolatis. Jacq. Collect. 2. pag. 118. tab. 7. fig. 1. 2. 3.

Vulgairement genipi blanc ou genipi.

8. ARMOISE glomérulée. *Artemisia glacialis*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 695. fig. 2. Sub *abfynthio*. — Jacq. Austr. 5. Append. pag. 46. tab. 35. Allion. Pedem. tab. 8. fig. 3.

Artemisia foliis omnibus palmatis & multifidis; floribus terminalibus, calicibus rotundatis, receptaculis hirsutis. Vill. Dauph. 3. pag. 243.

Abfynthium congestum. Lamarck, Flor. franç. 2. pag. 46.

8.* ARMOISE luisante. *Artemisia splendens*. Willd.

Artemisia caule herbaceo, simplicissimo; foliis omnibus palmato-multifidis, cano sericis; floribus axillaribus, globosis, omnibus pedunculatis; calicinis squamis ovatis, corollulis pilosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1822.

Abfynthium orientale, tenuifolium, argenteum & sericem, magno flore. Tournef. Coroll. 34.

Artemisia rupestris, var. 8. Lam.

Très-rapprochée de l'*Artemisia rupestris*, elle en diffère non-seulement par la grandeur de ses feuilles & de ses fleurs, mais encore par ses corolles pileuses & par ses fleurs toutes pédonculées & globuleuses. Ses tiges sont ascendantes, très-simples, tomenteuses & soyeuses, hautes de six à sept pouces; ses feuilles toutes palmées, blanches & soyeuses, à découpures linéaires. Les pédoncules, de la longueur des feuilles, supportent d'une à trois fleurs. Les écailles du calice sont tomenteuses, oblongues, obtuses, scarieuses à leurs bords; le réceptacle pileux.

Cette plante croît dans l'Orient. ♀

8.** ARMOISE lanugineuse. *Artemisia lanuginosa*.

Artemisia (lanata), caule herbaceo, simplicissimo; foliis omnibus palmato-multifidis, albo-sericis, acutis; floribus axillaribus, globosis; inferioribus pedunculatis, summis sessilibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1823.

Ses tiges sont très-simples, ascendantes, blanches, tomenteuses, hautes d'environ six pouces; les feuilles d'un blanc soyeux, longues de six lignes, palmées, à découpures linéaires, aiguës. Les fleurs sont axillaires, globuleuses, de la grandeur de celles de l'espèce précédente; les inférieures pédonculées; les pédoncules deux fois plus courts que les feuilles, fourrant une à deux fleurs; les écailles calicinales lancéolées, aiguës, tomenteuses; les corolles très-lainuses; le réceptacle pileux. Elle diffère de la précédente par ses feuilles beaucoup plus petites, plus étroites, aiguës; par ses fleurs à peine pédicellées, les supérieures sessiles; par les écailles du calice, plus étroites, aiguës; par les corolles très-lainuses.

Cette plante croît sur les montagnes, en Espagne. ♀ (Descript. ex Willd.)

8.*** ARMOISE du Caucafé. *Artemisa caucasica*. Willd.

Artemisa caule herbaeo, simplicissimo; foliis omnibus palmatis multifidis, albo-sericeis, acutis; pedunculis axillaribus, spicatis; floribus globosis, sessilibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1823.

Artemisa raphanifolia. Pallas.

Cette espèce est remarquable par ses épis très-courts. Ses tiges sont simples, ascendantes, hautes d'un demi-pied, tomenteuses & foveolées; les feuilles blanches, foveolées, palmées, à découpures linéaires, aiguës. Les fleurs sont sessiles, globuleuses, disposées en épis axillaires, de la longueur des feuilles ou à peine plus longs, accompagnées de bractées trifides; leur calice tomenteux; les écailles obtuses; le réceptacle pileux.

Cette plante croît sur le mont Caucafé. (Descript. ex Willd.)

8.*** ARMOISE des hautes montagnes. *Artemisa alpina*. Willd.

Artemisa caule herbaceo, simplicissimo; foliis palmatis multifidis, albo-sericeis; summis floralibus, simplicibus; pedunculis axillaribus, unifloris, nutantibus; floribus globosis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1824.

Artemisa alpina. Pallas.

Ses feuilles radicales sont disposées en gazon. De leur centre s'élève une tige très-simple, d'un blanc foveux, ascendante, haute de trois ou quatre pouces. Les feuilles sont palmées, à découpures linéaires, aiguës; les supérieures simples, linéaires, très-courtes; les pédoncules axillaires, inclinés, très-courts, uniflores; les fleurs globuleuses; les calices composés d'écailles blanches, obtuses; le réceptacle pileux.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibérie. (Descript. ex Willd.)

9. ARMOISE à feuilles de tanaisie. *Artemisa tanacetifolia*. Linn. — Lam. Ill. tab. 695. fig. 3.

9.* ARMOISE boréale. *Artemisa borealis*. Willd.

Artemisa foliis sericeo-viridis, caulibus pinnatis; pinatis linearibus, acutis; floralibus simplicibus; caule ascendente, subramoso; floribus globosis, pedunculatis, erectisculis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1839.

Artemisa borealis. Pallas, Itin. 3. Append. 129. tab. III. fig. 1.

Ses tiges sont ascendantes, médiocrement rameuses, pubescentes, hautes d'un pied & plus; les feuilles blanches & foveolées; les radicales ailées; les pinnules à trois découpures linéaires;

les feuilles caulinaires sessiles, ailées; les folioles linéaires, recuées à leurs deux extrémités; les feuilles florales entières, linéaires-lancéolées. La panicule est oblongue, élançée, composée de rameaux courts & redressés; les fleurs droites, pédonculées, globuleuses, quelquefois légèrement inclinées; les écailles intérieures du calice scarieuses; le réceptacle piluleux.

Cette plante croît dans la Sibérie & le long du fleuve Obi. (Descript. ex Willd.)

11. ARMOISE d'Espagne. *Artemisa hispanica*. Lam.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de Paris, a été reconnue pour être la même que l'*Artemisa valentina*, n°. 39. Selon Willdenow, l'*Artemisa aethiopica*, n°. 16, Linn., est encore la même plante que l'*Artemisa valentina* Lam.

15.* ARMOISE capillaire. *Artemisa capillaris*. Thunb.

Artemisa frutesca, foliis simplicibus, capillaceis. Thunb. Flor. jap. pag. 309. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1818.

Intim. Kœmpf. Amoen. 897.

Ses tiges sont droites, ligneuses, striées, rameuses, glabres, roussâtres, hautes d'un pied & plus; les rameaux épars, étalés, redressés, semblables aux tiges; les feuilles nombreuses, simples, capillaires, glabres, longues de six lignes. Les fleurs sont réunies en grappes très-serrées sur les derniers rameaux.

Cette plante croît au Japon. (Descript. ex Thunb.)

18. ARMOISE fluette. *Artemisa minima*. Linn.

Centipeda (orbicularis), procumbens, ramossima, foliis acutatis; floribus axillaribus, solitariis. Lour. Flor. coch. vol. 2. pag. 662.

Loureiro a fait de cette espèce un genre particulier, appuyé particulièrement sur le caractère de ses semences oblongues, presque cylindriques, hérissées de poils renversés. Leur réceptacle est nu; le calice composé d'écailles imbriquées, droites, colorées; les fleurs purpurines, axillaires, sessiles, solitaires. Cette plante n'a presque point d'odeur, mais une saveur acre. Elle croît à la Cochinchine.

19. ARMOISE citronnelle. *Artemisa abrotanum*. Lam. Illustr. Gen. tab. 695. fig. 2. — Zanon. Hist. tab. 30.

20. ARMOISE paniculée. *Artemisa paniculata*. Lam.

Artemisa (procera), frutescens, caule ramoso,

potente; foliis omnibus bipinnatis, capillaceis; calicibus glabris, hemisphaericis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1818.

21. ARMOISE dorée. *Artemisia corymbosa*. Lam.

Artemisia (camphorata), foliis petiolatis, palmato-multifidis, linearibus, supremis simplicibus; calicibus angulosis, receptaculis hirsutis. Villars, Dauph. 3. pag. 242.

Artemisia (humilis), fruticosa, foliis supra decemcostis, subpinnato-multifidis; foliis linearibus; floribus elongato-sacosis, subglobosis, brevi pedunculo pendulis, secundis. Wulf. in Jacq. Collect. 4. pag. 295.?

1. *Artemisia rupestris*. Scopol. Carn. n°. 1038.

22. ARMOISE à feuilles de camomille. *Artemisia chamamelifolia*. Lam.

1. *Artemisia multicaulis*, erecta, foliis tripinnatis, etc. Vill. Dauph. 3. pag. 250. tab. 35.

Artemisia Lobelii. Allioni, Ped. n°. 607. (Excl. synon.)

23. ARMOISE des champs. *Artemisia campestris*. Linn.

1. *Artemisia maritima*. Decand. Flor. franç. 4. pag. 194.

Abrotanum maritimum, humi sparsum. Bonam. Prodr. Flor. norr. pag. 1.

2. *Artemisia alpina*. Decand. l. c.

La variété 1 est plus grande dans toutes ses parties, & parfaitement glabre; elle rampe & trace beaucoup. Elle a été observée dans les sables maritimes, depuis Nantes jusqu'à la Rochelle, par Bonamy. « La variété 2, qu'on trouve dans les Hautes-Alpes, a la grappe simple, dit M. Decandolle, & la tige haute de huit à dix pouces. »

23. ARMOISE herbacée. *Artemisia herbacea*. Willd.

Artemisia foliis caulinis tripinnatis, filiformibus, glabris; caule erecto, paniculato; floribus globosis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1828. — Ehrh.

Ses tiges sont droites, hautes de trois pieds, herbacées; les rameaux paniculés; les feuilles trois fois ailées; les radicales blanchâtres, à découpures linéaires; celles des tiges glabres, vertes, filiformes. Les fleurs sont pendantes, globuleuses, pedunculées; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Sibérie. x (Descript. ex Willd.)

23. ARMOISE du Canada. *Artemisia canadensis*.

Artemisia subdecumbens, parvis pubens, foliis planis, linearis-pinnatifidis; ramulis spiciferis; floribus majusculis, subhemisphaericis; calicibus scariosis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 129.

Ses tiges sont presque couchées, légèrement pubescentes, garnies de feuilles planes, alternes, linéaires, pinnatifides. Les fleurs sont assez grandes, presque hémisphériques, disposées presque en épis le long des rameaux; les calices composés d'écaillés imbriquées, ovales-arrondies, scarieuses; le réceptacle nu.

Cette plante croît à la baie d'Hudson, dans le sable mobile. (Mich.)

23. ARMOISE à queue. *Artemisia caudata*. Mich.

Artemisia erecta, glabra, foliis subsuccato-pinnatifidis; laciniis convexis; caule primariis ramis in racemum longissimum, stridum despositis; ramulis confertis; floribus omnibus pedicellatis, subgloboso-ovoides. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 129.

Ses tiges sont droites & glabres, rameuses & garnies de feuilles alternes, pétiolées, presque linéaires, pinnatifides, très-glabres. La tige principale & les premiers rameaux se terminent par une grappe de fleurs, droite, très-longue, & se divisent en d'autres petits rameaux très-fermés. Les fleurs sont toutes pédicellées, ovoides, presque globuleuses; les calices glabres.

Cette plante croît dans le sable, sur les rives du fleuve Missouri. (Mich.)

24. ARMOISE estragon. *Artemisia dracunculus*. Linn.

1. *Artemisia inodora*, floribus minoribus. Hort. Paris.

L'estrageon est remarquable & facile à distinguer par sa saveur piquante, aromatique. La plante 1, cultivée au Jardin des Plantes de Paris, en est totalement privée; elle en diffère par ses fleurs un peu plus petites. D'ailleurs, elle lui ressemble parfaitement par son port & par la forme de ses feuilles; ce qui m'a engagé à ne la mentionner que comme une simple variété, quoiqu'il puisse bien arriver que, mieux suivie, elle soit reconnue comme espèce. J'ignore son lieu natal.

24. ARMOISE de Chine. *Artemisia chinensis*. Linn.

Artemisia foliis simplicibus, tomentosis, obtusis, lanceolatis; inferioribus euneiformibus, trilobis. Linn. Spec. 1190. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1848. — Lour. Flor. cochin. 2. pag. 600.

Artemisia foliis radicalibus & caulinis diversis. Gmel. Sibir. 2. pag. 127. tab. 61. fig. 1 & 2.

Aspinthium

Asplenium maritimum, florum, lavendulifolium, pulcherrimum corymbis, inaequalis, sapore aromatico. Pluken. Analt. 3. tab. 353. fig. 5.

Tout- cette plante est inodore & presque sans saveur. Ses tiges sont simples, herbacées, droites, épaisses, très-tomentueuses, hautes d'un à deux pieds (rameuses dans la culture cultivée), garnies de feuilles alternes, simples, tomentueuses, obtuses, lancéolées; les inférieures cunéiformes, à trois lobes; les supérieures linéaires-lancéolées, très-entières, épaisses, sessiles, tomentueuses à leurs deux faces. Les fleurs sont petites, pâles, ramassées en grappes droites, terminales, multiflores, presque ovales. Le calice est lâche & tomentueux.

Cette plante croît dans la Chine. h (V. f.) Les Chinois s'en servent pour leur moxa.

25. ARMOISE annuelle. *Artemisia annua*. Linn.

Artemisia (biennis). *foliis glabris, radicealibus triplicato-pinnatis; caulibus inferioribus pinnatifidis, superioribus indivisis, linearibus; caule striato; floribus subrotundis, subsessilibus, cretibus.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1842.

Artemisia zelandica. Lam. Dict. n°. 25. p.

Des fleurs sessiles, plus ramassées, les feuilles supérieures quelquefois entières, linéaires, une existence de deux ans, sont les seuls caractères qui distinguent cette variété de l'armoise annuelle.

27. ARMOISE à feuilles capillaires. *Artemisia capillifolia*. Lam.

Artemisia (renouifolia), *frutescens, caule striato; foliis bipinnatis, capillaceis, ramulis simplicibus; calicibus oblongis.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1819.

Artemisia aquatica. Louriero, Flor. coch. 2. pag. 58.

27.* ARMOISE parfumée. *Artemisia odoratissima*. Desfont.

Artemisia caule fruticoso, decumbente; foliis bipinnatis, foliolis subulatis; floribus corymbis, racemoso-paniculatis. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 263.

Asplenium sanctonici, judaicum. Schaw. Spec. n°. 2. Non C. Bauhini.

Cette espèce à une odeur aromatique très-pénétrente. Ses tiges sont ligneuses, hautes de deux ou trois pieds, divisées en rameaux glabres, striés, rabattus, garnis de feuilles nombreuses, fort petites, d'un vert-pâle, deux fois ailées, couvertes de poils très-courts, peu apparents; les folioles subulées, inégales. Les fleurs sont petites, ramassées, sessiles, d'un jaune-pâle, disposées en grappes paniculées; le calice cylindrique, composé d'é-

Botanique. Supplément. Tome 1.

cailles imbriquées, fort petites, obtuses, elliptiques, concaves; les fleurs peu nombreuses, de la longueur du calice.

Cette plante croît en Barbarie, aux lieux arides & incultes. (Desfont.) h (V. f.)

27.* ARMOISE d'Afrique. *Artemisia afra*. Jacq.

Artemisia frutescens, foliis bipinnatifidis, subtus tomentosa; laciniis lanceolatis, obtusis; panicula secundaria, floribus nutantibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1820.

Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds & plus; les rameaux striés & blanchâtres; les feuilles alternes, pétiolées, deux fois ailées, longues d'un pouce & demi, vertes en dessus, tomentueuses & très-blanches en dessous; les découpures lancéolées, obtuses. Les panicules sont terminales, feuillées, unilatérales; les fleurs pendantes; les calices hémisphériques, composés d'écaillés oblongues, obtuses, tomentueuses.

On soupçonne cette plante originaire du Cap de Bonne-Espérance. h (Desfont. ex Willd.)

28 * ARMOISE des rochers. *Artemisia saxatilis*. Waldst.

Artemisia foliis caulibus canescentibus, pinnatis, linearibus; foliolis indivisis, linearibus; caule adscendente, ramuloso, paniculato; pedunculis fibro-cymosis; calicibus subsessilibus, nutantibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1830. — Waldst. & Kitaib. Plant. rar. Hung.

Artemisia rupestris. Pillar & Mirterp. Iter per Poëg.

Ses tiges sont ascendantes, rameuses, paniculées, hautes d'environ deux pieds & demi, paniculées à leur partie supérieure; les feuilles racales, les inférieures & celles des rameaux filiales, blanchâtres, semblables à celles de l'*Artemisia campestris*; les folioles linéaires, filiformes, un peu aiguës, entières ou munies d'une ou de deux dents; les florales simples, linéaires, obtuses; les fleurs presque disposées en corymbe; les calices anguleux, légèrement globuleux, blanchâtres, inclinés; le receptacle nu.

Cette plante croît en Hongrie, sur les rochers calcaires & dans les sables. x (Desfont. ex Willd.)

28.* ARMOISE inclinée. *Artemisia nutans*. Willd.

Artemisia foliis caulibus pinnatis trifidis, linearibus; ramis linearibus, indivisis; caule erecto, paniculato; ramis nutantibus, secundis; floribus oblongis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1831.

Elle a le port de l'*Artemisia canescens*. Ses tiges N n n

sont droites, blanchâtres, paniculées; ses rameaux unilatéraux, fortement inclinés; ses feuilles blanches; celles des tiges, ailées ou trifides, longues d'un pouce, à découpures planes, linéaires; les feuilles des rameaux linéaires, rétrécies à leur base, un peu aiguës. Les fleurs sont petites, oblongues, pédonculées, pendantes; les calices oblongs; les écailles extérieures blanchâtres, lancéolées; les intérieures oblongues, obtuses, scarieuses, ne contenant qu'environ trois fleurs; le réceptacle nu.

Cette plante croît chez les Calmoucks, sur les bords du fleuve Denez. γ (Descript. ex Willd.)

28.*** ARMOISE glauque. *Artemisia glauca*. Willd.

Artemisia foliis glaucis, pubescentibus, infimis pinnatis; pinnis linearilanceolatis; reliquis simplicibus; linearilanceolatis; caule erecto, paniculato, fistulo; floribus globosis, pedunculatis, muticibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1831. — Pallas.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & plus, striées, paniculées; ses feuilles glauques, couvertes de poils très-courts, nombreux; les inférieures ailées, à folioles linéaires-lancéolées; elles manquent souvent dans la plante adulte; les supérieures simples, semblables à celles de l'*Artemisia dracunculus*; les fleurs pédonculées, un peu globuleuses, inclinées; les écailles intérieures du calice luisantes, blanchâtres, membraneuses, transparentes; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Sibérie. Θ ? (Descript. ex Willd.)

29.* ARMOISE à feuilles de soude. *Artemisia salifolia*. Willd.

Artemisia foliis caulibus glabris, tripartitis, linearibus; ramis linearibus, acutis; caule fruticoso, ramofo; ramis simplicibus, erectis; pedunculis axillaribus, subtrifloris; floribus oblongis, erectis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1832.

Elle se distingue par ses feuilles un peu charnues, glabres, planes, longues d'un pouce, à trois découpures linéaires, un peu aiguës; celles des rameaux & les supérieures entières, planes, linéaires, à peine aiguës. Les tiges sont ligneuses & diffusées; les rameaux simples, ascendants, longs d'un demi-pied; les pédoncules axillaires, plus courts que les feuilles, soutenant trois fleurs petites, oblongues, redressées; les écailles calicinales scarieuses & obtuses.

Cette plante croît dans la Sibérie. η (Descript. ex Willd.)

29.** ARMOISE monogyne. *Artemisia monogyna*. Walldt.

Artemisia foliis subincanis, radicalibus bipinnatis; caulibus pinnatis, amplexicaulis; laciniis linearibus; ramis simplicibus, linearibus; caule ascendente, paniculato; calicibus oblongis, erectis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1832.

Artemisia (monogyna), foliis multipartitis, cano-tomentosis; racemis erectis, secundis; floribus erectis, subquinq-floris; fasciculo femineo unico aut nullo. Walldt. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 177. tab. 75.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges simples, ascendantes, hautes d'environ deux pieds, paniculées à leur sommet. Les feuilles radicales sont blanches, deux fois ailées, à découpures linéaires, obtuses; celles des tiges simplement ailées, sessiles, moins blanches, presque amplexicaules; les feuilles florales simples, vertes, obtuses. Les fleurs sont redressées, pédonculées; les calices oblongs, composés d'écailles imbriquées; les intérieures jaunâtres, membraneuses, obtuses, presque à cinq fleurs; une seule femelle, quelquefois nulle; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Hongrie & dans la Sibérie. γ (Descript. ex Willd.)

30. ARMOISE vulgaire. *Artemisia vulgaris*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 695. fig. 1.

γ . *Artemisia (indica), foliis subius tomentosis, caulibus pinnatis; laciniis oblongo-lanceolatis, subdentatis, acutis; floribus inaequalibus, linearibus; floribus sessilibus, oblongis, erectis; calicibus glabris.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1840.

Artemisia vulgaris. Burm. Ind. 177. — Thunb. Flor. jap. 310.

Artemisia latifolia. Rumph. Amb. 5. pag. 161. tab. 91. fig. 2.

Artemisia chinensis, cujus mollago moxa dicitur. Pluken. Almag. 50. tab. 15. fig. 1.

La plante γ , qui ne paroît être qu'une variété de notre armoise vulgaire, est employée, ainsi que celle de la Chine, à la préparation du moxa par les Chinois; elle diffère de la nôtre par ses découpures de ses feuilles, plus larges; par ses feuilles florales, très-étroites, linéaires, longues de six lignes; par ses fleurs plus petites, les calices glabres.

31.* ARMOISE du Japon. *Artemisia japonica*. Thunb.

Artemisia foliis glabris; ramis lanceolatis, integris; caulibus oblongis, trifidis; floribus racemosis, cernuis. Thunb. Flor. japon. pag. 310. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1847.

Cette plante, d'après Thunberg, a des tiges droites, ligneuses, anguleuses, striées, divuées à

leur partie supérieure en rameaux glabres, élan-
cés, longs de deux pieds, avec des ramifica-
tions alternes, filiformes; etales, un peu courbés à
leur sommet; d'autres petits rameaux capillaires,
ralevés, à peine longs d'un ponce. Les feuilles
sont glabres; les caulinaires alternes, sessiles, ob-
longues, entières, incisées & dentées vers leur
sommet, longues d'un pouce; celles des rameaux
lancoles, très-entières, aiguës à leurs deux ex-
trémités. Les fleurs naissent en grappes, à l'extré-
mité des rameaux; elles sont pendantes, pédon-
culées, unilatérales; leur pédoncule très-court,
capillaire, réfléchi, accompagné d'une petite
bractée à sa base.

Cette plante croît au Japon. * (*Descript. ex
Thunb.*)

33.* ARMOISE dentée. *Artemisa dentata*.
Willd.

*Artemisa caule subramoso; foliis glabris, infe-
rioribus bipinnatis, superioribus pinnatis; pinnis
linearibus, subintegerrimis; floribus paniculatis, nu-
tantibus.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1816.

Ses tiges sont glabres, presque rameuses; ses
feuilles glabres; les inférieures à peine longues
d'un demi-pouce, deux fois pinnatifides; les su-
périeures plus petites, simplement ailées; les so-
lioles sessiles, linéaires, munies d'une ou de deux
dents. Les fleurs sont inclinées, un peu globu-
leuses, disposées en une panicle terminale; les
écailles du calice membranacées à leurs bords; les
inférieures scarieuses; le réceptacle pileux.

Cette plante croît dans la Sibirie. *

35. ARMOISE maritime. *Artemisa maritima*.
Linn.

*Artemisa (maritima), foliis niveo-tomentosis;
caulinis pinnatis, linearibus, obtusis; ramis ligea-
ribus, simpliciter obtusis; caule ascendente, ramoso;
ramulis cernuis; floribus oblongis, tomentosis, sessi-
libus.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1833. — Smith,
Flor. britan. 2. pag. 864.

1. *Artemisa (gallica), foliis incanis; radicalibus
bipinnatis, linearifiliformibus; caulinis pinnatis,
pinnis linearifiliformibus; caule erecto, ramoso,
tomentoso; ramis erectis; floribus oblongis, sessi-
libus, erectis.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1835.

2. *Artemisa (fragrans), foliis incanis, radica-
libus bipinnatis; pinnis confertis, linearibus, obtu-
sis; ramis pinnatis, sessilibus; floralibus simplicibus,
linearibus, flore brevioribus; floribus oblongis, erec-
tis, sessilibus.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1835.

3. *Artemisa (salina), foliis incanis, radicalibus
pinnatis; pinnis tripartitis, linearifiliformibus; ra-
mis simplicibus, filiformibus; caule erecto, panicu-
lato; ramulis erectisculis; floribus oblongis, pedun-*

culatis, nutantibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag.
1834.

Artemisa maritima. Leyf. Halenf. n°. 817. —
Hoffm. Germ. 290. — Roth, Germ. I. pag. 351.
& II. pag. 305.

*Asplenium seriphium, tenuifolium, maritimum,
narbonense.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 177.

Quelques botanistes ont distingué comme espè-
ces les deux variétés que M. de Lamarck a ren-
vies à l'armoise maritime, remarquable par le
duvet fin, cotonneux, d'un blanc-éclatant, qui
couvre toutes ses parties; les grappes de fleurs un
peu recourbées. Dans la plante 1, les tiges sont
moins élevées, le duvet d'un blanc-cendé, e, bien
moins cotonneux; les grappes droites, touffues.
Dans la plante 2, les feuilles sont blanchâtres,
longuement pétiolées, deux fois ailées; les so-
lioles nombreuses & touffues; les caulinaires sessiles,
celles des fleurs simples & linéaires; les fleurs
droites, oblongues, sessiles.

J'ai peine à croire que la plante 3 soit bien dis-
tincte des précédentes, surtout comme espèce.
Ses feuilles sont pl. simples, une seule fois ail-
lées; les pinnules à trois découpures linéaires,
filiformes; celles des rameaux simples, linéaires;
les fleurs oblongues. Les rameaux de la panicle
sont pen-ans, & les fleurs paroissent sessiles avant
la floraison; mais ensuite elles se redressent, & les
fleurs sont pédunculées. (Willd.)

39. ARMOISE de Valence. C'est la même que
Artemisa hispanica, n°. 11, ainsi que nous l'avons
fait observer.

* Espèces moins connues.

* *Artemisa (lerchiana), foliis incanis, inferiori-
bus bipinnatis; pinnis linearibus, obtusis. hujus
attenuatis; superiori s sessilibus, pinnatis; fo albus
simplicibus; caule fissuloso, ascendente; floribus
subglobosis, sessilibus, erectis.* Willd. Spec. Plant. 3.
pag. 1838. — Stechm. Artem. pag. 24 n°. 18.

*Artemisa fruticosa, incana, foliis inferioribus pin-
natis, brevibus, tenaciter divisis; pinnis palmatis,
superioribus indivisis; corymbis sessilibus, copiosissi-
mis, spicatis, oblongis.* Gmel. Sibir. 2. pag. 114.
t. 50. fig. 2 & 3.

Ses tiges sont ligneuses; ses feuilles blanches,
deux fois ailées; les pinnules linéaires, obtuses,
rétrécies à leur base; les feuilles du sommet ses-
siles, simplement ailées; les florules simples; les
fleurs redressées, sessiles, presque globuleuses.

Cette plante croît sur les rives du Volga, aux
environs d'Alraican. *

* *Artemisa (teretica), foliis tri-
partitis, pinnis tripartitis, acuminatis, linearibus.*
Nnn 2

ses, divisées en rameaux ascendants, paniculés; les feuilles caulinaires ailées, à découpures linéaires, obuses; celles des rameaux linéaires. Les fleurs sont oblongues, redressées, presque sessiles, disposées en épis paniculés. Elle croît dans la Sibérie, sur les hauteurs. *h*

* *Artemisia* (Scoparia), *foliis caulinis setaceis, pinnatis, glabris; radicalibus pinnatis, multiplex, sericeis; caule erecto, ramis ramulq; floribus ovatis, pedunculatis, nutantibus*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1827.

Artemisa (Scoparia), *herbacea, foliis caulinis bipinnatis, nudis; foliolis setaceis, floribus ovatis, nutantibus; siliquis femineis ternis, receptaculo nudo*. Walldt. & Kitaoi. Plant. rar. Hung. 1. pag. 66. tab. 63.

Ses tiges sont droites, herbacées, annuelles, rameuses; les rameaux sous-divisés en ramifications courtes; les feuilles glabres; les racines & inférieures plusieurs fois pinnatifides, à divisions nombreuses, sétacées. Les fleurs sont pédonculées, ovales, inclinées; les femelles au nombre de trois; le réceptacle nu.

Cette plante croît dans les lieux sablonneux de la Hongrie, dans la Tartarie, sur le mont Taurus. *o*

ARMOSELLE. *Scirpium*. Ce genre contient de petits arbrustes fort élégans, touffus, toujours verts, semblables aux bruyères par la disposition & par la petitesse de leurs feuilles: ils sont presque tous originaires du continent & des îles de l'Afrique; ils ressemblent tellement aux *flabe*, que M. de Lamarck a réuni ici ces deux genres; il les a depuis séparés dans les *Illustrations*, tab. 721, où se trouvent gravés le *scirpium cinereum* de Linné & le *flabe aethiopicum* du même auteur. (Voyez STEBÉ, vol. VII, pag. 410.)

ARNEBIA. Genre établi par Forskhal, dans la description des plantes de l'Egypte. M. de Lamarck le rapporte aux *lithospermum*. M. Vahl est du même avis. C'est son *lithospermum tinctorium* (Symb. 2. pag. 33, tab. 28); c'est le *lithospermum tetragynum* Lam. Encycl. (Voyez GRÉMIL, n°. 9.) Il faut lire pour la synonymie, *arnebia tinctoria*. C'est la seule espèce, & sans doute c'est par erreur qu'on trouve dans Forskhal, à la description générique de cette plante, le nom spécifique *tetragynum*.

ARNICA. (Voyez DORONIC.)

ARNOPOGON. (Voyez SALSIFIS.)

ARNOSÈRE. *Arnosferis*. Gärtn. tab. 157. Ce genre a été établi par Gärtnier sur une espèce d'*hyosferis* de Linné, connue sous le nom d'*hyosferis*

minima, & que M. de Lamarck a réunie aux lampyranes. Ses semences sont couronnées d'un rebord coriace, droit & entier, caractère qui le distingue des *lampyranes*, qui n'ont point leurs semences couronnées, & des *hyosferis*, dont les semences sont aigrettées. L'*hyosferis fetida* Linn. devroit aussi être réunie à ce genre. (Voyez LAMPYRANE, vol. III, pag. 414.)

AROIDES (Les). (Voyez GOULETS.)

AROLF. On donne ce nom, dans les Alpes, au *cembro*, espèce de pin.

ARONIA. (Voyez NÉFLIER.)

AROUA. Les habitans de la Guiane nomment ainsi une espèce de galanga (*maranta arouma* Aubl.), dont ils emploient les tiges fendues pour faire des paniers ou pagaras, suivant Aublet. Il paroît que la plante indiquée ailleurs sous le nom d'*arrouma*, & rapportée au *bihai*, est la même. (Juss.)

AROUNA. (Voyez AROUNIER, & Lam. III. Gener. tab. 10.)

AROUSSE. *Arachus*. On nomme ainsi, dans l'Auvergne, une plante légumineuse, du genre de l'ers, très-voisine de l'ers velu (*erum hirsutum* Linn.), ainsi que de quelques espèces congénères. (Juss.)

ARRAYAN. — On trouve sous ce nom, dit M. de Jussieu, dans les dessins de Joseph de Jussieu, une espèce de myrte du Pérou, à fleurs purpurines, à fruits bleus, bons à manger, de la grosseur d'une cerise. Il est cité par Frézier, dans la relation du voyage de la mer du Sud.

ARRÊTE-BŒUF. (Voyez BUGRANE.)

ARRIVOU-TAOU-VELOU. Ce mot, d'après M. du Petit-Thouars, qui, dans la langue malgache ou de Madagascar, veut dire *mille ans de vie*, désigne une plante du genre *excoecum*; il exprime hyperboliquement la propriété qu'on lui attribue de prolonger la vie.

ARROCHE. *Atriplex*. Outre les fleurs de deux sortes qui séparent ce genre des *chenopodium*, on peut encore le reconnaître aux calices des fleurs femelles, qui ne consistent qu'en deux divisions appliquées l'une contre l'autre, qui grandissent après la floraison, & forment autour du fruit une enveloppe de deux pièces, comprimée, que l'on nomme *valves feminales*. Le calice des fleurs hermaphrodites est à cinq divisions.

ESPÈCES.

4. ARROCHE à fruits en rose. *Atriplex rosea*. Linn. — Lam. III. tab. 853. fig. 2.

9. ARROCHE étalée. *Atriplex patula*. Linn. — Lam. III. Gesl. tab. 853. fig. 3.

12. ARROCHE de jardin. *Atriplex hortensis*. Linn. — Lam. III. 853. fig. 1.

13. ARROCHE à feuilles molles. *Atriplex mollis*. Desfont.

Atriplex caule fruticoso, erecto; foliis lanceolatis, carnosiss, mollibus; calicibus fructibus rotundatis, integerrimis. Desfont. Flot. atlant. 2. pag. 391.

Cette plante se rapproche de l'*Atriplex portulacoides*; elle en diffère par ses tiges droites, par ses feuilles alternes, très-molles, succulentes; par les calices très-grands, membraneux, planes, arrondis. C'est un arbrisseau très-rameux, haut de deux pieds & plus; les rameaux droits, cylindriques, blanchâtres; les feuilles lancéolées; les inférieures lancéolées, en fer de pique, très-entières, glabres à leurs deux faces, transparentes, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont petites, sessiles, nombreuses, agglomérées, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures. Leur calice est de la grandeur de celui de l'*Atriplex hortensis*, très-entier, comprimé, arrondi.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines, dans les sables du désert, en Barbaïe. \bar{h} (V. f.)

14. ARROCHE blanchâtre. *Atriplex albicans*. Aiton.

Atriplex caule fruticoso, erecto; foliis hastatis, integerrimis, acutis; spicis terminalibus. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 430.

Atriplex (odorata), cinereo-glauca, caule fruticoso, ramis angulatis; foliis petiolatis, hastatis; spicis simplicibus, frutigenis, crassis, subpingui. ? Perl. Synopf. Plant. 1. pag. 295.

Toute la plante est d'un blanc un peu cendré; elle a des rapports avec l'*Atriplex hastata*. C'est un arbrisseau assez élégant, dont les tiges sont droites, ligneuses, divisées en rameaux un peu anguleux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, en forme de fer de pique, un peu épaisses, blanchâtres, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en épis simples, touffus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. \bar{h}

15. ARROCHE de la Grèce. *Atriplex graca*. Willd.

Atriplex caule fruticoso, ascendente; foliis inferioribus lanceolatis, hastatis; superioribus linearilanceolatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 958.

Atriplex graca, fruticosa, humifusa, halimifolia. Tournef. Coroll. 38.

Arbrisseau dont les tiges sont couchées, relevées & ascendantes à leur partie supérieure, garnies de feuilles médiocrement pétiolées, glabres, longues d'un demi-pouce; les inférieures lancéolées, en fer de pique, très-entières ou munies quelquefois d'une dent vers leur milieu; les supérieures linéaires lancéolées, très-entières.

Cette plante croît dans l'île de Paros. \bar{h}

16. ARROCHE à feuille. de lin. *Atriplex linearifolia*. Willd.

Atriplex caule suffruticosa, erecto; foliis linearibus, acutis, integerrimis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 959. — Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cy'indriques, hautes d'un pied & demi ou de deux pieds, garnies de feuilles médiocrement pétiolées, linéaires, aiguës, très-entières, glabres à leur face inférieure, longues depuis un demi-pouce jusqu'à un pouce & demi. Les fleurs sont agglomérées, rapprochées en épis terminaux; le calice du fruit petit, presque rond.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. \bar{h}

17. ARROCHE en crête. *Atriplex cristata*. Willd.

Atriplex caule fruticoso, decumbente; foliis lanceolatis, dentatis, subius tomentosis; calicibus fructibus dentatis, cristatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 959. — Humb. & Bonpl.

Cette plante a des tiges ligneuses, couchées, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles alternes, pétiolées, à peine longues d'un pouce, oblongues-lancéolées, obtuses à leur sommet, rétrécies en coin à leur base, tomenteuses en dessous, inégalement dentées à leurs bords. Les fleurs sont axillaires, agglomérées, réunies en un épi court, terminal; le calice du fruit comprimé, arrondi, muni à son disque d'un double rang de dents en forme de crête.

Cette plante croît en Amérique, aux environs de Carmana, dans les sables sablonneux. \bar{h} (Descript. ex Willd.)

18. ARROCHE dentée. *Atriplex muricata*. Willd.

Atriplex caule suffruticosa, procumbente; foliis obovatis, denticulatis, subius tomentosis; calicibus fructibus orbiculatis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 959. — Humb. & Bonpl.

Elle se rapproche beaucoup de la précédente; elle en diffère par la forme de ses feuilles & par ses caïces. Ses tiges sont ligneuses à leur partie inférieure, divisées en rameaux rabotés, longs de

quatre à dix pouces & plus, garnis de feuilles en ovale renversé, tomenteuses en dessous, longues d'un demi-pouce, munies, à chacun de leurs bords, de trois ou quatre dents. Le calice du fruit est blanchâtre, comprimé, orbiculaire, entouré de petites dents aiguës, nu & un peu convexe à son disque, quelquefois surmonté d'un petit tubercule.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. H

19. ARROCHE cendrée. *Atriplex cinerea*.

Atriplex caule fruticosa, foliis linearis lanceolatis, subsessilibus; floribus subsessilibus, axillaribus; calicibus fructibus convexis, integerrimis, apice triangularibus. (N)

Les différentes parties de cette plante sont toutes d'un blanc-grisâtre ou cendré. Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, un peu tomenteuses; les rameaux alternes, groins de feuilles presque sessiles, très-rapprochées, linéaires-lanceolées, longues d'un à deux pouces, glabres, épaisses, très-entières, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies en pétiole à leur base. Les fleurs sont presque solitaires dans les aisselles des feuilles, à peine pédonculées; le calice du fruit comprimé, convexe dans son centre à ses deux faces, nu & entier à ses bords, triangulaire & un peu aigu à sa partie supérieure.

Cette plante a été recueillie dans la Nouvelle-Hollande par M. de Labillardière. H (V. f. in herb. Desfont.)

20. ARROCHE luisante. *Atriplex nitens*. Willd.

Atriplex caule erecto, herbacea; foliis triangulari-hastatis, sinuato-dentatis, subius argenteis; calicibus fructibus triangulari-ovatis, integerrimis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 961.

Atriplex caule herbaceo; foliis triangularibus, sinuato-dentatis, superius nitentibus; valvulis calicis femineis triquetris, integerrimis. Reichenbach. Prodr. n°. 441. — Schk. Handb. tab. 348.

1. *Atriplex* (acuminata), caule erecto, herbaceo; foliis triangulari-hastatis, subius argenteis, superioribus integerrimis; calicibus fructibus ovatis, integerrimis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 961.

Atriplex caule herbaceo; foliis triangulari-hastatis, basi apiceque productis, lucidis; calicibus fructibus integerrimis, glabris. Walld. & Kitaib. Hung. 2. pag. 107. tab. 103.

Cette plante a de grands rapports avec l'*Atriplex horneensis*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses tiges sont droites, d'un jaune verdâtre, plus vertes sur les tiges, glabres, cylindriques, garnies de feuilles pétiolées, alternes, trian-

gulaires, élargies à leur base, presque hâtées, prolongées à leur sommet en une longue pointe acuminée, irrégulièrement finies à leurs bords, d'un vert-luisant en dessus, d'un blanc-argente & un peu pulverulent en dessous, principalement dans leur jeunesse. Les fleurs sont petites, disposées, dans les aisselles des feuilles supérieures, en grappes jaunes & rameuses; le calice du fruit ovale, triangulaire, très-entier. La plante se me paroît qu'une légère variété de celle-ci ou de l'*Atriplex horneensis*, ayant les feuilles supérieures très-entières, & les inférieures plus lâchement & bien moins profondément dentées.

Cette plante croît dans l'Allemagne, la Hongrie & la Tartarie. \odot (V. v.)

21. ARROCHE de Venise. *Atriplex venetum*. Willd.

Atriplex caule erecto, herbacea; foliis inferioribus triangulari-hastatis, dentatis; superioribus lanceolatis, subhastatis, integerrimis; calicibus fructibus rhombicis, acutis, apice obsolete dentatis. Willd. Spec. 4. pag. 962.

Cette plante, dans son état sauvage, a des tiges droites, hautes d'un pied & demi, rameuses. Ses feuilles sont glauques en dessous, les inférieures hâtées, triangulaires, presque longues d'un pouce, munies de quelques dents écartées; les supérieures hâtées, lanceolées, très-entières, longues d'un pouce & demi. Le calice du fruit est rhomboïdal, aigu, un peu denticulé à son bord supérieur, à trois nervures. Dans la plante cultivée, les tiges sont plus hautes, les feuilles plus profondément dentées & plus longues; le calice du fruit marqué de cinq à sept nervures réticulées, muni, de chaque côté de son bord supérieur, de deux petites dents.

Cette plante croît aux environs de Venise, sur les bords de la mer. \odot (D. script. ex Willd.)

22. ARROCHE blanchâtre. *Atriplex albicans*. Willd.

Atriplex caule herbaceo, procumbente; foliis incanis, rhombicis, subdentatis; calicibus fructibus triangulari-rhombicis. Willd. Spec. 4. pag. 962.

Ses tiges sont herbacées, rameuses & couchées; ses feuilles rhomboïdales, longues d'un demi-pouce, blanches à leurs deux faces, munies, vers leur sommet, d'une ou de deux dents de chaque côté, quelquefois très-entière. Les calices des fruits sont rhomboïdaux, avec leurs angles aigus; ce qui les fait paroître tridentés. Quelquefois un des angles est pourvu de deux dents.

Cette plante croît en Espagne, sur les bords de la mer. (Descript. ex Willd.)

23. ARROCHE couchée. *Atriplex prostrata*. Dec.

Atriplex caule herbaceo, prostrato, ramossissimo; foliis triangularibus, oviculatis, glaucis; valvulis feminalibus intermixtis. Decand. Synopf. Plant. gall. p. 196. n°. 2251. — Boucher, Flor. Abbev. 76.

Cette plante a de très-grands rapports avec l'*Atriplex hastata*; elle en diffère par ses tiges étalées & couchées; par ses feuilles plus petites, munies d'oïcelles ordinairement plus prononcées, mais particulièrement en ce que les valves féminales n'ont ni dents épineuses ni tubercules sur le dos; caractère qui doit également la faire distinguer de l'*Atriplex patula*. Ces espèces varient tellement, tant dans leur port que dans leurs feuilles, qu'on ne doit espérer de les bien déterminer que dans les caractères de leurs semences.

Cette plante croît dans les champs, les décombres; elle a été trouvée par M. Boucher, le long du canal de Saint-Valéry. ○ (*V. v.*)

24. ARROCHE triangulaire. *Atriplex triangularis*. Willd.

Atriplex caule herbaceo, erecto; foliis triangularibus, integerrimis; calicibus fructibus triangularibus, subdentatis, d'æco bimucronatis. Willd. Spec. 4. pag. 963.

Cette plante a de tels rapports avec les *Atriplex patula* & *hastata*, que je serois porté à ne la regarder que comme une variété intermédiaire. Ne la connoissant pas, je ne la décris que d'après ce qu'en a dit Willdenow.

Ses tiges sont rameuses, hautes d'un pied, quelquefois couchées; ses feuilles alternes, triangulaires, hastées, très-entières, un peu charnues, blanchâtres en dessous, longues d'environ six lignes; les valves féminales ou les calices des fruits comprimés, triangulaires, très-entiers, quelquefois munis d'une dent, & ordinairement de deux pointes sur leur disque.

Cette plante croît à Venise, sur les bords de la mer Adriatique. ○ (*Describe. ex Willd.*)

25. ARROCHE à feuilles obtuses. *Atriplex obtusa*. Willd.

Atriplex caule herbaceo, erecto; foliis oppositis, triangularibus, obtusissimis, integerrimis. Willden. Spec. 4. pag. 964.

Ses tiges sont droites, peu élevées, rameuses à leur base; les feuilles opposées, longuement pétiolées, triangulaires, très-entières, obtuses à leur sommet & sur leurs angles, un peu glauques en dessous, longues d'un demi-pouce. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en épis paniculés.

Cette plante croît dans la Sibérie. ○ (*Describe. ex Willd.*)

26. ARROCHE à petits fruits. *Atriplex microsperma*. Willd.

Atriplex caule erecto, herbaceo; foliis triangularibus, acutiusculis, subdentatis; calicibus fructibus ovatis, acutis, integerrimis. Willd. Spec. 4. pag. 964. — Waldst. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Cette espèce a des tiges droites, herbacées, garnies de feuilles hastées, triangulaires; les inférieures légèrement dentées; les supérieures très-entières. Les valves féminales sont ovales, siguées, fort petites, très-entières. Elle croît dans la Hongrie. ○

* Espèces douteuses ou moins connues.

* *Atriplex (microphylla), foliis ovatis, integris, glaucis; caule fruticoso.* Thunb. Prodr. 48. Sub *chenopodio*. Willd.

Ses feuilles sont gluques, ovales, entières, ses tiges ligneuses. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

* *Atriplex (erecta), caule herbaceo, erecto; foliis ovato-lanceolatis, inferioribus fructibus; calicibus femininum antequam maturatis.* Smith, Flor. britan. 3. pag. 1038.

Atriplex angustifolia, laciniato. Rai, Synopf. 152.

Ses valves féminales sont hérissées de pointes de tous côtés. Ses tiges sont droites, herbacées; ses feuilles ovales-lanceolées; les inférieures laciniées.

Cette plante croît parmi les décombres, en Angleterre. ○

* *Atriplex (angustifolia), caule herbaceo, divaricato; foliis lanceolatis, integerrimis, inferius subhastatis; calicibus femininum hastatis, leviusculis.* Smith, Flor. britan. 3. pag. 1092.

Selon M. Smith, Linné auroit confondu cette plante avec l'*Atriplex patula*. Les synonymes de Lobel, de Bauhin & de Hallet appartiennent à cette espèce, & non à celle de Linné. Ces plantes varient à un tel point, que je n'oserois prononcer. Celle-ci a des tiges herbacées, étalées; les feuilles inférieures hastées, presque dentées; les supérieures lanceolées, très-entières; les valves féminales hastées, presque lisses. Elles sont, dans l'*Atriplex patula*, légèrement denticulées à leur sommet, & un peu hérissées à leur disque. Elle croît en Europe, parmi les décombres. ○

* *Atriplex (foliosa), caule herbaceo, rhombico-oblongis, sinuato-dentatis; fructibus triangularibus, acutis.* Link, in Schrad. Journ. 1800. pag. 55.

Cette plante n'est probablement qu'une variété de l'*Atriplex rosea*; elle en diffère un peu par la forme

forme de ses valves féminales, triangulaires, aiguës. Les feuilles sont oblongues, rhomboidales, finuées & dentées. Elle croît sur les rives du Tage, en Portugal. ☉

* *Atriplex (sinuata)*, caule herbaceo; foliis deltoideis, hystatis, sinuatis, subius argenteis; calicibus seminum spicatis, muricatis. Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 277.

On ne peut guère considérer cette plante que comme une variété de *Atriplex laciniata*. Ses feuilles sont étroites, hautes, finuées, d'un blanc-argenté en dessous; les fleurs disposées en épis; les valves féminales hérissées.

* *Atriplex (virgata)*, caule herbaceo, patulo; foliis lanceolatis, ramis decussatis. Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 277. — Schkuhr, Handb. 3. tab. 347.

Elle se rapproche encore de *Atriplex pasula*. Ses tiges sont étalées, herbacées; les rameaux élancés, opposés en croix; les feuilles lancéolées.

* *Atriplex (alba)*, caule erecto, ramossimo, herbaceo; foliis ovatis; floribus axillaribus, glomeratis; calicibus fructibus angulatis, dentatis, levibus. Scopol. del. Infub. 2. tab. 8.

Ses tiges sont droites, très-rameuses, herbacées; les feuilles ovales; les fleurs axillaires, glomerulées; les valves féminales lisses, anguleuses, dentées à leurs bords.

ARROCHIE PUANTE. (Voyez ANSÉRINE, n°. 15.)

ARROUY: nom malgache d'une espèce de sensitive de Madagascar, qui paroît être, selon M. du Petit-Thouars, le *mimosa sensitiva* Linn. Il y en a une autre espèce qu'ils nomment *arroy-jara*. Ce dernier mot qui la distingue, veut dire beau.

ARSIS. *Arfis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, dont la famille n'est pas encore déterminée, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles simples, alternes; les fleurs disposées en grappes terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle à cinq pétales campanulés; un calice à cinq folioles; un grand nombre de filamens insérés sur le réceptacle; une baie libre, pédicellée dans le calice, à une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, partagé en cinq folioles étalées, presque ovales, caduques, colorées.
Botanique. Supplément. Tome I.

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, plus courts que le calice.

3°. Environ cinquante étamines insérées sur un réceptacle allongé; les filamens filiformes, presque aussi longs que le calice; les extérieurs plus courts, soutenant des anthères arrondies à quatre loges.

4°. Un ovaire libre, arrondi, porté sur un réceptacle en forme de pédicelle; le style subulé, de la longueur des étamines; le stigmate aigu.

Le fruit est une baie globuleuse, pédicellée, contenant une semence arrondie.

ES PÈ C E.

ARSIS ridée. *Arfis rugosa*. Lour.

Arfis foliis alternis, rugosis; racemis terminalibus. Lour. Flor. cochin. vol. 1. pag. 409.

Arbrisseau d'environ cinq pieds, dont les tiges sont très-rameuses, garnies de feuilles simples, alternes, ovales-lancéolées, ridées, très-entières à leurs bords. Les fleurs sont blanches, disposées en grappes à l'extrémité des rameaux. Leur calice est divisé jusqu'à sa base en cinq folioles ovales, colorées; la corolle plus courte que le calice. Elle présente l'aspect d'une fleur campanulée, quoique composée de cinq pétales. Les étamines nombreuses sont attachées sur un réceptacle allongé, qui fait paroître l'ovaire pédoncule, ainsi que le fruit. Ce dernier est charnu, globuleux, à une seule semence.

Cette plante a été découverte dans les forêts de la Cochinchine par Loureiro. ♀

ARTEDIA. (Voyez ARTÈDIE, & Ill. Gen. tab. 193.)

ARTEMISIA. (Voyez ARMOISE.)

ARTICHAUT. *Cynara*.

1. ARTICHAUT commun. *Cynara scolymus*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 663. fig. 1. (Ex Tourn.)

4. ARTICHAUT sans tige. *Cynara acaulis*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 663. fig. 2. — Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 233. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 249.

Les espèces d'artichaut décrites par Linné ont toutes le réceptacle des fleurs épis & charnu, fort bon à manger. Celle dont il s'agit ici, très-commune dans les terrains sablonneux de la Barbarie, où je l'ai fréquemment recueillie pour m'en nourrir, est d'une saveur très-délicate, supérieure à celle de notre artichaut commun. Les *Cynara cardunculus-humilis* qu'on rencontre dans les mêmes

contées, sont aussi très-bons à manger crus. Ils sont d'une grande ressource dans un pays où les vivres peuvent venir à manquer dans des voyages un peu longs.

5. ARTICHAUT pygmée. *Cynara pygmaea*. Willd.

Cynara aculeis, foliis pinnatis, glabrisculis; laciniis dentatis, spinosis; calicinis squamis interioribus, apice scariosis. Willd. Spec. 3. pag. 1691.

Très-rapprochée de l'espèce précédente, celle-ci en diffère par ses feuilles vertes à leurs deux faces, épineuses à leurs dentelures. Il n'y a point de tige. Toutes les feuilles sont racinales, ailées, longues d'un pouce & demi à deux pouces, à découpures inégales, dentées, aiguës, épineuses à leur sommet, hérissées sur leur côte du milieu. De leur centre sort une fleur sessile. Son calice est cylindrique; les écailles extérieures ovales, dentées à leur sommet; les dentelures terminées par une épine; les intérieures ovales, très-entières, surmontées d'une pointe épineuse; celles qui enveloppent les fleurs, oblongues, scarieuses à leur sommet, sans épines.

Cette plante croît en Espagne. γ (*Descript. ex Willd.*)

6. ARTICHAUT nuché. *Cynara pusilla*. Labill.

Cynara aculeis, foliis pinnatis subtomentosis; laciniis pinnatifidis; squamis calicinis integris, apice scariosis. Labill. Icon. Plant. Syr. Fasc. 3. pag. 11. tab. 7.

β . *Cynara orientalis, moschata, aculeis; foliis jacobæa, tenuiter incisè; squamis calicinis fuscis speculantibus*. Tournef. Coroll. 31.

Ses racines sont presque simples; elles produisent de leur collet des feuilles toutes radicales, étalées sur la terre, oblongues, lancéolées, ailées; les folioles pinnatifides, oblongues, inégales, quelques-unes entières, tomenteuses à leurs deux faces dans leur jeunesse; de leur centre sort une fleur sessile, solitaire. Le calice est cylindrique; les écailles entières, acuminées, scarieuses à leur sommet; toutes les fleurs glauculeuses, hermaphrodites; le tube grêle, élargi à son orifice; le limbe à cinq découpures linéaires, subulées; les femencs ovales-oblongues, légèrement comprimés, striés, surmontés d'une aigrette sessile, plumeuse; le réceptacle concave, parsemé de quelques poils rares.

Cette plante a été observée aux environs de Damas, par M. de Labillardière. γ

La plante de Tournefort, var. β , se rapporte à cette espèce, selon M. de Labillardière; elle en diffère par ses feuilles, dont la face supérieure est hérissée & rude au toucher. Elle croît dans l'Afrique.

7. ARTICHAUT à feuilles entières. *Cynara integrifolia*. Vahl.

Cynara foliis lanceolatis, denticulatis; squamis calicinis lanceolato-acuminatis. Vahl, Symbol. 1. pag. 68.

C'est une plante peu élevée, grêle sur toutes ses parties, dont la tige est simple, striée, garnie de feuilles pétiolées, assez larges, lancéolées, longues d'un pouce & demi, denticulées à leurs bords; les dentelures épineuses. La fleur est bleue, solitaire, pédonculée, terminale, une fois plus petite que celle du *Cynara scolymus*; les écailles du calice lancéolées, acuminées; les inférieures terminées par une épine à peine piquante.

Cette plante croît en Espagne, sur les montagnes des environs de Tolède, dans la Castille neuve. (*Descript. ex Vahl.*)

* *Cynara (hortidis), foliis pinnatifidis, subhis tomentosis, spinosis; spinis basibus foliorum pinnarumque basi connatis*. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 148. In Madera. γ

* *Cynara (glomerata), aculeis, foliis pinnatifidis, spinosis*. Thunb. Prodr. 141. Ad Caput Bonaspei.

ARTICHAUT. Ce nom est donné, non-seulement à l'artichaut commun (*Cynara*), mais encore à plusieurs plantes qui ont avec lui des rapports, soit par leur saveur, soit par la conformation de quelques-unes de leurs parties. Le topinambour, espèce de soleil (*Helianthus tuberosus* Linn.), est l'artichaut de terre, ainsi nommé parce que la racine a le goût d'artichaut; on lui donne aussi le nom d'artichaut de Jérusalem. La patate, espèce de liseron ou de quinquillo, est nommée, peut-être pour la même raison, artichaut des Indes. Une espèce de conge d'Amérique, à fruits couronnés de tubercules, est dans quelques lieux l'artichaut de Jérusalem ou d'Espagne. La joubarbe ordinaire, dont les feuilles sont disposées comme les écailles du fruit de l'artichaut commun, est nommée vulgairement artichaut sauvage. (*Juss.*)

ARTICIOCCO. Les Italiens nomment ainsi l'artichaut, appelé ailleurs artiocum ou alveolatum. C'est le *cardus* des Anciens, dont la portion du calice que l'on mange, est nommée par eux scalia suivant Théophraste, ascalia suivant Pline, & escaleon suivant Athénée. (*Juss.*)

ARTURO: nom que porte, dans l'île de Candie, une espèce de celtis (*Celtis ardarus* Linn.). L'obel l'attribue aussi à un allagale (*Astragalus fuscatus* Linn.).

ARUBA. Aubl. (*Poyez* ARUBE & Ill. Gen. tab. 209.) Ce genre, selon M. de Jussieu, do-

voit être réuni aux *quassia*, dont il ne diffère que par le nombre des parties de la fructification.

ARUM. (Voyez GOUET.)

ARUNA. Vahl. (Voyez AROUNIER.)

ARUNDINARIA. (Voyez ROSINAIRE.) C'est la *megia* de Persoon. Synopf. Plant. 1. pag. 101.

ARUNDO. (Voyez ROSEAU.)

ASAHASAFRA. Dalechamp cite, sous ce nom, d'après Avicenne, une plante à racines tubéreuses, & palmée, qui paroit être une espèce d'*orchis*, & qui a les mêmes vertus.

ASARET. *Afarum*.

1. ASARET d'Europe. *Afarum europaeum*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 394. fig. 1. — Flor. dan. tab. 663.

2. ASARET de Canada. *Afarum canadense*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 394. fig. 2. — Michx. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 279.

4. ASARET à feuilles de gouet. *Afarum arifolium*. Michx.

Afarum foliis subnullato cordatis; calice tubuloso, infra limbum brevissimè trifidum ciliolato. Michx. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 279.

Afarum virginicum. Walter. Flor. carol.

Cette espèce est très-distincte des précédentes par la forme de ses fleurs, & même par celle de ses feuilles. Ses racines rampantes produisent de longues fibres épaisses, cylindriques. Les feuilles toutes radicales sont longuement pétiolées, presque triangulaires, échancrées en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, arrondies sur les deux angles inférieurs, glabres, entières, marquées de taches blanchâtres. Les fleurs sont médiocrement pédonculées; leur calice tubulé; le tube rétréci au dessous du limbe; celui-ci légèrement trifide à son bord.

Cette plante croît dans les forêts ombragées, à la Bassé-Caroline. M. Bosc, qui l'y a recueillie, m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

ASARINE. Tournef. Cette plante, qui est l'*as-shirriam asarina* Linn., est distinguée par Tournefort comme formant un genre particulier, qui diffère des *linaria* par sa capsule sphérique & non ovale. (Voyez MÜLLIER.)

ASARUM. (Voyez ASARET.)

ASCARINA. (Voyez ASCARINE.)

ASCARINE. *Ascarina*. Ce genre est composé d'arbrisseaux exotiques, très-rameux, garnis de feuilles opposées, ayant leurs fleurs disposées en chatons dans l'aisselle des feuilles supérieures. La famille naturelle de ce genre n'est pas encore déterminée.

ESPÈCES.

1. ASCARINE à plusieurs épis. *Ascarina polystachia*. Forst.

Ascarina foliis petiolatis, oppositis, oblongis, integerrimis, stipulatis; floribus dioicis. (N.) Forst. Prodr. n°. 364. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 647. — Lam. III. Gen. tab. 798.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, très-entières, veinées, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, longues d'un pouce & plus, accompagnées à leur base d'une stipule très-courte, vaginale, tronquée. Les fleurs sont dioïques, disposées en chatons presque filiformes, à peine longs d'un demi-pouce, réunis au nombre de deux ou trois dans les aisselles des feuilles supérieures.

Cette plante croît dans les îles de la Société. H

2. ASCARINE à fruits rouges. *Ascarina rubra*.

Ascarina foliis sparsis, subserratis; floribus monoicis. (N.)

Morella (rubra), foliis oblongis, subintegerrimis, glabris, sparsis; amentis lateralibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 669.

Prunus japonica, fructu purpureo, more similis. ? Kœmpf. Hist. jap. lib. 1. pag. 101.

An cudranum ? Rumph. Amb. lib. 7. cap. 14. tab. 16.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de huit pieds sur une tige tortueuse, de couleur brune, divisée en rameaux étalés & garnis de feuilles éparfes, pétiolées, oblongues, un peu aiguës, glabres à leurs deux faces, les unes entières, d'autres lâchement dentées. Les fleurs sont monoïques, disposées en chatons courts, latéraux, filiformes, couverts de petites écailles imbriquées, charnues, triangulaires, à une seule fleur, sans calice ni corolle; une étamine sessile, &c, dans les fleurs mâles, deux stamens tubules, divergens. Le fruit est un drupe rougeâtre, arrondi, d'un demi-pouce & plus de diamètre, semblable au fruit du mûrier par les vésicules succulentes qu'il offre à l'extérieur: il a la saveur d'une cerise aigre; il contient un noyau presque ovale, lacuneux, à deux loges, dans lequel se trouvent deux amandes ovales, comprimées.

Cet arbrisseau croît dans la Cochinchine. On le cultive en Chine. H (Description. ex Lour.)

Les fruits de cet arbrisseau sont très-estimés en Chine. On les mange crus lorsqu'ils sont mûrs, ou bien, lorsqu'ils sont encore verts, les Chinois les font cuire avec le poisson dont ils se nourrissent, pour lui servir d'alimentation. Les Cochinchinois les font fermenter comme nous faisons pour le raisin; ils se procurent par ce moyen une liqueur vineuse, d'un goût agréable.

ASCHIL ou ALACHIL. C'est le nom que les Arabes donnent à la scille maritime (*Scilla maritima* Linn.).

ASCUM. Ce nom générique a été substitué par plusieurs auteurs à celui de *norantea*, consacré par Aublet pour un genre de plantes de la Guiane. (Voyez *NORANTEA*, Suppl.)

ASCLÉPIADE. *Asclepias*.

5. **ASCLÉPIADE de Syrie.** *Asclepias syriaca*. Linn. — Lam. ill. Gen. tab. 175. fig. 3.

5.* **ASCLÉPIADE à feuilles obtuses.** *Asclepias obtusifolia*. Mich.

Asclepias foliis amplexicaulis, oblongis, rotundato-obtusis, nudatis; umbellâ terminali, longius pedunculatâ, glabrâ; corniculis exsertis. Mich. Flor. boreal. Amer. t. pag. 115.

Ses tiges sont garnies de feuilles opposées, sessiles, amplexicaules, oblongues, arrondies & obtuses à leur sommet, ondulées à leur contour. Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, longuement pédonculée, contenant un assez grand nombre de fleurs. Les corolles sont glabres; les cornets faibles.

Cette plante croît à la Virginie & dans la Caroline. (Mich.)

5.** **ASCLÉPIADE amplexicaule.** *Asclepias amplexicaulis*. Mich.

Asclepias glabra, caulibus decumbentibus, simplicibus; foliis cordatis, amplexicaulis; corniculis aestivis, compresso-ligulatis. Mich. Flor. bor. Amer. t. pag. 115.

6. 2 *Asclepias (humistrata), foliis sessilibus, cordatis, oppositis; caule prostrato, umbellis axillari-bus*. Walch. Flor. carol. pag. 105.

Cette plante est glabre sur toutes ses parties, & même d'une couleur un peu glauque. Ses tiges sont simples, tombantes ou couchées, garnies de feuilles opposées, sessiles, amplexicaules, en cœur, traversées par des veines purpurines. Les fleurs sont disposées, au sommet des tiges, en ombelles avillaires. La corolle est verdâtre; les cornets cachés, comprimés & en languette. La

plante, encore peu connue, ne paroît être qu'une variété de cette espèce.

Cette plante croît dans les pâturages arides & sablonneux, aux environs de la ville de Savannah, à la Nouvelle-Géorgie & dans la Caroline.

6.* **ASCLÉPIADE hybride.** *Asclepias hybrida*. Mich.

Asclepias caule simplicissimo, subtomentoso; foliis petiolatis, ovalibus, pubescentibus; umbellis aphyllis, terminalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. t. pag. 115.

Asclepias variegata. Walch. Flor. carolin. Nov. Linn.

Ses tiges sont très-simples, légèrement tomenteuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, à peine pubescentes, très-entières. Les ombelles sont terminales, point axillaires; la corolle de couleur purpurine, blanchâtre à son limbe & sur le bord des cornets.

Cette plante croît à la Caroline. (Mich.)

10.* **ASCLÉPIADE à fleurs laineuses.** *Asclepias laniflora*. Vahl.

Asclepias foliis planis, linearilanceolatis; caule fruticoso; umbellis lateralibus, foliis; corollis hispidis. Vahl, Symbol. t. pag. 23, tab. 7.

Asclepias (laniflora), foliis planis, linearilanceolatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 51.

Ses tiges sont ligneuses, garnies de feuilles opposées, planes, linéaires-lanceolées, luisantes, glabres à leurs deux faces, très-entières; les fleurs disposées en ombelles solitaires, axillaires & laterales; les corolles velues en dedans. Le fruit consiste en deux follicules striés, un peu ridés, mais point enflés ni hispides. Il découle de cette plante un suc très-abondant, que les Arabes emploient contre la rage en le mêlant avec du beurre, d'après Forkhal.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. H.

11.* **ASCLÉPIADE mignone.** *Asclepias pulchra*. Ehrh.

Asclepias foliis lanceolatis, subtis pubescentibus; caule superne diviso; umbellis erectis, geminis. Willd. Spec. Plant. t. pag. 1267. — Ehrh.

Cette plante est très-rapprochée de l'*Asclepias incarnata*; elle en diffère par ses tiges, pubescentes à leur partie supérieure, tamenées seulement vers leur sommet. Ses feuilles sont plus courtes, un peu plus larges, pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, droites & gemines.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

11.* ASCLÉPIADE à tige grêle. *Aftelepis debilis*. Mich.

Aftelepis glaberrima, caule debili, erecto, simpliciter; foliis petiolatis, ovali-lanceolatis, utrinque acutis, membranaceis; pedicellis capillaribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 116.

Ses tiges sont très-simples, un peu fistuleuses, droites, foibles, cylindriques, très-glabres, garnies de feuilles opposées, pétiolées, lanceolées ou ovales-lanceolées, membraneuses, très-entières, aiguës, presque acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont entièrement blanches, disposées en ombelles axillaires & terminales, assez nombreuses, fontaines par des pédicelles glabres, presque capillaires.

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux humides & ombragés. (V. f. Comm. Bos.)

12.* ASCLÉPIADE à feuilles de citronnier. *Aftelepis citrifolia*. Jacq.

Aftelepis foliis ovatis, undulatis, subitè discoloribus, pubescentibus; umbellâ terminali; caule erecto, simplici. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1268.

Aftelepis foliis ovato-lanceolatis, acutis, repando-undulatis, subitè glaucis & minutè pilosiusculis, firmis; caule erecto, umbellâ hemisphaerica. Jacq. Icon. Rat. 2. tab. 343, & Collect. 2. pag. 290.

Ses tiges sont droites, herbacées, très-simples, garnies de feuilles opposées, ovales-lanceolées, assez semblables à celles du citronnier, sinuées & ondulées à leur contour, aiguës à leur sommet, assez fermes, vertes & glabres en dessus, glauques & pubescentes ou légèrement pileuses en dessous. Les fleurs sont disposées en ombelle terminale, hémisphérique.

Cette plante croît dans l'Amérique. ♀

14. ASCLÉPIADE dompte-venin. *Aftelepis vincetoxicum*. Linn. — Lam. III. tab. 175. fig. 1.

Cynanchum vincetoxicum. Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 274.

Vincetoxicum officinale. Moench. Meth. p. 317.

M. Persoon regarde cette plante comme devant appartenir au *cynanchum*, ainsi que l'*aftelepis nigra*, & même former un genre particulier, leurs appendices n'étant point des cornets, comme dans les autres espèces, mais des tubercules assez durs.

16.* ASCLÉPIADE des Indes. *Aftelepis alexandrina*.

Aftelepis caule volubili, foliis inferioribus cordatis, superioribus ovatis; umbellis sessilibus. Jacq. Collect. 2. pag. 101. — Willden. Spec. Plant. 1. pag. 1270.

Nantjera patsha. Rheed. Hort. Malab. 9. pag. 21. tab. 13.

Cette espèce, sur laquelle il nous reste quelques détails plus étendus à désirer, s'élève sur une tige grimpante, herbacée, garnie de feuilles opposées; les inférieures échanquées en cœur; les supérieures ovales, entières. Les fleurs sont disposées en ombelles sessiles. Elle croît à l'île de Ceilan. ♀

16.* ASCLÉPIADE fétide. *Aftelepis fustida*. Cavan.

Aftelepis caule tereti-volubili; floribus racemosis (umbellis prostratis Willd.); fo. oppositis, cordatis, acuminatis. Cavan. Icon. Rat. 2. pag. 45. tab. 158. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1269.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, géniculées; les rameaux alternes; les feuilles opposées, pétiolées, échanquées en cœur, ovales, aiguës, vertes en dessus, glauques en dessous; les pétioles arqués, cylindriques, un peu plus courts que les feuilles. Les fleurs sont disposées en grappes latérales, solitaires, semblables à des ombelles prostrées; elles répandent une odeur fétide. Leur calice est petit, à cinq découpures aiguës & rougeâtres; la corolle d'un vert-pâle, à cinq découpures linéaires, réfléchies; les cornets droits & blanchâtres.

Cette plante croît au Mexique; elle est cultivée dans le Jardin royal à Madrid. ♀ (Descript. ex Cavan.)

16.* ASCLÉPIADE offier. *Aftelepis vinimalis*. Swartz.

Aftelepis caule sistrutaceo, volubili, filiformi; foliis oppositis, lanceolatis, glabris; umbellis lateralibus, multifloris. Swartz, Prodr. 53, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 559.

Aftelepis funiculacea, laetè scandens; foliis varioribus, coracato-lanceolatis; floribus umbellatis. Brown, Jam. 184.

Apocynum fruticosum, scandens, genista hispanica facie; floribus latis, odoratis. Sloan, Jam. 89. Hist. 1. pag. 207. tab. 131. fig. 1.

Apocynum scandens, foliis laurii; flore albo, umbellato. Plum. 20. Icon. 27. fig. 2.

Ses tiges sont très-longues, filiformes, presque ligneuses, grimpantes, cylindriques; les rameaux glabres, axillaires, garnis de feuilles opposées, pétiolées, lanceolées, aiguës, étalées, un peu élargies, veinées, glabres à leurs deux faces. Les

fleurs sont petites, disposées en ombelles pédonculées, composées de dix à douze fleurs. Le calice est à cinq petites folioles aiguës, persistantes; la corolle blanche, partagée, jusqu'à la base, en cinq découpures ovales, aiguës, ciliées à leurs bords, d'un blanc de neige en dedans; cinq appendices ovales, coniques, très-blancs, point creusés en cornet. Le fruit consiste en deux follicules oblongues, acuminées, étalées, comprimées à leur base, ventrues, couvertes d'un duvet blanchâtre, contenant des semences aigretées.

Cette plante croît le long des ruisseaux, à la Jamaïque, dans les lieux arides & sablonneux. (Description ex Swartz.)

17. ASCLÉPIADE à feuilles de saule. *Asclepias frutescens*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 175. fig. 2.

17.* ASCLÉPIADE à feuilles de laurier. *Asclepias laurifolia*. Mich.

Asclepias caule erecto; foliis subsessilibus, ovali-lanceolatis, sensim angustatis, acutis, glabris; margine serratisulcis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 117.

Cette plante a le port de l'*asclepias amara*. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, quelquefois rameuses à leur partie supérieure, & légèrement pubescentes. Ses feuilles sont opposées, presque sessiles, ovales-lancéolées, insensiblement rétrécies & très-aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, un peu rudes à leurs bords; celles du haut plus étroites, lancéolées. La corolle est purpurine, verdâtre en dessous; les cornets de couleur pourpre.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie, le long du fleuve Altamaha. (Description ex Mich.)

17.* ASCLÉPIADE à feuilles rares. *Asclepias paucifolia*. Mich.

Asclepias caule erectissimo, glabro; foliis raris, linearibus, longissimis; umbellis terminalibus, paucifloris.

Asclepias (lanceolata), foliis linearibus; caule erecto, levi; umbellis terminalibus. Walrh. Flor. carol. pag. 105.

Il n'est peut-être, d'après Michaux, qu'une variété de la précédente. Ses tiges sont glabres, redressées, très-peu garnies de feuilles, nues à leur partie supérieure. Les feuilles sont opposées, fort longues, linéaires, presque glabres; les fleurs disposées en ombelles terminales, peu garnies; la corolle rougeâtre; les cornets jaunes.

Cette plante croît parmi les pâturages humides, dans la Bassé-Caroline. (Mich.)

18.* ASCLÉPIADE de la Daourie. *Asclepias daurica*. Willd.

Asclepias foliis linearibus, subulatis, piloso-ciliatis, oppositis; umbellis pedunculatis, axillaribus; calicibus pilosis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1271.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'*asclepias sibirica*; elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus courtes & plus étroites, linéaires, tubuleuses, pileuses, ciliées à leurs bords, opposées. Les fleurs sont de la grandeur de celles de l'*asclepias syriaca*; elles sont disposées en ombelles axillaires, pédonculées.

Cette plante croît dans la Daourie. (Description ex Willd.)

18.* ASCLÉPIADE foyeuse. *Asclepias fetosa*. Vahl.

Asclepias foliis linearibus, revolutis, oppositis; caule fruticoso. Vahl, Symbol. 1. pag. 23. tab. 8.

Asclepias (fetosa), foliis margine revolutis. Fomkh. Flor. ægypt.-arab. pag. 51.

Ses tiges sont droites, ligneuses, garnies de feuilles opposées, linéaires, roulées à leurs bords; les fleurs disposées en ombelles latérales & terminales; les corolles vertes; les follicules renflées, couvertes de poils foyeux.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. (V.)

19.* ASCLÉPIADE du Mexique. *Asclepias mexicana*. Cavan.

Asclepias foliis verticillatis, senis, lanceolatis; floribus umbellatis. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 42. tab. 58.

Elle diffère de l'*asclepias verticillata*, particulièrement par ses feuilles plus larges, au nombre de six à chaque verticille. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, hautes d'un pié & demi, tendres, herbacées, un peu anguleuses; les feuilles presque sessiles, étroites, linéaires-lancéolées, vertes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures un peu plus étroites. Les fleurs sont blanches, beaucoup plus grandes que celles de l'espèce précédente, disposées en ombelles pédonculées à l'extrémité des tiges, accompagnées à leur base d'un involucre de folioles courtes, lancéolées, recouvrant la corolle à cinq découpures ovales, acuminées, rétrécies; cinq cornes à peine sail-lans; deux follicules oblongs, acuminés, ventrues, striés, à une loge, à une seule valve, longues de deux poices.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

20.* ASCLÉPIADE linéaire. *Asclepias linearis*. Cavan.

Asclepias foliis sparsis, subulatis, canaliculatis;

umbellulis lateratibus, multifloris, Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 41. tab. 57.

Aftelepias foliis alternis, lineari-subulatis; umbellulis pedunculatis, mutatis, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1273.

Ses tiges sont droites, un peu rameuses; les rameaux glabres, durs, cylindriques, raboteux, d'un vert-cendré, garnis de feuilles éparées, sessiles, étroites, linéaires-subulées, un peu canaliculées, glabres à leurs deux faces, aiguës, très-rapprochées. Les fleurs font d'un blanc-verdâtre, disposées en ombelles latérales, pedunculées, inclinées, munies d'un involucre de folioles aiguës.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ignore son lieu natal. x (V. v.)

21.* *ASCIÉTRADE* à longues feuilles. *Aftelepias longifolia*, Mich.

Aftelepias caule decumbente, foliisque sparsis, praelongo-linearibus, pubescentibus, Mich. Flor. boreal. Amet. 1. pag. 116.

Cette espèce paroît appartenir à l'*Aftelepias incarnata* de Waltherius; elle est remarquable par ses longues feuilles étroites, linéaires, un peu obtuses, sessiles, à peine légèrement pubescentes, éparées, quelquefois rapprochées presqu'en verticille ou opposées. Les tiges font couchées, herbacées, filices, cylindriques, un peu anguleuses à leur partie supérieure, à peine pubescentes, verdâtres. Les ombelles font axillaires, terminales, pedunculées; les appendices de la corolle plus courts que les organes sexuels.

Cette plante croît dans les forêts, à la Nouvelle-Géorgie. (V. f. Comm. Bef.)

Epices moins connues.

* *Aftelepias (mucronata), foliis oblongis, mucronatis, glabris; umbellis axillaribus*, Thunberg, Prodr. 47.

Ses feuilles sont glabres, oblongues, mucronées à leur sommet; les fleurs disposées en ombelles axillaires. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Aftelepias (parviflora), foliis lanceolatis, acuminatis, glabris, oppositis, basi attenuatis; caule fruticose, erecto; umbellis lateratibus, solitariis*, Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 307.

Ses tiges sont droites et ligneuses; les feuilles glabres, opposées, lancéolées, acuminées, rétrécies à leur base; les fleurs petites, disposées en ombelles solitaires et latérales. Elle croît dans la Floride & la Caroline. y

* *Aftelepias (convolvulacea), foliis subrotundo-*

cordatis, acuminatis; caule volubili, umbellis pro-

liferis, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1269.

Cette plante, que Willdenow n'a vue qu'incomplète, ressemble, d'après cet auteur, à l'*Aftelepias fatida*, n°. 16*; elle en diffère par ses feuilles en cœur, un peu arrondies; les deux lobes de la base écartés; le pedoncule commun plus long que les feuilles, velu, ainsi que les tiges. Elle croît en Guinée. z

* *Aftelepias (filiformis), caule erecto, foliis filiformibus; umbellis lateratibus, elongato-pedunculatis*, Linn. f. Suppl. pag. 169.

Aftelepias foliis lineari-filiformibus; umbellis lateratibus, pedunculatis; caule erecto, Thunb. Prodr. 47.

D'après Linné fils, cette plante ne diffère que par le caractère de ses fleurs de l'*apocynum filiforme* & du *zinnia hum filiforme*. Ces trois plantes se ressemblent au premier aspect, du moins quant à la forme de leurs feuilles. Celle-ci croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Aftelepias (fusca), caule repente, foliis cordato-lanceolatis; umbellis axillaribus, geminis*, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 211.

Cette espèce paroît très-voisine de l'*Aftelepias nigra*, si toutefois elle n'en est pas une variété. Ses tiges sont grêles, herbacées, grimpantes, nombreuses, radicantes à leur partie inférieure, très-rameuses vers leur sommet, garnies de feuilles en cœur, lancéolées, pétiolées, assez petites. Les fleurs font d'un pourpre-foncé; les ombelles axillaires, deux à deux; la corolle petite, sans cornets; cinq appendices auriculés. Le fruit consiste en deux follicules petites, subulées, ventrues en dehors, planes en dedans; les semences ovales, courbées, aigretées.

Cette plante croît à la Cochinchine, sur les vieux murs & parmi les décombres. (Lour.)

ASCOBOLÉ. *Ascobolus*. Ce genre, d'abord réuni aux *perizetes* par Bulliard, en a été séparé avec assez de raison par M. Persoon, à cause des petites capsules libres & saillantes dont la surface supérieure est parsemée. Les autres caractères lui sont communs avec les pézizes. Au reste, ce genre se réduit à un très-petit nombre d'espèces; elles sont toutes charnues, hémisphériques, granuleuses, presqu'en forme de cupule.

ESPÈCES.

1. ASCOBOLÉ farineuse. *Ascobolus furfuraceus*, Persf.

Ascobolus gregarius, subconceus, fuscus aut viridescens, externè furfuraceus, Persf. Obs. Mycol. 1. pag. 33. tab. 4. fig. 3. 4 & 6.

Periza stercoraria. Bull. Champ. pag. 136. tab. 176. — Sowerb. Fung. tab. 18. — Lam. Ill. tab. 886. fig. 3.

1. *Ascobolus luteus*. Bull. l. c. fig. 1.

2. *Ascobolus violaceus*. Bull. l. c. tab. 438. fig. 4.

Ce petit champignon est presque sessile, charnu, fragile, en forme de coupe, un peu plus grand qu'une lenille, granuleux, blanchâtre & comme farineux à sa face inférieure, de couleur jaune ou violette à sa face supérieure, qui est en même temps concave, parsemée de capsules sous la forme de grains noirs. Cette espèce ne se trouve que sur la fiente des bêtes de somme.

3. ASCOBOLÉ couleur de chair. *Ascobolus carneus*. Pers.

Ascobolus glaber, colore carneo. Pers. Synopf. pag. 676.

Elle est partout d'une couleur de chair claire, glabre à la superficie, plane & à peine bordée. Elle croît dans les forêts, sur la fiente des animaux, comme la précédente; elle est rare, d'après M. Persoon.

4. ASCOBOLÉ glabre. *Ascobolus glaber*. Pers.

Ascobolus minutus, congestus, glaber, nitens, subconvexus, spadicus. Pers. Obs. Mycol. 1. p. 34. tab. 4. fig. 3. B, & fig. 7. A. B. C, & Synopf. 677.

Elle croît en automne sur la fiente de vache, où elle est assez commune; elle est fort petite, ramassée par groupes, très-glabre, d'un jaune clair. Sa forme varie selon ses âges; d'abord cylindrique, presque conique, puis un peu comprimée, convexe.

5. ASCOBOLÉ enchaîné. *Ascobolus immersus*. Pers.

Ascobolus sparsus, immersus, irregularis, subconicus, externè subsurfuratus. Pers. Obs. Mycol. pag. 35. tab. 4. fig. 7. D. E.

Cette espèce est presque entièrement enfoncée dans le fumier; elle n'a de saillant que ses capsules. Les semences qu'elles renferment, vues à la loupe, sont anguleuses, noires, plongées dans une humeur aqueuse. Sa forme est irrégulière, presque conique; sa surface un peu farineuse.

ASCOPHORE vivace. *Ascophora perennis*. Pers.

Ascophora alba, persistens. Pers. Synopf. p. 685.

Ascophora ovalis. Todde, Fung. Meckl. 1. pag. 15, & in d. Schrift. d. Gesell. Naturf. fr. in Berl. vol. 3. pag. 247. tab. 4. fig. 4 & 6. Sub *afsidio*,

Cette plante, de la famille des champignons & de la division des *gymnocarpes* de Persoon, constitue à elle seule un genre à part, qui se rapproche des *filix*, & qui en diffère par la petite tête vide & enflée qui termine un pédicule filiforme.

L'espèce dont il est ici question est d'un blanc-éclatant; elle ressemble assez bien aux éramines des autres plantes. Son pédicule est plus fin qu'un cheveu, long presque d'un pouce, terminé par une petite tête ovale, obtuse, vide & enflée, de la grosseur d'une petite tête d'épingle.

Cette plante croît en automne, à l'extrémité des rameaux, par petits groupes épars. Je l'ai trouvée au Jardin des Plantes, à l'extrémité des feuilles de pin; elle se conserve très-long-temps, malgré son extrême finesse & sa délicatesse.

ASCYRE. *Ascyrum*. Le genre que Tournefort avoit établi sous ce nom, il le distinguoit des millepertuis (*hypericum*) par les stigmates & les loges des capsules au nombre de cinq au lieu de trois. M. de Lamarck, dans ses *Illustrations des Genres*, tab. 642, a rétabli le genre de Tournefort, & a donné le nom d'*hypericoides*, tab. 644, à celui qui, dans Linné, porte le nom d'*ascyrum*, qui n'est point celui de Tournefort, Linné ayant également rangé parmi ses *hypericum* les espèces pourvues de capsules à trois ou à cinq loges.

Il est donc essentiel de remarquer que le genre dont il s'agit ici est celui de Linné, & qu'il répond aux *hypericoides* des *Illustrations*, facile à distinguer par les corolles à quatre pétales & par les calices à quatre divisions persistantes, les deux intérieures beaucoup plus grandes.

ES P È C E S.

1. ASCYRE croix de Saint-André. *Ascyrum crux Andree*. Linn.

Hypericoides. Lam. Ill. Gen. tab. 944. fig. 2. ex Gaertn.

2. ASCYRE perforé. *Ascyrum hypericoides*. Linn. — Lam. Ill. tab. 644. fig. 1.

4. ASCYRE à tiges nombreuses. *Ascyrum multicaule*. Mich.

Ascyrum multicaule, erectissimum, foliis sublanco-latis oblongis; floribus subsessilibus, digynis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77.

Ascyrum (multicaule), foliis oblongis, ramis ancipitibus, corymbo terminali. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1473.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec l'*ascyrum hypericoides*. Elle en diffère par son port, par la disposition de ses fleurs. Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges grêles, droites, rameuses; les

les rameaux glabres, à deux angles; les feuilles opposées, sessiles, oblongues, glabres, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, les fleurs presque sessiles, axillaires & solitaires au sommet; les rameaux formant par leur ensemble une sorte de corymbe; l'ovaire surmonté de deux styles.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. γ

5. ASCYRE amplexicaule. *Ascyrum amplexicaule*. Mich.

Ascyrum caule erecto, supernè dichotome paniculato; foliis amplexicaulis, cordatis; floribus trigynis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77.

Ses tiges sont droites, dichotomes & paniculées à leur partie supérieure, garnies de feuilles amplexicaules, en forme de cœur. Les fleurs renferment trois styles. Elle croît dans la Floride.

6. ASCYRE à tige basse. *Ascyrum pumilum*. Mich.

Ascyrum humillimum, foliis parvis, ovalibus, obtusis; pedicellis longis, reflexis; floribus monogynis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77.

Cette espèce a des tiges très-basses, garnies de feuilles fort petites, ovales, obtuses; les pédicelles allongés & réfléchis; les ovaires surmontés d'un ou de deux styles. Elle croît dans la Nouvelle-Géorgie.

7. ASCYRE enveloppé. *Ascyrum involutum*. Labill.

Ascyrum petalis quinis, involutis; foliis ovato-oblongis; caule tetragono, paniculè dichotomè. Labill. Nov. Holland. 1. pag. 32. tab. 174.

Ses tiges sont légèrement ligneuses, à tiges basses, redressées, ascendentes, tétragones, garnies de feuilles à demi amplexicaules, opposées, ovales-oblongues ou elliptiques, à points transparents. Les fleurs sont solitaires, terminales, ou paniculées par dichotomies; les découpures du calice égales, ovales-lancéolées; les pétales oblongs, persistans long-tems avec le fruit; les filamens au nombre de quinze à vingt, à peine filiculés, réunis à leur base, insérés sous le pistil; les anthères orbiculaires, à deux valves. L'ovaire est ovale, oblong, libre, surmonté de trois styles courts, rapprochés entr'eux à leur base; les stigmates réfléchis, obtus. Le fruit est une capsule ovale, oblongue, à une loge, à trois valves.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. γ Labillard.

8. ASCYRE couché. *Ascyrum humifusum*. Labill. Botanique. Supplément. Tome 1.

Ascyrum petalis quinis, flaminibus denatis, foliis obovatis; caulis tetragonis, prostratis. Labill. Nov. Holl. pag. 33. tab. 175.

Petite plante, dont les tiges grêles sont étendues sur la terre, glabres, tétragones, garnies de feuilles opposées, en ovale renversé, sessiles, un peu crénelées ou entières, traversées de points transparents. Les fleurs sont axillaires & terminales, pédonculées; les découpures du calice égales, presque aussi longues que la corolle; les pétales ovales, oblongs. Les autres parties de la fructification comme dans l'espèce précédente.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labill.)

* *Ascyrum* (flans), *caule erecto, infernè simpliciter, ancipite; foliis oblongo-ovalibus; floribus breviter pedicellatis, trigynis*. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 77.

An ascyrum hypericoides? Walth. Flor. carol.

Cette plante paroît être la même que l'*hypericum tetrapetalum* Lam. n°. 22, d'après Willdenow. Ses feuilles sont oblongues, obtuses, arrondies à leur base, de la longueur des entre-nœuds; les pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, soutenant d'une à trois fleurs. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. γ

ASCYRUM. (Voyez ASCYRE.)

ASEROË rouge. *Aseroe rubra*. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 124, & Voyag. de Lapeyr. vol. 1. p. 145. tab. 12.

M. de Labillardière a décrit sous ce nom un champignon pour lequel il a établi un genre particulier, & dont il distingue le caractère essentiel par :

Un volva gélatineux, frié, presque globuleux; un pédoncule cylindrique & fistuleux, s'ouvrant à son sommet en plusieurs rayons clairs & bifides.

Ses racines sont fongueuses, tubéreuses; elles produisent plusieurs fibres simples, allongées. Le volva est charnu, presque globuleux, blanchâtre, presque transparent, marqué de sept stries tant en dedans qu'en dehors, percé à son sommet. Le pédoncule est cylindrique, beaucoup plus long que le volva, de couleur pourpre, fistuleux, ouvert à son sommet, couronné par sept rayons étalés, bifides, de couleur pourpre, jaunâtres en dedans.

Ce champignon croît sur la terre, parmi les mousses, au cap Van-Diemen. (Desf. ex Labill.)

ASJOGAN. Roxburg (Asiat. Res. 4. pag. 355.) a fait de cette plante, jusqu'alors peu connue, un genre particulier sous le nom d'*ionassa*, & auquel il donne pour caractère essentiel : un calice à deux folioles; une corolle infundibuliforme; le tube

P p p

charnu, fermé; le limbe à quatre lobes; un appendice en forme d'anneau, inséré à l'orifice du tube de la corolle, qui supporte sept étamines; un ovaire pédicellé, auquel succède une gousse en forme de fable, contenant de quatre à huit semences. Ces caractères annoncent les rapports de ce genre avec la famille des légumineuses, & son affinité avec les *palovea* & les *bauhinia*.

ASMENI. C'est, d'après Daclechamp, le nom que donnent les Arabes à l'iris commune.

ASMONICH : nom péruvien d'un quinquina, le *cinchona rosea*. Ruiz & Pav. Flot. peruv. 2. pag. 54. tab. 199.

ASOUATOU : nom brame du *isela* du Malabar. (Rheed. Hort. Malab. 3. tab. 63.) C'est une espèce de figuier, *figus indica* Linn.

ASPALAT. *Aspalathus*. Ce genre a été considérablement augmenté par les espèces que Thunberg a mentionnées par une seule phrase spécifique dans son *Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Espérance*. Ces espèces sont trop peu connues pour que nous puissions entreprendre de les ajouter à celles déjà décrites dans ce Dictionnaire.

M. de Lamarck a fait graver dans les *Illustrations des Genes*, tab. 620, les espèces suivantes :

1. ASPALAT épineux. *Aspalathus spinosa*, fig. 3.
3. ASPALAT acuminé. *Aspalathus acuminata*, fig. 4.
4. ASPALAT hétérisson. *Aspalathus hirtix*, fig. 1.
6. ASPALAT à fleurs en têtes. *Aspalathus capitata*, fig. 2.

Le même auteur a placé dans ce genre un *lotus* de Linné, n°. 26, & quelques *anthyllides*, n°. 29, 33. Quant à l'ASPALAT à bois noir, n°. 28 (*aspalathus etrusca* Linn.), voyez les observations à l'article ALDINE, Suppl.

ASPALATHUS. (Voyez ASPALAT.) Ce nom, adopté par Linné pour le genre que nous venons de décrire, a été employé par Dioscoride pour le cytis. On l'a donné aussi à quelques espèces de *spartium* & à des arbrisseaux épineux dont le bois odorant étoit employé dans les parfums, ainsi qu'au *lignum rhodium*, que l'on reconnoît maintenant pour être une espèce de *liseron*.

ASPARAGUS. (Voyez ASPERGE.)

ASPERELLE. *Asperella*, Ill. Gen. vol. 1. p. 167. Schreber avoit d'abord désigné, sous le nom d'*asperella*, le *phalaris oxyoides* Linn., différent de

ce genre par l'absence des valves calicinales; en suite, dans son supplément, il a substitué lui-même au nom *asperella*, celui de *leersia*, adopté par plusieurs autres botanistes qui ont réuni quelques autres espèces à ce nouveau genre. M. de Lamarck, dans ses *Illustrations*, a conservé la première plante sous le nom d'*asperella*, auquel il n'attribue que trois étamines. Ses valves, ciliées, comprimées, striées, ressemblent un peu, en ce point, à celles du tiz, qui a de même les fleurs paniculées: on a tiré son nom spécifique de cette ressemblance. (Voyez ALPISTE, n°. 13, & LEERSIA, Suppl.)

ASPERGE. *Asparagus*.

1. ASPERGE commune. *Asparagus officinalis*. Linn. — Lam. Ill. tab. 249.

4. ASPERGE crêpe. *Asparagus crispus*. Lam.

Asparagus (decumbens), caule herbaceo, inermis, decumbente, ramossissimo; ramis flexuosis; foliis setaceis; pedunculis solitariis, terminalibus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 151.

Asparagus (decumbens), herbaceus, inermis, decumbens, ramis subreflexis, foliis subsetaceis. Jacq. Hort. Schoenb. 1. pag. 71. tab. 97.

5. ASPERGE à grappes. *Asparagus racemosus*. Willd.

Asparagus aculeatus solitariis, ramis striatis; foliis fasciculatis, linearibus subulatis, falcatis; racemis multifloris, axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 152.

Cette plante, suivant Willdenow, rapprochée de l'*asparagus falcatus*, est très-différente & bien reconnoissable à ses feuilles dix fois courtes & quatre fois plus étroites, ramassées par paquets, linéaires, subulées, courbées en faucille. Ses riges ligneuses se divisent en rameaux striés. Ses fleurs sont petites, disposées en grappes axillaires, longues d'un pouce & demi; les pédoncules accompagnés, à leur base, de bractées oblongues, fort petites.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Description. ex Willd.)

Observations. Les espèces suivantes, mentionnées par Thunberg dans son *Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Espérance*, ont besoin d'une description plus détaillée pour être mieux reconnues.

* *Asparagus* (flexuosus), herbaceus, inermis, caule flexuoso, foliis lanceolatis. Thunb. Prodr. pag. 66.

* *Asparagus* (scandens), herbaceus, inermis, volubilis, foliis lanceolatis, falcatis. Thunberg. Prodr. 63.

* *Asparagus* (subulatus), frutescens, inermis,

ramis retroflexis, foliis ceteri-fabulatis. Thunberg, Prodr. 66.

* *Asparagus* (dependens), *fruticofus, aculeatus, ramis reflexis, foliis subulatis.* Thunb. Prodr. 66.

* *Asparagus* (lanceus), *aculeis solitariis; foliis lanceolatis, subulatis; pedunculis axillaribus, solitariis.* Thunb. Prodr. 66.

ASPERGILLE. *Aspergillus.* Genre de plantes de la famille des champignons, établi par Micheli, contondu par Linné avec les *mucor*, & que M. Persoon a compris dans son genre *monilia*. (Voyez *MONILIE*, Suppl., & *ASPERGILLUS*. Ill. Gen. tab. 890.)

ASPERUGO. (Voyez *RAPETIE*.)

ASPERULA. (Voyez *ASPERULE*.)

ASPERULE. *Asperula*.

1. ASPERULE odorante. *Asperula odorata*. Linn. — Lam. Ill. tab. 61. — Curtis, Lond. Icon.

1.* ASPERULE à six feuilles. *Asperula hexaphylla*. Allioni.

Asperula foliis senis, rigidiusculis, glabris, levibus, linearibus; floribus terminalibus, aggregatis, sessilibus, bracteas superantibus. Decand. Synopf. pag. 258. n°. 3339.

Asperula foliis senis, linearibus; floribus umbellatis, terminalibus, sessilibus. Allioni, Flor. ped. n°. 48. tab. 77. fig. 3.

Ses tiges sont grêles, tétragones, simples ou rameuses, très-glabres, hautes de quatre à cinq pouces, garnies de feuilles étroites, linéaires, aiguës, un peu fermes, rudes à leurs bords, au nombre de six à chaque verticille. Les fleurs forment une petite ombelle terminale, presque scissile, accompagnée de six folioles plus courtes que les corolles; celles-ci font d'un blanc lavé de rose; le tube long d'environ quatre lignes; le limbe divisé en quatre lobes aigus; le fruit glabre, strié, à deux semences ovales, oblongues.

Cette plante croît sur les rochers, au dessus de Tende, dans le Piémont. (V. f.)

2.* ASPERULE à feuilles rudes. *Asperula hirta*. Ram.

Asperula foliis senis, hirtis, acutis, internodiis longioribus; floribus terminalibus, aggregatis, sessilibus, bracteas superantibus. Ramond, Bull. philom. n°. 41. pag. 131. tab. 9. fig. 1. 2 & 3. — Decand. Synopf. pag. 298. n°. 3338.

Il sort d'une racine forte & ligneuse un grand

nombre de tiges grêles, quadrangulaires, droites ou ascendantes, hautes de quatre à cinq pouces, garnies de feuilles nombreuses, plus longues que les entre-nœuds, linéaires, aiguës, fix à chaque verticille, hérissées de poils rudes à leurs bords, & quelquefois sur leurs nervures. Les fleurs sont sessiles, réunies en têtes terminales, blanches, légèrement purpurines en dehors. Le fruit, d'après M. Ramond, est formé par deux bies sèches, d'un pourpre-noir luisant, divisées chacune en deux lobes à leur maturité.

Cette plante croît sur les rochers, dans les Hautes-Pyrénées. (V. f.)

2.* ASPERULE hérissée. *Asperula hirsuta*. Desf.

Asperula foliis senis, linearibus, acutis, denticulatis, inferioribus hirsutis; floribus aggregatis, terminalibus. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 127.

Rubecula lusitanica, aspera, floribus purpurascens. Tourn. Inst. R. Herb. 130. — Vail. Herb.

Cette espèce a le port du *galium uliginosum* Linn. Ses tiges sont droites, grêles, très-lilées, rameuses, quadrangulaires, hautes d'un pied & plus, hérissées à leur partie inférieure, garnies de feuilles glauques, étroites, presque linéaires, insensiblement élargies vers leur sommet, acuminées, finement denticulées à leurs bords, fix à chaque verticille; les inférieures hérissées de poils courts & rudes; les verticilles inférieurs beaucoup plus rapprochés que les supérieurs. Les fleurs sont réunies en une tête terminale. La corolle est infundibuliforme, d'un rose-pâle, longue de quatre à cinq lignes; le limbe divisé en quatre lobes ovoides; les semences glabres.

Cette plante croît sur les collines, aux environs d'Alger. (V. f. in herb. Desfont.)

8. ASPERULE de la Calabre. *Asperula calabrica*. Linn. — Desf. Flor. atlant. 1. pag. 126.

Rubecula cretica, fastidissima, frutescens, myrtifolia; flore magno, suave-rubente. Tourn. Coroll. 5.

Thymelaea supina, lignosior, cretica; ingratis odoris, major. Zan. Hist. 215. tab. 166.

Nerium oleosum, viridi, fastidissimum, incarnatum flore. Hort. Cathol. Suppl. 3. — Vail. Herb.

Sherardia fastidissima. Cyrtill. Char. 69. tab. 3. fig. 7.

Asperula foliis oppositis, linearilanceolatis; caule fruticosa. Lhérit. Stirp. 65. tab. 32.

Cette plante répand, lorsqu'on la broie, une odeur très-désagréable. Ses tiges sont ligneuses, couchées, rameuses, longues d'un à deux pieds; les rameaux opposés & cylindriques; les feuilles glabres, opposées, un peu épaisses, linéaires-lan-

céolées, rétrécies à leurs deux extrémités, pâles en dessous; deux stipules petites, serrées contre la tige, aiguës. Les fleurs sont droites, fécondes, terminales, réunies en corymbe au nombre de huit à douze; la corolle couleure de rose, longue d'un demi-pouce; son tube grêle; son limbe divisé en quatre lobes étalés, souvent réfléchis, aigus; les étamines saillantes; les anthères versatiles. Le fruit consiste en deux baies adhérentes, grêles, à peine charnues, rougeâtres, à demi cylindriques; autant de semences oblongues.

Cette plante croît dans la Calabre. M. Desfontaines l'a également recueillie sur le mont Atlas. (V. f. in herb. Desfont.)

9. ASPÉRULE à courtes feuilles. *Asperula brevifolia*. Vent.

Asperula foliis quaternis, brevissimis, superioribus oppositis; caula decumbente; floribus quadrifidis, axillaribus, foliariis; terminalibus fasciculatis. Vent. Hort. Cels. pag. 8. tab. 63.

Cette espèce a quelques rapports avec l'*Asperula cynanchica*; elle s'en distingue aisément par ses feuilles très-courtes, par la disposition de ses fleurs, dont quelques-unes sont axillaires & foliaires, les autres terminales, fasciculées; par son style, divisé jusqu'à sa base. Ses tiges sont glabres, ligneuses, tombantes, très-rameuses, géminées; les rameaux redressés; les feuilles linéaires, aiguës, concaves, un peu rudes au toucher; les inférieures au nombre de quatre à chaque verticille; les supérieures opposées, portant souvent, dans leurs aisselles, des rameaux avortés; les fleurs d'abord d'un jaune-verdâtre, puis d'un pourpre foncé en vieillissant; le tube trois fois plus long que le calice; le limbe à quatre lobes ovales, obtus; le fruit lisse, globuleux, d'un rouge-brun, comprenant deux semences recouvertes d'une membrane très mince.

Cette plante croît sur les montagnes de la Carmanie, où elle a été découverte par MM. Bruzière & Olivier. (V.)

ASPHODÈLE. *Asphodelus*. Le nom d'*asphodelus* a été employé par Plin & par Dioscoride; il vient du grec, & signifie *septre*. Il fut probablement donné à cette plante à cause de la forme de sa tige & de la disposition de ses fleurs. Les Anciens plantoient l'*asphodelus* rameux auprès des tombeaux. Le vulgaire croyoit que les mânes des morts se nourrissoient de ses racines. Les sangliers en sont très-frands. En Barbaïe, où cette plante est très-commune, ainsi que ces animaux, j'ai vu la terre partout bouleversée pour en arracher cet aliment. Ce bouleversement la rend plus fertile, & facilite l'accroissement de la végétation dans ces terrains durcis par la grande chaleur, & que les pluies rares ne peuvent amolir ni diviser. Le grouin

& les pieds du sanglier semblent remplacer, dans ces plaines désertes, la bêche & le hoyau.

ES PÈCES.

2. ASPHODÈLE de Crète. *Asphodelus creticus*. Linn.

Asphodelus (creticus), caule inferni folioso, superne ramoso, nudo; foliis subulatis, asperis; geniculatis declinatis. Desf. Coroll. Tourn. pag. 3. tab. 1.

4. ASPHODÈLE rameux. *Asphodelus ramosus*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 241. fig. 1 & 2. — Gztn. tab. 17.

5. *Asphodelus (albus), caule nudo, simplici; pedunculis confertis, longitudine bractearum; foliis linearibus, carinatis, levibus*. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 133.

La variété 5 est, d'après Willdenow, une espèce distincte, qui diffère de l'*asphodelus* rameux par ses tiges constamment simples, par les feuilles beaucoup plus étroites, par les bractées de la longueur des pédoncules; enfin, par ses fleurs plus petites, beaucoup plus rapprochées. Elle croît dans les mêmes lieux.

6. ASPHODÈLE sans tige. *Asphodelus acaulis*. Desfont.

Asphodelus caule nullo, foliis subulato-triquetris; pedicellis fructiferis, reflexis. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 302. tab. 89.

Cette plante a des racines longues, épaisses, fusiformes, garnies de quelques fibres; elles produisent un grand nombre de feuilles ramassées en gazon, glabres, étroites, subulées, triangulaires, légèrement siliées, dilatées & membracées à leur base. De leur centre sortent plusieurs fleurs solitaires, médiocrement pédonculées, accompagnées de bractées blanchâtres, membracées, lancéolées, aiguës. La corolle est d'un rose-pâle, de la grandeur de celle de l'*asphodelus* jaune, à six découpures elliptiques, obtuses, traversées par une ligne plus fortement colorée; les étamines au nombre de six, trois plus courtes; les filaments ongiculés à leur base, connivens; le style plus long que les étamines, terminé par trois stigmates obtus. La capsule est ronde, réfléchie vers la terre sur son pédoncule.

Cette plante croît en Barbaïe, sur les montagnes de Sibia, où elle a été découverte par M. Desfontaines. (V. f.)

* *Asphodelus (altaicus), caule nudo, simplici; flaminibus corollâ dupli longioribus; foliis linearibus, canaliculatis*. Willd. Spec. Plant. 2. p. 134. — Pall. Ac. Petrop. 1779. pag. 260. tab. 10. * *Ad radices monium altaicorum*.

* *Aphodelus* (liburnicus), *caule simpliciter*, *basi folioso*; *corolla cernua*, *monopetalis*; *foliis setaceis*. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 134. — Scop. Carn. n.º. 411. tab. 12.

Observations. L'ASPHODELE d'Afrique, n.º. 3, paroît être la même plante que l'*albica abyssinica* Jacq. (Voyez ALBUCA, Suppl. n.º. 11.)

ASPHODELUS. (Voyez ASPHODELE.)

ASPIC : nom vulgaire & corrompu que l'on donne à l'ALPISTE de Canarie, n.º. 1 (*phalaris canariensis* Linn.). On donne encore le nom d'*aspic* ou de *spic* à une espèce de lavande (*lavandula spica* Linn.).

ASPIDIUM. Swartz, Filic. (Voyez POLYPODE.)

ASPIJIE. *Aspilia* Genre de plantes monocotylédones, de la famille des corymbifères, établi par M. du Petit-Thouars dans les *Genres nouveaux de l'île de Madagascar*, pag. 12; il comprend des herbes dont les tiges sont couchées, les feuilles opposées & sessiles, les fleurs solitaires & terminales. Elles ont pour caractère essentiel & générique :

1.º. Un calice commun, cylindrique, composé d'un double rang d'écaillés imbriquées; les extérieures au nombre de cinq, réfléchies en dehors.

2.º. Une corolle radiée; les demi-fleurs de la circonférence stériles, au nombre de cinq à six, jaunes, terminés par deux dents.

3.º. Cinq étamines synergènes.

4.º. Un ovaire oblong; des semences oblongues, comprimées, velues, élargies à leur sommet, couronnées par dix petites dents.

Le réceptacle est garni de pailettes lancéolées, colorées à leur sommet.

Ce genre a des rapports avec les *spilanthus*, les *bides*, les *oclypsa*; il en diffère par la couronne de ses semences.

ASPLENIUM. (Voyez DORADILLE.)

ASSA-FŒTIDA. Gomme-résine rousseâtre, remplie de grumeaux blanchâtres, âcre, amère, d'une odeur d'ail insupportable. (Voyez RÉSINE.) On lit dans Komper, qui a vu récolter cette substance, qu'au printemps les Persans abandonnent leurs villages, & se portent en masse sur les montagnes où croît en abondance la *stule* qui la produit; ils la débarrassent de ses feuilles inférieures, qui sont finies, & mettent à nu la partie supérieure de la racine, dont la grosseur égale celle du bras. Après cette opération préliminaire, ils reviennent au bout de quarante jours, & coupent transversalement le sommet de la racine. Un suc

laiteux couvre bientôt la blessure. On le recueille : on fait une autre section transversale : on recueille de nouveau le suc qui a coulé, & on continue ainsi jusqu'à ce que la racine soit épuisée. Le suc prend au soleil une consistance solide. Les Européens & les Asiatiques sont différemment affectés par l'odeur & par la saveur de cette substance. Les premiers trouvent l'une & l'autre si repoussantes, qu'ils lui ont donné le nom vulgaire de *stercus diaboli*. Les Asiatiques, au contraire, qui la connoissent sous le nom de *king*, la trouvent si fort à leur gré & la mangent avec tant de plaisir pour aiguïser leur appétit, qu'ils lui donnent, par excellence, le nom de *manger des dieux*. On lit dans l'*Histoire générale des voyages* (vol. 9, pag. 44), que son usage à Surate est si général, que l'ait en est infecté. (Voyez Dict. des Sciences naturelles.)

ASSILIS. C'est, d'après Dalechamp, le nom que donnent les Arabes à une plante qui paroît être le *selinum* *vestre* Linn.

ASSIMINIER : nom vulgaire que porte, dans quelques contrées, l'*anona triloba* Linn. (Voyez COROSOLE.)

ASSONE à feuilles de peuplier. *Affonia populi-folia*. Cavan.

Affonia foliis ovato-lanceolatis, glabris; corymbis trifido. (N.) Cavan. Dissert. 3. pag. 120. tab. 42. fig. 1.

Vulgairement bois de senteur bleu ou galeux.

Genre de plantes établi par Cavanilles, de la famille des malvacées, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice double; l'extérieur latéral, d'une seule pièce, en forme d'une bractée à trois pointes; cinq pétales; vingt étamines, dont cinq stériles; cinq styles; cinq capsules adhérentes entre elles, à une seule loge, à deux semences.

Arbrisseau qui s'élève droit sur un tronc revêtu d'une écorce cendrée. Son bois est très-odorant, & de couleur bleue dans l'intérieur, acquerant, avec l'âge, une très-grande dureté. Ses feuilles sont grandes, éparées, longuement pétioolées, alternes, ovales-lancéolées, échancrées en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, d'un vert foncé, un peu crénelées à leurs bords, veinées, presque à trois nervures, prolongées en pointe à leur sommet, assez semblables à celles du *populus balsamifera*. Les fleurs sont blanches, & deviennent d'un jaune de rouille en viciéissant; elles sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe axillaire, longuement pédonculé; le pédoncule partagé en deux branches.

Le calice est double; l'extérieur d'une seule

pitée, en forme d'une bractée latérale, à trois lobes; l'intérieur à cinq divisions profondes. La corolle est composée de cinq pétales obliques, courbés en faucille; les étamines au nombre de vingt, dont cinq stériles, qui séparent, par leur filament plus allongé, les quinze fertiles de trois en trois, toutes réunies à leur base en un petit godet. L'ovaire est pubescent, surmonté de cinq styles, terminés par cinq stigmates: il leur succède un fruit globuleux, ombilique, composé de cinq capsules conniventes, à une seule loge, contenant deux semences.

Cette plante croît dans les forêts, à l'île Bourbon. h (V. f.)

ASSOUROU: nom caraïbe d'un myrte des Antilles, appelé aussi *poivre de la Jamaïque*, dont les feuilles ont un goût épicé & peuvent entrer dans les assaisonnemens. Il est figuré dans Sloane (tab. 91, fig. 1), que Linné rapporte à son *Myrtus pimenta*. (Voyez ce sujet nos observations à l'article MYRTE à feuilles de citronnier, n°. 11.)

ASSY: nom que porte à Madagascar le *dracaena umbraulifera* Jacq. (Voyez DRAGONIER, Suppl.) M. Rochon, qui en fait un palmier, dit qu'il s'élève à la hauteur de dix pieds; que sa tige est couronnée de feuilles semblables à celles du lis, longues de quatre ou cinq pieds, & disposées en parafol. On le nomme aussi *haffing bé*. Cette dernière syllabe signifie *grand*. (Juss.)

ASTÈRE. *Aster*. Ce genre, aujourd'hui si nombreux en espèces, étoit, chez les Anciens, borné presque à une seule, qui est notre *aster amellus*. Dioscoride est le premier qui en ait parlé d'une manière assez détaillée pour qu'on puisse la reconnaître; elle porte le nom grec d'*aster atticus*. Virgile l'a mentionnée, dans ses *Georgiques*, sous le nom d'*amellus*, que Linné lui a conservé.

Est etiam flos in prunis, cui nomen amello.

Quelques autres plantes européennes ont été successivement réunies aux astères; mais aucune contrée de la Terre ne nous en a fourni autant que l'Amérique septentrionale. Nos parterres en sont décorés; mais celle qui y figure avec le plus d'éclat est l'*aster chinensis*, vulgairement *reine-marguerite*. On soupçonne que nous en sommes redevables aux missionnaires de la Chine. Dillen est le premier qui l'ait décrite & figurée dans son *Hortus elthamensis*. On croit qu'elle a existé au Jardin des Plantes de Paris dès l'an 1728. (Voyez l'historique qu'en a donné M. Thouin dans le *Dictionnaire d'agriculture de l'Encyclopédie méthodique*, vol. I, pag. 710 & 711, au mot **ASTER**.)

• *Tige ligneuse.*

1. **ASTÈRE** à feuilles d'if. *Aster taxifolius*. Linn.

Aster (muricatus), *foliis linearifoliformibus, scabris, pilosis; calicibus subaequalibus, caule fruticoso*. Thunb. Prodr. 159.

2. **ASTÈRE** imbriqué. *Aster reflexus*. Linn. —

Andr. w. Botan. Repof. 2. pag. 93. tab. 93. — Thunb. Prodr. 160.

3. **ASTÈRE** chevelu. *Aster crinitus*. Linn. —

Thunb. Prodr. 160.

4. **ASTER** fruticuleux. *Aster fruticosus*. Linn.

— Jacq. Fragn. botan. pag. 9. tab. 5. fig. 4. — Thunb. Prodr. 159.

5. **ASTÈRE** tomenteux. *Aster tomentosus*. Willd.

Aster fruticosus, foliis ovatis, serratis, patentibus, subtus tomentosis; floribus terminalibus, subternis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2015. — Schrad. & Wendl. Sert. Flanov. pag. 8. tab. 24.

Aster (dentatus), *caule fruticoso; foliis dentatis, subtus ferrugineis; floribus terminalibus; pedunculis unifloris, bracteatis*. Andrew. Botan. Repof. 1. pag. 8. tab. 61.

Olearia dentata. Mœnch. Meth. Suppl. p. 354.

Petit arbruste haut d'un pied ou d'un pied & demi au plus, garni de rameaux tomenteux, étalés. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, longues d'un pouce, rudes & vertes en dessus, tomenteuses & d'un blanc un peu jaunâtre en dessous, à dentelures écartées, au nombre de trois ou quatre de chaque côté. Les pédoncules sont terminaux, solitaires ou deux à trois réunis, uniflores, tomenteux, un peu épaissis sous la fleur. Le calice est composé d'écaillés oblongues, hérissées, imbriquées, très-fertées; les demi-fleurs de la circonférence blancs ou un peu rougeâtres; l'algrette des semences plumeuse; les filets connivens à leur base.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. h (V. v.)

6. **ASTÈRE** satiné. *Aster sericeus*. Vent.

Aster caulibus procumbentibus; foliis ovato-lanceolatis, sericeis; ramis unifloris. Vent. Hort. Cels. pag. 33. tab. 33.

Aster fruticosus, foliis oblongo-lanceolatis, sessilibus, integerrimis, trinerviis, sericeo-tomentosis; floribus terminalibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2016.

Aster argenteus. Mich. Flor. boreal. Amet. 2. pag. 111.

Espèce très-remarquable par ses feuilles foyeuses & argentées. Ses tiges sont très-rameuses, touffues, grêles, pilantes; les rameaux pubescens, presque filiformes; les feuilles alternes, sessiles, ovales-lancéolées, très-entières, à trois nervures peu sensibles, longues d'environ un pouce, mucronées à leur sommet. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux, formant, par leur ensemble, une ample panicule; radiées, de couleur violette à la circonférence, d'un jaune-pâle à leur disque; le calice composé de folioles foyeuses; les extérieures, semblables aux feuilles; les intérieures plus étroites, recourbées vers leur sommet. Les semences sont glabres, ovales-oblongues, striées, surmontées d'une aigrette brune, presque simple.

Cette plante croît au pays des Illinois, dans l'Amérique septentrionale, où elle a été découverte par Michaux. h (V. v.)

7. ASTÈRE à feuilles de cymbalaire. *Aster cymbalaria*. Ait.

Aster fruticosus, foliis petiolatis, subrotundovatis, hirtis, utrinque uni vel bidentatis; pedunculis unifloris, elongatis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1016.

Aster fruticosus, foliis ovatis, sinuatis, hirtis; calicibus imbricatis, hirtis. Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 197.

Aster foliis cordato-ovatis, dentatis; caule herbaceo. t Thunb. Prodr. 160.

Ses tiges sont médiocrement ligneuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, un peu arrondies, presque en cœur, longues d'environ trois lignes, hérissées de poils roides, entières, sinuées, quelquefois munies d'une ou de deux dents profondes. Les fleurs sont blanches, petites, solitaires à l'extrémité des rameaux, portées sur de longs pédoncules simples; les calices composés d'écaillés hérissées, imbriquées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

8. ASTÈRE de la Caroline. *Aster carolinianus*. Walth.

Aster fruticosus, foliis oblongis, integerrimis, utrinque attenuatis; calicinis squamis laciniatis, squarrosis; ramulis pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1017.

Aster caule frutescente, subsicante, ramossissimo; foliis amplexantibus, sessilibus, ovali lanceolatis, integris; ramulis summitate paucifloris, calicibus squarrosis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 111. — Walth. Flor. carol. pag. 208.

Cette espèce a des tiges ligneuses, presque grimpantes, très-rameuses; les rameaux pubes-

cens, principalement dans leur jeunesse; les feuilles alternes, sessiles, presque amplexicaules, ovales-lancéolées, très-entières, longues d'un demi-pouce & plus, un peu rudes à leurs bords, un peu rétrécies à leur base, aiguës & mucronées à leur sommet. Les fleurs sont peu nombreuses, situées dans l'aisselle des feuilles, vers le sommet des rameaux; les pédoncules uniflores. Le calice est oblong, composé d'écaillés lancéolées, imbriquées, scarieuses; les inférieures réfléchies en dehors; les demi-flurons assez grands, de couleur de chair; les flurons du centre d'un jaune-pourpre.

Cette plante croît aux lieux humides, à la Caroline. h (V. f.)

9. ASTÈRE à feuilles étroites. *Aster angustifolius*. Jacq.

Aster fruticosus, foliis linearibus, acutis, impunctatis, subincanis; pedunculis terminalibus, foliariis, unifloris, elongatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1017.

Aster fruticulosus, foliis linearibus, impunctatis, subincanis; pedunculis unifloris, nudis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 370.

Arbuste dont les tiges sont rameuses, garnies de feuilles alternes, lineaires, très-étroites, glabres ou blanchâtres, point ponctuées, très-entières, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont d'un bleu-pâle, situées à l'extrémité des rameaux, sur un très-long pédoncule solitaire, uniflore.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

10. ASTÈRE à feuilles obtuses. *Aster obtusatus*. Thunb.

Aster fruticosus, foliis linearibus, carnosae, glabris, punctatis, obtusis; pedunculis unifloris; calicibus imbricatis, disco brevioribus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1018. — Thunb. Prodr. 159.

Elle se rapproche de la précédente, ainsi que de l'*aster fruticosus*; elle diffère de toutes deux par ses feuilles charnues, beaucoup plus courtes; de la première par ces mêmes feuilles, obtuses à leur sommet, glabres, ponctuées. Les pédoncules sont beaucoup plus courts, situés à l'extrémité des rameaux; les calices plus courts que les flurons du disque.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

11. ASTÈRE à aigrette rougeâtre. *Aster phlogopappus*. Labill.

Aster fruticosus, foliis oblongis, dentatis, subhispidis, junioribus supernè stellato-hispidis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 49. tab. 195.

Bel arbuste haut de huit à dix pieds, muni de rameaux striés, blanchâtres, tomenteux; les feuilles alternes, à peine pétiolées, oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, finées ou profondément dentées, tomenteuses, blanchâtres ou d'un jaune-clair en dessous; les plus jeunes couvertes de poils roides, en étoiles. Les fleurs peu nombreuses sont disposées en un corymbe paniculé à l'extrémité des rameaux; les écailles calicinales imbriquées, à peine ouvertes, un peu obtuses, légèrement tomenteuses; les fleurons peu nombreux; les ovaires pileux, environ dix demi-fleurons violets, un peu réfléchis, à trois dents; les semences oblongues, elliptiques, un peu striées, couronnées par une aigrette pileuse, un peu rude, d'un rouge de feu et le réceptacle nu.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (*Descript. ex Labill.*)

12. ASTÈRE étoilé. *After stellatus*. Labill.

After fruticosus, foliis lanceolatis, serratis, subtus tomentosis, junioribus stellato-hispidis; floribus paniculato-corymbosis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 50. tab. 196.

Arbuste très-voisin du précédent, qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds. Ses tiges se divisent en rameaux striés, tomenteux, de couleur un peu roussâtre. Les feuilles sont médiocrement pétiolées, alternes, lancéolées, aiguës, à dentelures moins profondes que dans la précédente, un peu plus allongées, semblables pour le reste, ainsi que dans la disposition des feuilles; les demi-fleurons au nombre de quinze; les aigrettes point colorées.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (*Labill.*)

13. ASTÈRE à feuilles de myrte. *After myrsinoides*. Labill.

After fruticosus, foliis obovatis, margine reflexis, crenulatis, subtus tomentosis; corymbis subrisidis, radiis subternis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 53. tab. 202.

Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes de cinq à six pieds, garnies de feuilles sessiles, alternes, ovales, crénelées, réfléchies à leurs bords, couvertes en dessous d'un duvet tomenteux, cendré ou ferrugineux. Les fleurs sont disposées en petits corymbes terminaux, axillaires, composés d'environ trois fleurs; la corolle violette; les écailles calicinales glabres, entières, un peu aiguës; environ trois demi-fleurons linéaires, aigus. Les semences sont glabres, oblongues, striées, couronnées par une aigrette pileuse, luisante, d'un rouge de feu.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (*Labill.*)

14. ASTÈRE visqueux. *After viscosus*. Labill.

After fruticosus, foliis elliptico-oblongis, oppositis, subtus tomentosis; floribus corymbosis, radiis ternis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 53. tab. 203.

Arbuste de cinq à six pieds & plus, garni de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, elliptiques, rétrécies à leurs extrémités, blanchâtres, tomenteuses, presque sans nervures en dessous, visqueuses, luisantes en dessus. Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires & terminaux; les écailles calicinales tomenteuses & légèrement ciliées; trois ou quatre demi-fleurons, à peine soyeux en dessus, tridentés à leur sommet, de couleur violette; les semences ovales-oblongues, pileuses, striées, couronnées par une aigrette presque en massue.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (*Labill.*)

15. ASTÈRE d'un blanc-sale. *After argophyllus*. Labill.

After fruticosus, foliis ovato-lanceolatis, dentatis, subtus albo-ferricis; paniculis compoitis, axillaribus; radiis ternis. Labill. Nov. Holl. 2. p. 52. tab. 201.

Ses tiges, hautes de huit à neuf pieds, se divisent en rameaux tordus, tomenteux, légèrement striés. Les feuilles sont alternes, pétiolées, grandes, oblongues, elliptiques, longues de trois à cinq pouces, glabres en dessus, soyeuses & blanchâtres en dessous, à dentelures aiguës. Les fleurs forment des panicules axillaires, composées, nues, plus longues que les feuilles; les écailles calicinales à peine pileuses, légèrement imbriquées; trois ou quatre demi-fleurons très-entiers; cinq fleurons hermaphrodites; les poils de l'aigrette un peu en massue.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (*Labill.*)

16. ASTÈRE rameux. *After ramulosus*. Labill.

After foliis sparsis, linearibus, margine revolutis, subacuminatis; ramulis unifloris, radiis subobovatis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 50. tab. 196.

Arbuste très-rameux, haut de cinq à six pieds, garni de feuilles petites, courtes, linéaires, roulées à leurs bords, épaisses, presque acuminées, glabres à leur face supérieure, couvertes de petits points nombreux, légèrement tomenteuses en dessous. Les fleurs sont solitaires, à l'extrémité des rameaux; le calice composé d'écailles imbriquées, dentées & ciliées à leurs bords; les demi-fleurons environ au nombre de huit, tridentés à leur sommet, un peu réfléchis; les semences ovales & pileuses.

Cette

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (Labill.)

17. ASTÈRE à aiguillons. *Aster aculeatus*. Labill.

Aster fruticosus, foliis sparsis, linearibus, margine revoluta, superne aculeatis, subtus tomentosis; floribus racemosis paniculatis, radiis subquinis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 52. tab. 200.

Ses tiges sont ligneuses, très-rameuses, hautes de cinq à six pieds; les feuilles éparées, longues de trois lignes, étroites, linéaires, roulées à leurs bords, obtuses, hérissées de petits aiguillons à leur face supérieure, tomentueuses en dessous, de couleur cendrée ou ferrugineuse. Les fleurs sont en grappes paniculées, un peu épaissies; les écailles du calice glabres, imbriquées, un peu ciliées à leur sommet; cinq à six demi-fleurs échancrés à leur sommet; les semences glabres.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (Labill.)

18. ASTÈRE à feuilles mignonnes. *Aster lepidophyllus*. Pers.

Aster (microphyllus), fruticosus, foliis confertis, ovalibus, convexis, squamiformibus; subtus niveo-lanuginosis; ramulis unifloris, radiis subdonis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 51. tab. 199. — Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 442.

Arbuste de deux ou trois pieds, dont les rameaux sont couverts d'un duvet blanc & couché; les feuilles extrêmement petites, à peine longues d'un demi-ligne, convexes, elliptiques, réfléchies à leurs bords, glabres en dessus, lanugineuses, d'un blanc de neige en dessous, fasciculées, rabattues. Les fleurs sont terminales, solitaires; les écailles calicinales imbriquées, très-entières, en partie lanugineuses; les stigmates un peu en masse.

Cette plante croît sur les bords de la mer, au cap Van-Diemen. *h* (Labill.)

19. ASTÈRE glanduleux. *Aster glandulosus*. Labill.

Aster fruticosus, foliis linearibus, elongatis, crenato-glandulosus, pellucidis; floribus corymbosis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 50. tab. 196.

Ses tiges sont ligneuses, ériées, hautes de trois à quatre pouces, légèrement striées, divisées à leur partie supérieure en ramoux fleuris, formant un corymbe. Les feuilles sont éparées, linéaires, étroites, très-aiguës, munies vers leurs bords, de quelques glandes transparentes, sessiles, glabres à leurs deux faces, légèrement crénelées, longues d'environ trois pouces; les écailles calicinales imbriquées, dentées, ciliées; dix à vingt

Botanique, Supplément. Tome I.

demi-fleurs entiers, obtus; les semences ovales, pileuses.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (Descript. ex Labill.)

20. ASTÈRE à petites feuilles. *Aster microphyllus*. Vent.

Aster fruticosus, foliis sparsis, spatulatis, subtus ferrugineis; calicibus exsertis apice glandulosis. Vent. Hort. Malm. pag. 83.

Cette espèce est fort jolie: c'est un arbrisseau très-rameux, hérissé de poils courts & peu apparents. Ses feuilles sont éparées, en forme de spatule, glabres en dessus, recouvertes en dessous de petites écailles couleur de rouille, longues de deux ou trois lignes, sur une de large. Les fleurs sont solitaires au sommet des jeunes rameaux, & leurs demi-fleurs sont à peine dentées; les calices glanduleux à leur sommet.

Cette espèce a été recueillie dans le cours des voyages du capitaine Baudin. *h* (Descript. ex Vent.)

21. ASTÈRE filiforme. *Aster filifolius*. Vent.

Aster foliis linearifiliformibus, fasciculatis, glabris, punctatis; caule fruticose, ligulis integerrimis. Vent. Hort. Malm. pag. 8 & tab. 83.

Cette plante a de grands rapports avec l'*Aster fruticosus*; elle en diffère par ses feuilles presque filiformes, par la couleur blanche de ses demi-fleurs. Ses tiges sont droites, ligneuses, très-rameuses, de couleur brune; ses feuilles éparées, fasciculées, sessiles, dilatées & concaves à leur base, glabres, filiformes, d'un vert-gai, parsemées de points peu apparents, longues d'environ un pouce & demi. Les fleurs sont d'un blanc de lait à leur circonférence, d'un jaune-doré à leur centre, soutenues par des pédoncules simples, distans, filiformes, munis de deux ou trois bractées linéaires, serrées contre le pédoncule. Le calice est glabre, composé d'écailles droites, lancéolées, obtuses, membranées à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f.)

•• Tiges herbacées, à une ou deux fleurs; feuilles entières ou à peine denticulées.

22. ASTÈRE des Alpes, n°. 6. *Aster alpinus*. Linn.

7. *Aster (fugax), foliis lanceolatis, hirtis, scabris, integerrimis, planis; caule simplicissimo, erecto, unifloro.* Brot. Flor. lusit. t. pag. 383.

Cette plante ne paroît être qu'une variété de l'*Aster alpinus*. On la trouve en Portugal, où elle

Q q q

ne fleurit que dans le mois d'octobre, après les pluies d'automne. Ses tiges sont droites, très-simples, terminées par une seule fleur; les feuilles planes, lancéolées, très-entières, rudes au toucher, hérissées de poils courts.

23. ASTÈRE mignon. *Aster pulchellus*. Willd.

Aster caule unifloro; foliis integerrimis, radicalibus spatulatis; caulibus linearis-lanceolatis; calicinis squamis subaequalibus, linearibus, acuminatis. Willd. Spec. 3. pag. 2019.

Aster orientalis, minimus, flore saepe rubente. Tournef. Coroll. 36.

Cette espèce a de très-grands rapports avec l'*Aster alpinus*; elle en diffère en ce qu'elle est beaucoup plus petite; ses feuilles plus épaisses, à peine marquées de trois nervures; et les radicales en forme de spatule; les caulinaires linéaires-lancéolées. Ses tiges ne portent qu'une seule fleur. Le calice est composé d'écaillés linéaires, acuminées, hérissées de poils blancs; les demi-fleurs plus nombreux, trois fois plus étroits, d'un rouge-vif.

Cette plante croît dans l'Arménie. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

24. ASTÈRE soyeux. *Aster holosericeus*. Forst.

Aster herbaceus, foliis oblongo-lanceolatis, serratis, subius argenteo-sericeis; scapis unifloris, foliosis. Forst. Prodr. n.º 296. — Willd. Spec. Plant. 8. pag. 2019.

Ses tiges sont glabres, comprimées, striées, garnies de feuilles linéaires, éparfes, longues d'un pouce, très-entières, soyeuses & blanchâtes en dessous; les radicales oblongues-lancéolées, dentées en scie à leur contour, glabres en dessus, soyeuses & d'un blanc de neige en dessous, longues de cinq à six pouces. Les tiges ne portent qu'une seule fleur, grande, terminale; les écailles du calice scarieuses, lancéolées.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

25. ASTÈRE du Caucase. *Aster caucasicus*. Willd.

Aster caule unifloro; foliis ovatis, sessilibus, serratis, scabrisculis; calicinis squamis subaequalibus, linearibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2010.

Elle s'élève à la hauteur d'un pied, sur une tige droite, simple, rude au toucher, garnie de feuilles alternes, sessiles, ovales, longues d'un pouce & demi, vertes à leurs deux faces, un peu rudes, veinées, lâchement dentées en scie. Elle n'a qu'une seule fleur terminale. Le calice est composé d'écaillés presque toutes égales, linéaires, aiguës.

Cette plante croît sur le mont Caucase. ♀

26. ASTÈRE uniflore. *Aster uniflorus*. Mich.

Aster caulis simplicissimis, in pedunculum nudiflorum, uniflorum desinentibus; foliis lanceolatis, integerrimis; calicinis simplicissimis, subulatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 110.

Ses tiges sont très-simples; elles se terminent par un pédoncule presque nu, supportant une seule fleur. Les feuilles sont alternes, lancéolées, très-entières; les calices composés de folioles presque simples, subulées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, proche le lac Mistassin, dans les marais de Spaigne. (Mich.)

27. ASTÈRE biflore. *Aster biflorus*. Mich.

Aster caule subbifloro; foliis sessilibus, lanceolatis, serratis, scabris; calicinis squamis imbricatis, adpressis, ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2020.

Cette plante a des tiges droites, glabres, cylindriques, hautes de huit à dix pouces, légèrement cannelées par la base très-étroite & décurrenente des feuilles. Cell. s-ci sont sessiles, alternes, étroites, lancéolées, longues d'un pouce & plus, un peu rudes au toucher, finement dentées en scie. Les tiges se terminent par une, quelque-fois par deux fleurs pédonculées. Le calice est composé d'écaillés serrées, imbriquées, ovales-oblongues.

Cette plante croît au Canada. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

28. ASTÈRE de Magellan. *Aster magellanicus*. Lam. Ill. tab. 681. fig. 3.

Dans une note manuscrite de M. Vahl, que j'ai vue dans l'herbier de M. de Lamarck, cet auteur regardoit cette plante comme un *perdicium*, & la nommoit *perdicium latissoides*.

*** Tige herbacée, à plusieurs fleurs; feuilles très-entières.

29. ASTÈRE délicat, n.º 5. *Aster tenellus*. Linn. — Curris, Magaz. tab. 33. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 198.

30. ASTÈRE de l'Arrigon, n.º 7. *Aster arrigonensis*. Lam. Ill. Gen. tab. 331. fig. 5.

31. ASTÈRE des forêts. *Aster nemoralis*. Ait.

Aster foliis linearis-lanceolatis, basi attenuatis, encerviis, punctatis, scabrisculis; caulibus repens, ramis corymboso-fusigatis; ramulis filiformibus, unifloris; calicibus dissectis duplo brevioribus, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2021. — Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 198.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied & demi,

divisées, vers leur sommet, en corymbes filigés; les petits rameaux filiformes, terminés par une seule fleur. Les feuilles des tiges sont linéaires-lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, ponctuées, réfléchies, sans nervures sensibles, un peu rudes à leurs bords, longues d'un pouce & demi; celles des rameaux étalées, beaucoup plus étroites. Le calice est oblong, composé d'écailles imbriquées, d'abord serrées, puis lâches, en caène, lancéolées, un peu aiguës; le disque de la corolle jaunâtre, une fois plus long que le calice; les demi-fleurs de la circonférence au nombre de huit à dix, d'un bleu-pâle.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. *γ* (Willd.)

32. ASTÈRE à feuilles d'hysope, n°. 10. *Aster hyssopifolius*. Linn. — Ant. Horr. Kew. 3. p. 4022.

β. *Aster* (punctatus), *foliis linearibus, remotis, trinerviis, acuminatis, punctatis, margine scabris; ramulis corymbofo-suffigatis, divaricatis; radio subaequilobis; calicibus imbricatis, disco duplo brevioribus*. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 1022. — Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 113. tab. 109.

Aster (hyssopifolius), *foliis linearibus, integerrimis, scabris; pedunculis subnudis*. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 17. tab. 232.

La plante variée à 2 ses feuilles beaucoup plus rétrécies au sommet, étalées, & non droites &roides; les corymbes plus denses; les pédoncules plus longues, garnis de quelques feuilles. Les demi-fleurs sont au nombre de huit à dix. Elle croît dans la Hongrie; ce qui pourroit porter à croire qu'elle forme une espèce distincte.

33. ASTÈRE âcre, n°. 16. *Aster acris*. Linn.

34. ASTÈRE à feuilles de linéaire, n°. 11. *Aster linearifolius*. Linn.

35. ASTÈRE à feuilles de lin, n°. 14. *Aster linifolius*. Linn.

36. ASTÈRE à feuilles d'estragon. *Aster dracunculoides*. Lam. (Voyez l'espèce suivante.)

37. ASTÈRE verge d'or. *Aster solidagineus*. Mich.

Aster caule simpliciter; foliis linearibus-oblongeolatis, obtusiusculis, integris, trinerviis, margine asperis; corymbo suffigato; floribus sessilibus, aggregatis, albis, quinque-radiatis. Mich. Flot. boreal. Amer. 2. pag. 109.

Conyza linifolia. Linn.

Malgré les grands rapports de cette plante avec

l'*Aster dracunculoides* Lam., je doute qu'elle soit la même, ayant ses fleurs sessiles & aggrégées, tandis que, dans la plante de M. de Lamarck, cultivée au Jardin des Plantes de Paris, les fleurs sont pédonculées, en corymbe; les demi-fleurs d'un violet-pâle. A la vérité, tous les autres caractères indiqués par Michaux sont communs aux deux espèces, auxquelles ces deux auteurs rapportent également le *Conyza linifolia* de Linné.

38. ASTÈRE à rejetons. *Aster sarcocollus*. Mich.

Aster foliis longo-lanceolatis, glabrisculis; radiiculis spatulatis; corymbois raris; calicibus squamis linearibus-oblongis, obtusiusculis; radice repente; caule simpliciter, debili. (N.) Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 113.

Cette plante est peu élevée. Ses racines sont rampantes & produisent des rejetons; ses tiges faibles, tombantes, point rameuses, garnies de feuilles alternes, alongées, lancéolées, presque glabres; les racines en forme de spatule. Les fleurs sont terminales, peu nombreuses, disposées en corymbe; les écailles du calice linéaires, oblongues, presque obtuses.

Cette plante croît dans les forêts de la Caroline septentrionale, dans le comté de Burke. (Mich.)

39. ASTÈRE subulé. *Aster subulatus*. Mich.

Aster glaberrimus, parvislorus, caule paniculato, ramis multifloris; foliis linearibus-subulatis, integerrimis; calicibus cylindricis, ligulis radii minutis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 111.

Ses tiges sont très-glabres, ainsi que toutes les autres parties de cette plante, divisées en rameaux paniculés, garnies de feuilles alternes, linéaires, subulées, très-entières. Les fleurs sont petites, nombreuses; leur calice cylindrique; les demi-fleurs de la circonférence sont petites.

Cette plante croît dans la Pensilvanie & à la Caroline, aux lieux maritimes & marécageux. (Mich.)

40. ASTÈRE pileux. *Aster pilosus*.

Aster foliis linearibus-lanceolatis, integerrimis, albopilosis; caule tomofo, villosis; ramulis subsessilibus, unisporis; calicibus laxis, imbricatis; squamis lanceolatis, mucronatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1025.

Aster villosus. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 113.

Cette espèce a ses tiges divisées en rameaux nombreux, couverts de poils blanchâtres, étalés, sous-divisés en d'autres très-courts, recourbés, tournés la plupart du même côté, terminés par

une seule fleur. Les feuilles sont linéaires, lancéolées, aiguës, très-entières, pileuses, longues d'un pouce & demi ou de deux pouces. Les fleurs, par leur ensemble, offrent presque des grappes unilatérales. Leur calice est oblong, un peu globuleux, d'abord serré, puis lâche, pileux, lancéolé, mucroné.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au pays des Illinois. ♀

41. ASTÈRE feuillé. *Aster foliolosus*. Ait.

Aster foliis linearilanceolatis, utrinque attenuatis, integerrimis, acuminatis; caule pubescente, paniculato, erecto; ramis paucifloris, calicibus imbricatis; squamis linearibus, acutis, adpressis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 203. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 202.

Aster ericoides, meliloti agraria umbone. Dillen. Elth. 39. tab. 35. fig. 39.

Ses tiges sont droites, simples, pubescentes, paniculées à leur sommet, garnies de feuilles glabres, alternes, linéaires lancéolées, longues de deux pouces, très-entières, rudes à leurs bords, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base; celles des rameaux beaucoup plus courtes. Les fleurs sont paniculées, peu nombreuses sur les rameaux; les demi-fleurs blanches; les calices composés d'écaillés serrées, imbriquées, linéaires, aiguës.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

42. ASTÈRE à feuilles menues, n°. 13. *Aster tenuifolius*. Linn.

43. ASTÈRE en buisson, n°. 17. *Aster dumosus*. Linn.

Aster foliis linearibus, integerrimis, glabris, ramulorum brevissimis; ramis paniculatis; calicibus cylindricis, arctè imbricatis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 202.

a. *Idem*, radio pallide violaceo, caule pubescente. Ait. l. c.

β. *Idem*, radio albo, caule glabro. Ait. l. c.

Il y a de très-grands rapports entre cette espèce & la précédente. Celle-ci en diffère par ses feuilles linéaires, point hispides à leurs bords, plus courtes sur les tiges stériles, plus étroites sur celles qui portent des fleurs; les écaillés calicinales linéaires & serrées. On en distingue deux variétés. La première a des tiges pubescentes; les demi-fleurs d'un violet-pâle. La seconde a des tiges glabres; les demi-fleurs blancs.

44. ASTÈRE à feuilles de bruyère, n°. 18. *Aster ericoides*. Linn.

1. *Aster (multiflorus), foliis linearibus, integerrimis, glabrisculis; caule ramossissimo, diffuso, pubescente; ramulis secundis, calicibus imbricatis; squamis oblongis, squarrosis, acutis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 202. — Ait. Hort. Kew. 2. p. 203. — Dillen. Hort. Elth. pag. 40. tab. 36. fig. 40.

Cette variété est remarquable par ses tiges plus étalées, légèrement pubescentes, un peu rudes, ainsi que les feuilles; les petites rameaux tournés presque tous du même côté; les écaillés calicinales plus scarieuses. Elle est en général beaucoup plus grande, dans toutes ses parties, que l'*Aster ericoides* Linn.

45. ASTÈRE cilié. *Aster ciliatus*. Willd.

Aster foliis integerrimis, ciliatis; caulibus linearilanceolatis, nervosis; ramis brevissimis, lanceolatis, trinerviis; caule ramoso, pubescente; ramis paniculatis, calicibus imbricatis; squamis spatulatis, squarrosis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 203. — Mühlent. in Litt.

Elle a, dans son port, beaucoup de rapport avec l'espèce précédente. Ses tiges sont purpurines, pubescentes; les rameaux paniculés; les feuilles caulinaires presque amplicaulaires, linéaires, lancéolées, un peu aiguës, longues d'un pouce, munies à leurs bords de cils très-courts; celles des rameaux lancéolées, très-rapprochées, longues de six lignes, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires ou ternées à l'extrémité des rameaux; les écaillés calicinales scarieuses, spatulées, obtuses, ciliées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

46. ASTÈRE à feuilles de coris. *Aster coridifolius*. Mich.

Aster foliis linearibus, obtusis, reflexis, margine hispida; caule ramoso, diffuso, glabro; ramulis unifloris, calicibus imbricatis; squamis linearispatulatis, obtusis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 203. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 112.

Ses tiges sont glabres, purpurines, très-rameuses; les rameaux diffus, étalés, garnis de feuilles alternes, linéaires, très-entières, obtuses, réfléchies, longues d'environ six lignes, rudes à leurs bords; celles des rameaux beaucoup plus petites, plus nombreuses. Les fleurs sont petites, disposées en une panicule lâche, de couleur bleue, solitaires à l'extrémité de chaque rameau, formant une panicule lâche; les écaillés calicinales serrées, imbriquées, obtuses, spatulées; les intérieures mucronées.

Cette plante croît dans les forêts de la Basse-Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (*V. v.*)

47. ASTÈRE scabieux. *Aster squarrosus*. Walth.

Aster foliis ovatis, acuminatis, integerrimis, reflexis, margine hispida; caule ramoso, hirsuto; ramis unifloris, calicibus imbricatis; squamis linearibus, acutis, squarrosus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2018. — Walth. Flor. carol. p. 8. 109. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 5. 112.

Ses tiges sont purpurines, rameuses; les rameaux épars, étalés, très-lâches, éhiles, garnis de poils courts & toides, garnis de feuilles très-petites, à peine longues de six lignes, ovales, réfléchies, très-entières, feilées, hispides à leurs bords, acuminées à leur sommet; celles des jeunes rameaux plus petites. Les fleurs sont bleues, en panicules irrégulières, solitaires à l'extrémité de chaque rameau; les écailles calicinales scabieuses, lineaires, aiguës, presque cuneiformes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à la Caroline. ? (V. f.)

48. ASTÈRE d'une seule couleur, l.^{re}. 19. *Aster concolor*. Linn.

49. ASTÈRE à feuilles d'amandier, n^o. 14. *Aster amygdalinus*. Lam. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 109.

Aster (umbellatus), foliis lanceolatis, basi attenuatis, integerrimis, margine scobris; ramis corymbosis, fastigiatis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 199. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2030. — Hoffm. Phyt. pag. 74. tab. B. fig. 2.

50. ASTÈRE à tige rouge, n^o. 15. *Aster rubricaulis*. Lam.

51. *Aster (cyanus), foliis radicalibus spatulatis, obtusis; caulibus oblongis, integerrimis, subamplexicaulis; paniculis unifloris.* Hoffm. Phyt. pag. 71. tab. B. fig. 1.

51. ASTÈRE à haute tige. *Aster praetius*.

Aster (calicifolius), foliis linearibus lanceolatis, integerrimis, glabris; calicibus imbricatis, laxis; caule levi. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 203.

Cette plante paroît avoir de grands rapports avec la précédente. D'après Aiton, les tiges sont droites, lisses, hautes de cinq à six pieds; les feuilles glabres, alternes, linéaires-lanceolées, très-entières; les folioles calicinales imbricées, écartées à leur sommet, aiguës; les demi-fleurons d'un bleu-incarnat. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. ?

52. ASTÈRE de Pannonie. *Aster pannonicus*. Jacq.

Aster foliis linearibus lanceolatis, integerrimis, margine hispida; caule simpliciter, superne corymbosis,

glabro; calicibus squamis lanceolatis, obtusis, aequalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2031. — Jacq. Hort. 1. pag. 3. tab. 8.

Il a beaucoup de rapport avec l'*Aster crispulum*; il en diffère par ses feuilles plus longues, plus étroites, très-entières, même les inférieures, longues de deux ou trois pouces, sans nervures sensibles, hispides à leur base, glabres, ainsi que toutes les autres parties de cette plante. Les tiges sont simples, rameuses à leur sommet; les fleurs disposées en un corymbe terminal; les demi-fleurons d'un rouge-violet; les écailles calicinales toutes égales, lanceolées, obtuses.

Cette plante croît en Hongrie, dans les terrains marécageux. ?

53. ASTÈRE amelle, n^o. 8. *Aster amellus*. Linn.

54. ASTÈRE roide, n^o. 12. *Aster rigidus*. Linn. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 110.

Ses tiges sont basses, très-simples; les feuilles toides, ciliées à leurs bords; les fleurs peu nombreuses.

55. ASTÈRE géant, n^o. 20. *Aster Nova-Angliae*. Linn. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 113. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 101.

56. ASTÈRE amplexicaule, n^o. 21. *Aster amplexicaulis*. Lam.

Aster (spurius), foliis lanceolatis, amplexicaulis, integerrimis, basi auriculatis; caule paniculato, piloso; ramis subunifloris; calicibus squamis laxis, lanceolatis, discum aequantibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2033.

Aster Nova-Angliae, var. 1. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 201.

La description que donne Willdencw à son *Aster spurius* me paroît convenir parfaitement à l'*Aster amplexicaule* Lam.; ce qui m'a déterminé à les rapprocher.

57. ASTÈRE blanchâtre. *Aster conus*. Waldst.

Aster foliis linearibus lanceolatis, integerrimis, trinerviis, utrinque pubescentibus, canis; ramis corymbosis, divaricatis; calicibus disco amplè brevioribus, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2023.

Aster foliis lanceolatis, integerrimis, trinerviis, utrinque tomentosis; posculis radii abortientibus. Waldst. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 1. pag. 26. tab. 30.

Ses tiges sont droites, divisées en rameaux étalés & diffus, formant, par leur ensemble, une sorte de corymbe. Les feuilles sont alternes, linéaires-lanceolées, blanchâtres & pubescentes à

leurs deux faces, entières à leurs bords, marquées de trois nervures longituinales; les fleurs étalées en corymbe; les calices imbriqués, une fois plus courts que les fleurons du disque.

Cette plante croît dans la Hongrie. ✕

68. ASTÈRE des marais. *Aster paludifolius*. Ait.

Aster foliis linearibus, amplexicaulis, erectis, integerrimis, glaucerrimis, margine scabris; pedunculis fere natis, calicibus squarrosis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 201.

Cette espèce a des tiges droites, rameuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, linéaires, glabres à leurs deux faces, très-entières, rudes à leurs bords, longues de trois à quatre pouces, larges de deux ou trois lignes, distantes entr'elles. Les pédoncules sont simples, presque nus, quelquefois munis, un peu au dessous du calice, de deux petites folioles. Les demi-fleurons de la circonférence sont bleus, assez grands; les fleurons du disque jaunâtres; les écailles calicinales scarieuses.

Cette plante croît dans les marais, à la Caroline. ✕

59. ASTÈRE à grandes fleurs, n°. 23. *Aster grandiflorus*. Linn. — Hoffm. Phyt. pag. 55. tab. A. fig. 1.

60. ASTÈRE à feuilles rouges. *Aster phlogifolius*. Willd.

Aster foliis lanceolatis, integerrimis, cordatis, amplexicaulis, subtus pubescentibus; caule simplicissimo, pubescente; apice paniculato; calicinis squamis laxis, imbricatis, lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2034.

An ? aster (amplexicaulis), foliis quasi perforato-amplexicaulis, subcordato-oblongis, infero-natis angustatis, integris; panicula laxa, rariiflora. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 114.

Cette plante a l'aspect & la forme des feuilles du *phlox paniculata*. Ses tiges sont simples, cylindriques, purpurines, pubescentes, hautes d'un pied, paniculées à leur sommet; les feuilles alternes, lancéolées, très-entières, longues de deux pouces, amplexicaules, profondément échanquées en cœur à leur base, rétrociées & aiguës à leur sommet, glabres en dessus, rouges ou traversées par des veines rougeâtres & pubescentes en dessous, rudes à leurs bords. Les fleurs sont disposées en une panicule simple, longue d'environ quatre pouces; les ramifications feuillées, chargées de deux à cinq fleurs; les écailles calicinales rudes, lâches, lancéolées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ✕

61. ASTÈRE étalé. *Aster patens*. Ait.

Aster foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis, ciliatis, cordatis, amplexicaulis, utrinque pifosis; caule ramoso, hirsuto; ramis patentibus, elongatis, paucifloris; calicinis squamis imbricatis, lanceolatis, parvis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2034. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 201.

Ses tiges sont hérissées, hautes de trois pieds; les rameaux étalés, diffus, pubescens, longues; les feuilles alternes, oblongues-lancéolées, amplexicaules, échanquées en cœur, très-entières, pileuses à leurs deux faces, obliquement réfléchies à leur base; les supérieures fort petites, presque imbriquées. Les fleurs sont peu nombreuses sur les rameaux; les écailles calicinales imbriquées, lancéolées, étalées; les demi-fleurons d'un bleu-clair; les fleurons jaunâtres.

Cette plante croît dans la Virginie & la Pensilvanie. ✕

62. ASTÈRE à tige basse. *Aster humilis*. Willd.

Aster foliis ovatis, acutis, integerrimis, petiolatis, glabris, margine hispidis; floribus corymbosis; calicinis laxis, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2038.

Ses tiges sont droites, simples, hautes d'un demi-pied, quelquefois d'un pied, glabres, un peu flexueuses; les feuilles pétiolées, oblongues ovales, rétrécies à leurs deux extrémités, très-entières, glabres à leurs deux faces, hispides à leurs bords, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi; les supérieures oblongues-lancéolées; les pétioles courts. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, peu garni; les écailles calicinales lancéolées, lâchement imbriquées; les demi-fleurons de couleur blanche.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. ✕ (*Descript. ex Willd.*)

63. ASTÈRE à feuilles de cornouiller. *Aster cornifolius*. Willd.

Aster foliis oblongo-ovatis, acuminatis, integerrimis, petiolatis, glabris, margine scabris; caule glabro, panicula pauciflora, calicibus subimbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2039 — Mühlenb. in Litt.

Elle a des tiges droites & glabres, des feuilles médiocrement pétiolées, oblongues, ovales, rétrécies à leur base, fortement acuminées à leur sommet, glabres, très-entières, longues de trois pouces, assez semblables à celles du cornouiller sanguin, légèrement pileuses en dessous sur leur principale nervure, rudes à leurs bords; les supérieures oblongues-lancéolées. La panicule est simple, peu garnie, n'ayant que deux fleurs sur chaque

rameux; les écailles calicinales oblongues, lancéolées; les extérieures un peu plus courtes.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. (Descript. ex Willd.)

*** Tige herbacée; feuilles dentées; les supérieures souvent entières.

64. ASTÈRE ondulé, n°. 22. *Aster undulatus*. Linn. — Hoffm. Phyt. pag. 77. tab. C. fig. 1.

65. ASTÈRE à feuilles variables. *Aster diversifolius*. Michx.

After caule aspero, rubente; foliis subintegris, undulatis, inferioribus alato-petiolatis, cordato-ovalibus, superioribus sessilibus, ovali-lanceolatis; panicula laxa; ramis gracilibus, microphyllis. Michx. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 113.

Cette plante se rapproche beaucoup de la précédente, mais ses feuilles ne sont point velues en dessous. Ses tiges sont droites, simples, cylindriques, rudes, pubescentes, lâchement paniculées à leur sommet par des rameaux grêles & courts. Les feuilles sont alternes, presque entières ou légèrement ondulées à leurs bords, ovales, en cœur, un peu épaisses, rudes à leurs deux faces, longues d'un pouce & plus, aiguës à leur sommet; les inférieures décurrentes sur un pétiole court; les supérieures sessiles, un peu lancéolées; celles des rameaux très-petites. Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, pédoncules simples, plus longs que les fleurs, munis de quelques petites folioles; les écailles du calice scarieuses, verdâtres dans leur milieu, étroites, un peu obtuses; les demi-fleurons d'un bien pâle.

Cette plante croît à la Caroline. (V. f.)

66. ASTÈRE à feuilles sagittées. *Aster sagittifolius*. Willd.

After foliis oblongo-lanceolatis, sessilibus, medio serratis; radicalibus oblongis, cordato-sagittatis, serratis; petiolatis; caule ramoso, glabro; calicibus laxis, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2035. — Wedemeyer.

Ses tiges sont droites, glabres, très-rameuses, hautes de deux ou trois pieds. Les feuilles radicales sont oblongues, pétiolées, parfaitement semblables à celles du *ramex acris*, inégalement dentées en scie, échancrées en cœur & sagittées à leur base, glabres, longues d'un pouce & plus; les caulinaires inférieures oblongues, ovales, acuminées, à grosses dentelures décurrentes sur leur pétiole; les supérieures sessiles, oblongues-lancéolées, acuminées, dentées en scie vers leur milieu; les dernières très-entières. Les fleurs sont bleues; leur pédoncule muni de bractées; les écailles du calice lâchement imbriquées, lancéolées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (Descript. ex Willd.)

67. ASTÈRE paniculé. *Aster paniculatus*. Aiton. Non Lam.

After foliis ovato-lanceolatis, subserratis, petiolatis; glabris; radicalibus ovato-cordatis, serratis, scabris; petiolatis; petiolis nudis; caule ramosissimo, glabro; ramulis pilosis; calicibus laxis, subimbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2035.

After foliis glabris, acutis, serratis, petiolatis; radicalibus cordatis, caulinis ovatis; supremis lanceolatis, integris; ramis paniculatis, calicibus laxis subimbricatis; caule glabro. Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 207.

After latifolius, glaber, humilis, ramosissimus, flore parvo, cauleto; foliis ad basin cordatis. Moirif. Hist. 3. pag. 121. §. 7. tab. 22. fig. 34.

Asterifolius latifolius, autumnalis. Cornuti, Canad. pag. 64. tab. 65.

Cette espèce, très-semblable à l'*after cordifolius* par son port & par ses principaux caractères, avec lequel on l'a confondu, en diffère sous plusieurs rapports. Ses tiges sont glabres, très-rameuses; les jeunes rameaux pileux; les feuilles radicales pétiolées, point décurrentes, ovales, en cœur, dentées en scie, rudes au toucher; les caulinaires pétiolées, ovales-lancéolées, glabres, à peine dentées ou très-entières; les celles des rameaux sessiles, lancéolées, très-entières; les écailles calicinales lâchement imbriquées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (V. f.)

68. ASTÈRE à feuilles en cœur, n°. 38. *Aster cordifolius*. Linn. (Exel. synonym. Cornu. & Moirif.)

After foliis cordatis, subhis pilosis, argute serratis, petiolatis; petiolis alatis; caule paniculato, piloso; calicibus laxis, subimbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2036. — Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 207.

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges moins glabres, par ses feuilles un peu pileuses en dessous, presque routes dentelées; par ses pétioles ailes, par ses tiges bien moins rameuses, caractères qu'on ne retrouve pas toujours constamment dans les plantes cultivées; ce qui me ferait soupçonner que l'on a présenté comme espèces deux plantes qui ne sont peut-être que variété l'une de l'autre.

69. ASTÈRE à corymbes. *Aster corymbosus*. Ait.

After foliis argute serratis, acuminatis; inferioribus cordatis, petiolatis, nudis; caule superne corymboso-sustingito, ramis pilosis; calicibus oblongis,

imbricatis; *squamis arête adpressis*. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2036. — Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 207.

Ce que j'ai dit plus haut en traitant de l'espèce précédente, peut également s'appliquer à celle-ci. Les caractères d'après lesquels on les distingue, ne font peut-être que l'effet de la culture. Ses tiges sont glabres, verdâtres ou purpurines, divisées, à leur partie supérieure, en rameaux pileux, réunis en un corymbe fastigié. Ses feuilles intérieures sont glabres, pétioles, en cœur, dentées en scie, point décurrentes, quelquefois un peu pileuses sur leurs nervures; les supérieures pétioles, aiguës, finement dentées; les dernières presque sessiles, à peine dentées. Le calice est oblong, composé d'écaillés serrées, imbriquées, lanceolées, obtuses; les demi-fleurons de couleur blanche.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

70. ASTÈRE à grandes feuilles, n°. 37. *Aster macrophyllus*. Linn.

71. ASTÈRE de la Chine, n°. 44. *Aster chinensis*. Linn.

72. ASTÈRE maritime, n°. 9. *Aster tripolium*. Linn. — Engl. Botan. tab. 87. — Flor. dan. tab. 615.

Les feuilles inférieures sont quelquefois légèrement dentées vers leur sommet.

73. ASTÈRE annuel, n°. 43. *Aster annuus*. Linn.

Cette espèce, par ses demi-fleurons linéaires, entiers, très-étroits, appartient plutôt aux *érigeron* qu'aux *aster*.

74. ASTÈRE de Hongrie. *Aster hungaricus*.

Aster (salignus), *foliis lineari-lanceolatis, sessilibus, integerrimis, margine scabris; inferioribus lanceolatis, apice serratis; caule paniculato, glabro, erecto; calicibus laxi imbricatis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2040.

Aster (salicifolius), *foliis lanceolatis, serratis, margine scabris; ramis sublinearibus, integerrimis; pedunculis alternis, subnullis*. Scholl. Suppl. Flor. barb. pag. 318. Icon. — Hoffm. Germ. 297. — Roth, Germ. I, pag. 367, & II, pag. 352.

Ses tiges sont droites, glabres, divisées en rameaux paniculés, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires-lanceolées, rudes à leurs bords, glabres à leurs deux faces; les supérieures très-entières; les inférieures lanceolées, dentées en scie vers leur sommet. Les fleurs, disposées en panicule, ont leurs demi-fleurons blancs; ils prennent,

en vieillissant, une teinte bleuâtre. Les écaillés calicinales sont lâchement imbriquées.

Cette plante croît en Allemagne & dans la Hongrie. ♀

75. ASTÈRE luisant, n°. 29. *Aster amarus*. Lam.

« *Aster* (puniceus), *foliis semi-amplexicaulis, lanceolatis, serratis, scabris; pedunculis alternis, subnullis; calicibus discum superantibus*. Linn. Spec. pag. 1225. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 208. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 115.

Aster americanus, latifolius, puniceis caulis. Herm. Lugd.-Bat. 649. tab. 651. — Morif. Hist. 3. pag. 120.

« *Aster hispidus*. Lam. n°. 29.

Cette plante varie dans la couleur & dans l'élévation de ses tiges, qui s'élèvent depuis deux pieds jusqu'à sept, elles sont rougeâtres ou purpurines; les feuilles sont ordinairement plus larges dans la variété «, plus étroites dans la variété «. On rencontre des intermédiaires qui prouvent que ces deux plantes ne peuvent appartenir qu'à la même espèce.

76. ASTÈRE paniculé. *Aster paniculatus*. Lam.

Aster Novi-Belgii. Linn. (Non *Aster Traescentii*.)

Aster (flexuosus), *foliis subamplexicaulis, lanceolatis, inferioribus serratis; caule glabro, ramis corymbosis, ramulis pilosis; calicibus squamis laxis, lanceolatis, imbricatis*. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2048.

Cet astère, par la hauteur de ses tiges, le nombre & la beauté de ses fleurs d'un bleu vif, est devenu très-commun dans nos parterres. La plante se diffère de celle-ci par ses rameaux pileux & par ses fleurs plus nombreuses.

ASTÈRE pubescent. *Aster pubescens*. Lam.

Aster (tataricus), *foliis radicalibus lanceolato-ovatis, serratis, scabris; caule paucifloro*. Linn. f. Suppl. pag. 373.

ASTÈRE de l'Inde. *Aster indicus*. Linn.

Aster *foliis cauliculis oblongis, serratis; ramis lineari-lanceolatis, obtusis, subintegerrimis; caule hirsuto, ramis unijloris, calicibus squamis exterioribus foliaceis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2041.

Aster (indicus), *foliis ovato-oblongis, serratis; floralibus ovali-lanceolatis, integerrimis; ramis unijloris*. Linn. Spec. pag. 1230.

Aster conyroides, India orientalis, ramifloro, caulibus sparsis. L. Pluken. Almag. 57. tab. 149. fig. 3. Mula.

Voici

Volci, d'après Willdenow, la description de cette plante, jusqu'alors peu connue. Ses riges sont droites, rudes, cannelées, hautes d'un pied, rameuses à la partie supérieure; les rameaux simples, unifiés, feuillés; les inférieurs beaucoup plus longs. Les feuilles des riges sont sessiles, oblongues, un peu obtuses, dentées en scie, longues d'un à deux pouces; celles des rameaux étroites, linéaires, lancéolées, sessiles, obovées, longues d'un demi-pouce ou d'un pouce; les inférieures dentées en scie; les supérieures très-entières. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux; les écailles calicinales imbriquées; les intérieures scarieuses, lancéolées; les extérieures de la même longueur, lancéolées, foliacées.

Cette plante croît en Chine & dans les Indes orientales. ○

77. ASTÈRE des Pyrénées. *Aster pyrenaeus*. Hort. Paris.

Aster caule hirsuto, simpliciter, supra corymbofo; foliis oblongo-lanceolatis, subscribis, subamplexicaulis, apice quatuor-quinquedentatis; involucri squamis linear-acuminatis, hirsutis. Decand. Synopl. pag. 280. n°. 3139.

Aster sibiricus. Lam. n°. 27. An Linn. ?

La description que M. de Lamarck donne de cette plante convient parfaitement à celle qui porte le nom d'*aster pyrenaeus* au Jardin des Plantes. Convient-elle également à la plante de Linné ?

78. ASTÈRE élégant. *Aster elegans*. Willd.

Aster foliis scabris, caulibus oblongo-lanceolatis, integerrimis, acutis; radicalibus petiolatis, oblongis, serratis; caule ramoso, corymbofo; calicinis squamis oblongo-cuneatis, obtusis, squarrosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2042.

« Cette espèce, dit Willdenow, a de grands rapports avec l'*aster amallus*; elle en diffère par ses feuilles caulinares aiguës; par les radicales dentées en scie, toutes rudes au toucher; par ses fleurs plus grandes, & par les écailles calicinales, scarieuses, cuneiformes, oblongues, obovées. Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. »

79. ASTÈRE hispide. *Aster hispidus*. Thunb.

Aster foliis oblongo-lanceolatis, scabris, ciliatis, subserratis infimis, ovatis, serratis; caule paniculato, hispido; ramulis unifloris; calicinis squamis oblongis, imbricatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2042.

Aster foliis infimis oblongis, crenatis, scabris; caulibus lanceolatis, integris, ciliatis; caule scabro. Thunb. Flor. jap. 315. — Banc. Icon. — Kœmpf. tab. 29.

Kiuzjo. Kœmpf. Amoen. 876.
Botanique. Supplément. Tome I.

Ses racines, d'après Thunberg, sont fibreuses & rameuses; les tiges droites, hispides, hautes d'un pied; les rameaux alternes, écartés, les feuilles inférieures ovales-oblongues, obtuses, distantes, dentées, ciliées à leurs bords, rudes au toucher; les supérieures & celles des rameaux entières, lancéolées, obtuses, insensiblement plus petites. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, formant une panicule par leur ensemble; les écailles du calice oblongues, imbriquées; les demi-fleurs blancs.

Cette plante croît au Japon. ✕ (*Descript. ex Thunb.*)

80. ASTÈRE à feuilles rudes. *Aster scaber*. Thunb.

Aster foliis oblongis, serratis, scobris; pedunculis paniculatis. Thunb. Flor. jap. pag. 316.

Ses riges sont droites, herbacées, cylindriques, striées, glabres, de couleur purpurine, hautes d'un pied & plus, divisées, à leur partie supérieure, en rameaux panicules. Les feuilles sont alternes, pétiolées, oblongues, glabres, dentées en scie, acuminées, étalées, vertes en dessus, plus pâles en dessous, hérissées, à leur face supérieure & à leurs bords, de poils roides; les inférieures longues de deux pouces; les supérieures insensiblement plus petites. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale; les pédoncules & les pédicelles dépourvus de feuilles; une bractée lancéolée à chaque pédicelle.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

81. ASTÈRE à fleurs de consif. *Aster conyzoides*. Willd.

Aster foliis oblongis, trinerviis, basi angustatis, acutis; superioribus sessilibus, subintegerrimis; inferioribus petiolatis, serratis; caule simpliciter, apice corymbofo; calicibus cylindricis, squarrosis; radio calice brevioris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2043.

Conyza (asteroides), *foliis lato-lanceolatis, corollis radiatis, calicibus squarrosis*. Linn. Spec. pag. 1206. — Lam. Dict. 2. pag. 94. *

Aster (marilandicus), *caule simpliciter; foliis ovato-lanceolatis, superne subserratis; summis integris, corymbo fastigiato*. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 108.

Aster marilandicus, formica capitis, flore albo, baillardi monspeliensis folio & effigie. Pluken. Mantiss. 29.

Cette plante présente, dans la forme de ses demi-fleurs très-courts, l'aspect d'une consif, genre dans lequel elle avoir d'abord été placée. Ses tiges sont simples, cylindriques, glabres, striées, hautes d'un pied, divisées, à leur partie supé-

R r r

rieure, en rameaux en corymbe. Les feuilles inférieures sont pétiolées, oblongues, à trois ou cinq nervures, glabres, légèrement dentées depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, rudes à leurs bords; les supérieures sessiles, oblongues, aiguës, à peine dentées, rétrécies à leur base. Les fleurs sont agglomérées & sessiles à l'extrémité des pédoncules. Leur calice est cylindrique, composé d'écaillés ovales, blanchâtres, vertes & réfléchies à leur sommet; la corolle jaune à son centre, blanche à sa circonférence; les demi-fleurons lancéolés, plus courts que le calice.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. χ

82. ASTÈRE divergent, n°. 28. *Aster divaricatus*. Linn.

Aster (infirmus), caule gracili, sulcatus; foliis subrhomboidis, ovali-lanceolatis, utrinque acumatis, integris; panicula divergenti-dichotoma, nudifida, pauciflora; floribus omnibus pedunculatis, albis, coloratis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 109.

81. ASTÈRE lisse. *Aster levigatus*. Lam. — *Aster levis* ? Linn.

Willdenow cite, sous le nom d'*Aster levigatus*, une plante qui paroit se rapprocher beaucoup de celle-ci, & qu'il dit être cultivée dans les jardins pour l'*Aster levis*, mais qui en est différente par ses panicules très rameuses, chargées d'un grand nombre de fleurs.

84. ASTÈRE à feuilles de préanthe. *Aster prenanthoides*. Willd.

Aster foliis amplexicaulibus, spatulato-lanceolatis, medio serratis, basi cordatis; ramulis pilosis; calicibus squamis lanceolatis, squarosis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2046. — Mühl. in Litt.

Ses rameaux sont chargés de poils sur deux lignes opposées, formées par la décurrence de la base des feuilles. Celles-ci sont alternes, amplexicaules, lancéolées, presque en spatule, longues de deux ou trois pouces, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur milieu, profondément échancrées en cœur; les écaillés calicinales lancéolées, scarieuses; les demi-fleurons de couleur bleue.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. χ (*Desf. ex Willd.*)

85. ASTÈRE de Pensilvanie. *Aster pensilvanicus*. *Aster* (amplexicaulis), foliis ovato-oblongis, acutis, amplexicaulis cordatis, serratis; caule paniculato, glabro; calicinis squamis lanceolatis, arcte imbricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2046. — Mühl. in Litt.

Ses tiges sont glabres, striées, divisées, à leur sommet, en rameaux paniculés; les feuilles alternes, amplexicaules, ovales-oblongues, aiguës, glabres à leurs deux faces, rudes à leurs bords, échancrées en cœur à leur base, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi; les feuilles des rameaux petites, lancéolées, amplexicaules. Les fleurs sont bleues, une ou deux sur chaque rameau; les écaillés calicinales lancéolées, fortement imbriquées.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. χ (*Desf. ex Willd.*)

86. ASTÈRE en osier. *Aster vimineus*. Lam.

Aster (tradescanti), foliis lanceolato-linearibus, medio serratis; pedunculis foliosis, caule racemoso, calicibus erectis. Linn. — Hort. Cliff. 408.

Aster (tradescanti), caule pubescente, ab imo ramoso; ramis gracilibus, virgatis, patulis, simplicibus, foliis racemosis; floribus parvis, subsessilibus; calicibus erectis; radiis brevibus, subulatis; foliis linearilanceolatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 115.

Ces deux plantes sont identiques, d'après l'observation de Michaux. L'*Aster multifidus* Linn. s'en rapproche beaucoup; mais nous ne la connoissons pas assez pour prononcer affirmativement.

87. ASTÈRE à feuilles longues, n°. 33. *Aster longifolius*. Lam.

88. ASTÈRE de couleurs variées. *Aster variegatus*. Willd.

Aster foliis subamplexicaulibus, lato-lanceolatis, subserratis; radiceibus medio serratis; caule ramossimo, glabro; calicinis squamis lanceolatis, luxis, aisco brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2045.

Cette espèce se distingue par ses grandes & belles fleurs agglomérées au sommet des rameaux, & qui changent de couleur à mesure qu'elles se développent. Leur circonférence est blanche, puis elle devient insensiblement d'un violet foncé, avec le disque jaune, ce qui offre, sur le même pied, des fleurs violettes & blanches. Les feuilles supérieures sont très entières; les inférieures munies de quelques dentelures; les radicales oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en scie à leur milieu; toutes les autres amplexicaules, élargies, lancéolées. Les tiges sont glabres, très-rameuses; les écaillés calicinales lâches, lancéolées, plus courtes que le disque.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. χ (*Desf. ex Willd.*)

89. ASTÈRE ramassé. *Aster strigosus*. Hort. Paris. *Aster* caule subglabro, strigoso, ramossimo; foliis

caulinis serratis, subamplexicaulibus, lanceolatis, submucronatis; ramis integris; squamis calicinis imbricatis, subqualibus, lanceolatis, acutis. (N.)

Ses tiges sont droites, striées, presque glabres, très-rameuses; les rameaux grêles, alternes, ratisés, droits, rapprochés des tiges, & formant une panicule peu étalée. Les feuilles sont glabres, alternes, sessiles, un peu amplexicaules, longues d'un à deux pouces, lancéolées; celles des tiges lâchement dentées en scie à leurs bords, très-aiguës, presque mucronées; celles des rameaux une fois plus petites, sessiles, très-entières, mucronées. Les fleurs sont nombreuses, paniculées, solitaires à l'extrémité d'un petit rameau très-court, feuillé. Leur calice est glabre, composé d'écaillés imbriquées, étroites, lancéolées, très-aiguës, à peine de la longueur des aigrettes; les demi-fleurs d'un bleu-tendré; les aigrettes cendrées, un peu roussâtres.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes, est originaire de l'Amérique septentrionale. ♀ (V. v.)

90. ASTÈRE à feuilles de saule, n°. 31. *Aster foliolifolius*. Lam.

Aster (recurvatus), foliis sessilibus, angustolanceolatis, basi attenuatis; inferioribus medio serratis; caule ramoso, glabro, recurvato; calicinis squamis laxis, subimbricatis. ? Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2047.

La plante de Willdenow me paroît très-rapprochée de l'altère à feuilles de saule. Voici d'ailleurs la description qu'il en donne. Les tiges sont glabres, très-rameuses, longues de trois pieds, rabattues vers la terre; les feuilles étroites, lancéolées, aiguës, rétrécies à leur base, rudes à leurs bords; les inférieures larges de trois pouces, munies d'une ou de deux dentelures à leur milieu; les supérieures très-entières, longues d'un pouce & demi; les fleurs de la grandeur de l'*Aster triflorus*; les écaillés calicinales linéaires lancéolées, lâches, aiguës, presque égales.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

91. ASTÈRE élégant. *Aster spectabilis*. Ait.

Aster foliis lanceolatis, scabrisculis; inferioribus serratis; ramis corymbosis; foliis calicinis laxis, foliolis subunciformibus, acutisculis, squarrosis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 209. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2048.

Ses tiges sont hautes de deux pieds; ses rameaux en forme de corymbe, munis d'une ligne pileuse, décurrense; les feuilles légèrement amplexicaules, un peu rudes, lancéolées, très-entières; les inférieures dentées à leur milieu. Les fleurs sont

grandes, de couleur bleue; les demi-fleurs linéaires-lancéolées; les écaillés du calice la plupart, peu serrées, scarieuses, un peu aiguës, rétrécies à leur base, presque cuneiformes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

92. ASTÈRE d'automne. *Aster serotinus*. Willd.

Aster foliis oblongo-lanceolatis, sessilibus, glabris, marginis scabris; inferioribus serratis; ramis corymbosis, glabris; ramulis unifloris; calicinis squamis lanceolatis, patentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2049.

Ses tiges sont hautes de quatre pieds, glabres, ramuscules, paniculées; les rameaux uniflores; les feuilles sessiles, glabres, oblongues, lancéolées, acuminées, rudes à leurs bords; les inférieures longues de deux pouces, dentées à leur milieu; les supérieures presque entières, longues d'un pouce. Les fleurs sont grandes & bleues; elles ne paroissent que vers la fin d'octobre; les folioles du calice lancéolées, acuminées, étalées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

93. ASTÈRE à fleurs tardives, n°. 41. *Aster tardiflorus*. Linn.

94. ASTÈRE effilé. *Aster junceus*. Ait.

Aster foliis lanceolato-linearibus, sessilibus, glabris; infimis subserratis, ramulorum lanceolatis; ramis vagatis, calicibus imbricatis, caule glabrisculis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 204. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2050.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de quatre à cinq pieds, paniculées; les rameaux munis d'une ligne pileuse, décurrense, grêles, effilés; les feuilles inférieures lancéolées, glabres, sessiles, rapprochées de celles du saule, longues de trois pouces, légèrement dentées, rétrécies à leurs deux extrémités; les supérieures linéaires lancéolées, longues de deux pouces, très-entières; les fleurs d'un blanc-incarnat, de la grandeur de celles de l'espèce précédente.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

95. ASTÈRE lancéolé. *Aster lanceolatus*. Willd.

Aster foliis linearilanceolatis, sessilibus, integerrimis, glabris; infimis lanceolatis, subserratis; caule ramoso, diffuso, calicibus imbricatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2050.

Elle diffère de la précédente par son port. Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, très-rameuses; les rameaux étalés, munis d'une ligne décurrense

de poils; les feuilles glabres, sessiles, linéaires-lancéolées, très-entières; les radicales pétiolées, longues d'un pouce; celles des tiges étroites, lancéolées, dentées à leur milieu, longues d'un pouce & demi; les supérieures linéaires-lancéolées, très-entières, longues d'un demi-pouce ou d'un pouce. Les fleurs sont blanches, un peu violettes, d'une grandeur médiocre; les folioles du calice lancéolées, aiguës, médiocrement imbriquées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

96. ASTÈRE à fleurs blanches. *Aster leucanthemus*. Hort. Paris.

Aster foliis lanceolatis-linearibus, serratis; ramis virgatis, paniculatis, pilosis; pedunculis foliosis, calicibus imbricatis. Desfont. Catal. pag. 102. — Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 447.

Cette espèce paroît se rapprocher beaucoup des deux précédentes. Ses tiges sont droites, cylindriques, très-rameuses; les rameaux grêles, ramifiés, pileux, striés; les feuilles alternes, sessiles, linéaires-lancéolées, glabres, lâchement dentées en scie, rétrécies à leurs deux extrémités; celles des rameaux presque entières, beaucoup plus étroites. Les fleurs sont blanches, petites, pédicellées; les écailles calicinales lancéolées, lâchement imbriquées, blanchâtres, avec une tache blanche dans leur milieu.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*V. v.*)

97. ASTÈRE à fleurs d'armoise. *Aster artemisiflorus*.

Aster (dracunculoides), foliis linearibus, obovatis, integerrimis; inferioribus linearibus-lanceolatis, subserratis; ramis corymbofis, calicibus imbricatis, caule glabresculo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2050. Non Lam.

Ses tiges sont droites, presque glabres, hautes de quatre pieds; les rameaux paniculés, munis d'une ligne pileuse; les feuilles caulinaires étroites, lancéolées, très-entières, acuminées à leur sommet, longues d'un pouce & demi à deux pouces; les radicales & les inférieures linéaires-lancéolées, longues d'un pouce & demi, rétrécies à leurs deux extrémités, un peu dentées à leur milieu. Les fleurs sont blanches, une fois plus petites que celles des espèces précédentes; les folioles calicinales lancéolées, aiguës, médiocrement imbriquées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

98. ASTÈRE fragile. *Aster fragilis*. Willd.

Aster foliis linearibus, acuminatis, integerrimis; radicalibus oblongis, serratis; ramis corymbofo-paniculatis, calicibus imbricatis, squamis adpressis, caule glabresculo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 251.

Ses fleurs sont blanches, une fois plus petites que dans l'espèce précédente; les tiges droites, hautes de deux pieds & plus; les rameaux paniculés & pileux; les feuilles caulinaires glabres, linéaires, très-entières, longues d'un à deux pouces; les radicales pétiolées, oblongues, dentées, obtuses; les écailles calicinales linéaires, aiguës, fortement imbriquées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

99. ASTÈRE lupuline, n°. 40. *Aster miser*. Linn.

100. ASTÈRE éralé, n°. 39. *Aster paulus*. Lam.

* ASTÈRE à tige nue, n°. 42. *Aster nudicaulis*. Lam. Ill. tab. 681. fig. 4.

Cette plante, d'après l'observation de Forster, est un *colendula*. (*Voyez Souc't, n°. 16.*)

101. ASTÈRE ailé. *Aster pinnatus*. Cavan.

Aster foliis pinnatis, rachi alata; foliolis linearibus, apice serratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2053. — Cavan. Ic. Rar. 3. pag. 6. tab. 212.

Cette plante, remarquable par son port, ainsi que la suivante, a des tiges couchées, hispides, cannelées, longues d'un pied, garnies de feuilles opposées, ailées avec une impaire, composées de six paires de folioles linéaires, presque en forme de coin, aiguës, munies vers leur sommet, de chaque côté, de deux dents fines; leur pétiole ailé, linéaire. Les fleurs sont solitaires, terminales, portées sur un pédoncule un peu épais. Le calice est composé d'un double rang d'écailles scarieuses, linéaires, obtuses; la corolle d'un jaune-foncé, à huit demi-fleurs ovales, tridentés. (*Willd.*)

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. ♀

102. ASTÈRE orangé. *Aster aurantiacus*. Linn.

Aster foliis pinnatis, rachi simpliciter; foliolis ovatis, serratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2052.

Aster foliis pinnatis. Linn. — Hott. Cliff. 407. — Mill. Dict. 31.

Aster americanus, foliis pinnatis & serratis, floribus aurantiis. Houtt. Mss. Icon. — Amm. Herb. 466. — Banks, Reliq. Houtt. 7. tab. 18.

Ses tiges sont herbacées, à six cannelures, garnies de feuilles opposées, ailées avec une impaire, composées de deux paires de folioles ovales, dentées en scie. Le pétiole est nu, point ailé, muni à

sa base, de chaque côté, de deux dents sétacées. Les fleurs font solitaires, terminales, soutenues par des pédoncules courts, uniflores; les écailles du calice imbriquées, scarieuses, ovales, aiguës; la corolle d'un jaune-orangé; les demi-fleurs nombreux.

Cette plante croît à la Vera-Cruz. ☉ (Willd.)

* *Espèces moins connues.*

* *Aster* (hirtus), *foliis obovatis, obtusis, pubescentibus; calice imbricato, caule fruticoso*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* *Aster* (heterophyllus), *foliis infimis oblongis; supremis linearibus, inermibus, glabris*. Thunberg, Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* *Aster* (macrochizus), *foliis linearibus-lanceolatis, pilosis; calice imbricato, caule fruticoso*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* *Aster* (villosus), *foliis linearibus filiformibus, obtusis, hirsutis; calicibus imbricatis, caule fruticoso*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* *Aster* (coriaceus), *herbaceus, foliis ovatis, integerrimis, superne sulcatis, subtus lanatis; scapis unifloris, foliolis, lanatis*. Forst. Prodr. n°. 297. *Æ Novæ-Zelandiæ*. ☿

* *Aster* (strigosus), *foliis linearibus-lanceolatis, hirsutis; calice aequali, strigoso; caule herbaceo*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* *Aster* (vernus), *foliis radicalibus lanceolatis, integerrimis, obtusis; caule subnudo, filiformi, subramoso; pedunculis nudis*. Linn. Spec. pag. 1230. — Gron. Virg. 125.

* *Aster* palustris, *foliis bellidis, non serratis; barbulis tenuibus, albis; disco luteo; caule viridi, hirsuta, erecta*. Clayt. l. ibid. *Æ Virginii*.

* *Aster* (elongatus), *foliis lanceolatis, scabris, piloso-hirsutis; calice aequali, strigoso; caule herbaceo*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* *Aster* (xanthus), *foliis lanceolatis, subamplexicaulis, integerrimis, glabris, margine scabris; calicibus laxis, foliolis aqualibus*. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 203.

* *Aster* (rotundifolius), *foliis ovatis, integris, piloso-hirsutis; calice aequali, caule herbaceo*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* *Aster* (dentatus), *foliis linearibus, dentatis, pilosis; caule herbaceo*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 159.

* *Aster* (serratus), *foliis lanceolatis, acutis, ciliato-serratis; calice aequali, caule herbaceo*. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 160.

* *Aster* (radula), *foliis lanceolatis, serratis,*

acuminatis, rugosis, scaberrimis; calicibus imbricatis; foliolis lanceolatis, obtusis. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 210. ☿ *In Novâ-Scotiâ*.

* *Aster* (divergens), *foliis elliptico-lanceolatis, serratis, glabris; caulibus linearibus-lanceolatis, elongatis; ramis patentibus, calicibus imbricatis, caule pubescente*. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 205.

Ses tiges sont foibles, pubescentes, hautes de cinq pieds, quelquefois bien moins élevées; les rameaux étalés; les feuilles glabres, elliptiques, lancéolées, dentées en scie; celles des tiges linéaires-lancéolées, alongées; les calices cylindriques, à folioles nombreuses, aiguës; les fleurs petites; les demi-fleurs blancs, plus courts que le calice; les fleurs rougeâtres dans le disque. Elle croît dans l'Amérique septentrionale, & ne fleurit dans les jardins que vers la fin du mois d'octobre. ☿

* *Aster* (diffusus), *foliis elliptico-lanceolatis, serratis, glabris, proportionatis; ramis patentibus, calicibus imbricatis, caule pubescente*. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 205.

* *Aster* caule tomentoso, *ramis patentissimis, disco rubro*. Ait. l. c.

* *Aster* caule pubescente, *ramis virgatis, disco stramineo*. Ait. l. c.

Dans cette espèce, très-rapprochée de la précédente, toutes les feuilles se ressemblent. Ses fleurs sont blanches. Elle varie par ses tiges pubescentes ou tomenteuses; par le disque de ses fleurs, rouge ou d'un jaune-pâle. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. ☿

* *Aster* (pendulus), *foliis elliptico-lanceolatis, serratis, glabris, ramulorum remotiusculis; ramis divaricatis, pendulis; caule pubescente*. Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 204.

La petitesse des feuilles & la ressemblance des fleurs la rapprochent de la précédente; mais les tiges sont plus grêles, paniculées; les rameaux pendans, munis de feuilles plus distantes les unes des autres. Les fleurs sont blanches; leur disque jaune, puis de couleur de rouille. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. ☿ Ces trois espèces pourroient bien n'être que des variétés.

* *Aster* (acuminatus), *caule simplici, flexuoso, anguloso; foliis omnibus confusis, majusculis, ovali-lanceolatis, utrinque subsqualiter angustatis, longissime acuminatis, inaequaliter incis-serratis; panicula divaricato-dichotoma*. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 109.

Elle paroît encore se rapprocher de trois précédentes. Ses tiges sont simples, flexueuses, anguleuses; toutes les feuilles ovales-lancéolées, assez grandes, presque également rétrécies à leurs deux extrémités, longuement acuminées, inégalement

incisées ou dentées; les fleurs blanches, pédonculeuses, disposées en une panicule étalée, dichotome. Elle croit au Capa'a.

* *Aster* (tortifolius), *fo. t. parvulis, cuneato-obovatis, integris, tortuosis patulis; corymbis compositis, subsessilibus*. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 109.

Conyza bifoliata. ? Walth. Flor. carol.

* *Aster* (thyrsifolius), *foliis lanceolatis, subangusticaulibus, medio nervosis, glabris; caule thyrsoso, tereti, glabro; pedunculis unijloris*. Hoffm. Phytogr. pag. 83, tab. D. fig. 1. In Virginid.

ASTERELLA. (Voyez ASTERELLE.)

ASTERELLE. *Asterella*. Genre de plantes de la famille des hépatiques, établi par M. Paliot de Beauvois, & qui est un dénombrement du genre *marckiana* Linn.; il a pour caractère essentiel des fleurs dioïques.

Fleurs mâles. Ombelle atrondie, portée sur un pédoncule court, privé de péricarpe; plusieurs fleurettes sessiles, à six ou dix divisions, renfermant un amas de filets élastiques, où sont attachés les grains de la poussière fécondante.

Fleurs femelles membranaceuses, sessiles, en forme de cupule, adhérente à l'épisperme, contenant plusieurs semences arrondies, échancrées, comprimées.

Ce genre renferme les deux espèces suivantes :

1. *Asterella tenella*. (Voyez HÉPATIQUE Bluette, n°. 7.)

2. *Asterella hemisphaerica*. (Voyez HÉPATIQUE hémisphérique, n°. 4.)

ASTÉRISQUE. (*Asteriskus*. Tournef.) ASTÉROÏDE. (*Asteroides*. Tournef.) Ce sont deux genres de plantes radiées, établis par Tournefort, & que Linné a réunis dans son genre *aphthalnum*. Tournefort caractérisoit le premier par un calice dont les écailles débordent les demi-fleurons, & le second par un calice plus court que les demi-fleurons.

ASTÉROPE. *Asteropeia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polytalées, dont la famille naturelle n'est pas encore connue, qui paroît se rapprocher des rotacées, & avoir des rapports avec les *blackwellia*; il a été établi par M. du Petit-Thouars pour un arbrisseau de Madagascar, à feuilles alternes & entières, ayant les fleurs disposées en panicule.

Chaque fleur offre pour caractère essentiel :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales; dix étamines conniventes à leur base; cinq alternes plus

courtes; un style; trois stigmates (une capsule à trois loges; trois ou quatre semences centrales?).

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq découpures oblongues, étalées, persistantes.

2°. Une corolle régulière, à cinq pétales caducs, lancéolés, insérés sur le calice, alternes avec ses divisions.

3°. Dix étamines, dont cinq alternes, plus courtes; les filaments réunis à leur base, formant un urcéole adhérent à la base du calice; les anthers bifides à leurs deux extrémités, s'ouvrant latéralement.

4°. Un ovaire libre, trigone, à trois loges polyspermes, surmonté d'un style court, trifide à son sommet; trois stigmates en tête.

Le fruit, observé très jeune, paroît devoir être une capsule entourée par le calice persistant & agrandi, à trois loges, contenant trois ou quatre semences attachées au centre.

ES P È C E.

ASTÉROPE à fleurs nombreuses. *Asteropeia multiflora*. Petit-Thouars.

Asteropeia foliis ovato-oblongis, obtusis, glabris; panicula terminali, divaricata. (N.) Petit-Thouars, Véget. des îles d'Afrique pag. 55. tab. 17.

Arbrisseau peu élevé, dont la tige se divise en rameaux divarqués, alternes, formant une cime étalée. Les feuilles sont alternes, médiocrement pétiolées, ovales, oblongues, très-obtusées, glabres à leurs deux faces, très-entières, longues de trois à quatre pouces, larges de moitié, d'une consistance ferme & grasses au toucher; les nervures latérales irrégulières, se réunissant vers le bord des feuilles; les pétioles courts, épais. Les fleurs forment des panicules terminales; leurs ramifications comprimées, très-étalées, plusieurs fois ramifiées. Le calice est profondément divisé en cinq découpures ouvertes, lancéolées, persistantes. La corolle est blanche, à cinq pétales lancéolés, aigus, insérés sur le calice, alternes avec les divisions. Les étamines sont au nombre de dix, alternativement plus courtes; les filaments réunis par leur base, & formant un urcéole très-court, adhérent à la base du calice. L'ovaire, obtusément trigone, occupe le fond du calice sans y adhérer; il est surmonté d'un style court, trifide, & de trois stigmates en tête. Le fruit très-jeune annonce une capsule à trois valves, contenant chacune trois ou quatre semences presque réniformes, attachées au centre. Le calice, ouvert en étoile, agrandi & membranueux, entoure le fruit à sa base.

Cette plante croît à l'île de Madagascar, où elle a été découverte par M. du Petit-Thouars. *Hy*

ASTEROPEIA. (Voyez ASTEROPH.)

ASTÉROPTÈRE. *Asteropterus*. Czeriner, de Fruct. & Sem. 2. pag. 400. tab. 173. fig. 6.

Genre de plante de la famille des corymbifères, formé par Czeriner sur les espèces du genre *lesyera* de Linné, qui n'ont point le réceptacle de leurs fleurs garni également par tout de poillets, mais munies seulement, à la circonférence du réceptacle, d'échelles courtes qui entourent les semences extérieures. C'est le seul caractère qui distingue ce genre des *lesyera*, & qui convient particulièrement au *lesyera californica* Linn. (voyez LEYSER, n°. 2, & III. tab. 688, fig. 1.) & peut être à quelques-unes des espèces ajoutées par Thunberg. Quant au reste, ces plantes ont des fleurs radiales, un calice commun, composé d'échelles fortes, inégales, imbriquées. Les semences des demi-fleurs sont couronnées d'une aigrette simple; celles des fleurs surmontées d'une aigrette composée de filières courtes, entourées d'arêtes plumées; caractères qui conviennent également aux *lesyera*; & si l'on ajoute que le port rapproche encore les espèces de ces deux genres, on aura de la peine à les tenir séparés.

ASTEROPTERUS. (Voyez ASTEROPTÈRE.)

ASTRAGALE. *Astragalus*. Ce genre se distingue très bien par ses gouffes divisées en deux loges ou presque à deux loges, formées par la rentrée de la future inférieure, d'où résulte une cloison plus ou moins complète, longitudinale, parallèle aux valves, composées de deux feuillets membraneux. Ce caractère forme des astragales un genre tellement naturel, qu'il est très-difficile de pouvoir le diviser en plusieurs autres, malgré le grand nombre des espèces. M. Decandolle l'a cependant entrepris dans la monographie qu'il en a donnée; il a profité de la différence qui présente la carène dans une suite d'espèces assez nombreuses, pour établir son genre *oxytropis*, dans lequel cette carène se prolonge au sommet en une pointe droite. M. Decandolle croit en outre que la cloison est formée par la rentrée de la future supérieure, tandis que les astragales ont la carène oblique, & la cloison formée par la future inférieure. On conçoit que ces faibles caractères, dans l'ordre naturel, ne pourroient constituer qu'une sous-division, avantageuse pour la distinction des espèces, mais qui n'a, d'un autre côté, comme presque toutes les autres, l'inconvénient de tenir éloignées les unes des autres certaines espèces rapprochées par un plus grand nombre de caractères.

Si l'on ne s'en tenoit pas aussi rigoureusement

aux parties de la fructification pour la formation des genres, les *traganthus* de Tournefort devroient être conservés comme genre, formant une suite très-naturelle d'espèces distinguées de toutes les autres par leur port, par leurs pétioles qui se durcissent & deviennent piquans comme des épines, qui remplacent la foliole terminale; par la propriété de plusieurs d'entre-elles de fournir une gomme particulière; par leurs fleurs axillaires, presque sessiles, solitaires ou réunies plusieurs ensemble dans chaque aisselle; enfin, par leurs gouffes, qui ne renferment que deux à trois semences dans chaque loge. Leur lieu natal est encore une considération qui ne doit pas être négligée. Les *traganthus* ne se trouvent que dans les pays chauds, dans le Levant, la Syrie, les îles de l'Archipel, l'Espagne, les départements méridionaux de la France; ils aiment les sols arides, pierreux, sablonneux, les collines, les bords de la mer, tandis que la Sibirie, les Alpes, le Caucase, &c. fournissent la plupart des astragales proprement dits.

En faisant rentrer dans ce genre les espèces qui n'ont pas pu y être mentionnées d'abord, je me suis principalement attaché à faire connoître celles que M. Decandolle a décrites & figurées dans son bel ouvrage sur les astragales. Je n'ai pas cru devoir parler de plusieurs espèces citées dans Willdenow & dans d'autres auteurs, ne les connoissant pas, dans la crainte de faire de doubles emplois, forcé d'ailleurs d'être court, pour ne point passer les bornes que je me suis prescrites. On pourra consulter, pour des plus amples détails, les excellentes monographies que MM. Pallas & Decandolle ont données des astragales.

ESPÈCES.

* **ASTRAGALUS.** Carène obtuse, point mucronée.

A. *Stipules non adhérentes aux pétioles.*

1. **ASTRAGALE** d'Autriche, n°. 24. *Astragalus austriacus*. Linn. — Decand. Astrag. pag. 99.

2. **ASTRAGALE** fleur de vesce. *Astragalus cracca*. Decand.

Astragalus diffusus, herbaceus, foliis ovato-oblongis, emarginatis, pubescentibus; leguminibus pendulis, stipitatis, ovato oblongis, compressis, semibilocularibus. Decand. Astrag. pag. 80. tab. 9.

Cette espèce a des racines presque suffrutescentes; des tiges simples, grêles, éraillées; deux stipules distinctes, lancéolées. Elle se rapproche de l'*astragalus austriacus*, dont elle diffère par les tiges & par les feuilles pubescentes; les folioles plus larges, presque ovales; le calice à demi divisé en cinq découpures égales, linéaires. Les fleurs sont plus

grandes, en éris, assez semblables à celles du *vicia cracca*; l'étendard long; la carène plus courte que les ailes; les gouffes pédicellées, glabres, comprimées, à demi divisées en deux loges; les semences brunes, en forme de rein.

Cette plante croît au Pérou. \times (Decand.)

3. ASTRAGALE à feuilles menues. *Astragalus leptophyllus*. Desf.

Astragalus caule procumbente, foliis obcordatis, pedunculis axillaribus, floribus capitatis; leguminibus foliatis, compressis, nutantibus. Desf. Flor. atl. 2. pag. 188. tab. 207.

Astragalus tunetonius. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1277.

Plusieurs tiges étalées ou couchées, longues d'un pied, s'élèvent en touffe des mêmes racines. Elles sont pubescentes ainsi que les feuilles; les folioles fort petites, en cœur renversé, tronquées, échanquées; les stipules petites, ovales. Les fleurs sont presque sessiles, disposées en tête à l'extrémité d'un pédoncule commun; le calice petit, à cinq dents saïgées; la corolle blanche; l'étendard obtus, plus long que les ailes & la carène; cette dernière plus courte que les ailes; les gouffes courbées en faucille, inclinées, aiguës, comprimées, pubescentes dans leur jeunesse.

Cette plante croît dans le royaume de Tunis, sur les monts Siba, où elle a été découverte par M. Desfontaines. \times (V. f.)

4. ASTRAGALE pied d'oïseau, n°. 19. *Astragalus ornithopodioides*. Lam.

Astragalus onobrychis, orientalis. Decand. p. 125.

5. ASTRAGALE sous-arbrisseau. *Astragalus suffruticosus*. Decand.

Astragalus diffusus, suffruticosus, calicibus subinatis, villosis; leguminibus patulis, subtrigonis, villosis. Decand. Astrag. pag. 82.

Astragalus caulescens, fruticosus, ramis herbaceis; floribus paucis, subcapitatis; leguminibus villosis. Gmel. Sibir. 4. pag. 47. tab. 14. fig. B.

Les tiges sont ligneuses à leur base; les rameaux herbacés, blanchâtres, velus; les stipules lancéolées, presque glabres; les pétioles pubescens; les feuilles composées de sept à onze paires de folioles sessiles, opposées, ovales-oblongues, légèrement velues; les fleurs en tête, réunies au nombre de sept à huit par un épi court, pédicellées, garnies de bractées velues, sétacées; le calice velu, à cinq découpures égales; la corolle purpurine; l'étendard oblong, obru; les ailes plus courtes, pédicellées. Les gouffes sont ovales, presque trigones, aiguës, comprimées, velues, à deux

loges; les semences brunes, arrondies, en rein, de trois à cinq dans chaque loge.

Cette plante croît dans la Sibérie. \times

6. ASTRAGALE taché, n°. 36. *Astragalus maculatus*. Lam.

Astragalus (fubulatus), caule prostrato, villosis; foliis obovatis, incanis; pedunculis axillaribus, folio longioribus; floribus capitatis; leguminibus rectis, subulatis, sericeis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 186.

Astragalus onnularis. Decand. Astr. pag. 93. 104 & 151. tab. 7.

7. ASTRAGALE étoilé, n°. 19. *Astragalus stella*. Linn.

8. *Astragalus acutifolius*. Persl. *Astragalus (stella), incanus, villosus, foliis linearilanceolatis, pedunculis folio brevioribus; leguminibus capitatis, subulatis, rectis, stellatis, sericeis*. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 187.

La variété 2 se distingue par ses feuilles plus étroites, linéaires-lancéolées. La corolle est blanchâtre, fort petite; les gouffes subulées & foyeuses. Elle a été observée par M. Desfontaines sur les côtes de la Barbarie.

8. ASTRAGALE s-fame, n°. 30. *Astragalus s-fameus*. Linn. — Pall. Astr. n°. 104.

ASTRAGALE à une stipule. *Astragalus unifolius*. Lhérit.

Astragalus decumbens, villosus-incanus, stipulis coarctis, vaginantibus; leguminibus erectis, compressis, villosis. Decand. Astrag. pag. 87. tab. 10.

Astragalus unifolius, suffruticosus, procumbens, stipulis foliatis, amplexicaulis, oppositifoliis, bifidis. Lhérit. Sturp. pag. 158.

Ses tiges sont couchées, un peu ligneuses; les rameaux ascendants, velus, blanchâtres; les stipules grandes, solitaires, amplexicaules, pubescentes, brisées, opposées aux feuilles; les feuilles velues, presque blanches, composées de dix à treize paires de folioles sessiles, opposées, oblongues, elliptiques, très-obtus; les fleurs presque sessiles, en épis axillaires, accompagnées de bractées lancéolées. Le calice est cylindrique, chargé de poils roussâtres; la corolle purpurine; les gouffes droites, ovales-oblongues, comprimées, velues, acuminées, à demi divisées en deux loges; les semences brunes, réniformes.

Cette plante croît au Pérou. \times

9. ASTRAGALE à feuilles linéaires. *Astragalus tenuifolius*. Desfont.

Astragalus caule decumbens; foliis linearibus, argenteis;

argenteis; floribus capitatis, pedunculis folio brevioribus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 186. — Decand. Astrag. pag. 109.

Cette plante est couverte, sur toutes ses parties, de poils courts, nombreux, très-blancs, couchés. Ses tiges sont grêles, canaliculées, striées; les stipules ovales, aiguës; sept à huit paires de folioles linéaires, presque elliptiques; les fleurs petites, couleur de rose, réunies en tête, portées sur un pédoncule commun, court, axillaire; le calice grêle, brun, cylindrique, à cinq dents courtes; l'étendard obtus, presque une fois plus long que les ailes.

Cette plante croît en Barbarie, dans les sables, aux environs de Cassa. ? (*V. f. in herb. Desf.*)

10. ASTRAGALE ammodyte, n°. 38. *Astragalus ampodytes*. Pall.

Astragalus prostratus, lanatus, floribus geminis; leguminibus erectis, ovoideis, lenatis, mucronatis. Decand. Astrag. pag. 88.

Astragalus ammodytes. Pall. Voyag. 3. pag. 489. tab. 6. fig. 2, & Astrag. pag. 7. n°. 10. tab. 5. — Linn. f. Suppl. pag. 338. — Scopol. Infub. 2. pag. 111. n°. 52.

Ses racines sont simples, fort longues; les tiges nombreuses, un peu ligneuses, couchées, lanugineuses; deux ou cinq paires de folioles sessiles, opposées, caduques, rapprochées, ovales-oblongues, lanugineuses; les fleurs geminées, axillaires, médiocrement pédonculées, blanches, petites; le calice lanugineux, cylindrique, à cinq dents linéaires; l'étendard étroit, un peu plus long que les ailes. Le fruit est petit, ventru, laineux, surmonté d'un style mucroné & recourbé; les semences brunes, oblongues, peu nombreuses, placées dans deux demi-loges.

Cette plante croît sur les collines sablonneuses de la Sibérie. Elle est, dans toutes ses parties, d'une saveur douce. ? (*Pall.*)

11. ASTRAGALE barbu, n°. 17. *Astragalus barbatus*. Lam. — Decand. Astr. pag. 111. — Pallas, Astr. pag. 30.

Astragalus hispidus. Labill. Syr. pag. 18. tab. 8.

12. ASTRAGALE enflé. *Astragalus inflatus*. Decand.

Astragalus diffus, ascendens, calicibus vesicariis, tomentosis, ore contractis & nigrescentibus; florum capitatis longè pedunculatis. Decand. Astr. pag. 90.

Astragalus fragiformis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1261.

Astragalus anthyloides. Pall. Astr. pag. 15. n°. 19. tab. 13.

Botanique. Supplément. Tome I.

Ses tiges sont grêles, droites, ascendantes, courtes, très-simples, garnies de quelques feuilles alternes, glabres, composées de trois paires de folioles linéaires; les trois dernières plus grandes. Les fleurs sont presque terminales, réunies en une tête globuleuse, sessile à l'extrémité d'un pédoncule commun. Le calice est cylindrique, renflé & persistant après la floraison, à cinq découpages saccées, très-petites; son orifice renflé, muni d'un divet lanugineux, blanc dans le centre, d'un pourpre-noir à la circonférence; la corolle violet-bleue, étroite, l'étendard oblong, dépassant à peine la carène & les ailes. Les gousses sont ovales, acuminées, contenues dans le calice renflé.

Cette plante croît dans les déserts de la Sibérie. (*Pallas.*)

13. ASTRAGALE rayé, n°. 18. *Astragalus lineatus*. Lam. — Decand. Astr. pag. 113. tab. 11. fig. 1.

14. ASTRAGALE vésiculeux, n°. 33. *Astragalus vesicarius*. Linn. — Villars, Dauph. 3. pag. 463. tab. 42. fig. 1. — Decand. Astr. pag. 91.

Astragalus albidus. Flor. Hungar. tab. 40. — Magnol. Hort. 27. Icon.

15. ASTRAGALE hérissé, n°. 32. *Astragalus echinatus*. Lam. Ill. tab. 622. fig. 5.

Astragalus pentaglottis. Cavan. Icon. n°. 206. tab. 183. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 184. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 340. tab. 154. — Lam. Ill. tab. 622. fig. 5.

Astragalus dasyglossis. Pall. Astr. n°. 111.

Astragalus cristatus. Gouan, Illustr. pag. 50.

* *Astragalus supinus, filiquis villosis, glomeratis*, Tournef. Inst. R. Herb. 416.

Glaux hispanica. Rivin. 2. tab. 109. Bona.

16. ASTRAGALE pourpre, n°. 25. *Astragalus purpureus*. Lam. (*Excluf. Linnæi synonym.*) — Decand. Astr. pag. 93. tab. 12.

Astragalus glaux. Vill. Dauph. 3. pag. 459.

17. ASTRAGALE hypoglotte. *Astragalus hypoglossis*. Linn.

Astragalus prostratus, foliolis emarginatis; leguminibus erectis, capitatis, hispidis; loculis monospermis. Decand. Astrag. pag. 94. tab. 14. — Linn. Mantiss. 174. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 183. — Scopol. Infub. 2. pag. 110. n°. 45.

Astragalus epiglossis. Linn. Syst. Nat. edit. 12. pag. 199. n°. 19. (*Excluf. synonym.*)

Astragalus arenarius. Mull. Ill. Dan. tab. 614. — Pall. Astr. pag. 43. tab. 34.

S s s

Astragalus danicus. Retz. Observ. botan. 2. pag. 47. — Roth. Germ. 1. pag. 312, & II, vol. 3. pag. 193.

Astragalus glaucus. Pall. Itin. 2. pag. 264.

Astragalus inaequalis, *parvus*, *purpureus*, *nostratus*. Pluken. Almag. pag. 59. — Rai, Synops. pag. 326. tab. 12. fig. 3.

Glaux montana, *purpurea*, *nostratus*. Rai, Hist. 1. pag. 939. Icon.

Astragalus montanus, *purpureus*, *anglicus*. Tourn. Inst. R. Herb. 416.

Glaux montana, *flore caruleo*. Rupp. Jen. 270.

Astragalus echinatus, var. β , *hypoglottis*. Lam. Dict. n°. 32.

Cette espèce, tantôt réunie à l'*Astragalus pentaglottis* Linn., tantôt méconnue & décrite sous un autre nom, ainsi qu'on l'a vu par la synonymie, est distinguée par ses folioles toujours obtuses, quelquefois échanquées; par ses gouffes point pubescentes, mais velues; par ses loges à une seule semence. Les stipules sont adhérentes, presque vaginales à leur base, bidentées, opposées aux feuilles; les calices cylindriques, à cinq dents aiguës, couverts de poils noirs; l'étendard de la longueur des ailes; la carène plus courte.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, en Espagne, en Barbarie. γ (V. v.)

18. ASTRAGALE à feuilles de vesce. *Astragalus viciifolius*. Decand.

Astragalus humifusus, *foliolis obcordatis*; *leguminibus erectis*, *compressis*, *pilosis-hispidis*. Decand. Astrag. pag. 95.

Astragalus humifusus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1286.

Astragalus orientalis, *humifusus*, *foliis vicia*; *flore parvo*, *caruleo*; *siliquis villosis*. Tournef. Coroll. 28.

Ses tiges sont couchées, herbacées, rameuses, pubescentes; ses feuilles composées de dix à onze paires de folioles cuneiformes, échanquées & tronquées à leur sommet, couvertes de poils blancs. Les pédoncules sont droits, axillaires, anguleux, pubescens, à peine plus longs que les feuilles, soutenant cinq à sept fleurs droites, pédicellées, en épi; les bractées velues, sétacées; le calice cylindrique, velu, à cinq découpures linéaires, égales. La corolle est bleue, une fois plus longue que le calice; l'étendard échanqué au sommet; les ailes pédicellées; leur limbe auriculé à un de leurs bords, de la longueur de la carène; les gouffes droites, oblongues, aiguës, constrictées, pileu-

ses, à deux loges, renfermant chacune trois ou quatre semences.

Cette plante croît aux environs de Tripoli, dans la Cappadoce. (Decand.)

19. ASTRAGALE léontin. *Astragalus leontineus*. Gmel.

Astragalus prostratus, *leguminibus ovatis*, *villofis*; *pedunculis trigonis*; *foliolis ovatis*, *vestigio alis paulo longiore*. Decand. Astrag. pag. 96. — Gmel. Syst. pag. 1134. — Jacq. Miscell. 2. pag. 59, & Icon. Rar. tab. 37.

Ses tiges sont couchées, herbacées, rameuses à leur base; les rameaux trigones, pubescens; les stipules amplexicaules, lancéolées, de six à huit folioles ovales, pubescentes en dessous, pédicellées. Les pédoncules sont axillaires, un peu plus longs que les feuilles, soutenant des fleurs droites, sessiles, réunies en un épi ovale; les bractées oblongues, lancéolées; le calice pubescent, cylindrique, tronqué obliquement, à cinq dents; la corolle purpurine; l'étendard un peu plus long que les ailes; celles-ci pédicellées, prolongées à leur base en un appendice arrondi; les gouffes droites, ovales, velues.

Cette plante croît en Suisse & dans l'Autriche. (V. f.)

20. ASTRAGALE à ombelles, n°. 35. *Astragalus sinicus*. Linn. — Scop. Infubr. 2. pag. 110. n°. 49. — Decand. Astrag. pag. 97.

21. ASTRAGALE d'Espagne, n°. 26. *Astragalus glaucus*. Linn. — Decand. Astrag. pag. 97. — Pall. Astrag. pag. 36.

Glaux Dioecoridis. Lobel. Icon. 2. pag. 80. — Ic. Clus. & J. Bauh. Hist. 2. pag. 341. — Tabern. Ic. 515.

22. ASTRAGALE de Laxman, *Astragalus Laxmanni*. Jacq.

Astragalus prostratus, *floribus arborescentibus*; *vestigio alis paulo longiore*. Decand. Astrag. pag. 98. — Jacq. Hort. Vind. 3. pag. 22. tab. 37. — Linn. f. Suppl. pag. 337. — Scop. Infubr. 2. pag. 109. Non Pallas.

Astragalus adurgens. Pall. Astrag. pag. 40. tab. 31.

Cette espèce a des tiges couchées, glabres, presque cylindriques; sept à neuf paires de folioles ovales, légèrement pubescentes; les fleurs disposées en un épi oblong, cylindrique; droites, sessiles, bleuâtres, situées à l'extrémité d'un pédoncule plus long que les feuilles. Le calice est pubescent, cylindrique, à cinq dents profondes, linéaires; l'étendard plus long que les ailes, échanqué à son sommet; les ailes pédicellées, auricu-

lées à un des bords de leur limbe; les gouffes pubescentes, oblongues, trigones, mucronées, presqu'à deux loges, contenant plusieurs semences luisantes.

Cette plante croît en Sibérie. (Decand.)

23. *ASTRAGALE* esparcette, n°. 20. *Astragalus onobrychis*, Linn. — Decand. Astr. pag. 99.

M. Decandolle a décrit six variétés de cette plante, qu'il regarde comme devant appartenir à la même espèce, ayant les feuilles glabres ou pubescentes, les fleurs en tête ou en épis; les tiges plus ou moins élevées.

24. *ASTRAGALE* annuel. *Astragalus annuus*. Decand.

Astragalus subdiffusus, floribus patulis, vexillis albis duplo longioribus, foliis linearibus. Decand. Astr. pag. 101.

Astragalus annuus, angustifolius, flosculis subcaulicis, cauliculis adherentibus. Hetb. Burm.

Cette espèce paroît tenir le milieu entre l'*astragalus onobrychis* & le *subuliformis*; elle diffère du premier par ses fleurs étalées & non redressées, du second par l'étendard très-long, de tous deux par les tiges annuelles, diffuses, presque glabres. Le pétiole est géle, à peine pubescent; il soutient des folioles linéaires. Les pédoncules sont axillaires, plus longs que les feuilles; les fleurs purpurines, ramassées en une tête étalée; le calice cylindrique, presque glabre, à cinq dents aiguës. Son lieu natal n'est pas connu. (Decand.)

25. *ASTRAGALE* musqué. *Astragalus fragrans*. Willd.

Astragalus caulescens, procumbens, foliis oblongis, acutis, pilosis; spicis ovatis, pedunculatis, folia subquadratis; bracteis ovatis, membranaceis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1394.

Astragalus glaber. Decand. Astr. pag. 147.

Astragalus orientalis, minimus, foliis viciis; flore ex viridi-flavescente, odoratissimo. Tourn. Coroll. 28.

Ses racines produisent plusieurs tiges couchées, très-courtes. Les feuilles sont composées de neuf à dix paires de folioles blanchâtres dans leur jeunesse, puis vertes, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, pileuses en dessous; les stipules grandes, ovales, membraneuses, serrées contre les tiges. Les fleurs sont disposées en un épi ovale, pédonculé, un peu plus long que les feuilles, garni de bractées ovales, membraneuses; le calice tubulé, à cinq dents subulées, parsemées de poils noirs.

Cette plante croît dans la Cappadoce. ♀ (Willd.)

26. *ASTRAGALE* rabattu. *Astragalus declinatus*. Willd.

Astragalus caulescens, procumbens, foliis oblongis, obtusis, pilosis; racemis paucifloris, confertis, pedunculatis, folio duplo longioribus; leguminibus oblongis, acutis, pilosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1294.

Astragalus acaulis serz, flore luteo. Tournef. Coroll. 29.

Ses tiges étalées, diffuses & pileuses, ont à peine deux pouces de long. Les feuilles sont composées de quinze paires de folioles oblongues, obtuses, pilueuses; les fleurs de cinq à huit, disposées en grappes pédonculées, une fois plus courtes que les feuilles. Le calice est pileux & coloré, à cinq dents courtes, acuminées, ovales; la corolle jaune; les gouffes une fois plus longues que le calice, pileuses, acuminées par le style.

Cette plante croît dans le Levant. ♀ (Willd.)

27. *ASTRAGALE* osier. *Astragalus vimineus*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, fruticosus, foliis subquinqjugis, lanceolatis, pubescentibus; spicis subcapitatis, pedunculatis; leguminibus oblongo-lanceolatis, villosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1268. — Pall. Astr. n°. 28. tab. 21.

Astragalus cornutus. Pall. Itin. 2. Append. pag. 499. n°. 12.

Arbuste d'environ un pied & demi, dont les rameaux sont herbacés; les feuilles composées de quatre à cinq paires de folioles lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, pileuses; les fleurs violettes, sessiles, réunies presque en tête à l'extrémité d'un pédoncule plus long que les feuilles. Les gouffes sont oblongues, lancéolées, velues, acuminées, presqu'à deux loges, marquées d'un sillon profond à son côté extérieur.

Cette plante croît dans la Sibérie & au mont Caucase. ♀ (Willd.)

28. *ASTRAGALE* arbutue. *Astragalus arbutula*, Pallas.

Astragalus caulescens, erectus, fruticosus, foliis subtrijugis, linearibus, canis; spicis subcapitatis, pedunculatis; leguminibus linearibus, triquetris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1268. — Pallas, Astr. pag. 19. n°. 24. tab. 17.

Cet arbutue à l'aspect d'un *robinia*. Ses rameaux sont herbacés, effilés, longs d'environ un pied & demi; les feuilles garnies de trois paires de folioles linéaires, blanchâtres, rétrécies à leur base,

aiguës, un peu obtuses à leur sommet; les stipules lancéolées; les fleurs violettes, presqu'en tête; le pédoncule presque trois fois plus long que les feuilles; les gouffes linéaires, trigones, marquées d'un filon profond.

Cette plante croît dans la Sibérie. *Th* (Willd.)

29. ASTRAGALE à petites gouffes. *Astragalus microcarpus*. D. cand.

Astragalus herbaceus, glaber, leguminibus patulis, ovatis, compressis, semi-orbicularibus, capitatis. Decand. *Alfr.* pag. 131.

Cette plante se rapproche beaucoup de l'*Astragalus onobrychis*. Ses tiges sont glabres, redressées; les stipules triangulaires; les folioles (de vingt-un à vingt-cinq) glabres, ovales, elliptiques; les fleurs violettes, sessiles, d'abord réunies en tête, puis en épi; le calice pubescent; l'étendard à peine plus long que les ailes; les gouffes perries, étalées, ovales, point pendantes, à deux demi-loges.

Cette plante croît dans les campagnes de la Sibérie. *Th* (Decand.)

30. ASTRAGALE à poils rudes. *Astragalus hispidulus*. Decand.

Astragalus herbaceus, piloso-hispidus, leguminibus erectis, arcuatis, hispidis. Dec. *Alfr.* pag. 132. tab. 13.

Cette espèce a des rapports avec l'*Astragalus trimifidus*; elle en diffère par ses folioles point échanquées, par les gouffes hispides & non pubescentes, jamais contournées en spirale. Ses fleurs paraissent purpurines, peu nombreuses, pédicellées; les pédoncules plus longs que les feuilles; le calice pileux, à cinq dents linéaires; les gouffes droites, comprimées, courbées en faucille; les semences petites, nombreuses.

Cette plante croît en Égypte. (Decand.)

31. ASTRAGALE des sables. *Astragalus arenarius*. Linn.

Astragalus caulescens, ramosus, prostratus, foliis linearilanceolatis, sericeis, complicatis; racemis subsessilibus, folio longioribus; leguminibus oblongis, pubescentibus. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1289. — Linn. *Flor. suec.* 2. n°. 659, & *Iter Scand.* 108. — Retz. *Obierv.* 3. pag. 41. tab. 3.

Ses tiges sont rameuses, couchées, longues d'environ un pied, ouvertes, ainsi que toute la plante, de poils blancs & soyeux; les folioles plées, lancéolées, au nombre de trois à six paires; les stipules solitaires, ovales, bifides, opposées aux feuilles; quatre à six fleurs bleues, en grappes, un peu plus longues que les feuilles. Les

gouffes sont oblongues, cylindriques, pubescentes, un peu arquées, acuminées, marquées d'un léger filon.

Cette plante croît dans les sables mouvans, en Suède & en Allemagne. *Th*

32. ASTRAGALE pansiché. *Astragalus leucophaeus*. Smith.

Astragalus caulescens, procumbens, foliis obcordatis, subtus sericeis; racemis pedunculatis, folia subaquantibus; leguminibus verticibus, lanceolatis, patentibus, glabris. Willden. *Spec. Plant.* 3. pag. 1290. — Smith, *Act. Soc. Linn.* 1. pag. 252.

Ses tiges sont courtes, rabattues; ses feuilles composées de treize à quinze paires de folioles glabres, en cœur ténéré, foyeuses & pubescentes en dessous; les stipules amples, ovales, ciliées, membraneuses; les fleurs d'abord réunies en une tête qui se prolonge en une grappe à peine plus longue que les feuilles. La corolle est blanchâtre; l'étendard d'un bleu-livide en dedans & à ses bords; les gouffes glabres, étalées, cylindriques, lancéolées.

On ignore le lieu natal de cette plante. *Th* (Willd.)

33. ASTRAGALE d'Hyrcanie. *Astragalus hyrcanus*. Pall.

Astragalus fruticosus, caulescens, erectus, foliis trijugis; pedunculis paucifloris; leguminibus oblongo-mucronatis, pubescentibus. Pall. *Alfr.* p. 25. n°. 29. tab. 22. — Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1266.

Ses tiges sont courtes, ligneuses, pubescentes, redressées, garnies de feuilles composées de trois paires de folioles pubescentes, linéaires, aiguës; les stipules ovales, acuminées. Les pédoncules sont axillaires, peu garnis de fleurs purpurines, en grappe, auxquelles succèdent des gouffes oblongues, mucronées, pubescentes.

Cette plante croît sur les rives sablonneuses de la mer Caspienne. *Th*

34. ASTRAGALE funelle. *Astragalus garbanzillo*. Cavan.

Astragalus caulescens, erectus, fruticosus, foliis multijugis, oblongo-linearibus, emarginatis, cavis; stipulis vaginatis, bifidis; racemis pedunculatis, folio longioribus. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1267. — Cavan. *Icon. Rar.* 1. pag. 59. tab. 85.

Cette espèce s'élève à la hauteur d'un pied & demi, sur une tige ligneuse, garnie de feuilles blanchâtres, légèrement tomenteuses, ainsi que toute la plante, composées de dix à quinze paires de folioles oblongues, linéaires, échanquées, une stipule solitaire, vaginale, bifide. Les fleurs font

violettes, presque sessiles, disposées en une grappe pédonculée, plus longue que les feuilles. Ses fruits ne sont pas connus.

Cette plante croît au Pérou; elle passe pour n'être que des bestiaux. \S

35. ASTRAGALE en alène. *Astragalus subuliformis*. Decand.

Astragalus suffrutescens, diffus, pedunculis longis, racemosis; leguminibus sessilibus, triquetrisubulatis, erectis. Decand. Altr. pag. 134.

Astragalus subulatus. Pall. Altr. pag. 22. n°. 27. tab. 20. B. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1288. — Gmel. Sibir. 4. pag. 51.

a. *Astragalus* (tauricus), foliis septem linearibus. Pall. Altr. tab. 22. A.

Astragalus tauricus, foliis pubescentibus. Dec. l. c. pag. 135.

b. *Astragalus* (altaicus), foliis 11-13 ovato-oblongis, puribus purpurascens. Pall. Altr. tab. 20. fig. A.

c. *Astragalus* (macileneus), glaber, foliis 7-9 linearibus. Pall. Altr. n°. 27. tab. 22. fig. D.

Cette plante a des tiges couchées, presque ligneuses, étalées; les folioles linéaires, très-étroites, légèrement tomenteuses, d'un vert-blanchâtre; des gouffes droites, sessiles, linéaires-subulées, un peu trigones. Elle offre plusieurs variétés dans la longueur des tiges, dans le nombre de ses folioles, dans ses fleurs blanches, rougeâtres ou purpurines, souvent panachées.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Tauride. \S (V. f.)

36. ASTRAGALE bigarré, n°. 21. *Astragalus varius*. Lam.

Astragalus (virgatus), fruticoso-caulescens, erectus, foliis sexagitis, fricis longissime tosa; leguminibus oblongo-triquetris, mucronatis. Pallas. Altr. pag. 20. n°. 25. tab. 18. (Exclus. synonym. Linn.)

Astragalus inconnus, fruticosus, foliis vicia. Buxb. Cent. 3. pag. 21. tab. 37.

37. ASTRAGALE filonné, n°. 23. *Astragalus falcatus*. Lam. — Ja q. Hort. 3. pag. 23. tab. 40. — Decand. Altr. pag. 138. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1263.

Astragalus leptostachys. Pallas, Altr. pag. 50. tab. 40.

38. ASTRAGALE de diverses couleurs. *Astragalus versicolor*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, foliis linearibus, ovatis, glabris; stipulis lanceolatis, connatis; rosetis oxilioribus, folio longioribus; calicinis dentibus brevissimis, ovatis, cuspidatis; leguminibus triquetrisubulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1265. — Pall. Altr. pag. 45. tab. 35. (Exclus. Linn. synonym.)

Cet astragale ressemble beaucoup à l'*Astragalus floribundus* (oxytropis Dec.) ; il en diffère par ses fleurs bleues & non jaunâtres, par ses tiges & ses feuilles glabres, par les dents du calice très-courtes. Les folioles sont linéaires, aiguës, les stipules lancéolées, conniventes; les grappes axillaires, plus longues que les feuilles; les gouffes subulées, presque trigones.

Cette plante croît sur les rochers & les hautes montagnes de la Sibérie. \S

39. ASTRAGALE à gaines. *Astragalus vaginatus*. Pallas.

Astragalus caulescens, erectus, pubescens, foliis lanceolatis, utrinque obtusius; stipulis oppositifoliis, foliariis, vaginatis; spicis pedunculatis, folio longioribus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1270. — Pall. Altr. pag. 46. tab. 36.

Astragalus versicolor, var. major. Decand. Altr. pag. 139.

Il diffère du précédent par ses tiges plus élevées, par toutes ses parties pubescentes, par ses folioles lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités; par ses stipules vaginales, foliaires, opposées aux feuilles, ovales, acuminées. Les épis sont plus longs que les feuilles; les gouffes droites, linéaires.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur le bord des lacs. \S

40. ASTRAGALE à feuilles de mélilot. *Astragalus melilotoides*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, paniculatus, foliis bi-trij-gifves; foliis linearibus, connatis, retusis, glabris; rosetis filiformibus; leguminibus ovatis, rugosis, didymis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1266. — Pall. Altr. pag. 51. tab. 41. & Icon. 3. Append. n°. 177. tab. Dd. fig. 1 & 2.

Astragalus caulis erectis, rosetis filiformibus, &c. Gmel. Sibir. 4. pag. 38.

Lotus montano, erecto, oblongo & angusto folio, parvulo, &c. Amm. Ruth. n°. 57.

Cette espèce est facile à reconnoître par sa ressemblance avec les mélilots. Ses tiges se divisent en rameaux droits, paniculés. Les feuilles sont composées de deux ou trois paires de folioles linéaires, cunéiformes, glabres, rétrécies; les grappes filiformes, plus longues que les feuilles; les fleurs purpurines; les gouffes ridées, didymes.

Cette plante croît sur les montagnes de la Sibérie. ✕

41. ASTRAGALE à gros épis. *Astragalus macrostachys*. Decand.

Astragalus (hedysaroides), *caulescens*, *erectus*, *foliolis linearibus*, *pubescentibus*; *stipulis ovatis*, *acuminatis*; *spicis pedunculatis*, *longissimis*, *terminali*; *calicibus tubulosis*, *pilosis*; *ovello acuto*, *elongato*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1264. — Decand. Alfr. pag. 141. tab. 12.

Astragalus orientalis, *onobrychidis* *facie*, *spicis* *florum longissimis*. Tournet. Coroll. 28.

Ses tiges sont redressées, hautes de trois à quatre pouces; les folioles étroites, linéaires, pubescentes, obtuses; les stipules petites, ovales, acuminées; les fleurs purpurines, pédicellées, réunies en un épi pédoncule, épais, long d'un pied; le calice pileux, cylindrique; l'étendard aigu, plus long que les ailes & la carène.

Cette plante croît dans l'Orient. ✕

42. ASTRAGALE de Syrie, n°. 37. *Astragalus furiacus*. Linn.

43. ASTRAGALE blanchâtre. *Astragalus canescens*. Decand.

Astragalus frutescens, *suberectus*, *floribus densis* *spicatis*; *foliolis ellipticis*, *hirsuto-cinereis*. Decand. Alfr. pag. 142. tab. 16.

Astragalus cephalotus. Pall. Alfr. pag. 29. tab. 24. (Exclaj. synon.)

Astragalus onobrychioides. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1261. — Marsh. ab Bieberst. Calp. pag. 117. n°. 15. (Exclaj. Tournet. synon.)

Cette plante, blanchâtre sur toutes les parties, se rapproche de *Astragalus furiacus* Linn. Ses tiges sont redressées, pubescentes, ligneuses; les folioles lancéolées; les fleurs purpurines, réunies en une tête arrondie, longuement pédonculée; l'étendard très-long, lancéolé; les dents du calice lancéolées; les gouffes pileuses, plus longues que le calice, surmontées par le style réfléchi.

Cette plante croît en Perse, sur les collines pierreuses. ✕

44. ASTRAGALE de deux couleurs, n°. 44. *Astragalus bicolor*. Lam. — Vahl, Symbol. 1. pag. 62. — Decand. Alfr. pag. 144.

45. ASTRAGALE pforalier, n°. 42. *Astragalus pforaloides*. Lam. — Vahl, Symbol. 1. pag. 62. — Decand. Alfr. pag. 135. tab. 18. fig. 2.

46. ASTRAGALE scorpion. *Astragalus scorpioides*. Pourr.

Astragalus caulescens, *et ad-patulus*, *pubescens*, *foliolis oblongis*, *obtusis*, *emarginatis*; *stipulis lanceolatis*; *floribus axillaribus*, *solitariis*, *subsessilibus*; *leguminibus hamatis*, *subulatis*, *pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1287. — Pourr.

Ses racines, simples, perpendiculaires, produisent plusieurs tiges pubescentes, étalées, reoressées. Les feuilles sont composées d'environ huit paires de folioles oblongues, obtuses, échan-crées, pubescentes; les stipules lancéolées. Les fleurs sont axillaires, solitaires, presque sessiles, de couleur purpurine, les gouffes tubuleuses, pubescentes, courbées en hampe.

Cette plante croît en Espagne. ○ (Willd.)

47. ASTRAGALE nain. *Astragalus nanus*. Decand.

Astragalus suffrutescens, *subcaulis*, *floribus erectis*, *capitato-spicatis*; *foliolis villosis*, *ovatis*; *stipulis coalitis*. Decand. Alfr. pag. 143. tab. 17.

Ses tiges sont ligneuses, très-basses, presque nulles; les feuilles composées de folioles ovales, velues; les stipules conniventes à leur base; les fleurs purpurines, réunies, à l'extrémité d'un pédoncule commun, en un épi court, presque en tête.

Cette plante croît dans la Syrie. ✕

48. ASTRAGALE à tige blanche. *Astragalus albicaulis*. Decand.

Astragalus pedunculis folio longioribus, *caule fruticoso*; *foliolis paucis*, *ovatis*; *leguminibus erectis*, *compressis*. Decand. Alfr. pag. 166. tab. 61.

Cette plante est remarquable par la blancheur de ses rameaux & de ses pétioles. Les stipules sont petites, aiguës; les folioles ovales, pubescentes, opposées, au nombre de cinq à neuf; les pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, supportant une tête de fleurs jaunâtres. Leur calice est cylindrique, pubescent, à cinq dents linéaires; les gouffes ovales, oblongues, comprimées, velues, acuminées, à deux loges; quatre à six semences dans chaque loge.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♂ (F. f. in herb. Desfont.)

49. ASTRAGALE à grosse tête. *Astragalus macrocephalus*. Willd.

Astragalus caulescens, *erectus*, *foliolis oblongo-lanceolatis*, *glabris*; *stipulis ovatis*, *dilatatis*, *vaginatis*; *spicis globosis*, *pedunculatis*; *calicibus lanatis*, *dentibus lanceolato-subulatis*. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1160.

Ses tiges sont droites, striées, hautes de quatre pieds; les feuilles très-longues, composées de folioles glabres, oblongues, lancéolées, aiguës; les stipules amples, ovales, en gaine à leur base; les

fleurs jaunes, ramassées en tête, de la grosseur d'une petite pomme, à l'extrémité d'un pedoncule épais, un peu pileux; les calices blancs & lanugineux, à cinq dents linéaires, subulées; les gouffes velues, presque trigones, creusées, vers leur sommet, d'un filon profond.

Cette plante croît dans la Galatie. *(Willd.)*

50. *ASTRAGALE tuberculeux. Astragalus tuberculifolius*. Decand.

Astragalus pedunculis folio longioribus; caule herbaceo, superne hispido; leguminibus paulis, depressis, pilosotuberculosis. Decand. Alfrag. pag. 133. tab. 21.

Ses tiges sont herbacées, un peu tortueuses, cylindriques; ses feuilles éparées, composées de vingt-une à vingt-cinq folioles un peu velues, elliptiques, obtuses, échanquées à leur sommet; les pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles; les fleurs jaunâtres, en épi; le calice hispide, à cinq dents étroites, aiguës; les gouffes étalées, comprimées, un peu pileuses & ruberculées, mucronées, recourbées à leur sommet, à deux loges; trois ou quatre semences dans chaque loge.

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par M. de Labillardière. *(Decand.)*

51. *ASTRAGALE à bourse, n° 5. Astragalus galeiformis*. Linn. — Pall. Alfrag. pag. 35. tab. 29. — Lam. Ill. tab. 622. fig. 6. — Guss. de Fruct. & Sem. 2. pag. 340. tab. 154.

52. *ASTRAGALE de Chine, n° 6. Astragalus chinensis*. Linn.

53. *ASTRAGALE rude. Astragalus asper*. Jacq.

Astragalus caulescens, erectus, asper, foliis lineari-lanceolatis; spicis pedunculatis, folio longioribus; stridis; leguminibus oblongo-lanceolatis, triquetris. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1271. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 152. & Miscell. 2. pag. 335.

Astragalus chloranthus. Pall. Alfrag. p. 30. tab. 25.

Ses tiges sont droites, un peu rudes, cannelées; ses folioles linéaires-lancéolées, glabres, d'un vert-glauque, aiguës, de vingt-un à vingt-cinq; les pédoncules droits, beaucoup plus longs que les feuilles, terminés par un épi roide, allongé; la corolle jaunâtre; les gouffes droites, lancéolées, trigones, calquées.

Cette plante croît en Hongrie & sur les bords de la mer Caspienne. *(V. c.)*

54. *ASTRAGALE à demi cloison. Astragalus semibilocularis*. Decand.

Astragalus pedunculis folio longioribus; floribus

erectis, arctis spicatis; leguminibus semibilocularibus. Decand. Alfrag. pag. 170. tab. 23.

Astragalus Laxmanni. Willd. Spec. Plant. 5. p. 1296. — Pall. Alfrag. pag. 38. tab. 30. (*Exclus. synonym. Jacq. & Linn.*)

Il se distingue par ses tiges & ses feuilles glabres; par ses stipules d'une seule pièce; par les gouffes à demi biloculaires, la suture inférieure courbée en dedans. Ses folioles, au nombre de dix-neuf à vingt-trois, sont sessiles, elliptiques, acuminées, glabres ou à peine pubescentes; les fleurs jaunes, réunies en un épi ovale. Il croît dans la Sibérie. *(Decand.)*

55. *ASTRAGALE de Canada, n° 9. Astragalus canadensis*. Linn.

56. *ASTRAGALE de la Caroline, n° 10. Astragalus carolinianus*. Linn.

57. *ASTRAGALE à folioles nombreuses. Astragalus schanginianus*. Pall.

Astragalus coulescens, erectus, pubescens, foliis ovato-oblongis; racemis subcapitatis, petiolo brevioribus; leguminibus oblongis, pendulis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1274. — Pall. Alfrag. pag. 77. tab. 63.

Cette plante est pileuse sur toutes ses parties. Ses tiges sont redressées, hautes de trois pouces; ses feuilles souvent longues d'un pied, composées de quinze paires de folioles ovales-oblongues; les stipules étalées, lancéolées; les fleurs jaunes, disposées en grappes axillaires, presque en tête, plus courtes que les feuilles; les gouffes velues, oblongues, cylindriques, mucronées.

Cette plante croît dans la Sibérie. *(Willd.)*

58. *ASTRAGALE des marais, n° 7. Astragalus uliginosus*. Linn. — Pall. Alfrag. pag. 31. tab. 26.

59. *ASTRAGALE odorant, n° 8. Astragalus odoratus*. Lam. — Decand. Alfrag. pag. 174. tab. 24.

60. *ASTRAGALE mucroné. Astragalus mucronatus*. Decand.

Astragalus pedunculis folio aequalibus; foliis subius pubescentibus, mucronatis; leguminibus compressis, ovatis. Decand. Alfrag. pag. 175. tab. 25.

Il diffère peu du précédent: on l'en distingue par ses folioles mucronées à leur sommet; par les gouffes comprimées, recourbées à leur sommet. Il croît dans l'Orient. *(V. c.)*

61. *ASTRAGALE alyssifolide, n° 43. Astragalus alyssoides*. Lam. — Decand. Alfrag. pag. 146. tab. 18. fig. 1.

62. *ASTRAGALE foyeux. Astragalus sericeus*. Decand.

Astragalus suffrutescens, subcaulis, foliis leguminibusque sericeis, ellipticis. Decand. Altr. pag. 148.

Astragalus orientalis, minimus, flore glomerato, virente. Tournef. Coroll. 29.

Ses tiges sont très-courtes & ligneuses; les feuilles soyueuses, composées de onze à douze paires de folioles oblongues, elliptiques, aîguës. Les fleurs sont verdâtres, nombreuses, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule cylindrique; un peu plus long que les feuilles, pubescent ainsi que le calice; les bractées plus longues que le calice; les gouffes ovales, soyueuses, à deux loges, acuminées.

Cette plante croît dans le Levant. γ (Decand.)

63. ASTRAGALE très-velu. *Astragalus hirsutissimus*. Decand.

Astragalus suffrutescens, subcaulis, foliis hirsutissimis, subius revolutis; leguminibus semicordatis, hirsutis. Decand. Altr. 149. tab. 19.

Très-petite plante, dont les tiges sont très-courtes, ligneuses, rameuses; les feuilles blanches, très-velues, composées de sept à dix paires de folioles très-rapprochées, sessiles, ovales-oblongues; les fleurs d'un blanc-jamâtre, sessiles, réunies en tête sur un pédoncule axillaire, très-velu ainsi que tout le reste de la plante; les gouffes presque en cœur, trigones, comprimées, à deux loges, contenant chacune une ou deux semences réniformes.

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. Labillardière. η (V. f. in herb. Desfont.)

64. ASTRAGALE à feuilles serrées, n°. 41. *Astragalus densifolius*. Lam.

β . *Astragalus* (emarginatus), subcaulis, scapis longissimis, capitulis globosis, leguminibus lanatis. Labill. Syr. 1. pag. 19. tab. 9. — Lam. III. Gen. tab. 623. fig. 1.

La variété β est beaucoup plus grande dans toutes ses parties. M. Labillardière l'a recueillie en Syrie. L'*Astragalus capitatus* Linn. paroît devoir encore être rapporté comme variété à la même espèce.

65. ASTRAGALE comprimé (nain, n°. 48.). *Astragalus depressus*. Linn.

β . *Astragalus helminthocarpus*. Villars, Dauph. 3. pag. 456. tab. 42. Cette variété n'en diffère que par ses gouffes un peu plus courtes.

66. ASTRAGALE recroquevillé, n°. 15. *Astragalus contortuplicatus*. Linn.

67. ASTRAGALE à hameçon, n°. 14. *Astragalus*

hamosus. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 611. fig. 4. — Gztn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 339. tab. 154.

68. ASTRAGALE goniculé. *Astragalus geniculatus*. Desf.

Astragalus incanus, floribus capitatis; leguminibus hirsutis, subarcuatis, macronatis, dorso canalicatis; pedunculis fructiferis, oppositis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 186. tab. 205.

Ses tiges sont courtes, velues; les folioles au nombre de onze à quinze, linéaires-elliptiques, obtuses, soyueuses; les fleurs réunies en tête, à l'extrémité d'un pédoncule velu, plus court que les feuilles. Le calice est velu, à cinq dents serrées; la corolle d'un jaune-pâle; les gouffes épaissies, hérissées, un peu arquées, lancéolées, subulées, canaliculées à un de leurs bords, renversées.

Cette plante croît en Barbarie, sur les collines incultes, aux environs de Mascara. \odot (V. f.)

69. ASTRAGALE d'Andalousie, n°. 16. *Astragalus boticus*. Linn. — Lam. III. tab. 611. fig. 2. — Gztn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 339. tab. 154.

70. ASTRAGALE à feuilles de réglisse, n°. 13. *Astragalus glycyphyllos*. Linn.

71. ASTRAGALE unilatéral. *Astragalus secundus*. Decand.

Astragalus procumbens, leguminibus oblongis, compressis, pedicellatis; calicibus truncatis. Decand. Altr. pag. 161.

Très-rapprochée de la précédente, elle en diffère par ses fleurs tournées du même côté. Ses tiges sont couchées; les calices tronqués; la corolle d'un blanc-jamâtre; les gouffes oblongues, comprimées, pédicellées. Elle croît dans la Sibérie.

72. ASTRAGALE épiglottier, n°. 31. *Astragalus epiglottis*. Linn.

73. ASTRAGALE à fruits ronds, n°. 11. *Astragalus cicer*. Linn.

74. ASTRAGALE à petites feuilles, n°. 12. *Astragalus microphyllus*. Linn.

75. ASTRAGALE à grandes fleurs. *Astragalus megalanthus*. Decand.

Astragalus diffusus, floribus spicatis, patentibus, magnis; venis amplo, emarginato; calicibus tandem inflatis. Decand. Altr. pag. 131. tab. 20.

Cette plante se rapproche beaucoup du *cypissus wolgaricus* de Pallas; peut-être même, d'après M. Decandolle, ces deux plantes devraient former un genre particulier, voisin des astragales. Ses tiges sont cylindriques, pubescentes, herbacées; ses

ses feuilles légèrement foyeuses, composées de six à dix paires de folioles elliptiques ou ovales, un peu mucronées. Les fleurs sont grandes, réunies en un épi lâche à l'extrémité d'un pédoncule un peu plus long que les feuilles; le calice pileux, cylindrique, puis renflé; à cinq dents presque obtuses, inégales; la corolle d'un blanc-jaunâtre; l'épandard ample, échancré à son sommet; l'ovaire ovale oblong.

Cette plante croît dans la Russie. (Decand.)

76. ASTRAGALE en faucille, n°. 4. *Astragalus falcatus*. Lam. — Pall. Altr. pag. 34. tab. 28. — Ait. Kew. 3. pag. 73. — Decand. Altr. tab. 26.

Astragalus virens. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1272.

8. *Astragalus falcatus*. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 183. tab. 207. — Vahl, Symb. 1. pag. 58.

Astragalus orientalis, altissimus, galea foliis amplexoribus; flore parvo, flavescente. Tournef. Coroll. 29.

La plante de M. Desfontaines est différente de celle de M. de Lamack, & paroitroit devoir former une espèce. Ses folioles sont oblongues, elliptiques, obtuses; les stipules ovales, aiguës; le calice divisé en cinq dents courtes, sétacées; la corolle petite, d'un jaune-pâle; les gouffes légèrement pédicellées, inclinées, comprimées, courbées en faucille, aiguës. Elle croît au pied du mont Atlas. 7.

77. ASTRAGALE à feuilles de frêne. *Astragalus fraxinifolius*. Decand.

Astragalus pedunculis folio aqualibus; foliis tredecim supernè glabris; leguminibus subtriquetris, arcuatis. Decand. Altr. pag. 177.

Astragalus orientalis, altissimus, fraxinifolia; flore à viridi-flavescente. Tournef. Coroll. 29.

Elle a le port de l'*astragalus glycyphyllos*; elle en diffère par les tiges hautes, redressées; par ses stipules conniventes; par ses folioles plus grandes, aiguës, au nombre de treize, glabres en dessus. Les fleurs font d'un jaune-verdâtre; les pédoncules de la longueur des feuilles; les gouffes presque trigones, arquées. Elle croît dans l'Orient. 7.

78. ASTRAGALE axillaire, n°. 2. *Astragalus christiannus*. Linn.

Astragalus floridus. Scopol. Infub. 1. pag. 108. n°. 23.

79. ASTRAGALE aggloméré. *Astragalus sivevenatus*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, foliolis oblongis, petiolatis; stipulis ovatis, acuminatis; pedunculis Boiss. Boiss. Supplément. Tome I.

multifloris, axillaribus, glomeratis; leguminibus ovatis, inflatis, tomentosus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1256. — Pall. Altr. pag. 15. tab. 12.

Cette espèce se rapproche de la précédente. Elle en diffère par ses folioles plus allongées; par ses stipules ovales, acuminées; par ses fleurs réunies en paquets agglomérés dans l'aisselle des feuilles. Les gouffes sont ovales, renflées, tomenteuses. Elle croît dans la Sibérie. 7.

80. ASTRAGALE à gros fruits. *Astragalus macrocarpus*. Decand.

Astragalus floribus glomeratis, subsessilibus, axillaribus; leguminibus glabris, inflatis, levis. Decand. Altr. pag. 179. tab. 28.

Son port est celui de l'*astragalus christiannus*; mais ses gouffes sont très-grosses, glabres, renflées; les fleurs axillaires, presque sessiles, agglomérées. Elle croît dans l'Orient. 7.

81. ASTRAGALE étranger. *Astragalus peregrinus*. Vahl.

Astragalus caulescens, erectus, spicis pedunculatis, longiusculis foliarum; leguminibus arcuatis, lanuginosis, stylatis. Vahl, Symb. 1. p. 57. — Pall. Altr. pag. 69. n°. 77. — Decand. Altr. pag. 178. tab. 27.

Cette espèce diffère des précédentes par ses fleurs disposées en épis pédonculés, de la longueur des feuilles. Les gouffes sont arquées, lanugineuses, mucronées. Elle croît dans l'Orient.

82. ASTRAGALE vulpin. *Astragalus vulpinus*. Willd.

Astragalus caulescens, erectus, foliis ellipticis, obtusis, villosis; stipulis lanceolatis; spicis ovatis, pedunculatis; calicinis dentibus capillaceis, lanatis, longitudine corollæ. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1259.

Astragalus alopecuroides. Pall. Altr. p. 9. tab. 7.

Orabus syriacus, hirsutus, magno flore. Moris. Hist. 2. pag. 98. §. 2. tab. 8. fig. 2.?

On distingue cette espèce à ses épis ovales, pédonculés, de la longueur d'une noix. Ses tiges sont droites, garnies de feuilles velues, composées de folioles elliptiques, obtuses; les stipules lancéolées; les calices velus, divisés en cinq dents linéaires, capillaires, lanugineuses, presque aussi longues que la corolle. Les gouffes, renfermées dans le calice, contiennent quatre semences.

Cette plante croît sur les collines sablonneuses de la Sibérie. 7.

83. ASTRAGALE queue de renard, n°. 1. *Astragalus alopecuroides*. Linn. — Pall. Altr. pag. 11. tab. 8.

T T T

8. *Astragalus narbonensis*. Gouan. — Pall. *Astr.* pag. 13. tab. 10. — Decand. *Astr.* pag. 147.

84. ASTRAGALE alopecie. *Astragalus alopecies*. Pallas.

Astragalus caulescens, erectus, florum capitulis axillaribus, sessilibus, cylindricis; leguminibus calice lanato inclusis, polygynis. Pallas, *Astr.* pag. 12. tab. 9. — Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1258.

Très-belle espèce, dont les tiges sont droites, hautes d'environ quatre pieds; les folioles velues, elliptiques; les stipules lancéolées; les épis épais, cylindriques, obtus, longs de trois ou quatre pouces, de la longueur des feuilles. Elle croît en Bérie, sur les bords du lac Alagut. x

85. ASTRAGALE à grosse queue. *Astragalus alopecurus*. Decand.

Astragalus (maximus), caulescens, erectus, foliis lanceolatis, pubescentibus; stipulis oblongo-lanceolatis; spica cylindrica, sessili, terminali; calicinis dentibus capillaceis, lanatis, corollâ brevioribus. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1258. — Decand. *Astr.* pag. 149.

Astragalus orientalis, maximus, glaber, alopecuroides, flore luteo. Tournef. *Coroll.* 29.

Cette espèce diffère de l'*Astragalus alopecuroides* par ses feuilles une fois plus étroites, oblongues-lancéolées, pubescentes; par ses stipules lancéolées & non ovales; par ses calices bien moins lanugineux, à dents plus courtes; par ses corolles beaucoup plus grandes que les calices.

Cette plante croît dans l'Orient. x

86. ASTRAGALE de Pont. *Astragalus ponticus*. Pallas.

Astragalus caulescens, erectus, foliis oblongis, emarginatis, subhirsutis; stipulis lanceolatis; spica globosa, sessilibus; calicibus cylindricis, lanatis; dentibus ovatis. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1259. — Pall. *Astr.* pag. 14. tab. 11.

8. *Astragalus orientalis, glaber, gaëta foliis; capitulis siccis sphaericis, ad alas positis*. Tournef. *Coroll.* 29.

Cet astragale a le port des précédens; il s'en distingue par ses tiges presque glabres, pubescentes à leur sommet; par ses feuilles légèrement hérissées, point velues; par ses calices cylindriques, à dents très courtes, ovales, aiguës. Dans la variété 8, les folioles sont glabres, plus longues, point échanrées.

Cette plante croît dans la Tauride, & la variété 8 dans l'Orient. x

87. ASTRAGALE cotonneux, n°. 18. *Astragalus*

tomentosus. Lam. — Decand. *Astr.* pag. 188. tab. 20.

Astragalus christiansii. Vahl, *Symb.* 1. pag. 57.

Astragalus (fruticosus), floribus axillaribus, subsessilibus. Forsk. *Flor. ægypt.-arab.* pag. 139.

B. Stipules adhérentes au pétiole.

* Pétioles ne devant point épineux.

88. ASTRAGALE ovale. *Astragalus ovasus*. Dec.

Astragalus caulescens, villosus, pedunculis folio longioribus, ovaris globosis. Decand. *Astr.* p. 212.

Astragalus latifolius, orientalis, capitulo oblongo, flore vario. Tournef. *Coroll.* 28.

Ses tiges sont diffuses, velues, couchées, herbacées; ses feuilles composées de dix à onze paires de folioles sessiles, ovales, obtuses, velues; les pédoncules plus longs que les feuilles; les fleurs surmâtes, réunies en un épi ovale, oblong; les bractées sétacées, velues, foliacées; le calice cylindrique, à cinq découpures linéaires, plumeuses; l'ovaire glabre, ovale.

Cette plante croît dans l'Arménie. x (Decand.)

89. ASTRAGALE à tête velue. *Astragalus dasyanthus*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, foliis ellipticis, obtusis, mucronatis, villosis; stipulis lanceolatis; spica subrotundo-capitata, pedunculatis; calicinis dentibus lanceolatis, leguminibusque ovato-lanceolatis, villosis. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 1260. — Pallas, *Astr.* pag. 69. tab. 65, & *Itin.* 3. Append. n°. 119. tab. G. 9. fig. 2.

Astragalus erioccephalus. Waldf. & Kitaib. *Plant. rar. Hung.* 1. pag. 45. tab. 46.

Toute la plante est pileuse. Ses tiges sont droites, quelquefois presque nulles; les folioles elliptiques, obtuses, velues, mucronées; les stipules lancéolées; les épis pédoncules, en tête arrondie; les dents du calice lancéolées; les gouffes resseies, ovales, lancéolées, velues. Dans la variété 8, qui croît en Hongrie, les tiges & les pédoncules sont rougeâtres.

Cette plante croît dans la Sibérie & sur le Caucase. x (P. f.)

90. ASTRAGALE d'Afrique. *Astragalus caprinus*. Linn. — Desfont. *Flor. atlant.* 2. pag. 181. — Poir. *Voyag. en Barb.* 2. pag. 217. — Decand. *Astr.* pag. 214.

91. ASTRAGALE porte-laine. *Astragalus lanigerus*. Desfont.

Astragalus acutis, villosissimus, canescens, scopo

brevissimo; leguminibus ovatis, inflatis. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 181. tab. 202. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1322. — Decand. Altr. pag. 215.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Astragalus exscapus*; mais ses folioles sont beaucoup plus petites; ses fleurs pédonculées; ses calices lanugineux; ses gouffes beaucoup plus grandes. Toute la plante est blanchâtre, très-velue. Elle croît dans les tables, sur la côte de Barbarie. (V. f. in herb. Desfont.)

92. *ASTRAGALE sans tige. Astragalus exscapus.* Linn.

Astragalus acaulis, foliolis oblongis, obtusis, pilosis; floribus subpedunculatis, aggregatis; calicibus adpresso-pilosis; leguminibus oblongis, lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1522. — Linn. Mantiss. 275. — Haller, Helv. n.º 415. — Pallas, Altr. pag. 78. tab. 64. — Decand. Altr. pag. 176.

Glaux montana, acaulis. C. Bauh. Pin. 347, & Prodr. 147.

Astragaloides sphilitica. Moench. Method. 168.

Ses racines sont épaisses & charnues; elles produisent plusieurs feuilles composées d'un grand nombre de folioles ovales, velues, obtuses. Les pédoncules sont très-courts, axillaires, velus, sortant de trois à huit fleurs assez grandes, d'un jaune-clair, disposées en épis; le calice velu, à cinq découpures étroites, velues; les gouffes ovales, sessiles, comprimées, à deux loges, contenant chacune trois à quatre semences.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, en Autriche, dans le Levant. (V. f.)

93. *ASTRAGALE à fleurs pubescentes. Astragalus pubiflorus.* Decand.

Astragalus subacaulis, floribus aggregatis, subsessilibus; alis pubescentibus; leguminibus sessilibus, lanatis. Decand. Altr. pag. 216.

Cette plante tient le milieu entre l'*Astragalus caprinus* & le *dasyanthus*; elle se distingue principalement par les ailes de la corolle, pubescentes en dehors. Ses tiges sont extrêmement courtes; ses fleurs jaunâtres, agrégées, presque sessiles; les gouffes sessiles & lanugineuses.

Cette plante croît dans la Sibérie. (V. f.)

94. *ASTRAGALE tragacanthoïde, n.º 39. Astragalus tragacanthoides.* Lam. (Excl. synonym. Tournef. ex Willd. (vide *Astragalum declinatum*), & synonym. Lobel. ex Decand. (vide *Astragalum utrigerum*, var. β .)

95. *ASTRAGALE à longues fleurs. Astragalus longiflorus.* Pall.

Astragalus acandis, foliolis ellipticis, revetis, sub-

pilosis; scapis racemosis, paucifloris, folio duplò brevioribus; leguminibus ellipticis, inflatis, acuminatis, glabris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1304. — Pall. Altr. pag. 73. tab. 60.

Astragalus pedunculis radicatis, unifloris aut bifloris, folio dimidio brevioribus; floribus longissimis; foliolis ovalibus, hirsutissimis. Gmel. Sibit. 4. p. 75. tab. 27.

Cette plante me paroît se rapprocher beaucoup de la précédente. Toutes ses feuilles sont radicales; les folioles elliptiques, obtuses, légèrement pileuses; les pédoncules très-courts ou allongés, selon les localités, plus ou moins velus; les fleurs jaunâtres, très-longues, peu nombreuses, réunies en grappe; les gouffes renflées, elliptiques, glabres, acuminées, à deux loges.

Cette plante croît dans la Grande-Tartarie & sur les monts Altaïques. (V. f.)

96. *ASTRAGALE utriculé. Astragalus utriger.* Pallas.

Astragalus acaulis, foliolis oblongis, acutis, pilosis; scapis racemosis, paucifloris, folio duplò brevioribus; leguminibus ellipticis, inflatis, acuminatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1305. — Pall. Altr. pag. 75. tab. 61.

Astragalus utriger (var. α , ovarus), foliolis ovatis, leguminibus hirsutis. Decand. Altr. pag. 217.

β . *Astragalus* (linearis), foliis linearibus, leguminibus subhirsutis. Decand. l. c.

Astragalus syriacus. Lobel. Icon. 2. tab. 79.

Ses racines produisent des feuilles composées de folioles oblongues, pileuses, aiguës. De la base des pétioles sortent des hampes une fois plus courtes que les feuilles, soutenant une petite grappe de fleurs jaunâtres. Les gouffes sont pubescentes, renflées, elliptiques, acuminées, presque uniloculaires. Dans la variété α , les folioles sont ovales, les gouffes hérissées. Dans la variété β , les folioles sont linéaires.

Cette plante croît sur les montagnes dans la Tartarie & en Syrie. (V. f.)

97. *ASTRAGALE ligneux. Astragalus lignosus.* Decand.

Astragalus caulescent, lignosus, cinereus, leguminibus villosis, compressis, sessilibus. Decand. Altr. pag. 218. tab. 59.

α . *Astragalus* (procerior), caule erecto, pedunculis brevibus. Decand. l. c.

β . *Astragalus* (minor), caule ferè nullo, pedunculis foliis subaequalibus. Decand. l. c.

Astragalus utriger, var. β . Pallas, Altr. pag. 76. tab. 62. fig. B.

Ses racines (ainsi que ses tiges lorsque cette plante en est pourvue) sont ligneuses; ses feuilles velues, composées d'un grand nombre de folioles petites, linéaires, obtuses, couvertes de poils cendrés. Les pédoncules sont très-courts dans la variété α , presque de la longueur des feuilles dans celle β . Les fleurs sont jaunâtres, droites, assez grandes; les calices très-hérissés; les gouffes velues, comprimées, sessiles.

Cette plante croît en Asie, dans la Syrie. γ (V. f. in herb. Desfont.)

98. ASTRAGALE douteux. *Astragalus dubius*. Decand.

Astragalus lignosus, exscapus, villosus-cinereus, leguminibus villosis, compressis, semi-bilocularibus, fissilibus. Decand. Altr. pag. 219.

β ? *Astragalus* (buchtormensis), acaulis, foliis oblongis, ovatis, pubescentibus; scapis subsimplicibus, folio duplo brevioribus, declinatis; leguminibus oblongis, acuminate. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1320. — Pall. Altr. pag. 76. tab. 62. fig. A.

Cette plante est ligneuse, couverte de poils cendrés, dépourvue de tiges; ses feuilles composées d'environ dix-neuf à vingt-une paires de folioles oblongues, obtuses, blanchâtres, pubescentes; les pédoncules très-courts, quelquefois recourbés après la floraison, n'ayant très-souvent que deux ou trois fleurs blanchâtres dans la variété α , jaunes dans celle β . Les gouffes sont comprimées, velues, sessiles, à deux demi-loges.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Tartarie. η

99. ASTRAGALE à feuilles de nummulaire, n°. 40. *Astragalus nummularius*. Lam. — Decand. Altr. pag. 221. tab. 11. fig. 2. — Vahl, Symb. 1. pag. 60.

100. ASTRAGALE grisâtre. *Astragalus cinerascens*. Decand.

Astragalus subcaulescens, cinereo-villosus, floribus subsessilibus aut pedunculatis, calicibus quinquelocatis, leguminibus semibilocularibus. Decand. Astrag. pag. 221.

α . *Astragalus* (radiciflorus), floribus radicalibus subsessilibus. Decand. l. c. tab. 40.

β . *Astragalus* (brevipes), floribus pedunculatis, capitatis; pedunculo foliis brevioribus. Decand. l. c. tab. 40. fig. 1.

γ . *Astragalus* (longipes), floribus pedunculatis, capitatis; pedunculo foliis longioribus. Decand. l. c. tab. 40. fig. 2.

Cette espèce, couverte de poils cendrés & grisâtres, varie dans ses proportions; tantôt ses

fleurs sont radicales, presque sessiles; tantôt elles sont pédonculées, ramassées en tête. Le pédoncule est, ou plus court, ou plus long que les feuilles. Quand il existe des tiges, elles sont courtes, ascendantes. Quelquefois les folioles sont plus petites & plus lâches; les fleurs d'un blanc-jaunâtre; les calices marqués de cinq lignes saillantes; les gouffes à demi biloculaires.

Cette plante croît dans la Sibérie. γ

101. ASTRAGALE à épis cylindriques. *Astragalus cylindraceus*. Decand.

Astragalus acaulis, incano-sericeus, foliolis elliptico-ovatis, spicis cylindraceis, bracteis calice longioribus. Decand. Altr. pag. 223.

Astragalus orientalis, foliis viciae incanis; caule nudo, erecto; floribus luteis. Tourn. Coroll. 28.

Ses racines produisent des feuilles couvertes d'un duvet d'un blanc-foyeux, composées de folioles ovales, elliptiques. Ses pédoncules se terminent par des épis cylindriques, chargés de fleurs jaunes, entre-mêlées de bractées plus longues que le calice.

Cette plante croît dans l'Orient. γ

102. ASTRAGALE globuleux. *Astragalus globosus*. Vahl.

Astragalus acaulis, scapis erectis, folio longioribus; capitulis globosis; bracteis linearibus, calicem aequantibus. Vahl, Symbol. 1. pag. 60. — Decand. Altr. pag. 224.

Astragalus orientalis, foliis viciae argenteis; caule nudo, erecto; floribus luteis. Tourn. Coroll. 28.

Il sort de ses racines des feuilles composées de folioles elliptiques, d'un blanc-argenté. Les pédoncules sont droits, plus longs que les feuilles, soutenant une tête globuleuse de fleurs jaunes, entre-mêlées de bractées linéaires, de la longueur du calice.

Cette plante croît dans le Levant. γ

103. ASTRAGALE houblon. *Astragalus lupulinus*. Pallas.

Astragalus acaulis, foliolis oblongis, emarginatis, canis; scapis erectis, folio brevioribus; floribus globoso-capitatis; calicibus fructiferis, globosis, inflatis, lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Altr. pag. 17. tab. 15. & Irin. 3. Append. n°. 121. — Decand. Altr. pag. 224.

Ses feuilles sont toutes radicales, composées de folioles oblongues, blanchâtres, pileuses, échan-crées; les pédoncules redressés, plus courts que les feuilles; ils soutiennent des fleurs jaunes, réunies en tête globuleuse. Les calices sont anguleux,

très-pileux, lanugineux, renflés à l'époque de la fructification.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses de la Sibirie. ♀

104. ASTRAGALE hérissé. *Astragalus hirsutus*. Vahl.

Astragalus acaulis, foliolis ellipticis, incanis; scapis erectis, folio longioribus; floribus globoso-capitatis; leguminibus ovatis, laciniis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1307. — Vahl, Symbol. 1. pag. 59.

Astragalus orientalis, candidissimus & tomentosus. Tournef. Coroll. 39.

Ses feuilles sont blanches, foyeuses, composées de quatre paires de folioles elliptiques, un peu aiguës; les stipules membraeuses, lacéolées; les pédoncules pubescens, cannelés, plus longs que les feuilles, soutenant des fleurs jaunes en épis, presqu'en tête; les calices velus, à cinq dents lancéolées. Les gouffes sont ovales, un peu arrondies, très-lanugineuses, plus grandes que le calice, à deux loges.

Cette plante croît dans le Levant. ♀

105. ASTRAGALE du Liban. *Astragalus libanotis*. Willd.

Astragalus acaulis, scapis folia aequantibus; floribus ovato-spicatis; leguminibus ovatis, triquetris, compressis, acutis, villosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1308.

Astragalus lanatus. Labill. Syr. 1. pag. 21. tab. 10. — Lam. ill. tab. 623. fig. 2.

Toutes les feuilles sont radicales, composées de cinq à onze paires de folioles ovales, romaneuses, sessiles. Les stipules sont pileuses, lancéolées; les pédoncules cylindriques, pileux, ascendants, de la longueur des feuilles; le calice oblong, tubulé, à cinq dents inégales; la corolle jaunâtre; les gouffes lanugineuses, à demi en cœur, trigones, un peu comprimées, à demi biloculaires, à deux valves.

Cette plante croît sur le mont Liban, où elle a été découverte par M. de Labillardière. ♀ (*V. f. in herb. Desfont.*)

106. ASTRAGALE en massue. *Astragalus clavatus*. Decand.

Astragalus subacaulis, incanus, foliolis rotundo-ovatis; leguminibus erectis, glabris, subclavatis, superne incurvis. Decand. Alt. pag. 230. tab. 44.

■ *Astragalus* (longibracteatus). Decand. l. c.

■ *Astragalus incanus, siliqua incurvâ, amplissimo folio*. Tournef.

3. *Astragalus* (brevibracteatus). Decand. l. c.

Astragalus cinereus, acaulis, foliolis elliptico-subrotundis, striceo-canis; scapis erectis, folio longioribus; floribus spicatis, cernuis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1315.

Astragalus orientalis, folio subrotundo, incano; flore ex viridi-flavescente.

Ses tiges sont très-courtes, presque nulles; ses feuilles composées d'environ six à huit paires de folioles ovales, arrondies, blanchâtres, luisantes, foyeuses, orbiculées, longues d'un demi-pouce; les stipules oblongues, acuminées; les pédoncules droits, plus longs que les feuilles, soutenant un épi oblong; les fleurs jaunâtres, inclinées; les bractées un peu arrondies, beaucoup plus petites & plus courtes dans la variété 3. Les gouffes sont droites, glabres, presqu'en massue, recourbées à leur partie supérieure.

Cette plante croît dans le Levant. ♀

107. ASTRAGALE recourbé. *Astragalus incurvus*. D. Sfont.

Astragalus acaulis, foliolis ellipticis, incanis; floribus capitatis; leguminibus erectis, arcuatis, glabris, incrassatis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 182. tab. 203.

Rapprochée de l'*Astragalus incanus*, cette espèce en diffère par les gouffes beaucoup plus épaisses. Ses feuilles sont composées de sept à douze paires de folioles serrées, blanchâtres, ovales ou elliptiques; les pédoncules striés, pubescens; les fleurs d'un pourpre-pâle, sessiles, ramassées en tête; le calice tubuleux, à cinq petites dents aiguës. Les gouffes sont droites, glabres, épaisses, arquées.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses, aux environs d'Alger. ♀ (*V. f. in herb. Desf.*)

108. ASTRAGALE blanchâtre, n°. 50. *Astragalus incanus*. Linn.

109. ASTRAGALE pendant. *Astragalus pendulus*. Decand.

Astragalus acaulis, incanus, foliolis rotundis, floribus pendulis. Decand. Alt. pag. 232.

Astragalus orientalis, folio subrotundo, canescente; flore purpureo, magno. Tournef. Coroll. 28.

Toute cette plante est blanchâtre, pubescente, dépourvue de tige; les folioles arrondies; les fleurs assez grandes, pendantes, de couleur purpurine. Elle croît dans l'Orient. ♀

110. ASTRAGALE à feuilles rondes. *Astragalus nummularoides*. Decand.

Astragalus (nummularius), *acaulis*, *foliis* *tri-*
lobato-orbiculatis, *incanis*; *pedunculis* *folio* *longio-*
ribus; *floribus* *capitis*; *leguminibus* *obtusis*, *tereti-*
bus, *striatis*. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 181. tab.
204. (Exclaf. synon. Lam. & Tourn.) — Decand.
Alfr. pag. 233.

Astragalus rotundifolius. Willkm. Spec. Plant.
3. pag. 1317.

Cette espèce se distingue de l'*Astragalus nummularius* par ses folioles blanchâtres, un peu elliptiques; par ses fleurs d'un rose-pâle, réunies en une tête un peu prolongée en épi; par ses gouffes courtes, foveuses, obtuses, sans pointe, ventruës. Elle a été découverte par M. Desfontaines dans les sables, proche Sibia, au royaume de Tunis. γ (V. f. in herb. Desfont.)

111. ASTRAGALE à grosses racines. *Astragalus macrorhizus*. Cav.

Astragalus acaulis, *foliolis* *ovatis*, *acutis*, *incanis*; *scapis* *folio* *longioribus*; *floribus* *spicatis*; *leguminibus* *obovatis*, *venericosis*, *pubescentibus*; *acuminate*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1317. — Can. var. Icon. 28. tab. 133.

Cet astragale se rapproche beaucoup du précédent. Il est remarquable par ses grosses racines; par ses gouffes surmontées d'une pointe courbée en hampe. Ses folioles sont ovales, blanchâtres, aiguës; les pédoncules plus longs que les feuilles; ses fleurs en épis; l'étendard de la corolle allongé, de couleur pourpre; les gouffes ventruës, en ovale renversé. γ Il croit en Espagne.

112. ASTRAGALE anguleux. *Astragalus angulosus*. Decand.

Astragalus acaulis, *incanus*, *foliolis* *ovatis*, *micranatis*; *leguminibus* *glabrisculis*, *patulis*, *subtri-*
gonis. Decand. Alfr. pag. 234. tab. 45.

Ses feuilles sont radicales, blanchâtres, composées de neuf à treize folioles ovales, mucronées; les fleurs purpurines, sessiles, distantes, disposées en un épi lâche; les gouffes étalées, presque glabres, un peu trigones.

Cette plante a été recueillie en Syrie par M. de Labillardière. γ (V. f. in herb. Desf.)

113. ASTRAGALE à feuilles larges, n°. 53. *Astragalus latifolius*. Lam. — Decand. Alfr. pag. 23. tab. 24. fig. 1, 2.

114. ASTRAGALE de Montpellier, n°. 51. *Astragalus monspeliensis*. Linn. — Desf. Flor. atlant. 2. pag. 181. — Curt. Bot. Magaz. tab. 219. — Scop. Carn. 2. pag. 77. tab. 45.

115. ASTRAGALE allongé. *Astragalus elongatus*. Willd.

Astragalus acaulis, *foliolis* *ellipticis*, *acutis*, *can-*
o-pubescentibus; *scapis* *racemosis*, *erectis*, *folio* *longio-*
rioribus; *leguminibus* *oblongis*, *duris*, *acutis*, *pendu-*
lis, *pendulis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1314.

Ses feuilles, longues d'un demi-pied, sont composées d'environ quatre paires de folioles blanchâtres, pubescentes, elliptiques, aiguës, couvertes de poils couchés; la foliole terminale pétiolée; les stipules velues, ovales, acuminées; les hampe longues d'un pied, légèrement pileuses, pointuées; les gouffes pileuses, oblonges, pendantes, très-dures, mucronées, à deux loges.

Cette plante croit dans la Galatie. γ (Willd.)

116. ASTRAGALE à gouffes laineuses. *Astragalus eriocarpus*. Decand.

Astragalus acaulis, *foliolis* *leguminibus* *villosis*, *venillo* *longissimo*. Decand. Alfr. pag. 237. tab. 47.

Ses feuilles sont toutes radicales, composées de dix à treize paires de folioles velues; les fleurs purpurines, droites, sessiles, très-fermées, réunies en un épi oblong; l'étendard de la corolle très-allongé; les gouffes velues. On ignore le lieu natal de cette plante. (Decand.)

117. ASTRAGALE pied de lièvre. *Astragalus lagurides*. Pall.

Astragalus acaulis, *foliolis* *lanceolatis*, *canis*; *scapis* *ascendentibus*, *folio* *brevioribus*; *floribus* *globosis* *capitis*; *calicibus* *fructiferis*, *globosis*, *inflatis*, *pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1309. — Pall. Jun. 4. Append. n°. 120. tab. CC. fig. 3. — Decand. Alfr. pag. 238.

Astragalus lagurus. Pall. Alfr. pag. 18. tab. 16.

Cette plante est couchée, étalée, pileuse, formée de tiges; ses feuilles composées de folioles blanchâtres, lanceolées; les pédoncules ascendants, plus courts que les feuilles, soutenant une tête globuleuse de fleurs purpurines; les gouffes sont renfermées dans le calice renflé, pubescent, globuleux. Elle croit dans la Sibérie, aux lieux arides. γ

118. ASTRAGALE à vessies. *Astragalus physodes*. Pall.

Astragalus acaulis, *foliolis* *ovatis*, *glaucescentibus*; *scapis* *folio* *longioribus*; *floribus* *capitis*; *leguminibus* *inflatis*, *globosis*, *membranaceis*, *glabris*. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1303. — Mill. Dict. n°. 9. — Pall. Itin. 2. pag. 474. & Alfr. pag. 71. tab. 58. — Decand. Alfr. pag. 239. tab. 48.

Astragalus (Wolgensis), *foliolis* *oblongis*, *scapis* *declinatis*. Pall. l. c. tab. 58. fig. A.

Astragalus (tauricus), *magis* *caulescens*, *foliolis* *ovalibus*, *numcrorioribus*; *scapo* *recto*. Pallas, l. c. B. fig. 1.

7. *Astragalus* (altaicus), *foliolis angustioribus*, *numerosioribus*; *scapis erectis*, *folio longioribus*. Pall. | c. fig. 2.

8. *Astragalus* (lascyrrus), *leguminibus lanatis*. Decand. Altr. pag. 241.

Cette plante, très-variable, a ses folioles ovales, un peu glauques; ses pédoncules plus longs que les feuilles; les fleurs purpurines, ramassées en tête; ses gouffes glabres, renflées, globuleuses; les coques membraneuses. Dans la variété « la plante est plus grêle; les folioles oblongues, au nombre de treize à dix-sept; les pédoncules inclinés. La variété « est pourvue d'une tige courte, de folioles ovales, très-nombreuses. Les pédoncules sont droits; ils sont plus longs que les feuilles dans la plante 7; les feuilles plus étroites, très-nombreuses. La variété 8, qui est peut-être une espèce distincte, a des gouffes pubescentes.

Cette plante croît dans la Sibérie & dans la Chersonèse taurique. 7

119. ASTRAGALE testiculé. *Astragalus testiculatus*. Pall.

Astragalus acutis, *foliolis lanceolatis*, *sericeo acutis*; *floribus calicibus subsessilibus*, *aggregatis*; *leguminibus ovatis*, *ventricosis*, *albo-tomentosis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1320. — Pall. Altr. pag. 82. tab. 67.

Astragalus subcaulis, *floribus radicatis*, *numerosis*, *subsessilibus*. Gmel. Sibit. 4. pag. 52. (Exclus. variet. & synonym. Boiss.)

Ses folioles sont lancéolées, couvertes d'un duvet blanchâtre & soyeux; les fleurs raciales, presque sessiles, agrégées, assez nombreuses; les fleurs purpurines; les ailes bordées à leur sommet; les gouffes ovales, ventrues, blanches, cotonneuses. Elle croît sur les bords de la mer Caspienne, dans les sables limoneux. 7

120. ASTRAGALE à courte carène. *Astragalus brevicarinatus*. Decand.

Astragalus acutis, *pubescens*, *scapis subrefloris*; *foliis brevioribus*, *calice semiquinquefid.*, *carinâ brevissimâ*. D. cand. Altr. pag. 224. tab. 49.

Cette plante est toute pubescente, sans tiges; ses folioles au nombre de onze; de leur centre s'élèvent quelques pédoncules plus courts que les feuilles; munis de deux ou trois fleurs terminales. Le calice est à demi divisé en cinq dents; la corolle purpurine; la carène très-courte; les gouffes oblongues, hérissées, comprimées. Elle croît dans la Sibérie. 7 (Decand.)

121. ASTRAGALE percepierre. *Astragalus rupe-fugus*. Pall.

Astragalus acutis, *foliolis oblongis*, *obtusis*, *piloso-pubescentibus*; *floribus breviter pedunculatis*, *aggregatis*; *leguminibus oblongis*, *acutis*, *lanatis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1320. — Pall. Altr. pag. 86. tab. 70.

Ses folioles, au nombre de vingt, sont oblongues, obtuses, pileuses, pubescentes; ses pédoncules très-courts, presque nuls; les fleurs purpurines, agrégées, ramassées en tête; les calices inégalement dentés; les gouffes ovales oblongues, presque trigones, lanugineuses.

Cette plante croît sur les rochers arides de la Tauride. 7

122. ASTRAGALE à feuilles de dolichos. *Astragalus dolichophyllus*. Pall.

Astragalus (diffusus), *acutis*, *foliolis lanceolatis*, *acutis*, *piloso-pubescentibus*, *sericeo subsessilibus*, *aggregatis*; *calicibus dentibus subulatis*, *pilosis*; *leguminibus oblongis*, *suaviteris*, *lanatis*. Willd. n. Spec. Plant. pag. 1321. — Pallas, Altr. pag. 84. tab. 68.

Ses racines produisent des feuilles composées de folioles lancéolées, pileuses, aiguës, pubescentes. Les pédoncules sont très-courts, presque nuls; les fleurs pâles, agrégées; les dents du calice subulées, pileuses; les gouffes oblongues, trigones, lanugineuses.

Cette plante croît dans la Grande-Tartarie & sur les bords de la mer Caspienne. 7

123. ASTRAGALE galactite. *Astragalus galactites*. Pall.

Astragalus acutis, *foliolis oblongis*, *acutis*, *subsericeis*; *floribus subsessilibus*, *aggregatis*; *leguminibus ovatis*, *dispermis*, *calice inclis.* Willd. Spec. Plant. pag. 1321. — Pall. Altr. pag. 88. tab. 69.

Astragalus repens, *herba Jovis*, *acutis*, *semit polyanthos*. Amm. Rurh. 120.

Ses folioles sont oblongues, aiguës, un peu blanchâtres, soyeuses, au nombre de quinze; les fleurs d'un blanc de lait, agrégées, presque sessiles; le calice velu; les gouffes ovales, petites, renfermées dans le calice, à deux semences. Elle croît dans la Sibérie. 7

124. ASTRAGALE noirâtre. *Astragalus nigrescens*. Pall.

Astragalus procumbens, *subcaulescens*, *stipulis calicibusque nigro-villosis*; *pedunculis avicularibus*, *bifloris*; *leguminibus maximis*, *oblongo-inflatis*, *pubescentibus*, *unilocularibus*. Pall. Altr. pag. 65. tab. 53. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1293. — Decand. Altr. pag. 247.

Ses racines produisent plusieurs tiges très-cour-

tes & couchées. Ses feuilles sont composées de quatre ou cinq paires de folioles oblongues, hérissées de poils blancs. Ils sont noirs sur les stipules & les calices. Les pédoncules sont axillaires, plus courts que les feuilles, terminés par deux fleurs violettes. Les gouffes sont grandes, longues d'un pouce, oblongues, renflées, aiguës, à une seule loge, couvertes d'un duvet brun.

Cette plante croît dans la Russie. γ

125. ASTRAGALE à tige courte. *Astragalus pumilio*. Pall.

Astragalus subcoulescens, prostratus, foliis linearilanceolatis, subtus canis; pedunculis brevissimis, bifloris, folio brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1297. — Pall. Astr. pag. 67. tab. 55. — Decand. Astr. pag. 242.

Cette espèce a une tige couchée, très-courte. Ses feuilles sont composées de quatre paires de folioles petites, linéaires-lancéolées, blanchâtres en dessous; les pédoncules plus courts que les feuilles, terminés par deux fleurs purpurines, assez grandes. Elle croît dans les îles Canaries. γ

126. ASTRAGALE uniflore. *Astragalus uniflorus*. Decand.

Astragalus subcaulis, lignosus, glaber, stipulis vaginatis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus. Decand. Astr. pag. 244. tab. 50.

Ses tiges sont ligneuses, très-courtes, nombreuses; ses feuilles glabres; les fleurs axillaires, solitaires, presque sessiles. Elle croît sur les hautes montagnes du Pérou. γ

127. ASTRAGALE pygmée. *Astragalus pygmaeus*. Pall.

Astragalus coulescens, prostratus, leguminibus exscapis, solitariis, oblongo-acuminatis, inflores, unicellularibus. Pallas, Astr. pag. 66. n°. 54. — Decand. Astr. pag. 244. — Willd. Spec. Plant. 3. p. 1298.

Cette plante est fort petite; ses tiges couchées, très-courtes; les folioles plicées, lancéolées; les fleurs presque sessiles, solitaires, axillaires; les gouffes oblongues, lancéolées, pubescentes, acuminées, renflées, à une seule loge. Elle croît dans la Sibérie. γ

* Pétales piquants, ressemblant à des épines, persistants après la chute des folioles. TRAGACANTHA. Tournef.

128. ASTRAGALE trigone. *Astragalus trigonus*. Decand.

Astragalus floribus solitariis, substipulis non latens; leguminibus trigonis, acuminatis. Decand. Astr. pag. 186.

Tragacantha aegyptia, minor, argentea, folio pu-

milo, lacteo flore; stipula trigona, pyramidal. Lippi. — Herb. Vaill.

Les tiges sont ligneuses, épaisses, rameuses; les rameaux courts, ramifiés en gazons lanugineux; les pétioles durs, ligneux, anguleux, garnis de petites folioles ovales, blanchâtres, lanugineuses, caduques. Les fleurs sont jaunes, sessiles, solitaires, axillaires; le calice cylindrique & pubescent; la corolle obtruse, de la longueur des ailes; les gouffes droites, trigones, pubescentes, à deux loges; trois petites semences noires dans chaque loge.

Cette plante croît en Égypte. γ

129. ASTRAGALE à fruit caché. *Astragalus cryptocarpus*. Decand.

Astragalus floribus solitariis, axillaribus, latens; foliis stipulisque glabris; leguminibus ovatis, hispidis. Decand. Astr. pag. 187.

Tragacantha orientalis, humillima, foliis vicia, costa purpurea inassensibus. Tournef. Coroll. 29.

Cette espèce a des tiges courtes, glabres, ligneuses; des folioles linéaires, aiguës, très-glabres. Les fleurs sont solitaires, sessiles, axillaires; les gouffes petites, ovales, cachées sous les stipules, velues, à deux loges; les semences petites, solitaires dans chaque loge. Elle croît en Arménie. γ

130. ASTRAGALE barbe de Jupiter. *Astragalus barba Jovis*. Decand.

Astragalus (microcephalus), frutescens, petiolis spiniscentibus; foliis quadrijugis; foliolis lanceolatis, inconnis, mucronatis; floribus axillaribus, sessilibus, subcapitatis; calicibus lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1332. — Decand. Astr. pag. 188.

Tragacantha orientalis humillima, argentea, barba Jovis folio. Tourn. Coroll. 29.

Ses tiges sont ligneuses, diffuses, très-rameuses, longues d'environ un demi-pied; les feuilles composées d'environ quatre paires de folioles lancéolées, blanches & tomentueuses à leurs deux faces, mucronées à leur sommet; les fleurs sessiles, axillaires, placées vers le sommet des rameaux, & formant, par leur rapprochement, une petite tête. Le calice est très-lanugineux, à cinq dents courtes.

Cette plante croît dans le Levant. γ

131. ASTRAGALE à calice laineux. *Astragalus erianthus*. Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spiniscentibus; foliis subquinquejugis; foliolis oblongis, acutis, glabris; floribus axillaribus, sessilibus, aggregatis; calicibus globosis, lanatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1332.

Cette espèce est remarquable par ses calices globuleux, couverts d'une laine blanche très-épaisse.

Ses

Ses tiges sont ligneuses ; ses pétioles jaunâtres , très-roulés , persians , épineux , chargés d'environ cinq paires de folioles glabres , oblongues , aiguës à leurs deux extrémités . Les fleurs sont nombreuses , sessiles , agrégées dans l'aisselle des feuilles .

Cette plante croît dans le Levant. \bar{h}

132. ASTRAGALE à tête laineuse. *Astragalus sericeocephalus*. Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spiniferentibus ; foliis subseptemjugis ; foliolis lanceolatis , villosis ; floribus globosis capitatis ; calicinis dentibus filiformibus , lanato-plumosis , corollam aequantibus . Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1333.

An astragalus breviflorus ? Decand. Alfr. pag. 154. tab. 31.

Tragacantha orientalis, foliis angustissimis , capitulo purpureo . Tournef. Coroll. 30.

Ses tiges sont ligneuses ; ses pétioles épineux ; ses feuilles composées de six à huit paires de folioles étroites , lancéolées , blanchâtres , velues , légèrement calleuses & mucronées à leur sommet . Les fleurs sont réunies en une tête globuleuse ; la corolle purpuree , les calices de la longueur de la corolle , couverts de poils plumeux .

Cette plante croît dans le Levant. \bar{h}

133. ASTRAGALE plumeux. *Astragalus plumosus*. Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spiniferentibus ; foliis quadrijugis ; foliolis sericeo-incanis , lanceolatis ; floribus capitatis ; calicinis dentibus filiformibus , lanato-plumosis , corollam brevioribus . Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1333.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles composées de quatre à cinq paires de folioles plus étroites , soyeuses , blanchâtres ; par ses têtes de fleurs plus épaisses , de la grosseur d'une petite poignée ; par ses corolles plus grandes ; par les calices moins lanugineux , à dents plumeuses . Elle croît dans le Levant. \bar{h} Willd.

134. ASTRAGALE gommier. *Astragalus gummifer*. Labill.

Astragalus frutescens, petiolis apice spinosis ; foliolis ovato-lanceolatis , glabris ; floribus sessilibus , in cylindrum dispositis ; comâ foliacâ . Labill. Journ. Phys. 1790. pag. 53. tab. 1. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1331.

g. Astragalus (hispidulus), foliolis pilis albis , rariusculis , hispidis . Decand. Alfr. pag. 190.

On la distingue des précédentes par ses fleurs jaunes , sessiles , réunies en un épi cylindrique & feuillé . Ses folioles , au nombre de treize ou en- Botanique. Supplément. Tome 1.

viron , sont glabres , ovales-lancéolées , un peu obtuses ; elles sont couvertes de quelques poils blancs dans la variété \bar{g} , & couverte en Perle par Michaux . Cette plante a été recueillie sur le mont Liban par M. de Labillardière . Elle produit une gomme jaunâtre , inférieure à la gomme adragan.

135. ASTRAGALE du Caucase. *Astragalus caucasicus*. Pall.

Astragalus frutescens, petiolis spiniferentibus ; foliis subseptemjugis ; foliolis lanceolatis , mucronatis , hirsutis ; floribus axillaribus , geminatis , sessilibus ; calicibus campanulatis , dentibus lanceolatis . Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1331. — Pall. Alfr. pag. 2. tab. 2.

Ses tiges sont ligneuses ; ses feuilles vertes , composées d'environ sept à huit paires de folioles hérissées , lancéolées , mucronées par une pointe forte ; les pétioles d'un jaune de pourpre ; les fleurs blanches , sessiles , axillaires , geminées ; les calices campanulés , à cinq dents , lancéolés . Les gouffes contiennent quatre semences . Elle croît sur le Caucase. \bar{h}

136. ASTRAGALE à fleurs compactes , n°. 64. *Astragalus compactus*. Lam. — Willd. Alfr. Berol. 1794. pag. 29. tab. 1. fig. 1. — Decand. Alfr. pag. 190. tab. 32. fig. 2.

137. ASTRAGALE à longues feuilles , n°. 65. *Astragalus longifolius*. Lam. — Decand. Alfr. pag. 192. tab. 30.

138. ASTRAGALE en boule. *Astragalus pugniformis*. Lhérit.

Astragalus frutescens, petiolis spiniferentibus ; foliis decemjugis ; foliolis oblongis , mucronatis , glabris ; floribus globosis capitatis ; calicinis dentibus linearilanceolatis , lanuginosis . Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1334. — Lhérit. Stirp. 170.

Astragalus longifolius. Willd. Alfr. Berol. 1794. pag. 30. tab. 1. fig. 1.

Tragacantha orientalis, foliis oleis , humillimis floribus in capitulum congestis . Tournef. Coroll. 30.

Tragacantha orientalis. Poir. K. lein. 3. pag. 276. tab. 88.

Cette plante ressemble à l'*Astragalus longifolius*. Ses paquets de fleurs sont plus épais , presque de la grosseur du poing ; ses folioles plus larges , oblongues , au nombre de huit ou dix paires au plus ; les calices recouverts d'un duvet lanugineux , dense , entre mêlé ; les dents linéaires-lancéolées , lanugineuses . Elle croît dans la Palestine , la Syrie , &c. \bar{h}

139. ASTRAGALE à feuilles d'olivier. *Astragalus oleifolius*.

Astragalus floribus aggregatis, circa caulem dispositis; foliis subglabris, glaucescentibus. Decand. Altr. pag. 192.

Elle a de très-grands rapports avec les deux précédentes, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses feuilles sont glauques, presque glabres; ses fleurs disposées presque en anneau & agrégées autour des tiges. Elle croit dans le Levant. η

140. ASTRAGALE jaune d'or. *Astragalus aureus.* Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spinifolius; foliis suboppositis; foliolis linearis-lanceolatis, glabrisculis; floribus globoso-capitatis; calicinis densibus subulatis, villosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1333, & Aët. Berol. 1794. pag. 29. tab. 1. fig. 3. — Decand. Altr. pag. 195. tab. 32. fig. 1.

Tragacantha orientalis, humilis, floribus luteis, densè congestis infoliorum alis. Tournef. Coroll. 29.

Ses tiges sont courtes, ligneuses; ses pétioles épineux, garnis d'environ six paires de folioles linéaires-lancéolées, presque glabres; les fleurs d'un jaune-doré, réunies en tête globuleuse; les calices velus, à cinq dents subulées. Elle croit dans le Levant. η

141. ASTRAGALE de Crète, n°. 62. *Astragalus creticus.* Lam. — Decand. Altr. pag. 196. tab. 33. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1330.

142. ASTRAGALE oursin. *Astragalus echinoides.* Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spinifolius; foliolis linearis-lanceolatis, canis; pedunculis bifloris, folio brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1326. — Lhérit. Stirp. 170.

Astragalus creticus. Willd. Aët. Berol. 1794. pag. 23. tab. 2. fig. 2. (Exclus. synonym. Tourn. & Lam.)

Tragacantha cretica, foliis minimis, incanis; flore majore albo. Tournef. Coroll. 29.

An tragacantha altera? Prosp. Alp. Exot. pag. 55. tab. 54.

Cette espèce est caractérisée par ses pédoncules plus courts que les feuilles, soutenant deux fleurs blanches assez grandes; l'étendard ample, marqué de lignes rougeâtres. Les calices sont tubulés, chargés de poils couchés; les folioles petites, linéaires, lancéolées, blanchâtres, soyeuses; les riges courtes, ligneuses, étalées. Elle croit dans l'île de Crète. η

143. ASTRAGALE hérissée. *Astragalus echinus.* Decand.

Astragalus floribus aggregatis, axillaribus; calicibus

quinq. dentatis, corollâ brevioribus. Decand. Altr. pag. 197. tab. 34.

Echinus, seu alia tragacantha. Prosp. Alp. Exot. pag. 57. tab. 56.

Elle diffère de la précédente par ses fleurs sessiles & par les calices lanugineux. Ses tiges sont très-courtes, en gazon, hérissées d'épines; les folioles glabres; les folioles petites, au nombre de huit à dix paires, oblongues, linéaires, aiguës, blanchâtres, velues; les fleurs axillaires, agrégées, presque cachées par les folioles; les bractées glabres & membracées; le calice plus court que la corolle, à cinq découpures droites, velues, rapprochées.

Cette plante croît dans le Levant, d'où elle a été rapportée par M. de Labillardière. η (*V. f. in herb. Desf.*)

144. ASTRAGALE du mont Olympe. *Astragalus olympicus.* Pall.

Astragalus (leucophyllus), frutescens, petiolis spinifolius; foliis sexjugis; foliolis oblongis, obtusifolius, incanis; floribus terminalibus, subsessilibus; calicibus tubulosis, densibus ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 331. — Pallas, Altr. pag. 4. tab. 4. fig. 3.

Ses tiges sont ligneuses, très-rameuses. Les rameaux noircissent en vieillissant; ils sont chargés de six à sept paires de folioles oblongues, velues, blanchâtres, un peu obtuses. Les fleurs sont blanches, axillaires, situées vers l'extrémité des rameaux, médiocrement pédonculées; les calices tubulés & soyeux; les gouffes cylindriques, mucronées.

Cette plante croît en Arménie & sur le mont Olympe. η

145. ASTRAGALE de Grewade, n°. 61. *Astragalus granatensis.* Lam.

Astragalus potiorum. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1327, & Aët. Berol. 1794. pag. 22. — Vahl, Symb. 1. pag. 63. — Pallas, Altr. pag. 1. tab. 1. 2.

Astragalus tragacantha, var. p. Linn. Spec. 1073.

146. ASTRAGALE de Marseille, n°. 29. *Astragalus Massiliensis.* Lam. — Decand. Altr. pag. 201.

Astragalus tragacantha. Linn. Spec. 1073. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 189. — L'edw. Est. tab. 74. — Vahl, Symb. 1. pag. 63. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1325, & Aët. Berol. 1794. pag. 21. tab. 1. fig. 5.

Ce n'est point de cette espèce qu'on retire la gomme adragan, mais de l'astragale de Crète.

147. ASTRAGALE toujours vert. *Astragalus sempervirens.* Lam.

Astragalus aristatus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1328, & Act. Berol. 1794. pag. 25. — Lhérit. Stirp. 170.

Astragalus pseudo-tragacantha. Pall. Astr. pag. 3. tab. 3.

Astragalus tragacantha, var. β . Get. Prov. 523. n°. 11. — Gatid. Aix, pag. 469. tab. 104.

Phaca tragacantha. Allioni, Flor. pedem. n°. 1257.

Tragacantha sive hirci spina. Dodon. Pempt. 751. Icon.

Tragacantha primum. Tabern. 2. pag. 245.

148. ASTRAGALE à feuilles étroites. *Astragalus angustifolius*. Lam. — Willd. Spr. Plant. 3. pag. 1324, & Act. Berol. 1794. pag. 25.

149. ASTRAGALE piquant. *Astragalus pungens*. Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spinescentibus; foliis oblongis, sericeis; pedunculo foliis longiore; floribus spicatis, densibus calicibus subulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1325.

An *Astragalus bracteolatus*? Decand. Astr. pag. 108.

Tragacantha humillima, se spargens, floribus spicatis. Tournef. Coroll. 29.

Cet astragale diffère du précédent par ses feuilles beaucoup plus grandes, par ses fleurs en épi, par les pédoncules plus longs que les feuilles; il se rapproche de *Astragalus tragacantha*; mais ce dernier a ses folioles plus larges, ses pédoncules de la longueur des feuilles; les dents du calice courtes, ovales & non lancéolées, subulées comme dans celui-ci, qui forme un petit arbrisseau haut d'un demi-pied. Ses folioles, au nombre de sept à huit paires, sont blanchâtres, soyeuses, ovales-oblongues, aiguës, rétrécies à leur base; les pédoncules chargés de huit à dix fleurs blanches, assez grandes; les bractées lancéolées, plus courtes que le calice; celui-ci chargé de poils blancs & noirs.

Cette plante croît dans le Levant. γ (Willd.)

150. ASTRAGALE rétus. *Astragalus retusus*. Willd.

Astragalus floribus subspicatis, calicibus cylindricis; bracteis membranaceis, ovatis; foliis quindecimjugis. Decand. Astr. pag. 205. tab. 35. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1326, & Act. Berol. 1794. pag. 24. tab. 2. fig. 3.

Tragacantha orientalis, erectior, foliis vicia glabris & ramis tomentosus. Tournef. Coroll. 29.

Ses folioles, moins blanches que celles de l'*Astragalus tragacantha*, sont ovales, légèrement réticulées, au nombre de trente; les fleurs peu nombreuses, presque disposées en épi; leut calice cylindrique, couvert de poils blancs & noirs, à cinq dents lancéolées; les bractées ovales, membraneuses; les stipules velues, acuminées, ovales; la corolle violette; l'étendard allongé; les tiges courtes & ligneuses.

Cette plante croît dans le Levant. γ

151. ASTRAGALE amer. *Astragalus amarus*. Pallas.

Astragalus suffruticosus, per o'is spinescentibus; foliolis ovatis, glabris; floribus spicatis, leguminibus falcatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1328. — Pallas, Astrag. pag. 8. tab. 6. — Decand. Astrag. pag. 248.

Quoiqu'ayant tous les caractères des astragales, cette plante s'en éloigne par les examens linéaires, & sous ce rapport, elle paraitroit devoir former un genre particulier. Ses racines sont ligneuses; mais les tiges sont herbacées, longues d'environ un demi-pied; ses feuilles glabres, composées de folioles ovales, obovées; les fleurs disposées en épis axillaires, filiformes, de la longueur des feuilles; les gouffes oblongues, presque nigones, courbées en faucille.

Cette plante croît vers la mer Caspienne, sur les collines gypseuses d'Arslanar. γ

152. ASTRAGALE renflé. *Astragalus tumidus*. Willd.

Astragalus frutescens, petiolis spinescentibus, foliis sexjugis; floribus subsolitaris, pedunculis; calicibus fructiferis, inflatis, villosis, setaceo-dentatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1329. — Ait., Oryctog. Astrag. 177. tab. 2. fig. 2.

Astragalus Rauswolfii. Vahl, Symb. 1. pag. 63.

Tragacantha orientalis, vesicaria, erectior, caule ab imo ad summum florido. Russel. Alepp. tab. 5.

Colatze spinosa. Forskhal, Flor. aegypt.-arab. pag. 151.

Ses tiges sont diffusées, ligneuses, très-rameuses, hautes d'environ un pied & plus; les rameaux tomenteux dans leur jeunesse; les feuilles composées de quatre ou six paires de folioles oblongues, blanchâtres, principalement en dessous; les pétioles tomenteux; les stipules ovales, lancéolées, membraneuses; les pédoncules unijugés; les fleurs d'un blanc-jaunâtre; les calices cylindriques, puis enflés, velus, à cinq dents étacées, renfermant une gouffe à trois semences.

Cette plante croît dans l'Égypte, la Syrie & l'Arabie. γ

Observations. Willdenow pense que l'*anthyllis tragacanthoides* (Lubill. non Desfont.), voisine de l'espèce précédente, doit appartenir aux astragales; il la nomme *astragalus calceoides*. Ses folioles sont ovales, oblongues, orbifères, tomenteuses; ses calices rentés & velus. Ses gouffes contiennent deux ou trois semences.

153. ASTRAGALE à épi velu, n°. 66. *Astragalus logopodioides*. Lam.

Astragalus lagurus. Willd. Act. Berol. 1794. pag. 28. tab. 1. fig. 2, & Spec. Plant. 3. pag. 1324.

g. Lam. — *Astragalus logopodioides*. Willd. Act. Berol. 1794. pag. 28. tab. 1. fig. 4. — Vahl, Symb. 1. pag. 64. — Decand. Altr. pag. 209.

154. ASTRAGALE à gaines. *Astragalus vaginans*. Decand.

Astragalus floribus spicatis, petiolis subinermibus; stipulis acuminatis, longis, vaginantibus. Decand. Altr. pag. 210 tab. 37.

Astragalus orientalis, flore ochroleuco. Vaillant, Herb.

Cette espèce est remarquable par les longues gaines des stipules qui enveloppent les tiges. Ces tiges sont droites & glabres; les folioles au nombre de huit à dix paires, pédicellées, oblongues, caduques, pubescentes en dessous, terminées par une longue pointe roide; les pedoncules velus, cylindriques, beaucoup plus longs que les feuilles; les fleurs jaunâtres, nombreuses, ramassées en un épi ovale. L'érendard est grand, légèrement échancré; les ailes plus courtes, pédicellées; l'ovaire velu, ovale, acuminé.

Cette plante croît dans le Levant. (Decand.)

155. ASTRAGALE à tête épaisse. *Astragalus cephalanthus*. Decand.

Astragalus floribus capitatis, petiolis subinermibus, calicibus fidentatis. Decand. Altr. pag. 211. tab. 38.

Ses pétioles ne deviennent que médiocrement épineux. Ses feuilles sont composées de quatorze à quinze paires de folioles presque opposées, oblongues, aiguës, blanchâtres; les pedoncules près, une fois plus longs que les feuilles; les fleurs purpurines, réunies en une tête épaisse, globuleuse; les calices à six dents.

Cette plante croît dans la Perse. (Decand.)

* * OXYTROPIS. Carène mucronée ou prolongée au sommet en une pointe droite.

A. Stipules non adhérentes aux pétioles.

156. ASTRAGALE velu, n°. 3. *Astragalus pilosus*. Linn. — Pall. Altr. tab. 80.

Oxytropis pilosa. Decand. Altr. pag. 91.

157. ASTRAGALE à gouffes arrondies. *Astragalus teres*.

Astragalus (oxytropis) teres, caulescens, erectus, serotinus, leguminibus erectis, serotinis, glabris. Decand. Altr. pag. 92.

Cette plante a des tiges droites, presque glabres, des feuilles légères et pubescentes en dessous, composées de folioles pédicellées, oblongues, aiguës; les pedoncules axillaires, pubescents, deux & trois fois plus longs que les feuilles; les fleurs disposées en épis lâches, redressés, les bractées linéaires, de la longueur des pédicelles; les gouffes glabres, peu nombreuses, cylindriques, mucronées & recourbées à leur sommet, redressées, à deux loges; plusieurs semences oblongues, réniformes.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Decand.)

158. ASTRAGALE de Pallas. *Astragalus Pallasii*.

Astragalus (lanatus), caulescens, prostratus, villosopubescent, pedunculis ubique axillaribus, foliis aquantibus; leguminibus subulato-acuminatis, villosis. Pall. Altr. n°. 115. tab. 81. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1276.

Oxytropis Pallasii. Decand. Altr.

Astragaloides montana, incana, major, flore albo. Bartel. Icon. Rat. 557.

Ses tiges sont couchées, velues & pubescentes; les folioles ovales-oblongues, un peu orbifères, blanchâtres, pubescentes; les pedoncules axillaires, de la longueur des feuilles, point inclinés; la corolle d'un blanc-jaunâtre, assez grande; les gouffes velues, subulées, acuminées.

Cette plante croît dans la Sibérie.

159. ASTRAGALE mille-fleur. *Astragalus floribundus*. Pall.

Astragalus caulescens, erectus, foliis linearibus, utrinque acutis, pubescentibus; stipulis lanceolatis; racemis axillaribus, folio longioribus; calicibus dentibus linearibus-subulatis, unilocularibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1264. — Pallas, Astrag. pag. 47. tab. 37.

Oxytropis floribunda. Decand. Altr. pag. 75.

Ses tiges sont droites, couvertes de poils blanchâtres; les folioles linéaires, pubescentes, aiguës à leurs deux extrémités; les stipules lancéolées; les fleurs jaunâtres, disposées en épis axillaires, plus longs que les feuilles; les dents du calice allongées, linéaires, subulées; les gouffes oblongues, subulées, à une seule loge.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Willd.)

160. ASTRAGALE blanchi. *Astragalus dealbatus*. Pallas.

Astragalus caulescens, suffruticosus, erectus, comis, foliis subterijugis, lanceolatis, acutis; stipulis oblongo-acuminatis; spicis pedunculatis, folio longioribus; vexillis emarginatis; leguminibus oblongis, canis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1262. — Pallas, Alfr. pag. 26. tab. 23. fig. 2 & 3. (Excus. synon. & fig. 1.)

Toute la plante est couverte de poils blancs & couchés. Ses tiges sont droites, un peu ligneuses; ses feuilles composées d'environ trois paires de folioles lanceolées, aiguës; les stipules acuminées; les pédoncules plus longs que les feuilles; les fleurs d'un blanc-jaunâtre, disposées en épis; l'épandage échancré à son sommet; les gousses oblongues, blanchâtres, pubescentes, mucronées.

Cette plante croît dans la Tauride & sur le Caucase. h (Willd.)

161. ASTRAGALE à tige glabre. *Astragalus glaber*.

Astragalus (oxytropis glabra), caulescens, prostratus, glaber, leguminibus pendulis, pubescentibus. Decand. Alfr. pag. 95. tab. 8.

Cette espèce a ses tiges glabres, couchées; ses folioles ovales-lancéolées; ses fleurs purpurines, petites, distantes, presque sessiles, disposées en un épi alongé; les gousses pendantes, lancéolées, pubescentes, chargées de poils noirâtres. Elle croît dans la Sibérie.

162. ASTRAGALE à petites fleurs, n°. 22. *Astragalus parviflorus*. Lam.

Oxytropis diflexa. Decand. Alfr. pag. 96.

Astragalus hians. Jacq. Icon. Rat. 1. tab. 153, & Col. c. 1. pag. 87.

Astragalus retroflexus. Pall. Alfr. p. 33. tab. 27.

Astragalus deflexus. Pall. Act. Petrop. 1779. pars 2. p. 260. tab. 15. — Lhérit. Stirp. 167. tab. 80.

163. ASTRAGALE à ailes échancrées. *Astragalus dichopterus*.

Astragalus (oxytropis dichoptera), caulescens, diffusa, pubescens, stipulis coalitis, alis emarginatis, pedunculis folio aequalibus. Decand. Alfr. p. 87. — Pall. Alfr. pag. 40. tab. 39.

Ses tiges sont pubescentes, dressées; ses feuilles éparpillées; les stipules adhérentes; les pédoncules de la longueur des feuilles; les fleurs d'un bleu-clair, disposées en grappes axillaires; les ailes échancrées; les gousses triangulaires, acuminées.

Cette plante croît dans la Sibérie. x

B. *Stipules adhérentes aux pétioles.*

164. ASTRAGALE de montagne, n°. 47. *Astragalus montanus*. Linn. — Jacq. Viud. 264, 5. Flor. austr. tab. 167. — S. Opol. Catu. n°. 922. tab. 45. — Pall. Alfr. pag. 65.

Oxytropis montana. Decand. Alfr. pag. 66. — Spreng. Flor. halens. tab. 8. var. villosa.

165. ASTRAGALE à corolle blanche. *Astragalus leucanthus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, glabris; scapis folio aequalibus, parvis glabris-capitatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Alfr. pag. 59. tab. 47.

Oxytropis leucantha. Decand. Alfr. pag. 67.

Toute la plante est glabre; elle n'a point de tige. Ses folioles sont lancéolées; les pédoncules à peine plus longs que les feuilles; les fleurs d'un blanc-lavande, peu nombreuses, réunies en une tête terminale & globuleuse.

Cette plante croît dans la Sibérie. x

166. ASTRAGALE argenté. *Astragalus argenteus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, sericeo-argenteis; scapis folio aequalibus; floribus capitatis; bracteis lanceolatis, longitudine calicis sericis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1310. — Pall. Alfr. pag. 60. tab. 48.

Ses feuilles sont toutes radicales, d'un blanc-foyeux, argenté; ses folioles lancéolées; les pédoncules de la longueur des feuilles; les fleurs blanches, peu nombreuses, réunies en tête; les bractées lancéolées; le calice foyeux, aussi long que le calice.

Cette plante croît dans les déserts de la Sibérie. x

167. ASTRAGALE de Baical. *Astragalus baicalensis*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, sericeo-pubescentibus; scapis folio duplo longioribus; floribus fœcatis; leguminibus ovatis, ventricosis, acuminatis, glabris. Willd. Sp. c. Plant. 3. pag. 1313. — Pall. Alfr. pag. 64. tab. 52.

Astragalus caruleus. Pall. Itin. 3. pag. 293.

Oxytropis carulea. Decand. Alfr. pag. 68.

Astragalus pedunculis radicatis; scapis folio allquantis longioribus; foliolis oblongis, glaberrimis; floribus imbricatis; leguminibus vesicularis, glabris. Gmel. Sibir. 4. pag. 55. tab. 26. fig. 2.

Ses fleurs sont bleues, imbriquées, inclinées,

réunis en une grappe dont le pédoncule est une fois plus long que les feuilles; les folioles lancéolées, moyennes, pubescentes; les gouffes glabres, ovales, ventrues, acuminées, membraneuses.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♀

168. ASTRAGALE d'Oural, n° 46. *Astragalus uralensis*. Linn. — Pall. Itin. 1. p. 148, & Afr. p. 53. tab. 41. — Gouan, Illustr. 50. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 155. — Mischk. 1. p. 250. (Nova Villars.)

Oxytropis uralensis. Decand. Afr. pag. 68.

169. ASTRAGALE incertain. *Astragalus ambiguus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis ovatis, subpubescentibus; scapis foliis longioribus, floribus spicatis, bracteis lanceolatis; leguminibus ovato-acuminatis, unilocularibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1312. — Pall. Afr. pag. 54. tab. 43.

Oxytropis ambiguus. Decand. Afr. pag. 56.

Astragalus pedunculis radicatis, hirsutissimis, folio longioribus; foliolis ovatis, acutis, septem imbricatis; spica ariflora. Gmel. Sibir. 4. pag. 59. tab. 30.

Cette espèce paroît peu distincte de la précédente. Ses folioles sont ovales, légèrement pubescentes; ses pédoncules plus longs que les feuilles; les fleurs d'un pourpre-violet, réunies en épis garnis de bractées lancéolées, plus courtes que le calice. Les gouffes sont droites, ovales, acuminées, à une seule loge. Elle croît dans la Sibérie & la Russie. ♀

170. ASTRAGALE à longs poils. *Astragalus scotus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, trinerviis, glabris; scapis folio longioribus, floribus ovato-spicatis, calicibus valde pilosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1311. — Pall. Afr. pag. 55. tab. 44.

Oxytropis fetosa. Decand. Afr. pag. 57.

Les racines sont longues, presque simples; toutes les feuilles radicales, composées de trois à cinq paires de folioles glabres, lancéolées, pileuses à leurs bords; les pédoncules pileux, plus longs que les feuilles; les fleurs purpurines, réunies en tête; les calices très-reclus.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♀ (Pall.)

171. ASTRAGALE à grandes fleurs. *Astragalus grandiflorus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis oblongo-lanceolatis, sericeis; scapis foliis duplo longioribus; floribus laxè spicatis; vexillo profunde emarginato; leguminibus oblongo-lanceolatis, pubescentibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1311. — Pall. Afr. pag. 57. tab. 46.

Oxytropis grandiflora. Decand. Afr. pag. 71.

Plante d'un très-bel aspect, luisante, foyeuse, argentée, très-variable dans sa grandeur. Ses folioles sont oblongues, lancéolées; ses pédoncules une fois plus longs que les feuilles; les fleurs grandes, d'un rose-tendre, disposées en un épi lâche; l'étendard profondément échancré; les gouffes renflées, oblongues, lancéolées, pubescentes. Elle croît dans la Sibérie. ♀

172. ASTRAGALE jaune-fale. *Astragalus fordianus*. Willd.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, sericeis; scapis folio longioribus calicibusque sericeis; capitulis paucifloris, cernuis; bracteis calice brevioribus; leguminibus cylindrico-oblongis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1313.

Astragalus uralensis. Flor. dan. tab. 1041. — Lightf. Scot. 1. p. 401. tab. 17. — Smith, Brit. 2. pag. 780. (Exclaf. syn. Hall.)

Cette espèce, d'après les observations de Willdenow, doit être distinguée de l'*Astragalus uralensis*, avec la quelle elle paroît avoir été confondue. Les calices & les pédoncules sont foyeux & non velus; les folioles foyeuses, lancéolées; la corolle d'un jaune-fale; l'étendard violet; le calice chargé de quelques poils noirs & blancs; les gouffes allongées, cylindriques, & non courtes & ovales. Elle croît dans l'Ecosse & dans la Norwège. ♀

173. ASTRAGALE blanc. *Astragalus candicans*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis ovato-lanceolatis, pubescentibus; scapis folio duplo longioribus, floribus spicatis, bracteis calicis longitudine, leguminibus oblongo-lanceolatis, acuminè inflexo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1311. — Pall. Afr. pag. 61. tab. 49.

Oxytropis candicans. Decand. Afr. pag. 72.

Ses feuilles, toutes radicales, sont composées de folioles ovales-lancéolées, pubescentes, blanchâtres & pileuses en dessous; les pédoncules du double plus longs que les feuilles, soutenant un épi de fleurs blanches, garnies de bractées de la longueur du calice; les gouffes renflées, oblongues-lancéolées, terminées par une pointe recourbée. Elle croît dans la Sibérie. ♀

174. ASTRAGALE à queue. *Astragalus caudatus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis oblongis, acutis, superne glabris; scapis erectis, foliis duplo longioribus, floribus densè spicatis, calicibus cylindricis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 506. — Pall. Afr. pag. 62. tab. 50.

Astragalus spicatus. Pallas, Itin. 2. Append. n°. 118. tab. W.

Oxytropis caudata. Decand. Astr. pag. 73.

Elle n'a point de tige. Ses feuilles sont composées de folioles oblongues, aiguës, glabres en dessus; les pédoncules droits, filonnés, une fois plus longs que les feuilles, soutenant un long épi touffu de fleurs purpurines; les calices cylindriques.

Cette plante croît dans la Sibérie, au pied des monts Altaïques. ♀

175. ASTRAGALE à follicules. *Astragalus follicularis*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis ovatis, acutis, sericeo-pubescentibus; scapis erectis, folio longioribus; floribus densis spicatis; calicibus ovatis, inflatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1306. — Pall. Astr. pag. 6. tab. 14.

On distingue cette plante à ses calices enflés, ovales, pileux; à ses corolles jaunes. Ses folioles sont ovales, aiguës, soyeuses, pubescentes; les pédoncules très-roides & droits, plus longs que les feuilles, terminés par des fleurs réunies en un épi touffu. Elle croît dans les déserts de la Sibérie. ♀

176. ASTRAGALE fongarique. *Astragalus fongaricus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, sericis; scapis erectis, folio duplo longioribus; floribus spicatis, distantibus; leguminibus lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1306. — Pall. Astr. pag. 63. tab. 51.

Oxytropis fongarica. Decand. Astr. pag. 73.

Les feuilles sont radicales, composées de folioles soyeuses, lancéolées; les pédoncules droits, lisses, une fois plus longs que les feuilles, soutenant des fleurs violettes, distantes, au nombre de six à dix, disposées en épis; les gouffes lancéolées. Elle croît dans la Sibérie. ♀

177. ASTRAGALE champêtre, n°. 45. *Astragalus campestris*. Linn. — Scheuchz. Itin. Alp. 4. pag. 330. Icon.

1. *Oxytropis*, var. *major*. Decand. Astr. pag. 59.

Astragalus uralensis. Villars, Dauph. 3. pag. 467.

2. *Oxytropis*, var. *viscosa*. Decand. Astr. l. c.

Astragalus viscosus. Vill. Dauph. 3. pag. 468.

Les stipules sont glabres dans les deux dernières variétés, velues dans la première; elles diffèrent aussi par leur grandeur. Les pédoncules, dans la dernière, sont chargés, vers leur sommet, de poils glanduleux & visqueux.

178. ASTRAGALE fétide. *Astragalus fetidus*. Willd.

Astragalus acaulis, foliis prostratis, viscosis, acutis, linearibus; scapis suberectis, paucifloris. Villars, Dauph. 3. pag. 468. tab. 43. — Alfioni, Pedem. n°. 1275. — Haller, Helv. n°. 407.

Oxytropis (fetida), *acaulis, glabra, viscosa, scapis superne lanatis; leguminibus erectis, secretis, subincurvis*. Decand. Astr. pag. 75.

Cette plante répand une odeur fétide. Elle est un peu visqueuse, & ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est entièrement glabre. Ses folioles sont plus nombreuses, plus petites; les fleurs presque blanches; les gouffes deux fois plus longues, cylindriques, renflées, un peu courbées; les pédoncules lanuaveux vers leur sommet. Elle croît dans le Dauphiné & les Alpes. ♀ (V. f.)

179. ASTRAGALE à feuilles délicates. *Astragalus leptophyllus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lineari filiformibus; scapis folia aquantibus, declinatis, paucifloris; leguminibus subrotundo-ovatis, inflatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1318. — Pall. Astr. pag. 80. tab. 66. fig. A, & Itin. 3. Append. n°. 118. tab. X. fig. 3. B.

Astragalus pedunculis radicatis; foliolis linearibus, pluribus conjugatis, glaberrimis. Gmel. Sibir. 4. pag. 53. tab. 24. B.

Oxytropis leptophylla. Decand. Astr. pag. 77.

Ses folioles sont linéaires, filiformes, peu nombreuses, très-glabres; les pédoncules inclinés, de la longueur des feuilles, peu garnis de fleurs; la corolle d'un rose fané; les gouffes ovales, renflées, un peu arrondies, à une seule loge, pubescentes. Elle croît dans la Sibérie. ♀

180. ASTRAGALE à crochets, n°. 49. *Astragalus uncatus*. Linn. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1319. *Oxytropis*. Decand.

181. ASTRAGALE à feuilles ternées. *Astragalus triphyllus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliis simplicibus ternatisque, glabris; scapis bifloris, declinatis, folio longioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1323. — Pall. Astr. pag. 68. tab. 56. fig. A.

Oxytropis triphylla. Decand. Astr. pag. 77.

Cette espèce est facile à reconnaître à ses feuilles toutes radicales, très-glabres, les unes simples, les autres ternées. Les hampes sont inclinées, plus longues que les feuilles, garnies de deux fleurs purpurines. Elle croît dans les îles sablonneuses du lac Baïcal. ♀

182. ASTRAGALE ampoulé. *Astragalus ampullatus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis lanceolatis, sericis; 3

scapis folia aquanibus, subtrifloris; leguminibus inflatis, globoso-ovatis, tomentosis, unilocularibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1304. — Pall. Alt. pag. 69. tab. 36. fig. 3, & lith. 3. Append. n°. 122. tab. CC. fig. 4. 5.

1. *Oxytropis physodes*, var. *villosa*. Decand. Alt. pag. 77. tab. 2.

2. *Oxytropis physodes*, var. *glabra*. Decand. l. c.

Astragalus (xiphioides), *acaulis*, *foliolis oblongis, glabris; scapis folio suboppositis, quinque floris; leguminibus inflatis, ovato-acuminatis, pascucentibus, unilocularibus.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1304. — Pall. Alt. pag. 70. tab. 37.

Ses folioles sont linéaires, foyeuses, glabres & oblongues dans la variété 1; les pédoncules de la longueur des feuilles, munis de trois à cinq fleurs d'un blanc-jauâtre; les gouffes renflées, globuleuses ou ovales, tomentueuses ou pubescentes, à une seule loge. Elle croit en Sibérie. 2.

183. ASTRAGALE écailléux. *Astragalus squamulosus*.

Astragalus (oxytropis squamulosa), *acaulis*, *glabra*, *foliis linearibus; calicibus squamulosis, bracteis stipulisque ciliatis, leguminibus avoicatis.* Decand. Alt. pag. 79. tab. 3.

Cette espèce est entièrement glabre, sans tiges; ses feuilles composées de folioles linéaires; les calices écaillés; les bractées & les stipules ciliées; les gouffes ovales. Elle croit dans la Sibérie. 2. Decand.

184. ASTRAGALE filiforme. *Astragalus filiformis*.

Astragalus (tauricus), *caulescens, parulus, foliolis linearibus, tomentosis; spica pedunculata, terminali; leguminibus ovatis, acutis.* Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1287. — Pall. Alt. pag. 48. tab. 38. (Excl. synonym.)

Oxytropis filiformis. Decand. Alt. pag. 80. tab. 4.

Ses tiges sont nombreuses, étalées, tomentueuses; ses feuilles composées de cinq à six paires de folioles linéaires, presque filiformes, aiguës, cotomeneuses; les stipules ovales; le pédoncule presque terminal, beaucoup plus long que les feuilles; les fleurs violettes, disposées en un épi lâche; les gouffes ovales, blanchâtres, acuminées, à deux loges; une seule semence dans chaque loge.

Cette plante croit dans la Tauride. 2.

185. ASTRAGALE en croissant. *Astragalus lunatus*. Pall.

Astragalus caulescens, glaber, perennis, foliis sparsis, peduncula brevioribus; leguminibus triquetrolunatis. Pall. Alt. pag. 44. n°. 47. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1288.

Astragalus parvus, filiquis falcatis. Euxb. Cont. 3. pag. 20. tab. 36. fig. 2. ?

Ses tiges sont grêles, hautes d'un pied, médiocrement ligneuses, peu rameuses; les folioles composées d'environ quinze paires de folioles serrées, linéaires-lanceolées, très-plâtres; les pédoncules axillaires, presque terminaux, cannelés, plus longs que les feuilles, supportant environ une dizaine de fleurs; les gouffes glabres, étalées, trigones, courbées en croissant, à deux loges.

Cette plante croit dans la Perse. 2. Pallas.

186. ASTRAGALE des bois. *Astragalus silvaticus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis inferioribus binatis, superioribus simplicibus, oblongis, acutis; scapo foliis longiore, spicis ovatis, calicibus villosis, leguminibus inflatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1300. — *Silvaticus*. Pall. Alt. n°. 100. t. b. 78. *Pheg. silvatica*. Pall. Itin. 3. Append. 1°. 109. tab. W. fig. 2.

Oxytropis silvatica. Decand. Alt. pag. 82.

Ses feuilles, toutes radicales, sont composées de folioles lanugineuses; les inférieures ovales, placées deux à deux; les supérieures simples, oblongues, aiguës; le pédoncule plus long que les feuilles, soutenant un épi trifloré, ovale, accompagné de bractées presque de la longueur des fleurs; les calices velus; les gouffes brunes, renflées, pileuses.

Cette plante croit dans la Sibérie. 2.

187. ASTRAGALE à long bec. *Astragalus longirostrum*.

Astragalus (oxytropis longirostris), *acaulis, subsericea, scapis folio duplo longioribus; foliis oblongo-acuminatis, carinis longe mucronatis, bracteis calice minaribus.* Decand. Alt. pag. 80. tab. 3.

Elle diffère de la précédente par les bractées plus courtes que le calice; par le calice une fois plus petit; par l'étendard arondi; par les ailes grandes, en forme de spatule; par la carène acuminée, & non pas obtuse, mucronée. Les folioles sont oblongues, plus aiguës, foyeuses; la corolle pourpre; l'ovaire pubescent. Elle croit dans la Sibérie.

188. ASTRAGALE à bec court. *Astragalus brevirostrum*.

Astragalus (oxytropis brevirostris), *acaulis, glabriuscula, scapis folio subaequalibus; stipulis magnis, ciliatis, bifidis; foliis elliptico-acuminatis.* Decand. Alt. pag. 82.

Cette plante n'a point de tiges. Ses folioles sont elliptiques, acuminées, conjuguées, peu velues; les stipules glabres, bifides, conniventes, assez grandes.

grandes; les pédoncules à peine de la longueur des feuilles; les fleurs bleues, sessiles, disposées en épi; l'étendard profondément échanuré; les ailes plus longues que la carène; celle-ci terminée par une pointe très-courte. Elle croît dans la Sibérie. x

189. ASTRAGALE diphylle. *Astragalus diphyllus*. Lam.

Astragalus microphyllus. Pall. Afr. pag. 92. tab. 76.

Oxytropis (microphylla), foliolis binis, ternis-que oblongis, obtusis; scapo foliis longiore; spicâ capitata; calicibus suummaricatis, lanuginosis. Decand. Afr. pag. 83.

190. ASTRAGALE à feuilles aiguës. *Astragalus oxyphyllus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis ternis, lineari-acuminatis, sericeis; scapo foliis longiore, erecto; spicâ oblonga; leguminibus inflato-ovatis, acuminatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1301. — Pall. Afr. pag. 90. tab. 74.

Phaca oxyphylla. Pall. Itin. 3. Append. n° 103. tab. X. fig. 2.

Oxytropis oxyphylla. Decand. Afr. pag. 84.

Espèce très-variable, dépourvue de tige, dont les feuilles sont ordinairement composées de trois, quelquefois quatre ou cinq folioles verticillées, moyennes, linéaires, acuminées; les pédoncules redressés, plus longs que les feuilles, terminés par un épi allongé de fleurs jaunes; les gousses ovales, renflées, membraneuses, pubescentes, surmontées d'une pointe recourbée.

Cette plante croît dans la Sibérie. x (L' *Astragalus baicalica*, Pall. tab. 77, fig. 1, n'est peut-être qu'une variété de cette plante.)

191. ASTRAGALE couché. *Astragalus prostratus*.

Astragalus (daguricus), acaulis, foliolis inferioribus binatis; superioribus simplicibus, linearibus, sericeis; scapo foliis longiore, declinato; spicâ capitata. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1301. — Pall. Afr. pag. 88. tab. 72.

Phaca prostrata. Linn. Suppl. 336. — Pall. Itin. 3. Append. n° 111. tab. X. fig. 2.

Oxytropis prostrata. Decand. Afr. pag. 85.

Ses racines sont ramassées en gazon, chargées à leur collet d'écaillés blanches & velues; elles produisent quelques feuilles, toutes radicales, longuement pétioolées; les folioles inférieures ordinairement deux à deux; les supérieures simples, linéaires, foyeuses; les pédoncules couchés, presque glabres, un peu plus longs que les feuilles; le calice velu, à cinq dents courtes, lancéolées.

Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante croît dans la Sibérie. x

192. ASTRAGALE chausse-trappe. *Astragalus muricatus*. Pall.

Astragalus acaulis, foliolis ternis, verticillatis, linearilanceolatis, glabris; scapo folia aquante; spicâ ovatis; leguminibus lanceolatis, arcuatis, muricatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1300. — Pall. Afr. pag. 89. tab. 75. — Lam. Dict. n° 55.

Phaca muricata. Linn. f. Suppl. 337. — Pall. Itin. 3. Append. n° 113. tab. A. 2. fig. 1. B.

Oxytropis muricata. Decand. Afr. pag. 86.

Toutes ses feuilles sont radicales; elles sortent d'une touffe de racines gazonneuses, velues. Les folioles sont presque verticillées, ternées, quaternées, lancéolées, canaliculées, glabres en dedans, hérissées de tubercules en dehors. Les pédoncules glabres, redressés; les bractées & les calices glabres; la corolle jaune; les gousses longues, arquées, lancéolées, armées de poils roides.

Cette plante croît dans la Sibérie, aux environs des lacs. x (Linn. Suppl.)

193. ASTRAGALE verticillaire, n° 54. *Astragalus verticillaris*. Linn. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1299.

Astragalus (myriophyllus), acaulis, foliolis subulatis, quaternis, verticillatis, pilosis; scapâ spicatis, folio longioribus; floribus inferioribus remotis; leguminibus lanceolatis, tomentosis. — Pall. Afr. 87. tab. 71.

Phaca myriophylla. Pall. Itin. 3. Append. n° 112. tab. Z.

β. *Oxytropis* (verticillaris), acaulis, foliolis quaternis, senis, verticillatis, elliptico-acuminatis, villosis sericeis. Decand. Afr. pag. 86.

194. ASTRAGALE à feuilles laineuses. *Astragalus dasphyllus*. Pall.

Astragalus (oxytropis lanata), caulescens, fruticosa, stipulis coalitis; foliolis quaternis, verticillatis, oblongis, sericeis; vexillis amplis. Decand. Afr. pag. 87.

Astragalus dasphyllus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1298. — Pall. Afr. pag. 91. tab. 75.

Phaca lanata. Pall. Itin. 3. pag. 746. tab. A. 2. fig. 2.

Phaca sibirica. Linn. f. Suppl. pag. 328.

Cette plante se rapproche beaucoup de la précédente, qui varie beaucoup. Celle-ci s'en distingue constamment par ses stipules conniventes; par ses folioles quaternées, verticillées; par l'étendard de sa corolle très-ample. Elle croît dans la Sibérie.

X x x

195. *ASTRAGALE* en racelle. *Astragalus cymbiformis*. Willd.

Astragalus subcaulis (caulescent), foliis cuneiformibus, retusis; foliolis subsessilibus; leguminibus ovatis-erectis, canaliculatis, glabris; floribus subpetalis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1302.

Astragalus cymbaripes. Bior. Lufit. 167.

Toute cette plante est glabre; ses tiges courtes, quelquefois allongées, grêles, striées, un peu triqu岸aires, couchées; les feuilles alternes, distantes, composées de huit à dix paires de folioles petites, distantes, opposées, pédicellées, lancéolées, rétrécies en coin à leur base, émoussées, échançrées à leur sommet; les fleurs presque sessiles, axillaires, la plupart solitaires, fort petites; les gousses ovales-oblongues, subsulées à leur sommet, courbées en racelle, dures, glabres, ridées; leur suture creusée en gouttière, à deux loges, contenant des semences nombreuses, planes, reniformes.

Cette plante croît dans le Portugal. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

ASTRAGALOIDES. Tournefort désignoit sous ce nom un genre de plantes légumineuses, qui tient le milieu entre les astragales & les bagueaudiers. Linnaë substitua à ce nom celui de phaca, genre que M. de Lamarck a regardé comme trop peu distingué de celui des bagueaudiers (*colutea* Linn.) pour en être séparé.

ASTRAGALUS (Voyez **ASTRAGALE**.)

ASTRANCE. *Astrantia*. M. de Lamarck a fait graver dans les *Illustrations des Genres* l'*astrantia major*, tab. 191, fig. 1, & l'*astrantia minor*, tab. 191, fig. 2. Aux quatre espèces décrites dans cet ouvrage on peut y joindre l'*astrantia carnolica*, Jacq. Austr. 6, Append. tab. 10, qui se rapproche beaucoup de l'*astrantia major*, qui en diffère par ses feuilles radicales, dont les lobes, oblongs, très-aigus, ne sont que médiocrement trifides, unicronés & dentés à leurs bords; les involucre tris-entiers: c'est l'*astrantia minor* de Scopoli, Carn. n°. 305, tab. 7. M. Willdenow en a mentionné une autre espèce sous le nom d'*astrantia heterophylla*, Nov. Act. Berol. vol. 2. Elle est originaire de la Sibérie. Ses feuilles caulinaires sont entières, ovales, feibles, à dentelures fines, presque épineuses. Les involucre sont cilées & dentées en scie vers le sommet.

ASTRANTHE de la Cochinchine. *Astranthus cochinchinensis*. Lour.

Astranthus foliis ovatis, serratis; spicis axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 274.

Abré d'une hauteur médiocre, peu garni de

rameaux, tous ascendants, munis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, dentées en scie à leurs bords, lanugineuses. Les fleurs sont pâles, un peu épaissies, disposées en longs épis simples, axillaires. Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul.

2°. Une corolle monopétale, en forme de soucoupe; le tube court; le limbe plane, divisé en quatorze découpures lancéolées, linéaires; sept alternes, plus courtes & radiales.

3°. Sept étamines, quelquefois six ou huit; les filaments droits, filiformes, plus longs que les divisions de la corolle, soutenant des anthères arrondies, à trois loges.

4°. Un ovaire libre, ovale, un peu aigu, surmonté de quatre styles capillaires, de la même longueur que les étamines, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en une seule semence, petite, ovale, acuminée, enveloppée par le tube de la corolle persistant.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice nul; une corolle en soucoupe; le limbe à quatorze divisions; une semence enveloppée par le tube persistant de la corolle.

Cette plante croît dans les champs, à la Cochinchine. h (Descript. ex Lour.)

Observations. Ce genre a été établi par Loureiro. Son nom est composé de deux mots grecs, *aster* (étoile), & *anthos* (fleur), fleur, ainsi nommé à cause de la corolle, dont le limbe est ouvert en étoile.

ASTRANTIA. (Voyez **ASTRANTE**.)

ATCHAR. *ATCHAR*. C'est, d'après les observations de M. du Petit-Thouars, un assaisonnement employé dans l'Inde, d'où il a passé à l'île de France & dans l'île de Bourbon, où on le nomme *ochar*. Il consiste en fruits verts de beaucoup d'espèces, surtout les mangues, les bilimbis, les citrons; en légumes, comme des haricots, des choux, des bourgeons de palmiste & de bambou, des racines d'ail, de gingembre, de la moutarde pilée, & surtout des piments (*capsicum* Linn.). C'est même du nom espagnol *asfisi* de ces derniers, que cette composition a pris son nom. Ces fruits ou légumes sont confits dans le vinaigre. A Batavia, qui est renommé dans ce genre, & dans d'autres endroits de l'Inde, on substitue au vinaigre le suc aigri de différentes espèces de palmiers. Les capres & les cornichons sont de véritables atchars. On est étonné de voir combien des peuples répétés bien plus près que nous de l'écar de l'impureté, mettent de variété dans leurs assaisonnements; ils ne

s'écarter pas pour cela de la simplicité de la nature, puisque, faisant leur principale nourriture de riz, ils éprouvent le besoin de toniques pour aider à la digestion de cet aliment naturellement froid.

ATEIRA. On trouve sous ce nom, dans le *Recueil des voyages*, un fruit de l'Inde assez estimé, probablement le même qui est nommé *Aleuris atocira*, espèce de corollol (*avona squamosa* Lam.).

ATHAMANTE. *Athamanta*. Les espèces à fruits glabres doivent être exclues de ce genre, & renvoyées au genre *selinum*. Quelques auteurs ont cru que le *libanotis* des Anciens devoit appartenir à ce genre. Théophraste dit que ses semences sont blanches, rudes, oblongues; & Dioscoride, qu'elles sont blanches, d'une odeur résineuse, qu'elles piquent la langue; ce qui convient assez bien à l'*athamanta libanotis* Linn. Gærtner en fait un genre particulier, sous le nom de *libanotis* (de Fruct. & Sem. vol. 2, pag. 184, tab. 21), auquel il donne pour caractère: une ombelle composée; les involucre à plusieurs folioles; les fruits oblongs, tomenteux. C'est, sous un autre nom, conserver les *athamanta* de Linné à fruits velus, & en exclure ceux à fruits glabres, ainsi que l'a voit fait M. de Lamarck. L'*athamanta fibrata* Linn. & Lam. III. tab. 194, fig. 1, paroît suffisamment distingué de l'*athamanta libanotis* pour rester comme espèce, ayant ses feuilles simplement ailées, les pinules incisées, anguleuses; les fleurs rouges en dessous.

ATHAMANTE musellinoïde, n°. 4 (*athamanta musellinoides* Lam.) est la même espèce que l'*athamanta Matthioli*, Jacq. Icon. Rar. 1, tab. 57, à laquelle il faut ajouter pour synonymie:

Athamanta (Matthioli), foliis suprà decompositis, tri quadrinerviis, diffusis; foliolis elongato-subsetaceis; feminibus ovato-acutis, striatis, hirsutis, sauculentibus. Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 211. — Hoff. Synopf. 149. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1403.

Libanotis rupestris. Scopol. Carn. n°. 315. tab. 9.

Mon. quod *athamanticum* vocant. Matth. Comm. pag. 20. tab. 39.

Mon. Matthioli. Dalech. Hist. pag. 78. tab. 759.

Athamanta rupestris. Vill. Dauph. 2. pag. 648.

Elle se distingue de l'*athamanta cretensis* par ses tiges un peu moins élevées, par ses folioles glabres & non velues; mais ses tiges & le pétiole des feuilles sont très-souvent garnis de poils.

3. ATHAMANTE de Crète. *Athamanta cretensis*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 194. fig. 2, & Gærtner. tab. 21.

7. ATHAMANTE blanchâtre. *Athamanta incana*. Willd.

Athamanta tota pubescens; incana, foliis suprà decompositis; foliolis cuneiformibus, quadridentatis; umbellâ multiradiatâ, glaberrâ. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1402. — Stepan. in Litt.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'*athamanta condensata*, n°. 2; elle en diffère par le duvet tomenteux, léger & blanchâtre qui recouvre toutes ses parties; par ses tiges plus épaisses, par la forme & la petitesse de ses folioles. Ses tiges sont hautes de deux pieds, de la grosseur d'une plume de cygne, munies de quelques rameaux; ses feuilles radicales trois fois ailées. Les premières pinules ne sont pas simplement opposées, comme dans la plupart des espèces, mais quaternées; les folioles très-petites, cuneiformes, à trois ou quatre dents très-aiguës; les feuilles caulinaires plus petites, deux fois ailées; les folioles imbriquées. L'ombelle est ample; ses rayons au nombre d'environ cinquante, longs d'un pouce & demi; les ombellules ramifiées en tête, à rayons très-nombreux. L'involucre universel est composé de quelques folioles linéaires, & d'une seule foliole; l'involucre partiel à plusieurs folioles linéaires-lancéolées.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Description. ex Willd.)

8. ATHAMANTE à larges feuilles. *Athamanta latifolia*. Viv.

Athamanta foliis ovato-oblongis, dentatis, basi obliquè truncatis, lobatis; lobis obtusis; extimo cordato, latiore. Vivian. Flot. ital. Fiagn. pag. 101. tab. 22. fig. 1.

Athamanta cervaria. Bertol. Plant. Gen. p. 44. *Daucus secundus*. Matth. Comm. Icon. Bona. Edit. Valgrif.

Ses tiges sont roi les, profondément cannelées, rameuses; ses feuilles triangulaires, deux fois ailées, composées de folioles presque sessiles, coriaces, luisantes, dentées; chaque dent terminée par une petite pointe; les folioles intérieures ovales-arrondies, à trois lobes aigus; les extérieures ovales, oblongues, un peu aiguës, obliquement tronquées à leur base; les fleurs blanches; les ombelles terminales; l'involucre universel quelquefois à une seule foliole; les partiels à plusieurs folioles réfléchies; les semences ovales, comprimées, à cinq côtes extérieures, entourées d'un rebord cartilagineux. Je n'ai pas vu les fruits. S'ils sont parfaitement glabres, comme j'ai lieu de

X x 2

le soupçonner, cette plante n'appartient point à ce genre.

Cette plante croît sur les collines, aux environs de Gênes. γ (*V. f. in herb. Disfont.*)

9. **ATHAMANIE** à fruits blancs. *Athamanta leucospermum*.

Athamanta (sefeli leucospermum), caule erecto, flexuoso; foliis lineariteracis, involucri submanophyllo, involucelli foliolis basi connatis; radiis umbellae, germinibusque tomentosis. Plant. rar. Hungar. pag. 92. tab. 98.

Les semences pubescentes de cette plante nous ont déterminés à la ranger dans ce genre plutôt que parmi les *sefeli*. Ses racines sont charnues, fusiformes, réticulées : il s'en élève des tiges droites, flexueuses, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, ailées, divisées en folioles sétacées. L'ombelle universelle est pourvue d'un involucre presque monophylle ; les ombellules accompagnées d'un involucre à plusieurs folioles adhérentes par leur base. Les fleurs sont blanches ; les rayons des ombellules pubescens, ainsi que les ovaires ; les fruits cannelés, blanchâtres, pubescens, couronnés par les styles persistans.

Cette plante croît en Hongrie, aux environs de Buda, sur les montagnes calcaires. γ ?

ATHANASIA. (*Mayet* ATHANASIE.)

ATHANASIE. *Athanasia*. Ce genre a éprouvé plusieurs réformes, que j'ai indiquées ailleurs. (*Voy. RELHANIA & SANTOLINE*, n°. 7, vol. VI.) Les espèces qu'on y a réunies depuis ne me font la plupart que peu connues. Je me bornerai à les mentionner sans description. Celles gravées dans les *Illustrations des Genres* sont :

1. **ATHANASIE** crénelée. *Athanasia crenata*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 670. fig. 2.

10. **ATHANASIE** à feuilles de basilic. *Athanasia crithmifolia*. Linn. — Lam. Ill. tab. 670. fig. 5. — *Geum*, tab. 165.

12. **ATHANASIE** pinnée. *Athanasia pinnata*. Linn. — Lam. Ill. tab. 670. fig. 4.

13. **ATHANASIE** cendrée. *Athanasia cinerea*. Linn. — Lam. Ill. tab. 670. fig. 1.

Athanasia tomentosa. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1806. — Thunb. Prodr. 144.

14. **ATHANASIE** à feuilles en coin. *Athanasia unguifolia*. Lam. Ill. tab. 670. fig. 3.

16. **ATHANASIE** ponctuée. *Athanasia punctata*. Berg.

Athanasia foliis subrotundis, glabris, punctatis; floribus terminalibus, sessilibus. Thunb. Prodr. 144. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1803.

Athanasia floribus aggregatis, terminalibus, subsessilibus; foliis suborbiculatis, mucronatis, punctatis, glabris, approximatis. Berg. Plant. Cap. pag. 238.

Tinacrum capense, buxifolium. Petiv. Gazoph. 442. tab. 81. fig. 6.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux glabres, cylindriques, striés, bifiés, et les γ ramifiés, garnis de feuil. ex. f. fil. glabres, arrondies, très-nuées, légèrement amincies, épaisses, rapprochées, longues de deux ou trois lignes, parsemées de points transparents ; les supérieures un peu plus longues, placées autour des fleurs. Celles-ci sont rapprochées au nombre de trois ou quatre, terminales, très-peu pédonculées ; les pédoncules courts & pileux. Le calice est arrondi, composé d'écaillés linéaires, égales, lisses, imbriquées, ovales, aiguës à leur sommet ; les extérieures légèrement pileuses. La corolle est un peu plus longue que le calice ; le réceptacle nu à son centre, garni, à sa circonférence, de paillettes scarieuses, linéaires-lancéolées, un peu ciliées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. γ (*Descript. ex Berg.*)

17. **ATHANASIE** lanugineuse. *Athanasia lanuginosa*. Cavan.

Athanasia caule fruticosa; foliis linearilanceolatis, glaucis, lanuginosis, imbricatis. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 2. tab. 9.

Athanasia (canescens), foliis oblongis, acutis, tomentosis; umbellis terminalibus. Thunb. Prodr. 144. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1804.

Cama aurea, africana, fruticans, linearis foliis glaucis & lanuginosis. Commel. Hort. 2. pag. 91. tab. 46.?

Ses tiges sont hautes d'un pied, ligneuses, couvertes, ainsi que toute la plante, d'un duvet blanchâtre & lanugineux. Les feuilles sont épaisses, très-rapprochées, sessiles, presque imbriquées, linéaires-lancéolées, glauques, aiguës, ensierées, longues d'environ un pouce au plus ; les fleurs peu nombreuses, réunies en un corymbe court & simple ; les pédoncules feuillés, longs d'un pouce. Le calice est ovale, composé d'écaillés imbriquées, presque lancéolées ; les intérieures, carrilagineuses à leur base ; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice ; les filements à cinq découpages aiguës, recourbées. Le réceptacle est garni de paillettes lancéolées, plus longues que les semences. Ces dernières, n'ayant point été observées, rendent douteux le genre de cette espèce.

Cette plante croît dans l'Afrique; elle a été cultivée à Trianon. *h* (*Descript. ex Cavan.*)

18. ATHANASIE effilée. *Athanasia virgata.*

Athanasia corymbis simplicibus; foliis inferioribus pinnatifidis, linearibus; superioribus oblongis, incisoferratis. Jacq. Hort. Schoenbr. vol. 2. pag. 11. tab. 148. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1806.

Cette espèce se rapproche un peu de l'*Athanasia trifida*: elle est beaucoup plus petite; elle en diffère encore par ses feuilles inférieures, incisées, presque pinnatifides; les supérieures à trois ou à cinq lobes courts. Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ un pied & demi & plus; les rameaux cylindriques, effilés; les feuilles pures, éparées, nombreuses, glabres, sessiles, un peu roides, presque cuneiformes. Les fleurs sont terminales, réunies environ dix à douze, presque en ombelle; les péduncules simples, munis de quelques petites bractées; les calices glabres, ovales, de couleur verte; la corolle jaune; les semences glabres, anguleuses, striées, noires, sans aigrette; le réceptacle garni de paillettes scarieuses, de la longueur du calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*Descript. ex Jacq.*)

19. ATHANASIE à trois pointes. *Athanasia trifida.* Hort. Paris.

Athanasia foliis linearibus, glabris, apice tri seu quinquefidis; corymbis subsimplicibus. (N.)

Coma aurea, frutescens, foliis trifidis, latioribus, viridibus, glabris. Burm. Afric. pag. 187. tab. 69. fig. 1.

Cet arbruste a beaucoup de rapport avec le précédent; il en diffère par son port, par ses feuilles plus allongées; par leurs découpures moins nombreuses, plus profondes. Ses tiges sont glabres, cylindriques, légèrement striées, d'un brun-clair, garnies de feuilles nombreuses, éparées, vertes, glabres à leurs deux faces, sessiles, longues d'un pouce & plus, étroites, linéaires, élargies vers leur sommet & divisées en trois, rarement cinq découpures étroites, linéaires, un peu aiguës. Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe presque simple; les péduncules inégaux, légèrement pubescents, garnis de petites folioles ou bractées entières, alternes, ordinairement uniflores, quelquefois à deux ou trois fleurs pédicellées. Les calices sont glabres, ovales, un peu globuleux, composés d'écailles imbriquées, scarieuses, jointes, obtuses, d'un vert-forcé dans leur milieu; la corolle jaune, un peu plus longue que le calice; le réceptacle muni de paillettes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*V. f.*)

* *Athanasia* (scabra), foliis ovatis, acutis, serratis; floribus solitariis, terminalibus. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. pag. 144. *h*

* *Athanasia* (glabra), foliis oblongis, obtusis, glabris; umbellis terminalibus. Thunb. Prodr. Cap. B. Sp. 144. *h*

* *Athanasia* (aspera), foliis ovatis, quinquedentatis, reflexis; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 145.

Athanasia (aspera), corymbis compositis; foliis ovatis, acutis, reflexis, quinquedentatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1805.

Athanasia levigata. Linn. Spec. 1181. — Lam. Dict. n°. 15. var. *h*

* *Athanasia* (quinquedentata), foliis ovatis, quinquedentatis, recurvis; floribus subumbellatis. Thunb. Prodr. 145. *h*

* *Athanasia* (hirtuta), foliis linearibus, incisifolius paniculatis compositis, caule villosis. Thunb. Prodr. 144. *h*

* *Athanasia* (tomentosa), foliis linearibus, tomentosis; paniculatis compositis. Thunb. Prodr. 144.

Il paroît que c'est la même espèce que l'*Athanasia cinerea* Linn. & Lam. n°. 13.

* *Athanasia* (flexuosa), foliis linearibus, acutis, glabris; floribus paniculatis, caule flexuoso. Thunb. Prodr. 144. *h*

* *Athanasia* (filiformis), foliis linearifiliformibus, glabris; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 144. *h* — Linn. f. Suppl. 361.

* *Athanasia* (pekinata), foliis pinnatis; pinnis linearibus, glabris; paniculatis compositis. Thunberg, Prodr. 145. — Linn. f. Suppl. 361.

Observations. Plusieurs espèces, ainsi que je l'ai dit plus haut, ont été placées parmi les *reliquia* Lherit., telles que l'*Athanasia squarrosa*, n°. 1; l'*Athanasia genistifolia*, n°. 4; l'*Athanasia uniflora* Linn.; l'*Athanasia sessiliflora* Linn.; l'*Athanasia palmata* Linn., &c.

Gärtner a fait de l'*Athanasia annua*, n°. 9, un genre particulier sous le nom de *lonas inodora* (de Frucht. & Sem. vol. 2, pag. 396, tab. 165, fig. 5). Il faut en exclure la synonymie de Trumfetter. L'*Athanasia maritima* Linn. a été distingué comme genre par M. Desfontaines: c'est son *diois confidissima*, Flor. atlant. (Voyez SANTOLINE.) Willdenow a rangé parmi les *tanacetum*, n°. 3, l'*Athanasia linifolia* Linn.

ATHECIA. (Voyez ATHÉCIE.)

ATHÉCIE. *Athecia*. (Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1, pag. 141, tab. 28.) Gærtner donne ce nom à une baie qui lui a été communiquée par Forster, & qui ressemble, pour la forme, à celle du *trochium*, présentant comme elle un calice supérieur, à cinq divisions; elle renferme une seule graine, dont l'embryon dicotylédon, à racines courtes, à lobes allongés & planes, est placé hors du centre du péricarpe cartilagineux qui l'entoure. Ces indications font insuffisantes pour rapporter cette baie à un genre connu. (*Just.*)

ATHENÆA. Schreber & Gmelin ont décrit sous ce nom l'*iroucana*, arbrisseau de la Guinée, figuré par Aublet, tab. 127, qui doit être réuni aux *anaviaga* ou aux *sumaya* si de ces deux genres on n'en fait qu'un. C'est le *casearia ramiflora* de Vahl. (*Voyez* IROUCAN, ANAVINGUE, *Suppl.*, & SAMYDE.)

ATHÉROPOGON apludoïde. *Atheropogon apludoideus*. Willd.

Atheropogon spicis simplicibus; floribus alternis, remotis. (N.) Willd. Spec. Plant. 4. pag. 937. — Mühlent. in Litt.

Genre de plantes à fleurs glumacées, polygames, monoïques, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *aplada*, & qui ne comprend jusqu'aujourd'hui qu'une seule espèce exotique.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice univalve, à deux fleurs, l'une hermaphrodite, l'autre stérile; dans la première, une corolle à deux valves; l'extérieure surmontée de trois arêtes; trois étamines; deux styles; point de fructification dans les fleurs neutres.

Cette graminée s'élève à la hauteur d'un pied. Les feuilles sont étroites, longues de cinq pouces; les tiges terminées par un épi simple, composé de fleurs alternes, distantes, triflores. Leur calice n'a qu'une seule valve, qui renferme deux fleurs; l'une hermaphrodite, à corolle bivalve; la valve extérieure surmontée de trois arêtes; l'intérieure bifide. Dans la fleur neutre, la valve extérieure est membraneuse, bifide, munie d'une arête un peu au-dessous de son sommet; l'intérieure surmontée de deux arêtes. Les antères sont d'un rouge de cinabre.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (*Descript. ex Willd.*)

ATHRODACTYLIS. (*Voyez* BAQUOIS, n°. 1, *Suppl.*)

ATHYRIUM. R. & H. Genre de fongères, qui contient quelques *aspidium* de Swartz. (*Voyez* POLYPODE.) Le *polypodium filix femina* & le *polypodium fontanum* Linn. rentrent dans ce genre. Roth

lui donne pour caractère essentiel d'avoir : les capicules réunies en groupes ovales, éparés sur la feuille, recouvertes d'un tégument en forme de rein ou de croissant, qui naît latéralement d'une nervure secondaire, & qui s'ouvre de dedans en dehors. C'est le genre *nephrodium*. Rich. & Mich. Flor. boreal. Amer.

ATIPOLO. Grand arbre des Philippines, qui paroît appartenir au genre JAQUIER, & qui, suivant Camelli, a beaucoup de rapport avec le *nanca* & le *camangi*, autres espèces de ce genre; il s'en distingue par ses feuilles linéaires, par son tronc plus élevé & plus gros, pourtant quelquefois jusqu'à quinze pieds de diamètre, & par son fruit petit & rougeâtre. Toutes les parties rendent un suc laiteux très-abondant. (*Voyez* JAQUIER, *Suppl.*)

ATITARA. Macgregor, dans son *Histoire du Brésil*, décrit sous ce nom un arbrisseau de huit à neuf pieds de hauteur, dont la tige est couverte d'aspérités ou de petites épines. Les feuilles sont petites, ailées, composées d'un grand nombre de folioles; le pétiole commun garni d'épines entre chaque foliole. L'auteur ne parle pas des fleurs. La figure qu'il donne de la plante, pag. 64, représente assez bien les jeunes pousses du *sagiarier hétrorhyle*, n°. 5, & l'on est porté à croire que c'est la même espèce ou une espèce voisine. (*Just.*)

ATLÉ. Arbuste fort commun en Égypte, où il sert presque exclusivement de bois à brûler. C'est le *samaris orientalis* de Forskall, qui a été figuré, pl. 9, dans le *Voyage de M. Sonnin en Égypte*. (*Voyez* TAMARIX, n°. 4.)

ATOTO. nom d'une espèce d'euphorbe (*euphorbia atoto*), trouvée par Forster dans les îles de la Société.

ATRACTOBOLE. *Atractobolus*. Genre de plantes de la famille des champignons, établi par Todde, conservé par Gmelin, & dont Person ne paroît pas avoir fait mention; il consiste en une substance sessile, en forme de cupule operculée, d'où sortent, par explosion, des vésicules féminifères. Il n'en existe qu'une seule espèce, que Todde a nommée *atractobolus annularis*. (Todde, Fung. Mock. Sel. 1. pag. 45. tab. 7. fig. 59. — Berk. Elem. Fung. Cent. 1. tab. 26. fig. 139.)

ATRACTYLIS. (*Voyez* QUENOUILLETTE.)

ATRAGÈNE. (*Voyez* CLÉMATITE.)

ATRAPHAXIS. (*Voyez* ATRAPHACE, & III. Gen. tab. 265.) La figure 1 représente l'*ATRAPHACE repliée*, n°. 2 (*atraxaxis replicata* Lam.) la figure 2, l'*ATRAPHACE épineuse*, n°. 1 (*atra-*

phasia spinosa Linn. — Lhérit. Stip. Nov. 1. pag. 27. tab. 14. — Griseb. tab. 119.)

Observations. L'*Atraphaxis replicata* de M. de Lamarck a de très-grands rapports avec l'*Atraphaxis undulata*; il en diffère par les tiges très-inclinées, étalées, presque concaves, très-rameuses; les rameaux redressés; les feuilles d'un vert-glauque. Comme cette plante n'est connue que cultivée, elle pourroit fort bien être une simple variété de l'*Atraphaxis ondulata*. La plante suivante, que M. Bosc m'a communiquée, me paroît devoir être distinguée comme espèce, ainsi qu'il suit :

4. **ATRAPHAXIS** à feuilles en coin. *Atraphaxis cuneifolia*.

Atraphaxis caule inermi, ? foliis subsessilibus, cuneatis, resatis; floribus minimis; pedunculis articulatis, reflexis. (N.)

Ses rameaux sont grêles, cylindriques, effilés, d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles alternes, à peine pétiolées, petites, presque ovales, très-entières, glabres à leurs deux faces, tétrécies en coin à leur base, obtuses, souvent comme tronquées & légèrement échancrées à leur sommet, d'un vert-pâle. Les fleurs sont petites, d'un blanc-verdâtre, disposées en grappes alternes à l'extrémité des rameaux; les pédoncules courts, presque sessiles, géniculés & réfléchis un peu au dessus de leur base, accompagnés, à leur insertion, de petites bractées concaves, vaginales.

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été découverte par M. Bosc. (V. f.)

ATRICHIE. *Atrichum*. Genre de plantes, de la famille des mousses, établi par M. Palisot de Beauvois, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Une coiffe simple, en capuchon, garnie, à son sommet, de quelques poils courts & tues; un opercule subulé, plus ou moins aigu; une urne oblongue ou ovale, étoilée ou légèrement inclinée; le tube long & arqué; la gaine oblongue; l'orifice de l'urne garni de trente-deux ou soixante quatre dents repliées en dedans, formant un crochets, & supportant une membrane horizontale, perçue à jour; point de péries.

Ce genre renferme des plantes terrestres à tiges simples ou presque simples, à feuilles éparées & dont les fleurs sont terminales. M. Palisot de Beauvois y rapporte trois espèces :

1. **ATRICHIE ondulée.** *Atrichum undulatum*. Pal. Beauv. *Ætheog.* pag. 42 : c'est le *bryum undulatum*. Lam. n. 10. — *Polytrichum undulatum*. Brid. — Hedw. Musc. Frond. 1. tab. 16. 17. fig. 6. 10. 11.

2. **ATRICHIE d'Hercynie.** *Atrichum hercynicum*. Pal. Beauv. *Ætheog.* pag. 41 : c'est le *polytrichum*

hercynicum. Dickl. — Gmel. Syst. Nat. 2. pag. 1327. — Encycl. 5. p. 173. * — Hedw. Musc. Frond. 1. tab. 15. Elle a le port des *polytrichum*, dont elle diffère par la coiffe & par la forme cylindrique de l'urne.

3. **ATRICHIE renversée.** *Atrichum controversum*. Pal. Beauv. : c'est le *bryum juniperini*. Dillen. Musc. tab. 46. fig. 19. — *Polytrichum unaulatum*, minus. Hedw. Musc. Frond. 1. tab. 17. fig. 14. 15. 17. 18. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. Ses feuilles sont petites, légèrement ondulées.

« Linné avoit avec raison, dit M. Palisot de Beauvais, séparé son *hypnum undulatum* du genre *polytrichum*, dont il diffère essentiellement par la coiffe & par l'opercule. » Hedwig & Bridel ont mal-à-propos réuni le genre *atrichie* à celui du *polytrichum*, qui a une double coiffe, dont l'inférieure est lisse, fendue par le côté, & l'extérieure composée de filaments entrelacés. Le genre *polytrichum* se distingue encore de l'*atrichum*, en ce que ce dernier a son opercule acuminé & son urne cylindrique, jamais tetragone.

ATRIplex. (Voyez ARROCHE.)

ATRIPLICÉES (les). (Voyez ARROCHES.)

ATROPA. (Voyez BELLADONE.)

ATRUHYLLUM. (Loureiro, Flor. cochîn.) Grand arbre de la Cochinchine, employé dans les constructions. Loureiro, qui l'a ainsi nommé à cause de ses feuilles rassemblées en sautoirs aux extrémités des rameaux, en fait un genre particulier, dont le caractère est absolument semblable à celui des *ardisia*; ce n'est donc qu'une espèce de ce genre, facile à distinguer des autres par ses feuilles étroites & linéaires. (Voyez ARDISIA & TINELIER. Suppl.)

ATTALÉRIE. Plante de la côte de Comorandé. Elle a été d'abord figurée par Burmann (Flor. Ind., tab. 39, fig. 3) sous le nom de *steris aquatica*, regardée ensuite par Smith comme identique avec le *nama zeylanica* Linn., que MM. de Jussieu & Vahl rapportent au genre *COUTARDE*, sous le nom d'*hyaralea zeylanica*. (Voyez STERIS.)

ATTI-ALI : nom malabare du figuier à grappes, n. 11. (*Ficus racemosa* Linn.)

ATTIER : nom donné au corossol écailléux, n. 2. (*Anona squamosa* Linn.)

ATTRAPE-MOUCHE : nom donné à plusieurs plantes munies, dans quelques-unes de leurs parties, d'une substance gluante, à laquelle les mouches & autres insectes s'attachent, sans pouvoir ensuite se dégager. Elle est répandue sur la tige du

fiene natans Linn., & surtout dans les interstices des anthers de *Opocynum androsanifolium* Linn., & peut-être de quelques autres apocinées. Le nom d'*attrape-mouche* que l'on donne encore au *dionao* tient à un autre phénomène très-curieux. (Voyez DIONÉE.)

ATUN. *Atunus littorea*. (Rumphé, Amb. 3, pag. 95, tab. 65.) Nom malais, sous lequel est décrit & figuré par Rumphé un arbre des Moluques, dont les feuilles, alternes, ovales-lancéolées, ont quinze pouces de long sur environ neuf de large, & qui porte, à l'extrémité des rameaux, des grappes de fleurs, auxquelles succèdent de gros fruits ovales, relevés en catène d'un côté, & contenant, sous un brou épais, un noyau employé dans l'Inde comme épice. On ignore à quelle famille cet arbre doit appartenir : on reconnoît seulement que les fruits ont beaucoup de rapport avec ceux du *Valantheria* Gaertn., *Phœnarea littoralis* d'Aiton. (Voyez MOLLAT, n°. 1.)

AVACARI. Jean Bauhin (Hist. 1, pag. 518) a mentionné, sous ce nom, un fruit qui paroît devoir appartenir aux myrtes. Il croît dans l'Inde.

AVANACU des Malabares. C'est le ricin ordinaire.

AVANCARÉ. Espèce de haricot des Antilles, qui s'élève le long des arbres, comme les lianes. Elle est, dans l'herbier de Surin, sous le nom de liane *avancaré*. (Juss.)

AVARA PALU. Espèce de haricot de Ceilan.

AVARAMO. Petit arbre du Brésil, cité & figuré par Pison, pag. 168, dont les gouffes, contournées en bracelets, sont présumées qu'il doit être rapporté au genre *acacia*, & peut-être à l'espèce nommée *mimosa unguiculata* Linn., dont il diffère pourtant par les folioles aiguës & qui ne sont pas tout-à-fait disposées de même. Son écorce, amère & dessiccative, est employée en poudre & en decoction pour panser les vieux ulcères. Pison ajoute que son usage a quelquefois opéré la guérison des cancers. (Juss.)

AVARU : nom donné, dans l'île de Ceilan, à l'indigo cultivé, *indigofera tinctoria* Linn.

AVAUX : nom provençal du chêne kermès, *quercus coccifera* Linn. Les Langue-dociens le nomment *avauxsès*.

AUBE. AUBO. AOUBA : noms sous lesquels les Provençaux & les Langue-dociens désignent le peuplier blanc (*populus alba* Linn.).

AUBEPIN. AUBÉPINE. ÉPIN BLANCHE. NOBLE ÉPINE. On donne ces différents noms

au *crataegus oxyacantha* Linn., que, d'après Jussieu & Lamarck, nous avons rangé parmi les néfliers, à cause de ses fruits à deux noyaux & non à pépins, sous le nom de *mespilus oxyacantha*. (Voyez NÉFLIER.)

AUBERGINE. MÉLONGÈNE. (Voyez MORELLE, n°. 45.)

AUBIFOIN. BARBEAU. BLEUET : noms anciens du *bleuet*, *cyanus* de Tournefort, & dont Linné avoit fait une espèce de centauree (*centaurea cyonus*). M. de Jussieu a rétabli le genre *cyonur*. (Voyez CENTAUREE, n°. 30.)

AUBERTIA de Bourbon. *Aubertia borbonica*. Bory.

Aubertia foliis oppositis, ovato-oblongis, integerrimis emarginatis. Bory Saint-Vinc. Voyage en Afriq. vol. 1. pag. 356, tab. 18.

Ce genre, que M. Bory a consacré à M. Aubert du Petit-Thouars, est fondé sur un arbre de l'île Bourbon, qui paroît avoir des rapports avec les *sagars*. Son caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à quatre divisions fort petites ; quatre pétales ; quatre étamines ; quatre styles, auxquelles succèdent des capsules oblongues, carénées, dont une, deux ou trois avortent : elles sont uniloculaires, s'ouvrent longitudinalement, & contenant d'une à trois semences.

Les feuilles sont ovales, oblongues, opposées, pétiolées, très-entières, obtuses ou aiguës, quelquefois échancrées à leur sommet, à nervures peu saillantes, confluentes vers les bords. Ces feuilles ont une odeur approchant du betel ; elles font sautoineuses lorsqu'on les brise entre les doigts. Les fleurs sont fort petites, jaunâtres, peu apparentes, disposées, dans les aisselles des feuilles, en grappes peu chargées : il leur succèdent des capsules verdâtres, qui, quand elles s'ouvrent, offrent l'apparence de fleurs.

Cette plante croît à l'île Bourbon. B.

Observations Les deux amplexes de Rumphé (voyez AMPAC & FAGARA) pourroient entrer comme espèces dans ce genre, s'ils étoient pourvus de quatre styles & d'autant de capsules.

AUBLETTIA. Le nom d'Aublet, botaniste français, auteur de l'ouvrage sur les plantes de la Guiane, a été donné à plusieurs plantes qui ont ensuite été réunies à d'autres genres. La verveine à longues fleurs (*verbena longiflora* Lour.), verveine à bouquets, n°. 7, étoit décrite, sous le nom d'*aubletia*, dans le *Journal de Physique*, & on lui donne encore, dans quelques ouvrages modernes, celui de *verbena aubletia*. Gmelin & Willdenow ont substitué au nom d'*aceiba*, adopté par Aublet, pour

pout un genre de la Guiane, celui de cet auteur. Mais Swartz & Lamarck ont conservé avec raison le premier nom, sous lequel les espèces de ce genre sont connues dans le pays. L'*aubletia* que Loureiro décrit dans la *Flore de la Cochinchine*, n'est qu'un paliure. Il le dit apétale & muni de dix étamines; mais il n'a réellement que cinq étamines: les autres, d'après sa description, sont de vrais pétales semblables à ceux du paliure. (Voy. VERVINE, APEIBA, PALIURE, Juss.) Gærtner a également établi un autre genre qu'il nomme *aubletia*, qui appartient au *sonneratia* de Linné fils. (Voyez BLATTI, Suppl.)

AUCUBA. *Aucuba*. Genre de plantes à fleurs incomplètes, monoïques, qui a de l'affinité avec ceux de la famille des nerpruns, & paroit se rapprocher des *masa* de Forster. Il comprend des arbres exotiques à l'Europe, à rameaux dichotomes, à feuilles opposées, réunies au sommet des branches. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; un calice à quatre petites dents; quatre pétales; quatre étamines; le réceptacle creusé d'une fossette dans son milieu. Dans les fleurs femelles, un ovaire adhérent au calice; un style; un stigmate en tête; une baie ovale, à une seule loge monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques. Les fleurs mâles offrent :

1°. Un calice d'une seule pièce, tronqué à son bord, court, persistant, muni de quatre petites dents à peine sensibles.

2°. Une corolle à quatre pétales étalés, ovales, concaves, caducs.

3°. Quatre étamines insérées entre les pétales, sur le réceptacle; les filamens droits, très-courts, terminés par des anthères ovales, à deux loges, à quatre filons.

4°. Un réceptacle plane, un peu convexe, creusé dans son milieu de quatre petites fossettes.

Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs mâles.

2°. Point d'étamines.

3°. Un ovaire adhérent au calice, surmonté d'un style court, épais, terminé par un stigmate simple, en tête.

Le fruit est une baie ovale, médiocrement charnue, à une seule loge, surmontée du style persistant, à une seule semence.

Botanique, Supplément, Tome I.

ES P È C E.

AUCUBA du Japon. *Aucuba japonica*.

Aucuba foliis oppositis, petiolatis, serratis, oblongis; floribus paniculatis. (N.)

Aucuba japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 64. tab. 12. — Kœmpf. Amœn. exot. pag. 775. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 318. — Lam. Ill. Gen. tab. 759.

Au Japon, *AUCUBA*.

a. *Aucuba foliis fusco-viridibus, immaculatis.* Thunb. Jap. l. c.

β. *Aucuba foliis latè viribus, albo variegatis.* Thunb. l. c.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de six à huit pieds, & souvent plus, sur un tronc droit, cylindrique, qui se divise en branches & en rameaux opposés, plusieurs fois dichotomes, très-étalés, droits, glabres, anguleux, un peu charnus, couverts de tubercules par les impressions qu'y laissent les feuilles après leur chute. Ces feuilles sont opposées, pétioles, ramassées & très-rapprochées à la partie supérieure des rameaux, ovales-oblongues, un peu irrégulières & variables dans leur grandeur, lâchement dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, vertes à leur face supérieure, un peu plus pâles en dessous, longues de trois à quatre pouces, larges d'environ deux pouces, quelquefois beaucoup plus grandes, marquées de nervures alternes, pluri-nerviées, médiocrement saillantes en dessous, canaliculées en dessus, un peu ramifiées vers leur extrémité; les pétioles longs d'environ un pouce, un peu striés & légèrement comprimés. On distingue deux variétés remarquables dans les feuilles de cet arbre. Elles sont, dans la première, d'un vert-obscur très-foncé, sans aucune tache; dans la seconde, d'un vert-gai, beaucoup plus clair, panachées de taches blanches.

Les fleurs sont monoïques, disposées en panicules terminales, à trois principales divisions, plusieurs fois ramifiées en rameaux opposés, les pédoncules & les pédicelles plus ou moins velus, accompagnés, à leur insertion, de bractées glabres, lancéolées, dentées en scie petites, d'ailleurs assez semblables aux feuilles. Le calice est court, verdâtre, tronqué à ses bords; la corolle peu apparente, composée de quatre pétales caducs, verdâtres en dessous, de couleur purpurine en dehors; les étamines au nombre de quatre, insérées sur le réceptacle, alternes avec les pétales; les anthères purpurines, à deux loges. L'ovaire, dans les fleurs femelles, est ovale; le style épais & court; le stigmate capité. Il leur succède une petite baie ovale, à une seule loge, à peine un peu charnue, ne renfermant qu'une semence de même forme.

Y y y

Cet arbre est originaire du Japon, assez commun dans les terrains cultivés. Il fleurit au mois de juin, & ne donne de fruits mûrs qu'au mois de mars suivant. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres de l'Europe. Il croît avec assez de facilité, & se conserve sans peine en le garantissant des grands froûs. C'est une plante d'ornement qui produit un assez bel eff. t, surtout la variété à feuilles panachées.

AVELINE. AVELINIER. C'est une espèce ou variété cultivée du noisier ordinaire, dont le fruit est nommé *aveline*, en latin *avellana*, d'*Avella*, ville de Campanie, près de laquelle croissoit cet arbre. Les Provençaux lui donnent le nom d'*avellanier*, & les Languedociens celui d'*abianier*.

AVELLANÈDE, capsule du gland de chêne, employée pour tanner les cuirs. Il en vient beaucoup du Levant, recueillie particulièrement sur le chêne dit *villani*; mais celle des chênes de France serviroit également aux mêmes usages. (*Juss.*)

AVELLANO : nom que porte, au Chili, l'arbre décrit par Molina sous le nom de *gruina*, & par Ruiz & Pavon sous celui de *quadria*. (*Voyez* GRUIN & QUADRIE.)

AVENA. (*Voyez* AVOINE.)

AVENAT : nom de l'avoine dans quelques contrées du Languedoc, & en Provence, d'une préparation de ce grain pour la nourriture de l'homme.

AVENKA. On trouve sous ce nom, dans Rheed (Hort. malab. 12. tab. 40), une fougère, dont Burmann fait un *adiantum* (*adiantum lunatum*). Ses feuilles, ovales, crénelées, formant, par leurs replis, une espèce de croissant, sont portées le long d'un pétiole commun. Margrave, dans l'*Histoire du Brésil*, page 25, décrit & figure, sous le nom d'*avenqua* ou *avenca*, donné par les Portugais qui habitent ce pays, une autre fougère qui peut appartenir au même genre, mais dans la section des feuilles plus composées, ou au genre de l'acrostique, & peut-être à l'*acrostichum calamagrostis* Juss.

AVÉRON. AVÉNERON. On a donné ce nom à quelques graminées du genre *tramus*; mais il est plus communément appliqué à l'avoine folle, *avena sativa* Linn.

AVERRHOA. (*Voyez* CARAMBOLIER.)

AVET. AVÈTE. ABÈTE : noms dérivés du mot latin *abies*, & employés dans quelques pays pour désigner l'espèce ordinaire du sapin.

AUGEA du Cap. *Augea capensis*. Thunb.

Augea foliis oppositis, vaginantibus; floribus axillaribus, subsulcatis. (N.)

Augea capensis. Thunb. Prodr. pag. 80. — Nov. Gen. Plant. 1. pag. 125. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 650.

Genre de plante dicotylédones, à fleurs incomplètes, établi par Thunberg, & dont la famille n'est pas encore déterminée. Il offre pour caractère essentiel :

Un calice à cinq découpures; point de corolle; dix étamines réunies en tube à leur base; un style; une capsule à dix loges.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce. C'est une plante à tige herbacée, foible, charnue, haute d'environ un pied, divisée, dès sa base, en rameaux garnis de feuilles sessiles, opposées, vaginales à leur base, à demi cylindriques, longues d'un demi-pouce. Les fleurs sont petites, situées dans les aisselles des feuilles supérieures, solitaires ou réunies deux ou trois, portées chacune sur un pédoncule court. Leur calice est d'une seule pièce, à cinq divisions. Il n'y a point de corolle. Les étamines sont au nombre de dix, attachées à la base du calice; les filaments réunis, à leur partie inférieure, en un tube court, qui embrasse un ovaire libre ou supérieur, surmonté d'un style filiforme, que termine un stigmate obtus. Le fruit consiste en une capsule charnue, cylindrique, s'ouvrant en dix valves, divisée en dix loges, remplies de semences lenticulaires, enveloppées d'une tunique blanche.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Description* de Thunb.)

AUGIA. *Augia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des guttifères, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, & dont les fleurs sont disposées en panicules.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tronqué, fort petit; cinq pétales; un grand nombre d'étamines; un style; un drupe contenant un noyau à une loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, inférieur, tronqué, étalé.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, étalés, insérés sur le réceptacle.

3°. Environ une centaine d'étamines, dont les filaments sont filiformes, plus longs que la corolle;

insérés sur le réceptacle, soutenant des anthères arrondies.

4°. Un ovaire libre, comprimé, presque rond, surmonté d'un style filiforme, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est un drupe presque lenticulaire, petit, luisant, comprimé verticalement, contenant un noyau de même forme, à une seule loge.

Observations. Ce genre a été établi par Loureiro, qui lui a donné le nom d'*augia*, d'un mot grec qui signifie luisant, à cause du suc résineux qui découle de ces arbrisseaux.

ES PÈ C E.

AUGIA de la Chine. *Augia sinensis*. Lour.

Augia foliis pinnatis, integerrimis; paniculis subterminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 411.

Vernix indica. An anacardium? Kœmpf. Amoen. pag. 792. — Hist. Jap. lib. 1. pag. 99. — Charlev. Jap. 1. cap. 27. pag. 352. Icon.

C'est un arbre d'une médiocre grandeur, revêtu d'une écorce rude, divisé en rameaux ascendants. Les feuilles sont ailées avec une impaire, composées d'environ cinq paires de folioles, petites, glabres, très-entières, élargies, lancéolées, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont pâles, rassemblées en grandes panicules lâches, éparées vers le sommet des rameaux. Le calice est fort petit, tronqué à son orifice, la corolle composée de cinq pétales oblongs. Le fruit est un drupe lenticulaire, large d'environ quatre lignes, de couleur brune, revêtu d'une écorce mince, très-lisse.

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la Cochinchine, à la Chine, &c. *h* (*Descript. ex Lour.*)

Cet arbre, d'après Loureiro, est celui qui produit le véritable vernis de la Chine; c'est le *vernix indica*. Lorsqu'on veut l'obtenir, on fend l'écorce : il en découle un suc résineux, très-visqueux. On l'emploie pur ou mêlé à diverses substances colorées. Cette résine est encore employée, dans l'Inde, comme médicament, après l'avoir fait bouillir pour lui enlever un principe volatil, d'une acreté extrême. Les médecins de la Cochinchine la font prendre ordinairement à leurs malades sous forme de pilules. Elle produit, selon Loureiro, de très-bons effets, comme échauffante, résolutive, emménagogue & vermifuge.

AUGUO. Les Provençaux nomment ainsi l'algue des vitriers, connu des botanistes sous le nom de zoïtère, *zostera oceanica* Linn.

AVICENNIA. (*Voyez* AVICENNIE, & III. Gen. tab. 540.) C'est l'*avicennia tomentosa*, n°. 1.

Les fruits de cette espèce sont du nombre des mets nommés *carils* dans le Malabar, lorsqu'ils ont perdu leur amertume par une longue macération, & par la cuisson dans l'eau. De ces mêmes fruits verts, cuits avec les feuilles de l'adambœ (*ipomœa campanulata* Linn.), pilés & mêlés de beurre, on forme des cataplasmes émollients pour faire avorter les tumeurs. La lessive de leurs cendres sert à blanchir les étoffes de coton, & à fixer les couleurs lorsqu'on l'emploie dans la peinture. (*Diâ. des Scienc. nat.*)

3. AVICENNIE résineux. *Avicennia resinifera*. Forst.

Avicennia foliis ovato-lanceolatis, subius tomentosis. Forst. Prodr. n°. 246, & Plant. escul. pag. 72. n°. 94.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la première. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, coriaces, lancéolées, très-entières, aiguës à leur sommet, glabres & luisantes en dessus, longues d'environ deux pouces, couvertes en dessous d'un léger duvet d'un blanc-auraire. Ses pédoncules sont terminaux, presque trifides, portant un paquet de fleurs en tête. Forster présume que le suc concret qui sort de sa tige, est la gomme de couleur verte que les habitants de la Nouvelle-Zélande mangent avec plaisir, au rapport de Crozet, voyageur français.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. *h*

AVI-HI-AVI : nom que porte, à Madagascar, un arbre du genre *dillenia*, suivant Commerçon.

AVILA : nom caribbe du nhandiroba, *sevilla f. undens*.

AULACIA. Loureiro (*Flore de la Cochinchine*) décrit, sous ce nom, un petit arbre à feuilles alternes, simples & crénelées, à fleurs verticillées, en grappes terminales, qui a beaucoup de rapport, dans sa fructification, avec le *wampi* (*cookia*), & qui n'est peut-être qu'une espèce du même genre. Il en diffère par son calice divisé moins profondément. Sa baie est composée de cinq loges, remplies chacune de deux semences. Ses feuilles sont simples : on leur attribue une vertu emménagogue. Son fruit n'est pas bon à manger. (*Jes.*)

AULNE noir. (*Voyez* BOURDAINE, *Supplém. & NERPRUN* (*rhamnus*).)

AVOINE. *Avena*. Ce genre, qui paroît assez naturel lorsque Linné l'établit pour la première fois, a éprouvé, depuis cette époque, bien des changements. On y a introduit des espèces placées dans d'autres genres : on en a retranché d'autres, pour lesquelles on a créé de nouveaux genres, & Yyy 2

chaque réformateur enchérit sur ses prédécesseurs. Souvent, par le seul changement de nom, on est parvenu, à force de vouloir perfectionner, par jeter dans un embarras un peu plus grand qu'il n'étoit auparavant, soit pour placer les espèces dans les genres nouvellement créés, soit pour se décider sur le choix de ces genres & sur les noms qu'il convient le mieux de conserver. Je ne dirai que deux mots de ces réformes.

Linné avoit déterminé le caractère essentiel des avoines d'après la considération d'une arête articulée, plus ou moins torse, placée sur le dos de la valve extérieure de la corolle. On a remarqué que, dans quelques espèces, cette valve se partageoit en deux à son sommet, qu'il en résultoit deux pointes très-aiguës en forme d'arête, & que quelquefois l'arête dorsale n'étoit presque point contournée. Cette particularité a donné naissance, 1^o. au genre *trisetum* de Persoon (*Voyage Trisetaire*, *Observations*, vol. 8, pag. 116); 2^o. au genre *danhovia* de Descaudolle (*Flore française*, 3, pag. 32), qui diffère très-peu de celui de Persoon; au genre *ventenatis* de Kœler, &c., tandis que quelques espèces d'*holcus* se font glisser parmi les avoines; malgré leurs fleurs polygames, quelques *sestiva*, &c. Il y auroit bien encore d'autres petites réformes à faire; mais je me bornerai à quelques concordances de synonymie & aux espèces découvertes depuis la publication de ce genre par M. de Lamarck.

ESPÈCES.

1. AVOINE cultivée. *Avena sativa*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 27.

10. AVOINE calcinale. *Avena calcinea*. Lam.

Avena paniculata, calicibus bifloris, flosculis duobus longioribus, corollis aristatis, pedunculis capillaribus. Lam. III. Gen. 1. pag. 200. n^o. 1106. — Non Villars.

Danhovia. Decand. — *Trisetum*. Pers.

Ses tiges sont droites, cylindriques, terminées par une panicule étalée; les feuilles glabres, un peu striées, alternes, aiguës. Les pédoncules sont très-déliés, capillaires, pendans, recourbés; les calices luisans, biflores, composés de deux valves d'un jaune pâle, égaux, très-aiguës, au moins une fois plus longues que la corolle, persistantes, à peine striées; les valves de la corolle blanchâtres, membraneuses, transparentes, pubescentes à leur partie inférieure; la valve extérieure bifide à son sommet, supportant sur son dos, un peu au dessous de l'échancre, une arête brune, médiocrement contournée, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb.* Lam.)

19. AVOINE courte. *Avena brevis*. Roth.

Avena paniculata, calicibus subtrifloris; seminibus brevibus, obtusis, apice bidentatis; aristâ dorsali, scabra. Roth. Germ. 1. pag. 40, & vol. II. pag. 108. — Hoffm. Germ. 40. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 445.

Avena paniculâ laevi, secundâ; calicibus dispermis; seminibus brevibus, obtusis, apice bidentatis, dorso aristatis, scabris. Roth. Abb. und Beob. pag. 42. n^o. 1.

Ses tiges sont hautes de deux ou trois pieds, glabres, un peu coudées; les articulations renfoncées & d'un brun-noirâtre; les feuilles rudes, striées; les gaines glabres, un peu glauques, quelquefois munies à leurs bords de quelques poils rudes, très-fins, allongés; l'orifice garni d'une membrane courte, tronquée, crénelée. La panicule est oblongue, lâche, presque unilatérale; les pédoncules rudes; ils soutiennent un ou trois épillets pédicellés; les valves calicinales d'un vert-pâle, un peu inégales, aiguës, un peu striées; elles renferment deux ou trois fleurs; la corolle à peine plus longue que le calice; la valve extérieure ovale, bifide à son sommet, glabre, un peu rude sur le dos, munie d'une arête dorsale, presque droite, un peu torse, trois fois plus longue que les valves. Les semences enveloppées des valves de la corolle sont brunes, souvent couvertes de poils roides, longs, épars; tomentueuses à leur base, quelquefois glabres, dépouillées des valves. Elles sont courtes, obtuses à leurs deux extrémités, pubescentes, d'un brun-clair.

Cette plante croît dans les moissons, en Allemagne, aux environs de la ville de Brême. (V. v.)

20. AVOINE blanche. *Avena alba*. Vahl.

Avena paniculata, calicibus bifloris; corollis pilosis, alterâ aristatâ. Vahl, Symb. 2. pag. 24.

Elle a le port de l'*avena sativa*, mais ses épillets sont trois fois plus petits & les corolles velues à leur base; elle me paroît se rapprocher beaucoup de la précédente. Ses tiges sont hautes d'un pied; ses feuilles glauques & glabres; la panicule simple, pen garnie; les valves calicinales d'un vert-pâle, transparentes à leurs bords; la valve extérieure de la corolle aiguë, striée, couverte à sa partie inférieure de poils très-blancs, portant un peu au dessus de sa base une arête plus longue que le calice.

Cette plante a été observée par M. Vahl aux environs de Turin.

21. AVOINE d'Orient. *Avena orientalis*. Schreb.

Avena paniculâ coarctatâ, secundâ; spiculis bifloris,

horizontalibus, parallelis; seminibus levibus. Schreb. Spicil. 52.

Avena (racemosa), sativa, paniculâ in racemum oblongum, subsessile, multiorum coarctatâ; glumis binis; floribus muticis. Thail. Flor. pacif. edit. 2. pag. 59.

Cette plante diffère de l'*avena sativa* par ses panicules allongées, tressées, presque en grappes unilatérales; chaque épillet composé de deux fleurs, dont une pédicellée, la plupart privées d'arêtes. Les valves calicinales sont oblongues, concaves, striées, très-aiguës; celles de la corolle plus courtes, très-glabres; l'une d'elles quelquefois surmontée d'une arête presque droite, brune à sa base, au moins une fois plus longue que la corolle; les semences étroites, allongées. Les feuilles sont grandes, élargies, rudes au toucher; leur gaine très-lisse.

Cette plante se cultive au Jardin des Plantes. On la soupçonne originaire du Levant. O (V. v.)

Observations. Il me paraît très-probable que cette espèce, ainsi que quelques autres rapprochées de l'*avena sativa*, n'en ont été primitivement que des variétés, qui se sont perpétuées par la culture avec les caractères qui les distinguent.

22. AVOINE de Provence. *Avena provincialis.*

Avena (calicina), foliis planis, basi pilosis; paniculâ simplici; spiculis quinquefloris, longitudine calicis. Villars, Dauph. 2. pag. 148. tab. 2. fig. 9. — Monti, Prodr. tab. 2. fig. 1.

Avena spicata, var. ß. Willden. Spec. Plant. 1. pag. 453.

Danthonia (provincialis), aristâ longâ, tortili; glumis 5-6 floris; foliis glabris, ore pilosis; inferioribus convolutis-fetaceis. Decand. Synops. pag. 216. & Flor. franç. 3. pag. 33. — Trisetum. Pers.

Cette plante a des tiges hautes d'environ un pied, grêles, cylindriques, coudees à leur base, puis redressées, garnies de feuilles étroites, peu nombreuses; les inférieures presque fetacées, roulées sur elles-mêmes; les supérieures planes, un peu plus larges, glabres, munies de quelques poils à l'entrée de leur gaine. Les fleurs sont disposées en une panicule droite, simple, presque unilatérale, peu garnie, composée d'environ quatre épillets solitaires & pédicellés. Le calice contient cinq à six fleurs; il est composé de deux valves lisses, fort grandes, d'un vert un peu violet, concaves, très-aiguës; les fleurs intérieures disposées par deux rangs, chacune d'elles munie de deux valves; l'intérieure glabre, membraneuse, obtuse; l'extérieure coriace, concave, velue à sa partie inférieure & sur les bords, fortement échancree, à son sommet, en deux poin-

tes allongées, divergentes. De la base de l'échancre part une arête touffue, torse à sa base, fort longue. La plante figurée par Monti appartient à cette espèce, & non au *sticta decumbens* Linn.

Cette plante croît en Provence, aux environs de Gap & de Sisteron. 4 (V. f.)

23. AVOINE hispide. *Avena hispida.* Linn.

Avena paniculâ simplici; calicibus trifloris, pilosis; glumis subulatis. Lam. Ill. t. pag. 201. n°. 1111. — Linn. f. Suppl. 111. — Thunb. Prodr. 22. — Willden. Spec. Plant. 1. pag. 451. — Trisetum. Pers.

Avena (capensis), paniculâ ovata; spiculis binis, apice biaristatis; aristâ dorsali tortâ; floribus sessilibus, barbatis. Burm. Prodr. 3.

Cette espèce a, dans la forme & la disposition de ses fleurs, l'aspect d'un *bromus*. Ses tiges sont lisses, hautes d'un pied, garnies de feuilles alternatives, un peu étroites, glabres, pileuses à l'orifice de leur gaine. Les fleurs sont disposées en une panicule simple, peu garnie, presque en grappe, contenant trois ou quatre épillets pédicellés; les pédoncles simples; les valves calicinales droites, longues d'un pouce, pileuses, acuminées, contenant trois fleurs subulées; leur valve extérieure bise à son sommet, munie d'une arête torse, trois fois plus longue que les fleurs.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

24. AVOINE subulée. *Avena subulata.* Lam.

Avena paniculâ vix compositâ, purpureo-flavescente; calicibus subtrifloris, spiculis aequantibus; foliis involuto-folulatis. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 201. n°. 1113.

Avena (setacea), foliis setaceis, vaginis lanuginosis, paniculâ purpurascens, spiculis majusculis, calicibus trifloris; aristis nigris, recurvis. Villars, Dauph. 2. pag. 144. tab. 5. — Beil. Act. Tur. 5. pag. 218.

Avena (aurata), paniculâ strictâ, spiculis elongatis, spiculis basi villosis, foliis setaceis. Allion. Pedem. n°. 2259. — Hall. Helv. n°. 1488.

Elle se distingue par ses tiges droites, presque filiformes; par ses feuilles roides, aussi longues que les tiges, fines, presque fetacées, très-étroites, d'un vert-pâle, roulées à leurs bords, veloutées sur leur gaine. Les panicules sont droites, peu garnies; les pédoncles serrés & ne portant qu'un ou deux épillets oblongs, souvent d'un jaune-doré ou un peu violets, luisants, très-glabres. Les calices ne renferment que deux ou trois fleurs velues à leur base; les valves aiguës; l'arête noirâtre, au moins une fois aussi longue que le calice.

Cette plante croît dans le Dauphiné & dans les Alpes. (V. f.)

25. AVOINE améthyste. *Avena amethystina*. Decand.

Avena paniculata erecta, angustata; glumis bifloris; flosculis inferiore uniauriculata, superiore biaristata. Decand. Synopl. pag. 126, & Flor. franç. 3. pag. 37. n°. 1552.

Ses tiges sont droites, hautes de six à huit pouces, très-simples, garnies, dans toute leur longueur, de feuilles courtes, étroites, redressées, planes ou plies en long; les supérieures glabres; les inférieures velues sur leur gainé & à leur face inférieure. La panicule est droite, peu garnie; elle sort de la gainé supérieure; les pédicelles ne portent qu'un seul épillet; les valves calicinales sont grandes, oblongues, pointues, un peu inégales, d'un beau violet à leur base, argentées à leur sommet; elles renferment deux fleurs moyennes à leur base, rachetées de violet vers le haut. Dans chaque épillet, on distingue trois arêtes droites, longues, purpurines, dont une sur la balle inférieure, & deux sur la supérieure; caractère remarquable & particulier à cette espèce.

Cette plante a été découverte dans les Alpes de Provence par M. Clarion. (Decand.)

26. AVOINE de Seyne. *Avena f. denensis*. Dec.

Avena paniculata erecta, contrahata; pedicellis geminis; glumis bi seu trifloris; flosculorum basi villorum valvula inferiore bifida. Decand. Synopl. pag. 126.

Cette plante, que je ne connois point, qui croît dans les Alpes de la Haute-Provence, aux environs de la ville de Seyne, se distingue, selon M. Decandolle, par sa panicule droite, resserrée. Les pédoncules sont geminés; les calices contiennent deux ou trois fleurs velues à leur base. La valve inférieure de la corolle est bifide.

27. AVOINE douteuse. *Avena dubia*. Leerf.

Avena paniculata, calicibus subaristatis, flosculis infimo terminalis, aristâ rectâ, reliquis apice biaristatis; dorso aristâ reflexâ. Leerf. Herborn. n°. 89. tab. 9. fig. 3. (Non *avena nervosa*.) Lam. III. — Roth, Germ. I. pag. 39. & vol. II. pag. 108. — Hoffm. Germ. 39.

Avena (renuix), *paniculata, spiculis erectis, subaristatis; floribus omnibus fertilibus, infimo aristato; aristâ incurvâ; reliquis apice biaristatis; aristis brevibus, rectis*. Moench. Method. 195. — Willden. Spec. Plant. 1. pag. 448.

Avena fertilis.? Allion. Aucl. pag. 45.

Avena triaristata. Villars, Dauph. 2. pag. 148. tab. 4.

Pentstemon avenacea. Kœl. Gram. 274.

Holcus biaristatus. Wigg. Prim. 776.

Ses tiges sont minces & grêles, hautes de six à dix pouces, un peu courbées à leur base, marquées de trois à quatre nœuds de couleur purpurine. Les feuilles radicales sont courtes, planes, étroites; celles de la tige un peu rudes, plies en long, presque subulées; les gaines glabres, accompagnées, à leur orifice, d'une membrane bifide, lancéolée. Les fleurs sont peu nombreuses, paniculées; les pédoncules rudes, solitaires, geminés ou verticillés, d'abord ferrés, puis éraillés au moment de la floraison, chargés d'un à trois épillets plus petits que dans l'espèce suivante; les valves du calice longues, aiguës, un peu inégales, marquées sur le dos de sept stries fines & profondes, contenant deux ou trois fleurs fertiles & munies d'arêtes; la valve extérieure lisse, terminée par deux pointes très-aiguës; l'arête dorsale couverte dans son milieu, presque deux fois plus longue que la corolle.

Cette plante croît sur les collines sèches, dans le Dauphiné, le Piémont, l'Allemagne. (V. f.)

28. AVOINE nerveuse. *Avena nervosa*. Lam.

Avena paniculata laxa, pauciflora; calicibus bifloris, costato-striatis; flosculis superne scabris, subulato-bifloris. Lam. III. Gen. 1. pag. 201. n°. 1115.

Avena (strigosa), *paniculata oblonga, contrahata, secundâ; flosculis geminis, apice biaristatis; dorso aristâ geniculatâ*. Schreb. Spicil. 52. — Kœl. Gram. 285. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 446. — Retz. Observ. 1. pag. 11. — Roth, Germ. I. pag. 39. & vol. II. pag. 107. — Hoffm. Germ. 39.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & plus; les feuilles planes, glabres; l'orifice de leur gainé garni de quelques poils. La panicule est lâche, allongée, purpurine, presque unilatérale; les pédoncules capillaires, soutenant un ou deux épillets; les valves calicinales d'un vert-pâle, glabres, oblongues, aiguës, marquées sur leur dos de cinq à sept nervures; elles renferment deux fleurs; leur valve extérieure un peu coriace, lisse à sa base, rude & striée vers le haut, terminée par deux pointes allongées; l'arête corse, noirâtre à sa partie inférieure, une fois plus longue que les valves.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France.

29. AVOINE luisante. *Avena nitida*. Desfont.

Avena paniculata spicata; glumis membranaceis, nitidis, pubescentibus, triaristatis. Desfont. Flor. atl. 1. pag. 102. tab. 51. fig. 2. — Triseum. Pers.

Ses racines sont pubescentes, capillaires, fasci-

enlées : il s'en élève des tiges droites, hautes d'un pied & plus, glabres, filiformes, nues à leur partie supérieure, simples, quelquefois rameuses ; les feuilles molles, pubescentes, larges d'environ une ligne. Les panicules sont serrées en un épi alongé, composées de rameaux courts, serrés ; le rachis pubescent ; les épillets un peu laineux, d'un jaun-pâle ; les valves calicinales presque égales, aiguës, lancéolées, scarieuses à leur sommet, ciliées sur leur dos, contenant trois à quatre fleurs, dont deux latérales, filiformes ; les corolles membraneuses ; leur valve extérieure concave, oblongue, aiguë, terminée par deux pointes en forme d'arête ; une arête dorsale plus longue, droite, très-fine ; la valve intérieure blanche, transparente, subulée ; les deux fleurs centrales légèrement pélicellées, plus petites, semblables aux deux autres.

Cette plante croît dans les sables, aux environs de Mascara en Barbarie ; elle a été découverte par M. Desfontaines. (V. f.)

50. AVOINE à petites fleurs. *Avena parviflora* Desfont.

Avena foliis pubescentibus, panicula patula, spiculis bi aut trifloris ; aristis brevibus, scissiformi, infra glumam apicem emergente. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 103. tab. 32.

Poëa segutum. Sav. Flor. pis. 1. pag. 116. tab. 1. fig. 3. — Boran. Etruf. 1. pag. 69.

Son port & la petitesse de ses fleurs donnent à cette plante l'aspect d'un agrostis. Ses tiges sont droites, filiformes, hautes d'environ un pied, quelquefois rameuses à leur base ; les feuilles étroites, pubescentes ; les fleurs nombreuses, fort petites, jaunâtres, réunies en une panicule étalée, alongée. Le calice contient deux ou trois fleurs. Ses valves sont inégales, concaves, aiguës ; la plus grande de la longueur de l'épillet ; les valves de la corolle aiguës ; l'arête droite, courte, sétacée, située un peu au dessous du sommet.

Cette plante croît en Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. (V. f.)

31. AVOINE naine. *Avena pumila*. Desfont.

Avena floribus paniculato-spicatis, spiculis subquadrifloris, glumis dorso ciliatis ; aristis scissiformi, longitudine glumae. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 103.

Avena (pumila), panicula contorta, spiculis quinque seu sexfloris ; flosculis hirsutis, sub apice aristatis ; aristis rectis. Lam. III. Genet. pag. 202. n°. 1118.

An kaluria phleoides ? Pers. Synops. Plant. 1. pag. 97.

Ses racines sont capillaires, pubescentes, fasci-

culées ; elles produisent plusieurs tiges filiformes, noueuses à leur base, souvent géocules, longues de trois à huit pouces, garnies de feuilles molles, pubescentes. Les fleurs sont réunies en une panicule droite, serrée, longue d'un à deux pouces. Le rachis est pubescent ; les pédoncules courts, inégaux ; les épillets fort petits, comprimés, d'un jaune-rouge, d'environ quatre fleurs ; les valves calicinales presque égales, scarieuses & en carène sur leur dos, membraneuses à leur sommet & à leurs bords ; la valve extérieure de la corolle munie, au dessous de son sommet, d'une arête droite, très-fine, à peine longue de deux lignes.

Cette plante a été découverte en Barbarie par M. Desfontaines, aux environs de Mascara, dans les sables. (V. f. in herb. Desfont.)

32. AVOINE à tige aplatie. *Avena plicatula*. Flor. germ.

Avena panicula subspicata ; spiculis oblongis, subquinquefloris, glaberrimis ; glumâ exteriori apice bifida ; culmo foliisque plicatis, planis, obtusis. (N.)

Cette espèce, très-remarquable, a ses tiges rudes, presque nues à leur partie supérieure, comprimées, hautes d'environ deux pieds, garnies à leur base de feuilles larges, planes, pliées en deux, presque imbriquées comme celles de l'iris, longues de six à dix pouces, obtuses, striées, rudes, particulièrement sur leurs gaines & sur leur dos ; les gaines très-comprimées, munies, à leur orifice, d'une membrane blanche ; une feuille supérieure très-courte, ovale, obtuse, un peu mucronée, en forme de spathe, laquelle très-éloignée des fleurs. Les fleurs sont disposées en une panicule alongée, serrée, en épi, droite ; les pédoncules courts, rudes, soutenant un, deux ou trois épillets oblongs, pédicellés, composés de quatre à cinq fleurs. Le calice est luisant, très-glabre, violet & argenté, à deux valves inégales, concaves, aiguës ; la corolle de même couleur, à deux valves très-inégales ; l'intérieure petite, scarieuse, obtuse ; l'extérieure beaucoup plus grande, bifide à son sommet, munie d'une arête dorsale, un peu brune, coudée, presque une fois aussi longue que la corolle.

Cette plante croît dans la Silésie. (V. f. in herb. Desfont.)

33. AVOINE des marais. *Avena palustris*. Mich.

Avena foliis planis, linearibus ; panicula confertiusculâ ; glumis bifloris ; floribus glabris, alieno matricis, alicuiusmodi apicem sensim aristato. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 72.

Ses feuilles sont planes, linéaires. Ses tiges se terminent par une panicule un peu serrée, composée d'épillets parfaitement glabres. Les valves

du calice enveloppent deux fleurs ; l'une sans arête ; l'autre munie, vers son sommet, d'une arête très-fine.

Cette plante croît à la Caroline & dans la Géorgie, aux lieux marécageux ; elle fournit aux troupeaux un excellent pâturage. (Mich.)

34. AVOINE striée. *Avena striata*. Mich.

Avena paniculata coarctata, rariflora; glumâ quinqueflora; floribus eadem longioribus, subimbricatis; valvula exteriori striatâ, dorso longius aristatâ; seminibus nudis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 73. Non Lam.

Ses tiges supportent une panicule peu garnie de fleurs lâches. Chaque calice contient cinq fleurs plus longues que les valves calicinales, presque glabres. La valve extérieure de la corolle est munie de plusieurs stries & d'une arête dorsale. Les semences sont nues.

Cette plante croît sur la chaîne des montagnes qui règne depuis la baie d'Hudson jusqu'au Canada. (Mich.)

35. AVOINE molle. *Avena mollis*. Mich.

Avena tota mollissimè pubescens, paniculâ racemoso-spicatâ, calicibus bifloris. Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 101. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 72.

Cette plante est couverte sur toutes ses parties d'un duvet mou & très-fin. Ses feuilles sont pubescentes ; ses fleurs disposées en une grappe médiocrement serrée ; ses ramifications rapprochées en épis. Ses calices ne renferment que deux fleurs point barbues, munies, sur leur valve extérieure, d'une arête droite, point torse, de la longueur des valves.

Cette plante croît au Canada. (Mich.)

36. AVOINE de Forskhal. *Avena Forskalei*. Vahl.

Avena paniculata, calicibus trifloris; corollis hirsutis, aristatis; calmo ramofo; foliis involutis, rigidis. Vahl, Symbol. 2. pag. 25.

Avena pensylvanica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 23. n°. 81.

Ses tiges sont rameuses, garnies de feuilles courtes, roides, roulées à leurs bords, velues à leur base, ciliées sur le bord de leur gaine ; les fleurs disposées en panicule. Les calices contiennent trois fleurs. Les corolles sont velues, particulièrement sur leur dos ; la valve extérieure bifide à son sommet, munie, un peu au dessous, d'une arête dorsale.

Cette plante croît en Égypte, dans les déserts. (V. f.)

37. AVOINE filiforme. *Avena filiformis*. Forst.

Avena paniculâ erectâ, tenuissimâ; calicibus unifloris; aristis calice duplè longioribus. Forst. Prodr. n°. 46. — Labill. Nov. Holl. 1. pag. 24. rab. 31.

Ses tiges cylindriques sont légèrement géniculées à leur base ; les feuilles filiformes, un peu glabres ; l'orifice de leur gaine accompagné d'une membrane oblongue, entière. La panicule sort de la feuille supérieure, qui sert de spathe. Cette panicule est droite, longue de six à sept pouces, étalée après la floraison ; ses ramifications très-longues, filiformes, nombreuses, un peu rudes, deux ou trois fois bifurquées ; les pédicelles un peu épaissis à leur sommet ; les fleurs solitaires. Le calice n'a qu'une seule fleur ; il se divise en deux valves inégales, lâches, aiguës, un peu membraneuses, denticulées sur leur dos. La corolle est pileuse à sa base ; la valve extérieure de moitié plus courte que le calice, souvent à quatre découpures sétacées, munie d'une arête dorsale, torse, une fois plus longue que le calice. On distingue à la base de chaque valve un poil pubescent.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labill.)

38. AVOINE à quatre foies. *Avena quadrifida*. Labill.

Avena paniculâ spiciformi, calicibus unifloris; corollarum valvula exteriori quadrifida. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 25. rab. 32.

Cette plante a beaucoup de rapport avec les agrostides ; elle en a davantage avec l'espèce précédente. Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, entièrement couvertes de gaines à leur partie inférieure, nues & très-allongées à leur partie supérieure ; les feuilles striées, un peu rudes ; l'orifice des gaines muni d'une membrane oblongue, entière. La panicule est serrée en forme d'épi, longue de trois à quatre pouces ; les valves calicinales presque égales, aiguës, denticulées sur leur dos, à une seule fleur. La corolle est pileuse à sa base ; la valve extérieure presque de la longueur du calice, divisée à son sommet en quatre découpures sétacées, munie d'une arête dorsale une fois plus longue que la corolle ; la valve interne, membraneuse, ovale-lancéolée, souvent bifide, aiguë.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labill.)

39. AVOINE bromoïde. *Avena bromoides*. Linn.

Avena subspicata, spiculis binatis, alterâ pedunculatâ; aristis divaricatis, calicibus obflores. Linn. Spec. Plant. pag. 1666.

Gramen avenaceum, montanum, spica simplici, aristis recurvis. Rai, Synopf. 262. — Tourn. Inst. 525, & Vaill. Herb. — Monti, Prodr. 55. tab. 66. — Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 104.

Gramen

Gramen avenaceum, alpinum, glabrum, angustifolium, locustis aristatis, in spicam dispositis. Scheuz. Gram. 218. tab. 4. fig. 21 & 22.

Gramen avenaceum, distichum, locustis longioribus, cum aristis nigricantibus, inflexis. Tourn. Inst. 525, & Vaill. Herb.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, noueuses à leur base, feuillées à leur partie inférieure; les feuilles glabres, droites, beaucoup plus courtes que les tiges; l'inflexion de leur gaine muni d'une membrane sailante, lancéolée, obtuse. Les fleurs sont glabres, disposées en un épi droit, formé par une panicule très-fermée, interrompue à sa base; les pédicules inférieurs à deux ou trois ramifications, portant chacune deux épillets, l'un pédicellé, l'autre presque sessile; les pédicules du milieu simples, à deux épillets; les épillets du sommet de l'épi alternes & sessiles. Le calice est à deux valves oblongues, aiguës, inégales, contenant de quatre à huit fleurs sessiles, alternes; les deux dernières stériles, fort petites, pédicellées; toutes les autres portées sur un rachis noueux, un peu genouillé, s'élevant du centre du calice; les valves de la corolle lisses, luisantes, oblongues, aiguës, l'extérieure munie d'une arête dorsale, genouillée, tortillée, divergente, de la longueur de l'épillet.

J'ai trouvé cette plante sur les côtes de Barbarie & dans les environs de Marseille. ♀ (V. v.)

40. AVOÏNE à feuilles roides. *Avena rigida.* Marsh.

Avena paniculata, calicibus bifloris, flosculis aristatis, receptaculis barbatis; foliis rigidis, distichis; culmo repente. Marsh. Flor. taur. 1. pag. 77.

Cette plante, selon Marshall, est très-voisine de l'*avena fissuraria* Linn., surtout par la forme de sa panicule & de ses épillets. Elle en diffère par ses tiges rampantes & radicantes à leur partie inférieure; par les feuilles plus courtes, roides, très-acuminées, glauques, souvent toulées sur elles-mêmes, étalées & disposées sur deux rangs. Les calices ne contiennent que deux fleurs barbues à leur base, munies d'une arête. Les anthères sont violettes; les stigmates blancs & plumeux.

Cette plante croît sur le Caucase, au bord des torrents; elle fleurit dans l'été. ♀ (Marsh.)

41. AVOÏNE maigre. *Avena macra.* Marsh.

Avena racemosa, calicibus subaristatis, flosculis glabris, inflexis mucis, ceteris aristatis. Marshall, Flor. taur. 1. pag. 77.

Petite plante, dont les tiges s'élèvent à peine à la hauteur de trois à quatre pouces. Ses feuilles sont étroites & glabres; les fleurs disposées en une grappe allongée; les épillets de la grandeur de *Botanique. Supplément. Tome I.*

ceux de l'*avena flavescens*, sessiles ou pédicellés solitaires ou géminés. Les calices contiennent deux à quatre fleurs glabres; l'inférieure mutique; les autres munies d'arêtes divergentes.

Cette plante croît dans le royaume d'Imérette, au pied du Caucase. ○ (Marsh.)

* Espèces moins connues.

Voyez l'article *TRISTEUM* pour quelques espèces d'avoine mentionnées par Thunberg, dans son *Prodrome des Plantes du Cap de Bonne Espérance*.

* *Avena (elephantina), panicula composita, calicibus quadrifloris; corollis pilosis, bifidis, aristatis.* Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. 23.

* *Avena (antaresis), panicula coarctata, calicibus quadrifloris; corollis bifidis, aristatis.* Thunb. l. c.

* *Avena (montana), panicula erecta; spiculis pedunculatis, subaristatis; foliis planis, subhirsutis, rigidis.* Monti, Prodr. Gram. tab. 65. — Gmel. Syll. Nat. 1. pag. 192. *An varietas avena-pulefcentis?*

* *Avena (pallens), panicula ramis erectis, calicibus bifloris, corollis hirsutis, foliis setaceis.* Link. in Bot. Journ. 2. pag. 314. *Habitat in Lusitania. An varietas minor avena elatioris?*

Observations. L'*avena sibirica* Linn. se trouve mentionnée parmi les *stipa*. (Voyez n°. 11.) L'*avena capensis* Linn. a été considérée par Thunberg comme appartenant aux *aristida*. L'*avena elatior*, n°. 4, var. 8, est l'*avena precatoria*. Thuill. Flor. patif., édit. 2, pag. 58. La variété * est l'*holcus avenaceus*. Scopul. Caro. 2. pag. 277. L'*avena la-singiana*, n°. 7, est la même que l'*avena panicea*. Ill. n°. 117, & Desf. Flor. atlant. 1, pag. 102, ainsi que l'*avena neglecta*. Savi, Flor. pis. 1, pag. 132, tab. 1, fig. 4. — Bot. Erfurt. 1, pag. 84; mais il reste incertain si c'est vraiment l'*avena la-singiana* de Linné. (Voyez Cavan. Icon. Rar. tab. 45, fig. 1. L'*avena fissuraria* Linn. ne paraît qu'une variété de l'*avena pulefcentis* Linn., n°. 11. Il se rapproche aussi beaucoup de l'*avena flavescens* Linn., dont il diffère par sa panicule plus serrée, d'un blanc-argente, souvent mêlée de violet-foncé. L'*avena versicolor*, n°. 13, Vill. Dauph. 2, pag. 142, tab. 4, est l'*avena Schæfferi*. Alk. Flor. pedem. n°. 2259. — Schuchz. Itin. 6, pag. 455, tab. 19, & Agr. Prodr. tab. 5, est l'*avena alpina* Latour. Chlor. Lugd. 3. L'*avena glumosa* de Michaux est la même plante que l'*avena spicata* Linn.

Quelques auteurs, en formant une sous-division d'espèces polygames, y réunissent plusieurs *holcus*, tels que l'*holcus luteus* — mollis — odoratus — redolens, &c. qu'ils joignent à l'*avena elatior*. On est étonné de voir l'*avena subspicata* Linn. rangé

parmi les *aira*, ayant tous les caractères des avoines, surtout une arête dorsale & tortillée. Kæler en a fait un *avena* avec raison, *avena airoides*, Gram. pag. 298.

1. AVOIRA de Guinée. *Elais guineensis*, Linn. & Lam. Ill. Gen. tab. 896. — Gz: in. tab. 6.

Gz: iner, sous le nom d'*elais melanococca*, tab. 6, présente la figure d'un fruit qu'il rapporte avec raison aux *elais*, & qu'il soupçonne même n'être qu'une variété de l'espèce précédente. Il en diffère en ce qu'il est plus petit, moins ventru; son enveloppe bien moins épaisse, de forme un peu oblongue, réfléchie subitement à son sommet, & terminée par une pointe oblique. Ses semences sont brunes, ovales, oblongues. Cet auteur le rapporte au *nux indica*, *velut larvam ostendens*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 387. fig. 1, 2, & au *nux indica larvosa*. J. Ehrh. Dendr. tab. 48.

Swartz, dans son *Flora Ind. occid.* vol. 1, pag. 619, a mentionné une autre espèce d'*elais*, qu'il nomme :

2. AVOIRA d'Occident. *Avoira occidentalis*, Sw.

Avoira frondibus pinnatis, foliis vaginatis, stipitibus caudicæque inermi. Swartz, l. c.

Palma non spinosa, foliis minoribus, fructu prunisiformi, minimo. Sloan. Jm. 172. Hist. 2. n°. 118. — Glick. Ord. nat. pag. 100. n°. 6.

Palma inermis, caudice erecto; pinnis amplexantibus, subvaginatis; bacis minoribus. Brown, Jm. pag. 343. n°. 6.

Vulgo thatch apud Jamaicenses.

Ses tiges sont hautes de cinquante à soixante pieds, lisses, dépourvues d'épines, couronnées par une touffe de feuilles ailées, très-étalées, longues de cinq à dix pieds; les folioles linéaires lancéolées, presque vaginales à leur base; les pétioles dépourvus d'épines, amplexicaules à leur base. La spathe universelle se divise en deux valves. Le spadice est long de deux pieds, composé de rameaux simples, rapprochés, longs d'un pied, rabattus, couverts d'écaillés serrées, très-nombreuses, de dessous lesquelles sortent de très-petites fleurs, les unes mâles, les autres femelles, mêlées entr'elles. Le calice est à six folioles, trois inférieures fort petites, trois supérieures presque de la longueur de la corolle, lancéolées, colorées; la corolle blanche, en entonnoir; le limbe à six découpures; six filaments très-courts, feublés, insérés sur les divisions de la corolle; les anthères en cœur, presque droites; point d'ovaire, excepté un embryon stérile. Dans les fleurs femelles, le limbe de la corolle est réfléchi à son sommet, recouvert par une coiffe membraneuse, qui s'ouvre transversalement à l'époque de la floraison,

& dont la partie inférieure reste dans le calice. L'ovaire est jaunâtre, en cœur; le style droit, subulé, plus court que la corolle; le stigmate à trois découpures. Le fruit est un diupe ovale, petit, légèrement anguleux, renfermant une seule semence. Il n'a été observé qu'à très-jeune.

Cette plante croît sur les montagnes, dans l'intérieur de la Jamaïque. B (*Descript. ex Swartz*.)

AVONG-AVONG. C'est, selon M. du Petit-Thouars, le nom malgache d'un arbre remarquable de Madagascar, qui paroit être une espèce de *gossia*, de la famille des araliacées (Juss.); il se distingue par son tronc presque simple, à la manière des palmiers, & par ses feuilles qui sont très-grandes & ailées avec impaire; mais chaque paire de folioles est redoublée, c'est-à-dire qu'à des deux côtés il en part deux du même point.

AURICULAIRE. *Auricularia*. Genre de plantes de la famille des champignons, établi par Bulliard, & compris parmi les thélyphores. (Voyez ce mot & les *Illustrations des Genes*, tab. 886.) La figure 1 est l'*auricularia carophyllæ* Bull., & la figure 2 l'*auricularia reflexa* Bull.

AURICULE ou OREILLE D'OURS, espèce de *primula*, ainsi nommée à cause de la forme de ses feuilles. Tournefort en faisoit un genre à raison de son calice beaucoup plus court que le tube de la corolle. (Voyez PRIMEVÈRE.)

AURICULÉES (Feuilles). *Auriculata folia*. On donne ce nom aux feuilles lorsque leur disque se prolonge, à leur base, en deux appendices séparés du pétiole.

AURONE. *Abroranum*. Genre de plantes de Tournefort, que Linné a réuni au *artemisia*. (Voyez ARMOISE.) L'auroone femelle est une antioche.

AUTOUR, écorce légère du Levant, spongieuse, sans goût, sans odeur, employée dans la préparation du carmin.

AUZUBA. Plumier, dans ses manuscrits & ses dessins non publiés, vol. 5, tab. 124, cite, sous ce nom, un grand arbre de Saint-Domingue, qui est, selon lui, l'*acoma* du pays, & qu'il croit être le même que l'*ajuba* dont parle Ovide dans son *Histoire des Indes occidentales*. On ne peut, d'après la figure & la description incomplète de Plumier, indiquer le vrai genre de cet arbre, qui a les feuilles alternes; les fruits de forme ovale, jaunes, charnus, remplis d'une humeur visqueuse, au milieu de laquelle est un noyau dur, semblable à celui d'une olive. Il paroit se rapprocher du *sideroxylon*. (Voyez ARGAN.) (Juss.)

AXIE de la Cochinchine. *Axia cochinchinensis*. Lour.

Axia caule ramosissimo; foliis lanceolatis, tomentosis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 44.

C'est, au rapport de Loureiro, un arbrisseau dont les racines, presque fusiformes, produisent plusieurs tiges rougeâtres, un peu couchées, noueuses, très-rameuses, hautes de deux pieds, garnies de feuilles opposées, inflexes, ovales-lancéolées, petites, tomenteuses, légèrement crénelées à leurs bords. Les fleurs sont petites, d'un blanc-rougeâtre, disposées en grappes presque terminales. Chacune d'elles offre :

1°. Un *calice* à trois folioles courtes, aiguës, inégales, caduques.

2°. Une *corolle* monopétale, campanulée, fort petite, régulière, dont le limbe est plane, à dix lobes courts, arrondis.

3°. Trois *étamines*, dont les filaments sont filiformes, de la longueur de la corolle, soutenant des anthères à deux lobes globuleux.

4°. Un *ovaire* inférieurement, ovale, cannelé, surmonté d'un style filiforme, de la même longueur que les étamines, terminé par un stigmate épais.

Le fruit consiste en une seule semence ovale, cannelée, velue.

Cet arbrisseau croît à la Cochinchine. *h* (Desfr. ex Lour.) D'après Loureiro, il est très-utile, dans les fièvres intermittentes, pour détruire les obstructions, les humeurs visqueuses des poulmons. Il excite l'utérus, la sueur & les règles.

Observations. Loureiro, jugeant cet arbrisseau digne, par ses propriétés, de rivaliser avec le ginseng, lui a donné le nom d'*axia*, du grec *axios* (digne), digne. Il a, par ses semences nues, quelques rapports avec les *boerhaavia* ; mais il se rapproche davantage des *valerianes* par son caractère général. On l'en distingue par son port, par sa corolle régulière à dix lobes. Quant aux trois folioles calicinales, il y a lieu de soupçonner que ce sont trois bractées, surtout si elles sont inférieures à l'ovaire. La corolle devrait être alors considérée comme un calice qui recouvre la semence. Loureiro ne dit point si ce calice, qu'il appelle *corolle*, fait corps ou non avec la semence.

AXINÉE. *Axinaea*. Ce genre a été établi par MM. Ruiz & Pavon dans leur *Prodrome de la Flore du Pérou*. Il appartient à la famille des *melastomées*, & se rapproche des *blakea*, dont il diffère principalement par l'ovaire libre ou supérieur. Le calice est en forme de coupe, persistant, divisé en cinq ou six dents ; la corolle composée de six pétales en doigte, insérés sur les bords intérieurs du calice ; douze étamines, dont six alternes plus longues, un ovaire oblong, tronqué, surmonté

d'un style recourbé, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple & obtus. Le fruit consiste en une capsule oblongue, tronquée, entourée par le calice persistant, à six loges, à six valves s'ouvrant à leurs angles.

On ne cite que deux espèces appartenantes à ce genre, mais sans description, & avec une seule phrase spécifique.

1. **AXINÉE lancéolée.** *Axinaea lanceolata*.

Axinaea foliis ovato-lanceolatis, quinque nerviis, dentatis. Ruiz & Pav. Prod. Fl. per. pag. 122.

C'est un arbre fort élevé, à feuilles opposées, ovales-lancéolées, dentées à leurs bords, marquées de cinq nervures. Il croît dans les grandes forêts au Pérou. *h*

2. **AXINÉE à fleurs purpurines.** *Axinaea purpurea*.

Axinaea foliis cordatis, septem nerviis, crenatopentatis. Ruiz & Pav. l. c.

Arbre de quinze à dix-huit pieds, des grandes forêts du Pérou. Ses feuilles sont en forme de cœur, à sept nervures, crénelées, dentées à leurs bords ; les fleurs de couleur purpurine ; elles varient, dans le nombre de leurs parties, de cinq à dix. *h*

1. **AXIRIS cétaoïde.** *Axyris ceratoides*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 753. fig. 1. — Gært. de Fruct. & Sem. 2. pag. 210. tab. 128. fig. 1. — Vahl, Symb. 1. pag. 76. — Jacq. Icon. Rar. tab. 189, & Miscell. 2. pag. 355.

Achyranthes (papposa), foliis alternis, crassifolius, linearis-lanceatis, obtusis. Forsk. Flor. ægypti-arab. 48.

Diotis ceratoides. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 368.

Ceratophyllum papposum. Pers. Synops. Plant. 2. pag. 552.

Krascheninnikovia. Guldest. Aq. Petrop. 16. pag. 548. tab. 17.

Le calice à deux divisions, persistant & recouvrant le fruit, qu'il surmonte par deux espèces de cornes, à fait regarder cette espèce, par quelques botanistes, comme devant former un genre particulier, qu'ils ont nommé *diotis* : c'est avoir une bien grande pitié pour les genres nouveaux.

2. **AXIRIS amara-thoise.** *Axyris amaranthoides*. Linn. — Lam. III. Gen. tab. 753. fig. 2.

AXIS. **ASSIS** : noms arabes du *bangue*, espèce de chanvre, ou ayant avec lui beaucoup d'affinité. Les Turcs le nomment *asfarah*. On trouve encore dans Pomet le piment sous le nom d'*axis*.

AXYRIS. (Voyez **AXIRIS**.)

• Zzz 2

AYA-PANNA, espèce d'eupatoire, dont il sera fait mention au supplément de ce genre. Je vais, en attendant, rapporter ici ce que M. Aubert du Petit-Thouars a dit de cette plante, dont la découverte & les propriétés ont été, dans le tems, le sujet de plusieurs dissertations curieuses.

« *L'aya-panna* est le nom que les habitants du Brésil donnent à une plante de leur pays, à laquelle ils attribuent de grandes propriétés : ce qui engage Augustin Baudin, frère de celui qui a dirigé le voyage à la Nouvelle-Hollande, entrepris pour le progrès des sciences, à la porter à l'île de France ; ce qu'il a exécuté en 1797. Ce ne fut pas sans peine qu'il parvint à se la procurer. Elle fut confiée aux soins de M. Céré ; elle avait déjà été éprouvée avec succès dans la culture des arbres à épiceries. Sur la réputation de cette plante, on crut qu'on lui avait confié un trésor encore plus précieux ; aussi appliqua-t-on tous ses soins à la multiplier : il y parvint heureusement avant que l'ardeur avec laquelle on cherchoit à se la procurer fût à son comble ; car il auroit eu peine à la conserver. Le récit des cures multipliées qu'elle avoit produites, étoit tel, qu'on devoit la regarder comme une panacée universelle ; aussi n'y avoit-il aucun malade, de quelque nature que fût son mal, qui ne l'enviasât comme seule capable de finir ses souffrances. Elle détruisoit l'effet de toute espèce de poison, celui des minéraux, celui des végétaux, celui des serpens. Quant à ces derniers, ce qui vaut mieux que tous les contre-poisons, la nature a écarté de nos îles africaines ces terribles animaux ; mais il y existe quelques bestes que d'autres contrées ne connoissent pas : c'est ainsi que la chair de plusieurs espèces de poissons est sujete à devenir un vrai poison sur certaines plages, dans certaines saisons.

« *L'aya-panna* remédioit efficacement ; ce qui tiroit un grand nombre d'habitans de la position de Tantale, où la crainte les tenoit ; mais ce qui étoit encore plus précieux, cette plante faisoit disparaître tous les symptômes effrayans du tétanos. En un mot, chaque jour découvroit une nouvelle propriété à cette plante merveilleuse ; en sorte qu'il cût été plus coort de faire l'énumération des maladies qu'il lui avoit eût guéries, que de celles qu'elle avoit guéries. Il n'eût pas étonnant, d'après cela, que l'on ait nûs beaucoup d'empressement à se la procurer ; aussi l'a-t-on vu vendre, au bazarr ou marché, à raison de trois sous la feuille. (Il est vrai que c'est la plus petite monnoie du pays.) M. Céré, trouvant beaucoup de facilité à la multiplier de marcottes (ses graines ont constamment avorté jusqu'à présent), se trouva bienrôr à même de répondre à l'empressement que les habitants mettoient à s'en procurer des pieds, & par ce moyen elle se trouva au dessus des besoins.

« Il eût été cependant difficile de parvenir à ce

point, si l'on ne se fût un peu refroidi sur son compte. En effet, l'expérience ne tarda pas à faire reconnoître que l'on avoit au moins exagéré ses vertus ; en sorte que, par une sorte de réaction qui est presque toujours la suite de l'engouement, on vit successivement diminuer le nombre de ses partisans & ce qui lui donna le tems de se développer dans tous les jardins. Il est même à craindre que, comme tant d'autres remèdes, elle ne descende au point d'être totalement oubliée. Il est probable cependant qu'elle peut être employée avantageusement dans plusieurs cas ; mais il faut que des expériences suivies & répétées par des gens de l'art lui assignent la place qu'elle doit occuper dans la matière médicale. On peut conjecturer d'avance qu'elle n'y sera jamais comptée parmi le petit nombre de remèdes héroïques, qui, dans les mains d'un médecin habile, décident réellement la cure des maladies critiques : c'est ce que dénotent ses qualités extérieures, son odeur & sa saveur. Son odeur est bien aromatique, mais à un degré inférieur. Il en est de même de son amertume ; elle est mêlée à une légère astriction, mais si foible, qu'il est bien difficile de penser qu'elle puisse jamais faire beaucoup d'impression sur l'économie animale.

« La botanique offre un autre moyen de conjecturer l'usage auquel on peut employer une plante quelconque : c'est par l'examen des rapports ou degrés d'affinité qu'elle peut avoir avec d'autres plantes ; en un mot, sa classification naturelle. La place de *l'aya-panna* n'a pas été difficile à déterminer. Dès qu'elle a montré sa fleur, elle a dû être placée parmi les composées : on n'a pas eu plus de peine à reconnoître qu'elle faisoit partie du genre eupatoire ; mais cette famille étant la plus nombreuse du règne végétal, il n'a pas été aussi facile que dans d'autres, de circonscrire ses vertus générales ; & il n'y a pas la vingtième partie des espèces qui la composent, qui aient place dans la matière médicale, & par conséquent qui aient été éprouvées. Le plus grand nombre de celles qui y figurent, se font également remarquer par leur odeur forte, aromatique ou fécale, & par leur saveur plus ou moins amère, ces deux qualités réunies ou séparées. Le genre *eupatoire* lui-même, contenant une cinquantaine d'espèces, n'est pas plus circonscrit dans ses propriétés générales. La plus commune, qui habite l'Europe, a eu, comme *l'aya-panna*, un moment de vogue ; mais elle est laissée depuis long-tems par les praticiens, quoiqu'elle paroisse mériter leur attention par son amertume & une légère odeur aromatique. Il y a d'autres espèces qui possèdent cette dernière qualité à un degré plus éminent : c'est parmi elles que doit se ranger *l'aya-panna*.

La description abrégée & les caractères botaniques de *l'aya-panna* ont paru, pour la première fois, dans la *Gazette de Madras*, du 8 août 1801 ;

ils faisoient partie d'une lettre que M. Aubert du Petit-Thouars avoit adressée au docteur Anderson, & que celui-ci, après l'avoir traduite, fit insérer dans cette feuille. M. Ventenat, qui ne pouvoit en avoir connoissance, fit de cette plante l'objet d'un Mémoire lu à l'Institut national : depuis, il en a publié une figure dans son bel ouvrage sur les plantes du Jardin de la Malmaison. (*Dict. des Scienc. nat.*)

1. AYÈNE délicate. *Ayenia pusilla*. Linn. — Lam. Ill. tab. 732. — Cav. Dissert. 5. p. 289. tab. 147. — Gärtn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 382. tab. 79.

4. AYÈNE lisse. *Ayenia levigata*. Swartz.

Ayenia foliis ovatis, integris, glaberrimis; geminis pedicellato; nectario decemfolio, radiato. Sw. Prodr. pag. 97. — Flor. Ind. occid. 2. p. 1151.

Arbrisseau divisé en rameaux flexueux, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, obtusés, entières, glabres, arrondies à leur base, veinées, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, munies, à la base des pétioles, de stipules très-petites, subulées. Les fleurs sont petites, d'un rouge de sang, solitaires, axillaires; les pédoncules filiformes, plus longs que les pétioles; le calice à cinq folioles pâles, ovales, concaves; l'appendice tubulé, divisé, à son limbe, en dix découpures étalées, linéaires, acuminées, un peu rétrécies à leur sommet, pubescentes, de la longueur des folioles du calice; les filamens presque nuls; les anthères arrondies, à deux lobes; le style court, à peine saillant; le stigmate presque en tête.

Cette plante croît parmi les broussailles, à la Jamaïque. h. (Swartz.)

AYENIA. (Voyez AYÈNE)

AYLANTHUS. (Voyez LANGIT & PONGELION.)

AYTONIA. (Voyez AITONE.)

AZADARACHT. (Voyez AZÉDARAC.)

AZALÉA. (Voyez AZALÉE.)

AZALÉE. *Azalea*. Ce genre est un démembrement du *camæhodendron* de Tournefort, qui réunissoit en un seul genre les *rhododendrum* & les *azalea* de Linné, entre lesquels, en effet, il n'existe d'autre différence que celle du nombre des étamines, & dont la corolle, dans les *azalea*, est irrégulièrement divisée à peu près comme dans les chèvrefeuilles.

Les nombreuses variétés que l'on obtient des *azalea viscosa* & *nudiflora*, que M. de Lamarck regarde elles-mêmes comme deux variétés, ren-

dent douteuses plusieurs espèces que l'on a données comme nouvelles.

L'*azalea procumbens*, n^o. 4, est gravé dans les *Illustrations*, tab. 110, fig. 1, & l'*azalea glauca* fig. 2. Michaux, dans la *Flora de l'Amérique septentrionale*, présente les espèces suivantes comme devant être distinguées.

7. AZALÉE blanche. *Azalea canadensis*. Mich.

Azalea foliis subius tenui tomento canescentibus, nervo non scirgato; floribus roseis, non viscidis; calice minutissimo, filamentibus exsertis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 150.

Dans cette plante, les fleurs sont nues, c'est-à-dire, dégagées de feuilles, réunies en ombelle; la corolle couleur de rose, point visqueuse, glabre ou à peine pubescente lorsqu'on l'examine à l'œil nu. Son tube est plus court que dans l'*azalea viscosa*; les dents du calice très courtes, obtusées, arrondies; les étamines saillantes; les feuilles revêtues en dessous d'un duvet léger & blanchâtre.

Cette plante croît sur le bord des ruisseaux, dans la Baie-Caroline. h.

8. AZALÉE chèvrefeuille. *Azalea peryclymenoides*. Mich.

Azalea subnudiflora, foliis glabellis; nervo supra lanuginoso, subius scirgato; floribus majoribus, non viscosis; filamentibus longissimè exsertis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 151.

Elle se distingue de l'*azalea viscosa* par ses fleurs point visqueuses. Ses feuilles sont presque glabres, vertes à leurs deux faces, lanugineuses sur leur principale nervure en dessus, pileuses en dessous. La couleur est rose; le tube velu, plus court que le limbe, qui est beaucoup plus grand que dans les autres espèces; les étamines très-saillantes; les dents du calice courtes, ovales, arrondies; les fleurs presque nues.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à la Nouvelle-Jersey. h.

9. AZALÉE couleur de souci. *Azalea calendulacea*. Mich.

Azalea subnudiflora, foliis utrinque pubescentibus, persicis hirsutis; floribus amplioribus, non viscosis, calendulacis; calice densius oblongis; corollâ tubo hirsuto, laciniis brevioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 151.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'*azalea pontica*; mais ses feuilles sont glabres, tandis que dans celle-ci elles sont pubescentes à leurs deux faces; & lorsqu'elles sont entièrement développées, elles restent un peu hérissées. Les fleurs sont plus grandes, presque nues, point visqueuses,

d'un jaune ~~ou~~ safran, quelquefois d'un rouge de feu tirant sur le jaune; le tube de la corolle velu, plus court que les divisions du lymbe; les dents du calice oblongues.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les hautes montagnes de la Caroline & sur les bords du fleuve Savannah. η

* AZALÉE à feuilles de romarin. *Azalea rosmarinifolia*. Burm.

Azalea floribus solitariis; foliis linearilanceolatis, marginatis, hirsutis. Burm. Flor. ind. pag. 42. tab. 3. fig. 3. — Linn. Ill. Gen. 1. pag. 493. n°. 2255.

Ses feuilles sont alternes, linéaires-lancéolées, velues, repliées à leurs bords, étroites, assez semblables à celles du romarin. Les fleurs sont solitaires & non disposées en ombelle; le calice ferrugineux; la corolle jaune.

Cette plante croît au Japon.

* AZALÉE pileuse. *Azalea pilosa*. Mich.

Azalea foliis pilosis, ad apicem niveis; floribus ciliatis, corollis ovatis. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 494. — Mich. Journ. d'Hist. nat. vol. 1. pag. 410.

Cette plante, si véritablement elle appartient à ce genre, est remarquable par ses fleurs à huit étamines; par ses corolles ovales. Ses capsules sont oblongues, anguleuses; ses feuilles pileuses, d'un blanc de neige à leur sommet. Elle croît sur les plus hautes montagnes de la Caroline, vers les sources de la rivière Catawba. η

AZARA. *Azara*. Genre de plantes dycotylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille naturelle n'a pas encore pu être déterminée, qui paroit avoir des rapports avec les *prokia*, & peut-être pouvoir se réunir à la famille des rosacées. Ruiz & Pavon, auteurs de ce genre, n'en ont décrit dans leur *Prodrome de la Flore du Pérou*, que le caractère générique, & en ont mentionné trois espèces à tiges ligneuses, sous forme d'arbrisseaux, dont les feuilles sont amères & les fleurs odorantes.

Le caractère de ce genre est d'avoir :

1°. Un calice divisé en quatre, cinq ou six parties renversées pendant la floraison, & puis redressées.

2°. Point de corolle.

3°. Un grand nombre d'étamines; vingt-deux à trente-six, attachées sous l'ovaire; les filaments capillaires, de la longueur du calice, soutenant des anthères arrondies, à deux lobes.

Des filaments stériles (nécessaires), semblables à ceux des étamines, mais plus courts, placés entre eux, & de couleur.

4°. Un ovaire libre, arrondi, surmonté d'un style subulé, terminée par un stigmate obtus.

Le fruit consiste en une baie entourée par le calice, terminée par le style, à une seule loge, contenant des semences nombreuses, attachées sur trois placentas adhérens aux parois internes de la baie.

ESPÈCES.

1. AZARA dentée. *Azara ferrata*. Ruiz & Pav.

Azara foliis geminis, serratis, majori lanceolato, minori subrotundo; corymbis multifloris. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. peruv. pag. 137.

Arbrisseau dont la cime est presque globuleuse; les feuilles géminées, dentées en scie; une plus grande lancéolée, une plus petite un peu arrondie. Les fleurs sont nombreuses, disposées en corymbe. Il croît au Chili dans les forêts. η

2. AZARA à feuilles entières. *Azara integrifolia*. Ruiz & Pav.

Azara foliis geminis, integerrimis, majori obovato; floribus spicatis, pendulis. Ruiz & Pavon, Prodr. Flor. peruv. pag. 138.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de dix-huit ou vingt pieds. Ses feuilles sont géminées, entières, inégales; la plus grande en ovale renversé. Ses fleurs sont disposées en épis pendans. Il croît dans les grandes forêts, au Chili, dans les environs de la ville de la Concepcion. η

3. AZARA dentée. *Azara dentata*. Ruiz & Pav.

Azara foliis geminis, dentatis, majori elliptico; floribus umbellatis. Ruiz & Pav. l. c.

Ses feuilles sont dentées, géminées, inégales; la plus grande elliptique; les fleurs disposées en ombelle. Il croît dans les mêmes lieux que les deux espèces précédentes. η

AZÉDARAC. *Melia*. M. de Jussieu range ce genre dans la famille des azédaracs ou meliacées.

1. AZÉDARAC bispinné. *Melia azedarach*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 352. — Cavan. Dissert. 7. pag. 363. tab. 207.

* *Melia* (composita), foliis pinnatis, foliolis infimis ternatis; pedunculis, calicibus corollisque tomentosis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 559.

An melia dubia? Cavan. Dissert. 7. pag. 364.

Arbrisseau dont les rameaux sont noirâtres en vieillissant, épais, cylindriques, ridés, striés, marqués de cicatrices; les plus jeunes tomenteux & feuilés; les feuilles alternes, longuement pétiolées, allées avec une impaire; les folioles pétiolées, glabres à leurs deux faces, ovales, acy-

minées, veinées, lâchement drônées, entières à leur base, pubescentes dans leur jeunesse; les feuilles inférieures ternées; les pétioles pubescens, surtout à leur base. Les fleurs sont disposées en un corymbe paniculé, axillaire, plus court que les feuilles; les pédoncules cylindriques, pubescens; le calice tomenteux, à cinq dents obtuses; les pétales linéaires, obtus, tomenteux en dehors; l'appendice cylindrique & denté; les anthères ovales, aiguës, insérées à l'orifice de l'appendice; le stigmate en tête. Le fruit n'a point été observé.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *H. (Willd.)*

AZÉROLIER : nom particulier sous lequel est connu le *Crataegus azarolus* Linn. Son fruit se nomme *azarole* : c'est notre *NEFLIER*, n°. 2.

AZIER. *Nonatelia*. Ce genre, très-rapproché des *psycotria*, en diffère par le nombre des loges & des semences : il n'y en a que deux dans les *psycotria*, cinq dans les *nonatelia*. M. de Lamarck a figuré, dans les *Illustrations des Genres*, le n°. 4, *nonatelia racemosa*, tab. 155, fig. 1, & le n°. 5, *nonatelia violacea*, fig. 2.

AZIMA. (*Voyez AZIME*, & Ill. Gen. tab. 807. — *Scabif. Thef.* 1. tab. 13. fig. 1.) — *Monetia barlerioides*, Lhérit. Stirp. tab. 1.

AZOLLA. (*Voyez AZOLLE*, & Ill. tab. 863.)

Cette plante a la forme d'un *salvinia*, & paroît en avoir les caractères, autant qu'on peut en juger d'après l'inspection de ses parties, infiniment petites. (*Juss.*)

AZORELLA. (*Voyez AZORELLE*.)

AZORELLE. *Azorella*. Ce genre, établi par M. de Lamarck, a été depuis nommé *chamitis* par Gärtn. Ce dernier auteur y a réuni une autre plante sous le nom de *chamitis trispidata*, qui se trouve être la même que le *bolax* de Comertson & de Juséieu, & dont M. de Lamarck avoit fait une espèce d'*hydrocotyle* (*hydrocotyle gumifera*, n°. 9), à laquelle il réunit quelques variétés, dont la troisième (var. 7) me paroît trop bien distinguée des autres pour ne pas en être séparée. Peut-être faudroit-il également réunir aux *azorella* le genre que MM. Ruiz & Pavon ont nommé *fragosa* dans leur *Flora du Pérou*. D'après ces observations, voici le tableau des espèces auxquelles se trouvent réunies quelques autres qui ont été découvertes à la Nouvelle-Hollande par M. de Labillardière, & d'autres décrites par Cavanilles.

ESPÈCES.

1. AZORELLE filamenteuse. *Azorella filamentosa*. Lam.

Azorella foliis indivisis, integerrimis; petiolis infirmè dilutatis, ciliatis Vahl, Symb. 3. pag. 47. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1365. — Lam. Ill. Gen. tab. 189. fig. 1.

Chamitis integrifolia. Gärtn. de Fruct. & Sem. 1. pag. 94. tab. 22. fig. 4.

Les fruits sont petits, légèrement comprimés, ovales, couronnés par les dents du calice, formés de deux semences marquées de trois lignes saillantes sur le dos. Gärtn. a observé que quelquefois ces fruits se divisoient en trois semences : caractère très-singulier & jusqu'alors unique dans les ombelles.

2. AZORELLE à trois pointes. *Azorella trispidata*.

Azorella foliis trifidis, petiolis nudis Vahl, Symb. 3. pag. 48. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1365. — Lam. Ill. Gen. tab. 189. fig. 2. 4.

Chamitis trifurcata & trispidata. Gärtn. de Fruct. & Sem. pag. 95. tab. 22. fig. 4.

Hydrocotyle gumifera. Lam. Dict. 3. pag. 156. n°. 19. var. 8.

Bolax glebaria. Comm. Herb. & Mss. — Juss. pag. 226 & 453.

Vulgairement GOMMIER des Malouines.

3. *Eadem, foliis brevioribus, densissimè imbricatis*. Lam. 1. c. & Ill. fig. 3.

Les fruits sont beaucoup plus grands que dans l'espèce précédente; les fleurs plus rares & quelquefois solitaires.

3. AZORELLE porte-gomme. *Azorella gumifera*.

Azorella foliis integerrimis, glabris, densissimè imbricatis. (N.)

Hydrocotyle gumifera, var. 7. Lam. Dict. 3. pag. 156. n°. 19.

Cette espèce diffère de la première par ses feuilles très-petites, ovales, très-glabres, un peu charnues, lisses, presque luisantes, un peu concaves, légèrement aiguës, très-imbriquées; elles diffèrent de la seconde par ses mêmes feuilles très-entières, plus courtes, moins épaisses, & par la plante entière beaucoup plus petite. Elle croît sur le sommet des montagnes du détroit de Magellan, où elle a été recueillie par Comertson. (*F. sin herb. Desfont.*)

3. AZORELLE grasseuse. *Azorella espicosa*. Cavan.

Azorella foliis multifariam imbricatis, crassis; apice reflexo, ovato, acuto; umbellis simplicibus, terminalibus. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 57. tab. 484. fig. 2.

Azorella crassifolia. Petf. S; nosp. Plant. t. pag. 303.

Ses racines sont fusiformes, garnies de quelques fibres; elles produisent des tiges nombreuses, ramassées en gazon, longues d'environ trois à six lignes, couvertes de petites feuilles épaisses, glauques, imbriquées, très-rapprochées des tiges, & concaves à leur partie inférieure, ensuite réfléchies, ovales, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées en une ombelle simple, terminale; médiocrement pédonculée; l'involucre composé de cinq folioles ovales, aiguës; charnues, adhérentes à leur base. Les pédicelles sont courts, capillaires, au nombre de cinq à huit. Le calice est fort petit, persistant, à cinq dents, adhérent à l'ovaire; le fruit ovale, à deux semences, à trois stries.

Cette plante croît au Chili, sur les hautes montagnes. (*Descript. ex Cavan.*)

4. AZORELLE à feuilles de linéaire. *Azorella linearifolia*. Cav.

Azorella foliis linearibus, sparsis; umbellis universalibus & parvis. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 17. tab. 485.

Cette plante se rapproche du *gingidium* de Forster, dont elle diffère par ses pétales très-entiers, par les semences à trois stries tuberculées. Elle est remarquable par sa grandeur. Ses tiges sont hautes de deux pieds, cylindriques, diviées en rameaux épars, garnis de feuilles nombreuses, épaisses, linéaires, subulées, fort étroites, longues d'environ un pouce. L'ombelle universelle est composée de quatre ou six rayons; les parties d'un peu plus; les pédicelles très-courts; les involucre formés de trois à six folioles persistantes, subulées. Le calice est à cinq dents persistantes; la corolle composée de cinq pétales ovales, aiguës; les filaments capillaires, presque de la longueur de la corolle; les anthères arrondies, pattagées par un sillon; l'ovaire un peu comprimé; deux styles divergens, plus courts que la corolle; les stigmates épais. Le fruit est ovale, globuleux, médiocrement comprimé; trois stries à chaque face, chargées de très-petits tubercules.

Cette plante croît au port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande. (*Descript. ex Cav.*)

5. AZORELLE lancéolée. *Azorella lanceolata*. Labill.

Azorella umbellis compoitis, foliis lanceolatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 74. tab. 99.

Arbrisseau à rameaux cylindriques, étalés, légèrement pileux; à feuilles alternes, lancéolées, de trois à cinq nervures, glabres, entières, très-aiguës. Les ombelles sont composées de quatre à huit rayons, rarement simples, plus souvent terminés par de petites ombellules; les involucre formés, ainsi que les involucrelles, de trois ou six folioles subulées, de la longueur des pédicelles. Le calice est fort petit, à cinq dents; les pétales ovales, oblongs, très-entiers; les étamines à peine de la longueur des pétales; les anthères presque globuleuses, à deux loges; l'ovaire ovale, un peu comprimé; les styles réfléchis; les stigmates simples, aigus. Le fruit est légèrement globuleux, comprimé, couronné par les dents du calice, divisé en deux semences légèrement anguleuses, portant sur leur dos cinq ou sept lignes saillantes, toutes, ou les alternes hérissées de tubercules.

Cette plante a été découverte par M. de Labillardière dans la terre de Van-Leuwin. 7

AZORELLE ovale. *Azorella ovata*. Labill.

Azorella umbellis compoitis; foliis ovatis, imbricatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 74. tab. 100.

Cet arbrisseau, haut d'un pied & plus, revêtu d'un épiderme très-mince, transparent, caduc, est parfaitement semblable au précédent dans la disposition & la forme de ses fleurs; mais il en est très-différent par ses feuilles ovales, acuminées, presque imbriquées, à trois ou cinq nervures.

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. 7

6. AZORELLE comprimée. *Azorella compressa*. Labill.

Azorella umbellis compoitis; caule compresso, subaphyllo. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 75.

Ses tiges sont couchées à leur base, rameuses, herbacées, comprimées, à deux angles, longues d'un pied & plus, presque nues, excepté quelques folioles capillaires fort petites, binnées, trides ou simples, placées sous la division des rameaux. Les rayons de l'ombelle sont très-inégaux; les ombellules simples ou quelquefois composées; l'involucre des ombelles de quatre à six folioles subulées; celles des ombellules à deux ou quatre, toutes plus courtes que les rayons. Le fruit est transversalement elliptique, comprimé, partagé en deux semences convexes en dehors, ridées, marquées de trois lignes saillantes.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (*Labill.*) Elle végète dans le sable & produit de la gomme.

BAAIA-PALETI. Rheede, Hort. malabar. 2, tab. 10. C'est le nom malabar de l'*Avicennia littoralis*, figuré dans Rheede. (Voyez CANANG, n°. 3.)

BABATAMIEL. C'est, suivant Surian, le nom caraïbe du *tripteris jamaicensis* Linn.

BABELA : arbre de l'Inde, qui, au rapport de Codigny, est une espèce d'*acacia*. Suivant le même auteur, il nourrit l'insecte qui fournit la gomme-laque. On le nomme *laknia* dans le Bengale. (Juss.)

BABOSA-QUINADO : nom portugais d'une espèce de *cifus* de la côte de Malabar, figurée & décrite par Rheede, Hort. malab. vol. 7, pag. 77, tab. 41. (Voyez ACHIT, n°. 4.)

BABOULI-CANTI : nom brachmane du *flacurtia sepia*, figuré parmi les plantes du Coromandel, publiées par Roxburg, pag. 48, tab. 68, & que Rheede avoit déjà mentionné dans son *Hort. malabar.* vol. 5, pag. 77, tab. 39. (Voyez RAMONTCHI, Suppl.)

BACASIE épineuse. *Bacaya spinosa*. Ruiz & Pavon.

Bacaya foliis obovatis, mucronatis, cartilagineis ; floribus foliatis. Syst. veget. Flor. peruv. pag. 288.

Genre de plantes hémicléales, de la famille des corymbifères, établi par MM. Ruiz & Pavon ; il comprend des arbrisseaux à fleurs solitaires, radiales, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice commun, ovale, composé d'échelles imbriquées, scarieuses ; les extérieures ovales-lancolées ; les intérieures linéaires.

La corolle est radiale ; les demi-fleurons, placés à la circonférence, sont hermaphrodites, fertiles, à quatre dents, munis d'une longue soie qui part de l'ouverture du tube. Un seul fleuron stérile occupe le centre : il est très-grand, divisé à son sommet en cinq lobes, & inséré sur un corps foqueux ; il renferme un stigmate simple & une seule anthère stérile, placée dans le fond du tube. Dans les autres fleurs hermaphrodites le stigmate est bifide, & les filaments des étamines insérés sur le tube.

Les semences sont surmontées d'une aigrette plumée, & le réceptacle est velu.

Les tiges se divisent en rameaux chargés de

Botanique. Supplément, Tome I.

feuilles alternes, presque sessiles, en ovale renversé, glabres, cartilagineuses, entières, mucronées à leur sommet.

Cette plante croît sur les montagnes élevées, au Pérou. 7

BACAU, BACAUVAN, BACHAO, BU-CHAU : noms divers, sous lesquels est désigné par Camelli, dans ses plantes des Philippines, publiées par Rai, une espèce de manglier ou palétuvier, qui offre des rapports avec celui que Linné nomme *rhizophora gymnorhiza*, & dans lequel Bruguières trouva des caractères un peu différents de ceux du manglier ordinaire. Ses pétales, pliés en deux dans leur longueur, présentent chacun la forme d'une gouffe ou filique, dans laquelle étoient renfermées six étamines.

L'héritier a cru ce caractère suffisant pour séparer cette espèce & en former un genre nouveau, qu'il a nommé *bruguiera*. Le *bacau*, examiné sur un dessin de Camelli, & d'après sa description, semble appartenir à ce nouveau genre. « La fleur est blanche, dit-il, composée d'étamines qui forment deux à deux de quatre boîtes (*alabastres*). Le fruit, noirâtre, porté sur un calice à quatre divisions, rempli d'un suc laiteux, a la forme d'une bouteille renflée par le bas, de laquelle sort une production (la radicule) flexible, verte, de la grosseur du petit doigt, longue d'un pied & demi & pendante. De divers points de la tige naissent des rameaux qui se dirigent vers la terre, & vont y prendre racine. » Cette organisation désigne assez clairement un manglier, & surtout une espèce voisine du *bruguiera* (palétuvier.) (Juss.)

BACCAUREA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs polygames, incomplètes, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles simples, entières, & dont les fleurs sont disposées en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs polygames, dioïques ; un calice à cinq découpures ; point de corolle ; six à huit étamines ; un stigmate concave ; une baie à trois loges dans les fleurs femelles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs hermaphrodites, disposées en petites grappes, offrent chacune :

1°. Un calice inférieur, à cinq découpures ovales, charnues, réfléchies, persistantes.

2°. Une corolle nulle.

3°. Six à huit étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères arrondies, à deux loges.

4°. Un ovaire stérile; point de style; un stigmate concave, laciolé.

Les fleurs femelles, sur un pied séparé, disposées en grappes fort longues, offrent :

1°. Le calice, la corolle, comme dans les fleurs hermaphrodites.

2°. Un ovaire arrondi; point de style; un stigmate fort grand, lenticulaire, mamelonné.

Le fruit est une baie arrondie, succulente, à trois loges, contenant chacune deux semences ovales, un peu comprimées.

Observations. Ce genre, établi par Loureiro, tire son nom de la couleur de ses baies, d'un beau jaune-doré.

ESPÈCES.

1. *BACCAUREA ramiflora*, *Baccaurea ramiflora*. Lour.

Baccaurea ramis & summo caule fructificantibus, baccis glabris. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813.

Noni-hua. Ruomph. Amboin. lib. 4. pag. 21. tab. 9.

Arbre d'une médiocre grandeur, dont les rameaux sont étalés; les feuilles ovales, oblongues, très-entières, acuminées, éparées, pétioles; les fleurs d'un vert-jaunâtre, disposées en grappes simples, pendantes du sommet des tiges & des principales branches. Le fruit est une baie épaisse d'un pouce, inodore, d'un jaune d'or, glabre, à trois loges, d'une saveur aigrelette, assez douce, bonne à manger.

Cette plante se rencontre fréquemment dans les jardins, à la Cochinchine. *h* (Lour.)

2. *BACCAUREA cauliflora*, *Baccaurea cauliflora*. Lour.

Baccaurea imo caule fructificante, baccis glabris. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813.

Ses tiges & ses feuilles sont semblables à celles de l'espèce précédente. Ses fleurs en diffèrent en ce que les grappes sont simples, pendantes seulement du sommet des tiges, & non des rameaux. Les baies sont glabres, globuleuses, à trois loges, d'un pourpre-foncé, d'une saveur acide, bonnes à manger.

Cette plante est cultivée dans les jardins, à la Cochinchine. *h* (Lour.)

3. *BACCAUREA sauvage*, *Baccaurea filvestris*. Lour.

Baccaurea ramis fructificantibus, baccis tomentosis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 813.

Arbre peu élevé, mais plus grand que les deux précédents, muni de rameaux obliques. Les feuilles sont éparées, pétioles, ovales, lancéolées, très-entières, pubescentes en dessous; les fleurs disposées en grappes simples, pendantes de l'extrémité des rameaux & non des tiges; les découpures du calice courtes, étalées; les baies presques rondes, d'un brun-jaunâtre, tomenteuses, à cinq loges; une semence dans chaque loge. Leur saveur est douce, très-agréable dans les individus sauvages; elle devient acide & rebutante dans les plantes cultivées.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Cochinchine. *h* (Lour.)

BACCHANTE. *Baccharis*. Les bacchantes sont si peu distinguées des conyzes, que plusieurs auteurs ont réuni ces deux genres, tandis que d'autres ont placé indifféremment plusieurs espèces dans l'un ou l'autre genre. MM. Ruiz & Pavon, dans leur *Flora du Pérou*, ont établi leur genre *molina*, composé d'espèces ou nouvelles ou prises dans ces deux genres, qui ont les fleurs hermaphrodites stériles, & les seules femelles fertiles.

Nous devons à M. de Jussieu les observations suivantes, insérées dans les *Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris*, vol. 7, pag. 385.

« En parlant du genre *baccharis*, Gærtner a dit avec raison que ce genre différait très-peu de la conyze; mais il ne savoit pas que les vrais *baccharis* de l'Amérique sont diques. Cette observation, singulière dans une plante composée, faite d'abord par Richard & par Vahl sur une espèce, a été confirmée sur toutes par Michaux; elle doit faire la base du caractère distinctif du *baccharis*, auquel il faut dès-lors rapporter le *molina* de Ruiz & Pavon, nombreux en espèces, qui est fondé principalement sur ce caractère, & toutes les espèces de *baccharis* non diques devront être reportées au conyze. Le *placus* de Loureiro se rapprochera du même genre, & se confondra peut-être avec lui lorsqu'il sera mieux connu. »

Cette observation importante établit les limites des deux genres *baccharis* & *conyza*, & devient un avertissement pour s'affurer des espèces réellement diques. Il eo est beaucoup sur lesquelles il est difficile de prononcer, faute d'avoir été observées sous les rapports que nous venons d'indiquer; elles doivent rester provisoirement dans les genres où elles le trouvent, jusqu'à ce qu'elles soient mieux connues. Nous y ajouterons les suivantes :

Le *baccharis iuvifolia* est figuré dans les *Illustrat.* tab. 698, fig. 1.

12. BACCHANTE à fleurs agglomérées. *Baccharis glomeruliflora*. Pers.

Baccharis (seffiliflora), *foliis levibus*, *cuneato-obovatis*, *superius dentatis*; *floribus in ramulis per glomerulos axillares, sessilibus et remotis dispositis*; *calicem squamis superius rufis*. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 125. — Pers. Synop. Plant. 2. pag. 425.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, élan-
cés, très-glabres, striés, anguleux, garnis de
feuilles alternes, distantes, presque sessiles, rétré-
ciss en coin à leur base, ovales, très-lisses, obs-
tusifs, entières ou légèrement dentées vers leur
sommet, coriaces, un peu plieuses. Les fleurs
sont presque sessiles, réunies en paquets dans l'ai-
selle des feuilles; leur calice ovale, composé
de petites écailles d'un brun-roussâtre à leur
sommet.

Cette plante croît à la Caroline, dans les forêts
voisines de la mer. (V. f.)

13. BACCHANTE à feuilles étroites. *Baccharis angustifolia*. Mich.

Baccharis glaberrima, *paniculato ramosissima*, *foliis angustato-linearibus, integris*; *panicula compo-
sita, multiflora*; *calicibus minutis, subvaginatis*.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 125.

Cette espèce est glabre sur toutes les parties.
Ses tiges se divisent en rameaux nombreux, pani-
culés, garnis de feuilles alternes, étroites, linéai-
res, entières, quelquefois un peu dentées, sur-
tout les premières. Les fleurs forment une panicule
ramifiée, à fleurs nombreuses. Leur calice est fort
petit, & contient environ une vingtaine de fleurs.

Cette plante croît sur les côtes maritimes, de-
puis la Caroline jusqu'à la Floride. (Mich.)

14. BACCHANTE à feuilles d'arboüset. *Baccharis arbutifolia*. Vahl.

*Baccharis foliis oblongis, sessilibus, rigidis, argutis
seratis, venoso-reticulatis*; *corymbis terminalis, flori-
bus congestis*. Vahl, Symb. 3. pag. 97. — Willden.
Spec. Plant. 3. pag. 1915.

An corymb arbutifolia? Lam. Dict.

Arbrisseau parfaitement glabre, dont les ra-
meaux sont marqués de cicatrices & d'une ligne
de chaque côté, formée par le prolongement de
la principale nervure. Les feuilles ressemblent à
celles de l'arboüset; mais elles sont un peu plus
courtes, lisses, sessiles, fermes, veinées, réticu-
lées, finement dentées en scie, un peu rétrécies
& entières à leur base, redressées, presque imbr-

quées. Les corymbes sont simples, terminaux; les
pédoncules anguleux, munis d'une feuille lanceo-
lée; les fleurs globuleuses.

Cette plante croît au Pérou. *h* (Descript. ex
Vahl.)

15. BACCHANTE à fleurs sessiles. *Baccharis seffiliflora*. Vahl.

*Baccharis foliis oblongis, sessilibus, dentatis inter-
grisque*; *floribus terminalibus, sessilibus*. Vahl, Symb.
3. pag. 97.

Ses rameaux sont glabres, ainsi que toute la
plante, presque anguleux à leur partie supérieure
par des lignes décurrentes, garnis de feuilles ses-
siles, les inférieures alternes, les supérieures op-
posées, longues d'un demi-pouce au moins, ova-
les, un peu arrondies, coriaces, nerveuses, quel-
quefois munies de trois à quatre dents; les fleurs
sessiles, cylindriques, réunies, au nombre de trois
ou quatre, au sommet des rameaux, une fois plus
grandes que celles du *baccharis humifolia*.

Cette plante croît au Brésil. *h* (Vahl.)

16. BACCHANTE velue. *Baccharis villosa*. Vahl.

*Baccharis foliis lanceolatis, petiolatis, extrorsum
ferratis, subita ramisque villosis-fabromensis*. Vahl,
Symbol. 3. pag. 98. — Willden. Spec. Plant. 4.
pag. 1916.

Elle paroît avoir des rapports avec le *baccharis
Dioscoridis*; elle en diffère par les rameaux, les pé-
doncules velus, ainsi que les feuilles en dessous.
Les tiges sont ligneuses; les feuilles linéaires,
plus étroites, rétrécies à leur base en pétiole, sans
dentelures ni prolongemens auriculaires. Les fleurs
sont disposées en corymbes fastigiés, allongés,
pédunculés; les feuilles des ramifications sub-
ulées; les folioles calicinales sétacées & non lan-
céolées; l'aigrette roussâtre.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. *h*
(Vahl.)

17. BACCHANTE dioïque. *Baccharis dioica*.
Vahl.

*Baccharis foliis cuneiformibus, subnatis, in-
nervatis, levibus, trinerviis*; *floribus dioicis*. Vahl,
Symb. 3. pag. 98. — Willd. Spec. Plant. 3. pag.
1918. — Lam. Ill. tab. 698. fig. 3.

Ses rameaux sont glabres, striés, marqués de
lignes décurrentes, garnis de feuilles alternes,
presque sessiles, très-lisses, cuneiformes, en-
tières, un peu épaisses, longues d'un pouce & plus,
traversées par trois nervures qui disparaissent vers
le sommet. Les fleurs sont dioïques, sessiles, au
nombre de quatre à sept, réunies presque en tête à
l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît à Saint-Domingue & dans l'île de Mont-Ferrat. *h* (Vahl.)

Le *Baccharis chinensis* Loar. & plusieurs autres espèces non mentionnées ici seroient rangées parmi les conyzes.

18. BACCHANTE à petites fleurs. *Baccharis parviflora*.

Baccharis foliis angustis-lanceolatis, subdentatis; panicula pauciflora, pedunculis multibracteatis. (N.) III. tab. 698. fig. 2.

Petit arbruste dont les tiges sont droites, cylindriques; les rameaux presqu'opposés; les feuilles nombreuses, éparées, fort étroites, lancéolées, un peu aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, quelques unes entières, la plupart à dentelures aiguës, peu marquées. Les fleurs sont disposées en une panicule courte, étalée, terminale ou insérée dans la bifurcation des derniers rameaux prolongés; les ramifications presqu'opposées, simples ou bifides, munies, dans toute leur longueur, de bractées nombreuses, très-petites, aiguës. Les fleurs sont petites, presque globuleuses; les écailles calicinales aiguës. Je n'ai pas pu m'assurer si elles étoient dioïques.

Cette plante a été recueillie par Commerçon, & se trouve dans son herbier. *h*

BACCHARIS. (Voyez BACCHANTE.)

BACONIA. (Voyez BACONE.)

BACONE à corymbes. *Baconia corymbosa*. Decand.

Baconia foliis glabris, lanceolatis, acutis; corymbis terminalibus. (N.) Decand. Annal. Mus. Paris. vol. 9. pag. 219.

Arbruste dont M. Decandolle a fait un genre particulier, de la famille des rubiacées, qui se rapproche des *garniera*, & qui offre pour caractère générique :

Un calice à quatre lobes, non adhérent à l'ovaire; une corolle en entonnoir, à quatre lobes, velue à son orifice; un ovaire libre; une baie sèche, à deux loges, à deux semences.

Ses tiges se divisent en rameaux obscurément tétragones, un peu pubescens, comprimés vers leur sommet, garnis de feuilles pétioles, opposées, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes en dessus, plus pâles en dessous, entières, acuminées à leur sommet; à nervures simples, alternes, latérales, faillantes. Les fleurs sont nombreuses, disposées en une panicule ample, terminale; les ramifications opposées ou presqu'alternes, dépourvues de bractées, terminées par des fleurs nombreuses, presqu'ou-

cine. Le calice est divisé en quatre lobes obus; la corolle infundibuliforme, barbue à son orifice; son limbe étalé, à quatre lobes; les étamines insérées à l'orifice du tube; les filaments courts; les anthères faillantes, linéaires, contournées après la fécondation; l'ovaire libre, ombiliqué à son sommet. Le fruit est une baie sèche, à deux loges, renfermant deux semences à demi globuleuses. L'embryon est cylindrique, redressé; le périsperme cartilagineux.

Cette plante croît en Afrique, à Sierra-Leona. *h* (V. f. in herb. Decand.)

Observations. Ce genre a été consacré par M. Decandolle à la mémoire du célèbre Bacon de Verulam; il est remarquable par son ovaire libre, & non adhérent avec le calice, caractère qu'on avoit cru d'abord ne pas convenir aux rubiacées, mais qui cependant avoit été trouvé depuis par M. de Lamarck dans le *garniera* & le *paguera*.

BACOUCOU, BACOUCOUHAKECHIA : noms caraïbes du bananier, selon Surian & M. Desfontaines.

BACHALA : nom arabe de l'amaranthe oléacée, n°. 8, & de quelques espèces congénètes, suivant Dalechamp.

BACHI-BACHI. On nomme ainsi à Madagascar, dit M. de Jussieu, une espèce de muscadier.

1. BACILE maritime. *Crithmum maritimum*. Linn. — Lam. III. tab. 197.

2. BACILE à larges feuilles. *Crithmum latifolium*.

Crithmum foliis cuneiformibus, fissis. Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 342.

Crithmum foliis pinnatis; foliis sessilibus, obtusis, lobatis; lobis dentatis. Linn. Suppl. 180.

Ses tiges sont droites, glabres, cannelées, cylindriques; ses feuilles ailées, très-glabres; les folioles opposées, au nombre de deux à trois paires, sessiles, décurrentes à leur bord extérieur, insensiblement dilatées en lobes & dentées. Les involucrets sont composés de six à huit folioles lancéolées; les fleurs jaunes; les semences lisses, glabres, cannelées, à rebord saillant.

Cette plante croît à Ténériffe, sur les côtes maritimes. *o*

* *Crithmum* (canariense), *foliis carnosis, bipinnatis, basi amplè vaginantibus.* Cavan. in Annal. scienc. nar. pag. 35.

BACOPA. (Voyez BACOPE.)

BACOPE aquatique. *Bacopa aquatica*. Aubl. — Lam. III. tab. 102.

BACOVE, fruit d'une espèce de bananier.

BACTRIS. Ce genre, confondu par Linné avec les cocotiers, en diffère par ses fruits, dont l'embryon est latéral, c'est-à-dire, placé sur le côté de la graine, au lieu d'être situé à la base, comme dans les cocotiers. Il a d'ailleurs pour caractère essentiel :

Des fleurs monoïques; les deux sexes disposés sur le même régime; une spathe universelle.

Dans les fleurs mâles, un calice à trois divisions; une corolle monopétale, trifide; six étamines.

Dans les fleurs femelles, un calice à trois folioles petites, caduques; trois pétales beaucoup plus grands, arrondis, persistans; un ovaire à trois stigmates.

Le fruit est un drupe globuleux, charnu, fibreux, à une seule loge, contenant une noix osseuse, marquée de trois trous à sa base; l'embryon latéral.

E S P È C E S.

1. **BACTRIS** à petits fruits. *Bactris minor*. Jacq.

Cocos guianensis. Linn. — Lam. Dict. 2. p. 38.

Bactris minima. ? Gært. de Fruct. & Sem. 2. pag. 169. tab. 139. fig. 5. (Voyez COCOTIER, n°. 3.)

2. **BACTRIS** à gros fruits. *Bactris major*. Jacq.

Bactris fructu ovato. Jacq. Amer. 280. tab. 171. fig. 2.

3. ? *Bactris globosa*, *minor*. Gært. de Fruct. & Sem. 1. pag. 22. tab. 9. fig. 1. — Lam. Illustr. tab. 895.

Palma pinis & *caudice ubique aculeatissimis*, *fructu majusculo*. Brown. Hist. Jam. 344. n°. 7.

Palma frondibus pinnatis, *ubique aculeatis*; *aculeis nigricantibus*, *fructu majore*. Mill. Dict. n°. 3.

Broad palma-cocco. Grew. Mus. p. 203. tab. 16.

Cette espèce ressemble beaucoup, par son port, à la précédente; mais son tronc, d'environ deux pouces de plus de diamètre, s'élève à la hauteur de vingt à vingt-cinq pieds. Ses fruits sont presque de la grosseur d'un œuf de pigeon. La plante a, figurée par Gærtner quant au fruit, diffère peu de cette espèce. Ses drupes sont globuleux, un peu comprimés, d'un brun-jaunâtre.

Cette plante croît aux environs de Carthagène. L.

BADAMIA. Gært. de Fruct. & Sem. 2. pag. 90. tab. 97. C'est très-probablement le *terminalia mauritiana*. (Voyez BADAMIER, n°. 4, & Suppl. Observ.) Gærtner en fait un genre particulier,

dont le fruit est un drupe sec, à une loge, médiocrement acuminé & obtus à son sommet; l'enveloppe très mince, renfermant une chair spongieuse, traversée dans sa longueur intérieurement par six protuberances un peu anguleuses, composées de fibres presque ligneuses; une seule semence oblongue; les cotylédons foliacés, roulés en spirale; point de plumule; la radicule supérieure alongée, cylindrique, un peu comprimée, presque à deux angles. Cette description du fruit coïncide avec les observations de M. du Petit-Thouars sur le *terminalia mauritiana*? (Voyez BADAMIER.)

BADAMIER. *Terminalia*. Ce genre, de la famille des mycobolans, est composé d'arbres ou arbrisseaux des deux lodes, remarquables par la beauté de leur port & par leurs usages. Ils ont de grandes feuilles entières, placées sur les nœuds ou à l'extrémité épaisse des rameaux, où elles forment des touffes, d'où sortent de longs épis de petites fleurs dépourvues de corolle.

Parmi les espèces mentionnées par M. de Lamarck, il faut ajouter pour synonymie : 1°. au *terminalia catappa*, n°. 1. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 197. & Collect. 1. pag. 130. — Lam. Ill. tab. 848. fig. 1. 2°. Au *terminalia moluccana*, n°. 2, *terminalia* (glabrata), *foliis obovatis*, *urinaque glabra*. Forst. Prodr. n°. 389. & Plant. Escul. pag. 52. — Spreng. Antiq. Bot. 102. tab. 2. — *Terminalia glandulosa*. Roxb.

3°. Le *terminalia mauritiana*, n°. 3, & Illustr. tab. 848, fig. 2 (voyez BADAMIA, Suppl.), n'est, selon M. du Petit-Thouars, qui s'observe cet arbre à l'île-de-France, que l'individu déjà vieux du *terminalia benjoin*, n°. 4. (Voyez BIENJOINT, Suppl.) Cet arbre est le plus gros & le plus grand de l'île-de-France & de l'île Bourbon. Son feuillage, d'un vert-jaunâtre, contraste d'une manière remarquable avec le vert-sombre dont les arbrisseaux des tropiques sont assez généralement colorés. Son bois est préféré à tous les autres, dans le pays, pour faire des pirogues. Il produit une résine odorante, connue sous le nom de *saux benjoin*, & employée dans les églises en place d'encens. Le vrai benjoin n'est extrait, comme on l'a cru successivement, ni de ce badamier ni d'une espèce de laurier, mais d'un alibousier décrit & figuré par Dryander, *At. Angl.* vol. 77, pag. 208, tab. 12, sous le nom de *styrax benjoin*. (Voyez ALIBOUSIER, n°. 5, Suppl.)

Les espèces suivantes doivent être ajoutées à ce genre.

6. **BADAMIER** à feuilles en cœur. *Terminalia subcordata*. Willd.

Terminalia foliis obovatis, *basè glandulosa*, *cordatis*, *obtusis*, *subrepandis*, *urinaque glabra*. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 968. — Humb. & Bonpl.

Cette espèce se rapproche beaucoup du badamier, n°. 1 ; mais ses feuilles sont échanquées en cœur à leur base, inégalement sinuées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet ; les pétioles légèrement pubescens.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, où elle a été découverte par MM. Humboldt et Bonpland.

7. BADAMIER à feuilles elliptiques. *Terminalia elliptica*. Willd.

Terminalia foliis oblongo-ellipticis, rotundato-obtusis, incrimatis, subtus pilosiusculis, basi subius biglandulosis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 969.

Ses rameaux sont bruns, cylindriques ; les ramifications pubescentes, garnies de feuilles longues de deux ou trois pouces, oblongues, elliptiques, rétrécies à leur base, arrondies, très-obtus et légèrement mucronées à leur sommet, glabres & d'un vert-foncé en dessus, plus pâles & parsemées en dessous de poils rares & couchés, munis en dessous, à leur base, de deux glandes en forme de coupe, légèrement pédicellées. Les fleurs sont paniculées & terminales.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

8. BADAMIER chérule. *Terminalia chetula*. Retz.

Terminalia foliis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis, utrinque glabris ; petiolis supra biglandulosis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 969.

Terminalia foliis obovatis, nudis ; petiolis supra biglandulosis, racemis simplicibus. Retz. Observ. 5. pag. 31.

Arbre de vingt à vingt-quatre pieds, à rameaux très-diffus, épars, cendrés, garnis de feuilles pétioles, presque opposées, ovales, très-entières, glabres, foyeuses & pubescentes dans leur jeunesse ; deux glandes au sommet du pétiole. Les fleurs sont sessiles, verticillées, en grappes terminales ; le calice court, campanulé, jaune & glabre en dehors, velu en dedans, à cinq petites dents ; dans le fond, des glandes oblongues & barbues ; dix étamines alternes, plus longues que le calice ; l'ovaire oblong, plus épais & piléux à sa base.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ♀ (*Retz.*)

9. BADAMIER à larges fleurs. *Terminalia latifolia*. Swartz.

Terminalia foliis obovatis, basi eglandulosis, obtusis, subserratis, utrinque glabris ; costa medio subius pubescente. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 969.

Terminalia foliis obovatis, subserratis ; drupis

carneis. Swartz, Prod. 68, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 747.

Arbor maxima, forte prunisera, cortice canthina, folio longissimo latissimoque. Sloan, Catal. 184. Hist. pag. 130. — Rai, Hist. 3. — DuRoi. pag. 43.

Cette espèce diffère de celle n°. 6 par ses feuilles rétrécies en coin & non échanquées en cœur à leur base, garnies, à leurs bords, de petites dents distantes & glanduleuses, leur principale nervure quelquefois blanchâtre & pubescente en dessous. Son tronc est très-épais, haut de cent pieds & plus ; les rameaux étalés ; les fleurs disposées en grappes axillaires, terminales. Elles sont blanchâtres, nombreuses, petites, sessiles ; les inférieures hermaphrodites ; les supérieures mâles. Le fruit est un drupe très-gros, ovale, acuminé, un peu comprimé, en forme de nœcle, pulpeux, d'un vert-rougeâtre, d'une saveur douce, contenant un noyau à une seule semence ovale.

Cette plante croît à la Jamaïque. ♀

* *Terminalia (arbuscula), foliis ovato-lanceolatis, integris, pubescentibus ; ramis dichotomis, racemis crassis*. Swartz, Prodr. pag. 68, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 750.

Ses fruits & ses fleurs mâles ne sont point connus. Ses tiges, hautes de six à sept pieds, sont très-rameuses ; les feuilles parsemées, pétioles, ovales, lancéolées, entières, pubescentes ; les fleurs petites, sessiles, disposées en grappes axillaires, terminales ; le calice urcéolé, velu en dedans ; les étamines plus longues que le calice ; les anthères en cœur ; l'ovaire ovale, surmonté du style subulé, de la longueur des étamines.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque. ♀ (*Swartz.*)

Le fruit, figuré Ill. tab. 848, fig. 3, est celui du *tanibouca guianensis*. Aubl. (*Voyez TANIBOU-CIER.*)

BADIAN ou BADIANE. *Illicium*.

1. BADIANE de la Chine. *Illicium anisatum*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 493, fig. 2. — Gært. de Fruct. & Sem. 1. pag. 338. tab. 69. fig. 6. — Regnault, Bot. tab. 396.

2. BADIANE de la Floride. *Illicium floridanum*. Linn. — Lam. Ill. tab. 493, fig. 1. — Gært. l. c. pag. 339. — Duham. edn. nov. tom. 5. pag. 190. tab. 47.

3. BADIANE à petites fleurs. *Illicium parviflorum*. Vent.

Illicium foliis obtusis ; floribus pusillis, obsoletis ; flavis ; petalis calicibusque rotundatis, concavis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 326.

Illicium anisatum. Bartram's, Journ. pag. 24. Lond. 1769.

Illicium petalis definitis, ovato-subrotundis, melis. Vent. Jard. de Cels, pag. 22. tab. 21.

Cette espèce se distingue à ses fleurs plus petites que dans les autres espèces, le nombre des pétales & des divisions du calice étant d'ailleurs borné à six ou huit. C'est un arbrisseau rougeur vert, aromatique dans toutes ses parties, mais dont l'odeur se dissipe insensiblement lorsqu'il a été arraché à la terre, les fruits restant seuls odorans. L'odeur devient même plus vive & plus pénétrante à mesure qu'ils se dessèchent. Les riges sont droites, cylindriques, hautes de huit à dix pieds, extrêmement rameuses, d'un bois dur & fragile, recouvertes d'une écorce mince, d'un gris-cendré; les rameaux alternes, aillaires, d'un vert-blanchâtre, portant, à leur extrémité, des boutons oblongs, pointus, dont les écailles sont ovales, concaves, munies de cils peu apparens, caducs. Les feuilles sont alternes, pétiolées, très-entières, lancéolées, obtuses ou aiguës à leur sommet surmonté d'une glande, lisses, glabres à leurs deux faces, planes, coriaces, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous; les pétioles très-courts.

Les fleurs sont presque axillaires, réunies deux ou trois au sommet des jeunes rameaux, inclinées, pédonculées, inodores, couleur de miel, munies, sur leur pédoncule, de quelques bractées fort petites, alternes, ovales, aiguës, à peine ciliées, très-caduques. Le calice est composé de six à huit folioles caduques, placées sur deux rangs, verdâtres en dehors, d'un jaune de miel en dedans; six à huit pétales attachés au bord du réceptacle, sur lequel sont portés les ovaires disposés sur deux rangs, ovales-arroondis, médiocrement ouverts; les intérieurs plus étroits; six éramines disposées sur un seul rang; douze ovaires oblongs, comprimés, réunis en un faisceau conique, inférés sur un disque épais; autant de capsules que d'ovaires, ouvertes en étoile, parsemées de points dorés, vues à la loupe, à une seule semence, de couleur brune, elliptique, très-luisante, tronquée à sa base, & munie d'un ombilic cartilagineux.

Cet arbrisseau d'abord été découvert par Bartram & ensuite par Michaux dans la Floride, sur les bords du lac Georges, introduit en France, & cultivé chez Cels & au Jardin des Plantes en 1789. Il passe l'hiver dans l'orangeier, & fleurit dans le courant de l'été. 5. (Vent.)

BADINDJIAN; nom arabe de la melongène, selon Forskhal. (*Solanum melongena* Linn.) Sloane, dans son *Histoire de la Jamaïque*, indique, comme synonymes de ce mot, deux autres mots arabes, *bendingian* & *baikiesiaon*, dans lesquels on reconnoît en effet le même nom différemment orthogra-

phié. D'Herbelot (*Bibliothèque orientale*) comprend, sous les noms arabes de *badingian* & de *badingian*, le fruit du *solanum pomiferum*, que nous connoissons sous les noms de *verranger* & *pommes d'amour*. Il regarde ces mots arabes comme formés par corruption du persan *badingian*, dont les Espagnols ont fait *verangens* & *berangens*; les Italiens, *melanzana*, & les botanistes anciens, *mala insana*. Cette dernière dénomination n'a donc pas son origine dans la propriété qu'auroit ce fruit de produire la folie d'amour, & c'est à tort qu'on en a tiré le nom français de *pomme d'amour*. (*Dict. des scienc. nat.*)

BADOK-BANKON. On nomme ainsi à Java une plante qui est le *balloa difflua*. Burm. Ind. pag. 126.

BADULA. (Voyez TINELIER.)

BADULAM. C'est le nom que porte, à Ceilan, un petit arbre de la forme d'un cerisier (Burm. Zeyl. pag. 122, tab. 103), qui est l'*ardipa humilis* des botanistes, & dont les fruits sont administrés avec sucres, sous forme de rob, dans les fièvres ardentes. (*Jussieu*.)

B.E.A. (Voyez BÉOLÉ.)

BÆCKEA. (Voyez TIONGINE.)

BÆBOTRYS. (Voyez MISA.)

BAGASSA. (Voyez BAGASSIER.)

BAGASSE. Ce mot est passé des langues du midi de l'Europe dans nos colonies; il vient de *baga*, baie, le *bacca* des Latins. *Bagoça* est l'enveloppe des graines des raisins ou des olives, dépouillée de son suc par le pressoir, & formant le marc. On l'a appliquée, dans nos îles, à la canne à sucre qui a passé par le moulin, & par une plus grande extension, aux tiges d'indigo retirées de la cuve après la fermentation. La bagasse de canne sert à nourrir les bestiaux quand elle est fraîche, ou à chauffer les fourneaux lorsqu'elle a été séchée au soleil.

La bagasse d'indigo fait un bon engrais lorsqu'on lui a donné le tems de vieillir; on l'entasse à cet effet dans des fosses. Il croît dessus un champignon qui, quoique fort ressemblant à l'*agaricus muscarius*, est regardé comme très-délicat à l'île de France. Il paroît que la double fermentation de la cuve & de la putréfaction ne détruit pas la faculté germinative des graines d'indigo; car de la bagasse provenant de plantes avancées & montées en graine, ayant été portée, au bout de cinq ans d'ensoufflage, sur les terres, en peu de jours le sol se trouva couvert de jeunes plantes d'indigo, en aussi grand nombre que si on les eût semées express. (*Dict. des scienc. natur.*)

BAGAPATE, PAGAPATE ou BAGATBAT : nom donné, dans les Philippines, à un arbre décrit par Cameli & Sonnetat, connu maintenant des botanistes sous celui de *Jonnarua*. (Voyez BLATT.)

BAGUENAUDIER. *Colutea*. Il étoit assez naturel, en ne considérant que la fructification, de réunir, ainsi que l'a fait M. de Lamarck, les *phaca* Linn. aux *colutea*, surtout en conservant parmi ces derniers les espèces herbacées; mais si l'on s'arrête à leur port & à leur lieu natal, on ne pourra s'empêcher de les séparer. En effet, les baguenaudiers proprement dits sont des arbrisseaux d'un bel aspect, qui s'élèvent à quatre ou six pieds en touffes agréables, qui plaisent également par la couleur glauque ou vert-tendre de leur feuillage, & par leurs fleurs d'un jaune-pâle (d'un rouge-vif dans le baguenaudier d'Éthiopie), disposées en grappes, & auxquelles succèdent des gouffes vésiculeuses; ils se plaisent dans les sols arides, au bord des précipices, dans les fentes des rochers, à une modeste élévation. Les *phaca*, au contraire, sont en général de petites plantes herbacées, rampantes ou peu élevées, qu'on ne trouve que sur les montagnes alpines, où l'on aime à les rencontrer, mais qui ont trop peu d'éclat pour entrer comme ornement dans nos jardins.

Les *phaca* diffèrent des baguenaudiers par leur fructification, en ce qu'ils n'ont point le style baïbu, & que leurs gouffes sont moins tendues, un peu comprimées. M. Decandolle ajoute que, dans la plupart des espèces, ces gouffes se tordent sur leur pédoncule pendant la maturation, de sorte que la future qui porte les graines, de supérieure qu'elle étoit, devient inférieure, s'ouvre & laisse tomber les graines.

Quant aux espèces herbacées des *colutea* de Linné, M. Decandolle en a fait un genre à part, sous le nom de *lessertia*, auquel il donne pour caractère essentiel d'avoir les gouffes membraneuses, comprimées, point vésiculeuses; le style courbé en arc; le stigmate en tête; la carène obtuse.

ESPÈCES.

* COLUTEA. Linn. *Tige ligneuse.*

1. BAGUENAUDIER commun. *Colutea arborescens*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 624. fig. 1 & 2. — Duham. edit. nov. 2. pag. 90. tab. 22.

Cet arbrisseau, selon M. Desfontaines, ne peut être le *colutea* de Théophraste, qu'il dit être un arbre fort élevé (*arbor magnitudine praestans*), dont le feuillage est employé à la nourriture des troupeaux; ce qui ne peut convenir à notre baguenaudier. (*Hist. des arb.* 2. pag. 315.)

2. BAGUENAUDIER du Levant. *Colutea orien-*

talis. Lam. Ill. tab. 624. fig. 3. — Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 4. tab. 307.

Colutea eruenta. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1139. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 55.

Colutea sanguinea. Pall. Flor. ross. 2. pag. 174.

Colutea humilis. Scopol. Infubr. 2. pag. 23. tab. 12.

3. BAGUENAUDIER d'Alep. *Colutea halepica*. Lam.

Colutea Pocockii. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1140. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 55.

4. BAGUENAUDIER d'Éthiopie. *Colutea frutescens*. Linn.

* *Colutea (rigida)*, pinnis lanceolatis, glabris; caule fruticoso, erecto, glabro. Thunb. Prodr. 134.

* *Colutea (obtusata)*, pinnis linearibus; caule frutescente, erecto; floribus racemosis, erectis. Thunb. Prodr. 134.

* LESSERTIA. Decand. *Tige herbacée.*

5. BAGUENAUDIER sous-ligneux. *Colutea perennans*. Jacq.

Colutea foliolis oblongis, pubescentibus; caule herbaceo, erecto; racemis terminalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1141. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 56. — Jacq. Vind. 511, & Hort. 3. pag. 5. tab. 3. — Murr. Syst. veget. pag. 668.

Colutea (filulosa), caule herbaceo; foliis ovatis, complicatis, subtus pubescentibus. Retz. Obs. 3. pag. 40.

Colutea (pubescens), pinnis lanceolatis, villosis; caule herbaceo, erecto, pubescente. Thunberg, Prodr. 134. ?

Lessertia perennans. Decand. Astrag. pag. 43.

Ses tiges sont droites, striées, peu rameuses, à peine pubescentes; les feuilles composées de six à huit paires de folioles petites, ovales, oblongues, pédoncelées, pubescentes, obtuses à leurs deux extrémités; les fleurs blanches ou légèrement purpurines, pédicellées, presque unilatérales, disposées en grappes simples, allongées; le calice campanulé, à cinq dents aiguës, inégales; la corolle petite; les ailes onguiculées; les gouffes petites, globes, ovales, comprimées, contenant quatre à cinq semences réniformes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

6. BAGUENAUDIER annuel, n°. 5. *Colutea herbacea*.

herbacea. Linn. — Lam. Illust. tab. 624. fig. f. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1141.

Lisseria annua. Decand. Astrag. pag. 43.

* *Colutea* (tomentosa), *pinnis ovatis*, *incanis*; *caule herbaceo, tomentoso; floribus racematis*. Thunb. Prodr. 135.

* *Colutea* (vesicaria), *pinnis ovatis*; *caule herbaceo, decumbente, villosa; leguminibus orbiculatis, inflatis*. Thunb. Prodr. 135.

* *Colutea* (excisa), *pinnis ovatis, excisis*; *caule herbaceo, decumbente; racemis terminalibus*. Thunb. Prodr. 134.

* *Colutea* (prostrata), *pinnis lanceolatis, villosis*; *caule herbaceo, diffuso; pedunculis axillaribus, subsessilibus*. Thunb. Prodr. 134.

* *Colutea* (linearis), *pinnis linearibus, acutis*; *caule herbaceo, erecto; racemis terminalibus, incurvis*. Thunb. Prodr. 135.

* *Colutea* (zichinomenoides), *herbacea, foliis lanceolatis, obtusis, à nervo acuminatis, glabris*. Scopol. del. Infus. 3. pag. 22. tab. 12.

*** PHACA. Linn.

7. BAGUENAUDIER du Portugal. *Colutea batica*.

Phaca (batrica), *caulescens, erecta, pilosa, leguminibus tereti-filiformibus*. Linn. Spec. 1064. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 180.

Astragalus lusitanicus. Lam. Dict. 1. pag. 312.

8. BAGUENAUDIER des Alpes, n°. 6. *Colutea alpina*. Lam. Ill. tab. 624. fig. 4.

Phaca alpina. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 151. & Miscell. 2. pag. 93. — Decand. Astr. pag. 47. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1252. Non Linn.

Astragaloides alpino, *hirsuta, erecta, foliis viciis, floribus alatis luteis*. Till. Pfl. 19. tab. 14. fig. 2.

9. BAGUENAUDIER des pays froids. *Colutea frigida*.

Colutea (phaca frigida), *caulescens, erecta, indivisa, foliis pinnatis, subquinquejugis; foliolis oblongis, obtusis, subsiliatis; leguminibus oblongis, inflatis*. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1253. — Jacq. Vind. 265. & Flor. austr. tab. 166. — Decand. Astr. pag. 46.

Phaca alpino. Linn. Spec. 1064. — Flor. dan. tab. 856.

Astragalus caule erecto, stipulis maximis; foliis ovatis, novenis; leguminibus inflatis. Haller, Helv. n°. 402.

Phaca ochreate. Crantz, Austr. 419. tab. 2. fig. 1.

Botanique, Supplément. Tome I.

Rapprochée de l'espèce précédente, avec laquelle on l'a peut-être confondue, celle-ci en diffère par ses tiges plus courtes, glabres, anguleuses; par ses stipules ovales, élargies, foliacées. Les pétioles sont glabres, chargés de trois à quatre paires de folioles petites, glabres, ovales; les fleurs d'un blanc-jaunâtre, disposées en grappes axillaires, entre-mêlées de bractées oblongues, ciliées sur leurs bords; le calice glabre, à cinq dents courtes; les gousses droites, oblongues, renflées, hérissées de poils assez nombreux.

Cette plante croît dans les hautes montagnes alpines. (V. f.)

10. BAGUENAUDIER glabre. *Colutea globra*.

Colutea (phaca glabra), *caule ramofo, prostrato; foliis ovato-lanceolatis, florum alis integerrimis; leguminibus glabris, obovatis, reflexis*. Decand. Synopf. pag. 354. & Flor. franç. 4. pag. 563. — Clarion. Bull. philom. n°. 61. — Decand. Astr. pag. 48.

Phaca Gerardi. Vill. Dauph. 4. pag. 474.?

Cette plante se distingue de la précédente par ses tiges couchées, un peu ligneuses à leur base, ainsi que le reste de la plante. Ses feuilles sont composées de quatre à six paires de folioles lancéolées, ovales-oblongues, aiguës; les stipules membraneuses, pointues, légèrement ciliées, quelquefois soudées ensemble; les fleurs disposées en grappes axillaires, plus longues que les feuilles; le calice muni de poils noirâtres, un peu lanugineux; la corolle blanche; la carène & le bord inférieur des ailes tachés de violet; ceux-ci entières; les bractées linéaires. Les gousses sont ovales, pédicellées dans le calice, très-glabres.

Cette plante croît dans les Basses-Alpes. (V. f.)

11. BAGUENAUDIER austral, n°. 7. *Colutea australis*. Lam.

Phaca australis. Linn. — Jacq. Miscell. 1. tab. 3. — Decand. Astr. pag. 51.

Phaca Holleri. Vill. Dauph. 4. pag. 473.

12. BAGUENAUDIER astragale. *Colutea astragalina*.

Colutea (phaca astragalina), *caule ramofo, prostrato; stipulis lanceolatis, acutis; alis carina brevioribus; leguminibus junioribus, hirsutis*. Decand. Astr. 52. — Synopf. pag. 355.

Astragalus alpinus. Linn. — Lam. Dict. 1. pag. 315. — Flor. lapp. tab. 9. fig. 1.

Phaca minimo. Allioni, Flor. pedem. n°. 1256. (Voyez ASTRAGALE des Alpes, n°. 34.)

B b b

13. BAGUENAUDIER à fleurs nombreuses. *Colutea floribunda*.

Colutea (phaca floridana), caulescens, erecta, glabra, foliis abrupte pinnatis; foliolis oblongis, obtusis, mucronatis; stipulis lanceolato-subulatis; leguminibus oblongis, compressis, acuminatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1252.

Robinia vesicaria. Jacq. Icon. Rat. 1. tab. 148, & Coll. Cl. 1. pag. 105.

Cette plante, qui a beaucoup de rapport avec les *robinia*, parmi lesquels Jacquin l'avoit placée, paroît, d'après Willdenow, le rapprocher davantage des *phaca*. Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à sept pieds, garnies de feuilles ailées sans impaire, composées de dix à seize paires de folioles oblongues, obtuses, mucronées; le pétiole commun terminé par un filet saccé; les stipules lancéolées, subulées. Les fleurs sont jaunes, pédonculées, au nombre de quatre à cinq sur chaque grappe; les pédoncules velus, axillaires; les gouffes oblongues, enfilées, comprimées, acuminées, à deux loges. Ce dernier caractère ne permet guère de confondre cette plante dans ce genre.

Cette plante croît dans la Floride. (Willd.)

14. BAGUENAUDIER des salines. *Colutea salifolia*.

Colutea (phaca salifolia), caulescens, erecta, incana, foliis pinnatis; foliolis obovatis, obtusis; stipulis oblongis, obtusis; leguminibus globosis, pendulis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1252. — Linn. f. Suppl. pag. 336. — Pallas, Itin. Append. n°. 115. tab. Bb.

Ses tiges sont droites, blanchâtres; ses feuilles ailées, composées de folioles en ovale renversé, obtuses; les stipules oblongues, obtuses; les gouffes pendantes, pédonculées, globuleuses, semblables, par leur forme, à celles de l'*astragalus chinensis*.

Cette plante croît dans la Daoutie, sur les bords du lac Tartée. ✕

15. BAGUENAUDIER des sables. *Colutea arenaria*.

Colutea (phaca arenaria), caulescens, subramosa, ascendens, glabra, foliis pinnatis, subquingjugis; foliolis lineari-lanceolatis, impari subsessili; leguminibus obovatis, inflatis, erectis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1254. — Pallas, Itin. 3. Append. n°. 116. tab. A2. fig. 1 & 2.

Ses tiges sont médiocrement rameuses, ascendantes, très-glabres, garnies de feuilles ailées, composées d'environ cinq paires de folioles glabres, linéaires-lancéolées; la foliole impaire presque sessile; les gouffes droites, renflées, en ovale renversé.

Cette plante croît dans la Sibérie. ✕

16. BAGUENAUDIER vésiculeux. *Colutea halicacaba*.

Colutea (phaca halicacaba), caulescens, procumbens, foliis pinnatis, subquingjugis, oblongis, acutis, incanis; impari subsessili; calicibus inflatis, ovatis, reticulatis, hirsutis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1254.

Des mêmes racines sortent plusieurs tiges courtes & couchées. Les feuilles sont composées de quatre, cinq ou six paires de folioles oblongues, aiguës, blanchâtres, velues; l'impaire presque sessile; les fleurs jaunes, disposées, au nombre de trois ou cinq, en grappes axillaires, pédonculées; les bractées ovales, membraneuses, placées à la base de chaque fleur; les calices ovales, renflés, velus, téticulés, à cinq dents lancéolées, subulées; l'étendard obtus.

Cette plante croît dans la Galatie. ✕ (Descript. ex Willd.)

17. BAGUENAUDIER à trois fleurs. *Colutea triflora*.

Colutea (phaca triflora), caule dichotomo, floribus tenuibus, parvis; vexille carinato longiore; foliolis 19-23; leguminibus aepressis-turgidis, pubescentibus. Decand. Ailr. pag. 62. tab. 1.

Ses tiges sont dichotomes; les feuilles alternes, ailées; les pétioles filiformes, garnis de dix-neuf à vingt-trois folioles petites; les fleurs fort petites, réunies au nombre de deux ou trois; l'étendard plus long que la carène; les gouffes enfilées, comprimées, pubescentes; les semences noires.

Cette plante croît au Pérou. ○

18. BAGUENAUDIER à trois folioles. *Colutea trifoliata*.

Colutea (phaca trifoliata), foliis ternatis, ovatis, obtusis; leguminibus semiorbiculatis. Linn. Mantill. 270.

Cette espèce paroît se rapprocher davantage des crotaires que des baguenaudiers. Ses tiges, d'après Linné, sont filiformes & rameuses; ses feuilles pétiolées, à trois folioles obtuses, tomenteuses en dessous, nerveuses; la terminale plus grande; les stipules lancéolées, étacées à leur sommet; les fleurs disposées en grappes terminales; les pédoncules géminés, uniflores; les gouffes à demi orbiculaires, renflées, ventrues, obtuses; la future supérieure prolongée en une pointe sétacée, recourbée.

Cette plante croît à la Chine. (Linn.)

19. BAGUENAUDIER à feuilles blanches. *Colutea incana*.

Phaca (incana), calicibus fructiferis, ovatis, inflatis, villosis; foliis oblongis, obtusis. Vahl, Symb. 1. pag. 57. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1555.

Astragalus anthylloides. Lam. Dict. 1. pag. 320. (Voyez ASTRAGALE, n°. 58.)

Observations. M. de Lamarck pense qu'il faut rapporter à cette division, sous le nom de *coluta wolgarica*, le *cyrtus wolgaricus* Linn. Suppl., qui y convient en effet par son port, par ses feuilles composées de six à sept paires de folioles avec une impaire, orbiculaires, argentées, & par le caractère des fleurs en grappes, droites, unilatérales, d'un beau jaune. (Voyez les observations à la fin de l'article CYTISE.)

BAGUETTE D'OR. (Voyez GIROFLÉE, n°. 1.)

BAHEL-SCHULLI : arbrisseau épineux de la côte de Malabar, figuré par Rheede, vol. 2, tab. 45. Il est, suivant cet auteur, apéritif & hydragogue; il croît dans les lieux humides. C'est le *barleria longifolia* de Linné. (Voyez BARBELLÈRE, n°. 1.)

BAHEL-TSJULLI des Malabares. C'est la même plante que l'on nomme à Java *païan-ayer*. Elle est figurée dans Rheede, Hort. malab. vol. 9, tab. 87. Burmann l'a regardée comme un sésame. Linné en a fait une colonnée. Vahl, qui l'a trouvée différente de ces deux genres par sa corolle presque régulière, à quatre lobes, & par sa capsule à deux loges, l'a nommée *achimenes sesamoides*; elle est herbacée. Ses feuilles sont opposées & lancéolées. Ses fleurs sont en espèce de grappe terminale. (Voyez COLOMNEE, n°. 3, & Suppl.)

BAHO : variété du manguier, cultivée dans les Philippines, que l'on distingue, (suivant Camelli, par son fruit plus petit, moins charnu, & dont le noyau est à proportion plus gros. (Juss.)

BAI-BAI, BAI-BAIBA : noms caraïbes d'un *malpighia spicata*, Cavan. Monadelph. 8, pag. 409, tab. 127, qui est aussi le bois dyssentérique des Antilles. (Juss.)

BAILLERIA. (Voyez BAILLÈRE.)

BAILLÈRE. *Bailliera*. Schreber a substitué à ce genre le nom de *trixis*, auquel il a ajouté les deux espèces ci-jointes. Le *bailliera aspera* est figuré dans les *Illustrations*, tab. 711.

3. BAILLÈRE térébinthacée. *Bailliera terebinthacea*.

Bailliera (trixis terebinthacea), foliis ovatis,

ferrulatis, hispida, subtus hirsutis; floribus corymbosis. Swartz, Prodr. 115, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1375.

Arbrisseau dont la tige est rude, haute de cinq à six pieds; ses rameaux rectifiés, un peu velus; les feuilles opposées, pétioles, ovales-oblongues, acuminées, dentées en scie, à trois nervures, couvertes en dessus de points calleux & de petits poils soyeux; les pétioles pubescents. Les fleurs répandent une odeur de térébinthine; elles sont terminales, disposées en corymbes paniculés; les pédoncules cylindriques, opposés en croix, pubescents, munis à leur base de petites folioles linéaires; le calice ovale, composé de huit à dix écailles oblongues, presque égales, pubescentes; les fleurons du disque nombreux, hermaphrodites; les demi-fleurons femelles; leur limbe trifide. Les femences du centre avortent souvent; celles des fleurs femelles sont ovales, presque trigones, un peu velues, sans aigrettes; le réceptacle couvert de paillettes oblongues, aiguës, concaves, plus courtes que les femences.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les vallées pierreuses. b (Swartz.)

4. BAILLÈRE rongée. *Bailliera erosa*.

Bailliera (trixis erosa), foliis lato-ovatis, incise ferratis, rugosis, scabris, petiolis longioribus. Swartz, Prodr. 115, & Flor. Ind. occident. 3. pag. 1377.

Ses rameaux sont cylindriques, légèrement tomenteux; les feuilles opposées, pétioles, larges, ovales, un peu rhomboidales, aiguës, inégalement incisées ou dentées, longues de cinq à six pouces, hérissées de poils rudes. Les fleurs sont blanches, assez grandes, disposées en un corymbe terminal; le calice glabre, à six ou huit folioles lisses, ovales, concaves, aiguës; les paillettes du réceptacle elliptiques, peu nombreuses.

Cette plante croît aux Antilles, à l'île Saint-Christophe, &c. h (Swartz.)

* *Bailliera* (trixis pedunculosa), herbacea, ramis gracilibus, apice 2-3 cephalis; foliis lanceolatis, serratis, quinquenerviis, hispida. Richard, in Act. Soc. Linn. Paris, pag. 105. E Caienn.

BAITARIA acule. *Baitaria aculea*. Flor. per.

Baitaria aculea, foliis linearilanceolatis. Ruiz & Pav. Syst. veget. Flor. peruv. pag. 111.

Genre de plantes établi par MM. Ruiz & Pavon, sur une seule plante du Pérou, dont la racine est visqueuse & produit des feuilles routes radicantes, linéaires-lancéolées. Les fleurs offrent;

1°. Un calice à quatre folioles, dont deux, attachées sur le pédoncule plus bas que les autres, sont plus étroites & ressemblent à des bractées.

B b b b 1

2°. Une corolle monopétale, tubulée, divisée à son limbe en cinq découpures.

3°. Quatorze ou dix huit diamines tenfermées dans le tube, attachées sur les parois.

4°. Un ovaire libre, surmonté d'un seul style, termine par un stigmate à trois découpures.

Le fruit confiste en une capsule accompagnée du calice persistant, à trois faces, divisée en trois loges, contenant plusieurs semences lenticulaires, attachées aux cloisons, contiguës chacune avec la paroi de chaque valve.

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux arides & pierreux, le long des routes.

BALAI-DOUX, HERBE A BALAI : nom que l'on donne, selon M. Palifot-Beauvois, dans les Antilles & dans la partie française de Saint-Domingue, à la scopaire (*Scoparia dulcis* Linn.), parce que les Noirs, lorsqu'ils ont besoin de balai, emploient une poignée de cette herbe très-commune dans le pays, & qu'ils vont cueillir au moment même de s'en servir. Dans la partie de Saint-Domingue, où la scopaire est plus rare, elle est remplacée pour cet usage par l'*urena lobata* Linn., appelée couffer par les colons, ou par le *féda americana*, que, dans quelques quartiers, on appelle herbe de douze heures, parce que ses pétales ne commencent à s'épanouir que vers midi, & se referment deux ou trois heures après.

BALAM-PULLI : nom malabare du tamarin, figuré par Rheede dans l'*Hort. malab.* vol. 1, tab. 23.

BALANA BONE : nom caraïbe de l'acacie ou fenitive épineuse, suivant Nicholson.

BALANG-HAS : espèce de sterculier de Ceylan (*Sterculia balanghas* Linn.), figurée dans l'*Hort. molib.* vol. 1, tab. 49, & dans la Monadelphie de Cavanilles, tab. 143. (Voyez STERCULIER, n°. 1.)

BALANGUE (Gx n. de Fruët. & Sem. 2. pag. 485. tab. 181), fruit de Madagascar, décrit & figuré par Gærtner. C'est une petite baie globuleuse, noirâtre, charnue à une ou deux loges, séparées, dans ce dernier cas, par une cloison membraneuse, contenant deux semences blanchâtres, en cœur renversé, attachées au fond de la baie, entièrement enveloppées par un arille sec; l'embryon muni d'un perispermécharnu; les cotylédons foliacés; la radicule courte, droite, cylindrique. La plante qui produit le fruit n'est pas connue.

BALANOPHORA. (Voyez BALANOPHORE.)

BALANOPHORE fongueuse. *Balanophora fungosa* Lam. Ill. tab. 742.

Cynomorium (balanophora), stipite squamose, amento oblongo; squamis parulis, oblongo lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 177.

Ce genre paroît devoir être réuni aux *cynomorium* Linn. (Voyez CYNOMORIE, 2, pag. 241.)

BALANOPTERIS. C'est le nom que Gærtner a donné au molavi des Philippines, qui est l'*heritiera littoralis*. Ait. & Lam. (Voyez MOLLAVE.)

BALANTI, petit arbre des Îles Philippines, remarquable par ses feuilles ombelliques, assez semblables à celles du *binonga* des mêmes îles, qui est le *ricinus mappa* Linn. Camelli dit que ses feuilles ressemblent aussi à celles du ricin. Il ajoute que ses racines sont employées dans la dysentérie. (Juss.)

BALANUS : nom donné par quelques anciens auteurs au ben (*maringa aleferu*).

BALASBAS. (Voyez ANTOLANG, Suppl.)

BALASSEN, BALESSAN : noms égyptiens du baume de Judée, selon Prosper Alpin.

BALATANA : nom caraïbe des grosses bananes.

BALATAS. Plusieurs arbres étrangers portent ce nom. Prêtonraïne, dans la *Maison rustique de Cayenne*, parle du balatas blanc, du balatas rouge & de celui à grosse écorce. Il détaille leurs usages pour les constructions; mais il ne donne pas aux botanistes les moyens de les reconnoître. Son balatas blanc est probablement le *couratari* des Galibis, qu'Aublet nomme de même dans ses *Plantes de la Guiane*, pag. 724, tab. 250, en ajoutant qu'on fait des cordes avec son écorce. Le balatas rouge est, selon Nicholson, connu à Saint-Domingue, sous le nom de *sapotillier marron*. Aublet cite encore une espèce de *sapotillier*, qu'il nomme *achras balata* ou bois de natte. On possède, dans les collections de fruits, sous le nom de *balatas*, une graine assez grosse, lisse comme les sapotilles, & conformée de même que Clusius l'a figurée dans ses *Exotic.* pag. 16. L'arbre qui la produit n'est pas connu, mais son genre, ou au moins sa famille, est facile à déterminer. (Voyez COURATARI, SAPOTILLIER.) (Juss.)

Poupée Desportes parle, sous ce nom de *balatas*, d'un arbre de Saint-Domingue; mais la description qu'il en donne est, comme celle de Nicholson, trop incomplète pour pouvoir le rapprocher des noms de Linné ou d'autres botanistes. Il est à remarquer que, de tous les naturalistes qui ont parcouru le pays pour en connoître les productions, Desportes & Nicholson sont les seuls qui aient parlé de celle-ci. Le surnom de *sapotillier marron*,

joint à son caractère d'avoir une grande fleur pourpre & une écorce mucilagineuse & filamenteuse, comme les malvacées, tout semble nous indiquer qu'il a été mal observé, ce qui est d'autant plus à regretter, que Desportes l'indique comme fournissant un bois compacte, bon à bâtir & à faire toutes sortes d'ouvrages. (*Pal. Beauv.*)

BALLATONASSO, arbrisseau mentionné dans l'*Histoire des Plantes des îles Philippines*, par Rai, pag. 70, & dont Camelli a donné la figure, tab. 36. Si l'on en juge d'après la figure, cette plante paroît voisine du *ricinus mappa* Linn., figuré dans Rumphius, Amboin. vol. 3, tab. 108; mais ses feuilles, qui sont pétiolées, sont en cœur, arrondies, entières à la base, & terminées en pointe au sommet, avec des dentelures sur les bords. Ses feuilles sont alternes; les deux supérieures opposées. Les fleurs, mâles ou femelles, naissent dans l'aisselle des feuilles supérieures & en grappes. Les mâles offrent une masse globuleuse d'écrans, & les femelles, dont on ne voit que le fruit, sont situées à la partie inférieure de la grappe. Le fruit est arrondi, & se divise en quatre loges; ce qui éloignerait cette plante du genre ricin; mais par l'ensemble de ses caractères, il n'y a nul doute qu'elle ne soit une plante de la famille des euphorbes. (*Lam. Dict. des scienc. nat.*)

BALAUSTES. On donne ce nom, dans la médecine, aux fleurs desséchées du grenadier, qui est aussi nommé *balanier* dans quelques contrées, particulièrement en Provence. (*Voyez GRENADIER.*)

BALBISIA. (*Voyez BALBISIE.*)

BALBISIE à longs pédoncules. *Balbisia elongata*. Willd.

Balbisia caule procumbente, subsimplici; pedunculis terminalibus longissimis; calicinis foliolis ovatis, subaequalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2214. — *Perf. Synopf. Plant.* 2. pag. 470.

Amellus pedunculatus. Ortega.

Cette plante, rapportée d'abord aux *amellus* par Ortega, dont elle est en effet très-voisine, en a été séparée par Willdenow, qui en a fait un genre particulier, ayant pour caractère essentiel :

Un calice simple, à huit folioles; les demi-fleurs trifides; les semences surmontées d'une aigrette sessile, plumbeuse; le réceptacle palmé.

Les tiges sont herbacées, couchées, puis ascendantes, longues de six à huit pouces, hérissées de poils rudes, grêles, presque simples ou trichotomes, n'ayant guère que deux rameaux opposés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque rhomboidales, à grosses dentelures,

chargées de poils rudes à leurs deux faces, veinées, à trois nervures plus faillantes. Chaque tige ou rameau se termine par un très-long pédoncule de quatre à six pouces, simple, uniflore, hispide. Le calice est velu, à folioles presque égales, lancéolées, aiguës; la corolle jaune; son disque d'un jaune plus pâle; les demi-fleurs profondément partagées en trois découpures.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (*V. v.*)

* *Balbisia (canescens)*, caule erecto, ramoso, incano, hispido; pedunculis lateralibus; calicis brevibus foliolis rotundatis. Richard. — *Perf. Synopf. Plant.* 2. pag. 470.

BALESSAN. Bruce. (*Voyez BALSAMIER*, n° 5, *Suppl.*)

BALIGARAB, BALIFARAB ou BUYONG, arbrisseau des Philippines, ayant le port du faule, que les Maures nomment *garab*. Ses jeunes rameaux, longs & plians comme ceux de l'osier, se chargent de feuilles opposées, très-grandes. Les fleurs, disposées en bouquets terminaux, sont jaunâtres, monopétales, divisées par le haut en cinq lobes épanouis en étoile. Entre ces fleurs, on trouve, dit Camelli, de qui nous empruntons cette description, d'autres feuilles différentes de celles des rameaux, plus courtes, plus minces, marquées de cinq nervures, & faisant, par leur couleur blanche, un contraste agréable avec celles des fleurs & des feuilles inférieures. Les fruits sont de petites baies couronnées, verdâtres, remplies de graines menues, & auxquelles les feuilles florales restent attachées. Il est facile de reconnoître ici que le baligarab est une espèce de *mussaenda*, genre de la famille des rubiacées, bien caractérisé par une des divisions de son calice, qui prend une extension très-considérable, & subsiste sous la forme d'une feuille. C'est peut-être la même plante que le *bellila* du Malabar, mentionné par Rheede. (*Voyez BELLILA & MUSSSENDE, Suppl.*) (*Juss.*)

EALIMBA, BOLIMBA. Chez les Malais on nomme ainsi le carambolier, appelé ailleurs *bilimbi*.

BALIMBAGO, petit arbre des Moluques, que Camelli dit être le même que le *buparitia* des Malabares, ou *hibiscus populneus* des botanistes. Il dit que sa fleur est comme celle de l'abelmosch, autre espèce d'*hibiscus*, & que son fruit est rempli d'un suc semblable à celui de la gomme-gutte. Sa racine, regardée comme éméétique, est employée dans les diarrhées anciennes, les fièvres quotidiennes, les coliques & les indigestions. Cette propriété, dans une plante de la famille des malvacées, est assez particulière, & peut être révoquée en doute. (*Juss.*)

BALINGASAN ou **PUTAD** : nom d'un petit arbre des Philippines, qui appartient au genre *Stravadium* Just., dans la famille des myrtes. Camelli en parle dans son Recueil des plantes de ce pays, publié par Rpi. (Just.) (Voyez **JAMBOSTER**, n°. 5, & **STRAVADI**, Suppl.)

BALISIER *Canna*. Quoique les balisiers soient des plantes nées sous les tropiques, & que la plupart habitent également l'Asie, l'Afrique & l'Amérique, cependant, ignorées des Anciens, elles n'ont été connues que depuis la découverte de l'Amérique. Il parait que les premiers individus vivans en Europe ont été obtenus de graines envoyées par des missionnaires à des religieux portugais, qui les ont cultivées & propagées dans les jardins de leur couvent. Le port élégant des balisiers, la beauté de leurs feuilles amples, larinées, d'un vert gai, l'éclat & la forme singulière de leurs fleurs, les ont fait rechercher par les curieux, & les balisiers sont devenus en peu de tems l'ornement des plus célèbres jardins de l'Italie, de l'Espagne, de la France & des autres contrées méridionales de l'Europe. Leurs racines, tubéreuses & charnues, produisent tous les ans un grand nombre de cœurs, qui rendent la propagation de ces plantes bien plus facile & plus sûre que les semences, dont la maturité, dans nos climats, n'est pas toujours parfaite. Il parait qu'on a toujours traité ces plantes avec trop de délicatesse, en employant pour elles au printemps les terres chaudes, les vitruux, & dans l'hiver, l'orangerie ou la serre tempérée. Ces soins minutieux, en prolongeant leur foiblesse, s'opposent à leur parfaite naturalisation. Des cultivateurs plus hardis les ont, depuis quelques années, abandonnées en pleine terre; ils en ont obtenu de très-baux individus, plus vigoureux, plus chargés de fleurs, & des semences bien mûres.

Lécluse a le premier décrit & figuré l'espèce de balisier qui long-tems est restée la seule connue; il la nommoit *canna indica*, dénomination adoptée par Linné, & fondée sur les rapports qui paroissent exister entre ses racines, ses riges & celles des roseaux ou cannes. Les deux frères Bauhin, Lobel & Dalechamp lui ont conservé le nom de *roseau (arundo)*; d'autres, en particulier Rumphé & Tournefort, la considérant comme une plante mitoyenne entre l'*arundo* & l'*acorus*, l'ont appelée *cannacorus*. Camerarius en fait une espèce de g'azeul (*gladiolus indicus*), en quoi il s'écarte moins des rapports naturels. Ces différents dénominations prouvent combien, à cette époque, l'on étoit loin d'avoir des idées justes sur les affinités des plantes.

Le balisier, qui embellit les vastes campagnes des Indes, est aussi cultivé comme plante d'agrément autour des habitations & dans les jardins; il est plus brillant par ses dehors, par l'éclat de ses

fleurs, qu'utile par ses usages. On a dit & répété que ses feuilles étoient employées, dans les colonies françaises, à couvrir les cases des Nègres; mais il est à remarquer que l'on donne quelquefois le nom de *balisier* à des plantes de la famille des bananiers, qu'on a confondu avec les vrais balisiers. Les bananiers ont des feuilles bien plus grandes, & plus propres à cet usage économique. Au rapport de Barrère, les semences sont très-recherchées par les pigeons ramiers, dont elles rendent la chair amère: elles seroient très-précieuses pour les arts, à cause de la belle couleur pourpre qu'elles fournissent; mais elle ne dure pas, & jusqu'alors on n'a pas encore pu trouver de moyens pour la fixer. Les habitants des Indes & les Ethiopiens font des chapelets avec ses graines, dures, globuleuses, d'un beau noir-luitant.

Les voyageurs ont depuis peu d'années découvert dans les deux Indes quelques nouvelles espèces de balisier, qui ne le cèdent guère en beauté à la première. Celle-ci est gravée dans les *Illustr. Gen. tab. 1*. Aux espèces décrites il faut ajouter :

4. **BALISIER** à feuilles jonciformes. *Canna juncea*. Retz.

Canna foliis linearibus, nervosis. Retz. Observ. Fasc. 1. pag. 9. n°. 1.

Cette espèce est remarquable & bien distinguée par ses feuilles étroites, linéaires, semblables à celles des graminées, vaginales à leur base, à cinq nervures saillantes, hautes d'environ un pied, munies, proche les racines, de petites fibres capillaires. Les riges sont enveloppées par plusieurs gaines lancéolées; les fleurs terminales peu nombreuses; la corolle petite, d'un roux-obscur; la capsule hérissée.

Cette plante croît à la Chine. (Descript. ex Retz.)

5. **BALISIER** paniculé. *Canna paniculata*. Ruiz & Pavon.

Canna foliis ovatis, subius lanatis, argenteis; peralis inferioribus brevioribus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 1. tab. 1. fig. 1.

Ses racines sont rameuses & fasciculées; ses tiges droites, cylindriques, hautes de dix à douze pieds; ses feuilles alternes, pétiolées, ovales, nerveuses, lanugineuses & argentées en dessous; les fleurs disposées en une panicule terminale, étalée, munie de bractées ovales, lancéolées; la corolle de couleur écarlate; les trois pétales extérieurs plus grands, égaux; les intérieurs inégaux. La capsule est grande, ovale, oblongue, hérissée de pointes; les semences noirâtres, un peu globuleuses & luisantes.

Cette plante se trouve dans les bois & dans les

jardins, au Pérou, où elle porte le nom vulgaire d'*achira sauvage* (*achira silvestris*). (Ruiz & Pav.)

6. BALISIER à fleurs d'iris. *Canna iridiflora*. Ruiz & Pav.

Canna foliis ovatis, acuminatis; laciniis tribus corollae interioribus majoribus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. l. c.

Ses tiges sont très-hautes, droites, articulées; ses feuilles à pétiole vaginal, alternes, ovales, acuminées, glabres & luisantes en dessus, lanugineuses & blanchâtres en dessous; les fleurs disposées en grappes cernées & binnées; les pédoncules comprimés; les pétales pendans, unifoies, accompagnés d'une petite bractée ovale, spatulée, & à leur base d'un obo de deux filamens linéaires, tubulés. La corolle est infundibuliforme; les trois découpures extérieures plus courtes, lancéolées, roulées, de couleur purpurine; les trois intérieures oblongues, plus grandes, plus larges, érales, rougeâtres un appendice binné, en forme de pétale; l'anthère placée sur une des divisions du style en forme de languette; la capsule trigone, oblongue, hérissée & les semences brunes & globuleuses.

Cette plante croît au Pérou, où elle est cultivée comme plante d'ornement. On la nomme *sumac-achira*, c'est-à-dire, *achira* élégante. (Ruiz & Pav.)

BALISIER est un nom vulgaire qu'on a donné à plusieurs plantes qui, à la vérité, ont quelques rapports avec le *canna* de Linné, mais qui appartiennent à un autre genre. Ainsi, au Cap-François, on nomme *balisier* l'*amomum zerumbet* Linn. On l'appelle aussi *gingembre bâlard*. On donne encore ce nom à l'*alspinia racemosa* dans certains quartiers de Saint-Domingue où croît cette dernière plante, d'après l'observation de M. Palisot-Beaupré. Desportes parle d'un autre balisier de Saint-Domingue dans le nombre des plantes propres pour la teinture: c'est le *costus arabicus* Linn., le *paccouanga* de Margrave.

BALLOTA. (Voyez BALLOTE.)

BALLOTE: nom vulgaire d'un chêne (*quercus ballota* Desfont.) que nous avons rencontré, M. Desfontaines & moi, sur la côte de Barbarie, dans les montagnes inférieures de l'Atlas, dont les glands, aussi doux que la châtaigne, servent de nourriture pendant une partie de l'hiver à un grand nombre d'habitans du mont Atlas. Il appartient à la section des chênes-verts, qui ne perdent point leurs feuilles, & a beaucoup de rapport avec l'yeuse, dont il diffère par sa tige plus élevée, par ses feuilles cotonneuses en dessous, par ses fruits plus allongés, d'une saveur douce, &c. (Voyez

CHÊNE, Suppl., & un Mémoire de M. Desfontaines, inséré parmi ceux de l'Académie des Sciences, 1790, pag. 394, tab. 6.)

1. BALLOTE fétide. *Ballota nigra*. Linn. edit. 1. pag. 582. — Lam. Illustr. tab. 508. fig. 1. — Buil. Herb. tab. 397. — Smith, Flor. brit. 2. pag. 635.

D'après l'observation de M. Smith, le *ballota nigra* de Linn., edit. 2, est une plante différente de celle-ci, particulière à la Suède, qui est peut-être la fig. 1 de la planche 65 de Rivin.

2. BALLOTE lineuse. *Ballota lanata*. Linn. — Lam. Ill. tab. 508. fig. 2.

Panzeria multifida. Mench. Meth. Suppl. pag. 137.

Observations. On trouve dans l'herbier de Comerton une plante de l'Île-de-France, qui a le port du *ballota nigra*, mais qui en diffère par ses calices non striés ni pilés. Ses feuilles font en cœur, presque à doubles crénelures à leur contour; les fleurs ramassées par paquets; les calices un peu lisses. M. Persoon l'a nommée *ballota mauritiana*. Loureiro a trouvé en Chine l'espèce suivante.

3. BALLOTE pileuse. *Ballota pilosa*. Lour.

Ballota foliis ovatis, crenatis, tomentosis; verticillis pilosis, calicibus decemdentatis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 442.

Cette espèce diffère du *ballota diffusa* principalement par ses calices à six dents. Ses tiges sont droites, foibles, hautes de quatre pieds, pileuses, striées, ramulées; les feuilles pétiolées, ovales, point en cœur, crénelées & non dentées en scie, aiguës, tomenteuses. Les fleurs sont blanches, réunies en verticilles axillaires & pileux; leur calice tubulé, recourbé, à dix ftries, divisé à son limbe en dix dents aiguës, réfléchies; la lèvre supérieure de la corolle entière, en forme de voûte; l'intérieure étalée, à trois lobes.

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Cochinchine. (Descript. ex Lour.)

BALLOULOU: nom caraïbe du bananier à petits fruits.

BALOURINHA: nom caraïbe d'une espèce de *figa*, genre de la famille des malvacées. (Juss.)

BALSAMARIA. « Le genre que Loureiro a donné sous ce nom dans la *Flora de la Cochinchine*, n'est, dit M. de Jussieu, qu'une espèce de *calaba* (*eulophyllum*); il offre quelques différences dans son calice à deux feuilles, selon Loureiro. Sa corolle est composée de six pétales, & ses étamines rassemblées en plusieurs paquets. On tire du son

tronc, de ses rameaux & de ses feuilles un suc connu sous le nom de *baume de Marie*, employé pour empêcher l'inflammation & la putridité des plaies. Ses amandes fournissent aussi une huile abondante, de qualité inférieure, dont on se sert pour les lampes. » (*Voyez CALADA, Suppl.*)

BALSAMIER. *Amyris*. Les additions à faite à ce genre intéressant le réduisent aux suivantes :

1. **BALSAMIER élémifère.** *Amyris elemifera*. Linn. — Lam. III. tab. 303. fig. 1.

4. **BALSAMIER de Gildal.** *Amyris gileadenfa*. Linn. — Vahl, Symbol. 1. pag. 28. tab. 11.

5. **BALSAMIER de la Merque.** *Amyris opobalsamum*. Linn. — Lam. III. tab. 303. fig. 2.

Balefan. Bruce, Itin. 5. pag. 16. Icon. & edit. Germ. 5. pag. 28. tab. 2 & 3.

8. *Balsamea mecanensis*. Gleditsch, Act. Soc. Nat. Berol. 3. pag. 127. tab. 3. fig. 2.

Willdenow soupçonne que l'espèce précédente, celle-ci & la variété s pourroient fort bien n'être que des variétés de la même plante, produites par l'âge ou par le sol, & dont les feuilles, ailées & plus composées dans la jeune plante, sont ternées quand elle est plus avancée.

10. **BALSAMIER karaf.** *Amyris karaf*. Forskh. — Vahl, Symb. 1. pag. 28.

13. **BALSAMIER à feuilles dentées.** *Amyris dentata*. Willd.

Amyris foliis pinnatis, foliolis petiolatis, novem, ovatis, acuminatis, dentatis; racemis axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 337.

Cette espèce, d'après Willdenow, est distinguée de toutes les autres par les dentelures de ses folioles. Ses feuilles sont toutes ailées; les folioles petiolées, au nombre de neuf, ovales, acuminées, échancrées, parsemées de points résineux & diaphanes; les dentelures distantes; les fleurs disposées en grappes simples & axillaires; les pédicelles uniflores, très allongés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Th* (*Descript. ex Willd.*)

14. **BALSAMIER anisé.** *Amyris anisata*. Willd.

Amyris foliis pinnatis, foliolis petiolatis, tredecimis, ovato-lanceolatis, obsoletis dentatis, inaequalibus; paniculis axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 337.

Elle ressemble beaucoup à la précédente. On l'en distingue par les folioles plus nombreuses, ovales-lanceolées, inégales à leur base, à dente-

nures à peine sensibles. Les panicules forment presque des corymbes, & les pédicelles portent plusieurs fleurs.

Cette plante croît dans la Guinée. *Th* (*Willd.*)

15. **BALSAMIER de Ceilan.** *Amyris ceylanica*. Retz.

Amyris foliis pinnatis, petiolatis, glabris; racemis interruptis, axillaribus; floribus involucreatis, hexandris. Retz. Observ. 4. pag. 25.

Cette espèce diffère de ses congénères par le nombre des parties de sa fructification. Ses tiges sont revêtues d'une écorce cendrée; les feuilles ailées, composées de cinq à sept folioles ovales, petiolées, aiguës, glabres, très-entières; les fleurs réunies par paquets interrompus sur un pédoncule axillaire, enveloppés d'un involucre en cœur, sessile, tomenteux. Le calice est tomenteux, globuleux, à trois dents, plus grand que la corolle; trois pétales concaves, velus en dehors; six étamines. Le fruit est une drupe sec, ovale, long d'un pouce & demi, contenant une noix osseuse, épaisse, qui offre dans son intérieur trois cavités, comme pour loger trois semences.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. C'est elle qui fournit, selon Retzius, la véritable gomme élémé des boutiques. *Th* (*Retz.*)

16. **BALSAMIER polygame.** *Amyris polygama*. Cavan.

Amyris foliis simplicibus, lanceolatis, integerrimis; racemis simplicibus, axillaribus, numerosis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 333. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 20. tab. 239.

Arbre de quinze à dix-huit pieds, revêtu d'une écorce brune, chargée de rameaux couverts de feuilles éparfes, simples, médiocrement pétiolées, un peu coriaces, ovales-lanceolées, luisantes, très-entières. Les fleurs sont polygames, disposées en grappes simples, nombreuses, axillaires; les pédicelles capillaires; le calice hémisphérique, à quatre dents; la corolle d'un jaune-pâle, à quatre pétales ovales, rétrécis à leur base; un corollule central, plane, orbiculaire, à huit crénelures dans les fleurs mâles; huit étamines, dont quatre plus longues, alternes avec les pétales; dans les fleurs femelles, un ovaire libre, globuleux; le style presque nul; les stigmates composés de trois ou quatre corollules globuleux; les filaments plus courts que dans les fleurs mâles, munis d'anthères peut-être stériles. Le fruit est une drupe sphérique, contenant un noyau foliaire, monosperme.

Cette plante croît au Chili, & se cultive au Jardin botanique de Madrid. *Th* (*Descript. ex Cavan.*)

BALSAMINE.

BALSAMINE. *Impatiens*. Il n'y a dans ce genre que deux espèces qui nous soient parfaitement connues, l'une cultivée dans tous les jardins, l'autre assez commune dans les bois ombragés & humides de l'Europe. La première (*impatiens balsamina*) est gravée dans les *Illustrations*, tab. 725. Les espèces ajoutées à celles décrites par M. de Lamarck ne nous sont point connues. Nous nous bornerons à les mentionner rapidement.

* *Impatiens* (*bifida*), *pedunculis unifloris*, *foliariis*; *foliis oblongis*, *ferratis*; *nectariis longissimis*, *bifidis*. Thunb. Prodr. 41. E. Cup. B. Sp.

* *Impatiens* (*capensis*), *pedunculis unifloris*, *foliariis*; *foliis ovatis*, *crenatis piliferis*. Thunb. Prodr. 41.

* *Impatiens* (*biflora*), *pedunculis foliariis*, *plerumque bifloris*; *foliis ovatis*, *ferratis*; *floribus sulcatis*, *maculis rubris*. Walt. Coroll. 219. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1175.

* *Impatiens* (*natans*), *pedunculis trifloris*, *foliariis*; *foliis angulo-lanceolatis*, *nectario brevissimo*. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1175.

Cette espèce, originaire des Indes orientales, a les feuilles semblables à celles de la balsamine des jardins; mais ses pédoncules ne sont chargés que de trois fleurs. Son éperon n'offre qu'une bourse très-courte.

L'*impatiens rosmarinifolia* de Retzius, obs. 5, pag. 29, a de si grands rapports avec l'*impatiens oppositifolia* Linn., qu'il y a tout lieu de soupçonner que c'est la même plante ou une simple variété.

BALSAMITE. *Balsamita*. Genre de plantes établi par M. Desfontaines, & dont il a été fait mention à l'article TANASIE. (Voyez ce mot.)

BALSAMONA. Vandelli avoit décrit, sous ce nom, une plante qui appartient au genre *cuscuta* de Jacquin. (Voyez SALIQUIER, n°. 1.)

BALSAN : nom arabe du balsamier qui fournit le baume de Judée.

BALTIMORA. (Voyez BALTIMORE, & III. Gen. tab. 709.)

M. Richard regarde le *milleria alba* cultivé à Trianon, comme devant appartenir à ce genre.

BALTRACAN. On trouve ce nom dans Valmont de Bomare, sans citation. Il dit qu'il appartient à une plante de Tartarie, qui ressemble à celle de la rave. Son fruit, qui est une capsule, s'ouvre lorsqu'il est mûr, & répand alors une odeur semblable à celle de l'orange. Les graines ressemblent, pour la couleur & pour la forme, à celles du fenouil. Les Tartares le nourrissent de ce fruit.

Botanique. Supplément. Tome I.

BALUCANAD. Grand arbre des Philippines, que Rai & Camelli croient être le *camiri* de Cluettius, & qui paroît avoir beaucoup d'affinité avec l'*aleurites*, auquel le rapporte également le *camirium* de Rumphius, Amb. 2, tab. 58.

BALUCBALUC, arbre élevé des îles Philippines, dont on retire un suc résineux, au rapport de Camelli. Ses feuilles sont alternes, ailées, composées de cinq folioles ovales, aiguës, assez grandes, dont une est terminale. Son fruit paroît être une gousse; il appartient donc à un genre de la famille des légumineuses, voisin du *dalbergia* ou de l'*angelin* (*andira*). (Juss.)

BALRY : nom caraïbe d'un balisier.

BAMATA : nom caraïbe d'une bignone des Antilles, *bignonia pentaphylla* Linn., qui est le poirier des îles.

BAMBAGE. *Bambagia* : nom italien du coton, qui est aussi nommé *bombax*. L'étymologie de ce mot vient probablement du rapport qui existe entre la bourre dont ses graines sont enveloppées, & la soie fournie par le bombyx ou ver à soie. Le nom de *bombax* a été depuis appliqué par Linné au fromager, autre genre de plantes, dont le fruit contient une bourre pareille, & dont Pona fait mention dans son *Voyage au mont Baldo*, sous celui de *bombagio indiano*. (Juss.)

BAMBOCHES, jeunes tiges de bambou, dont on fait des cannes légères.

BAMBOU. *Bambos*. (Voyez VOULOU.)

BAMIA. Prosper Alpin & Jean Bauhin nomment ainsi une espèce de ketmie (*hisifus esculentus* Linn.), connue ailleurs sous le nom de *gombaut* ou *gombo*. (Voyez KETMIE, n°. 40.)

BANABA, **BANAVA** : noms que porte dans les Philippines le *manchosa*, genre d'arbrisseau de la famille des salicaires. On trouve aussi, sous le dernier de ces noms, dans un herbier donné par Poivre, le *maybala* des Philippines (*cavanillea* Lam.). (Voyez MABOLO.)

BANANES, fruits du bananier. (Voyez ce mot.)

BANANIER. *Musa*. Les nombreuses variétés obtenues par la culture de cette plante si précieuse par la bonté de ses fruits, nous ont déterminés à ne point présenter ici quelques nouvelles espèces ajoutées à celles décrites par M. de Lamarck. On en trouve deux décrites par Jacquin dans l'*Hortus schoenbr.* : 1°. *musa maculata*, vol. 4, tab. 446; 2°. *musa rosacea*, idem 4, tab. 445. Il y a encore le *musa coccinea*, Andrews, Bot. R. p. 1, tab. 47. Le *musa paradisiaca* Linn. est gravé dans

les *Illustrations*, tab. 836 & 837. — Detuffac, Flor. des Antill. 1, pag. 57, tab. 1 & 2. Le bananier porte aussi le nom de *plantain des Indes*.

Il a été envoyé, il y a quelques années, à l'Institut, par M. Hapel la-Chenaye, un Mémoire sur les trachées du bananier, & sur les usages auxquels elles peuvent être employées. Ce Mémoire contient des détails fort intéressants. Il a été imprimé dans les *Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris*, vol. 9, pag. 294. « Le bananier, dit l'auteur, déjà si précieux par l'aliment qu'il fournit aux Africains & aux habitants de nos colonies, par l'eau-de-vie suave & manifestement ébérécée que j'ai retirée de ses fruits, par la farine propre à la panification qu'on peut préparer avec ces mêmes fruits cueillis avant leur maturité, & ensuite séchés & rapés, offre encore une nouvelle espèce de coton, dont la légèreté ne le cède point à celle de l'edredon, & qui peut être employé aux mêmes usages. Chaque tronc de bananier donne jusqu'à un gros & demi de trachées, dont les fils sont plus longs, plus élastiques & plus disposés à se lier entre eux, que ceux des diverses espèces de coton. Privé d'aristiles, je n'ai pu faire essayer ici de fabriquer différents tissus avec cette matière. Je me suis borné à la faire filer pour l'employer à la broderie & au tricorage. J'ai été satisfait des résultats. On pourra sans doute en fabriquer des étoffes qui seront d'une extrême légèreté. Elle doit surtout être propre à la fabrication des chapeaux; car j'ai reconnu que ses fils, contournés en spirale, se contractent fortement & se lient entre eux par un degré de chaleur peu supérieur à celui de l'eau bouillante, caractère qui le rapproche de la laine. Cette matière est encore excellente pour faire des mèches dans la fabrication des chandeliers. L'incinération de ces mèches ne tarde pas à s'opérer après leur carbonisation. Elles ne forment point, comme les mèches de coton, ce champignon qui diminue beaucoup la lumière, & les chandeliers n'ont besoin d'être mouchés que de loin en loin. « Quant même les trachées du bananier ne pourroient être employées dans les usages économiques avec autant d'avantage que l'auteur le présume, son observation seroit toujours intéressante & utile aux progrès de l'anatomie végétale, parce qu'on ne connoit aucune plante où les trachées soient aussi abondantes que dans le bananier, & où il soit aussi facile de les observer. Après qu'on a coupé le tronc du bananier & les feuilles qui l'enveloppent, il en sort une grande quantité de suc limpide, qui a été analysé par MM. Fourcroy & Vauquelin. Cette analyse, insérée à la suite du Mémoire cité plus haut, prouve que ce suc contient une très grande quantité de sels, & qu'il y a si peu de matière végétale dans ce suc, qu'on pourroit le regarder comme une simple dissolution saline.

BANARA. (Voyez BANARE, & Ill. tab. 464.)

Banara sagifolia, Vahl, Symb. 3, pag. 65.

BANCAI.US. Rumph. Amb. 3, pag. 84, tab. 55, fig. 1. Il paroît que c'est la même plante que le *bancaia orientalis* Linn. (Voy. NAUCLÉ, n°. 1.)

BANCOUI, BANCOULIER, NOLX DE BANCOUL. (Voyez ALEVAIR, Suppl.)

BANCSIE. *Banksia*. Ce beau genre a été augmenté de plusieurs espèces, la plupart découvertes à la Nouvelle-Hollande, & les anciennes mieux déterminées par des figures & des observations particulières. Le genre *Banksia*, établi par Cavanilles, que M. Smith a nommé depuis *conchium*, renferme quelques espèces placées d'abord parmi les *banisfa*. (Voyez VAUBIER.)

ESPÈCES.

1. BANCSIE serrée. *Banksia serrata*. Linn. — Lam. Ill. tab. 54, fig. 1. — White, Irin. 123. Icon. — Cav. Icon. Rar. 6, tab. 540. — Andrew, Bot. Repof. tab. 82.

Banksia conchifera. Gært. de Fruct. & Sem. 1, pag. 221. tab. 48, fig. 1.

2. BANCSIE à feuilles entières. *Banksia integrifolia*. Linn. — Lam. Ill. tab. 54, fig. 2. — Cavan. Icon. Rar. 6, tab. 546.

Banksia spicata. Gært. de Fruct. & Sem. 1, p. 221. tab. 48, fig. 2.

3. BANCSIE à feuilles de bruyère. *Banksia ericifolia*. Linn. — Cavan. Icon. Rar. 6, tab. 538.

4. BANCSIE dentée. *Banksia dentata*. Linn. — Wendl. Hort. Herren. tab. 8.

5. BANCSIE musculiforme. *Banksia musculiformis*. Gært.

Banksia foliis obfusca, integerrimis; capsulis muricatis, unilocularibus. Lam. Illustr. 1, n°. 1280. — Gært. de Fruct. & Sem. 1, pag. 221.

Cette espèce a déjà été mentionnée sous le nom d'*ohcaoui* à fruit en moule, vol. 1, pag. 62. Gært. la considère comme un *banisfa*, malgré les fruits à une seule loge. C'est une capsule longue d'un à deux pouces, ovale, conique, acuminée, ligneuse, toute couverte de tubercules arrondis, panachée de brun & de rouge, à une seule loge, s'ouvrant en deux valves, contenant deux semences ailées. (Gærtner.)

6. BANCSIE tongée. *Banksia pramosa*. Andr.

Banksia foliis cuneatis, pramosis, serratis, sub-ris oblongo-punctatis; floribus externis parvifloris. Andrew, Bot. Repof. tab. 258.

Ses tiges sont garnies de feuilles éparées, presque sessiles, rétrécies en coin à leur base, tronquées & comme rongées à leur sommet, lâchement dentées en scie, parsemées en dessous de points blancs hâtes; les têtes de fleurs sont très-grosses, ovales, oblongues, obtuses, foliaires, d'un pourpre-foncé; les capsules bivalves, à deux semences ailées. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. *H*

7. BANCIE à petits épis. *Banksia microstachia*. Cavan.

Banksia foliis lanceolato-linearibus, serrato-spinosis, subius tomentosis, albis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 28. tab. 541.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, sur une tige très-rameuse, garnie de feuilles éparées, linéaires-lancéolées, rétrécies en un pétiole court, tronquées à leur sommet, glabres, vertes en dessus, tomenteuses & blanchâtres en dessous, longues de deux pouces, à dentelures épineuses; les fleurs réunies en une tête ovale, de la grosseur d'un gland, placée dans la bifurcation des rameaux; les involucre subulés; les écailles tomenteuses; la corolle velue, d'un jaune de safran; à quatre découpures capillaires.

Cette plante croît au port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande. *H* (Cavan.)

8. BANCIE à feuilles oblongues. *Banksia oblongifolia*. Cavan.

Banksia foliis oblongis, serratis, subius tomentosis; caule arboresc. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 24. tab. 541.

Son tronc s'élève à douze ou quinze pieds. Le bois est dur, d'un blanc-rougeâtre; les rameaux cylindriques, ramifiés, disposés sur trois rangs. Les feuilles sont coriaces, à peine pétioolées, oblongues, à denreures aiguës, à veines parallèles, glabres en dessus, tomenteuses en dessous, longues de trois pouces, obtuses; les têtes de fleurs ovales, longues de trois pouces; les écailles tomenteuses; les corolles velues, d'un jaune-doré.

Cette plante croît dans les environs du port Jackson. *H* (Cavan.)

9. BANCIE à feuilles de chêne. *Banksia robur*. Cavan.

Banksia foliis ovato-oblongis, serrato-spinosis, sparsis, subius ferrugineo-tomentosis. Cavan. Icon. Rar. pag. 29. tab. 543.

Cet arbre parvient à la hauteur de trente pieds & plus. Ses rameaux sont tomenteux dans leur jeunesse; les feuilles éparées, très-amplées, coriaces, pétioolées, profondément dentées, rousses

& tomenteuses en dessous; glabres en dessus, ovales-oblongues, obtuses; les dentelures épineuses; les fleurs velues, d'un jaune-brun, réunies en têtes foliaires, longues de trois pouces; les styles rouges, persistants, après la fécondation, en forme d'épines un peu roides.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, à la baie Botanique. *H* (Cavan.)

10. BANCIE à feuilles de saule. *Banksia salicifolia*. Cavan.

Banksia foliis sparsis, oblongis, integerrimis, apice breviter mucronatis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 31.

Arbrisseau d'environ six pieds, muni de rameaux tomenteux & roussâtres dans leur jeunesse, garnis de feuilles nombreuses, éparées, oblongues, très-entières, tomenteuses en dessous, traversées par le pétiole qui les déborde sous la forme d'une épine courte, terminale.

Cette plante croît à la baie Botanique. *H*

11. BANCIE à feuilles bordées. *Banksia marginata*. Cavan.

Banksia foliis linearibus, truncatis, margine revolutis; capsulis compressis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 30. tab. 544.

Ses tiges, hautes de quatre à cinq pieds, sont garnies de feuilles étroites, linéaires, tronquées à leur sommet, longues de deux pouces, médiocrement pétioolées, tomenteuses en dessous, roulées à leurs bords, terminées par une petite pointe épineuse; les fleurs velues ainsi que les écailles, ramassées en une tête épaisse, longue de deux pouces, hérissée, après la fécondation, par les styles persistants; les capsules comprimées, à deux valves.

Cette plante croît au port Jackson. *H* (Cavan.)

12. BANCIE à feuilles d'olivier. *Banksia oleaefolia*. Cavan.

Banksia foliis verticillatis, sublancoatis, integerrimis, subius tomentosis, albis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 30. tab. 545.

Ses tiges sont hautes de douze pieds, rameuses, garnies de feuilles quaternées ou presque verticillées, à peine pétioolées, oblongues, étroites, lancéolées, très-entières, blanches & légèrement tomenteuses en dessous, glabres, vertes en dessous; les fleurs jaunes, velues, réunies en têtes épaisses, ovales, obtuses, axillaires; les styles rouges.

Cette plante croît au port Jackson. *H* (Cavan.)

13. BANCIE épineuse. *Banksia spinulosa*. Smith.

Banksia foliis linearibus, revolutis, mucronatis, C c c c 2

apicem versus denticulato-spinosis. Smith, Nov. Holl. 1. pag. 13. tab. 4. — Cavan. Icon. Rat. 6. pag. 26. tab. 537.

Cette espèce se distingue par ses feuilles nombreuses, éparpillées, linéaires, luisantes en dessus, légèrement cotonneuses en dessous, longues de deux à trois pouces, roulées à leurs bords, à dentelures épineuses vers leur sommet, tronquées & remplies par trois épines. Les fleurs sont jaunâtres, velues, réunies en une tête cylindrique, longue de quatre pouces, munie à la base d'écaillés subulées, en forme d'involucre; les autres écaillés épaisses, tomentueuses, les styles rouges.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au port Jackson. *h* (Cavan.)

14. BANSIE traçante. *Banksia repens*. (Labill.)

Banksia foliis oblongis, pinnatifidis; laciniiis ovato-lanceolatis, subdentatis, junioribus cauleque ferrugineo tomentosis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 118, & Voyag. vol. 1. pag. 412. tab. 23.

Ses tiges sont traçantes, couvertes d'un duvet épais & rougeâtre; les feuilles oblongues, pinnatifides, à découpages oval-sancolées, légèrement dentées, couvertes, lorsqu'elles sont fort jeunes, du même duvet que la tige, au point de faire prendre cette plante pour quelque espèce d'*acrostichum*; mais, plus avancées en âge, elles sont très-rigides. Les fleurs sont réunies sous la forme d'un cône, à l'extrémité des tiges.

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. *h* (Labill.)

15. BANSIE argentée. *Banksia nivea*. Labill.

* *Banksia subcaulis, foliis linearibus, serrato-pinnatifidis, truncatis, subtus niveis; laciniiis acutis, rigidis, marginibus reflexis*. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 118, & Voyag. vol. 1. pag. 413. tab. 24.

Cette espèce n'a presque point de tiges; elle est remarquable par ses longues feuilles linéaires, pinnatifides ou très-profondément dentées, tronquées à leur sommet, d'un blanc de neige en dessous; les découpages roides, aiguës, réfléchies à leurs bords. Elle croît aux mêmes lieux que la précédente. *h*

* *Banksia (grandis), foliis pinnatifidis, truncatis, m. crenatis, subtus pubescentibus; laciniiis ovatis, acuminatis, alternis*. Willden. Spec. Plant. 1. pag. 535.

Cette espèce est remarquable par la forme singulière de ses feuilles pinnatifides, tronquées, mucronées, pubescentes en dessous; les découpages alternes, ovales, acuminés. Elle croît à la Nouvelle-Hollande. Les fleurs & les fruits n'ont point été observés. *h*

BANCUDUS. Rumph. 2. pag. 158. tab. 99. (Voyez MORINDE, n°. 2.)

BANDURA. (Voyez NÉPENTHE, n°. 1.)

BANGA : palmier des Philippines, qui, suivant Camelli, a beaucoup de rapport avec le dattier.

BANGADA-VALLI : nom brame d'une espèce de liseron (*convolvulus pes caprae*. Linn.), figurée dans l'*Hort. malab.* 11. tab. 57.

BANGHETS. Suivant Flaccourt, c'est le nom des plantes du genre *indigofera* ou anil, dont se servent les habitants de Madagascar; ils les nomment plus communément *enghets*.

BANGI : petit arbre des Philippines, rempli d'un suc lacteux. Camelli dit que son fruit, de la grosseur d'une orange, est vert, tuberculeux, bon à manger, mais que ses graines enivrent & tuent les chiens.

BANGO : plante des Philippines, figurée par Camelli, tab. 45, & qui paroît être une espèce de pavetta.

BANGUE : chanvre de l'Inde, qui s'élève beaucoup plus haut que celui de l'Europe, dont il paroît cependant n'être qu'une variété. Ses feuilles sont employées en malicacion & pour fumer. Le mélange de sa graine avec l'opium, l'arec & le sucre, pris à l'intérieur, procure une espèce d'ivresse & un sommeil tranquille. Le *majuk* des Indiens, composé de musc, d'ambre & de sucre, auxquels on joint cette graine, est en usage pour écarter les idées sombres & inspirer de la gaieté. (Voyez AXIS.) (Juss.)

BANGUING. Le petit arbre qui porte ce nom dans les îles Philippines, & dont Camelli fait mention, est le *cicca disticha* Linn.

BANISTÈRE. *Banisteria*. M. Cavanilles a augmenté ce genre de plusieurs belles espèces.

14. BANISTÈRE palmée. *Banisteria palmata*. Cavan.

Banisteria caule volubili, foliis palmatis, subtus tomentosis; petiolis bipinnatis. Cavan. Dissert. 9. pag. 430. tab. 257. fig. 2.

Cette espèce est remarquable par la forme de ses feuilles palmées ou divisées en cinq digitations aiguës; celle du milieu plus longue; la pinnule inférieure des feuilles entière, d'un vert-foncé, glabres en dessus, blanchâtres, très-cotonneuses en dessous; le pétiole muni de deux glandes à son sommet. Les tiges sont grimpantes. La fructification n'a point été observée.

Cette plante croît à Saint-Domingue. *h* (V. f. in herb. Juss.)

15. BANISTÈRE sagittée. *Banisteria sagittata*. Cavan.

Banisteria caule volubili; foliis sagittatis, magnis, subius tomentosis; petiolis biglandulosis. Cavan. Differt. 9. pag. 430. tab. 157. fig. 3.

Ses tiges sont grimpantes, garnies de feuilles pétiolées, opposées, assez grandes, sagittées, munies, vers leur sommet, d'une dent courte de chaque côté, glabres en dessus, tomenteuses à leur face inférieure, deux fois plus longues que les pétioles : ceux-ci sont pourvus de deux glandes à leur sommet. La fructification n'est point connue.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. (V. f. in herb. Juss.)

16. BANISTÈRE auriculée. *Banisteria auriculata*. Cavan.

Banisteria caule volubili; foliis subsagittatis, glabris; lobis rotundatis, foribus umbellatis. Cavan. Differt. 9. pag. 428. tab. 155.

Ses tiges, grêles & grimpantes, sont garnies de feuilles glabres, médiocrement sagittées ou plutôt profondément échancrées en cœur à leur base; les lobes arrondis, très-entiers; les pétioles plus courts que les feuilles, pourvus de douze glandes à leur sommet; le calice à huit glandes. Le fruit consiste en trois capsules, surmontées chacune d'une aile lancéolée, obtuse; les semences ovales, aiguës.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Rio-Janeiro. *h* (Cavan.)

17. BANISTÈRE échancrée. *Banisteria emarginata*. Cavan.

Banisteria foliis ovatis, subcordatis, apice emarginato cuspidatis, desuper tomentosis; floribus racemosis - corymbosis. Cavan. Differt. 9. pag. 425. tab. 149.

Ses rameaux grêles sont revêtus d'une écorce brune, garnis de feuilles ovales, pétiolées, un peu en cœur à leur base, échancrées à leur sommet, avec une petite pointe dans le milieu de l'échancrure, glabres en dessus, tomenteuses & ferrugineuses en dessous; le pétiole court, à deux glandes; huit glandes au calice; la corolle jaune; les pétales orbiculaires & frangés; les étamines rougeâtres; l'ovaire tomenteux; les capsules petites, surmontées d'une aile pourvue d'une dent vers sa base.

Cette plante croît dans l'Amérique. *h* (Cavan.)

18. BANISTÈRE à petites feuilles. *Banisteria microphylla*. Jacq.

Banisteria foliis ellipticis, utrinque rotundatis, glabris; racemis terminalibus, subpaniculatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 739.

Banisteria foliis oblongis, obtusis, rigidis; racemis terminalibus. Jacq. Obiciv. 3. pag. 7. tab. 56.

Ses rameaux sont glabres; les feuilles petites, oblongues ou elliptiques, arrondies à leurs deux extrémités, glabres, entières, opposées, médiocrement pétiolées; les fleurs disposées en grappes terminales, simples ou peu ramifiées; le calice glanduleux; les pétales frangés, pourvus de très-longs ongles.

Cette plante croît à la Caroline. *h* (Jacq.)

19. BANISTÈRE hérissée. *Banisteria muricata*. Cavan.

Banisteria foliis ovata-acutis, subius tomentosis; foribus racemis axillaribus, scrotulis muricatis. Cav. Differt. 9. pag. 423. tab. 146. fig. 2.

Ses tiges se divisent en rameaux opposés, cylindriques, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, aiguës, très-entières, couvertes en dessous d'un duvet blanchâtre; les fleurs disposées en grappes axillaires, opposées, ainsi que les pédoncules. Le calice est pourvu de huit glandes; les capsules armées de cinq pointes courtes, l'inférieure plus longue; les ailes roussâtres.

Cette plante a été recueillie au Péron par M. Joseph de Jusseu. *h* (V. f. in herb. Juss.)

20. BANISTÈRE d'Afrique. *Banisteria leona*. Cavan.

Banisteria ramis tuberculatis; foliis ovatis, apice acuminatis, coriaceis; floribus paniculatis. Cavan. Differt. 9. pag. 424. tab. 147. — Lam. III. tab. 381.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, parsemés de petits tubercules; les feuilles grandes, ovales ou oblongues, coriaces, très-glabres, entières, acuminées, veinées, réticulées; les fleurs disposées en une panicule terminale; les ramifications axillaires; les pédoncules accompagnés, à leur base, d'une petite bractée aiguë. Le calice est pourvu de dix glandes; les pétales petits, arrondis, les styles prolongés, persistants & recourbés sur les fruits; les capsules ligneuses, munies d'une aile longue d'un pouce & demi; les semences ovales-oblongues, acuminées.

Cette plante croît dans l'Afrique, à Sierra-Leona. *h* (V. f.)

21. BANISTÈRE foyeuse. *Banisteria sericea*. Cavan.

Banisteria ramis aciculis; foliis ovatis, subius tomentosis; petiolis biglandulosis, floribus racemosis. Cavan. Differt. 9. pag. 429. tab. 158.

Quoique les fruits de cette belle plante ne soient pas connus, elle paroît néanmoins appartenir aux banilières. L'écorce de ses rameaux est d'un brun-cendré; les feuilles larges, ovales, tres-entieres, obtuses, mucronees, luisantes en dessus, couvertes en dessous d'un duvet soyeux & jaunâtre; les pétioles courts, décurrents sur les rameaux, où ils forment deux angles opposés; deux glandes à leur sommet; les fleurs disposées en une panicule composée de grappes opposées, axillaires; les pédicelles unifiés, articulés, accompagnés de deux stipules. Le calice est hémisphérique, à cinq découpures ovales, tomentueuses; huit glandes; les pétales frangés, onguculés; l'ovaire ovale, velu; trois styles; dix étamines adhérentes par leur base; les anthères ovales.

Cette plante a été observée au Brésil par Dombey. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

22. BANISTÈRE ferrugineuse. *Banisteria ferruginea*. Cavan.

Banisteria foliis ovato-acuminatis, subulis ferrugineis; floribus paniculatis, horum ramulis stipulatis, stipulis imbricatis. Cavan. Dissert. 9. pag. 424. tab. 248.

Ses feuilles sont roides, ovales-acuminées, pétioles, légèrement pileuses à leurs deux faces, d'un jaune ferrugineux en dessous; les pétioles courts; les fleurs paniculées; les pédoncules nombreux, uniflores, accompagnés de stipules à leur base; huit glandes sur le calice; les pétales petits, concaves, un peu frangés, d'un jaune de soufre un peu rougeâtre; les ovaires velus; les fruits tomenteux, ainsi que leurs ailes; deux appendices à la base de chaque mébrane; les semences ovales, acuminées.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Rio-Janeiro. *h* (*Cavan.*)

23. BANISTÈRE à longues feuilles. *Banisteria longifolia*. Swartz.

Banisteria foliis oblongis, acuminatis, rigidis, nitidis; panicula terminali, ramis patentissimis. Sw. Prodr. pag. 75, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 856.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, étalés; les feuilles opposées, pétioles, longues d'un pied, oblongues, arrondies à leur base, glabres, luisantes, un peu roides, acuminées; les fleurs petites, disposées en une panicule terminale; les ramifications simples, étalées; les pédicelles courts, uniflores; trois capsules adhérentes, monopermes.

Cette plante croît aux Antilles & à Sainte-Lucie. *h* (*Swartz.*)

24. BANISTÈRE ovale. *Banisteria ovata*. Cavan.

Banisteria caule volubili; foliis ovatis, acutis, integerrimis; floribus umbellatis, involucri stipulatis. Cavan. Dissert. 9. pag. 429. tab. 257. fig. 1.

Ses tiges sont grimpantes, légèrement velues; les feuilles ovales, aiguës, vertes, glabres en dessus, glauques & un peu velues en dessous, tres-entieres, les pétioles courts, à deux glandes. Les fleurs, portées sur de longs pédoncules, forment une sorte d'ombelle à trois rayons. Le calice est pourvu de huit glandes; la corolle d'un jaune de soufre; les pétales petits; dix étamines courtes; trois styles capillaires; les stigmates foliacés.

Cette plante croît à l'île de Saint-Domingue. *h* (*Cavan.*)

25. BANISTÈRE à gros fruits. *Banisteria macrocarpa*. Juss.

Banisteria foliis oblongis, acuminatis; florum spica composita; fructibus alis latissimis, obliquis, rotundatis. Pers. Synops. Plant. 1. pag. 507.

Cette espèce est remarquable par la grandeur & par l'ampleur des ailes qui surmontent les capsules; elles sont soit larges, obliques, arrondies. Les rameaux sont garnis de feuilles opposées, pétioles, oblongues, acuminées; les fleurs disposées en épis rameux. Elle croît à la Martinique. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

BANITAN. On emploie dans les Philippines, pour les fièvres & l'asthme, une racine de ce nom, mentionnée dans Camelli; elle est de la grosseur du doigt, contournée, couverte d'une écorce striée & friable, dont la saveur, d'abord douce, tire ensuite vers l'amer. La partie ligneuse, très-compacte, moins amère, est marquée de plusieurs lignes dirigées en rayons du centre à la circonférence. Elle paroît appartenir à un arbrisseau dont le fruit, gros comme une petite nœze, est charnu & rempli de plusieurs graines inégales à leur surface. Ces caractères ne sont pas suffisants pour déterminer son genre. (*Juss.*)

BANKARETTI: nom malabare du bonduc axillaire (*goilandina axillaris* Lam.), figuré dans l'*Hort. malab.* 6, tab. 20.

BANKSIA. (*Voyez* BANCIE.)

BANNISTERIOIDES. Linn. Flor. zeyl. n°. 457.

Cette plante peu connue paroît se rapprocher de l'*umbellia grossularia* Rein. fig. 4, & du *pellia ribesoides* Gært. (*Voyez* PELLA, Suppl.)

BANULAC: plante mentionnée par Rai dans son *Histoire des plantes des îles Philippines*, & figurée par Camelli, tab. 50. Suivant Rai, c'est un

arbrisseau assez grand, dont les feuilles sont opposées, sessiles, en cœur & pointues. Les fleurs sont disposées en un corymbe composé de trois petits pédoncules, qui soutiennent chacun trois fleurs tubuleuses, blanches, & dont le limbe est divisé en quatre parties. Le fruit est une baie de la grosseur d'un pois, & contient deux graines ou petites noix. Ces caractères nous porteroient à regarder cette plante comme un *pavetta*, genre de la famille des rubiacées. (*Lam. Dict. de la science natur.*)

BANWAL : arbrisseau de Ceilan, dont les tiges fermes et flexibles s'étendent au loin. On en fait des cordes pour lier les bœufs.

BANU-KURUNDU : nom vulgaire que porte, à l'île de Ceilan, le *Laurus cinnamomum* Linn.

BAOBAB : à feuilles digitées. *Adansonia digitata*. Linn. — Lam. Ill. Gen. tab. 388. — Cavan. Differt. bot. 5. pag. 298. tab. 157.

L'accroissement de cet arbre, très-rapide dans les premières années, diminue ensuite considérablement. Sa durée étonne l'imagination. On le nomme pour cette raison *arbre de mille ans*. Adanson, à qui nous devons une histoire très-étendue de ce végétal, a prouvé que, parmi ceux qu'il avoit observés au Sénégal, plusieurs étoient âgés de six mille ans.

Le fruit, lorsqu'il est gâté, & son écorce ligneuse, servent aux Nègres à faire un excellent savon, en tirant la lessive de ses cendres & en la faisant bouillir avec l'huile de palmier qui commence à rancir.

Les Nègres font encore un usage bien singulier du tronc de ces arbres : ils agrandissent les cavités de ceux qui sont atteints de la carie ; ils y pratiquent des espèces de chambres, où ils suspendent les cadavres de ceux auxquels ils refusent les honneurs de la sépulture, & ils en ferment l'entrée avec une planche. Ces cadavres s'y dessèchent parfaitement, & y deviennent de véritables momies sans aucune autre préparation. Le plus grand nombre de ces corps ainsi desséchés sont ceux des *guirios*. Ce sont des poètes musiciens, qui président aux fêtes & aux danses à la cour des rois nègres. Cette espèce de supériorité de talents les fait respecter des autres Nègres, qui les regardent comme des sorciers ou des démons ; mais à leur mort ce respect se change en horreur, & ils croient que si on enterroit ces corps ou si on les jetoit dans les eaux, ils attireroient la malédiction sur la terre : c'est pourquoi ils les cachent dans les troncs du baobab.

BAQUOIS ou **VACOUA**. *Pandanus*, M. du Petit-Thouars a donné ce genre un Mémoire dans lequel il présente seize espèces bien distinctes,

qu'il n'a pu rapporter à aucune de celles décrites dans les auteurs, & dont il donne l'indication avec des phrases spécifiques, auxquelles il a ajouté une notice sur le port de chacune d'elles. Nous les mentionnerons à la suite des espèces déjà connues.

« Ces arbres sont remarquables, dit M. du Petit-Thouars, 1°. par leur feuilles ensiforées, disposées sur trois lignes spirales, qui tantôt se courbent de gauche à droite, & tantôt dans le sens opposé ; 2°. par leurs rameaux plusieurs fois trifurqués ; 3°. par leurs fruits & leurs noix composés. Jusqu'à présent on a fait des tentatives inutiles pour déterminer la place de ce genre dans l'ordre naturel. La structure intérieure de la graine & la germination le rapprochent des palmiers ; ils deviennent assez nombreux pour former une famille distincte, quoique renfermés dans un seul genre. »

ES P È C E S.

1. **BAQUOIS** odorant. *Pandanus odoratissimus*. Linn. — Lam. Ill. tab. 708. — Roxb. Corom. 1. pag. 65. tab. 94. 95. 96. — Jacq. Frag. bot. pag. 21. tab. 13 & 14. fig. 1. — Lour. Coch. pag. 739.

Atrodabyllis spinosa. Forst. Gen. n°. 75.

2. **BAQUOIS** à plusieurs têtes. *Pandanus polycephalus*. Lam.

Pandanus (humilis), foliis, dorso marginique spinoso-dentatis ; fructibus globosis, aggregatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 645. — Jacq. Frag. bot. pag. 21. tab. 14. fig. 2. — Lour. Coch. pag. 740.

3. **BAQUOIS** fasciculaire. (*Voyez PANDANG.*)

5. **BAQUOIS** lisse. *Pandanus leviss*. Lour.

Pandanus foliis longissimis, dorso inermibus, fructu solitario. Lour. Coch. pag. 741. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 646.

Pandanus moschatatus seu leviss. Rumph. Amboin. 4. pag. 147.

Arbrisseau à tige courte, épaisse, rameuse, parsemée d'aiguillons. Ses feuilles sont subulées, longues de six pieds, canaliculées, fasciculées, longuement acuminées, glabres, sans épines sur leurs dos. Les fleurs sont dioïques, terminales, sans calice ni corolle ; les fleurs mâles réunies en grappes composées, oblongues, jaunâtres, odoriférantes. Les femelles produisent un fruit ovale, petit, solitaire, rougeâtre, tuberculeux.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine. h. (*Lour.*) Ses feuilles, blanchâtres, luisantes, d'une longue durée, sont employées par les indigènes pour former des cloisons dans leurs habitations.

6. BAQUOIS candelabre. *Pandanus candelabrum*. Pal.-Beauv.

Pandanus foliis marginé dorsoque serrato-spinosis, caudicis ramis erectis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware, pag. 37, tab. 21.

Les racines sont membraneuses, hors de la terre; les tiges nues, rameuses; les rameaux dans une direction horizontale, redressés vers leur extrémité; les feuilles imbriquées, vaginales à leur base, d'un vert-glauque, longues, ensiformes, très-aiguës, denses en scie, tant sur leur dos que sur leurs bords; placées à l'extrémité des rameaux, qui se relèvent comme les branches d'un lustre. Les fleurs sont blanches, d'une odeur suave, réunies en têtes axillaires, sessiles; le spadicé des fleurs mâles oblong; les drupes à une seule loge.

Cette plante croît sur les bords du fleuve For-mose, à peu de distance d'Agathon en Athique. η (Pal.-Beauv.)

7. BAQUOIS à semences purpurines. *Pandanus purpurascens*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis, dependentibus; nucibus dispersis, apice obtusé pyramidalis; stigmatibus glabris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 44.

Cet arbre ne s'élève qu'à une vingtaine de pieds. Ses têtes ont trois à quatre pouces de diamètre. Elles sont foliaires, pendantes; les stigmates glabres; les noix qui les composent, en pyramide obtuse à leur sommet, ne contiennent que deux graines. Elles sont de couleur purpurine. Il croît à l'île-de-France. η (Pet.-Th.)

8. BAQUOIS cultivé. *Pandanus sativus*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, cernuis; nucibus polyspermis, apice pyramidalis; stigmatibus glabris. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 44.

Cette espèce est remarquable par sa belle forme pyramidale; elle s'élève à cinquante ou soixante pieds. Ses têtes de fruits, foliaires, penchées, de forme pyramidale, ont jusqu'à un pied de diamètre. Les feuilles sont longues de six pieds dans leur jeunesse, sur quatre pouces de large; mais elles diminuent dans les plantes adultes. Les noix, pyramidales à leur sommet, contiennent plusieurs semences. Les stigmates sont glabres. On la cultive dans presque toutes les habitations à l'île-de-France. Ses feuilles sont les plus propres à faire des nattes ou des sacs. Depuis quelques années on l'a transportée dans les colonies des Antilles, où elle a très-bien réussi.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. η

9. BAQUOIS maroon. *Pandanus drupaceus*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, reflexis; nucibus polyspermis, externè carnosis, apice obtusé pyramidalis; stigmatibus suberectis. Petit-Thouars, Journ. Bot. 1. pag. 45.

Cet arbre est de moyenne taille; sa tige garnie, à la base, de racines extérieures; ses feuilles très-grandes; ses têtes de fruits foliaires, rabattues, assez grosses, formant un sphéroïde aplati à l'époque de la maturité; les noix obtuses, pyramidales à leur sommet, charnues à leur superficie, d'une faveur désagréable; les stigmates subéreux.

Cette plante croît dans les bois de l'île-de-France. η

10. BAQUOIS maritime. *Pandanus maritimus*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, cernuis; nucibus polyspermis; stigmatibus discretis, subdigitatis. Petit-Thouars, Journ. Bot. 1. pag. 45.

Cet arbre se fait remarquer sur les bords de la mer des deux îles de France & de Bourbon, par sa belle forme pyramidale. Il est d'une élévation médiocre. Sa tige est garnie, à sa base, de racines extérieures. Ses fruits sont oblongs, foliaires, inclinés; les stigmates presque digités; les noix plus grêles que dans le *Pandanus sativus*. Elles renferment plusieurs semences.

11. BAQUOIS élégant. *Pandanus elegans*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, cernuis; nucibus paucis, polyspermis, apice pyramidalis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 46.

Cet arbre s'élève à peine à la hauteur de vingt pieds. Sa cime est bien garnie; ce qui lui donne un aspect élégant. Ses têtes de fruits sont foliaires, inclinées, composées d'une vingtaine de noix pyramidales à leur sommet, contenant plusieurs semences. Il est commun sur le bord des rivières de l'île Bourbon.

12. BAQUOIS ensiforme. *Pandanus ensifolius*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis, erectis, sessilibus; nucibus paucis, dispersis, acutis pyramidalis. Petit-Thouars, Journ. Bot. 1. pag. 46.

Le tronc de cette plante est mince, & ne s'élève qu'à huit ou dix pieds; il est soutenu en bas par des racines extérieures souvent très-longues. La cime est éralée. Ses feuilles ont à peine un pied de long, sur deux pouces de large; elles sont d'un vert jaunâtre très-gai. Ses têtes de fruits sont sessiles, foliaires, redressées; les noix peu nombreuses,

breuses, pyramidales, aiguës. Elles ne contiennent que deux semences.

Cette plante croît dans les marais de Madagascar, près du rivage de la mer. *h* (Pet.-Th.)

13. BAQUOIS redressé. *Pandanus erigens*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, pedunculatis; nucibus monospermis, apice pyramidalis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 46.

Il forme un petit arbre d'une vingtaine de pieds, pyramidal. Ses feuilles ont un pied de long, sur neuf à dix lignes de large vers le milieu. Les têtes de fruits sont solitaires, pédonculées. Les noix, pyramidales à leur sommet, ne contiennent qu'une seule semence, dont les rats font très-fraisins. Il croît dans les forêts élevées de l'Île Bourbon. *h*

14. BAQUOIS sphéroïde. *Pandanus sphaeroides*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis, sessilibus; nucibus monospermis, apice planis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 46.

La cime de cette espèce est ramassée; les feuilles assez grandes, de couleur glauque. Les têtes de fruits sont filiformes, arrondies, & restent enveloppées dans les feuilles; elles ont cinq à six pouces de diamètre. Les noix, planes à leur sommet, ne renferment qu'une seule semence. Elle croît dans les endroits marécageux de l'intérieur de l'Île-de-France. *h*

15. BAQUOIS conique. *Pandanus conoides*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis, cernuis; nucibus monospermis, apice pyramidalis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 47.

C'est un arbre de quinze à vingt pieds, pyramidal. Ses feuilles sont alongées; les têtes de fleurs solitaires, réfléchies; les noix pyramidales à leur sommet, à une seule semence. Il croît à l'Île-de-France. *h*

16. BAQUOIS pygmée. *Pandanus pygmaeus*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis racemosis, erectis; nucibus monospermis, apice pyramidalis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 46.

Cette espèce ne s'élève pas à plus de dix pieds. Sa cime est étalée, très-garnie de feuilles, qui ont à peine six pouces de long, sur six à neuf lignes de large. Ses fruits ne sont pas plus gros qu'une noix, ayant à peine un pouce de diamètre; ils sont ramassés, au nombre de cinq ou six, en grappes droites. Les noix sont monospermes, pyramidales à leur sommet. Elle croît à Madagascar. *h*

Botanique, Supplément, Tome I.

17. BAQUOIS comestible. *Pandanus edulis*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis oblongis, racemosis, erectis; nucibus monospermis, apice planis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 47.

Le tronc de cet arbre a plus de six pouces de diamètre, mais il s'élève à peine à dix pieds; il fourme une cime étalée en parasol, de douze pieds au moins de diamètre. Ses fruits viennent en grappes; ils sont oblongs & plats d'un côté; les noix monospermes; elles deviennent charnues en mûrissant. Leur pulpe est très-souce, & les naturels de Madagascar les sucent volontiers.

Cette plante croît à l'Île de Madagascar. *h* (Pet.-Th.)

18. BAQUOIS globuleux. *Pandanus globuliferus*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis, globosis, sessilibus; nucibus monospermis, apice planis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 47.

Cet arbre s'élève à peine à six pieds. Sa cime est élégamment ramassée; les fruits sphériques, semblables, pour la forme & le volume, à un bœuf de canon de six. Ses feuilles ont un pied environ de long, sur neuf lignes de large, garnies de petites épines molles. Les noix sont planes à leur sommet; elles ne contiennent qu'une seule semence.

Cet arbre croît à l'Île-de-France. *h*

19. BAQUOIS hérissé. *Pandanus muricatus*. Petit-Thouars.

Pandanus capitulis foliariis, conicis, cernuis; nucibus monospermis, apice planis; spinis armatis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 48.

Cet arbre s'élève à trente pieds environ. Sa cime forme une belle pyramide. Ses feuilles sont oblongues; ses fruits coniques, solitaires; ils pendent sur de longs pédoncules. Les noix qui les composent, sont remarquables par cinq ou six épines implantées sur le sommet, & convergentes vers les stigmates qu'elles entourent. Les semences sont solitaires.

Il croît à Madagascar, dans les marais. *h*

20. BAQUOIS des marais. *Pandanus palustris*. Pet.-Th.

Pandanus capitulis foliariis; nucibus polyspermis, digitatis. Pet.-Th. Journ. Bot. 1. pag. 48.

Son tronc est élevé de dix à douze pieds; il porte une cime diffuse. Les feuilles sont très-grandes. Il sort du tronc & même des rameaux, des racines qui descendent jusqu'à terre. Le fruit est

D d d d

très-gros, solitaire ; les noix dont il est composé, sont divisées jusqu'à leur base en plusieurs lobes ; elles renferment plusieurs semences.

Cet arbre croît dans les parties marécageuses de l'intérieur de l'île-de-France. *h* (Pet.-Th.)

* *Pandanus* (obeliscus), *fructificatione ignota*; *foliis terminalibus*, *maximis*, *lateralibus*, *minimis*. Pet.-Th. Journ. Bot. t. pag. 49.

Quoique la fructification de cette plante n'aît pas été observée, elle paroît une espèce très-distincte par son port. De loin elle présente l'aspect d'un obélisque, s'élevant à cinquante ou soixante pieds, sur un diamètre de trois pieds vers le bas. Cet arbre singulier croît dans les marais les plus profonds de Madagascar. *h* (Pet.-Th.)

* *Pandanus* (nudus), *capitulis solitariis*, *dependentibus*; *nucibus polyspermis*, *apice obtuso pyramidatis*; *stigmatibus suberosis*. Pet.-Th. Journ. Bot. t. pag. 45.

Cet arbre ressemble beaucoup au *pandanus savius* ; il en diffère en ce qu'il n'a point de racines extérieures. Il croît dans les mêmes lieux.

BARACOCEA. On trouve sous ce nom, dans Césalpin, l'abricotier à noyau doux.

BARALOU, BAROULOU : noms caraïbes du balisier.

BARAMARECA : nom malabare du pois fabre, *dolichos ensiformis* Linn., figuré dans l'*Hortus malabaricus*, 8, pag. 85, tab. 44. (Voyez DOLICH.)

BARBACÈNE du Brésil. *Barbaenia brasiliensis*. Vandelli, in Koern. 1. pag. 98. tab. 6. fig. 9. — Ill. Gen. tab. 252. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 227.

Ce genre de plantes, établi par Vandelli, est encore peu connu. Il ne parle ni du caractère des tiges & des feuilles, ni de la situation de l'ovaire ; ce qui pourroit déterminer l'affinité de ce genre avec les salicaires si l'ovaire étoit supérieur, avec les onagres s'il étoit inférieur, d'après l'observation de M. de Jussieu.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six dents ; six pétales ; six filamens largis, dentés au sommet ; un style ; une capsule glanduleuse, à trois valves polyspermes.

Cette plante a un grand calice renflé, d'une seule pièce, divisé à son limbe en six parties, coarcté extérieurement de poils terminés par de petites glandes. Les pétales, au nombre de six, paroissent attachés à l'orifice du calice, ainsi que les étamines en même nombre ; les filamens élargis, dentés à leur sommet ; les anthères appliquées sur

les côtés des filamens. L'ovaire, surmonté d'un style & d'un stigmate en masse, devient une capsule allongée, à trois valves, renfermant un grand nombre de semences.

Cette plante croît au Brésil.

BARBAJOU : nom languedocien de la joubarbe ordinaire, *sempervivum sedorum* Linn.

BARBARÈ ou HERBE DE SAINT-F. BARBE, espèce de vélar, *erythrum barbara* Linn.

BARBASCO. On lit dans le *Recueil des voyages*, qu'à Guayaquil, sur les côtes du Pérou, les pêcheurs enivrent le poisson avec le suc d'une plante de ce nom, & qu'ils la mêlent aussi dans leurs amorces après l'avoir nâchée. Il est probable que cette plante est une espèce du genre molène, *verbascum* Linn., que l'on connoît comme joulant de la même vertu enivrante, propre à toute la famille des solanées, dont ce genre fait partie. L'on a d'ailleurs plus lieu d'être fondé sur cette opinion, que le nom *barvasco* est donné, dans les Antilles, au *jacinia*, espèce d'arbrisseau dont les feuilles sont également enivrantes & employées pour prendre le poisson. Il paroît encore évident que ce nom est dérivé du latin *verbascum*. (Juss.)

BARBE DE BOUC : nom vulgaire du salisier sauvage, traduit du *tragopogon*, qui est le nom latin du genre. Dans quelques lieux aussi la clavaire coralloïde porte ce nom.

BARBE DE CAPUCIN. On nomme ainsi la chicorée sauvage (*echorium intybus* Linn.) que l'on met l'hiver dans des caves, & qui, plantée sur couches ou enfoncée dans des trous pratiqués sur les côtes d'un tonneau rempli de terre, pousse des jets allongés & blancs que l'on coupe, & auxquels succèdent de nouveaux jets. On les mange en salade. Ils ont un petit degré d'amertume qui n'est pas désagréable. On donne aussi ce nom à la nigelle de Damas, dont la fleur est entourée d'un involucre très-découpé, & au *lichen barbatus* Linn.

BARBE DE CHÈVRE, traduction des mots latins *barba capra* & *aruncus*, ce dernier dérivé du grec *eryngos*, qui signifie la même chose. Tournefort & ses prédécesseurs désignent, par le nom *barba capra*, une plante réunie depuis par Linné au genre *spiraea*, qui est le *spiraea aruncus* Linn.

BARBE DE DIEU. C'est un barbon, *andropogon*.

BARBE ESPAGNOLE : nom vulgaire du *stil-landia usnoides* Linn., caragane, n°. 10, dont les tiges, longues, filamenteuses, diversément ente-

lacées & couvertes d'un duvet grisâtre, présentent la forme d'une barbe qui pend aux arbres sur lesquels croît cette plante : de là le nom de *barbe espagnole*, donné à cette plante par les Créoles des Antilles. Ses fibres, ligneuses, noires, sont dures, & ont un peu la consistance du crin. Elle croît si abondamment sur les arbres, qu'elle les couvre quelquefois en entier. On en fait peu d'usage dans les Antilles, quoique, comme le dit Nicholson, on puisse employer ses fibres dépouillées de leur écorce pour faire des sommiers & des meubles. Les Américains, peuple encore nouveau, & qui mettent tout à profit, se servent en effet de cette plante, qui croît abondamment dans les États du Sud, pour ces usages & pour rembourrer des chaises & des fauteuils ; mais les fibres n'ont pas assez de consistance pour être d'une longue durée ; elles ne tardent pas à se rompre & à se briser. D'abord elles se ramassent par pelotons, qui rendent fort désagréables les meubles ainsi composés, & elles finissent par se briser & se réduire en poussière ; ce qui, en mettant les meubles hors de service, occasionne un nouveau désagrément. On peut mettre au rang de ces meubles les lits de plumes & matelas que l'on fait, dans l'Amérique septentrionale, avec du duvet de la masette ou *typha*. (Pal.-Beauv.)

BARBE DE JUPITER. C'est le *barba Jovis* de Dalechamp & de Tonnesort, que Linné a transporté dans son genre *anthyllis*. Les diverses espèces de *barba Jovis* sont de petits arbrisseaux à feuillage soyeux & argenté. (Voyez ANTHYLLE.)

BARBE DE MOINE. On trouve sous ce nom, dans les plantes usuelles de Chomel, la cuscute ordinaire.

BARBE DE RENARD. On donne ce nom au *tragacantha* de Tournefort, connu aussi sous ceux d'épine de bouc & d'adragant, & que Linné a tenu au genre *asragale*.

BARBEAU. (Voyez BLUET & CENTAURÉE.)

BARBES, CARMAS : noms arabes de l'yeuse ou chêne-vert, selon Dalechamp.

BARBEUIA. Pet.-Th. Gen. nov. Madagasc. n°. 18. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille n'est pas encore déterminée, qui parait avoir quelques rapports avec les *prockia*. Il a été dédié par M. du Petit-Thouars à Barbeau du Bourg, auteur d'une Flore parisienne, sous le titre de *Boraniense français*. Ce genre a pour caractère essentiel :

Un calice à cinq découpures profondes ; une d'elles concave, membraneuse ; point de corolle ; des étamines nombreuses ; les filaments courts, aplatis, insérés au fond du calice ; les antères oblongues, sagittées ;

un ovaire libre ; deux styles courts, épais, hérissés d'une capsule à deux lobes, à deux loges ; chaque loge ne contenant qu'une seule semence à demi arillée.

Ce genre renferme des arbrustes foibles, * sagementeux, s'attachant aux plantes qui les avoient. Leurs rameaux sont grêles, flexibles ; les feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, très-glâbres, d'une couleur lugubre ; les fleurs fauciculées ; le pédoncule commun court, alongé, comprimé.

Ces plantes croissent à l'île de Madagascar.

BARBIFÈRE. *Barbiferus*. (Voyez BARBEUE, 2, Suppl.)

BARBON. *Andropogon*. Ce genre, d'après l'examen des espèces dont il étoit d'abord composé, a donné lieu à la formation de quelques autres genres. Les *anthistiria* ont déjà été mentionnés dans ce Supplément. Plusieurs espèces d'*andropogon* y ont été rapportées ; d'autres seront appelées dans le genre *chloris*, auquel appartiennent les *andropogon barbatus* — *provincialis* — *salsiculatus*, &c.

ES P È C E S.

* Fleurs disposées en un seul épi ou en panicule.

1. **BARBON carriqueux**, n°. 1. *Andropogon caricosum*, Linn. — Thunb. Flor. jap. 39.

2. **BARBON denté.** *Andropogon serratum*, Retz.

Andropogon spicid simplici, imbricatâ ; seriebus binis florum aristatis sessilibus, binis modis pedicellatorum ; calicibus univalvibus, Retz. Obs. 5. p. 21. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 903.

Ses tiges sont filiformes, tameuses, hautes d'un pied, velues à leurs articulations ; les feuilles linéaires, linéaires ; le pédoncule alongé, presque capillaire, soutenant un épi simple, foliaire, long d'un ponce & demi, chargé de fleurs serrées, disposées sur quatre rangs, dont deux, du même côté, contiennent des fleurs sessiles, surmontées d'une arête ; les autres pédicellées, sans arête. Les calices n'ont qu'une seule valve ovale, obtuse, verdâtre, ciliée, striée ; la corolle à deux valves lancéolées ; l'interne en carène. Dans les fleurs femelles, l'ovaire est ovale, comprimé ; l'arête torse, brune, alongée, insérée à la base de la corolle.

Cette plante croît au Bengale, sur le bord des fleuves. ♀ (Retz.)

3. **BARBON chevelu.** *Andropogon crinitum*, Thunb.

Andropogon spicid solitariâ, hirsutâ ; aristis nudis, geniculatis, longissimis, Thunb. Flor. jap. pag. 40. tab. 7.

D d d d 2

D'une touffe de racines filiformes s'élèvent plusieurs tiges simples ou rameuses, droites, articulées, capillaires à leur partie supérieure, longues de huit à dix pouces; les rameaux alternes, quelquefois canaliculés; les feuilles glabres, entières, longues de trois à quatre pouces, velues aux articulations; les épis foliaires, rarement geminés, linéaires, longs d'un pouce; le rachis couvert, à l'insertion de chaque fleur, de poils blancs, courts, étoilés. Les valves calicinales sont glabres; les arêtes réniformes à leur base, divergentes, beaucoup plus longues que les fleurs.

Cette plante croît au Japon. γ (Thunb.)

4. BARBON strié. *Andropogon striatum*. Willd.

Andropogon spica simplicis, floribus geminatis; hermaphrodito sessili, aristato; masculo pedicellato, valvula calicis exteriori nervosa. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 903. — Klein. in Litt.

Ses racines sont dures, presque ligneuses; les tiges hautes d'un pied ou d'un pied & demi, rameuses à leur base, ascendantes; les feuilles glabres, fermes, striées; les gaines barbues à leur orifice; les épis foliaires, terminaux, longs d'un pouce & demi; les fleurs geminés; les hermaphrodites sessiles. La valve extérieure du calice acuminée, ciliée à ses bords, à trois ou cinq nervures; l'intérieure membraneuse; la corolle membraneuse; une arête glabre, géniculée, s'élevant de la base de l'ovaire, beaucoup plus longue que la corolle; les fleurs mâles, pédicellées; les pédicelles comprimés & ciliés; les arêtes droites, terminales.

Cette plante croît au Malabar. γ (Willd.)

5. BARBON d'Allioni. *Andropogon Allionii*. Decand.

Andropogon spica solitaria, erecta, terminali; spiculis geminis, hinc masculis glabris, muticis, inde feminis pubescentibus, longe aristatis; aristis villosis, contortis. Decand. Flor. franç. 3. pag. 97. & Synops. n°. 1692. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 904.

Andropogon contortum. Allioni, Flor. pedem. n°. 277. tab. 91. fig. 4. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 377. (Excluf. Lyon.) — Lam. Dict. n°. 2, & Ill. tab. 340. fig. 3.

Cette espèce, facile à confondre avec l'*andropogon contortum*, en diffère par ses fleurs plus régulièrement disposées par deux rangs, par ses arêtes plus velues; par les valves des fleurs mâles, glabres, sans poils tuberculeux. Les tiges sont droites, ramifiées à leurs articulations; les feuilles longues, un peu tudes, droites, plissées sur leur nervure, d'un vert-glauque, glabres ou parsemées, vers leur base, de quelques poils épars; une touffe de

poils très-courts à l'entrée de leur gaine; les épis foliaires, comprimés; les fleurs sessiles, disposées deux à deux, gurnies, à leur base, d'une touffe de poils roux, disposées deux à deux, de telle sorte que toutes les femelles sont d'un côté, & les mâles de l'autre; les valves des fleurs mâles glabres, obtuses; celles des femelles brunes, coriaces, couvertes de petits poils roux, terminées par une longue arête velue. Ces arêtes se tortillent les unes avec les autres, de manière à ne former qu'un seul faisceau.

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, en Barbarie. γ (V. f.)

6. BARBON à épis tois. *Andropogon contortum*. Linn. Non Lam.

Cette plante, originaire de l'Inde, a été confondue avec l'espèce précédente, qui croît en Europe. On a vu précédemment en quoi ces deux plantes diffèrent. Celle-ci est surtout remarquable par les valves de ses calices, munies de longs poils fins, blancs, horizontaux. (V. f.)

7. BARBON à fleurs divergentes 3, n°. 3. *Andropogon divaricatum*. Linn. — Lam.

8. BARBON paniculé, n°. 4. *Andropogon grillus*. Linn. — Lam. Ill. tab. 840. fig. 1.

Andropogon panicula ramis laxis, trifloris; spiculis lateralibus masculis, intermediis hermaphrodito, aristato; aristis fuscis saepe multo longioribus. Hort. Gram. 2. pag. 1. tab. 1.

9. BARBON aciculaire. *Andropogon acicularis*. Retz.

Andropogon panicula simplicis, coarctata; ramis apice trifloris; flore intermediis femineis sessilibus, aristato, basi barbato; masculis pedicellatis, muticis, subulatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 906. — Retz. Observ. 5. pag. 22.

Gramen aciculatum. Rumph. Amb. 6. pag. 13. tab. 5. fig. 1.

Rapprochée de la précédente par son port, elle s'en distingue par ses fleurs plus petites, par ses panicules plus serrées; les ramifications terminées par trois fleurs; celle du milieu femelle, sessile, velue à la base, munie d'une arête; les fleurs mâles pédicellées, subulées, mutiques; les feuilles courtes, un peu denticulées, mais point ciliées à leurs bords; les gaines garnies de cils seulement à leur orifice.

Cette plante croît dans les Indes orientales, aux lieux défilés. γ

Observations. L'*andropogon nutans* & l'*andropogon quadrivulve* Linn. sont la même plante, &

appartiennent à *ix anthijiria*. (*Vo, et Anthijiria ciliata*, Suppl.)

10. BARBON roseau. *Andropogon arundinaceus*. Willd.

Andropogon paniculâ ramosâ, nutante; floris ternis; hermaphrodito aristato bisp. pedicellâtiq; barbâti; multifidis lateratis muticis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 906.

Cette plante est très élevée, & ressemble par son port à un roseau. Ses feuilles supérieures sont longues de deux pieds, larges d'un pouce; les p. inf. sont glabres, striées; l'orifice muni d'une membrane barbare; la panicule ramifiée, inclinée, longue d'un pied; les fleurs rapprochées au nombre de trois; deux nâles latérales, lancéolées, mutiques, sont nues par des pédicelles pileux; la fleur hermaphrodite, dont la valve extérieure du calice est plus grande, tridentée, ciliée, parsemée de poils épars, barbe à sa base; la valve intérieure aigüe; la corolle pourvue à sa base d'une arête torse, plus longue que la fleur.

11. BARBON avénacé. *Andropogon avenaceus*. Mich.

Andropogon foliis aseris vaginisque glabris; paniculâ nudâ, subpyramidalis oblongâ, multifidâ; floris rufescentibus, trianarâ; glumis valvâ alterâ villosâ, aristâ valvâ contortâ. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 58.

Ses tiges sont garnies de feuilles glabres, rudes, ainsi que leurs gaines; les panicules nues, oblongues, presque pyramidales; les fleurs nombreuses, roussâtres; la valve extérieure velue; les arêtes très-contournées. Elle croît dans les contrées des Illinois. 3 (Mich.)

12. BARBON douteux. *Andropogon ambiguus*. Mich.

Andropogon foliis amplexicaulis, subcordato-lanceolatis; paniculâ ramis promissis setaceis, simplicibus, erectis; glumis solitariis alternis, unijovis; flore imbricâ, longissimè aristatâ, trianarâ; glumâ succosâ; incrementis aristiformi. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 58.

Cette espèce, recueillie par Michaux dans les sols sablonneux de la Caroline, a des feuilles amplexicaules, presque en cœur, lancéolées. La panicule est longue; les ramifications droites, simples, setacées; les balles alternes, solitaires, unijovis; les fleurs glabres, munies d'une longue arête. 2

13. BARBON à panicule lâche. *Andropogon laxus*. Willd.

Andropogon paniculâ laxâ; flosculo altero sessili,

altero pedicellato; pedicellis hirsutis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 907.

Andropogon serratum. Thunb. Flor. jap. pag. 41.

Ses tiges sont droites, simples, cylindriques, glabres, hautes de trois pieds; les feuilles glabres, veinées, ciliées, dentées en scie, hérissées au bord de leurs gaines; les panicules lâches, d'un brun-noirâtre, longues d'un demi-pied; les pédoncules glabres, redressés, capillaires, flexueux; deux fleurs insérées à chaque dent sur pied nule, l'une sessile, velue à sa base l'autre pédicellée; le pédicelle court, velu; les calices glabres à leur sommet, noîrâtres à leur base; une arête caduque, glabre, contournée, quatre fois plus longue que les fl. urs.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

14. BARBON à maîue. *Andropogon cotuliferum*. Thunb.

Andropogon paniculâ patulâ, villosâ; aristâ teretili, nudâ; pedicellis incrassatis, putereformibus. Thunb. Flor. jap. pag. 41.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, sur une tige de l'épauille du doigt, simple, glabre, striée, garnie de feuilles glabres, linéaires, longues d'un pied, finement denticulées, velues à l'orifice de leurs gaines. La panicule est étalée, ramifiée; les fleurs caduques; les pédoncules capillaires, flexueux; les pédicelles très-courts, renflés en maîue; le rachis flexueux, velu à ses dents; les valves du calice rudes, velues, lancéolées, striées, acuminées; les barbes torse, géniculées, divergentes, une fois plus longues que le calice.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

15. BARBON hispide. *Andropogon hispidum*.

Andropogon paniculâ coarctatâ; spicis verticillatis, subsessilib; floris geminatis, aristatis, altero sessili, altero revolutello. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 908. — Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont droites, hautes de cinq pieds, rameuses à leur base; les feuilles roides, longues d'un demi-pied & plus, hérissées de poils roides & nombreux; les gaines hispides, striées, setacées à leur orifice; la panicule longue d'un demi-pied, composée d'épis nombreux, serrés, longs d'un ou de deux pouces, simples ou un peu rameux à leur base, disposés en verticilles; les fleurs géminées, l'une sessile, l'autre pédicellée; les pédicelles & les calices rudes sur leur dos; les valves calicinales inégales, nerveuses; la corolle munie à sa base d'une arête géniculée, glabre, torse, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît à Cumana, observée par MM. Humboldt & Bonpland. ? (Willd.)

16. BARBON nard, n°. 12. *Andropogon nardus*. Linn.

17. BARBON glauque. *Andropogon glauum*. Retz.

Andropogon paniculatus foliatus, involucrellis calicibus bifloris; florum sessilibus calicibus trivalvibus, pedunculatum bivalvibus. Retz. Obs. 5. pag. 20.

Ses tiges sont filiformes, hautes d'un pied; ses feuilles glauques, planes, linéaires; la panicule foliacée; un ou plusieurs pédoncules courts, sortant de la gaine d'une feuille; un involucre naviculaire, aigu, d'où sortent deux pédicelles courts, accompagnés chacun d'un involucre particulier, contenant deux fleurs, l'une sessile, l'autre pédonculée. Dans la première, le calice est à trois valves; les deux latérales planes, en faucille; l'autre droite, roulée, plus longue, acuminée, à deux fleurs; les valves de la corolle inégales; les stigmates plumeux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ? (Retz.)

18. BARBON porte-laine. *Andropogon lanigerum*. Desfont.

Andropogon foliis convolutis; spiculis lanuginosis, vaginâ cinctis; calice exteriori nullo; flore hermaphrodito, aristato. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 379.

Andropogon eriophorus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 910.

Cette espèce s'élève à la hauteur d'un pied, sur une tige glabre, lisse, garnie de feuilles roides, glabres, roulées sur elles-mêmes; leurs gaines plus courtes que les entre-nœuds. Les épis sont pédicellés, simples, axillaires, sortant de gaines foliacées; les fleurs geminées, enveloppées d'une laine blanche, très-épaisse; les mâles légèrement pédicellés, mutiques; les hermaphrodites sessiles, munies d'une arête serrée, de la longueur des valves.

Cette plante croît sur les montagnes, proche Caïsa en Barbarie; elle a été découverte par M. Desfontaines. ? (V. f. in herb. Desfont.)

19. BARBON à panicule roide. *Andropogon stricatus*. Willd.

Andropogon paniculatus subcaulatus; floribus apice aristatis, basi villosis; geminis, altero sessili, altero pedicellato; corolla trivalvi, valvula intermedia bifida. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 911.

Andropogon paniculatus erectus; spicis unifloris, aristatis; corolla glumâ trivalvi, valvula intermedia bifida. Hort. Gram. t. pag. 2. tab. 2.

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus; les feuilles assez semblables à celles des roseaux, roulées à leurs bords; les inférieures ciliées vers leur base; les gaines striées, ciliées à leurs bords; une membrane barbuë à leur orifice. La panicule est roide, composée d'épis rapprochés, les supérieurs simples, les inférieurs rameux; les fleurs geminées, barbuës à leur base, l'une sessile, l'autre pédicellée; les pédicelles & le rachis velus; la valve extérieure du calice plus grande, échancrée, aiguë; la corolle à trois valves membraneuses; l'extérieure oblongue, roulée à ses bords; l'intérieure plus courte, lancéolée, terminée par une arête droite, hispide; la troisième valve beaucoup plus petite, lancéolée, bifide.

Cette plante croît dans la Hongrie. ? (Willd.)

20. BARBON queue de renard. (ALOPÉC-ROIDE, n°. 9.) *Andropogon alopecuroides*. Linn. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 911.

21. BARBON saccharoïde. *Andropogon saccharoides*. Swartz.

Andropogon paniculatus simplicis, stridis; spicis alternis, confertis; simplicibus; floribus geminatis, altero sessili, aristato; altero pedicellato, mutico; rachis lanata, lanâ floribus longiore. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 912. — Swartz, Prodr. 26, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 205.

Cette espèce se rapproche de la précédente; elle en diffère par la disposition des fleurs, par sa panicule plus petite, par son arête droite, point géminée ni torse. Sa panicule est roide, simple, composée d'épis alternes, serrés, très-simples. Les fleurs sont geminées; l'une sessile, munie d'une arête; l'autre pédicellée, sans arête; le rachis & les pédicelles chargés d'un duvet lanugineux plus long que les fleurs.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les montagnes sèches. ?

22. BARBON ondulé. *Andropogon undatum*. Jacq.

Andropogon paniculatus simplicissimus; spicis alternis, remotis, secundis; floribus geminatis, pedicellatis; calicibus valvulis & corolla exteriori aristatis, foliis undulatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 912.

Andropogon spica pinnata, floribus secundis. Jacq. Icon. Rac. 3. tab. 361, & Collect. 5. pag. 237.

Ses tiges sont rampantes, puis ascendantes; les articulations barbuës; les feuilles oblongues, ondulées; la panicule très-simple, composée d'épis alternes, unilatéraux; les fleurs geminées, routes pédicellées, l'une mâle, l'autre hermaphrodite; le calice à deux valves oblongues, obtuses, munies d'une arête sous leur sommet, ainsi que la

valve extérieure de la corolle ; l'intérieure mutique.

Cette plante croît dans l'île Maurice. γ

23. BARBON à courtes feuilles. *Andropogon brevifolium*.

Andropogon spica axillaris, alternis, foliatis; floribus ternis, intermedio hermaphrodito, sessili, b-af aristato; lateralibus masculis, apice aristatis; culmo adscendente, compresso. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 913. — Swartz, Prodr. 26, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 209.

Ses tiges sont comprimées, ascendantes, géniculées, garnies de feuilles courtes; les épis alternes, solitaires, situés dans les aisselles des feuilles; les épillets distans; les fleurs réunies au nombre de trois; l'intermédiaire féconde, hermaphrodite, munie d'une arête à sa base; les deux fleurs mâles latérales, pourvues d'une arête.

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux sablonneux. \circ

24. BARBON fastigié. *Andropogon fastigiatum*. Swartz.

Andropogon spica simplicibus, pedunculatis, geminatis, paniculatis; floribus geminatis, hermaphrodito sessili, calice corollaque aristato; masculo pedicellato, calice aristato, valvula exteriori maxime corollâ mucidâ, rachi lanatâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 913. — Swartz, Prodr. 26, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 207.

Ses tiges supportent une panicule allongée, composée d'épis simples, geminés, pédoncules, sur lesquels les fleurs sont réunies deux à deux; l'une hermaphrodite, sessile, ayant les valves du calice & de la corolle terminées par une arête; l'autre mâle, pédicellée, et le calice seul pourvu d'une arête; la valve extérieure très-grande; celles de la corolle mutiques; le rachis lanugineux.

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux sablonneux. γ

25. BARBON pourpre. *Andropogon purpurascens*. Willd.

Andropogon spica simplicibus, pedunculatis, geminatis, sterile paniculatis; floribus geminis, hermaphrodito sessili, lanceolato, aristato; neutro pedicellato, aristato; rachi ciliatâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 913.

Andropogon (scoparium), vaginis villosis; ramis ramosis, elongatis, purpurascensibus, in longam paniculam strictis; spica simplicibus; floribus distincte alternis, triandris; involucellis brevissimis; flosculi addidit rudimento neutro, aristato. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 57.?

Ses tiges supportent une panicule roide, purpurine, composée d'épis geminés, dont l'un est longuement pédonculé, l'autre à pédoncule court; les fleurs également geminées; les hermaphrodites sessiles, lanceolées; la valve extérieure du calice terminée, aux fleurs inférieures, par une arête droite; leur corolle à deux valves inégales, munie à sa base d'une arête torse, allongée; les fleurs stériles pédicellées, leur calice étroit, lanceolé, surmonté d'une arête droite & courte; la corolle mutique; le rachis cilié.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. γ (Willd.)

26. BARBON à feuilles obtuses. *Andropogon obtusifolium*.

Andropogon culmo filiformi; ramis axillaribus, capillaceis; spica minimis, axillaribus, subsolitariis; foliis brevibus, obtusis, patentibus. (N.)

Cette singulière espèce est fort délicate. Ses tiges sont grêles, foibles, filiformes, ramoufées; les rameaux axillaires, presque fasciculés, sétacés; les feuilles planes, glabres, courtes, très-obtuses, linéaires, finement denticulées à leurs bords, très-ouvertes, quelquefois réfléchies, de la longueur des gaines; celles-ci lâches, nues à leur orifice, faisant la fonction de sparhe: il en sort, ou des rameaux ou des pédoncules qui se jettent sur le côté, & poussent, hors d'une gaine florale, un ou plusieurs épis filiformes, à peine longs de six à huit lignes, sortant d'une gaine florale, soutenus par un pédicelle sétacé. Les fleurs sont glabres, serrées contre un rachis très-fin, alternes, presque geminées; l'une à peine pédicellée, subulée, munie d'une arête torse, assez droite; l'autre stérile, mutique, sessile.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. (V. f.)

27. BARBON flexible. *Andropogon flexile*.

Andropogon spica axillaribus, paniculatis; pedicellis rachique barbatis; culmo stricto, sub apice triangulari; foliis subnullis, margine scabris. (N.)

Ses tiges sont grêles, droites, roides, hautes de deux à trois pieds, glabres, rameuses, triangulaires à leur partie supérieure; les rameaux axillaires, comprimés, anguleux, souples & flexibles; les feuilles longues, presque triangulaires, rudes à leurs bords, parsemées de quelques poils rares, très-fins. De l'aisselle des gaines supérieures sortent plusieurs rameaux latéraux, terminés par des fleurs alternes, en épis, réunies deux à deux dans une bractée concave, à peine plus longue que les fleurs; le rachis & surtout les pédicelles barbés; l'une des deux fleurs surmontée d'une arête droite, un peu contournée; l'autre mutique.

Cette plante a été recueillie par M. Bosc dans l'Amérique septentrionale. (V. f.)

* * Fleurs disposées sur plusieurs épis, &c.

18. BARBON à grosse panicule. *Andropogon macrocarpos*. Mich.

Andropogon vaginis foliorum ad margines manifestè villosi; panicula lateralibus fasciculata-polychaeta, in longam confertamque paniculam canthioidem; floribus monandris, aristis 4-5; gluma longitudine; valvis interioribus glabris. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 57.

Cinna (glomerata), *spicis bifidis, glomeratis, terminalibus; bracteis clavatis, plumosis*. Walt. Carol. 59.

Elle a le port de l'*Andropogon bicorne*; elle en diffère par les arêtes, par ses gaines de feuilles velues à leurs bords. Ses tiges sont garnies de feuilles alternes, longues, un peu étroites, aiguës; les fleurs disposées sur plusieurs épis géminés, fasciculés, très-serrés, formant, par leur ensemble, une longue panicule épaisse, latérale; le rachis & les involucre munis de longs poils; une seule étamine; les valves de la corolle glabres; les arêtes quatre & cinq fois plus longues que le calice.

Cette plante croît dans la Floride & la Caroline, aux lieux humides. ♀ (V. f.)

19. BARBON à fleurs épaves. *Andropogon distichiflorum*. Mich.

Andropogon vaginis foliorum glabellis; culmis stricte erectis, ferè ab imo floridis; spicis distichè lateralibus, cæcis, ætatis; floribus monandris, arista longa, recta; valvis interioribus glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 57.

Cinna (lateralis), *spicis bifidis, lateralibus, solitariis; bracteis clavatis, plumosis*. Walt. Carol. 59.

Les tiges sont droites, très-robustes; les gaines des feuilles glabres; les fleurs disposées, dans toute la longueur des tiges, en épis distans, latéraux, géminés ou solitaires, très-droits; les involucre velus, ainsi que le rachis; les valves intérieures glabres; la corolle à une seule étamine, surmontée d'une arête longue & droite.

Cette plante croît dans les forêts, à la Caroline & dans la Floride. ♀

30. BARBON à trois épis. *Andropogon ternarium*. Mich.

Andropogon ramis remotè alternis, foliariis, simplicibus, plerisque tristichis; spicis distanter alternis, bifidis; villis involucri glumæ brevioribus; floribus triandris; valvis interioribus sulcatis, inu-

ex ineisurâ aristas longam, contortam, emittentem. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 57.

Cette espèce se rapproche, par son port, de l'*Andropogon hirtum*. Ses tiges se divisent en rameaux alternes, distans, simples, solitaires, les inférieurs portant quelquefois quatre épis, les autres trois; les épis alternes, distans, bifides; les involucre velus; les épis plus courts que les bêtes; les arêtes à trois étamines; les valves intérieures légèrement velues; l'une d'elles bifide, pourvue d'une longue arête contournée, située à la division.

Cette plante croît aux lieux montagneux, dans la Caroline. ♀

31. BARBON odorant, n°. 15. *Andropogon schænanthus*. Linn. — Vahl, Symbol. 2. pag. 101. — Vent. Hort. Cels. tab. 89.

Andropogon bicorne. Forsk. Ægypt. pag. 173.

32. BARBON à bractées. *Andropogon bracteatum*. Willd.

Andropogon spicis laxis, conjugatis, paniculatis, bracteis; floribus ternis; internodiis hermaphrodito, sessili, aristato; arista hirsuta; lateralibus masculis, pedicellatis; aristas rachi pilosæ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 914. — Humb. & Bonpl.

Il se rapproche du précédent par son port. Ses tiges sont droites, hautes de trois pieds; les feuilles glabres, longues d'un demi-pied; les supérieures plus petites, pileuses à leur orifice; la panicule terminale, à rameaux divariqués, accompagnés, ainsi que les ramifications, d'involucre ou de bractées, d'où sortent deux épis lâches, peu garnis; les fleurs ternées; celle du milieu sessile, hermaphrodite; le calice mutique; la corolle pourvue, à sa base, d'une arête tortue, gémulée, hispide, trois fois plus longue que la fleur; les fleurs mâles latérales, géminées, pédicellées; la valve extérieure du calice plus grande, terminée par une arête droite & courte; la corolle mutique; le rachis couvert de longs poils.

Cette plante croît à Cumana. ♀ (Willd.)

33. BARBON de Virginie, n°. 16. *Andropogon virginicum*. Linn.

34. BARBON bicorne, n°. 17. *Andropogon bicorne*. Linn. — Swartz, Observ. pag. 381.

Elle diffère de l'*Andropogon macrocarpos* de Michx. par ses feuilles très-glabres, même par le bord de leurs gaines; par ses fleurs dépourvues d'arêtes, réunies au nombre de deux ou trois; le rachis chargé de longs poils. ♀ (V. f.)

35. BARBON hérissé, n°. 14. *Andropogon hirtum*. Linn. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 378. — Poir. Voyag. 2. pag. 265.

36. BARBON

16. BARBON double épi, n°. 13. *Andropogon distachyum*. Linn. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 377. — Poir. Voyage en Barb. 2. pag. 265. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 630. — Collect. 1. pag. 165. — Allioni, Pedem. n°. 1279. — Hott. Gram. 3. pag. 2. tab. 25.

Parmi les individus de cette espèce, que j'ai observés sur les côtes de Barbarie, j'en ai souvent rencontré à deux épis.

17. BARBON plumeux. *Andropogon plumosum*. Willd.

Andropogon spicis geminatis ternisve, terminalibus; flosculis geminis; calicibus pilosis, altero sessili, mutico; altero pedicellato, oristato; oristâ plumosa. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 918. — Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds; les feuilles planes, un peu rigides, rudes à leurs bords; les gaines glabres, striées; les articulations velues; les épis terminaux, geminés, quelquefois ternés, longs de trois à quatre pouces; les fleurs imbriquées, geminées, l'une sessile, mutique; l'autre pédicellée, munie d'une arête fix à sept fois plus longue que la fleur, torse, plumeuse depuis sa base jusque vers le milieu, puis hispide jusqu'à son sommet; les calices pileux.

Cette plante croît à Cumana. (Willd.)

18. BARBON biné. *Andropogon binotum*. Retz.

Andropogon spicis geminis, lanotis; calicis volutâ alterâ truncatâ, tridentatâ; petalo majori aristato. Retz. Observ. 1. pag. 21.

Ses tiges sont hautes d'un pied & plus, filiformes; les pédoncules allongés; les épis geminés, longs d'un pouce; les dents du rachis couvertes d'une rouffe de laine jaunâtre qui enveloppe également des fleurs sessiles; le calice strié, à deux valves; la plus grande acuminée; la plus courte tronquée, à trois dents; la valve extérieure de la corolle linéaire, munie d'une arête géniculée; l'intérieure plus courte, mutique; deux ligamens bruns & velus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Retz.)

19. BARBON à anneaux, n°. 14. *Andropogon annulatum*. Forsk. — Vahl, Symb. 2. pag. 102. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 918.

40. BARBON mutique, n°. 19. *Andropogon muticum*. Linn. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 919.

Willdenow est porté à croire que cette espèce appartient plutôt aux *chloris* qu'aux *andropogon*, & qu'elle se rapproche du *chloris petraea*.

Botanique. Supplément. Tome I.

41. BARBON à longues arêtes. *Andropogon aristatum*.

Andropogon spicis ternis quaternisve, floribus geminatis, altero sessili, longè aristato; altero pedicellato, mutico; foliis vaginisque lanè pilosis. (N.)

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente; elle en diffère par les fleurs pourvues d'arêtes, réunies en trois ou quatre épis terminaux, pédonculés, velus, linéaires, comprimés; les fleurs alternes, geminées; l'une sessile, pourvue d'une longue arête brune, géniculée; l'autre pédicellée, mutique; le calice acuminé; le rachis pileux; les feuilles rudes, fermes, étroites, longuement subulces à leur sommet, un peu planes, pileuses, ainsi que leurs gaines; les tiges glabres, cylindriques; les articulations brunes, rentrantes, très-glabres.

Cette plante a été observée à l'île-de-France par Commerçon. (V. f. in herb. Desfont.)

42. BARBON pileux. *Andropogon pilosum*. Willd.

Andropogon spicis digitatis, subsenis; floribus geminatis, basi villosis; altero hermaphrodito, aristato, sessili; altero masculo, mutico, pedicellato; rachis globosa. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 920.

Ses tiges sont hautes de trois pieds, rameuses à leur base; les feuilles roides; les inférieures longues de quatre pouces; les supérieures longues d'un pied, striées, pileuses un peu au dessus de leur base; l'orifice muni d'une membrane tronquée, laciniée; environ six épis longs de trois pouces; les fleurs geminées, environnées d'une longue laine à leur base; la fleur hermaphrodite sessile; le calice mutique; la corolle pourvue d'une arête un peu torse; les fleurs mâles pédicellées, mutiques; le rachis glabre.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Willd.)

43. BARBON de la Chine. *Andropogon Bladhii*. Retz.

Andropogon spicis subulonis; flosculo hermaphrodito sessili, aristato; neutro pedunculato, ciliato, mutico. Retz. Observ. 2. pag. 27.

Ses tiges sont simples, cylindriques, peu feuillées, velues à leurs articulations; les feuilles parsemées de poils blancs, surtout à l'orifice des gaines; environ huit épis pédonculés, linéaires; le rachis pileux, géniculé; les fleurs alternes, geminées, entourées de poils blanchâtres; la fleur hermaphrodite sessile, pourvue d'une longue arête torse; deux longs ligamens noirâtres, épais, un peu hérissés, supportés par des styles courts, capillaires; la fleur stérile vide, pédicellée, légèrement ciliée.

Cette plante croît à la Chine. (Retz.)

E e e

44. BARBON recourbé. *Andropogon incurvatum*. Retz.

Andropogon spicis filiformibus, subdigitatis; floribus geminatis; femineo pedicellato, aristato; masculo sessili, mutico; calicibus univalvibus. Retz, Observ. 5. pag. 21.

Cette plante a des tiges filiformes, hautes de deux pieds, rameuses, garnies de feuilles linéaires; celles du bas très-nombreuses; les autres rares. Plusieurs épis filiformes, d'un brun-verdâtre, supportent des fleurs geminées, hérissées, velues à leur base; la fleur mâle sessile, mutique; la fleur femelle pédicellée, pourvue d'une arête; les calices linéaires, velus, univalves, obtus; la corolle à deux valves lancéolées; l'arête torse, géniculée, plus longue que la fleur.

Cette plante croît à Tranquebarre, sur le bord des fleuves. (Retz.)

45. BARBON doré. *Andropogon aureum*. Willd.

Andropogon spicis digitatis, plurimis; floribus geminatis, aristatis; altero sessili, altero pedicellato; calicibus oblongis, villosis; rachis hirsuta. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 921.

Andropogon spicis confertis, hirsutis, rufo-flavis, numerosis. Borg. Itin. 1. pag. 367. tab. 21.

Ses tiges sont hautes de deux pieds; les feuilles roides & planes; leurs gaines striées, pileuses à leur orifice; les épis digités, au nombre de cinq à quinze, longs de deux à quatre pouces; les fleurs geminées, hermaphrodites; l'une pédicellée, l'autre sessile; leur calice à deux valves obuses, couvertes d'une laine luisante, d'un jaune d'or; la corolle pourvue, à sa base, d'une arête torse, trois fois plus longue que les fleurs; le rachis revêtu de poils roussâtres.

Cette plante croît à l'île Bourbon. (Willd.)

46. BARBON digité, n°. 20. *Andropogon ischaemum*. Linn. — Lam. Ill. tab. 840. fig. 4. — Hoffm. Gram. 2. pag. 3. tab. 3.

47. BARBON percé. *Andropogon pertusum*. Willd. *Holcus pertusum*. Linn. — Lam. Dict. 3. p. 142. n°. 6.

Cette plante, très-singulière par le trou arrondi qu'on remarque sur chacune des valves extérieures de ses calices, porte tous les caractères des *andropogon*, & doit y être réunie. On peut en dire autant de *Holcus racemosus*. Forsk. (Voyez HOUBOUR, n°. 5.)

48. BARBON fourchu. *Andropogon furcatum*. Willd.

Andropogon spicis digitatis, subquaternis; flori-

bis geminatis; hermaphrodite sessili, aristato; masculo mutico, pedicellato; rachis pilulâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 919.

Ses tiges se terminent par environ quatre épis longs de trois pouces, composés de fleurs geminées; les hermaphrodites sessiles, ayant un calice à deux valves lancéolées, hispides sur leur dos & à leurs bords; l'extérieure bidentée à son sommet; l'intérieure aiguë, un peu plus longue; la corolle membraneuse; la valve intérieure entière; l'extérieure bifide, munie d'une arête géniculée, au moins une fois plus longue que les valves; les fleurs mâles pédicellées, les valves calicinales mutiques, acuminées, hispides sur le dos & à leurs bords; la corolle dépourvue d'arêtes; le rachis couvert de très-longs poils.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (Willd.)

* *Andropogon (villosus), spicis digitatis; floribus aristatis, sessili pedunculatoque; calice culmæ villosis*. Thunb. Prodr. 20. (E Cap. B. Sp.)

BARBOTINE, SEMENCINE, POUDRE A VERS : nous divers de l'abbaye de Judée (armoise, n°. 14), dont la semence, envoyée du Levant, a une grande amertume & une odeur forte, qui la tendent, d'une part, stomachique, & de l'autre propre à faire mourir les vers. C'est peut-être celle que l'on nomme, dans les boutiques, *semes conia*. Il est au moins sûr que celle-ci appartient au même genre. Linné a nommé une espèce *artemisia conia*, probablement parce qu'elle a les mêmes propriétés, ou même qu'elle fournit la graine des boutiques. (Voyez ARMOISE.)

BARBOUTOUBA : nom cataïbe de l'*epiden-drum bifidum*. Aubl.

BARBOUQUINE. (Voyez SALSIFIS.)

1. BARBULE de Chine. *Barbula sinensis*. Lour.

Barbula floribus verticillatis; foliis oblongis, serratis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 445.

Genre de plantes de la famille des labiées, établi par Loureiro, sur une espèce d'arbutus de la Chine, d'une odeur très-agréable, qui s'élève à la hauteur d'un pied environ, garni de feuilles coronnées, ovales, oblongues, dentées, opposées. Les tiges & les rameaux se terminent par une pyramide de fleurs blanches, disposées par verticilles.

Le calice est d'une seule pièce, à cinq découpures droites, égales, fort aiguës; la corolle labiée, à deux lèvres; la lèvre supérieure divisée en quatre lobes ovales; l'inférieure grande, frangée, barbue; quatre étamines didymes; un ovaire à quatre lobes, surmonté d'un seul style; quatre semences nues au fond du calice.

Cette plante croît à la Cochinchine. Elle tire son nom de la cotolle frangée à la lèvre inférieure. *h*

2. BARBULE. *Barbula*. Genre de la famille des mousses, établi par M. Palisot de Beauvois. Ce nom, se trouvant le même que celui employé plus haut par Loursier pour une autre plante, pourroit être changé en celui de *barbifera* (*barbiferus*).

Le caractère de ce genre, d'après M. de Beauvois, est d'avoir un périsme simple, garni de cils simples, réunis en spirale, réunis en tube cylindrique, & libres seulement au sommet, comme les étamines de quelques plantes monadelphes. L'ovaire est filif, en forme de capuchon; l'opercule long, droit, tubulé; l'urne rubulée, ovale ou cylindrique; la gaine oblongue, dépourvue de péricarpe.

Ce genre ne comprend que quatre espèces, qui sont: des *bryum* de Linne, d's barbules & des tortues d'Herwig & de Bridel. Ces espèces sont: le *bryum rurale-sulcatum* Linn. — *ericetorum* Gmel. — *barbula acuminata* Hedw. App. polth. tab. 25, fig. 5. 7. (Voyez l'article BRY, & Pal-Beauv. Prod. pag. 26.)

BARBYLUS. Brown, Juss. C'est le *barola* d'Adanson. Ce genre, établi par Brown, se rapproche beaucoup des *trichilia*, & paroît même devoir y être réuni. Il n'en diffère que par le nombre des parties de la fructification, qui même sont variables, & par l'insertion des étamines.

Le calice est campanulé, à quatre ou cinq dents courtes; quatre ou cinq pétales insérés sur le bord intérieur du calice; huit à dix étamines sortant du fond du calice; les filaments comprimés; les anthères ovales; un ovaire libre; un style; un stigmate; une capsule à trois loges; deux semences dans chaque loge.

C'est un arbre de la Jamaïque, dont le tronc est revêtu d'une écorce raboteuse; les feuilles alternes, ailées; les fleurs disposées en grappes. (Voyez TRICHILIE, Suppl.)

BARCA: nom malabare, donné, suivant Clusius, à l'espèce ou variété de Jaquier (*artocarpus*, n°. 3), dont le fruit est plus succulent & plus agréable. Suivant Rheod, il est nommé *varaca*. On reconnoît facilement que c'est le même mot prononcé différemment, & que le dernier doit être préféré. (Juss.)

BARCAMAN. A Guzarate on nomme ainsi le turkish des Arabes, suivant Clusius.

BARDANE ou GLOUTERON. *Lappa* Lam., *arctium* Linn. Le *lappa glabra* Lam. ou *arctium lappa* Linn. est gravé dans les *Illustrations*, tab. 665. Willdenow & quelques autres botanistes ont

rangé parmi les *carduus* les troisième & quatrième espèces de Lamarck.

BARDOTTIER. C'est le nom que porte, dans l'île Bourbon, l'*imbricaria*. (Voyez NATIER.) Il se nomme encore *bois de nattes*, à raison de l'usage qu'on y fait de son bois débité par lames ou lattes, dites *nattes* dans le pays, & employées pour couvrir les maisons, ce qu'expriment aussi le nom latin *imbricaria*, & le français *bardottier*, corrompu de *bardeau*.

BARETIA Commerf., QUIVISIA Cavanil. (Voyez QUIVI.)

BARHARHA: nom que les habitants de Madagascar donnent à un grand & bel arbre de leur île. Il est remarquable par ses grandes feuilles & ses fleurs. Il est très-voisin des *dillenia* ou caimon; mais il paroît devoir former un genre particulier.

BARILLE. On nomme ainsi, sur quelques côtes méridionales de France, la soude, qui est nommée *barilla* sur celles d'Espagne, & dont les cendres donnent la meilleure soude d'Alicante. Ce dernier nom est aussi donné à *basis maritima*, suivant Jacquin, par les Américains habitants de Carthagène. (Voyez SOUDE, n°. 5.)

BARIN ou BALIN, espèce de baquois (*pandanus* Linn.) des Philippines, mentionnée par Camelli.

BARKHAUSIA. Quelques espèces de *crepis* ont été rangées dans ce genre établi par Moench, adopté par DeCandolle. Ces espèces ont été séparées des *crepis*, d'après les caractères suivants:

Un calice canaliculé, oblong, en côtes, & sillonné à sa base à l'époque de la maturité; les folioles intérieures allongées; celles du calice extérieures courtes & lâches; la receptacle alvéolaire & nu; les aigrettes simples, pédonculées par le prolongement filiforme des semences. Les fleurs sont jaunes ou rougeâtres.

Les *crepis alpina* — *rubra* — *serida*, &c. appartiennent à ce genre. (Voy. CREPIDE, Suppl.)

BARLERIA. (Voyez BARELLIER.)

BARNADESIA. (Voyez BARNADÉZ & les *Illustrations*, tab. 660, où est figuré le *barnadefia spinosa* Linn.)

BAROLA, Adanf. (Voy. BARBYLUS, Suppl.)

BARONETZE. (Voy. POLYPODE, n°. 146.)

BARRERIA, W. (Voy. PORAQUÈRE, AUL.)

BARRALDEIA. Genre de plantes que M. du

Petit-Thouars (*Gener. Nov. Madagaf.* n°. 81) consacre à M. Barault, médecin à l'Île-de-France, qui a recueilli, tant dans cette île que dans l'Inde, un grand nombre de plantes. Ce genre appartient à la famille des nerpruns; il offre pour caractère essentiel :

Un calice urcéolé, à cinq découpures; cinq pétales fort petites, onguiculés, bifides, insérés entre les découpures du calice; dix étamines; les filamens dilatés à leur base, cinq opposés aux pétales & plus longs; un ovaire glanduleux autour du pifil; l'ovaire adhérent au fond du calice; un style plus long que les étamines. Le fruit n'est pas connu.

Ce genre contient des arbrisseaux à tige droite; les rameaux opposés, articulés; les feuilles très-glâbres, opposées, légèrement dentées, parsemées de points transparens. Les pédoncules sont courts, situés à la base des feuilles, bifides, puis trifides, enfin à trois fleurs petites, globuleuses. Les bourgeons sont résineux.

BARRELIÈRE. *Barleria*. Quelques espèces doivent être ajoutées à ce genre, qui d'ailleurs se rapproche beaucoup des *ruellia*.

10. **BARRELIÈRE à trois épines.** *Barleria trifinosa*. Vahl.

Barleria spinis axillaribus, compositis, triradiatis; spicis terminalibus, imbricatis. Vahl, Symbol. 1. pag. 46.

Justicia trifinosa. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 6. — Lam. Dict. 1. pag. 633. n°. * CARMANTINE.

Arbrisseau à feuilles opposées, ovales-lancéolées, rétrécies en pétiole à leur base, entières, longues de deux pouces & plus, rudes & ciliées à leurs bords, munies, dans chaque aisselle, d'une épine blanche, subulée, à trois branches très-ouvertes. Les fleurs font imbriquées, disposées en un épi terminal, garni, dans toute sa longueur, de grandes bractées, & de deux autres plus petites, lancéolées, subulées, à la base de chaque fleur. Le calice est velu, ainsi que la corolle.

Cette plante croît dans les forêts, sur les montagnes, dans l'Arabie heureuse. **h**

11. **BARRELIÈRE à deux épines.** *Barleria bispinosa*. Vahl.

Barleria spinis axillaribus, biradiatis, floriferis; foliis ovatis, subius pilosis. Vahl, Symb. 1. pag. 46.

Justicia bispinosa. Forskhal, Egypt. pag. 6. — Lam. Dict. 1. pag. 633. n°. * CARMANTINE.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux pileux; ses feuilles médiocrement pétioolées, ovales, très-entières, mucronées, velues sur leurs

veines & à leurs bords. De l'aisselle des feuilles supérieures sortent des épines opposées, ordinairement à deux branches, quelquefois bifides, éralées, plus longues que les feuilles; les pédoncules courts, solitaires, uniflores, insérés dans la division des épines; le calice velu, de la longueur des épines; la corolle grande, violette, longue de deux pouces; le tube sensiblement agrandi.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. **h** (*Vahl.*)

12. **BARRELIÈRE acanthe.** *Barleria acanthoides*. Vahl.

Barleria spinis geminis, axillaribus, foliolatis; spicis axillaribus, secundis. Vahl, Symb. 1. pag. 47.

Ses tiges sont garnies de feuilles pétioolées, opposées, oblongues, très-entières, cuspidées, pileuses. De l'une des deux aisselles seulement sortent deux épines roides, lancéolées, foliacées, épineuses à leurs bords, rarement pileuses; une fois plus longues que les feuilles. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, unilatéraux.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. (*Vahl.*)

13. **BARRELIÈRE rude.** *Barleria frigosa*.

Barleria inermis, foliis oblongis, subius petiolatis, ramisque strigosis; bracteis ciliatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 379.

Elle diffère, selon Willdenow, du *barleria cristata* par ses feuilles longuement pétioolées, plus larges, très-rudes en dessous, le long de leurs nervures; par les épis terminaux; par les bractées plus élargies, point mucronées; par les cils plus fins, plus épais, plus courts que les bractées. Les rameaux sont glabres, parsemés, dans leur jeunesse, de poils couchés; les feuilles opposées, ramassées au sommet des rameaux, longues de trois pouces, acuminées, glabres en dessus; les bractées ovales, obtuses, veinées, réticulées, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît dans les Indes orientales. **h**

14. **BARRELIÈRE couchée.** *Barleria procumbens*. Lour.

Barleria inermis, foliis lanceolatis, crenatis, hispidis; capitulis terminalibus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 458.

Ses tiges sont nombreuses, ligneuses, tortueuses, couchées, dépourvues d'épines, hérissées, garnies de feuilles opposées, lancéolées, élargies, pileuses, crénelées à leurs bords. Les fleurs sont jaunes, ramassées en tête terminale, accompagnées de bractées ciliées, acuminées; les calices parragés en quatre découpures subulées & pileuses;

les capsules oblongues, anguleuses, à deux loges; les semences orbiculaires.

Cette plante croît aux environs de Canton, aux lieux incultes. (Description en Linn.).

Observations. M. de Lamarck a pensé que le *barleria nodiflora* & *cristata* n'étoient que deux variétés de la même espèce. M. Vahl les a séparées, & il l'a ajoutée comme variété de la première le *justicia lanceolata*, Forsk. Egypt. pag. 6, dont elle diffère par ses feuilles pileuses en dessous, principalement vers les bords.

Le *barleria longiflora*, n°. 7, est figuré dans les *Illustrations*, tab. 549, fig. 3. — Vahl, Symb. 1. pag. 46. tab. 16.

Barleria cristata, var. a. Lam. Ill. fig. 1, & var. b. Ill. fig. 2.

Cette dernière est une espèce bien distincte.

Le *barleria coccinea*, n°. 8, doit être rapporté aux *ruellia*, selon Vahl & Willdenow. (Voyez RUELLIE, n°. 34.)

Le *barleria pyramidata*, n°. 9, que M. de Lamarck a établi d'après Plumier, seroit-il la même plante que le *ruellia blechum* de Linné, auquel ce dernier auteur rapporte la même figure de Plumier avec celle de Sloane, tab. 109, fig. 1?

BARRINGTONIA. (Voyez BUTONIC.)

BARTALAI: nom provençal d'un chardon très-épineux (*cnicus serotus* Linn.).

BARTOLINA: nom donné par Adanson au tridax de Linné.

BARTONIA. (Voyez BARTONE.)

BARTONE fleurie. *Bartonia snella*. Willd. in Act. Soc. Nat. Cur. Berol. 4. vol. 3.

C'est une petite plante de l'Amérique septentrionale, très-délicate, qui a l'aspect du *buzonia tenuifolia*, & dont Willdenow a fait un genre particulier, auquel il donne pour caractère essentiel:

Un calice à quatre folioles; une corolle campanulée, persistante, à quatre découpures; quatre étamines; un seul style; une capsule à une seule loge, à deux valves, contenant plusieurs semences.

Cette plante a été recueillie à Philadelphie par Mühlenberg.

BATRAME. Genre de la famille des mousses. (Voyez CEPHALOXIS, Suppl.)

BATRAMIA. Gært. Parmi les espèces qui composent le genre *triumfetta* de Linné, il s'en trouve plusieurs dépourvues de calice, & qui sembloient devoir être séparées des autres. Gærtner,

en exécutant cette réforme, les a conservées dans le genre de Linné, & a établi pour les autres le genre *batramia*, auquel il assigne pour caractère essentiel:

Un calice à cinq folioles, munies d'une barbe un peu au dessous de leur sommet; cinq pétales; cinq glandes globuleuses à la base des pétales; quinze étamines; une capsule divisée en quatre coques à deux loges, sans valves; les semences solitaires, adhérentes aux parois des loges.

Il résulte, d'après Gærtner, que les espèces conservées parmi les *triumfetta* sont dépourvues de calice & de glandes à la base de la corolle. Les capsules sont très-entières, à quatre loges; les semences libres, & non adhérentes aux parois des capsules.

Les principales espèces à rapporter à ce genre, & déjà décrites parmi les *triumfetta* (voyez LAPFULIER), sont:

1. *BATRAMIA lappago*. Gært. de Fruct. & Sem. 2. pag. 137. tab. 111. fig. 5. — Lam. Illustr. tab. 400. fig. 2. (Voyez LAPFULIER, n°. 6.)

2. *BATRAMIA glandulosa*. Lam. Ill. tab. 400. fig. 1. (Voyez LAPFULIER, n°. 8.)

Les espèces de LAPFULIER, n°. 3, 4 & 5, semblent devoir également appartenir à ce nouveau genre. Il me paroît cependant que les *triumfetta* forment une suite d'espèces assez naturelles, il seroit préférable de les conserver dans leur intégrité, ayant d'ailleurs remarqué que le calice étoit caduc, & que quand même il n'existeroit point, ce caractère & quelques autres de médiocre importance sont insuffisants pour mutiler un genre peu nombreux en espèces, très-rapprochées entr'elles.

BARTSIA. (Voyez COCRÈTE, *rhinanthus* L.)

BARU ou DAUN-BARU. « Dans la langue malaise, dit M. du Petit-Thouars, on nomme ainsi le *hibiscus tiliaceus* Linn. Les habitants de Madagascar prononcent *baru* ou *varo*. Ce nom a passé à l'île-de-France, où il désigne le même arbrisseau, qui croît en abondance sur les bords de la mer, dans quelques ans qu'il décore magnifiquement. Son écorce est employée pour faire des cordes. On le nomme aussi *mahaut*. » (Voyez KETMIE.)

BARUCE. Clusius décrit sous ce nom le fruit du *hura* L. (Voyez SABLEIER.)

BARYOSMA TONGO. Gært. de Fruct. & Sem. 2. pag. 73, tab. 93. C'est la même plante que le *coumaruna* d'Aubl. (Voyez COUMAROU & TARALÉ.)

BARYXYLE rouffêstre. *Baryxylum rufum*. Lour. Flor. cochin. 2.

Genre de plantes de la famille des légumineuses, établi par Loureiro sur un grand arbre commun sur les montagnes de la Cochinchine. Son tronc se divise en rameaux garnis de feuilles ailées. Les fleurs sont jaunes, disposées en épis à l'extrémité des rameaux. Chaque fleur est pourvue d'un calice à cinq divisions réfléchies. La corolle est composée de cinq pétales un peu inégaux & chiffonnés; dix étamines de longueur inégale; un ovaire terminé par un style & un stigmate, qui se convertit en une gousse cylindrique, contenant plusieurs semences un peu anguleuses. h

On emploie le tronc pour la construction des ponts, & pour les colonnes qui doivent supporter de grands poids. Le bois est roux, & si dur, qu'on lui donne ordinairement, dans le pays, le nom de bois de fer. Ces qualités sont exprimées par le nom de cet arbre, *boryxylon*, signifiant en grec bois peigné.

BASAAI. Selon M. de Jussieu, l'espèce n°. 1 a une affinité marquée avec le genre *ordia* (rinièr), dont il n'est probablement qu'une espèce; & l'espèce n°. 2 semble, par son port & par son caractère, plus voisine des thymélées.

BASAR : nom sous lequel les Arabes désignent les bulbes ou racines des plantes bulbeuses, suivante Dalcamp.

BASELLA. (Voyez BASELLE, & Illustr. Gen. tab. 215. fig. 1. *B. jello rubra*.)

Le *basella vesicularis*, n°. 6, forme un genre particulier. Sous le nom d'*anredero*. (Voyez ANREDERE, Suppl.)

BASILÆA. (Voyez BASILE.)

BASILE. *Basilea*. Ce genre est le même que celui désigné par plusieurs auteurs modernes, sous le nom d'*eucomis*; il ne renfermoit d'abord qu'une seule espèce. Quelques autres y ont été ajoutées depuis.

1. **BASILE à épi couronné.** n°. 1. *Basilea coronata*. Lam. Ill. tab. 239. fig. 1.

Eucomis regia. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 93. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 433.

2. **BASILE ponctuée.** *Basilea punctata*.

Basilea (*eucomis* *punctata*), *scapo cylindrico; foliis oblongo-lanceolatis, constrictis, potentibus; coma foliis brevibus, racemis longissimis*. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 433. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 93. — L'herit. Sert. Angl. tab. 18. — Lam. Ill. tab. 239. fig. 2.

Asphodelus comosus. Houttuyn, Syst. pag. 391. t. 83.

Ornithogalum punctatum. Thunb. Prodr. 61.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles oblongues-lancéolées, étalées, canaliculées, aiguës, parsemées en dessous de points d'un pourpre-foncé; les tiges également ponctuées, glabres, cylindriques. Les fleurs forment un épi alongé, terminal, cylindrique, couronné par une touffe de feuilles courtes; les divisions de la corolle lancéolées, blanchâtres à leurs bords, d'un vert-foncé ou pourpre dans leur milieu; les filaments alternativement élargis; l'ovaire glabre, un peu globuleux.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. v (V. v.)

Observations. * *Eucomis* (*undulata*), *scapo cylindrico; foliis ovato-oblongis, undulatis, potentibus; coma foliis longioribus ferè racemis*. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 433.

Ornithogalum undulatum. Thunb. Prodr. 62.

Quoique je ne connoisse pas cette plante, & qu'il me soit difficile de prononcer, je serois transporté à ne la regarder, d'après son caractère, que comme une variété de la précédente, à feuilles ondulées; les épis surmontés de folioles plus longues. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. v

3. **BASILE naine.** *Basilea nana*. Ait.

Basilea (*eucomis* *nana*), *scapo clavato; foliis lato-lanceolatis, acutis*. Ait. Hort. Kew. 1. p. 432. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 47. tab. 91, & Collect. 4. pag. 213.

Fritillaria (*nana*), *racemo comoso; foliis bifariis, amplexicaulibus, lanceolatis*. Linn. Mant. 223. — Burm. Prodr. 9.

Ornithogalum nanum. Thunb. Prodr. 62.

Orchideae capensis, tulipa flore rosea. Petiv. Gazoph. tab. 85. fig. 6.

D'une bulbe ovale, de la grosseur du poing, s'élèvent plusieurs feuilles radicales, cunéiformes, oblongues, un peu obtuses, épaisses, cartilagineuses à leurs bords. Les hampes sont droites, un peu flexueuses, pleines, en forme de massue, couvertes vers leur sommet, de fleurs sessiles, disposées en épis; les bractées inférieures ovales, de la longueur des fleurs; les supérieures beaucoup plus longues, lancéolées, aiguës; les terminales ramassées en touffe, sans fleurs; la corolle verdâtre, à six découpures oblongues, orbues, un peu étalées à leur sommet; les filaments un peu recourbés, à peine plus courts que la corolle, élargis à leur base; les anthères oblongues, presque droites; l'ovaire arrondi, à trois lobes; le style droit, subulé; le stigmate simple.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Jacq.)

4. BASILIC à deux feuilles. *Basilica bifolia*.

Basilica (eucomis bifolia), *scapo clavato; foliis ellipticis, acutis, geminis, humi adpressis*. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 92. — Jacq. Icon. 2. tab. 449, & Collect. 4. pag. 215.

D'une bulbe arrondie, un peu comprimée, forment deux feuilles opposées, vaginales à leur base, glabres, ovales, lancéolées, aiguës, renversées, longues de sept pouces, légèrement ponctuées étant vues à la loupe. De leur ceurre s'élève une hampe droite, longue d'un demi-pied, renflée insensiblement en massue à sa partie supérieure, chargée de fleurs en épis, accompagnées de bractées ovales, acuminées, longues d'un pouce. La corolle est d'un blanc-verdâtre; les pétales oblongs, un peu aigus, trois alternes plus étroits; les filamens élargis & connivens à leur base, arqués vers le style; les anthers inclinées; l'ovaire libre, trigone; le style droit, subulé, plus court que les étamines.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

5. BASILIC. *Ocimum*.

22. BASILIC à feuilles entières. *Ocimum integerrimum*. Willd.

Ocimum foliis oblongis, acuminatis, integerrimis; bracteis ciliatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 162.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses; les rameaux étalés; les feuilles longuement pétiolées, oblongues, très-entières, quelquefois lancéolées, ponctuées en dessous, acuminées, rétrécies à leur base, longues d'un pouce & demi; les fleurs verticillées, disposées en grappes terminales, longues de trois à six pouces; les verticilles distans, composés de six fleurs; les bractées pétiolées, oblongues, aiguës, ciliées, à dentelures peu marquées. La lèvre supérieure du calice est trifide, la découpe du milieu obtuse, les latérales acuminées; la lèvre supérieure de la corolle à trois découpures; celle du milieu renversée; la lèvre inférieure lancéolée.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Willd.)

23. BASILIC recourbé. *Ocimum inflexum*. Thunb.

Ocimum paniculâ terminali, racemosâ; caule ramisque flexuosis. Thunb. Flor. jap. 249.

Ses tiges sont hautes d'un pied, rameuses, herbacées; les rameaux flexueux, redressés, courbés en dedans à leur sommet, légèrement romentueux; les feuilles opposées, longues de six lignes; les

fleurs disposées en grappes terminales, paniculées, resserrées.

Cette plante croît au Japon. (Thunb.)

24. BASILIC effilé. *Ocimum virgatum*. Thunb.

Ocimum racemis verticillatis, virgatis; foliis oblongis, serratis. Thunb. Flor. jap. pag. 250.

Cette espèce a des tiges profondément cannelées, rameuses, flexueuses, redressées, finement romentueuses; les rameaux effilés; les feuilles ovales-oblongues, pubescentes, dentées en scie, longues d'un pouce & plus; les grappes situées à l'extrémité des rameaux, redressées, longues d'environ trois pouces, composées de verticilles nombreux, à six fleurs.

Cette plante croît au Japon, aux environs de Nagasaki. (Thunb.)

25. BASILIC à feuilles ridées. *Ocimum rugosum*. Thunb.

Ocimum racemis terminalibus; foliis ovatis, serratis, subtus rugosis. Thunb. Flor. japon. pag. 249.

Ses tiges, hautes de deux pieds & plus, sont cannelées, légèrement romentueuses; les rameaux étalés; les feuilles ovales, acuminées, dentées en scie, plus pâles & ridées en dessous; les supérieures beaucoup plus petites; les grappes terminales & serrées.

Cette plante croît au Japon. (Thunb.)

26. BASILIC à feuilles rudes. *Ocimum scabrum*. Thunb.

Ocimum racemis simplicibus, erectis; foliis ovatis, subtus punctatis. Thunb. A&C. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 338.

Ocimum punctatum. Thunb. Flor. jap. 249.

Elle a des tiges droites, hautes d'un pied & plus, divisées en rameaux paniculés, couverts, ainsi que toute la plante, de poils rudes; les feuilles oblongues, ovales, aiguës, dentées en scie, finement ponctuées à leur face inférieure. Les grappes sont simples, terminales, longues d'environ trois à quatre pouces; les fleurs opposées; les bractées sétacées.

Cette plante croît au Japon. (Thunb.)

27. BASILIC crépu. *Ocimum crispum*. Thunb.

Ocimum racemis terminalibus; foliis ovatis, serratis, crispis; calicibus hispidis. Thunb. Flor. jap. pag. 248.

Siso. Kœmpf. Amoen. 784.

Ses tiges sont velues, droites, rameuses; les

rameaux en croix; les feuilles pétioles, ovales, acuminées, dentées en scie; les inférieures tres-entières, glabres, de couleur purpurine, crépues, longues d'un pouce; les pétioles lâches, velus, de la longueur des feuilles; les grappes lâches, terminales, longues de quatre à six pouces; les bractées courtes, glabres, oblongues, acuminées; les calices hispides.

• Cette plante croît au Japon. (Thunb.)

28. BASILIC aigu. *Ocymum acutum*. Thunb.

Cette plante a des tiges droites, lisses, glabres, garnies de feuilles pétioles, ovales-acuminées, dentées en scie; les inférieures entières, glabres, plus pâles & veinées en dessous, longues de trois pouces, larges de deux; les pétioles un peu plus courts que les feuilles, hérissés en dessous. Les grappes sont filiformes, longues de trois pouces & plus, munies de bractées ovales, hispides, aiguës.

• Cette plante croît au Japon. (Thunb.)

29. BASILIC à feuilles de serpolet. *Ocymum serpyllifolium*. Forsk.

Ocymum foliis lineari-lanceolatis, integerrimis; geniculatis longissimis. Vahl, *Symb.* 1. pag. 43. — Forsk. *Flor. aegypt.-arab.* pag. 110.

Arbrisseau chargé de rameaux nombreux, diffus, blanchâtres, garnis de feuilles lancéolées, petites, linéaires, blanchâtres, légèrement velues, rétrécies en pétiole à leur base. Les jeunes rameaux offrent, avant leur développement, des faisceaux de feuilles axillaires. Les grappes sont droites, terminales; les pédicelles courts, calleux à leur base; les bractées ovales, fort petites, caduques, aiguës; les fleurs rabattues; les calices un peu velus; les deux dents inférieures sétacées, les supérieures ovales; la corolle une fois plus longue que le calice; les filaments velus à leur base, trois fois plus longs que la corolle.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse, sur le mont Chadra. h (Vahl & Forsk.)

30. BASILIC à feuilles molles. *Ocymum molle*. Aiton.

Ocymum foliis ovatis, cordatis, acutis, serratis, rugosis, sinibus elatis; bracteis subrotundo cuneiformibus. Ait. *Hort. Kew.* 2. pag. 322.

Toute cette plante est pubescente, d'une odeur suave; ses tiges épaisses; ses feuilles larges, ovales, aiguës, molles, ridées, profondément échancrées en cœur; les lobes rapprochés; les dents inégales, obtuses; les pétioles presque aussi longs que les feuilles. La corolle est d'un blanc-violet; le tube de la longueur du calice; la lèvre

supérieure orbiculaire, en voûte; l'inférieure à quatre lobes; les filaments simples.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O (Aiton.)

31. BASILIC ascendant. *Ocymum ascendens*. Willd.

Ocymum foliis ovatis, subdentatis; verticillis paucifloris; calicibus pubescentibus. Willden. *Spec. Plant.* 3. pag. 166.

Les tiges sont érigées & rameuses à leur base, ascendantes, hautes d'un demi-pied; les feuilles longuement pétioles, ovales-oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, légèrement dentées, glabres en dessus, un peu rudes en dessous, longues de six lignes. Les grappes sont terminales, à quatre verticilles composés de quatre fleurs; le calice pubescent, à deux lobes; la lèvre supérieure oblongue, obtuse; l'inférieure denticulée vers son sommet, munie de deux arêtes; les bractées oblongues, pubescentes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ♀ (Willd.)

Observations. M. Vahl range parmi les *plethranthus* (*germanus* Lam.) l'*ocymum hadense*, n°. 20, & l'*ocymum Zatarhendi*, n°. 21. Ce sont deux espèces de Forskhal. On y réunit aussi l'*ocymum punctatum*, n°. 8. L'*ocymum hufisicum*, n°. 1, est figuré dans les *Illustrations*, tab. 114. L'*ocymum cochlearatum* Hort. Paris. a bien des rapports avec l'*ocymum bulbatum* Lam. n°. 3, & l'*ocymum zeylanicum* Medic. une variété de l'*ocymum gratissimum*, n°. 15.

32. BASILIC à tiges rondes. *Ocymum teretiusculum*.

Ocymum pubescens, foliis lineari lanceolatis, laxè serratis; floribus minimis, axillaribus, oppositis; caule tereti, striato. (N.)

Cette espèce est remarquable par ses tiges presque cylindriques, striées, grêles, roides, pileuses, pubescentes, rameuses à leur partie supérieure, hautes de huit à dix pouces & plus, garnies de feuilles médiocrement pétioles, étroites, linéaires-lancéolées, longues d'un pouce & plus, presque obtuses, aiguës à leur base, glabres en dessus, légèrement pileuses en dessous, lâchement dentées en scie à leurs bords. Les fleurs sont pédicellées, petites, opposées deux à deux ou solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures; les calices hérissés de poils cendrés.

Le lieu natal de cette plante ne m'est point connu. (V. f. in herb. Desfont.)

33. BASILIC à gros épis. *Ocymum macrostachyum*.

Ocymum

Ocymum caule suffruticoso ; foliis ovato-sublanco-latis , obtusis , subsdentatis , subglabris ; spicâ densâ , terminali. (N.)

Ses tiges sont dures, glabres, presque ligneuses, très-rameuses; les rameaux pileux; les feuilles à peine pétioolées, petites, courtes, ovales ou ovales-oblongues, un peu charnues, vertes, presque glabres à leurs deux faces, obtuses, à peine dentées. Les rameaux sont terminés par un épi nu, long d'un pouce & plus, cylindrique, obtus, composé de fleurs très-ferrées, dont les calices sont hérissés de poils très-courts.

Cette plante croît à Pondichery, où elle a été recueillie par Commerçon. *H. ? (V. f. in herb. Desfont.)*

* *Ocymum (madagascariense)*, pubescens, foliis cordato-ovatis, crenatis; bracteis subrotundis, integerrimis, subius villosis. Herb. Juss. — Pers. Synopf. Plant. 2. pag. 135. — Commerf. Madagaf.

* *Ocymum (panicularum)*, foliis ovatis, acuminateis, crenatis, subius pubescentibus; floribus subpaniculatis, pedicellis ramosis. Herb. Juss. — Pers. Synopf. Plant. 2. pag. 135. — Commerf. Madagaf.

BASILIC sauvage. Les Créoles de la Guiane nomment ainsi le *maturu* des prés, décrit & figuré par Aublet, tab. 259.

BASNAGILLI. La bryone laciniée (*bryonia laciniata* Linn.) est ainsi nommée à Ceilan.

BASSAL ou **BASSIL**: noms arabes de l'oignon, suivant Hornmann.

BASSIA. (Voyez **ILLIPE**.)

BASSINET: On donne particulièrement ce nom à la renoncule bulbeuse.

BASSOVIA. (Voyez **BASSOVE** des forêts, & **ILLIPE**. Gen. tab. 102.) Richard la regarde comme une espèce de morelle, *solanum* Linn.

BASTERIA, Houttuyn. (Voyez **ROHRIA**, **Suppl.**) C'est la même plante que le *bastera* d'Adanson.

BATAN. Le voyageur Linscot désigne sous ce nom un arbre de l'Inde, dont la fleur se nomme *bana*, & le fruit hérissé, de la grosseur d'un melon, *daryan*. Il est probable qu'il a voulu parler du *DURTON*. On est moins porté à croire qu'il ait voulu parler du jquier.

BATARREA ou **BATTAREA**. (Voy. **VESSELOUP** & **BATARREE**.)

BATATE, **PATATE**, **BATATAS**. On donne *Botanique. Supplément. Tome I.*

ces noms à plusieurs racines tubéreuses, bonnes à manger, & plus particulièrement à une espèce de lieron (*convolvulus batatas* Linn.). Les racines de ropinambours & de pommes de terre sont ainsi nommées dans quelques lieux.

BATELÉ: nom caraïbe d'une espèce d'eupatoire, suivant Nicholson.

BATHEC, **BATIEC**, **BATI**. Les Arabes & les habitants de l'Inde désignent le melon d'eau sous ces divers noms, lesquels dérive probablement celui de *passique*, sous lequel il est plus connu.

BATAELIUM, espèce de *lichen* Linn. Genre établi par Achard, dont le caractère est d'avoir une fructification sessile, presque globuleuse, couverte de papilles en forme d'opercules, s'ouvrant, vide en dedans. La base est uniforme, crustacée. Ce genre ne contient qu'une espèce originaire de Sierra-Leona en Afrique, décrite par Atnelius, & figurée dans Achard, Meth. Lich. tab. 8, fig. 3.

BATHENDA, bois dont les insulaires de Ceilan font des cuillers pour manger le riz. Linné soupçonne que c'est une espèce de *Kermia* (*hibiscus*).

BATIS maritime. Ill. Gen. tab. 806.

BATO ou **BATU**. Ce mot signifie *pierr*e dans la langue malaïse. Il entre dans la composition de plusieurs noms de plantes. Il en est de même chez les habitants de Madagascar, qui le prononcent *vato*. *Vato lela*: ce sont les graines du *gaulandina bonducella* Linn., dont ils se servent pour jouer à un jeu fort ingénieux, qui est le *sfanga* décrit par Flacoust. A. P.

BATRACHION. Ce mot grec signifie en latin *rannunculus*, & en français *petite grenouille*. Dans quelques auteurs anciens il désigne quelques espèces de renoncules, & particulièrement la renoncule bulbeuse, appelée aussi vulgairement *grenouillette*.

BATRACHOSPERME. *Batrachospermum*. Genre de plantes de la famille des algues. Ce genre a été établi par Vaucher sur plusieurs espèces de conferves d'eau douce. Il comprend celles qui sont gélatineuses, qui présentent à la main une surface douce, onctueuse, & qui, lorsqu'on les saisit sans précautions, s'échappent comme le frai des poissons & des grenouilles. C'est d'après cette particularité que Roth a donné le premier le nom de *batrachosperme* à ces sortes de plantes.

Vaucher a observé que chaque ramification est terminée par un fillet transparent & d'une extrême

FFF

néfle, par où il suppose que peut sortir la matière gluante & gélatineuse dont elles sont couvertes. Cet observateur n'a pas distinctement reconnu dans ces plantes deux organes sexuels ; mais il résulte de ses recherches & de ses expériences, que les espèces de ce genre se multiplient par les anneaux qui, lors de la maturité, se rompent & se séparent, & produisent de nouvelles plantes ; mais Vau her a remarqué que ces articulations ou anneaux n'avoient pas tous la même forme, & par conséquent qu'ils ne sont pas tous destinés aux mêmes fonctions. Il suppose que ceux qu'il n'a pas vu se reproduire, sont stériles, ou peut-être renferment la poussière fécondante. Ces derniers, plus petits, lui ont semblé des organes fécondants, dont la poussière sort par les cils ou filets transparents qui terminent chaque ramification.

La première observation est très-bonne, conforme à la marche graduée de la nature dans l'organisation des êtres vivans. Il s'alloit s'en tenir là ; mais vouloir découvrir des parties sexuelles dans ces végétaux qui ne sont point ainsi dire que les premiers linéaments de la végétation, c'est, comme l'observe très-bien M. de Lamarck, vouloir absolument y trouver ce qui n'y peut exister ; c'est comme si l'on recherchoit dans les polypes les organes des deux sexes.

Les batrachospermes sont faciles à distinguer par leur surface onctueuse. Leur tige est articulée ; les rameaux souvent disposés en verticilles ramifiés. On observe, entre ces ramifications, des corpuscules hérissés, qui sont les rudimens de nouvelles plantes, & qui se séparent d'eux-mêmes de la plante-mère.

ES P È C E S.

1. BATRACHOSPERME pelotonné. *Batrachospermum intricatum*. Vauch.

Batrachospermum subglobosum, filis implexis, ramosis. Vauch. Conferv. pag. 117. tab. 12. fig. 2. 3. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 158.

Conferva pollinea, globosa, gelatinosa. Haller, Helv. n°. 2110.

Elle se présente à l'œil sous la forme de mamelons d'un beau vert, arrondis, gélatineux, variables dans leur forme & leur grandeur. Ils adhèrent à des corps fixes, & se rencontrent à la source des petites fontaines. Vus au microscope, ces mamelons sont composés de filaments cloisonnés, rameux vers leur sommet, engagés dans une matière glauque ; chaque ramification terminée par un cil transparent.

2. BATRACHOSPERME en faisceau. *Batrachospermum fasciculatum*. Vauch.

Batrachospermum filis approximatis, simplicibus,

summate ramosis. Vauch. Conferv. pag. 116. tab. 13. fig. 1. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 158.

Rivularia confervoides. Roth, Catal. 1. p. 213. tab. 6. fig. 3 & 2. pag. 249.

Ce sont des mamelons fasciculés, verts, gélatineux, longs de quelques lignes, à lobes irréguliers. Ils présentent, au microscope, un grand nombre de filaments parallèles, allongés, divisés, à leur sommet, en plusieurs ramifications terminées par des cils transparents. Elle s'attache aux pierres dans les eaux à demi courantes.

3. BATRACHOSPERME en plume. *Batrachospermum plumosum*. Vauch.

Batrachospermum truncis elongatis, ramulis cauli approximatis. Vauch. Conferv. pag. 113. tab. 11. fig. 2. 4.

Elle est étalée en petites touffes d'un beau vert, longues de deux à trois pouces. Les rameaux sont cylindriques, cloisonnés, branchus, allongés, rapprochés du tronc principal ; les ramifications alternes ou opposées, terminées par un cil transparent. Elle adhère par sa base au fond de l'eau, & se trouve dans les eaux claires & les fontaines.

4. BATRACHOSPERME en houppe. *Batrachospermum glomeratum*. Vauch.

Batrachospermum ramosum, ramulis brevibus, fasciculatis, divergentibus. Vauch. Conferv. pag. 114. tab. 12. fig. 1. 4. — Journ. Phys. an. 9. pag. 12. tab. 3. fig. 7.

Conferva gelatinosa. Chant. Conferv. pag. 33. tab. 3. fig. 9.

Batrachospermum simplex. Decand. Bull. Phil. n°. 31. pag. 21.

Conferva mutabilis. Dilw. Brit. conf. tab. 12.

Son tronc principal est transparent, composé d'articulations cloisonnées, d'un beau vert. Il part de chaque cloison, des filaments simples ou rameux, solitaires ou le plus souvent en houppes, articulés, d'un vert-foncé, terminés par un cil transparent. On la trouve en hiver ou au printemps dans les eaux courantes. Elle adhère aux pierres par sa base. Elle n'offre, quand elle est jeune, qu'une masse gélatineuse.

5. BATRACHOSPERME à collier. *Batrachospermum moniliforme*. Vauch.

Batrachospermum ramosum, ramulis verticillato-fasciculatis. Vauch. Conferv. pag. 112. tab. 11. fig. 1. 3.

Batrachospermum nigricans. Decand. Bull. Phil. n°. 31. pag. 21.

Chara gelatinosa, purpurascens. Roth, Catal. 1. pag. 127.

Conserva gelatinosa. Linn. (Voyez CONFERVE, n°. 13.)

6. BATRACHOSPERME hétiéfié. *Batrachospermum hifpidum.* Thore.

*Batrachospermum ramofum, ramis magnitudine truncum aequantibus; ramulis piliformibus, undique ob-
natis.* Thore, Magaf. Encycl. an 5. p. 398. tab. 5.
— Decand. Flor. franç. 2. pag. 60.

« Cette plante, dit M. Decandolle, est d'un châtain-foncé, tirant sur le noir. Elle devient d'un beau violet par la dessiccation; elle adhère aux tochers par un petit empatement, duquel part une seule tige qui se ramifie subitement en une infinité de rameaux branchus, à tous de la même épaisseur que le tronc, & qui ont tous à quatre pouces de longueur. La plante est garnie d'un bout à l'autre d'un duvet fin, très-visible à l'œil nu; ce qui donne à chaque branche l'apparence d'une queue de chat, dont les poils seroient très-distincts. Elle a été découverte dans l'Adour, près Dax, par M. Thore, puis dans la Seine par M. Lémán. »

Dans un Mémoire publié dans les *Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris*, vol. 12, pag. 310, M. Bory-Saint-Vincent ajoute à ces espèces, qu'il ne reconnoît pas toutes pour des *batrachospermum*, quelques autres espèces nouvelles, & des variétés très-remarquables, nommées ainsi qu'il suit :

7. BATRACHOSPERME du bambou. *Batrachospermum bambusinum.* Bor.

Batrachospermum filamentis ramosis, articulis elongatis; verticillis minutissimis, distantibus, conoideis. Bor. Ann. Mus. Parif. 12. p. 315. tab. 29. fig. 1.

Le filament principal se divise en ramifications grêles, allongées; les rameaux simples épars, très-petits; les articulations ordinairement nues; leur point de contact renflé comme les entre-nœuds des bambous; les verticilles arrondis, très-petits, distans, en forme de cône, composés de petits rameaux très-ferrés.

Cette plante croît à l'Île-de-France, dans les grands ruisseaux, sur les galets.

8. BATRACHOSPERME de Vaillant. *Batrachospermum helmetosum.* Bor.

Batrachospermum filamentis ramosis, pyramidalis, inferni nudis; ramis simplicibus, subinnatis, acutiusculis; verticillis compressis, contiguis. Bory, Ann. Mus. Parif. 12. pag. 316. tab. 29. fig. 2.

Corallina pinguis, ramosa, viridis. Vaill. Parif. 40. tab. 6. fig. 6. *Medioetria.*

Ses tiges n'excèdent guère deux pouces de longueur. Elles sont fines, nues à leur base; les rameaux nombreux, tubulés; les verticilles comprimés, volumineux, tellement rapprochés, qu'ils se confondent, & forment, autour des jets, un cylindrique continu de mucosité. La couleur de la plante est obscure, d'un bleu-verdâtre. Elle croît dans les bassins des fontaines.

9. BATRACHOSPERME kératophyte. *Batrachospermum keratophyta.* Bor.

Batrachospermum stirpe corned, nigro-fusca, nudis; articulis crassiusculis, ramis verticilliferis, verticillis oblongis. Bory, Ann. Mus. Par. 12. pag. 318. tab. 31. fig. 2.

Cette espèce élégance a des tiges longues de trois pouces & plus, très-fines, capillaires, renflées à leurs articulations; les rameaux chargés de petits verticilles globuleux, un peu allongés, gelatineux, d'un beau vert tirant sur le bleu-indigo. Elle croît dans les landes de Bordeaux, dans les fontaines.

10. BATRACHOSPERME trille. *Batrachospermum trible.* Bor.

Batrachospermum filamentis setaceis, elongatis; ramis brevioribus; verticillis sparsis, completis incompletisve. Bor. Ann. Mus. Parif. 12. pag. 329.

α. *Batrachosperma (tristis chlora), laete-virescens, pallida, filamentis longioribus, tenuissimis.* Bor. l. c. tab. 31. fig. 3.

β. *Batrachosperma (tristis colorata), violaceo-virescens, filamentis brevibus, crassiusculis.* Bor. l. c. tab. 31. fig. 4.

Ses tiges fines produisent des rameaux grêles & courts, chargés de verticilles innégaux, assez distans. Les filamens, dans la variété α, sont plus longs & très-grêles. La plante est d'un jaune-verdâtre; dans la variété β elle est d'un violet-verdâtre. Les filamens sont courts, très-épais.

Cette plante croît dans les eaux froides & courantes, dans le département des Landes.

Observations. Le *conserva gelatinosa* Linn., dont on a fait un *batrachospermum*, n°. 5, offroit dans sa synonymie une grande confusion, selon M. Bory; il en a présentée sept variétés. Il donne à cette espèce le nom de *batrachosperma ludibunda*. Les variétés sont :

α. *Batrachosperma (confusa) nigro-fusca, verticillis contiguis, subconfusis, superne & inferne compressis.* Bor. l. c. pag. 320. tab. 29. fig. 3.

β. *Batrachosperma (equivalens) fusca, verticillis approximatis, globosis, distinctis.* Bor. l. c. tab. 29. 4.

FFFF 2

7. *Batrachosperma* (moniliformis), *atro-fusca*, *verticillis caulinaris*, *distinctis*, *sphaericis*, in ramulis confusis compressis. Bor. l. c. tab. 30. fig. 1.

8. *Batrachosperma* (pulcherrima), *griseo-violacea*, *verticillis sphaericis*, *distinctis*, in caulibus & ramulis distinctis. Bor. l. c. tab. 30. fig. 2.

9. *Batrachosperma* (caeruleum), *ramis elongatis*, *gracilibus*; *verticillis elegantissimè sphaericis*. Bory. l. c. tab. 30. fig. 3. — Dillen. tab. 7. fig. 45.?

10. *Batrachosperma* (viridis), *caeruleo-viridescens*, *filamentis ramuliformis*, *verticillis approximatis*. Bor. l. c. tab. 30. fig. 4.

11. *Batrachosperma* (flagnalis), *luteo viridescens*, *filamentis crassis*, *ramosis*; *verticillis distinctis*, compressis. Bory. l. c. tab. 30. fig. 5. — Dillen. tab. 8. fig. 44, & tab. 7. fig. 44.

Chara batrachosperma. Weiff. Plant. cryptog. Icon.

* *Especies moins connues.*

* *Batrachospermum* (myurus), *truncato elongato*, *simplici*, *ramulis piliformibus obtusis*. Dec. synopl. pag. 12. — Duch. Essai, pag. 76. In aquis montium.

* *Batrachospermum* (hamatites), *subglobosum*, *atro-viride*, *convexa carasco*, *intus zonata*. Decand. Synopl. pag. 11.

Conserva hamatites. Ramond, Insd. Ad rupes madidas graniticas Pyrenæorum.

* *Batrachospermum* (hemisphaericum), *subglobosum*, *lentis magnitudine*, *atro-viride*, *convexa carasco*, *densa*. Decand. Synopl. pag. 11. In lapidibus Oceanii.

BATSCHIA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des boraginées, qui a de grands rapports avec les *lithospermum* (grémil), & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles entières, alternes, les fleurs axillaires, solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures profondes; une corolle en soucoupe; le tube environné, à sa base interne, d'un anneau barbu; l'orifice nu; les semences dures, luisantes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé profondément en cinq découpures droites, linéaires, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, régulière, en sou-

coupe; le tube droit, plus long que le calice; environné, à sa base interne, d'un anneau barbu; l'orifice nu; le limbe divisé en cinq lobes arrondis.

3°. Cinq *stamens* renfermés dans le tube; les filaments presque nuls; les anthères ovales, redressées.

4°. Un ovaire libre, arrondi, à quatre lobes, surmonté d'un style capillaire, de la longueur des étamines; le stigmate fort petit, échancré, à deux lobes.

Le fruit consiste en quatre semences vues au fond du calice, dures, luisantes, semblables à celles des grémils.

Observations. Ce genre n'est que médiocrement distingué des grémils, & auroit pu y être réuni; il n'en diffère essentiellement que par l'anneau barbu placé à la base intérieure du tube de la corolle, caractère trop faible pour servir de base à un genre particulier. (Voyez les observations à la fin de ce genre.)

E S P È C E S.

1. BATSCHIA de Gmelin. *Batschia Gmelini*. Mich.

Batschia caule, foliis cuneatisque hirsutis; foliis caulibus oblongis, floralibus ovatis; calicibus longis, subnervolatis. Michx. Flor. boreal. Amer. t. pag. 130.

Batschia carolinensis. Walth. Flor. carol. pag. 91. — Gmel. Syst. Nat. t. pag. 315.

Cette plante a des tiges droites, hérissées de pili rués, garnies de feuilles alternes, sessiles, très-entières, rudes & velues à leurs deux faces; celles des tiges oblongues; les florales ovales, plus courtes. Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées vers le haut des tiges. Les calices sont rudes, hérissés, oblongs; les découpures lancéolées; la corolle assez grande; son limbe presque plane, à cinq lobes arrondis.

Cette plante croît dans les forêts, à la Bassi-Caroline.

2. BATSCHIA blanchâtre. *Batschia canescens*. Mich.

Batschia caule, foliis ovaliterisque summississimè moliter candicanti-villosissimis; foliis omnibus oblongis, calicibus brevissimis. Michx. Flor. boreal. Amer. t. pag. 130. tab. 14.

Ses tiges sont droites, cylindriques, blanchâtres, un peu velues, garnies de feuilles alternes, sessiles, linéaires, oblongues, très-entières, obtuses à leurs deux extrémités, toutes de même forme, couvertes de poils mous & blanchâtres,

très-nombreux; les feuilles florales plus courtes, plus velues; les fleurs axillaires, presque filiformes, surtout les inférieures; le calice une fois plus court que la corolle; à cinq divisions profondes, hispides, étroites, très-aiguës; la corolle à cinq lobes anodins.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les collines & dans les forêts de Tennessee.

Observations. Michaux pense que le *Strophocarpum orientale* de Liné doit être rapporté à ce genre, ou plutôt ne former qu'un seul genre des deux, le *Strophocarpum* n'ayant point de caractères suffisants pour être séparés des premiers. Ce nom de *Strophocarpum* a encore été employé pour d'autres genres.

1°. Thunberg l'a appliqué à des plantes que Muris lui avoit envoyées des environs de Santa-Fé; il en a donné le caractère & la figure dans le cinquième volume des *Nouveaux Actes d'Upsal*, pag. 120, tab. 1. Ce genre, qui est dioïque, a un petit calice à trois feuilles, & une corolle à trois pétales coriaces, velus, rapprochés dans leur milieu & réfléchis en dehors vers la pointe. Les fleurs mâles ont six étamines, portées sur un disque central, dont trois stériles sont insérées à la circonférence, & alternent avec les pétales. Les trois autres, fertiles, partant du centre, ont leurs filaments réunis en un pivot anguleux, qui est couronné par les trois anthères. Les fleurs femelles ont six filaments stériles, insérés également sur un disque, & marqués de deux taches sur leur extrémité élargie. Leur pistil est composé de trois ovaires libres, surmontés chacun d'un style latéral, intérieur, & d'un ligament échancré; ils deviennent autant de drupes coriaces, allongés, velus, remplis d'un seul noyau osseux, à moitié biloculaire. La graine, placée en deux, remplit ainsi les deux demi-loges, séparées par une demi-cloison. L'embryon, renfermé dans un périsperme, a une racine intérieure, & des lobes également repliés. Ces plantes paroissent hémisphériques, & sont giganantes; elles ont des feuilles alternes, simples, marquées de trois nervures à leur base. Les fleurs sont petites, placées aux aisselles des feuilles, disposées en grappes lâches dans une espèce, & en épi serré dans l'autre.

« En examinant avec attention ce caractère, dit M. de Justieu, on reconnoît sur-le-champ que ce genre appartient à la famille des minipermes, & de plus il est probable que c'est le même que l'*abura* d'Aublet, dont cet auteur n'a pas assez détaillé le caractère. » (Voyez MINIPERME, n°. 19.)

2°. Vahl, dans le troisième volume de son *Symbol.* bot. pag. 39, tab. 36, avoit aussi donné le nom de *Strophocarpum* à une plante légumineuse de

l'île de Ceilan; mais ayant eu, avant la publication de son travail, communication du genre de Thunberg, il a substitué à ce nom, dans un errata, celui de *humboldtia*, sous lequel il désigne la plante de Ceilan d'où il résulte que le nom de *Strophocarpum* a été donné à trois plantes différentes. (Voyez HUMBOLDTIA, Suppl.)

BATTA : nom caraïbe du nopal (*cactus opuntia* L.).

BATTARÉE, BATTAREA ou BATARREA. (Voyez VESSE-LOUP.) Genre de plantes de la famille des champignons, dont il a déjà été fait mention à l'article VESSE-LOUP. Son caractère est d'avoir une double valve, d'où sort un support terminé par un chapeau campanule, velu, contenant une poussière adhérente à des filaments. Le chapeau est recouvert d'une pellicule déchirée, qui paroît être une portion d'une des valves. Il ne comprend qu'une seule espèce.

BATTI-SCHORIGENAM. Rheed, dans son *Horius malab.* 2, pag. 75, tab. 40, désigne sous ce nom malabare une espèce d'ortie (*urtica intercrusta* L.) qui a quelques supports extérieurs avec le *Schorigenam* du même lieu, espèce de *tragia*.

BAUDRIER. On donne ce nom, sur les côtes de la mer, aux espèces de *Fucus* ou *varre*, tels que le *Fucus saccharinus* L., dont le feuillage, simple, large, membraneux & très-long, présente à peu près la forme d'un baudrier.

BAVERA à feuilles de garance. *Bavera rubroides* Andr.

Bavera foliis verticillatis, subsessilibus, ovato-lanceolatis; floribus subsolitariis, axillaribus. (N.) Andr. Botan. Repos. pag. & tab. 198. — Vent. Malm. pag. & tab. 96.

Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande, d'un aspect très-agréable, la seule espèce de ce genre, à fleurs complètes, polypétales, régulières, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à huit discoïques; autant de pétales insérés sur un disque qui entoure l'ovaire; des étamines nombreuses; l'ovaire libre; deux styles; une capsule à deux loges, s'ouvrant à son sommet en deux valves bifides.

Ses riges, hautes d'environ trois pieds, se divisent en rameaux opposés, velus, articulés à leur base, garnis de feuilles verticillées, au nombre de six, insérées trois à trois sur un tubercule peu apparent; ovales, lancéolées, très-ouvertes, recouvertes à leur sommet, aiguës, presque filiformes, glabres en dessus, légèrement pileuses en dessous,

dentées à leur moitié supérieure. Les fleurs sont de couleur de rose, pédonculaires, axillaires, parfois solitaires, les pédoncules filiformes, pubescents, plus longs que les feuilles.

Le calice est persistant, profondément divisé en six ou huit découppures lancéolées, aiguës, dentées, velues en dessous ; les pétales alternes avec les divisions du calice, ovales, réfléchies, traversées par une ligne blanche, très-caducs ; les étamines insérées sur le disque qui entoure l'ovaire, plus courtes que la corolle et les anthères vacillantes, ovales, arrondies, à quatre filons, s'ouvrant latéralement ; l'ovaire libre, globuleux, très-velu ; les styles plus longs que les étamines ; les stigmates obtus : il leur succède une capsule globuleuse, coriace, velue, recouverte par le calice ; les semences nombreuses, fort petites, brunes, ovales, chagrinées, attachées à un placenta de moitié plus court que la capsule, dilaté & membraneux sur ses bords, correspondants à ceux des divisions de chaque valve, & formant la cloison ; le périsperme charnu.

Cette plante croît aux environs du port Jackson. *B.*

Ce genre a été dédié par M. Banks à MM. Hofbavet frères, nés en Allemagne, peintres célèbres en histoire naturelle.

BAUHINE. *Bauhinia*. Trois espèces de *bauhinia* sont figurées dans les *Illustrations des Genres*, tab. 329 ; savoir : fig. 1, *Bauhinia acuminata*, n°. 10. — Fig. 2, *Bauhinia rufescens*, n°. 12. — Fig. 3, *Bauhinia divaricata*, n°. 5. Plusieurs belles espèces doivent être ajoutées à ce genre, telles que :

13. **BAUHINE** à petites fleurs. *Bauhinia parviflora*. Vahl.

Bauhinia racemis axillaribus terminalibusque, natis ; petalis linearibus ; lobis foliorum rotundatis, glabris. Vahl, *Symb.* 3. pag. 55.

Cette plante, très-approchée du *bauhinia scandens*, en diffère en ce qu'elle est dépourvue de vrilles. Ses tiges sont garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, beaucoup plus petites que dans le *bauhinia scandens* ; les deux lobes arrondis, très-obtus, point acuminés, glabres à leurs deux faces ; les fleurs situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, disposées en grappes pendantes ; la corolle composée de pétales linéaires.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *B.*

14. **BAUHINE** allongée. *Bauhinia porcella*. Ait.

Bauhinia foliis cordatis ; lobis porcellis, acutis, trinerviis ; petalis lanceolatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 48. — Swartz, Prodr. pag. 68.

Bauhinia floribus philadelphis, subdecandris ; foliis

cordatis ; lobis semiovatis, acutis, subquadrinerviis ; petalis lanceolatis. Jacq. Hort. Schoenb. 1. p. 52. tab. 100.

Bauhinia non aculeata, folio ampliori & bicorni. Plum. Gen. 23, & Icon. 44. fig. 2.

Bauhinia foliis bilobis ; spicis laxis, terminalibus. BROWN, Jam. 286.

Senna spuria, aut apsalacho affinis arbor foliis ovatis, foliis binis. Sloan, Jam. 150. Hist. 1. pag. 51.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, cendrés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, échancrées en cœur à leur base ; les deux lobes prolongés, à demi ovales, lancéolés, presque aigus, traversés par trois à quatre nervures longitudinales ; glabres, entiers à leurs bords ; les fleurs disposées en épis lâches à l'extrémité des rameaux ; les pétales lancéolés ; les fruits glabres, comprimés, lancéolés, à deux valves, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît à Saint-Domingue. *B. (P. f.)*

15. **BAUHINE** pied de chèvre. *Bauhinia pes-caprae*. Cavan.

Bauhinia caule arboroso ; foliis cordatis, glabris ; lobis apice divergentibus, floribus racemosis. Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 3. tab. 404.

Tige haute d'environ douze pieds, rameuse, garnie de feuilles glabres, un peu roides, en cœur, glauques en dessous, à deux lobes profonds, divergens, trois nervures à chaque lobe ; une petite pointe roide entre les deux lobes ; des stipules très-petites. Les fleurs sont disposées en grappes alternes, terminées ; les pédicelles épars, sortant d'une bractée subulée. Le calice est oblong, à cinq pointes, s'ouvrant latéralement en forme de spathe réfléchie ; cinq pétales ovales, ondulés à leur limbe, glabres, d'un rouge-pale en dedans, tomenteux & blanchâtres en dehors ; les étamines diadelphes ; les gouffes allongées, comprimées, à deux valves ; les semences ovales, comprimées.

Cette plante croît dans les environs d'Acapulco. *B. (Cavan.)*

16. **BAUHINE** à larges feuilles. *Bauhinia latifolia*. Cavan.

Bauhinia caule fruticoso ; foliis cordatis, rotundato bilobis ; floribus racemosis, glabris. Cavan. Ic. Rat. 5. pag. 4. tab. 405.

Remarquable par ses larges feuilles en cœur, arrondies, traversées par neuf nervures, à deux lobes courts, aigus, divergens, cette plante l'est encore par ses fleurs glabres, en grappes terminales & axillaires ; les pédicelles nombreux, accompagnés à leur base d'une bractée lancéolée ; les

pétales blancs, glabres & veinés; le reste comme dans l'espèce précédente.

Cette plante croît au Mexique. *h* (Cavan.)

17. BAUHINE à feuilles rondes. *Bauhinia rotundifolia*. Cavan.

Bauhinia foliis alternis, subrotundis; lobis semiorbiculatis, fimbriatis tomentosis; floribus racemosis. Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 5. tab. 406.

Ses feuilles, presque rondes, sont tomenteuses en dessous, glabres en dessus, à sept nervures, à deux lobes obtus; les pétioles pileux, ainsi que les jeunes rameaux; des stipules courts & un petit corps dur, épineux à la base des pétioles; les fleurs disposées en deux grappes terminales, velues; les pétales courts, petits, d'un rouge-clair, pileux, ovales-obtus, leurs onglets capillaires, tomenteux, allongés; l'ovaire velu. La fructification est celle du n°. 15.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Cavan.)

18. BAUHINE en croissant. *Bauhinia lunaria*. Cavan.

Bauhinia foliis glabris, cordatis; lobis subrotundis; floribus racemosis, tomentosis. Cavan. Ic. Rat. 5. pag. 4. tab. 407.

Elle se rapproche du *Bauhinia racemosa*. Ses tiges & ses rameaux sont glabres; les feuilles glabres, plus larges que longues, échancrées en croissant à leur base, à deux lobes arrondis; les pétioles filiformes, renflés à leurs deux extrémités; les fleurs en grappes axillaires; les onglets des pétales longs, filiformes, pileux. La fructification est celle de l'espèce précédente.

Cette plante croît au Mexique, dans les environs d'Acapulco. *h*

19. BAUHINE épineuse. *Bauhinia spinosa*.

Bauhinia (pauletia) aculeata, caule fruticoso, aculeato; foliis ovatis, bilobis; lobis obtusis; floribus geminis, in racemum foliosum diffusis. Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 6. tab. 410.

Cette espèce & la suivante forment, dans Cavanilles, un genre particulier, qui ne diffère des *Bauhinia* que par le tube du calice persistant & les étamines monadelphes. Ses tiges sont rameuses, hautes d'environ huit à dix pieds; les rameaux opposés; les stipules remplacées par deux aiguillons opposés; les feuilles ovales, à deux lobes obtus; les pétioles courts; deux fleurs latérales, pédicellées, sur un pédoncule commun, très-court, accompagné de bractées. Le calice est tubulé, grêle, oblong, à cinq pointes courtes, en forme d'aîcles, s'ouvrant ensuite en cinq décou-

pures allongées, réfléchies; les pétales très-étroits, d'un jaune-rougeâtre; les filaments rouges, capillaires; les anthères saillantes, bifides à leur base, mucronées à leur sommet; cinq filaments plus courts, souvent stériles.

Cette plante croît dans le voisinage de Panama. *h* (Cavan.)

20. BAUHINE non épineuse. *Bauhinia inermis*. Cavan.

Bauhinia inermis, caule arborescente, foliis ovatis, lobis acutis; floribus racemosis, terminalibus. — (*Pauletia inermis.*) Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 6. tab. 409.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de douze ou quinze pieds. Les rameaux sont alternes, sans épines; les feuilles ovales, à deux lobes aigus, divergens; vertes en dessus, ferrugineuses en dessous, à neuf nervures; les stipules courtes, aigues; les fleurs disposées en grappes terminales; les pédicelles opposés, accompagnés de deux petites bractées concaves, aigues. Le tube du calice est long de trois poices, sillonné, terminé par cinq pointes, s'ouvrant ensuite en cinq découpures réfléchies; les pétales plus courts que le calice; les anthères saillantes, à deux loges; les gouffes longues de huit poices, à peine larges de trois lignes, à plusieurs semences noires & luisantes.

Cette plante croît dans les environs d'Acapulco. *h* (Cavan.)

21. BAUHINE à larges filiques. *Bauhinia latifolia*. Cavan.

Bauhinia caule fruticoso, foliorum lobis acutis, leguminibus latissimis. Cavan. Icon. Rat. 5. pag. 5. tab. 406.

Quoique les fleurs de cette plante n'aient point été observées, les feuilles & les fruits la placent dans ce genre. Ses tiges sont sèches, rameuses, hautes de dix à douze pieds; les feuilles alternes, ovales, en cœur, à deux lobes profonds, aigus, à onze nervures; les fleurs en grappes terminales; les gouffes longues d'un demi-pied, larges de deux poices, comprimées, inégalement partagées par la future, qui devient décurrense, en forme d'une membrane large de trois lignes; les semences luisantes, ovales, comprimées.

Cette plante croît aux îles Philippines. *h* (Cav.)

22. BAUHINE à feuilles réticulées. *Bauhinia retusa*.

Bauhinia ramis petiolisque pubescentibus, foliis cordatis; lobis brevibus, retusis; racemis terminalibus, tomentosis; genitalibus caesitis. (N.)

Les rameaux sont cylindriques, pubescents dans leur jeunesse; les feuilles élargies, en cœur à leur

basse, à deux lobes peu profonds, divergens, très-obtus, coriaces, presque glabres à leurs deux faces; les fleurs en grappes terminales, droites, tomenteuses; le calice velu; les pétales oblongs; les filamens très-faillans; l'ovaire velu; le style long, pubescent, recourbé. Je ne connois point les fruits.

Cette plante a été cultivée au Jardin de Trianon en 1764. h (V. f. in herb. Juss.)

23. BAUHINE à grandes fleurs. *Bauhinia grandiflora*. Juss.

Bauhinia foliis lato-ovatis, subtus tomentosis; lobis obtusis; floribus maximis, geminis; ramis pubescentibus, spinis geminis. (N.)

Cette belle espèce, remarquable par les grandes fleurs, par la largeur des pétales, se rapproche du *Bauhinia spinosa* (pauletia Cav.). Ses rameaux sont cylindriques, pubescents dans leur jeunesse; les feuilles larges, ovales, en cœur, à deux lobes courts, arrondis, obtus; tomenteuses en dessous, à neuf nervures et deux épines à leur base. Les fleurs sont latérales, pédicellées, geminées à l'extrémité d'un pédoncule commun. Le calice est tubulé, pubescent, ainsi que les pédoncules; la corolle très-grande, longue d'environ trois pouces; les pétales larges, lancéolés, d'un blanc-jaunâtre; les étamines à peine de la longueur des pétales. Les fruits n'ont point été observés.

Cette plante a été rapportée du Pérou par Dombey. h (V. f. in herb. Juss.)

24. BAUHINE à grandes feuilles. *Bauhinia macrophylla*.

Bauhinia foliis profunde bilobatis, acuminatis, subtus fuscis; lobis quinque-nerviis; leguminibus ellipticis, marginatis. (N.)

Cette belle plante a des tiges & des rameaux glabres; des feuilles alternes, fort amples, longuement pétiolées, d'un vert foncé & luisant en dessus, d'un jaune-pâle en dessous, glabres, divisées, presque jusqu'à leur base, en deux grands lobes ovales, entiers, acuminés, à cinq nervures. Je n'ai pas vu les fleurs. Les gousses sont comprimées, longues de trois pouces, sur un de large, elliptiques, rétrécies à leurs deux extrémités, à bordures sailantes, relevées; les semences de la grosseur d'un haricot, noires, luisantes, ovales.

Le lieu natal de cette plante n'est pas bien connu. M. de Jussieu la soupçonne d'Amérique. h (V. f. in herb. Juss.)

* *Bauhinia (candida), foliis cordatis, subtus pubescentibus; lobis ovatis, obtusis; calicibus supernis attenuatis, elongatis.* Ait. Hort. Kew.

* *Bauhinia (diphylla), foliis binatis; foliolis*

inaequalibus, obtusis, quinque-nerviis; cirrho simpliciter, lateraliter. Sym. Iret ad tegm. Avam. 3. Lond. 1800. tab. 7. In India.

BAUHINIA. (Voyez BAUHINE.)

BAUMGARTIA. Mœnch. (Voyez EPIDATRUM, Suppl., auquel ce genre paroît devoir être rapporté.)

BAZARA : nom arabe de la pulicaire (*Plantago psyllium* L.), suivant Dalechamp.

BEAUHARNOISE à fruits pendans. *Beauharnoisia* fruticupendula. Ruiz & Pav.

Beauharnoisia foliis lanceolato-ellipticis; floribus unitermis, terminalibus. Ruiz & Pav. Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. vol. 11. pag. 71.

Genre de plantes dicorylléones, à fleurs complètes, irrégulières, polypétales, qui se rapproche de la famille des guttifères, & comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles opposées; les fleurs terminales, solitaires ou ternées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles; une corolle à quatre pétales; des anthères nombreuses, sessiles; quatre styles; une pomme à quatre semences.

On ne connoit encore qu'une seule espèce qui appartienne à ce genre. C'est un arbrisseau haut de dix-huit à vingt pieds & plus. Son tronc se divise en rameaux étalés, opposés, articulés, un peu comprimés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, lancéolées, elliptiques, très-entières, luisantes, longues d'environ un pouce & demi, larges d'un demi-pouce. Les fleurs font pédonculées, terminales, solitaires, geminées ou ternées, accompagnées, à la base des pétiolés, de deux bractées ovales-lancéolées, caduques.

Le calice est composé de deux folioles ovales, concaves, réfléchies, caduques; la corolle jaunâtre, à quatre pétales ovales, deux extérieurs opposés, deux intérieurs beaucoup plus larges; les étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle; point de filamens; les anthères sessiles, linéaires, réunies à leur base par un anneau très-court, à deux loges, répandant leur poussière par deux pores latéraux. L'ovaire est libre, en ovale renversé, surmonté de quatre styles rapprochés à leur base, puis divergens; les stigmates simples, obtus. Le fruit est une pomme tubineuse, pendante, revêtue d'une écorce coriace, divisée en quatre loges par une cloison membraneuse, contenant quatre semences jaunâtres.

Cette plante croît dans les andes du Pérou. h

BECHION : nom tiré du grec, que l'on a donné

au ruffilage, parce qu'il étoit employé contre la toux : d'où vient le nom de *plantes béciques*, donné à toutes celles qui ont la même propriété.

BECKEA ou BÛCKEA. (Voyez TIONGINE.)

BECKMANNIA. Hoff. (Voyez ALPISTE, Suppl.)

BEDARINGI : nom arabe de la mélisse, suivant Dalechamp.

BÉDÉGUAR, espèce de tumeur ou gale chevelue, produite sur le cuir par la piqure d'un insecte du genre *cynips*. On lui a attribué beaucoup de vertus, qui se réduisent à la qualité astringente propre au rosiér.

BEEDELSNOEREN : nom flamand d'un arbre nommé, sur la côte malabare, *isera-famfravadi*, suivant Rheed, *Hart. malab.* 4, pag. 15, tab. 17, que Linné a réuni à son genre *eugenia*, sous le nom d'*eugenia acutangula*, &c. qui doit être réuni au *stevadium* Juss. (Voyez JAMBOSIER, n°. 5, & STRAVADI, Suppl.)

BÊESHA. On nomme ainsi, sur la côte malabare, une espèce de bambou citée par Rheed, *Hart. malab.* 5, pag. 119, tab. 60.

BEETKLIM : nom flamand de la baselle, que l'on mange dans l'Inde, apprêtée comme l'épinard.

BÉFARE, BEFARIA ou plutôt BEJARIA. Des observations faites par M. Ventenat sur la structure des fruits de ce genre, prouvent évidemment, selon lui, qu'il appartient à la famille des rofages. Ce même savant remarque encore que l'*acumina oblonga* — *lanceolata* (Syst. veget. peruv.), qu'il a observée dans l'herbier de Dombey, se rapportent au genre *befaria*, &c. que même ces espèces ne diffèrent pas des *bejaria astuans* & *resinosa* Linn., ainsi que l'avoit déjà remarqué M. Zée (Annal. de scienc. nat. vol. 3, pag. 151). Ce même botaniste, M. Zée, disciple du célèbre Mutis, a prévenu qu'il falloit écrire *bejaria* & non *befaria*. Bejar, ami intime de Mutis, étoit professeur de botanique à Cadix.

A ces observations nous ajouterons la description d'une nouvelle espèce de *bejaria*, découverte par Michaux dans la Floride occidentale, figurée par Ventenat, cultivée chez Cels, de graines rapportées par Bosc.

3. BÉFARE à grappes. *Bejaria racemosa*. Vent.

Bejaria foliis fissilibus, lanceolatis, integerrimis, utrinque glabris; racemis terminalibus, corollis inaequalibus. Vent. Hort. Cels. pag. & tab. 51.

Botanique. Supplément. Tome I.

a. *Caule ramisque hispida*.

3. *Caule ramisque globosis*.

Befaria (paniculata), ramis hispido-finis; foliis ovali-lanceolatis, glabris; panicula subaphylla, multijuga, glutinosa. Mich. Flor. boeal. Amer. 1. pag. 180. tab. 16.

Arbrisseau élégant, remarquable par les grandes & belles fleurs. Ses tiges sont droites, plus ou moins visqueuses, hautes de trois à quatre pieds, hispides, quelque fois glabres, rameuses; les feuilles alternes, presque sessiles, persistantes, rapprochées, ovales-lancéolées, très-entières, aiguës, rétrécies, à leur base, en un pétiolo court; glabres, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, un peu pileuses sur leur principale nervure. Les fleurs sont d'un blanc légèrement teint de pourpre, disposées en grappes terminales, point axillaires, simples ou rameuses, pédicellées, accompagnées de bractées très-petites, lancéolées; le calice glabre, très court; la corolle à sept pétales un peu adhérens à leur base, inégaux, oblongs, obtus, dilatés vers leur sommet; le stigmate en tête, à sept stries. Le fruit consiste en une capsule globuleuse, de la grosseur d'un pois, avec laquelle persistent le calice & le style, divisée en sept loges, s'ouvrant en sept valves; les cloisons formées par les bords renirans des valves, un placenta central, cylindrique, dilaté, & divisé à son sommet en lobes qui pénètrent chacun dans une loge; des semences nombreuses, oblongues, roussâtres, fort menues.

Cette plante croît aux lieux sablonneux, dans la Floride. h (V. f. Comm. Bosc.)

BEFARIA. (Voyez BÉFARE.)

BEFBASE. Dans les Œuvres d'Avicenne on trouve sous ce nom le macis de la muscade, suivant Clusius.

BÉGONE. *Begonia*. Ce genre a été successivement éclairci & augmenté par Lhéritier & Dryander, & les espèces distribuées dans un ordre nouveau, ainsi qu'il suit.

ES P È C E S.

* Espèces pourvues de tige, à feuilles en cœur.

1. BÉGONE luisante. *Begonia nitida*. Dryand.

Begonia fruticosa, erecta, foliis glaberrimis, inaequaliter cordatis, obsoletè dentatis; capsula ala maxima, subrotunda. Dryand. Act. Soc. linn. l'ond. 1. pag. 159. — Air. Hort. K. w. 3. pag. 352.

Begonia (obliqua), fruticosa, foliis obliquè cordatis, cornosis, glaberrimis; fr. pulis tripteris. 1. l'et. Stirp. pag. 95. tab. 46. (Excl. synon.) — Lam. Ill. Gen. tab. 778.

Begonia (minor), caule fruticoso, erecto; foliis dentatis, glabris; floribus paniculatis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 618, & Collect. 1. pag. 126.

Begonia purpurea, Swartz, Prodr.

Abrusseau dont les tiges sont droites, glabres, rameuses, cylindriques; les feuilles t. s. glabres, renversées, un peu charnues, d'un vert-tendre, alternes, pétiolées, assez grandes, en cœur oblique, aiguës, presque entières ou bien à dentelures irrégulières, arrondies, souvent peu fenilables. Les fruits sont blanches, disposées en panicules axillaires, presque terminales, longuement pétiolées, presque divisées par dichotomies; chaque fleur pédicellée, accompagnée de deux petites stipules opposées, ovales, aiguës, en forme de carène; quatre pétales obtus, dont deux beaucoup plus étroits & un peu plus courts; les étamines très-courtes; une capsule triangulaire, surmontée par les pétales persilans, à trois loges; leurs angles prolongés en ailes membraneuses, l'une d'elles deux fois plus grande que les deux autres, toutes se séparant en deux à l'ouverture des valves; les cloisons très-minces, étroites, opposées aux valves; les semences nombreuses, fort petites, presque globuleuses.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, à la Jamaïque. *h* (V. f.)

2. *BEGONE* dichotome. *Begonia dichotoma*, Jacq.

Begonia fruticosa, erecta, foliis inaequaliter cordatis, subangulatis, denticulatis, glabris, subius ad venas subsutis; panicula dichotoma; capsula ala maximâ, acutangulâ; reliquis parallelis, acutangulis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 412.

Begonia caule fruticoso, erectifculo; foliis dentatis, subrotundis, fatis glabris, dorso hisutis; panicula dichotoma. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 619, & Collect. 3. pag. 250.

Ses tiges sont droites, ligneuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, plus larges que longues, échancrées en cœur oblique à leur base, presque rondes, glabres en dessus, légèrement hispides en dessous le long de leurs veines, denticulées; presque anguleuses à leur contour; les fleurs disposées en panicule; les ramifications dichotomes; la corolle blanche; quatre pétales, deux plus petits. Le fruit consiste en une capsule à trois valves, à trois loges, accompagnées d'ailes membraneuses, une plus grande, élargie à sa partie supérieure, rétrécie en angle aigu à sa base; les deux autres ailes parallèles.

Cette plante croît aux environs de Caracas, aux lieux humides. *h*

3. *BEGONE* réniforme. *Begonia reniformis*.

Begonia caulescens, foliis reniformibus, angulatis, dentatis; capsula ala maximâ, acutangulâ; reliquis parallelis, minimis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 161. tab. 14. fig. 1 & 2.

Cette espèce, rapprochée de la précédente, en diffère par ses tiges bien moins élevées, charnues, de l'épaisseur du doigt; par les feuilles réniformes, plus fortement anguleuses, à dentelures marquées; les pétiolés de la longueur du diamètre des feuilles. Les panicules sont terminales; le pédoncule commun, long de six à sept pouces, soutenant une cime d'abord deux fois, puis quatre fois dichotome; les pédicelles disposés en ombelle; les fleurs blanches; quatre p. rales dans les mâles, cinq dans les femelles; les styles v. l. us; la capsule ovale, trigone, à angles membraneux; les ailes beaucoup plus petites que dans l'espèce précédente.

Cette plante croît dans les fentes des rochers, au Brésil, proche Rio-Janeiro. *h*

4. *BEGONE* herbacée. *Begonia erminea*. Lhérit.

Begonia caulescens, foliis cordatis, acuminatis, serratis; capsula ala maximâ, falcata; reliquis obiteratis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. p. 162.

Begonia herbacea, foliis subaequalibus, cordatis, acuminatis, ciliato-dentatis, supra caudato-appendiculatis. Lhérit. Stirp. pag. 97. tab. 47.

Ses racines sont tubéreuses; elles produisent une tige droite, herbacée, simple, longue de six à huit pouces, garnie de feuilles alternes, pétiolées, en cœur, glabres, acuminées, presque égales aux deux côtés de leur base, dentées en scie à leur contour; les dentelures ciliées à leur sommet; les fleurs terminales, paniculées; les capsules surmontées d'une aile très-grande; les deux autres obitérées.

Cette plante croît sur les pierres, à Madagascar, le long des ruisseaux. *h*

5. *BEGONE* crénelée. *Begonia crenata*. Dryand.

Begonia caulescens, foliis inaequaliter cordatis, subrotundis, obtusis, crenato-dentatis; capsula bilocularibus. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 162. tab. 14. fig. 3.

Ses tiges sont garnies de feuilles alternes, arrondies, obtuses, échancrées en cœur, à deux lobes inégaux, crénelées, dentées à leur contour. Ses fleurs sont d'un rouge-pâle; les mâles composées de quatre pétales, deux opposés plus étroits, à peine plus courts; cinq pétales dans les fleurs femelles, trois plus étroits; un style; une capsule à deux loges.

Cette plante croît sur les rochers, dans les Indes orientales, dans l'île Salfette & proche le fort Visconde. (*Dryand.*)

6. BÉGONE à feuilles minces. *Begonia tenuifolia*. Dryand.

Begonia caulescens, foliis inaequaliter cordatis, ovatis, acutis, angulatis, obsolete denticatis; capsulis bilocularibus. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 162. tab. 14. fig. 4.

Cette plante a des tiges droites, glabres, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës, échancrées en cœur, à deux lobes inégaux, anguleux à leurs bords, avec des dentelures peu marquées. Les fleurs sont d'un blanc-incarnat avec des filices rougeâtres : dans les mâles, les deux pétales extérieurs ovales-arrondis, obtus, presque en cœur à leur base; les deux intérieurs ovales-oblongs, un peu plus petits, à peine obtus; les filaments courts, très-nombreux, rapprochés en un cône saillant; les anthères ovales, redressées; cinq pétales dans les fleurs femelles; l'intérieur plus petit que les autres; point d'étamines; l'ovaire mucroné; trois styles glabres; les capsules à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à Java. (Dryand.)

7. BÉGONE ferrugineuse, n°. 9. *Begonia ferruginea*. Linn. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 163. — Smith, Icon. ined. pag. 8. & tab. 44.

8. BÉGONE élevée. *Begonia grandis*. Dryand.

Begonia caulescens, foliis inaequaliter cordatis, angulatis, serratis; capsula alis parum inaequalibus. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 163.

Begonia (obliqua), foliis inaequaliter denticulatis. Thunb. Flor. japon. 231. — Banks, Icon. — Kœmpf. tab. 20.

Sjukaido. Kœmpf. Amoen. exot. 338.

Ses tiges sont hautes, droites, ligneuses, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, échancrées en cœur oblique; les lobes inégaux; le contour des feuilles anguleux, denté en scie; les dentelures inégales. Les ailes des capsules ne sont que très peu inégales.

Cette plante croît au Japon. *h*

9. BÉGONE à grandes feuilles, n°. 6. *Begonia macrophylla*. Lam. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 164.

Begonia (grandifolia), caule fruticoso, erecto; foliis serratis, glabris; floribus paniculatis. Jacq. Collect. 1. pag. 128.

Begonia obliqua. Jacq. Observ. 1. pag. 11.

10. BÉGONE tubéreuse, n°. 1. *Begonia tuberosa*. Lam. (Exclus. synon. Linn. Suppl.) — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 168.

11. BÉGONE à feuilles rondes, n°. 7. *Begonia rotundifolia*. Lam. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 169.

Begonia obliqua, var. *h*. Linn. Spec. Plant. 1498.

* * Espèces pourvues de tiges; feuilles à demi en cœur, l'un des deux lobes obtus.

12. BÉGONE isoptère. *Begonia isopteris*. Smith.

Begonia caulescens, foliis glabris, semicordatis, obsolete denticatis; capsula alis subaequalibus, parallelis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 169. — Smith, Icon. ined. pag. 8. & tab. 43.

Ses tiges sont droites, glabres, striées, un peu charnues; ses feuilles ovales, lancéolées, aiguës, à demi en cœur à leur base, inégales, très-glabres, ondulées, à peine denticulées; les pétiolés courts; la panicule terminale, dichotome; les bractées oblongues, membraneuses, caduques; les fleurs mâles petites, nombreuses, à deux pétales en cœur, arrondis; une capsule turbinée, à trois loges, à trois ailes égales, rabattues à leurs angles.

Cette plante croît à Java. (Smith.)

13. BÉGONE à feuilles aiguës. *Begonia acutifolia*.

Begonia caulescens, foliis semicordatis, angulatis, denticatis; capsula ala maxima, obusangulata; reliquis acutangulis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 165. — Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 994. — Jacq. Collect. 1. pag. 122.

Begonia purpurea. Swartz, Prodr. 86.

Aceris fructu herba anomala, flore tetrapetalo, albo. Sloan, Jam. tab. 127. fig. 1 & 2.

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds sur une tige forte, cylindrique, articulée, glabre, peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, ovales-lancéolées, acuminées, à demi en cœur, inégales à leur base, glabres, denticulées; les stipules petites, caduques, lancéolées; les fleurs paniculées; les pédoncules rougeâtres, plus longs que les feuilles, étalés, dichotomes à leur sommet, soutenant huit à dix fleurs blanches, munies de bractées petites, purpurines; quatre pétales inégaux dans les fleurs mâles, cinq dans les femelles; l'ovaire de couleur purpurine; trois styles bifides; une capsule ovale, à trois angles; une aile très-grande, à angle obtus; les deux autres plus petites, aiguës.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque. *h* (Swartz.)

14. BÉGONE acuminée. *Begonia acuminata*. Dryand.

Begonia caulescens, foliis hispida, semicordatis,
G 888 2

atuminatis, inaequaliter dentatis; capsula alba maximâ, obtusangulâ; reliquis acutangulis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 166. tab. 14. fig. 5 & 6.

Ses tiges four garnies de feuilles lancéolées, acuminées, inégalement dentées, à demi en cœur à leur base, n'ayant presque qu'un seul lobe. Les fleurs mâles ont quatre pétales, dont deux opposés, plus petits. Les fleurs femelles en ont cinq, deux plus petits. L'ovaire est accompagné à sa base de deux bractées finement dentées, une fois plus courtes; les capsules munies de trois ailes; la plus grande à angle obtus, les deux autres à angle aigu.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque. ♀

15. BÉGONE à tige basse. *Begonia humilis.* Dryand.

Begonia caulescens, erecta, foliis hispida, semicordatis, duplicato serratis; capsula alba rotundata, parum inaequalibus. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 166. tab. 15. — Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 355.

Toute cette plante est charnue, transparente. Ses tiges sont cylindriques, renflées à leurs articulations, de six à vingt-quatre pouces de haut, rougeâtres, ainsi que les pétioles & les pédoncules; les feuilles ovales, à demi en cœur à leur base, vertes, hispides en dessus, presque glabres, plus pâles en dessous, à dentelures inégales & ciliées, geminées, à demi ovales; les pédoncules longs, axillaires, souvent dichotomes, à plusieurs fleurs pédicellées; une petite bractée ovale, ciliée à la base de chaque pédicelle; la corolle blanche; quatre pétales inégaux dans les fleurs mâles, cinq dans les femelles; une capsule trigone, à ailes arrondies.

Cette plante croît à l'île de la Trinité. ♀ (Dryand.)

16. BÉGONE velue, n°. 1. *Begonia hirsuta.* Aubl. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 167.

*** Tiges pourvues de feuilles ovales ou oblongues.

17. BÉGONE à fleurs violettes, n°. 8. *Begonia urtica.* Linn. — Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 67. — Smith, Icon. ined. pag. 8 & tab. 45.

18. BÉGONE à feuilles d'orme. *Begonia ulmifolia.* Willd.

Begonia caulescens, erecta, foliis utrinque hispida, inaequaliter oblongis, duplicato-dentatis; capsula alba maximâ, acutangulâ; reliquis obtusangulis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 418. — Humb. & Bonpl.

Ses tiges sont droites, ligneuses, garnies de

feuilles velues à leurs deux faces, inégalement oblongues à leur base, aiguës à leur sommet, longues de trois pouces, inégalement dentées, à dentelures aiguës. Les capsules portent une aile très-grande, rétrécies en angle aigu à sa base; les deux autres plus petites, à angles obtus.

Cette plante a été découverte dans l'Amérique méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. ♀

19. BÉGONE lisse, n°. 4. *Begonia glabra.* Aubl.

Begonia (scandens), radicans, foliis ovato-subrotundis, absolète dentatis; capsula alba maximâ, obtusangulâ; reliquis parallelis, minimis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 168. — Swartz, Prodr. 86, & Flor. Ind. occident. 2. pag. 992. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 418.

*** Espèces dépourvues de tiges.

20. BÉGONE naine. *Begonia nana.* Lhérit.

Begonia acaulis, foliis lanceolatis, scapo subhirsuto. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 169.

Begonia acaulis, foliis aequalibus, lanceolatis; scapo subhirsuto. Lhérit. Stirp. pag. 99. tab. 48.

Petite plante, haute à peine de quatre à cinq pouces, pourvue de racines charnues, arrondies, presque tubéreuses, d'où sortent quelques feuilles pétioles, oblongues, étroites, lancéolées, égales, acuminées, rétrécies à leur base, glabres; dentées & ciliées à leurs bords. De leur centre s'élève une hampe grêle, simple, à peine plus longue que les feuilles, terminée par deux ou trois fleurs pédonculées, dont une femelle; quatre pétales inégaux dans les fleurs mâles; des étamines nombreuses, très-courtes, conniventes à leur base; six pétales irréguliers dans les fleurs femelles; une capsule oblongue, triangulaire; une des ailes beaucoup plus grande; les semences fort petites, nombreuses, presque rondes.

Cette plante croît à Madagascar, où elle a été découverte par Bruguère. ♀ (Description de Lhérit.)

21. BÉGONE tendre. *Begonia tenera.* Dryand.

Begonia acaulis, foliis inaequaliter cordatis, floribus umbellatis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 169. tab. 16.

Toutes les feuilles sont radicales, orbiculaires, aiguës, en cœur, tendres, membraneuses, inégalement dentées; les lobes inégaux; la face supérieure parsemée de petites glandes à la base des veinules; les pétioles quelquefois longs d'un pied, rouges, presque glabres, cylindriques; les hampe droites, charnues; des stipules radicales ovales, acuminées; les fleurs presque en ombelle; les pédicelles accompagnés à leur base de petites bractées lancéolées, caduques; les fleurs blan-

ches ; les filamens nombreux , capillaires , ennivens à leur base ; quatre pétales dans les fleurs mâles , six dans les femelles ; une capsule turbinée , trigone , à trois ailes aiguës à leur sommet , inégales.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. (Dryand.)

22. BÈGONE à deux ailes. *Begonia diptera*. Dryand.

Begonia acaulis, foliis inaequaliter cordatis ; pedunculis dichotomis ; capsula alâ unâ maximâ , alterâ angustâ , terâ obsoletâ. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. t. pag. 170.

Begonia (capensis), *acaulis*, foliis inaequaliter denticulatis. Linn. f. Suppl. 420.

Ses feuilles sont toutes radicales , pétioles , ovales , inégalement échancrées en cœur à leur base , glabres à l'un des deux faces , légèrement denticulées à leur contour. De leur centre s'élève une hampe ou pedoncule droit , dichotome , muni de quelques fleurs , auxquelles succède une capsule trigone , ovale , garnie seulement de deux ailes , une très-grande , l'autre beaucoup plus petite , étroite. On y remarque l'apparence d'une troisième aile.

Cette plante croît sur le revers des montagnes , aux lieux ombragés , à l'île Joanna. ♀

23. BÈGONE à huit pétales. *Begonia octopetalâ*. Lhérit.

Begonia acaulis, foliis cordatis , quinquelobis ; pedunculis dichotomis. Dryand. Act. Soc. Linn. Lond. t. pag. 171.

Begonia acaulis, foliis cordatis , quinquelobis , inaequaliter dentatis ; floribus masculis octopetalis. Lhérit. Stirp. pag. tot.

Cette espèce est remarquable par ses pétales égaux , par ses feuilles grandes , assez semblables à celles de la vigne , toutes radicales , longuement pétioles , aiguës , en cœur , à cinq lobes obtus , presque glabres , inégalement dentées ; les pétioles pubescents , la hampe droite , pubescente , haute de deux pieds , trifide , presque ramifiée en corymbe ; les fleurs pédicellées ; les bractées sessiles , opposées , caduques , ovales , échancrees ; fix à neuf pétales , plus souvent huit dans les fleurs mâles ; cinq à six dans les femelles.

Cette plante a été découverte au Pérou par Dombey. ♀

* *Begonia* (Stipulacea), *caulescens*, foliis reniformibus , subangulatis , crenatis ; pediculis venisque foliorum subinde hirsutis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 414.

Les fruits de cette espèce n'ont point été ob-

servés. Ses feuilles ressemblent beaucoup à celles du *Begonia reniformis* ; mais elles sont velues sur leur pétiole & sur leurs veines à leur face inférieure. Les fleurs sont presque disposées en ombelle , munies , sur leurs pédicelles , de deux bractées opposées , membraneuses , assez grandes , ovales , acuminées.

Son lieu natal n'est pas connu. ♀

* *Begonia* (cucullata), *caulescens*, foliis inaequaliter cordatis , denticulatis , glabris , cucullatis , capsula alâ maximâ , acutangulâ ; reliquis parvioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 414.

Ses tiges sont ligneuses , pourvues de feuilles médiocrement pétioles , oblongues , en cœur à leur base , à lobes inégaux , glabres , concaves , denticulés ; les stipules grandes , oblongues , dentées , vertes , point membraneuses ; quatre pétales , deux opposés , plus grands , arrondis ; deux autres étroits , lancéolés , une capsule à trois ailes ; la plus grande rétrécie à sa base en angle aigu ; les deux autres plus petites , égales , rétrécies à leurs deux extrémités.

Cette plante croît au Brésil. ♀ (Willd.)

BÈGONIA. (Voyez BÈGONE.)

BÈGUIL : fruit de la grosseur d'une pomme ordinaire , mais dont la chair a la couleur , le grain & le goût de la fraise. (Hist. abrég. des voyages , 2 , pag. 291.) L'arbre qui le produit , croît dans les bois de la Sierra-Leona , sur les côtes occidentales de l'Afrique. C'est peut-être une espèce d'arborescent , d'après la description imparfaite du fruit.

BEHEN blanc. Les Arabes désignent sous le nom de *schmen abiad* ou *behen blanc* , une racine blanche à l'intérieur & à l'extérieur , qui avoit une odeur aromatique & une faveur un peu stiptique ; ils lui attribuoient une vertu tonique , & celle d'augmenter la sécrétion de la semence. Elle étoit également estimée chez les Perses , qui , après l'avoir pilée , la mêloient , certains jours de fête , à leurs aliments. On ne la trouve presque plus dans les pharmacies , & l'on est incertain sur la plante qui la fournit. Tournefort pour croire que c'est celle qui est connue maintenant des botanistes sous le nom de *centaurea behen*. Il ne faut pas la confondre avec le *behen blanc* des environs de Paris (*cucubalus behen* Linn.) , qui n'est pas employé en médecine. (Juss.)

BEHEN rouge. C'est une racine nommée , par les Arabes , *schmen achmar* , que l'on apporte de la Syrie & du mont Liban , coupée par tranches compactes , d'un rouge-noir , regardée comme astringente & tonique , employée autrefois pour arrêter les hémorragies & le cours de ventre. On

a dit, mais sans pouvoir l'affirmer, qu'elle appartenoit au *Justice timonium* Linn., que quelques auteurs nommoient, pour cette raison, *Behen rubrum*, &c qui participe un peu des mêmes propriétés. (Juss.)

BEIAHALALEN, BIAHALALEZ: noms arabes de la joubarbe ordinaire (*Sempervivum tectorum* Linn.), sçavoir Dalechamp.

BEID-EL-OSSAR, BEIDELSAR: plante d'Égypte, de la famille des apocinées, rapportée au genre *Aselepiade*, &c que l'on croit être l'*aselepias procera* Ait.; elle croît abondamment sur les bords du Nil, &c s'élève à la hauteur de deux coudées, au rapport de Prosper Alp. Les Égyptiens emploient en guise d'amadou les poils soyeux qui couronnent les graines; ils en garnissent aussi leur lit, comme d'une espèce de duvet. L'empirérite faite avec les feuilles pilées de la plante est bonne dans les tumeurs froides. Son suc laiteux, appliqué sur les cuirs, procure le moyen d'enlever facilement leurs poils. On dit encore qu'il peut être mis en usage pour ronger les boutons galeux ou vénériens, &c qu'on se sert aussi de la plante contre la fièvre. (Juss.)

BEJARIA. (Voyez BEFARIA.)

BEJUCO. *Hippocratea*. Ce genre, affilié à la famille des érabes, voisin de celle des malpighies, offre pour caractère essentiel :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales; trois étamines; un style; trois capsules comprimées, à deux valves en carène; des semences ailées d'un seul côté.

ESPÈCES.

1. **BEJUCO grimpant**, n°. 1. *Hippocratea scandens* Jacq.

Hippocratea (obcordata), foliis ovato-lanceolatis, serratis; capsulis obcordatis. Lam. Ill. Gen. 1. p. 100. n°. 425. tab. 28. fig. 1. — Swartz, Prodr. 17, & Observ. pag. 28. (Exclus. Plum. synon.)

2. **BEJUCO ovale.** *Hippocratea ovata*. Lam.

Hippocratea foliis ovalibus, leviter dentatis; capsulis ovatis, integerrimis. Lam. Ill. 1. n°. 427. tab. 28. fig. 2.

Coc scandens, fructu trigemino, subrotundo. Plum. Gen. 8, & Icon. 88.

Hippocratea volubilis, var. β.

Cette plante, confondue d'abord avec la précédente, doit en être séparée, &c former une espèce particulière, principalement distinguée par ses capsules ovales, obtuses, elliptiques, point échancrées à leur sommet. Les feuilles sont ovales

&c non lancéolées, épaisses, coriaces, glabres à leurs deux faces, plus pâles, presque glauques en dessous, à peine aiguës, à dentelures obtuses, peu marquées. Les fleurs sont très-petites, nombreuses, les unes pédicelées, d'autres presque sessiles, disposées en panicules axillaires, amples, étalées; les ramifications très-ouvertes, bifurquées, surtout les inférieures; les pédoncules glabres, un peu anguleux; les tiges grimpantes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale; elle a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. Th (V. f. Comm. Ledru.)

3. **BEJUCO multiflore.** *Hippocratea multiflora*. Lam.

Hippocratea foliis lato-ovalibus, levibus, integerrimis; cymis crebris, multifloris. Lam. Illustr. t. pag. 101. n°. 428.

β. *Hippocratea* (comosa), paniculis comosis; pedunculis multifidis, capillaribus; foliis ovatis, acuminatis, integris. Swartz, Prodr. 17, & Flor. Ind. occid. t. pag. 77.

Coc scandens, fructu amplissimo, singulari. Plum. Icon. 77. tab. 88. fig. A. B.

Il est très-probable que la plante de M. de Lamarck & celle de Swartz appartiennent à la même espèce. C'est un arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, assez larges, ovales, très-entières, glabres, lisses à leurs deux faces, un peu aiguës, quelquefois acuminées. Les fleurs sont disposées en panicules axillaires, touffues, très-ramifiées; les ramifications terminées en cimes; les pédoncules glabres, les pédicelles capillaires; les capsules grandes, souvent solitaires.

Cette plante croît à Cayenne & à la Nouvelle-Espagne. Th (V. f.)

4. **BEJUCO ru le.** *Hippocratea aspera*. Lam.

Hippocratea foliis ovatis, subintegerrimis, glabris, subius venosis, asperis. Lam. Ill. 1. pag. 101. n°. 429.

Deux caractères principaux distinguent suffisamment cette espèce des précédentes & des suivantes : 1°. ses fleurs beaucoup plus grandes que dans toutes les autres espèces; 2°. ses feuilles rudes à leur face inférieure & celles dont d'auteurs ovales, opposées, pétiolées, glabres à leur face supérieure, traversées en dessous par des veines sensibles, presque entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées en panicules axillaires.

Cette plante croît à l'île de Cayenne, où elle a été recueillie par M. Richard. Th (V. f.)

5. **BEJUCO du Sénégal.** *Hippocratea senegalensis*.

Hippocratea foliis ovatis, leviter denticatis; ramulis punctatis; floribus verticillatis. Lam. Illustr. 1. pag. 101. n°. 430.

♂. *Hippocratea (madagascariensis), foliis ovatis, acutis, nitidis, subintegerrimis; ramulis leprosis, floribus verticillatis.* Lam. Ill. Gen. 1. pag. 101. n°. 431.

Hippocratea (verticillata), floribus verticillatis. Pers. Synops. Plant. 1. pag. 40.

J'ai réuni ces deux plantes, ainsi que l'a fait M. Persoon, leur ayant trouvé des caractères qui ne permettent guère de les tenir séparées, au moins comme espèces. Les tiges sont glabres, canaliculées, ramuleuses; les rameaux alternes, ponctués dans la variété *a*, chargés, dans la plante *♂*, de tubercules ovales, un peu comprimés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, plus ou moins aiguës, à peine denticulées à leur contour, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, plus pâles en dessous. Les fleurs sont petites, réunies, dans l'aisselle des feuilles, en paquets verticillés; les pédoncules presque simples, inégaux, courts, capillaires.

Cette plante croît au Sénégal & à l'île de Madagascar. *h* (V. f.)

6. BEJUCO vert. *Hippocratea viridis.* Ruiz & Pavon.

Hippocratea scandens, corymbis dichotomis; foliis ovatis, obtusis acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 44. tab. 74. fig. A.

Arbuste grimpant, dont les tiges sont glabres, rameuses, hautes de quinze à dix-huit pieds; les feuilles opposées, pétiolées, étalées, un peu coriaces, ovales, entières ou un peu dentées, acuminées, luisantes en dessus; les pétioles courts, contournés, canaliculés; les fleurs disposées en corymbes dichotomes, axillaires & terminaux; les pédicelles accompagnés de petites bractées ovales, concaves, aiguës; les fleurs petites & jaunes; les capsules vertes, longues d'un pouce.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes. *h* (Ruiz & Pav.)

♂. *Hippocratea (indica), foliis ellipticis, obtusifolius, crenulatis; corymbis axillaribus.* Willden. Spec. Plant. 1. pag. 193.

Observations. On trouve dans la Flore du Pérou un genre très-voisin des *hippocratea*, & qui doit peut-être y être réuni: c'est l'*anthodon* de Ruiz & Pavon. (Voyez ce mot dans notre Supplément.)

BEL & BELA, mots de la langue des peuples de la côte de Malabar; ils enrent, dit M. Aubert du Petit-Thouars, dans la composition de plusieurs noms de plantes décrites par Rheed

dans son *Hortus malabaricus*. « Dans le dialecte d'ici à cet auteur les empruntés, ces mots paroissent être une épithète qui veut dire blanc. Le mot *beluta* a la même signification; les sert aussi au même usage. Ces trois mots en précèdent d'autres qui sont en quelque sorte des noms génériques, & dénotent les plantes qui se distinguent des autres par des fleurs blanches. Quelques-uns des noms suivants en fournissent la preuve.

1. BEL-ADAMBOÉ. Rheed, dans l'*Hort. malab.* 9. pag. 119, tab. 58, a décrit & figuré sous ce nom une belle espèce de liseron, qui ressemble à celle de l'île-de-France, que M. de Lamarck a fait connoître sous le nom de *liseron à feuilles de tilleul* (*convolvulus tiliaceus*); mais celui-ci se distingue par ses fleurs, qui sont blanches, ce que désigne le mot de *bel*, qui entre dans la composition de son nom. Celui d'*adamboé*, qui le suit, désigne, soit d'autres liserons, soit le *munchausa* Linn.

2. BELAHÉ, BELA-AYÉ. Les habitants de Madagascar donnent ce nom à un arbre de leur pays, dont ils font beaucoup de cas à cause de ses propriétés. Ce mot est composé de *be*, qui veut dire grand (le *béar* des Malais), & de *lahé*, qui veut dire homme ou mâle. Tout ce que l'on sait jusqu'à présent de ses caractères botaniques, c'est qu'il a des feuilles alternes & trifoliées; qu'il est dioïque, & que ses fleurs mâles ont cinq étamines: il ne croît qu'à une certaine distance du bord de la mer, & dans les montagnes, à une assez grande élévation. C'est là que les habitants vont le chercher pour en rapporter l'écorce, dont ils font beaucoup d'usage, la regardant comme un excellent remède, opinion fondée sur la saveur très-amère & mêlée d'un peu d'arome. Cette qualité la rend propre à un usage qui en fait faire une grande consommation: il consiste à la faire infuser dans une liqueur fermentée que l'on tire du jus de la canne à sucre, & que les habitants de Madagascar nomment *tofsara*, & ceux de l'île-de-France *fanguirin*. Cette écorce fait le même effet, dans cette boisson, que le houblon dans la bière. L'amertume qu'elle procure, & à laquelle on s'accoutume, la rend plus saine: c'est pour la même raison que les habitants de Batavia, au rapport de Rumphius, mêlent au même suc de canne les feuilles & les tiges de la momordique balsamique (*la margose* de l'île-de-France), usage que l'on devrait imiter dans nos colonies africaines.

On ne peut guère douter que cette écorce, examinée avec soin, ne se trouvât posséder des propriétés précieuses pour la médecine, dans le genre de celles du *simarouba* ou du *quinquina*, auxquels on l'a comparée, & dont même on lui a donné les noms: c'est ce que Mauduit a cherché à établir en publiant, dans les Mémoires de la So-

ciété de médecine, vol. 3, pag. 369, les observations de Sonnerat. Ce savant voyageur en avoit fait usage lui-même avec succès dans un flux de sang; il lui donne le nom de *bela-ayt*. C'est sous ce même nom que Murai a donné le précis de ce Mémoire dans le sixième volume de la Matière médicale, pag. 177. (*Aub. Pet. Th.*)

BELAM-CANDA. (*Voyez BELEM-CANDA.*)

BELA-MODAGAM : nom donné par les habitants de la côte malabare à une plante du leur pays, que Rheed a décrite & figurée dans l'*Hortus malabaricus*, 4, p. 121, tab. 59. Il est aisé de la reconnaître pour une espèce du genre *scavola* Linn.; mais elle paroît différente de celles connues jusqu'à présent, principalement parce qu'elle forme un petit arbre & qu'elle croît dans l'intérieur des terres, au lieu que les autres, notamment les deux décrites & figurées, l'une en Amérique par Plumier, la seconde à Aniboine par Rumphé, ne sont que des arbrustes qui bordent le rivage de la mer. (*Aub. Pet. Th.*) La seconde plante est le *lobelia taccada*, Gærtn. 2, pag. 119, tab. 25.

BELA-POLA. Rheed a décrit & figuré sous ce nom (*Hort. malabar.* 211, pag. 69, tab. 35) une plante de la famille des orchidées, qui paroît du même genre naturel que l'angrec écrit, n°. 28 (*epidendrum scriptum* Linn.). Elle croît sur la terre, dans les endroits marécageux. Ses feuilles sont grandes, plissées & nerveuses, réunies à la base en une bulbe. Les fleurs sont disposées en un épi ferré & latéral; elles sont blanchâtres; la division inférieure de la corolle marquée de veines pourpres. Les bulbes de cette plante, pilées avec du riz, forment un liniment propre à hâter la maturation des phlegmons, des tumeurs ou abcès. C'est un usage auquel on emploie assez généralement, dans tous les pays, les différentes espèces de bulbes. Dans nos climats, c'est celui pour lequel on se sert le plus communément du lis blanc. Le mot *pola*, dans la langue de Malabar, désigne plusieurs plantes bulbeuses. (*Aub. Pet. Th.*)

BELA-SCHORA. Suivant Rheed (*Hort. malab.* 8, pag. 8, tab. 1), on cultive sous ce nom, à la côte de Malabar, dans tous les jardins, une cucurbitacée, dont la pulpe, qui est douce, se mange cuite & assaisonnée comme les concombres; elle est mûre dans la saison des pluies. Il paroît que c'est une variété de la calabasse (*cucurbita lagenaria* Linn.), cultivée pareillement à l'Ile-de-France, sous le nom de calabasse douce, que l'on apprête de la même manière que plusieurs autres cucurbitacées en usage dans cette île, tels que la papangate & les patoles, espèces de courge.

BELEM-CANDA. (*Voyez MORÉE*, n°. 3.) C'est l'*ixia chinensis* Linn.

BEL-ERICU : nom malabare d'une plante de la famille des apocinées, décrite sans figure par Rheed, *Hort. malab.* vol. 11, pag. 56. L'*ericu*, à la suite duquel cette plante est rapportée, est l'*afclepias gigantea* Linn.

BELIGANA : nom languedocien de la vigne sauvage.

BELILLA : nom que les habitants de la côte malabare donnent à un bel arbrisseau de leur pays, dont Rheed fait mention, *Hort. malab.* 2, p. 27, tab. 18: il a de très-grands rapports avec le BALIGARAB (*voyez ce mot*), si même ce n'est pas la même plante; il appartient à la famille des rubiacées; il se distingue surtout par une des divisions de son calice, qui s'allonge & s'étend considérablement, & prend la forme d'une feuille marquée de cinq nervures. Rumphé a regardé cet arbrisseau comme le même que *son daun putri* ou *sodium principis*, Herb. Amb. 4, pag. 111, tab. 51. Burmann a rapporté l'un & l'autre comme synonymes de son *musfanda*. M. de Lamarck les laisse aussi réunies en supprimant le genre, & reportant au *gardenia* cette plante de Rheed, Rumphé & Burmann. Vahl & Willdenow admettent la synonymie, en laissant néanmoins subsister le genre *musfanda*. Adanson, dans le Supplément à la première édition de l'*Encyclopédie*, regarde les trois plantes comme trois espèces distinctes, & il faut avouer que l'on ne sera assuré de l'identité des plantes figurées par Rheed & Rumphé que lorsqu'elles auront été vérifiées sur les lieux ou dans les herbiers. (*Aub. Pet. Th.*)

BELIPATHÆGAS : nom que l'on donne, dans l'île de Ceilan, à l'*hibiscus populatus* Linn., espèce de ketmie.

BELLADONE. *Atropa*. Ce genre a subi tant de réformes, qu'il est presque disparu en entier. Il est vrai que Linné y avoit introduit quelques espèces qui appartiennent évidemment à d'autres genres. Ainsi l'*atropa physalodes* Linn., qui est l'*atropa daturaefolia* Thor. Chl. Land. 24, renvoyé aux *physalis* par M. de Lamarck, constitue le genre *nicaandra* de Gærtner. (*Voyez COQUERET*, n°. 13, & *Suppl.*) La mandragore forme un genre particulier dans Tournefort, Jusieu, Gærtner, &c. Scopoli fait un genre du *belladono*. L'*atropa solanacea* Linn. appartient aux morelles, &c. Enfin, MM. Ruiz & Pavon ont établi le genre *sarcacha*, très-voisin des *atropa*, & qui pourroit rigoureusement y être réuni. (*Voyez SARAQUIER.*)

L'*atropa mandragora*, n°. 1, Bull. Herb. tab. 145 & 146, var. β , est le *mandragora acanthis* Gærtn. de Fruct. & Sem. 2, pag. 256, tab. 13, fig. 1. — Blackw. tab. 364.

L'*atropa belladonna*, n°. 2, est figuré dans les Illustrations,

Illustrations, tab. 114. fig. 1. — Bulliard, *Herb.* tab. 29.

L'*atropa procumbens* Cavan. (belladone couchée, Ill. 2, pag. 12) a été mentionnée à l'article SARAQUIER, n°. 4.

Enfin, l'*atropa frutescens*, n°. 4, est figuré dans les *Illustr.* tab. 114, fig. 2, & l'*atropa arborens* Linn (belladone, n°. 3) — Il la même plante que le cisteau campanulé, n°. 6.

On trouve dans la Flore du Pérou quelques autres espèces d'*atropa*, qui sont suite aux précédentes.

f. BELLADONE ombellée. *Atropa umbellata*. Ruiz & Pav.

Atropa caule frutescente, foliis ovatis cordatisque, integerrimis angulatisque; floribus umbellatis, corollis revolutis. Flor. peruv. 2. pag. 44. tab. 181. fig. 4.

Ses tiges sont glabres, flexueuses, ligneuses, hautes de quatre pieds; les rameaux dichotomes; les feuilles alternes, solitaires ou geminées, ovales, en cœur, très-entières, les inférieures anguleuses, légèrement pubescentes. Les pédoncules font axillaires, courts, pendans, soutenant huit à douze fleurs pédicellées, presque en ombelle. Leur calice est pubescent, à cinq découpures profondes, aiguës; la corolle jaune; le tube cylindrique, d'un pourpre-foncé; le limbe à cinq divisions profondes, rabattus. Le fruit consiste en une baie blanche, globuleuse, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît sur les collines, aux environs de Lima. f

6. BELLADONE biflore. *Atropa biflora*. Ruiz & Pavon.

Atropa caule fruticoso; foliis ovatis, acutis, integerrimis; pedunculis bifloris, fluminibus corollis longioribus. Flor. peruv. 1. tab. 181. fig. 6.

Arbrisseau légèrement pubescent, haut de deux pieds, ayant des tiges droites, cylindriques; des rameaux pendans, légèrement anguleux, garnis de feuilles ovales, aiguës, très-entières, les inférieures solitaires, les supérieures geminées, l'une un peu plus grande. Les fleurs sont latérales, axillaires; les pédoncules plus courts que les feuilles, terminés par deux fleurs pédicellées, inclinées; le calice légèrement pentagone; la corolle trois fois plus longue que le calice, un peu urcéolée, striée, velue en dehors; le tube d'un blanc-vertâtre ou de pourpre; le limbe d'un jaune-vert, à cinq découpures redressées, aiguës; les anthères saillantes, d'un bleu-clair; le stigmate bleu, à deux lobes; les baies arrondies, un peu comprimées, blanches, de la grosseur d'un pois; les semences petites & jaunâtres.

Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante croît dans le Pérou, aux lieux humides. f

7. BELLADONE bicolor. *Atropa bicolor*. Ruiz & Pavon.

Atropa caule fruticoso; foliis ovatis, angulatis, glabris; pedunculis 3-4 floris. Flor. peruv. 2. pag. 45.

Ses tiges sont ligneuses, hautes de six à sept pieds, droites, rameuses, cylindriques; les rameaux anguleux; les feuilles ovales, solitaires & geminées, glabres, anguleuses, aiguës; les pédoncules axillaires, cylindriques, soutenant trois à quatre fleurs; la corolle tubuleuse, d'un rouge-obscure, verte à son limbe.

Cette plante croît dans les lieux ombragés, au Pérou. f

8. BELLADONE rude. *Atropa aspera*. Ruiz & Pavon.

Atropa caule herbaceo; foliis ovatis, geminis, altero minori; floribus solitariis, cernuis; corollis subdecemfidis. Flor. peruv. 2. pag. 45.

Plante herbacée, hérissée de poils rudes, dont les tiges sont droites, anguleuses, hautes de deux pieds, dichotomes, rameuses, garnies de feuilles geminées, pétiolées, ovales-oblongues & lancéolées, très-entières, un peu finuées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, pendantes, axillaires ou dans la bifurcation des rameaux; la corolle d'un bleu-jaunâtre, violette dans son centre, campanulée, étalée, presque à dix découpures, cinq alternes, aiguës, cinq autres échancrées. Les filaments sont velus & violets; les baies blanches, de la grosseur d'un pois; les semences petites, roulées.

Cette plante croît sur les collines, aux environs de Lima.

9. BELLADONE barbue. *Atropa aristata*.

Atropa (physalis aristata), caule fruticoso; foliis oblongis, integris, glabris; ramis, petiolis pedunculisque lanuginosis; denticulis caulinis aristatis. Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 144.

Cette espèce appartient plutôt aux *atropa* qu'aux *physalis*. C'est un arbrisseau dont les rameaux sont cylindriques, comprimés, presque anguleux & flexueux à leur partie supérieure, revêtus d'une écorce presque tubéreuse, tomenteuse, cendrée ou un peu jaunâtre. Les feuilles sont alternes ou geminées, ovales-lancéolées, entières, acuminées, presque glabres; les pétioles pubescens; les fleurs presque solitaires, axillaires; les pédoncules tomenteux, à peine de la longueur des pétioles; les dents du calice terminées par une longue pointe en forme d'arête; la corolle jaunâtre, campanu-

Hhh

nuées; les découpures lancéolées, acuminées, très-aiguës; les baies globuleuses, munies, à leur base, du calice persistant.

Cette plante croît aux îles Canaries. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *(V. f.)*

10. BELLADONE de Rothe. *Atropa Rothii.*

Atropa (umbellata), *caule erecto, herbaceo, hirsuto; umbellis axillaribus, pedunculatis, cernuis; floribus plicatis, filamentis basi barbatis; foliis ovatis, scabris, oppositis geminis.* Roth. Catal. 2. pag. 26.

Cette plante a le port de l'*atropa promulens* Cav. ou *atropa plicata* Roth. (voyez SARAQUIER, n.º 4); mais ses tiges sont droites, herbacées, hérissées, garnies de feuilles; les inférieures simples, les supérieures geminées, ovales, très-entières, légèrement hérissées de poils rudes. Les fleurs sont disposées en ombelles axillaires, pédonculées, pendantes. La corolle est plissée; les filaments barbus à leur base. Le fruit consiste en une baie globuleuse, luisante, d'un noir-livide, marquée de quatre lignes en croix, divisée en deux lobes.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (Roth.)

BELLADONNA. Ce nom est employé par quelques auteurs pour désigner quelques *atropa*, dont on a fait un genre particulier (voyez BELLADONE); il est encore appliqué, selon Plukenet, au *solanum vespertilio*, plante épineuse des Canaries, où elle est nommée *permenon*. Ses feuilles sont en cœur. Ses fruits contiennent un suc rouge, que les femmes de ces îles emploient pour se colorer les joues & se rendre plus agréables. On trouve aussi, dans la famille des narcissus, l'*amaryllis belladonna*, nommée *belladone* dans les jardins.

BELLAN: nom arabe de la pimprenelle épineuse (*poterium spinosum* Linn.).

BELLAN-PATSI: nom que les habitants de la côte malabare donnent à une plante remarquable, que Kheed a décrite & figurée, *Hort. malab.* 12, pag. 73, tab. 40. Linné l'a rapportée au *lycopodium cernuum*. Elle se trouve répandue dans tous les pays situés entre les tropiques; elle a été figurée par Plumier, Plukenet & Burmann. Adanson, dans le Supplément de la première Encyclopédie, prétend que ce sont quatre plantes distinctes, contenues en une seule. L'observation de ces plantes dans leur pays natal ou dans les herbiers pourroit décider cette question; car les figures & les descriptions de ces auteurs sont trop vagues pour rien affirmer de certain à ce sujet. (*Arch. Bot.-Th.*)

BELLARDIA: nom substitué par Schrebbère à celui de *rontanea*, employé par Aubler pour une plante de Cayenne (voyez TONTANE). Allioni donne le même nom à des espèces de *rhinanthus*, qu'il détache de leur genre primitif. (Voyez COCRETE.)

BELLE-DAME. Ce nom est donné à plusieurs plantes, telles que l'archoche des jardins (*atriplex hortensis* Linn.), la belladone (*atropa cellasiana* Linn.) & une espèce d'amaryllis (*amaryllis belladonna* Linn.).

BELLE DE NUIT. On nomme ainsi les différentes espèces de nictage (*mirabilis* Linn.), parce que leurs fleurs, légèrement odoriférantes, ne s'épanouissent qu'à l'entrée de la nuit.

BELLE DE VITRY. C'est une variété du pêcher, décrite & figurée par Duhamel dans son *Traité des arbres fruitiers*, vol. 1, p. 36, tab. 25. C'est l'amandier-pêcher.

BELLERIS, BELLEREGLI. C'est un des mirobolans mentionnés dans les divers Traités des drogues, sous le nom de *myrobolanus bellericus*. Grenier, qui a examiné l'intérieur de sa graine, la regarde comme une véritable espèce de mirobolan, & croit que c'est la même plante que le *rami* des Malabares, figuré dans l'*Hort. malab.* 4, p. 23, tab. 10.

BELLIS. (Voyez PAQUERETTE.)

BELLIS, BELLIO. On trouve sous ce nom, dans Pline & dans d'autres anciens auteurs, non-seulement la plante si connue sous celui de *paquerette*, mais encore plusieurs espèces de chrysanthème, & surtout la marguerite ordinaire (*chrysanthemum leucanthemum* Linn.).

BELLIUM. (Voyez PAQUEROLLE.)

BELLONIA. (Voyez BELLON.)

1. BELLON à feuilles rudes. *Bellonia aspera*. Linn. — Lam. Ill. tab. 149. — Swartz, Prodr. 42.

2. BELLON épineux. *Bellonia spinosa*. Swartz. *Bellonia foliis ovatis, angulatis, dentato-serratis; pedunculis axillaribus, unifloris.* Swartz, Prodr. 42, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 382.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ deux pieds, sur une tige droite, rameuse, épineuse, divisée en rameaux opposés, roides, glabres, étalés; les épines opposées ou à ternes, piquantes, fragiles, scabres, placées entre les feuilles, plus longues que les pétioles; les feuilles médiocrement pétiolées, opposées en croix,

ovales ou oblongues, anguleuses, un peu dentées, un peu rudes en dessus, blanchâtres en dessous, longues d'un pouce; plusieurs autres feuilles beaucoup plus petites dans l'aisselle des premières; les fleurs petites, blanchâtres, axillaires, soutenues par des pédoncules glabres, rougeâtres, opposés aux feuilles. Le calice à cinq découpures lancéolées, un peu velues, persistantes; la corolle presque en roue, à cinq découpures profondes. Le fruit consiste en une capsule oblongue, aqueuse, petite, à pointe recourbée, à une loge, à deux valves; un réceptacle longitudinal, opposé aux côtés de la capsule; les femences nombreuses, fort petites, obliques, acuminées.

Cette plante croît dans les forêts, à Saint-Domingue, le long des fleuves. H

BELO. « Des trois plantes dont il est fait mention dans cet article, les deux premières, dit M. de Jussieu, distingues par leur écorce grise ou blanchâtre, qui s'a fait nommer *arbres de pieux blancs*, présentent de plus des feuilles allées sans impaire, & une trinitification qui paroit être celle de la famille des savonniers. L'espèce à points froids, dont le fruit est globuleux comme celui d'un *melicocca*, est peut-être de ce genre (peut-être aussi le *pometia pinnata* de Forster le rapporte-t-il à la même plante); celle à feuilles plus larges, qui a un fruit triangulaire, ressemble beaucoup à un *cupania*.

« La troisième, nommée *arbre de pieux noir* à cause de la couleur noire de son écorce, est d'ailleurs différente. Ses feuilles sont alternes & simples. Ses fleurs, en petit nombre, sont disposées en grappes. Ses fruits, de forme ovoïde, s'alongent, se ferment, sous une peau mince, quatre noyaux. Ces caractères sont insuffisans pour déterminer son genre & même sa famille. »

BELOËRE : nom malabar sous lequel Rheed a fait connoître, dans son *Hort. malab.* 6, pag. 77, tab. 45, une plante de la famille des malvacées, qui a été décrite par M. de Lamarck sous celui d'*abutilon à feuilles de peuplier* (*sida populifolia*). Le *katu-belore* du même ouvrage est une autre malvacée, mais du genre *betmie*.

BELOU : nom brachmane du *covalam* des Malabares, le même que le *beli* ou *beliglas* de l'Île de Ceilan, que Linné rapportoit au genre *eratava*, & dont M. Correa a fait un nouveau genre sous le nom d'*Egle*, & qu'il réunit à la famille des orangiers. (Voyez *EGLÉ* & *TAPIER*, n°. 5.)

BELUTTA : mot employé dans la composition de plusieurs noms de plantes de la côte de Malabar, citées par Rheed dans son *Hortus malabar.* Il paroit que c'est le même mot que *bel* & *beta*, qui veut dire *blanc*, distingué par une terminaison qui

a sûrement une signification particulière. Par un changement commun à presque toutes les langues, le même mot devint, dans certaines occasions, *velutta*. Ces observations sont de M. du Petit-Thouars, ainsi que les articles suivans, dans lesquels entre le mot *belutta*.

BELUTTA-ADECA-MANJEN. Suivant Rhed, c'est le nom malabar d'une plante figurée & décrite dans l'*Hort. malab.* 10, pag. 75, tab. 58, qui est le *passiflora argentea* (*calysta margaritacea* Linn.).

BELUTTA-AMEL-PODI : nom sous lequel Rheed a décrit & figuré, dans son *Hort. malabar.* 6, pag. 85, tab. 48, un arbrisseau inéteffant, mais dont il a donné trop peu de détails pour qu'on puisse le classer convenablement. Il a des fleurs semblables à celles du jasmin, & appartient peut-être à quelques apocinées. On l'emploie contre la morsure des serpents; ce que désigne le mot *amel-podi*, qui, dans la langue de la côte malabar, s'applique à plusieurs plantes réputées comme spécifiques contre ces terribles accidens.

BELUTTA-ARELI. Le *urofo* (*nerium*) à fleurs blanches est ainsi nommé sur la côte malabar, au rapport de Rheed, *Hort. malabar.* 9, pag. 3, tab. 2. L'espèce à fleurs roses y est sous le nom d'*areli* ou *spoonia areli*.

BELUTTA-KAKA-KODI : nom malabar d'une plante rampante, de la famille des apocinées, mentionnée par Rheed dans son *Hort. malabar.* 9, pag. 7, tab. 5 & 6, qui paroit devoir se rapporter au genre *echinops*. Elle est remarquable par ses feuilles en cœur, qui ont près d'un pied de diamètre. Ses fleurs sont grandes, rassemblées en corymbe terminal, blanches au moment de leur épanouissement; elles exhalent alors une odeur des plus fœves, approchant de celles du girrile. En vieillissant elles jaunissent, & leur odeur se change en celle de melon bien mûr. Les follicules qui leur succèdent, sont aussi très-grandes, & contiennent des graines à argettes folyules. Le mot *kaka-kodi* s'applique à plusieurs autres plantes de la même famille.

BELUTTA-KANELLI : nom que les habitants de la côte malabar donnent à un arbre de leur pays, figuré dans l'*Hort. malabar.* 5, tab. 20, qui paroit appartenir à la famille des myrtées. On le nomme encore *ben-miuel* & *postija* dans le même lieu; il s'élève à une hauteur modeste. Ses feuilles, qui sont entières & opposées, ont une saveur & une odeur aromatiques. Son fleur est composée d'un calice adhérent, à cinq divisions, & d'un grand nombre d'étamines qui paraissent avoir été recouvertes par un pétale en forme d'un scut, comme dans le genre *calyptranthes*. Le fruit qui

Hhh h 2

leur sucché, est couronné par les divisions du calice, & contient une graine aromatique. Ses feuilles, réduites en poudre, se prennent dans du lait pour arrêter les diarrhées.

BELUTTA-MODELA-MUCU : nom d'une plante décrite & figurée par Rheed dans l'*Hortus malabar.* 10, pag. 159, fig. 80. Elle parait devoir se rapporter au genre *polygonum* (renouée), d'autant que le nom *modela-mucu* est appliqué à d'autres espèces de ce genre, telles que la renouée barbuë & celle d'Orient, qui sont le *modela-mucu* & le *schovonna-modela-mucu* des Malabares; mais on n'a point exprimé dans la figure les gaines des feuilles, qui sont très-remarquables dans ce genre.

BELUTTA-ONAPU. Rheed a décrit & figuré, dans son *Hort. malabar.* 9, pag. 99, fig. 51, une plante qui est une espèce de balsamine (*impatiens*), que M. de Lamarck regarde comme une variété de celle qu'il nomme *balsamine fasciculée*. Six espèces du même genre, décrites & figurées sous le nom coll. d'*onapu*, sont distinguées par un prénom qui exprime leur différence. C'est ainsi que celle-ci est nommée *belutta*, parce qu'elle a les fleurs blanches.

BELUTTA-POLA-TALY : nom sous lequel Rheed a fait connaître (*Hort. malabar.* 11, p. 73, tab. 58) une plante bulbeuse que Linné a rapportée au genre *asiatium*, dont Gærtner a fait le genre *bulbine*, fondé sur ce que les capsules se changent en bulbes, comme il arrive à quelques espèces d'ail. Elle s'est naturalisée le long de quelques ruisseaux de l'île de France. Le nom de *pola*, qui entre dans la composition de son nom malabar, sert dans cette langue à désigner plusieurs plantes bulbeuses. (Voyez *AMARYLLIS*, n°. 28, *Suppl.*)

BELUTTA-TSIJAMPAKAM : nom malabar sous lequel Rheed a fait connaître, dans son *Hort. malabar.* 3, pag. 69, tab. 53, un des plus beaux arbres de l'Inde. Les Brame le nomment *nagatempo*, & les habitants de Ceilan *naghas*. Outre la beauté de ses fleurs, dont les Indiens aiment à se parer, il est recommandable par son bois, qui est de la plus grande dureté : aussi les Européens lui ont-ils donné le nom de *bois de fer*. Linné en a formé un genre qu'il a consacré à la mémoire du médecin arabe Mesué; il ne comprend jusqu'à présent qu'une seule espèce, qui est le *mesua ferrea*. (Voyez *NAGAS*.)

BELUTTA-TSIJORI-VALLI : espèce de *cissus* de la côte de Malabar (*cissus pedata*), remarquable par sa grappe, dont les grains sont blancs; ce qui le distingue du *cissus carnosus*, qui est le *tsijori-valli* du même pays. On voit la description de ces

plantes dans l'*Hort. malab.* vol. 7, pag. 17 & 19, tab. 9 & 10. (Voyez *ACHIT*, n°. 10 & 11.)

BELVÉDÈRE : nom vulgaire d'une espèce d'ansérine (*chenopodium scoparium* Linn.), que l'on cultive dans les jardins à cause de sa verdure agréable & de l'élégance de son port; ce qui l'a fait nommer *belvédère ou belle à voir*. En Italie, où elle croît naturellement, on en fait des balais. (Voyez *ANSÉRINE*, n°. 17.)

BELVISIA. Ce genre avoit été établi par M. Mirbel pour plusieurs espèces d'*aerofitium* & quelques autres plantes, dont la fructification occupe tout l'espace entre le bord de la feuille & la nervure principale, disposée en lignes de l'un & de l'autre côté. La membrane qui la recouvre, est attachée sur le bord de la feuille, & se détache du côté de la nervure principale. Les *aerofitium spicatum* — *australe* — *digitatum* — *fil quosum* de Linné faisoient partie de ce genre; il étoit consacré à M. Paliliet de Beauvois. (Voyez *ACROS-TIQUE*, & les reformes établies par Swartz.)

BEM ou BEN : mot employé, sur la côte malabar, par ses habitants, dans la composition de plusieurs noms de plantes de leur pays; il veut dire blanc. « On peut remarquer, dit M. Aubert du Petit-Thouars, qu'il existe dans la composition des mots des langues du Malabar & des pays malais, la même différence qu'entre celles du midi de l'Europe, à commencer par la France, & celle du nord, en y comprenant l'Angleterre : c'est que, dans les premières, l'adjectif précède ordinairement le substantif, & que, dans les autres, c'est le contraire. On en trouve la preuve dans les noms malabares suivants.

BEM-CURINI. Rheed, *Hort. malab.* 2. p. 33, tab. 21. Nom malabar du *justicia betonica* Linn., carmantine à fleurs courtes.

BEM-NOSI. Rheed, *Hort. malab.* 2. pag. 15, tab. 12. M. de Lamarck regarde cette plante comme une variété du gattier à trois feuilles, qui est le *nos* des Malabares.

BEM-PAVEL : nom malabar sous lequel Rheed a décrit & figuré, dans son *Hort. malab.* 8, p. 35, tab. 18, une plante cucurbitacée, à racine tubéreuse. La petiteesse de ses fleurs, qui sont jaunes, & ses feuilles découpées, peuvent faire presumer qu'elle appartient au genre *momordica*.

BEM-PUL : nom vulgaire d'une plante de l'île de Ceilan, dont Gærtner a décrit le fruit sous le nom de *trichopus zeylanicus*, 1. pag. 44, tab. 14.

BEM-SCHETTI. Rheed, *Hort. malab.* 2. p. 19, tab. 14. Le nom d'*ixore blanche* qu'on a donné à

cette plante est la traduction du nom malabare ; car le *schett* du même ouvrage est l'*ixore*, surnommé *scarlate* à cause de la couleur de ses fleurs. (Voyez IXORE, n°. 1 & 2.)

BEM-TAMARA. Rheed, *Hort. malabar.* 11, pag. 61, fig. 31. Il existe sur la côte malabare deux espèces de *nelumbo*, l'une à fleurs roses, l'autre à fleurs blanches. La première est le *tumara*, & on distingue la seconde par la dénomination de *bem-tumara*.

BEMBI. Suivant Rheed, c'est le nom donné par les Brame à l'*acorus calamus*, qu'il a décrit & figuré sans fructification sous celui de *vaembu*, Hort. malab. 11, pag. 99, tab. 48.

BEMBIX. Genre de plantes établi par Loureiro, à fleurs complètes, régulières, polypétalées, qui paroît se rapprocher de la famille des caryophyllées, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, ne renfermant jusqu'aujourd'hui qu'une seule espèce.

Ces arbrisseaux à des tiges grimpantes, cherchant un appui sur les corps autour desquels elles s'enroulent ; elles sont garnies de grandes feuilles opposées, en forme de coin. Les fleurs sont disposées en petites grappes au sommet des rameaux ; elles ont chacune un calice à trois divisions ; une corolle composée de cinq pétales ovales ; dix étamines, dont cinq alternes plus longues ; un ovaire libre, surmonté de trois styles plus épais au sommet qu'à la base, terminés chacun par un stigmate comprimé vermiculairement. Le fruit est une petite baie à trois loges. Ses feuilles sont employées par les habitants de la Cochinchine pour couvrir les toits des maisons, les barques & autres objets. Ces couvertures sont très-légères, & durent fort long-temps.

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochinchine. *H.*

BEN. (Voyez ANOME & BOIS néphrétique, Suppl.)

BEN est, selon M. du Petit-Thouars, un nom de la langue de la côte du Malabar, dont Rheed a emprunté ceux qu'il a employés dans son *Hortus malabaricus*, & sous lesquels il a décrit les plantes de ce pays. Comme ceux de *bel* & de *belutta*, il veut dire blanc. Il se change, à ce qu'il paroît, en *bem*. (Voyez le mot, Suppl.)

BEN-DAKI. Suivant Rheed, *Hort. malab.* 2, pag. 1, tab. 1 & 8, c'est le nom que les Brame donnent au baquois odorant (*pandanus odoratissimus* Linn.).

BEN-DARLI. Ce nom brame est donné à cinq

plantes différentes, citées dans l'*Hortus malab.* de Rheed : 1°. au *pari-paroa*, vol. 5, p. 91, tab. 46, qui est le *gewia orientalis* Linn. ; 2°. à l'*ana-parua*, vol. 7, pag. 75, tab. 40 : c'est le *pothos scandens* Linn. ; 3°. à l'*anjala*, vol. 7, p. 55, tab. 18, qui paroît être une espèce de *cissoria* ; 4°. au *maletta mala-maravara*, vol. 12, pag. 57, tab. 29 : c'est une espèce d'acrostiche à feuilles simples (*acrostichum heterophyllum*) ; 5°. enfin, au *tamarouel*, vol. 12, pag. 27, tab. 14, que les botanistes nomment *tyopodium phlegmaria*.

BEN DE JUDEE. (Voyez BENJOIN.)

BEN-KADALI. Rheed a décrit sous ce nom, dans son *Hort. malab.* 4, pag. 89, sans donner de figure, une plante qui paroît être une espèce de mélastome, d'après que le *kadali*, à la suite duquel il est décrit, est le *mélafome malabarikroide*, n°. 16. Lam.

BEN-KALESJAM. Rheed a décrit & figuré sous ce nom de la langue malabare (*Hort. malab.* 4, pag. 71, tab. 34), un arbre remarquable par les gales dont il se couvre, & qui sont produites par des piqûres d'insectes. Jusqu'à présent on ne lui a pas reconnu d'autre fructification. Ses feuilles ailées & alternes seroient présumer qu'il doit appartenir à la famille des favoniers.

BEN-MENJA. Rheed a décrit sous ce nom, dans son *Hort. malabar.* 4, pag. 113, tab. 57, un arbre de trente pieds de haut, dont il n'a point donné la fructification, parce qu'elle n'est point parvenue à sa connoissance. Des racines de cet arbre on fait une décoction alexipharmaque, qui est très-vantée contre les fièvres malignes. Son écorce, bouillie avec le *calamus aromaticus* & du sel, dans une décoction de riz, arrête, dit-on, sur-le-champ les vomissements qui proviennent de la morsure des serpens.

BEN-NAVEL. (Voyez BELUTTA-KANELLI.)

BEN-PALA. Plante du genre *euphorbe*, figurée & décrite par Rheed, *Hort. malab.* 10, p. 115, tab. 58 ; elle doit se rapporter à la *fidion* qui comprend les espèces à tige ou panicules dihotomes.

BEN-TIRU-TALI. Rheed a décrit & figuré sous ce nom, dans son *Hort. malab.* 2, pag. 111, tab. 54, une espèce de liseron à feuilles ovales, entières, & à fleurs blanches, solitaires, portées sur de longs pédoncules. Le *tiruti* du même ouvrage est une autre espèce de liseron.

BEN-TSJAPO : nom brame du *kampferia rotunda* Linn. (Voyez ZÉDOAIRE.)

BENAFLOULI : nom d'un rix du Bengale, très-fin & très-long, de la plus grande blancheur, qui, au rapport de Colligny, répand, lorsqu'il est cuit, une odeur suave & agréable : c'est ce qui l'a fait nommer *benafoul*, qui signifie *oavofere* dans la langue du pays. (*Jug.*)

BENA-PATSJA : nom malabare de l'héliotrope d. s. Indes (*heliotropium indicum* Linn.), cité dans l'*Hort. malab.* 10, pag. 95, tab. 43.

BENCARO : nom brame du *covalam* des Malabars, figure dans l'*Hort. malabar.* 1, pag. 89, tab. 50, qui est le *sterculia balanphas* Linn.

BENDURU, espèce de fongère de Ceilan, qui paroit appartenir au genre *uena* Cavan. ou *ramondia* Mirb., dans lequel ces auteurs ont rapporté l'*ophioglottis* foudens Linn. & les autres plantes qui ont le même caractère.

BENEFFIGI ou **SENEFFIGI** : noms arabes de la violette de mars, suivant Dalechamp.

BENGALE. On nomme ainsi, dans l'Inde, une racine employée en médecine, plus connue dans les pharmacies sous le nom de *cussumaria*.

BENGENI, **ALBENGENI** : noms de l'arbre du benjoin dans l'Indostan, suivant Colligny.

BENGI. Dalechamp dit que les médecins arabes nomment ainsi la jujubière.

BENGIECHEST : nom arabe du *vicia agnus castus*.

BENGIRI ou **GEIRI** : arbre de la côte malabare, décrit & figuré sous ce nom par Rheed, *Hort. malab.* 4, pag. 105, tab. 51 ; il appartient à la famille des euphorbes. On peut même présumer, malgré l'insuffisance de la description, qu'il appartient au genre *glutier* (*Jarum* Linn.), d'autant que toutes les parties contiennent un suc lacteux, très-abondant & très-âcre : cependant on mange ses semences ; mais il faut bien faire attention à ce que la pulpe qui entoure leur coque ne touche point la peau, & surtout les lèvres ; car le suc qu'elle contient, occasionne des ulcères qui sont quelquefois suivis de la mort. C'est pour cette raison que les Portugais de l'Inde les nomment *nelica* *ad inferno* ou *de enfer*, pour les distinguer de celles du *phyllanthus emulica*, qui est pour eux le *nelica*. (*Poi.-Th.*)

BENISSA : nom brame d'un arbre que Rheed a décrit & figuré, *Hort. malab.* 5, p. 41, tab. 21, sous celui de *ponagam*. Il paroit être de la famille des euphorbes, & voisin du ricin.

BENJOIN : nom d'une substance résineuse que le commerce fait venir de l'Inde pour être employée à différents usages. Il ne paroit pas qu'elle ait été connue des Anciens ; mais elle l'est d'un long-tems des Modernes, par l'entremise des Arabes, de qui nous avons emprunté ce mot. Comme tant d'autres venant de la même source, il s'est fort altéré : aussi a-t-il beaucoup varié, suivant les auteurs. En passant par différentes fièvres, il est devenu, suivant les uns ou les autres, le *benjoim*, le *benjoin*, le *beniv*, le *benjoin* ou *al'engeni*, de l'Indostan ; le *ben* de Judée ; enfin le *benjoin*. Ce dernier mot est le véritable, & le type de tous les autres. S'il faut en croire Gaucias, il signifie *filz de Jaos*, parce qu'il croît dans un endroit de ce nom proche de Samarie. Cette étymologie ne s'accorde point avec ce que l'on connoît de l'origine de cette drogue. Peut-être cependant, en débrouillant son histoire, trouvera-t-on le moyen de la rendre plus vraisemblable.

Depuis l'auteur que nous venons de citer, cette histoire s'est élevée très-haut. La notice qu'il en a donnée, a été copiée successivement par tous ceux qui en ont traité, entr'autres J. Bauhin & Rai, sans qu'aucun ait rien ajouté d'intéressant. On a été surtout très-logeux sans avoir de notions certaines sur le végétal qui produisoit le benjoin. Commelin crut le reconnaître dans un laurier de Virginie, qui est devenu le *Laurus benzoe* Linn. ; mais il ne fut pas difficile de s'apercevoir qu'une drogue apportée d'Afrique ne pouvoit provenir d'un arbre de l'Amérique ; en sorte qu'on fut obligé de le tourner d'un autre côté. Linné reçut ensuite un autre arbrisseau, sous le nom de *benjoin* ; mais n'ayant pu le voir fleurir, il le rapporta, sur l'inspection seule de son port, au genre *croton*, & en fit son *croton benzoe*.

Quelque tems après, Jacquin ayant reçu de M. Lemonnier deux graines, sous le nom de *benjoin de Bourbon*, il en confia une à la terre ; elle lui produisit un arbrisseau qu'il fit figurer, & d'après l'anatomie de la seconde graine, il le reconnut pour une espèce de *terminalia*, & lui donna le nom de *terminalia benzoe* ; mais Murray, qui l'introduisit dans la seconde édition du *Systema vegetabilium*, remarquant qu'aucune de ses parties ne déceloit l'odeur de benjoin, donna ce qui fut réellement l'arbre qui le produisoit. Effectivement, d'après les recherches des naturalistes anglais, surtout de Matklien, il parut constant qu'à Sumatra, qui fournit la plus grande partie de cette substance importante pour le commerce, elle provenoit d'un arbre congener du *Myrac* ou aliboufier. Dryander l'a décrit dans les *Transactions de la Société royale*, année 1777.

Tel est le précis des travaux de la botanique sur cet objet. Une autre science est venue au secours de ces conjectures. La chimie ayant découvert

que le benjoin étoit une substance d'une nature différente de la plupart des autres résines, & le produit d'un acide particulier, que cette résine se retrouvait dans différents végétaux, comme le camphre & le caoutchou ou gomme élastique, il ne doit pas paraître étonnant que, suivant les pays, différents arbres le produisent, & que différents pays le fournissent au commerce. Cet acide, différemment combiné, existe encore dans la vanille, appelée dans quelques lieux *benjoinil*, & il sert de base à plusieurs buimes, tels que ceux du Pérou & de Tolu; il s'est trouvé pareillement dans le *styrac* ou la résine produite par l'arbousier commun; & comme cet arbrisseau croît dans toutes les parties méridionales de l'Europe & des côtes de l'Afrique baignées par la Méditerranée, par conséquent en Palestine, il ne seroit pas étonnant que les Arabes, entraînés par l'analogie, eussent confondu, sous le même nom de *benjoin*, le *styrac* & le benjoin. D'après cette découverte chimique, on n'eût plus surpris de retrouver l'odeur de benjoin dans le laurier benjoin & le liquidambar. La chimie, poussant plus loin ses recherches, a fini par découvrir cette substance dans le règne animal.

Il reste encore un point important de l'histoire naturelle du benjoin à éclaircir : c'est celui du benjoin de Bourbon. Comme l'a remarqué Murray, aucune partie de cet arbre n'annonce extérieurement qu'il renferme cette substance, au point qu'à l'île-de-France, où il est aussi commun qu'à Bourbon, on est persuadé que ce nom lui a été donné, par corruption, de *bois qui est bien joint*, parce que son bois est très-liant, & recherché à cause de cela par les charbons. Cette étymologie a été recueillie d'abord par Lacaille, ensuite par M. de Saint-Pierre; mais à Bourbon, plus anciennement habitée, on y connoît la résine que cet arbre produit, & dans les premiers tems de la colonie, on s'en servoit dans les églises au lieu d'encens; ce qui avoit engagé Commerçon à le nommer *resina*; elle est devenue plus rare, parce qu'il n'y a que les très-vieux pieux qui en produisent. Ce n'est que sur le bois, dépouillé de son écorce, qu'elle se manifeste : c'est se présente le plus souvent sous la forme d'une grosse larme brune; elle ne consiste d'abord qu'en une pellicule mince & fragile. En la cassant, on trouve sur l'intérieur rempli d'une eau rousse, presque insipide & sans odeur sensible. Il paroît qu'elle se coagule lentement. L'examen de ces larmes & des arbres qui les produisent, porte à croire que cette eau n'a rien de commun avec le lait & les autres sucs colorés qui produisent les résines dans les autres plantes, & que c'est l'eau même de la pluie, qui, filtrant à travers les fibres des troncs, entraîne avec elle le benjoin, qui y est déposé en particules très-menues; elle s'y font plus dissoutes, mais seulement suspendues; en sorte qu'on peut regarder cette production comme une espèce de dissolution

végetale. La suppression du benjoin dans les fibres du bois n'est pas éraruite, puisqu'il s'en dégage en fleurs par la combustion.

Le benjoin du commerce est une substance résineuse, brune, fragile, d'une odeur particulière, agréable, qui se développe avec plus d'énergie quand on la fait brûler. On le distingue par différents noms. Le benjoin le plus pur est le *Samydalotte*, nommé ainsi parce qu'il est divisé en petites masses ou pains qui ont la forme d'une amande, suivant Maréchal, qui a donné les détails les plus authentiques sur le benjoin. A Sumatra on le nomme *mayan*. Le plus pur est surnommé *café*, ou *té*, que l'on distingue en tête d'Europe & en tête de l'Inde, suivant les pays pour lesquels il est destiné. La plus grande partie de celui qui arrive en Angleterre est exportée dans les pays catholiques, où on le brûle comme encens dans les églises. Les usages auxquels on l'emploie en médecine en consomment la moindre quantité, quoiqu'en lui attribue des propriétés assez énergiques. En général, on le regarde comme bœchique, vulnératoire & incisif; il entre dans plusieurs compositions, surtout quand il est sous la forme de fleurs; il est entr'autres la base du cosmétique, vante sous le nom de *lait virginal*. (*Ann. du P. Th. Didion, des scienc. nat.*)

BÉNOÏTE. *Geum*. Linn. *Caryophyllata* Lam. Tournefort avoit donné le nom de *geum* à un genre de plantes qui renfermoit plusieurs espèces des *fenistraga* de Linné, dont l'ovaire est tout-à-fait libre; mais Linné, après avoir réuni ces plantes à la *saxifraga*, a appliqué le nom de *geum* à la bénoïte, que Tournefort nommoit *caryophyllata*, & que M. de Lamarck avoit adopté.

Il y a tout lieu de croire que les Anciens n'ont point connu la bénoïte, ou du moins qu'ils n'en ont point fait mention dans leurs écrits, quoiqu'on lui soupçonne quelq. rapports avec le *geum* de Pline (liv. 26, chap. 7), dont les racines, d'après cet auteur, sont gélées, noires, d'une odeur agréable, propres pour apaiser les douleurs de poitrine & les points de côté, & qui, par leur saveur aromatique, dissipent les crudités de l'estomac. Comment pouvons-nous prononcer affirmativement d'après de si légères indications? Quoi qu'il en soit, les auteurs qui ont parlé les premiers de cette plante, tels que Brunfels, Tragus & Matthioli, lui ont donné le nom de *caryophyllata* à cause de l'odeur de ses racines, n'ayant aucun de celle de l'aëlle. Matthioli en distingue deux espèces qu'il a figurées, le *geum urbanum* & *montanum* Linné. Les grandes propriétés attribuées à ses racines l'ont fait appeler par le vulgaire *herba benedicta*, herbe bénoïte, bénoïte. En attendant qu'on puisse se décider sur l'identité du *geum* de Pline avec notre bénoïte, l'on a provisoirement attribué à cette dernière plante les propriétés que

Pline attribue à la sienne. Quoique négligée aujourd'hui, & déchu de beaucoup de sa première réputation, la bénoite peut offrir, dans ses racines odorantes, des propriétés utiles dans les arts & l'économie domestique. Dambourney en a retiré une belle couleur mauve-bleue, & la plante entière donne une teinture noisette. En Suède & dans quelques autres provinces du Nord, on jette dans les tonneaux de bière un paquet de racines; elles donnent à cette liqueur un goût agréable, & l'empêchent de s'aigrir. On prétend encore qu'elles raccommoient le vin gâté.

Quelques espèces de bénoite ont trouvé place dans nos jardins comme plantes d'ornement: tels sont le *geum rivale* Linn., agréable par ses fleurs d'un rose-tendre, & qui croît en touffes épaisses; le *geum nutans*, chargé de belles fleurs jaunes dès le mois de mai.

1. BENOITE commune, n°. 1. *Geum urbanum*. Linn. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 218. — Flor. dan. tab. 672.

2. *Geum* (intermedium), *foliis interruptè pinnatis*, *floribus subnatis*, *calicibus patentibus* (nec connatis nec reflexis); *petalis subrotundatis*, *uncinatis*, *unguiculatis*; *germinibus pilosis*, *aristâ nudâ*, *uncinatis*; *stilo piloso*, *fructu pedicellato*. Ehrh. Beitr. 6. pag. 143. — Pet. Hort. brit. 1. tab. 40. fig. 2.

Caryophyllata vulgaris, *major flore*. C. Bauh. Pin. 321. — Mapp. Alf. 58.

Caryophyllata montana, *semilis vulgari*. Comm. Hort. 35.

Caryophyllata silvestris. Fuchs, Hist. 385. Ic.

La variété 2 est parfaitement semblable à la bénoite commune par sa fructification; mais son port la rapproche de la bénoite des ruisseaux. Ses pédoncules sont légèrement inclinés; les calices ouverts, mais point connatifs ni réfléchis; les feuilles ailées avec interruption.

2. BENOITE de Virginie, n°. 2. *Geum virginianum*. Linn. — Murr. Nov. Comm. Gætt. 5. pag. 6 & tab. 32. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 217. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 301.

Geum canadense. Jacq. Hort. 2. p. 82. tab. 175.

3. BENOITE du Japon. *Geum japonicum*. Thunb. *Geum floribus erectis*, *fructibus hirsutis*, *aristis nudis*, *foliis subrotundis*. Thunb. Jap. 220.

Ses tiges sont droites, cylindriques, flexueuses, hautes d'un pied & plus, velues, à peine rameuses, seulement à leur partie supérieure; les rameaux très-courts, alternes, légèrement tomenteux; les feuilles alternes, pétioles, un peu

arrondies, à trois ou à cinq lobes; molles, dentées, velues, longues d'un pouce; les pétioles tomenteux, plus courts que les feuilles; deux stipules ovales, foliacées, dentées, incisées, plus courtes que les pétioles. Les fleurs sont solitaires, terminales; le calice à dix découpures, cinq alternes plus courtes; les pétales de la longueur du calice; les semences ovales, hérissées de poils gris; les arêtes glabres, subulées, recourbées en crochet.

Cette plante croît au Japon. 4 (Descript. ex Thunb.)

4. BENOITE du Canada. *Geum canadense*. Murr.

Geum floribus erectis; *seminibus hirsutis*, *aristatis*, *nudis*; *foliis omnibus pinnatis*; *pinnis cuneiformibus*, *incis.* Murr. Comm. Gætt. 5. pag. 33. tab. 4. B. — Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 300.

Geum aleppicum. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 93, & Colled. 1. pag. 88.

Geum strictum. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 217. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1113.

Ses tiges sont rudes, droites, cylindriques, médiocrement rameuses, anguleuses par la décurrence du pétiole; les feuilles plus ou moins hérissées & velues, ailées; les supérieures à trois folioles ovales-lanceolées, rétrécies en coin à leur base, aiguës, incisées ou lobées, ou profondément dentées; les stipules larges, incisées. Les fleurs sont solitaires, portées à l'extrémité de longs pédoncules droits & roides; la corolle jaunâtre; les pétales orbiculaires, plus longs que le calice; les semences brunes, hérissées; les arêtes nues, terminées en crochet.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 4 (V. v.)

5. BENOITE des ruisseaux, n°. 3. *Geum rivale*. Linn. — Flor. dan. tab. 721. — Engl. Botan. tab. 106.

Geum nutans. Crantz, Austr. pag. 70.

6. *Geum* (hybridum), *flore nutante*, *calice folioso*, *corollam postpetalâ excedente*. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 94, & Miscell. 2. pag. 33.

Anemone dodecaphylla. Krock. Silef. 2. pag. 235. tab. 20.

Caryophyllata montana, *flore pleno*, *prolifera*; *folio hederæ terrefstris*. Breyn. Centur. pag. 150. tab. 60.

Caryophyllata prolifera, *fofolis elegantissimis*. Loef. Puell. 37. tab. 6.

Caryophyllata montana, *tertia*. Clus. Hist. 2. pag. 214. Icon.

Caryophyllata

Caryophyllata aquatica, floribus plevis, magis *nutantibus*, Camer. Epit. 726.

La variété se distingue par ses fleurs beaucoup plus inclinées sur leur pédoncule; par les calices plus grands que les corolles, ayant leurs divisions presque foliacées & dentées. Les pétales sont plus nombreux, & vont quelquefois jusqu'à dix ou douze.

6. BÉNOÎTE penchée, n°. 4. *Geum nutans*, Lam.

7. BÉNOÎTE des Pyrénées. *Geum pyrenaicum*, Willd.

Geum floribus nutantibus, petalis calice longioribus; aristis pilosis, basi tortis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1115. — Ramond, Bull. phil. n°. 42. pag. 140. tab. 10. fig. 3.

Caryophyllus pyrenaica, amplissimo folio & rotundiore. Tournef. Inst. R. Herb. 195.

Cette plante, qui ressemble au *geum montanum*, en diffère par ses arêtes recourbées. Ses racines sont brunes, épaisses, horizontales; elles produisent une tige presque nue, longue d'environ un pied, droite, simple, velue; les feuilles radicales ailées, pileuses à leurs deux faces; les folioles latérales fort petites, inégales, dentées; la terminale fort ample, arrondie, à quatre ou cinq lobes & plus, dentée, obtus; les feuilles caulinaires sessiles, à trois lobes cuneiformes à leur base, incisées, dentées, acuminées; les stipules oblongues, profondément dentées. Les fleurs sont d'un beau-jaune, terminales, pédonculées, inclinées, au nombre d'une, deux ou trois; les pétales ouverts, arrondis, plus grands que le calice; les semences grosses, velues, recourbées, prolongées en une arête glabre, torse dans son milieu, caduque à sa partie supérieure.

Cette plante croît dans les Hautes-Pyrénées. (V. f.)

8. BÉNOÎTE du mont Atlas. *Geum atlanticum*, Desfont.

Geum villosum, foliis inferioribus pinnatis; pinnaulis terminalibus cordatis, maximis; caule subunifloro, fructibus hirsutis, aristis contortis, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 402.

Elle se distingue du *geum montanum* par ses tiges plus élevées, pileuses, hautes d'un pied & demi; par les folioles moins nombreuses, plus écartées, & surtout par les arêtes contournées, point barbues. Les feuilles radicales fort ailées, pétiolées; les folioles au nombre de trois à cinq, quelquefois sept, arrondies ou ovales, crénelées & dentées; la terminale très-grande, obtuse, en cœur; les stipules grandes, ovales, incisées; les fleurs solitaires.

Botanique, Supplément. Tome I.

rés, terminales, jaunes; les semences velues; les arêtes presque glabres.

Cette plante croît sur le mont Atlas, proche Tlemcen. (V. f.)

9. BÉNOÎTE géniculée. *Geum geniculatum*, Mich.

Geum subpaniculatum multiflorum, foliis caulinis subsessilibus, tripartitis; petalis cuneato-obcordatis; aristis prostratis pubescentibus, medio geniculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 300.

Ses tiges sont simples, divisées, à leur partie supérieure, en rameaux paniculés, étalés; les feuilles alternes; celles des tiges presque sessiles, à trois découpures; les stipules presque entières; les fleurs nombreuses; les pétales rétrécis en coin à leur base, élargis en cœur à leur sommet; les semences terminées par des arêtes géniculées dans leur milieu, pubescentes dans toute leur longueur.

Cette plante croît au Canada. (Mich.)

10. BÉNOÎTE radiée. *Geum radiatum*, Mich.

Geum hirsutissimum, caule simpliciter, foliis radicalibus pinnatis; impari amplissimo, reniformi, radianti-nervoso; caulinis amplexicaulis, inciso-lanceolatis; aristis glabris, apice simpliciter. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 301.

Plante assez élégante, à tiges simples, droites, très-hérissées; les feuilles radicales ailées, composées de petites folioles peu nombreuses; la terminale très-ample, en forme de rein, à nervures saillantes, divergentes; les feuilles caulinaires simples, amplexicaules, incisées & comme déchiquetées à leurs bords. La corolle est jaune, plus foncée à sa base; les pétales rétrécis en coin à leur partie inférieure, en cœur renversé à leur sommet; les arêtes glabres, simples à leur sommet.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Caroline. (Mich.)

11. BÉNOÎTE de montagne, n°. 15. *Geum montanum*, Linn. — Lam. Ill. tab. 443. fig. 2.

12. BÉNOÎTE rampante, n°. 6. *Geum reptans*, Linn.

13. BÉNOÎTE à feuilles de potentille, n°. 8. *Geum potentilloides*, Lam. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1116.

Dryas groides, Murr. Syst. pag. 481. — Jacq. Hort. 3. pag. 38. tab. 68. — Pall. Ross. tab. 11.

Geum Laxmanni, Gertn. de Fruet. & Sem. 1. pag. 352. tab. 74.

III

14. BÉNOÎT de la Kamtcharka, n°. 7. *Geum kamitchaticum*. Lam.

Dryas anemonoides. Pall. Itin. 3. Append. n°. 92. not. 2. tab. E. fig. 4.

Geum anemonoides. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 1117.

* *Geum* (involucrarum), *foliis pinnatis, extimo rotundato, crenato; floribus folio involucriatis*, Persl. Synops. Plant. 1. pag. 57.

Toutes les feuilles sont ailées, radicales; la dernière foliole arrondie, crénelée. De leur centre s'élève une hampe nue à sa partie inférieure, terminée par cinq fleurs pédonculées, rapprochées en tête, feuillées à leur base. La corolle est blanche, plus petite que le calice.

Cette plante croît au détroit de Maëllan; elle a été recueillie par Commerçon. (*Herb. Juss.*)

* *Geum* (magellanicum), *foliis pinnatis, extimo maximo, lobato, inferioribus minimis; scapo elongato*. Persl. Synops. Plant. 1. pag. 57. (*Herb. Juss.*)

BÉOLE. Bas. Lam. III. tab. 15. Commerçon a consacré ce genre au frère de sa femme, François Beau, curé de Toulon-sur-Arroux, dans le Charolois. Le genre *jovellana* de la *Flore du Pô* paraît devoir le réunir à celui-ci. (*Voyez JOVELLANA*, Suppl.)

BER, ou BOR : noms indiens d'une espèce de jujubier (*ziziphus jujuba* Willd.), qui est le bory des Brachmanes, le *perrin-toddali* des Malabares. C'est un des arbres sur lesquels on trouve une résine connue sous le nom de *gomme-laque*, déposée par une espèce d'insecte du genre *coccus*. (*Voy. JUJUBIER*, n°. 6.)

BERARDIA. Vill. (*Voyez ARCTONE*.)

BERBENA : nom langue Grecque & italien de la vervaine.

BERBERIS. (*Voyez VINETIER*.) C'est le nom latin de l'épine-vinette. Les Anglais la nomment *berberry*; les Arabes *tarah* ou *mosuk*; ils donnent le nom de *berberim* ou *amirberim* à l'aubépine.

BERBOUISSET : nom languedocien du fragon ordinaire (*rasus aculeatus* Linn.).

BERCE. *Heracleum*.

Il n'est peut-être pas d'un très-grand intérêt de savoir si le *sphondylium* de Dioscoride est la même plante que notre *berce brancusifera*, que Matthioli a fait graver pour celle de Dioscoride. Ce que ce dernier nous en dit, ainsi que Pline, ne porte que sur des propriétés médicales très-douteuses ;

mais ce qui nous importeroit davantage, ce seroit de savoir employer à des usages économiques une plante très-commune sur le bord des bois, & surtout dans les prés. On assure que, coupée près de terre lorsqu'elle est sur le point de fleurir, elle fournit aux vaches un bon fourrage qu'elles aiment beaucoup. Quelques autres espèces de berce, telles que celle à feuilles étroites, celle des Alpes, sont presque des plantes potagères, surtout la première, dont les habitants du Nord mangent les tiges vertes après en avoir enlevé l'écorce, & auxquels la décoction de ses feuilles tient lieu de bière. On retire des tiges des flechées après qu'elles ont fermenté dans l'eau, de l'alcool, & même en plus grande quantité, d'après les expériences de M. M. Giulio & Giobert, qu'on n'en peut obtenir d'un poids égal de vin. On fait encore qu'en Sibérie les tiges, rarifiées & séchées au soleil, se couvrent d'une efflorescence sucrée, que l'on recueille avec soin, & qui pousse pour une friandise très-délicate. Nous nous occupons trop peu de nos plantes indigènes, qu'on a trop long-temps considérées uniquement comme plantes médicinales, & auxquelles on a fini par préférer les plantes exotiques.

Le petit nombre d'espèces ajoutées à ce genre sont, la plupart, des variétés de celles qui étoient déjà connues : ainsi

L'*heracleum alpinifolium* de Lapeyrouse, Flor. pyren., est la même plante que l'*heracleum platyphyllum*, Ramond, Inéd. Toutes deux se confondent avec l'*heracleum pyrenaicum*, Lam. n°. 7. Peut-être celle-ci n'est-elle qu'une variété de l'*heracleum alpinum*.

L'*heracleum pumilum*, Villars, Dauph. 2, pag. 640, tab. 14, est la même que l'*heracleum minimum*, Lam. n°. 8.

L'*heracleum elegans*, Jacq. Austr. pag. 175, se rapproche beaucoup de l'*heracleum angustifolium*, n°. 2. Ses folioles sont pinnatifides; les decoupures distantes entr'elles, dentées; l'angle intérieur ovale; il croît en Autriche. On pourroit y réunir l'*heracleum flavescens* Willd., mais celui-ci a des fleurs jaunes, radiales. Jacquin lui a conservé le nom d'*heracleum angustifolium*, Flor. Austr. 2, pag. 46, tab. 173. Enfin, l'*heracleum angustifolium* offre, d'après Jacquin, Austr. 2, pag. 46, tab. 174, une variété remarquable par les pinnules des folioles, très-longues. On trouve dans le catalogue du Jardin des Plantes une espèce de Sibérie, sous le nom d'*heracleum lucinatum*, que je n'ai pas pu observer.

Molina cite une espèce du Chili, qu'il appelle *heracleum tuberosum*; elle ne diffère, selon lui, de l'*heracleum sphondylium* que par ses racines jaunes, composées de tubercules longs de six pouces, épais de trois, & par ses fleurs radiales, ou dont

les pétales extérieurs sont plus grands. Les feuilles sont ailées, composées de sept folioles.

M. Ventenat a décrit & figuré l'espèce suivante :

9. BERCE à feuilles d'absynthe. *Heracleum absynthioides*. Vent.

Heracleum incanum, foliis decompositis; foliolis cuneiformibus, trifidis; corollis subuniformibus, fructu villosis. Vent. Choix de Plant. pag. 82. tab. 7.

Sphandylum orientale, humilior, foliis absynthii. Tournet. Coroll. 12. Herb. Vail.

Cette espèce se rapproche des *tordylium* par son fruit presque orbiculaire & un peu renflé à ses bords. Toutes ses parties répandent, lorsqu'elles sont froissées, une odeur semblable à celle de l'*apium graveolens*. Ses racines sont pivotantes, lacteus & charnues; les tiges hautes de deux pieds, presque nues, hérissées de poils courts : il en sort une liqueur qui s'épaissit à l'air, & devient visqueuse; les feuilles presque trois fois ailées; les folioles cuneiformes, à trois lobes courts, linéaires, obtus, hérissées de poils courts. Les ombelles sont terminales, composées d'environ vingt rayons; les involucrets formés de folioles droites, lancéolées, aiguës, courtes, persistantes, très-velues; les corolles blanches; les pétales presque égaux, planes, plus réfléchis à leurs bords, un peu échancrés; les fruits ovales, arrondis, comprimés, marqués, sur chaque face, de trois stries peu apparentes, hérissées de poils blanchâtres & couchés.

Cette plante croît dans l'Orient, sur la route de Bagdad; elle est cultivée dans le jardin de M. Cels, de semences recueillies par MM. Bruguière & Olivier. x

Nous devons encore à Michaux une autre espèce, qui est la

10. BERCE laineuse. *Heracleum lanatum*. Mich.

Heracleum foliorum petiolo nervisque subius lanato-villosissimis; foliis trifoliatis; foliolis omnibus petiolatis, amplis, subrotundo-cordatis, subpalmatis; fructibus orbiculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 166.

Les tiges sont garnies de feuilles alternes, ailées, à trois grandes divisions; toutes les folioles pédicellées, amples, arrondies, en cœur, lobées, presque palmées, leurs nervures en dessous, ainsi que les pétioles couverts d'un duvet lanugineux très-épais. Les fruits sont orbiculaires.

Cette plante croît au Canada.

Gærtner a établi pour ce genre le nom ancien de *sphandylum*; il a figuré les fruits de l'*heracleum pinnatis*, tab. 21. (Voyez aussi les *Illustr.* tab. 200,

fig. 2. La figure 1 représente l'*heracleum sphandylum*, n°. 1.)

PERCEAU DE LA VIERGE : nom vulgaire de la clematis odorante.

BERCKHEYA. Willd. (Voy. ROHRIA, Suppl.) C'est l'*agrophyllum* (Juill.), l'*apuleia* de Gærtner.

BÉRÉLIE. Les habitants de l'île de Ceilan donnent ce nom à une plante dont Gærtner a décrit le fruit, & dont il a fait un genre sous la dénomination de *caryobolia*. (Voyez ce mot, Suppl.)

BERENDAROS : nom arabe du basilic des jardins (*ocymum basilicum* Linn.), suivant Dalechamp. Dans la *Flora d'Arabie* de Forskall, il est nommé *kabach* & *rihan*.

BERGAMOTTIER, espèce d'orange, dont le fruit est plus petit qu'une orange ordinaire, d'un goût très-suave, qu'il lui est particulier. Le pétiole de la feuille est marqué en dessous d'une ligne blanche.

BERGERA de Koenig. *Bergera Königii*. Linn.

Bergera foliis alternis, imparipinnatis; floribus corymbis-racemosis, terminalibus. (N.)

Bergera Königii. Linn. Mantiff. 363. — Roxb. Corom. 2. pag. 9. tab. 112.

Papaya siccifolia. ? Rumph. Amb. 1. pag. 149. tab. 33. fig. 1.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des oranges, qui a de grands rapports avec les *murrays*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, ailées avec impaire; les fleurs terminales, en grappes réunies en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, persistant, à cinq découpures; cinq pétales ouverts; dix étamines, cinq alternes plus courtes; un stigmate turbiné; cannelé transversalement; une baie globuleuse, à deux semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

- 1°. Un calice d'une seule pièce, fort petit, persistant, à cinq découpures courtes, aiguës, étalées.
- 2°. Une corolle à cinq pétales très-ouverts, longs, un peu obtus.
- 3°. Dix étamines; cinq filaments alternes, plus courts que les autres, soutenant des anthères arrondies.
- 4°. Un ovaire libre, un peu arrondi, surmonté

d'un style filiforme, en massue à son sommet, terminée par un stigmate luisant, turbine, à cannelures transversales.

Le fruit consiste en une baie presque globuleuse, accompagnée à sa base par le calice persillant, à une seule loge, contenant deux semences.

C'est un grand arbre des Indes, qui supporte une cime touffue. Son écorce ressemblait à celle de l'aune. Ses feuilles font alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de folioles alternes, pédicellées, ovales-lancéolées, presque rhomboïdales, glabres à leurs deux faces, plus étroites à un de leurs côtés, légèrement dentées à l'aure. Les fleurs sont pédicellées, disposées en corymbes terminaux, composées de ramifications simples, en grappes droites, étalées, plus courtes que les feuilles; les pédicelles courts, cylindriques, garnis de bractées lancéolées, persistantes; d'autres à leur base, petites, foliaires, caduques, appliquées contre les pédicelles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ♀

Observations. La figure de Rumphe, que je n'ai citée que sur l'autorité de Willdenow, qu'il n'aurait pu représenter assez bien le port de cet arbre, offre, dans la description qu'en donne cet auteur, des caractères qui ne peuvent convenir au *bergia*, & qui font très-remarquables. Le tronc, ainsi que les rameaux, est divisé par articulations si susceptibles de se casser net, que l'on n'ose y monter. Les fruits sont de petites baies de la grosseur d'un grain de riz, tronquées, & couronnées à leur sommet par cinq filaments réfléchis, divisées intérieurement en cinq loges. Si cette plante convenoit au *bergia*, il faudroit encore y ajouter, peut-être comme espèce, la figure 2 de la même planche.

BERGIA. (Voyez BERGIE.) Le *bergia capensis*, n°. 1, est le *bergia verticillata*, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 770. — Vahl, Symbol. 2. pag. 50. — Le *polakajira*, Rheed, Malab. 9. pag. 153. tab. 78. — Le *bergia aquatica*, Roxb. Coroin. 2. pag. 22. tab. 142.

BERGKIAS. Sonnerat, dans son *Voyage à la Nouvelle-Guinée*, désigne sous ce nom un arbrisseau de Manille, que l'on y connoît sous celui de *grand padacqui*, & qui, transporté au Cap de Bonne-Espérance, y est nommé *caquepire sauvage*. C'est un *gardenia*. (Voyez GARDÈNE verticillé, n°. 3.)

BÉRINGÈNE. C'est le *solanum melongena* Linn. (Voyez MORELLE, n°. 43.) A Saint-Domingue & dans les Antilles, on connoît sous ce nom la *melongène*, dont Desfontaines cite deux espèces ou variétés, l'une à fruits jaunes, & l'autre à fruits violets; elle est aussi appelée *bréhème*. Le nom de

brégingène paroît originaire des provinces de France qui avoisinent les Pyrénées, & dans lesquelles cette plante est encore nommée vulgairement *verrengena*. Les Créoles font fiands de ce fruit, qu'ils fendent & mettent sur le grill après avoir mélangé la chair avec de la mie de pain, du beurre, du piment & beaucoup d'épices.

BERLE. *Sium & sison*, Linn. Les caractères qui distinguoient les *sium* des *sison* de Linné étoient si foibles, que M. de Lamarck a cru devoir réunir ces deux genres, le premier ayant des pétioles en cœur au sommet, le second les ayant lancéolés, & les semences ordinairement plus ovales, un peu moins allongées. D'ailleurs, le port, dans les espèces, n'est point uniforme. Les uns ont 1 ou 2 tiges droites, d'autres rampantes; les folioles très-grandes ou étroites, courtes ou allongées, lancéolées ou capillaires, verticillées, &c. Les fleurs sont blanches, les corolles composées de quatre à dix folioles; les rayons des ombelles ordinairement en petit nombre, & souvent latéraux.

On trouve dans les *Illustrations*, tab. 197, fig. 1, le *sium latifolium*, & fig. 2, *sium siforum*. S. 101 Willdenow, le *sium filifolium* Thunb. est la même plante que le *conium scutifolium* Vahl.

Le *sium latifolium*, n°. 1, est le *coriandrum latifolium* Crantz, Ault. pag. 212. Il est à remarquer qu'il arrive assez fréquemment que les premières feuilles de cette plante se présentent sous une forme très-irrégulière, étant très-larges, crispées, déchiquetées, incisées ou plusieurs fois ailées. J'en ai souvent trouvé de semblables à la Garre, aux environs de Paris.

Le *sium angustifolium*, n°. 2, est l'*apium sium* de Crantz, Ault. pag. 215. — *Sium erectum*, Hudf. Angl. edit. 1. pag. 103. — *Sium nodosum*, Flor. dan. tab. 247. Non Linn. — *Sium berula*, Gouan, Flor. monip. 2:18.

M. Decandolle cite dans la *Flore française*, vol. 4, pag. 300, une variété du *sium nodosum*, n°. 3, qu'il appelle *sium nanum*; elle s'élève à peine à la hauteur de quatre pouces.

Le *sium falcaria*, n°. 9, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 153; Crantz de Fruct. & Sem. 1. pag. 104, tab. 43, est la même plante que le *sefeli falcaria* Crantz, Ault. pag. 208. — *Scopol. Carn. edit. 2. n°. 354*.

Il faut à ces observations ajouter les espèces suivantes :

16. BERLE rampante. *Sium repens*, Linn. f.

Sium caule repente; foliis subrotundis, dentato-angulatis, Linn. Sopp. pag. 181. — Jacq. Ault. 3. pag. 34. tab. 260. — Houst. Synop. 158.

Sium (repens & ochreatum), *caule ramofo, foliis sublanccolatis, involucri diphylla*. Decand. Flor. franç. 4. pag. 300.

Ses tiges font foibles, glabres, herbacées, couchées & traçantes; elles pousfent, au deffous des nœuds d'où partent les feuilles, des touffes de racines capillaires. Les feuilles font longuement pétiolées, composées d'environ quatre paires de folioles petites, oppofées, prefque féffiles, minces, arrondies, incifées, dentées ou lobées; l'impaire ordinairement à trois lobes. Les ombelles font oppofées aux feuilles, composées de cinq à fix rayons inégaux, placés à l'extrémité d'un pédoncule prefqu'auffi long que les feuilles; à la bafe des rayons, une collerette à quatre ou fix folioles ovales, renversées. Le fruit eft oval; un peu arrondi, ftrié, comprimé.

La variété β , trouvée aux Brotteux près de Lyon, tient prefque le milieu entre cette efèce & le *fium nodiflorum*. Peut-être doit elle former une efèce diftincte. « Elle à la tige rampante, dir M. De-candolle; les ombelles pédonculées, & la foliole terminale à trois lobes; mais, d'un autre côté, elle fe rapproche du *fium nodiflorum* par les folioles prefque lancéolées; par la diftation membracée qui fe forme à la bafe des pétiolés; par la confiftance de fes feuilles; enfin, par fa collerette, qui n'eft qu'à deux folioles, & qui manque quelque fois. »

Cette plante (var. α) croit fur le bord des étangs, dans les lieux tourbeux, inondés, dans la Bohême, fur les rives du Danube en Autriche, aux environs de Paris, &c. & (V. v.)

17. BERLE couchée. *Sium decumbens*. Thunb.

Sium foliis bipinnatis, foliolis trifidis, caule decumbente. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1435. — Thunb. Flor. jap. pag. 118.

Petite plante, dont la tige eft couchée ou renversée par terre; les feuilles radicales glabres, longuement pétiolées, deux fois ailées, composées de folioles trifides. Les ombelles font terminales, prefque fimples; les femences ovales, obtufes, glabres, ftriées, furmontées par les styles perfiftans.

Cette plante croit au Japon. (Thunb.)

18. BERLE du Japon. *Sium japonicum*. Thunb.

Sium foliis pinnatis, foliolis incifis, umbellis terminalibus. Thunb. Flor. jap. pag. 118.

Ses tiges font droites, flexueufes, rameufes à leur partie fupérieure, garnies de feuilles glabres, ailées; l'inférieure très-grande; les pinnules tréguilières, oblongues, ovales, étalées, entières ou incifées; les fupérieures beaucoup plus petites;

les folioles lancéolées, très-entières. Les rameaux fe terminent par des ombelles compofées.

Cette plante croit au Japon. (Thunb.)

19. BERLE linéaire. *Sium lineare*. Mich.

Sium foliis pinnatis, foliolis sublanccolato-lineari-bus, radiis brevibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 167.

Cette planre fe rapproche de la berle de Virginie, n°. 8. Ses tiges font droites; les feuilles ailées, composées de folioles allongées, prefque lancéolées, linéaires, légèrement dentées en fcie à leurs bords; les dentelures diftantes; les rayons des ombelles très-courts; la collerette univerfelle peu garnie; celle des ombelles partielles compofée de folioles linéaires, plus nombreufes.

Cette plante croit à la Caroline, dans les lieux humides. (Mich.)

20. BERLE intermédiaire. *Sium intermedium*. Decand.

Sium caule procumbente, gracili; foliolis profundè tripartitis, subverticillatis. Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 308. n°. 3433.

Sifon verticillato-inundatum. Thore. Chlore. Land. 101, & Journ. botan. 1. pag. 193. tab. 7. fig. 1 & 2.

Cette efèce à le port de la berle inondée, & fe rapproche, par les caractères, de la berle verticillée. Sa racine eft compofée de plufieurs fibres prefque fimples. De petites bulbes font placées au deffous du point où chaque tige produit des racines. La tige eft grêle, foible, couchée ou appuyée fur les plantes voifines, herbacée, longue de trois à neuf pouces, glabre, une ou rarement deux fois bifurquée; les feuilles radicales prefque auffi longues que la tige; leur pétiole nu fur les trois quarts de fa longueur, portant, vers fon fommet, huit ou dix paires de petites folioles oppofées, la plupart profondément divifées en trois lobes linéaires, de forte qu'elles paroiffent un peu verticillées; les feuilles caulinaires en-petit nombre, beaucoup plus courtes; l'ombelle générale à quatre ou fix rayons un peu inégaux; fa collerette compofée de quatre ou fix folioles lancéolées, affez courtes; les collerettes partielles à cinq folioles; les fleurs blanches, affez femblables à celles de la berle inondée; les pétales en cœur, courbés à leur fommet.

Cette plante croit fur le bord des mares herbeufes, à demi couvertes d'eau; elle a été trouvée aux environs de Dax par M. Thore. ○ ? (Decand. & Thore.)

Nota. La BERLE inondée, n°. 13, eft l'*hydrocotyle inundatum* Smith, Flor. brit. 1. pag. 314. —

Engl. bor. tab. 395. Quelque fois toutes ses feuilles sont capillaires; elles appartiennent alors à la variété *β*, *foliis omnibus capillatiss.*, caule suberecto. Schumacher, Zeeland. 1. pag. 90.

21. BERLE naine. *Sium pufillum*.

Sium (fifon pufillum), *annuum*, *foliis biternatis multipartitis*, *umbellulis tri quinquefloris*, *fructibus feabradis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 168.

Cette plante se rapproche beaucoup du *daucus divaricatus* de Walther; elle feroit peut-être mieux placée parmi les *ammi* que parmi les *fium*, à cause de fes fruits légèrement héiffés. Ses riges font courtes; les feuilles deux fois ternées; les folioles à plusieurs découpures; les ombellules compofées de trois à cinq fleurs; les fruits ovales, ftries, un peu rudes.

Cette plante croit à la Caroline, dans les fols fablonneux. ○ (V. f.)

22. BERLE trifoliée. *Sium trifoliatum*.

Sium (fifon trifoliatum), *foliis omnibus trifoliatis*, *foliolis dentatis*; *inferioribus ovalibus*, 2-3 lobis, *superioribus ovali-lanceolatis*; *umbellâ terminali*, *foliatis*, *promiffe pedunculatâ*; *fructibus subrotundis*. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 168.

Toutes fes feuilles, d'après Michaux, font compofées de trois folioles dentées à leurs bords; les inférieures ovales, à deux ou trois lobes; les fupérieures ovales-lanceolées. L'ombelle eft folitaire, terminale, longuement pédunculée; les fruits médiocrement arrondis.

Cette plante croit dans la Haute-Caroline. (Mich.)

23. BERLE bordée. *Sium marginatum*.

Sium (fifon marginatum), *foliis pinnatis*, *superioribus quinais*; *foliolis omnibus feffilibus*, *lanceolatis*, *integerrimis*, *albido-marginatis*; *involucro involucrisque nudis*. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 169.

Ses riges font garnies de feuilles ailées; les fupérieures compofées de cinq folioles, toutes feffiles, lanceolées, très-entières, entourées d'un rebord blanchâtre. Les ombelles & ombellules font dépouillées de colicette.

Cette plante croit dans la Caroline, aux lieux humides. (Mich.)

* *Sium* (fifon bulbosum), *pufillum*, *radice globoso-bulbofa*; *caule debili*, *fimpliciffimo*, *diphyllo*, *foliis unimulato*; *folio laterali tripartito*, *partionibus fubpinnatis*; *pinnulis divifis*, *terminali fubbiseruato*; *umbellulis terminalibus*, *foliolis tribus*, *tri quinquefloris*. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 169.

Le genre de cette plante eft un peu doureux, fes fruits n'ayant pas été obfervés dans leur maturité; elle paroît néanmoins avoir de l'affinité avec le *fium inundatum*. Ses riges font droits, hautes de trois à cinq pouces, portées fur une bulbe épaiffie à fon fommet. Cette riges ne produit qu'une feuille vers fon milieu, avec un rameau de fleurs; elle eft terminée par une feuille feffile. Il fort de la gaine deux, quelquefois trois pédoncules, terminés par une ombelle prefque feffile, à trois ou cinq fleurs; la collerette à folioles peu nombreuses. Le calice eft étiercé; les pétales blancs, ovales; les étamines plus longues que la corolle; les anthères d'un pourpre-foncé; l'ovaire comprimé, turbiné, fluté; les ftyles alougés.

Cette plante croit prefque dans la région des neiges, fur les roches élevées, proche Knoxville, dans l'Amérique feptentrionale. (Mich.)

* *Efpèces moins connues.*

* *Sium* (grandiflorum), *foliis bipinnatis*; *foliolis subrotundis*, *incifo-dentatis*. Thunb. Prodr. 50.

* *Sium* (paniculatum), *foliis bipinnatis*; *foliolis linearibus*, *incifo-pinnatifidis*. Thunb. Prodr. 51.

* *Sium* (parvulum), *foliis bipinnatis*, *foliolis trifidis*, *ramis difpufis*. Thunb. Prodr. 51.

* *Sium* (asperum), *foliis tripinnatis*, *pedunculis pedicellisque feabris*. Thunb. Prodr. 51.

* *Sium* (hispidum), *foliis tripinnatis*, *petiolis pedunculisque feabris*. Thunb. Prodr. 51.

* *Sium* (villosum), *foliis tripinnatifidis*; *lacinii ovatis*, *incifo-ferratis*, *villosis*. Thunb. Prodr. 51.

Toutes ces plantes croiffent au Cap de Bonne-Efpérance.

* *Sium* (ancifolium), *foliis pinnatis*; *foliolis lanceolatis*, *aqualibus*; *umbellis terminalibus*. Schrank, Flor. bavar. 1. pag. 556.

* *Sium* (cicuzofolium), *foliis pinnatis*, *foliolis linearilanceolatis*, *ramis ferratis*, *umbellis terminalibus*. Gmel. Flor. Sibir. 1. pag. 201. tab. 47.

* *Sium* (suave), *foliis radicalibus bipinnatis*, *fublinearibus*; *coulinis pinnatis*; *pinnis lanceolatis*, *argutis ferratis*. Walther. Flor. carol. 115.

* *Sium* (fifon crinitum), *foliis omnibus tripinnatis*, *capillaribus*; *involucris decompofo fetaceis*. Pall. Aët. Petrop. 1779. 2. pag. 250. tab. 7.

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec notre *ammi divaricatus* Suppl., ou du moins appartenir au même genre par fes collerettes à folioles deux fois aidées. Elle croit dans la Sibirie.

* *Sium* (sifon silvaticum), foliis radicalibus longè petiolatis, decompositis; foliolis tripartitis; laciniis cuneatis, incisifs; caule subaphyllo. Brotter. Phytogr. Luit. n°. 18. In *Lustania umbrosi*.

BERMUDIENNE. *Sifyrinchium*. Les filaments des étamines, connivens dans toute leur longueur, & présentant un tube allongé, forment le principal caractère de ce genre. Dans les *ferraria* & autres genres voisins, ces filaments ne sont connivens qu'à leur partie inférieure; ils sont libres dans les morées, les ixies, &c.

Des trois espèces décrites par M. de Lamarck, la première est gravée dans les *Illustrations*, tab. 569, & dans Gœrtner, de Frucht. & Sem. 1, p. 32, tab. 11, fig. 5. C'est la même que le *sifyrinchium anceps* Cavan. Diff. 6, pag. 345, tab. 190, fig. 2. La troisième appartient aux *moraa*, & a été de nouveau mentionnée au genre *MORAA*, n°. 3. C'est la même plante que le *sifyrinchium laetifolium* Swartz. Il faut à ces espèces ajouter les suivantes :

3. **BERMUDIENNE élégante.** *Sifyrinchium elegans*. Willd.

Sifyrinchium scapo tereti, unifloro, simplicis; folio radicali, lineari, acuminato, brevioris; petalis oblongis, acutis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 577.

MORAA (elegans), scapo tereti; folio unico, lineariformi, ensiformi, procumbente, scapum superante; petalis omnibus clypeolulosis; stigmatibus bifidis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1, pag. 6, tab. 12.

De ses racines s'élève une hampe simple, cylindrique, très-glabre, couverte, dans toute sa longueur, d'écaillés oblongues, alternes, acuminées, en forme de spathe. Il n'existe qu'une seule feuille radicale, plus longue que la hampe, glabre, linéaire, ensiforme, couchée. La hampe se termine par une fleur solitaire, assez grande. La corolle est jaune en dehors, dépourvue de glandes; les pétales linéaires, oblongs, aigus; les trois extérieurs marqués dans leur milieu, en dedans, d'une grande tache vercéâtre; les stigmatés bifides.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ✕

4. **BERMUDIENNE à grandes fleurs.** *Sifyrinchium grandiflorum*. Cavan.

Sifyrinchium radice bulbosa; scapo tereti, simplicis; spathe subtriflora; petalis obovatis, obtusis; foliis lanceolatis, plicatis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 578. — Cavan. Differt. 6, pag. 346, tab. 192, fig. 2.

Ses racines sont bulbeuses: il s'en élève une hampe droite, simple, cylindrique, feuillée; les feuilles de la hampe lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, plissées, striées. La spathe donne naissance à deux ou trois fleurs terminales, grandes,

de couleur jaune. La corolle est large d'un pouce & demi; les pétales en ovale renversé, très-obtus.

Cette plante croît au Pérou. ✕

5. **BERMUDIENNE des collines.** *Sifyrinchium collinum*. Cavan.

Sifyrinchium scapo tereti, subramoso, folio caulino lineari, acuminato brevioris; petalis oblongis, acutis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 578. — Cavan. Differt. 6, pag. 346.

MORAA (collina), scapo tereti, folio dependente, laciniis corollae subaequalibus. Thunb. Diss. de morae, pag. 11. n°. 13, & Prodr. 11. — Jacq. Icon. Rar. 2, tab. 226.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la bermudienne élégante; elle en diffère par ses hampes plus élevées, terminées ordinairement par trois fleurs; une seule fleur à l'extrémité de chaque rameau; la feuille point couchée, mais seulement renversée; la corolle plus grande, rougeâtre ou jaunâtre, sans tache.

Cette plante croît sur les collines, au Cap de Bonne-Espérance. ✕

6. **BERMUDIENNE mucronée.** *Sifyrinchium mucronatum*. Michx.

Sifyrinchium foliis angustissimis; seapis setaceis, simplicissimis; glumâ terminati, unica, ovali, colorati; valva exterioris mucrone recto, floribus longiore. Michx. Flor. boreal. Amer. 1, pag. 33.

Cette plante paroît différer très-peu de la bermudienne graminée. On l'en distingue par la valve extérieure de la spathe, prolongée en une longue pointe droite, plus longue que les fleurs. Les feuilles sont très-étroites; les hampes setacées, très-simples; les fleurs couleur d'améthyste, ainsi que la base des feuilles & la spathe. La figure de Plukenet, tab. 61, fig. 1, rapportée au *sifyrinchium gramineum* Lam., me paroît convenir davantage à cette espèce. M. Bosc m'a communiqué une plante de la Caroline, qui a de très-grands rapports avec celle de Michaux; mais les valves de la spathe sont presque égales; les fleurs sont petites. Elle ressemble parfaitement à la figure de Plukenet, excepté les valves.

Cette plante croît dans la Pensilvanie.

7. **BERMUDIENNE à petites fleurs.** *Sifyrinchium micranthum*. Cavan.

Sifyrinchium scapo ancipiti, ramoso, folioso; spathe triflora; inaequali, floribus subaequali; petalis linearibus, acuminatis; foliis graminibus, canaliculatis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 577. — Cavan. Differt. 6, pag. 345, tab. 191, fig. 2.

Petite plante à peine haute de deux pouces. Ses hampes sont ailées, rameuses & feuillées; les feuilles graminiformes, linéaires, canaliculées, acuminées à leur sommet; la spathe à deux valves inégales, d'où sortent deux ou trois fleurs à peine aussi longues que les valves; la corolle extrêmement petite; les pétales linéaires, acuminés.

Cette plante croît au Pérou. ✕

8. BERMUDIENNE roulée. *Sisyrinchium convolutum*.

Sisyrinchium scapo subsimplici, compresso; foliis linearis-nervosis; spathe terminali, multiporâ; valvis inaequalibus; petalis lato-ovatis, convolutis. (N.)

Ses hampes sont foibles, planes, striées, ordinairement simples, peu feuillées dans leur longueur, garnies à leur base de feuilles courtes, nombreuses, étroites, ensiformes, linéaires, zig-zag; les caulinaires de même forme. La hampe est terminée par une spathe oblongue, à deux valves aiguës, inégales; elles renferment de deux à quatre ou cinq filus jaunes, assez grandes; les pétales très-minces, larges, presque ovales, souvent roulés sur eux mêmes; les filaments libres à leur sommet; les anthères oblongues, sagittées; les capsules ovales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ✕ (V. v.)

9. BERMUDIENNE à réseau. *Sisyrinchium striatum*. Smith.

Sisyrinchium scapo ancipiti, folioso; floribus spicatis; petalis subrotundo-ovatis, acuis; foliis linearis-ensiformibus. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 580. — Smith, Icon. pict. 1. pag. 8 & tab. 9.

Sisyrinchium (spicatum), caule compresso; spathe multiflorâ, alternis, in spicam approximatis. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 1. tab. 104.

Morea (Errata), scapo tereti, foliis ensiformibus, racemo erecto, floribus aggregatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 6. tab. 11. (Secundum Willd.)

Cette belle espèce s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Ses tiges sont simples ou rameuses, comprimées, membraneuses à leurs bords, un peu cylindriques à leur partie supérieure, feuillées dans toute leur longueur; les feuilles droites, larges, pliées en deux, ensiformes, aiguës. Les fleurs sont disposées, à la partie supérieure des tiges, en un long épi droit, ramassées par paquets alternés dans l'aisselle d'une feuille très-ouverte, ovale, concave, plus ou moins acuminée, en forme de spathe; les spathes propres, bivalves, scarieuses. La corolle est grande, bleuâtre; les pétales ovales, un peu queue-formes à leur base,

traversés par des frises un peu jaunâtres avec d'autres en réseau; les capsules presque globuleuses.

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ✕ (V. v.)

BERTHOLLETIA élevé. *Bertholletia excelsa*. Humb. & Bonpl.

Bertholletia foliis maximis, alternis, integerrimis, oblongis; fructu maximo, sphaerico. (N.) Humb. & Bonpl. Plant. equin. pag. 122. tab. 36.

Très-bel arbre, élevé de plus de cent pieds, sur un tronc droit, cylindrique, de plus de deux pieds de diamètre, divisé en rameaux alternes, étalés, recourbés vers la terre à leur sommet, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, oblongues, coriaces, longues de deux pieds, sur cinq à six pouces de large, d'un beau vert, à frises transversales, parallèles, ramifiées en réseau vers le bord des feuilles. Les fleurs n'ont point été observées.

Le fruit est une drupe sphérique, de la grosseur d'une tête humaine, divisé intérieurement en quatre loges, contenant chacune plusieurs noix; l'enveloppe extérieure raboteuse, filonnée, recouverte d'un brou de couleur verte, uni, luisant. Chaque loge contient six ou huit noix tuberculées, inégalement triangulaires, attachées par leur extrémité inférieure à une cloison centrale; les semences oblongues, presque triangulaires, de la même nature que les amandes ordinaires, très-susceptibles de se rancir par la quantité d'huile qu'elles contiennent; elles n'offrent aucune apparence de plumule.

Les Portugais du Para font depuis long-tems un très-grand commerce avec les fruits de cet arbre, que les naturels nomment *ivia*, & les Espagnols *fruits almendon*; ils en portent des cargaisons à la Guiane française, en envoient à Lisbonne & en Angleterre. Les amandes fournissent une très-grande quantité d'huile bonne à brûler. « Nous avons été très-heureux, dit M. Bonpland, M. Humboldt & moi, de trouver de ces amandes dans notre voyage sur l'Orénoque. Il y avait trois mois que nous ne vivions que de mauvais chocolat, du riz cuit dans l'eau, toujours sans beurre & souvent sans sel, lorsque nous nous procurâmes une grande quantité de fruits frais du *bertholletia*. C'étoit dans le courant de juin. Les Indiens venoient d'en faire la récolte. Ces amandes font d'un goût exquis, surtout quand elles sont fraîches. »

Cet arbre est originaire du Brésil; il se trouve aussi dans l'Amérique espagnole, formant des forêts sur les bords de l'Orénoque. b

BERTIÈRE. *Bertiera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille

famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *moroccanum*, & qui comprend des arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont entières, opposées; les fleurs disposées en grappes terminales, munies de petites bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents; une corolle tubuleuse, velue à son orifice; le stigmate à deux lobes; une baie couronnée, à deux loges, à côtes saillantes; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, urbiné, à cinq dents.

2°. Une corolle monopétale, tubuleuse; le tube un peu court, velu à son orifice; le limbe à cinq découpures ouvertes, ovales, aiguës, persillantes.

3°. Cinq étamines; les filaments très-courts, insérés au dessous de l'orifice du tube, terminés par des anthères droites, linéaires.

4°. Un ovaire adhérent, arrondi, surmonté d'une glande; le style filiforme; le stigmate à deux lobes.

Le fruit est une baie globuleuse, couronnée par les dents du calice, souvent à côtes saillantes, à deux loges polypermes.

Les semences arrondies, plusieurs dans chaque loge, attachées à la cloison.

ESPÈCES.

1. BERTIÈRE de la Guiane. *Bertiera guianensis*. Aubl.

Bertiera salvia ovato-oblongis, acuminatis, subulis tomentosis; stipulis acutis; ramis paniculatisque villosis. (N.) Lam. Ill. tab. 165. fig. 1. — Vahl, Symb. 3. pag. 33. — Aubl. Guian. 1. pag. 180. tab. 69.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux opposés, cylindriques, velus, garnis de feuilles médiocrement pétioles, opposées, un peu élargies, ovales, oblongues, acuminées, tomenteuses en dessous, très-entières; les nervures simples, latérales, alternes; les stipules petites, ovales, très-aiguës. Les fleurs sont blanches, petites, disposées, à l'extrémité de chaque rameau, en grappes à peine ramifiées, velues, munies de petites bractées étroites, lancéolées à la base de chaque pédicelle. Les fruits sont de petites baies globuleuses, de la grosseur d'un pois, à côtes saillantes, couronnées par les divisions du calice.

Cette plante croît à Cayenne & dans les forêts de la Guiane. (V. f.)

Botanique. Supplément. Tome I.

2. BERTIÈRE zaluzane. *Bertiera zaluzana*.

Bertiera foliis lanceolatis, acutis, utrinque glabris; ramis paniculatisque glabris. (N.) Lam. Ill. Gener. tab. 165. fig. 2.

Zaluzania. Commerf. Mss. & Herb.

Cette plante, dont Commerfon avoit fait un genre particulier, se rapporte évidemment à celui-ci. Elle diffère de l'espèce précédente par ses rameaux glabres, garnis de feuilles médiocrement pétioles, plus étroites, lancéolées, entières, glabres à leurs deux faces, coriaces, aiguës; les stipules ovales, presque scarieuses, acuminées; les fleurs disposées en grappes terminales, presque paniculées, très-glabres; les ramifications grêles, peu nombreuses, munies, à leur base, de petites bractées tubulées. Parmi les fleurs, les unes sont pédicellées, les autres presque sessiles; le calice court, à cinq dents; la corolle petite, une fois plus longue que le calice. Le fruit consiste en une petite baie globuleuse, peu charnue.

Cette plante a été recueillie à l'île Bourbon par Commerfon. (V. f. in herb. Lam.)

BESLÈRE. (Voyez Beslère, & Illustr. Gen. tab. 524, où est figure le *Besleria lutea*, n°. 2.) Jacquin a fait connoître l'espèce suivante :

8. BESLÈRE dentelée. *Besleria serrulata*. Jacq.

Besleria pedunculis simplicibus, foliariis; calicibus serratis; corolla glabra limbo serrulato; foliis oblongis, utrinque obovatatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 267. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 21. tab. 290.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont sarmenteuses & grimpantes, garni de feuilles oblongues, presque elliptiques, opposées, acuminées à leurs deux extrémités, d'un vert-foncé en dessus, d'un pourpre-brun en dessous, hérissées à leurs deux faces; les pédoncules axillaires, solitaires, opposés, uniflores; les fleurs d'un jaune-blanchâtre; leur calice ample, verdâtre, très-découpures finement dentées en scie; la corolle glabre; son tube ventru, saillant en bossé à sa base; le limbe finement denticulé.

Cette plante croît dans les Indes occidentales. (V. f.)

Observations. M. Persoon, dans son *Synopsis Plant.* 2, pag. 165, cite une espèce découverte à Saint Domingue par M. Turpin, qu'il caractérise ainsi :

Besleria (linguea), foliis oblongis, serratis, maculosis; pilis adpressis; caule calicibusque incispi, densè villosis. Pers. Synops. l. c.

Ses feuilles sont oblongues, dentées en scie, marquées en dessous de larges taches rougeâtres; le calice à cinq divisions dentées en scie, presque

Kkk

lacinées; la corolle rubuleuse, velue, presqu'à deux lèvres, en b-sse à fa baie; une baie à une seule loge; les semences attachées aux parois de la loge.

BESTRAM : nom brame du *noëti-tali* des Malabares, décrit par Rheed, *Hort. malabar.* 4, pag. 115, tab. 56. Arbre faisant partie du genre que Burmann a nommé *antidesma*, qui veut dire *contre-poison*, parce qu'il passe pour le spécifique contre la morsure du serpent nommé *cobra di capello*. A. Janson a conservé le nom de *bestram*, & place ce genre dans la première section de sa famille des *sithyales*. (Voyez ANTIDESME.)

BÉTÉL : espèce de poivre (*piper betel* Linn.) cultivée dans diverses parties de l'Asie, surtout près des côtes de la mer, qui grimpe, à la manière de la vigne, sur les arbres ou sur les supports qu'on lui donne. Les Indiens le mâchent continuellement, & corrigent son amertume par un mélange de chaux & d'arec. On prend le bétel après le repas pour ôter l'odeur des viandes, & avant de se présenter chez les personnes auxquelles on doit des égards. Dans les visites on s'en présente mutuellement, & on le mâche toujours. Le bétel est diversément nommé dans chaque lieu; mais les dénominations de *bétel*, de *belle*, *bêre*, &c., sont dérivées d'un même nom primitif. On trouve aussi à Madagascar & ailleurs la même plante ou une espèce congénère. Plusieurs poivres sont connus au Brésil sous celui de *jaborandi*. Il paroît que le *berys* du même pays appartient encore au même genre. (Juss.) (Voyez POIVRIER, n°. 3.)

ETIS. Dans l'*Histoire des plantes des Philippines* de Camelli, imprimée par Rai, on trouve sous ce nom un grand arbre, dont le bois est folide, pesant, incorruptible, d'une saveur amère. Ses feuilles sont alternes, grandes, ovales, lancéolées & entières. Aux fleurs, rassemblées en paquets, & portées chacune sur un pédoncule particulier, succèdent des fruits fort petits. Le bois est bon pour exciter l'éternuement & pour chasser les vers, à raison de son amertume. La disposition des fleurs peut faire présumer que cet arbre appartient à la famille des sapotilliers. (Juss.)

BÉTOINE. *Betonica*. Parmi le petit nombre de plantes qui ont fixé l'attention des Anciens, la bétaine est une de celles dont ils ont parlé avec le plus d'éloge. Il paroît qu'ils étoient, dans leurs recherches sur les propriétés des plantes, dirigés par ce principe, vrai pour beaucoup de rapports, que plus les plantes avoient de faveur ou d'odeur, plus elles devoient avoir d'influence sur l'économie animale. La bétaine, d'une odeur incisive & pénétrante, avoit bien des titres pour entrer dans la liste des plantes médicinales; aussi l'enthousiasme a été porté si loin pour cette plante, qu'elle étoit presque considérée comme une panacée universelle. Maux de tête, maux d'yeux, d'oreilles, de dents, rétention d'urine, goutte, sciatique, engourdissement des membres, morsures de serpents, es fracturés, douleurs d'entrailles, ulcères, abcès, &c., enfin presque aucune des maladies qui affligent le corps humain ne pouvoit résister à la vertu toute-puissante de la bétaine. C'étoit déjà passer les bornes de la vraisemblance; mais le moyen d'arrêter l'esprit humain dans les écartés lorsque, sans principes, il n'est guidé que par l'amour du merveilleux! Bienôt la bétaine devint une plante sacrée. *Res omnino sanita est*, dit Metia, célèbre médecin d'Auguste, auteur d'un petit ouvrage sur les propriétés de la bétaine, & qu'il dit être la sauve-garde de l'âme aussi bien que du corps, garantissant ceux qui voyagent la nuit, de toute espèce de chaux & de dangers, écartant les vifs & les fantômes des lieux saints & du tombeau des morts. Quel homme raisonnable conféroit aujourd'hui sa santé à un médecin qui débiteroit de pareilles extravagances!

Dioscoride a donné au *betonica* des Latins les noms grecs *essron* & *psycotrophon*. Il y a, au reste, quelque confusion dans la nomenclature de plusieurs auteurs anciens; ce qui n'a pas grand inconvénient aujourd'hui, mais qui pouvoit en avoir beaucoup autrefois. Il paroît, d'après Pline, que *betonica* est le même nom que celui de *vetonica* employé dans les Gaules, & qui tire son origine des Vetons, ancien peuple d'Espagne, auquel on attribue la découverte de la bétaine. D'un autre côté, le *vetonica*, selon Pline, se nommoit *feratula* en Italie, dénomination qui a été réservée par la suite pour désigner une plante très-différente de la bétaine, le *feratula tinctoria* Linn. La bétaine a repris de nos jours la place qu'elle devoit occuper. On la cite avec éloge dans les Traités de matière médicale, & c'est à peu près tout. Son usage est passé de mode.

On trouve dans les *Illustrations des Genres*, tab. 507, fig. 1, le *betonica officinalis*, & fig. 2, le *betonica orientalis*. Ou a depuis découvert les espèces suivantes :

6. BÉTOINE roide. *Betonica stricta*. Ait.

Betonica spica oblonga, corollarum galea integrâ; lacinia intermedia latius inferiori crenato-undulata; calicibus pilosis. Ait. *Hort. Kew.* 2. pag. 299. — Decand. *Flor. franc.* 3. pag. 544. — Fusch, *Hist.* 350. Icon.

Betonica hirsuta. Thuill. *Flor. parisi.* édit. 2. pag. 293. Non Linn.

Betonica officinalis. Pollich, *Palat.* 562. Non Linn.

Betonica danica. Miller, Dict. n°. 3.

Cette espèce ressemble beaucoup à la bétoune officinale, avec laquelle on l'a probablement confondue; elle en diffère par son calice velu, par ses bractées ciliées à leurs bords, par sa corolle pubescente en dehors, par le tube plus court. La tige est plus roide, plus velue; les feuilles plus larges, plus velues. J'ai rencontré des individus dont l'épi, long de six à huit pouces, étoit composé de verticilles nombreux, très-écartés les uns des autres. La même variété a lieu dans la bétoune officinale. Je crains d'ailleurs que ces deux plantes soient réellement deux espèces distinctes.

Cette plante croît en France, sur les collines, dans les bois secs & sablonneux, aux environs de Paris. 4 (V. v.)

7. BÉTOINE blanchâtre. *Betonica incona*. Air.

Betonica spica interrupta, corollarum galea bifida; laciniis intermediis lobis inferioris crenatis; tubo tomentoso, incurvo. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 299.

Betonica incana. Miller, Dict. n°. 5.

Cette plante est rapprochée de la précédente. Ses tiges sont moins élevées, plus grêles; les feuilles un peu plus larges & moins longues; ses fleurs coul. ur de chair; mais le caractère qui la distingue plus particulièrement consiste dans la lèvre supérieure de la corolle, bise & non entière; le tube un peu courbé & tomenteux.

Cette plante croît en Italie, sur les montagnes. 4

8. BÉTOINE à grandes fleurs. *Betonica grandiflora*. Willd.

Betonica spica foliolis, interrupta; calicibus marginatis villis, densibus subulatis, corollis galea obcordata. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 96. Non Thuill. — Stephan. in litt.

Ses feuilles radicales ressemblent presque à celles du *phloxis tuberosa*, petiolées, en cœur, obtuses, pubescentes, à grosses dents obtuses, épaisses; les feuilles caulinaires inférieures petiolées; les supérieures & les florales stiles, ovales, presque en cœur, entières à leur base, pubescentes à leurs deux faces, à grosses dents un peu aiguës; les fleurs disposées, à l'extrémité des tiges, en verticilles au nombre de huit à dix, distans; les supérieurs rapprochés; les calices glabres, tubuleux, velus à leurs bords, à cinq dents subulées; la corolle quatre fois plus longue que le calice; la lèvre supérieure droite, plane, oblongue, entière; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu très-grand, entier, arrondi.

Cette plante croît dans la Sibérie, le long du fleuve Terek. 4 (Willd.)

Observations. Le *Betonica grandiflora* Thuill. est le *Betonica orientalis* Linn., qui paroît s'être naturalisé dans les bois de Meaux en Brie.

BÉTOINE d'eau. On donne ce nom à la scrophulaire aquatique. (Voyez ce mot.)

BÉTOINE de montagne : nom vulgaire de l'*Ornithoglossum montanum* Linn. (Voyez DORONIC, n°. 3.)

BETONICA. (Voyez BÉTOINE.) Ce nom latin de la bétoune a été aussi donné, par quelques auteurs anciens, à deux espèces de véronique, à deux scrophulaires, à un flachys & à deux oeillets (*dianthus corbuthanorum* & *superbus* Linn.), à une toque (*Juncularia peregrina* Linn.).

BÉTRE. On trouve dans Dalechamp une longue discussion sur ce mot, qui avoit été attribué mal-à-propos à la canelle, mais qui paroît plutôt appartenir à une espèce de poivre, & surtout à celui que l'on nomme bétel. (Voyez ce mot, Suppl.)

BETTE. *Beta*.

La bête, connue vulgairement sous le nom de poirée, se trouve mentionnée dans les auteurs les plus anciens, dans Théophraste, Plin, Dioscoride, &c.; mais il en est question comme d'une plante plutôt médicinale qu'alimentaire. Quant à la betterave, on pourroit peut-être la rapporter au *Beta nigrum* de ces mêmes auteurs, qu'ils ne distinguent de la première que par sa couleur & par quelques propriétés particulières qu'ils lui attribuent, sans qu'il y soit parlé de la propriété alimentaire de ses racines. Il n'y a pas même très-long-temps qu'on la connoît en France, du moins sous ce rapport. Olivier de Serres est le premier qui en ait fait mention, lorsqu'en 1599 il écrivit que cette plante venoit d'être apportée de l'Italie. On a reconnu depuis combien ce végétal étoit une acquisition intéressante.

On trouve dans les *Illustrations des Genres*, tab. 182, fig. 1, le *Beta maritima* Linn., & fig. 2, le *Beta vulgaris* Linn. Il existe une variété de la betterave, connue depuis de siècles; elle étoit cultivée sous le nom de racine de diète; elle étoit cultivée en Allemagne, & M. l'abbé Comm. en l'a introduite en France le premier. On lui attribue beaucoup de propriétés économiques, qui se retrouvent en grande partie dans notre betterave commune; mais les racines ne sont point alimentaires pour l'homme, comme celles de la betterave.

Aïton a fait connoître une troisième espèce de bête, caractérisée ainsi qu'il suit :

3. BETTE étalée. *Beta patula*. Ait.

Beta floribus congestis, foliis omnibus linearilanceolatis. Kkkk 2

ecolitis, ramis divaricatis. Aiton, Hort. Kew. 1. pag. 315.

Ses tiges sont hautes d'un pied, divisées en rameaux nombreux, étalés, allongés, garnis de feuilles étroites, glabres, toutes linéaires-lancéolées, presqu'en fer de lance. Les fleurs, réunies par paquets, ont les folioles du calice élargies à leur base, entières à leurs bords & non dentées. Cette plante, connue depuis peu d'années, n'est encore employée à aucun usage particulier; elle passe l'hiver dans l'orangerie, & croît naturellement à l'île de Madère.

* *Beta* (trigyna), *floribus ternis, trigynis; calicibus corollinis.* Walldt. Plant. Hungar. pag. 34. tab. 35.

Cette plante, observée le long des jardins, dans la Hongrie, est remarquable par ses fleurs ternées, disposées en longs épis, à trois styles. Ses calices ont l'aspect d'une corolle. Seroit-elle une variété du *beta vulgaris*?

BETTERAVE. (Voyez BETTE.)

BETULA. (Voyez BOULEAU.)

BETYS. Pison, dans son *Histoire du Brésil*, cite sous ce nom & sous celui de *bêre* un arbrisseau de quatre à cinq pieds de hauteur, dont la tige est droite, noueuse, verdâtre, parsemée de poins blancs. De quelques nœuds supérieurs il pousse des rameaux conformés & colorés de la même manière. Ses feuilles, lancéolées, ressemblent un peu à celles du laurier. Les fleurs, disposées en petits chatons, comme celles du poivrier, paroissent opposées aux feuilles sur les rameaux. Cette plante a en général le port du poivrier, mais elle n'en a point la saveur. La racine seule contient un arôme semblable à celui du gingembre, & sa décoction est employée pour calmer les douleurs de colique & dissiper les vents. Le caractère énoncé fait présumer que le *bety* est un poivre ou fait partie d'un genre voisin. Son nom, qui approche de celui de *bétel*, semble fortifier cette opinion. Il ne paroît pas qu'on puisse le rapprocher du *bait* que Brown a observé à la Jamaïque, & dont les chatons sont différents d'après la description. (Juss.)

BEURRE DE BAMBOUC. Mango-Parck, dans son *Voyage d'Afrique*, parle d'un arbre médicinal, à feuilles alternes & ovales, à fruits ronds, de la forme d'une noix, contenant un noyau rempli d'une amande de la grosseur d'un gland. Ces graines, pilées & bouillies dans l'eau, donnent une graisse d'un blanc-sale, qui tient lieu de beurre, & ressemble à du lard. C'est le beurre de bambouc, dont on fait usage en liniment pour guérir la sciatique. Il paroît qu'on lui donne aussi le nom de *beteale*.

BEURRERIA ou BOURRERIA. Brown, dans son *Histoire des plantes de la Jamaïque*, avoit désigné sous ce nom un arbrisseau qui porte, dans les Antilles françaises, celui de *bois cabril bâard*, & que Jacquin a ensuite décrit sous le même nom. Linné, qui l'avoit rapporté d'abord au fébétier (*cordia*), l'a ensuite réuni à son genre *ebretia*, qui a pris, en français, le nom de *cabrillet*. Le fruit de l'*ebretia* est une baie qui se partage en deux hémisphères, chacun à deux loges monospermes; celui du *beurreria* se divise en quatre segments également biloculaires; ce qui peut établir entr'eux une distinction générique. Au reste, ces deux genres doivent toujours rester rapprochés, & le *beurreria* servir de transition du fébétier au cabrillet. (Juss.) (Voyez CABRILLET, n°. 3.)

BEXUGO. Clusius parle d'une racine de ce nom, apportée du Pérou, & employée dans le pays comme purgative. Son écorce est gristée. Son goût, d'abord visqueux & douceâtre, devient ensuite âcre, & finit par être brûlant. Sa tige est sarmenteuse, & ressemble un peu à celle d'une clématite; ce qui l'a fait nommer *elematis peruviana* par Calpar Bauhin. On ignore cependant à quelle plante peut appartenir cette racine. Seroit-ce à l'*hippocrate*, qui est connu dans les Antilles & à Carthagène sous le nom de *bajuco*? Ce rapport de nom pourroit-il servir d'indication pour un rapport de caractère botanique? Nous trouvons encore, dans le *Recueil des voyages*, la vanille, indiquée au Mexique sous le nom de *vexuco*; mais il ne paroît pas, d'après l'énoncé de Clusius, que sa plante ait de l'affinité avec la vanille. (Juss.)

BEZERCHETAN : nom arabe du lin, suivant Dalechamp.

BEZERCOTHUME : un des noms arabes donnés à la pulicaie, suivant Dalechamp (*plantago psyllium* Linn.).

BEZETTA. On trouve sous ce nom, dans la Matière médicale de Murray, le tournesol (*erogon tinctorium* Linn.), dont on retire, dans le Languedoc, une féculé employée dans les teintures.

BEZOARD végétal. « On peut, dit M. de Justieu, donner ce nom à des concrétions pierreuses que l'on trouve dans l'intérieur du fruit du cocotier ou *calappa* de l'Inde. » Ces concrétions, dont la forme varie, sont nommées *calappies* par Rumphé dans son *Herbar. Amboin.* vol. 1, pag. 21.

BIASLIA. Vandel. Flor. lusit. & Bras. pag. 71. tab. 6. fig. 2. C'est la même plante que le *mayaca* d'Aublet. (Voyez ce mot.) C'est le *syena fluvialis* Vahl, Enum. Plant.

BICORNE. *Martynia* Linn. (Voyez COR-MARET.)

BICORNES ; nom donné par Ventenat à la famille des bruyères, parce que, dans beaucoup de plantes de cette famille, les anthères ont à leur base deux prolongemens en forme de cornes ; mais comme ce caractère n'est pas universel, il convient peut-être de conférer à la famille le nom tiré d'un de ses principaux genres. (Juss.)

BIDENS. (Voyez BIDENT.)

BIDENT. *Biden*. M. de Lamarck a réuni les *Spilanthes* à ce genre, dont en effet il est difficile de les distinguer d'après les parties de leur fructification ; mais leur port est si différent, que cette considération peut déterminer à les tenir séparés. M. de Lamarck est lui-même revenu à cette opinion dans les *Illustrations des Genres*. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut rattacher du genre *biden* Lam. toutes les espèces de *spilante* pour les reporter à ce dernier genre. (Voyez SPILANTE, Suppl.) Les espèces découvertes depuis la publication de ce genre sont :

18. BIDENT à feuilles de matricaire. *Biden chrysanthemoides* Mich.

Biden glabra, foliis subonnatis, lanceolatis, varietate serratis ; floribus erectis, aureis, multiradiatis ; seminibus biseriatis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 136. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1717.

Coreopsis perfoliata. Walther. Flor. carol.

Cette plante, d'après Michaux, est tellement semblable au *coreopsis biden* de Linné, qu'il ne doute point qu'elle ne lui appartienne si celui-ci a ses semences surmontées seulement de deux pointes. Willdenow, qui a vu la plante de Michaux, est presque de la même opinion ; mais il regarde le *coreopsis biden* Linn. comme une variété γ du *biden cernua* Linn., en faisant remarquer que les individus qui croissent dans les marais profonds ont des fleurs radiées, tandis que ceux des lieux humides n'ont que des fleurons sans languette ; cependant la plante de Michaux diffère du *biden cernua*, ainsi que du *coreopsis biden*, par ses feuilles oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, & non amplexicaules, seulement un peu adhérentes par leur base ; les fleurettes de la circonférence assez grandes, d'un jaune d'or.

Cette plante croît dans la Pensilvanie & la Caroline, aux lieux aquatiques.

19. BIDENT à feuilles de saule. *Biden heterophylla*. Ortega.

Biden floribus radiatis, erectis ; calice exteriori interiore longiore ; foliis caulinis lanceolatis, ser-

atis ; radicalibus subternatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1718. — Ortega. Decad. pag. 99. tab. 12.

Ses tiges sont droites, garnies de feuilles de deux sortes ; les radicales presque ternées ; les caulinaires & supérieures simples, oblongues, lancéolées, dentées en scie à leur contour ; les fleurs droites, radiées ; les fleurettes de la circonférence assez grandes, constamment stériles ; les folioles qui forment le calice extérieur plus longues que les intérieures.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ

20. BIDENT odorant. *Biden odorata*. Cavan.

Biden floribus radiatis ; calice exteriori longiore interioris ; foliis bipinnatis ; foliolis cuneiformibus, tridentatis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1720.

Biden caule tetragono, ramossimo ; foliis bipinnatis ; pinnulis cuneato-tripidis, glabris ; seminibus scabris. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 9. tab. 13.

Ses tiges sont droites, tétragones, très-rameuses, garnies de feuilles deux fois ailées, glabres à leurs deux faces, composées de folioles rétrécies en coin à leur base, trifides ou tridentées à leur sommet ; les fleurs odorantes, radiées ; le calice extérieur de la même longueur que l'intérieur ; les fleurettes de la circonférence blanches, amples, toutes stériles, environ au nombre de cinq ; les semences rudes, surmontées de deux pointes.

Cette plante croît au Mexique. ○

21. BIDENT à feuilles de sureau. *Biden sambuci-folia*. Cavan.

Biden floribus radiatis ; calice exteriori interiore longiore ; foliis decussive pinnatis, serratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1720.

Biden caule striato ; foliis oppositis, pinnatis ; pinnis ovato-lanceolatis, serratis, decurrentibus, ultimo majore. Cavan. Ic. Rar. 3. pag. 15. tab. 229.

Ses tiges sont droites, rameuses, striées, hautes d'environ trois pieds, garnies de feuilles ailées, opposées en croix, composées de pinnules ovales-oblongues, lancéolées, sessiles, dentées en scie, décurrentes sur le pétiole par le côté inférieur ; la foliole terminale plus grande. Les fleurs sont radiées, d'un rouge-écarlé ; le calice extérieur de la même longueur que l'intérieur.

Cette plante croît au Pérou & au Mexique. γ

22. BIDENT à folioles confluentes. *Biden con-nata*. Willd.

Biden floribus discoidis ; calice exteriori flore triplo longiore ; foliis caulinis ternatis ; foliolis lateralibus connatis, floralibus oblongo-lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1718. — Müntz.

Cette espèce, rapprochée du *bidens frondosa*, s'en distingue par la forme de ses feuilles & par son calice extérieur, plus court, à cinq folioles. Les tiges sont lisses & rameuses; les feuilles caulinaires pétiolées, ternées; les folioles latérales sessiles, oblongues, aiguës, dentées en scie, décourantes sur le pétiole par leur base; la foliole terminale pétiolée, oblongue, rétrécie à ses deux extrémités; les feuilles supérieures & florales pétiolées, oblongues. Le calice extérieur est à cinq folioles lancéolées, trois fois plus longues que la fleur; l'intérieur à folioles colorées, obtuses, égales, membranées à leurs bords. La corolle n'est point radiale.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ○ (Willd.)

23. BIDENT hérissé. *Bidens hispida*. Swartz.

Bidens foliis oppositis, ovato-lanceolatis, integerrimis, tomentoso-hispidis; caule scandenti-fruticoso; pedunculis oppositis, divergentibus, multifloris. Swartz, Prodr. 110, & Flor. Ind. occident. 3. pag. 1295.

Eupatorium jamaicense, foliis oblongis, subtus incanis. Sloan, Hist. r. pag. 257.

Ses tiges sont ligneuses, grimpantes, garnies de feuilles opposées, ovales-lancéolées, très-entières, velues, tomenteuses, blanchâtres en dessous; les pédoncules opposés, divergens, chargés de plusieurs fleurs; les anthères noires, renfermées dans l'orifice du tube.

Cette plante croît à la Jamaïque. ♀

24. BIDENT safrané. *Bidens crocata*. Cavan.

Bidens floribus discoidis, calice imbricato; foliis cano-scabris, eroso-dentatis; caulibus fasciculatis, radiceolibus ovatis; caule quadrilobo. Cavan. Ic. Rar. 1. pag. 66. tab. 99. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1725.

Cette plante s'éloigne, par son port & par plusieurs autres caractères, des espèces de ce genre. Ses tiges font quadrangulaires, ailées sur chacun de ses angles; les feuilles radicales ovales; celles des tiges presque en forme de lyre, toutes rongées, dentées à leurs bords, rudes, blanchâtres en dessous; le calice composé de plusieurs folioles imbriquées; les semences ailées, comprimées, surmontées de deux pointes.

Cette plante croît au Mexique. ♀ (Cavan.)

Observations. M. de Lamarck a fait graver dans les *Illustrations*, tab. 668, fig. 4, le *bidens eriopartea*, &c., d'après Gaertn., le *bidens frondosa*, fig. 2, & le *bidens pilosa*, fig. 3. J'ai rencontré bien souvent le *bidens cernua* muni de feuilles alternes sur ses derniers rameaux. Willdenow se

garde comme une espèce distincte le *bidens chinensis*, var. 3, du *bidens pilosa* Linn., ayant des fleurs radiées; les folioles ovales, presque en cœur. Il pense que le *coreopsis leucantha* Linn. appartient aux *oidens*.

25. BIDENT dichotome. *Bidens dichotoma*. Hort. Paris.

Bidens caule dichotomo, pubescente; foliis ovatis, eroso-dentatis; calicibus flosculis aquantibus (N.) Desfont. Hort. Paris. Catal. pag. 108. — Persoon, Synopf. Plant. 2. pag. 393.

Cette plante a le port & une grande partie des caractères du *verbena nasiflora* Linn. Ses tiges sont droites, pubescentes, dichotomes, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, simples, ovales, crénelées ou dentées à leur contour, acuminées à leur sommet, obliques à leur base; les fleurs latérales, presque sessiles, globuleuses, sans rayon à leur circonférence; les folioles du calice de la longueur des fleurons; les semences surmontées de deux arêtes dentées en scie.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (P. v.)

26. BIDENT pauciflore. *Bidens pauciflora*.

Bidens caule tenui, simpliciter; foliis pinnatis; pinnis inciso-pinnatifidis, glabris; floribus foliariis, oppositis, longè pedunculatis; calice interiore exteriorum multò superante. (N.)

Cette espèce se rapproche du *bidens bipinnata*, surtout par la forme de ses feuilles. Ses tiges sont grêles, tétragones, presque simples, à peine hautes d'un pied, garnies de feuilles opposées, pétiolées, une seule fois ailées; les pinnules légèrement décourantes sur le pétiole, lancéolées, irrégulièrement incisées, presque pinnatifides. De l'aisselle des feuilles supérieures sortent des pétioles opposés, foliaires, divergens, roides, beaucoup plus longs que les feuilles, terminés par une seule fleur oblongue, glabre, cylindrique, ne contenant qu'un petit nombre de fleurons; les folioles du calice intérieur linéaires-lancéolées, presque aussi longues que les semences; celles de l'extérieur beaucoup plus courtes; les semences longues, étroites, comprimées, surmontées de deux arêtes droites, barbes.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est pas connu. (P. v.)

BIENJOINT. On nomme ainsi, à l'Île-de-France & à celle de Bourbon, un arbre congénère du badier (*terminalia benjoin* Linn. Suppl.), qui est probablement le même que le *terminalia mauritiana* Lam. Ce nom lui a été donné parce que son

bois, ferme & très liant, est recherché par les charçons; il contient aussi un suc résineux qui transsude facilement des vieux arbres, & que l'on a cru être de la nature du benjoin; ce qui l'a voit encore fait appeler *benjoin de Bourbon*, *faux benjoin*, de sorte que son nom paroît avoir deux étymologies différentes. Commerçon, par le même motif, le nommoit *resinaria*, & en faisoit un genre nouveau, dont il n'avoit pas aperçu les rapports intimes avec le badamier. (Juss.)

BIFURQUE. *Dieranum*. Palis.-Beauv. (Voyez DICRANE, Suppl.)

BIGARRADE: variété de l'oranger. (Voyez *cit. mor.*)

BIGARREAUTIER: variété remarquable du cerisier commun.

BIGNEASSU: nom que porte aux Philippines, suivant Camelli, un arbrisseau dont les fruits sont de petites baies disposées en grappes, & qui paroît être une espèce de *phyllanthus*.

BIGNONE. *Bignonia*. M. de Jussieu a divisé en plusieurs genres les nombreuses espèces qui composent les *bignonia*, qu'il a établis d'après le nombre des étamines & la structure du fruit. Ces genres sont :

1°. Le *jaeazanda*, qui se caractérise par un calice à cinq découpures; une corolle tubuleuse à sa base, dilatée à son orifice; le limbe à cinq lobes inégaux; quatre étamines fertiles; un cinquième filament stérile, plus long, velu au sommet; un stigmate à deux lames; une capsule comprimée, orbiculaire, ligneuse, s'ouvrant à son bord en deux valves; une cloison charnue, opposée aux valves orbiculaires; les semences mûres d'un rebord membraneux. Le *bignonia carulea*, n°. 35, & le *bignonia brasiliensis*, n°. 36, appartiennent à ce genre.

2°. Le *catapa*. Son calice est à deux divisions; la corolle campanulée; le tube ventru; le limbe à quatre lobes inégaux; deux étamines fertiles; trois filaments stériles; un stigmate à deux lames; une capsule en forme de filique, longue, cylindrique, à deux valves; la cloison opposée aux valves; les semences membraneuses, & munies, à leur sommet & à leur base, d'une houpe de poils: tels sont le *bignonia catapa*, n°. 1, & le *bignonia longissima* Jacq., qui est le *bignonia quercus* Lam. n°. 2, &c.

3°. Le *secom*. Le calice à cinq dents; la corolle campanulée, divisée à son limbe en cinq lobes inégaux; quatre étamines fertiles; un cinquième filament stérile; un stigmate à deux lames; une capsule en forme de filique, allongée, cylindrique, à deux valves; la cloison opposée aux valves; les

semences membraneuses à leurs bords: tels sont le *bignonia flans*, n°. 26, le *bignonia radicans*, n°. 24, & le *bignonia pentaphylla*, n°. 19.

4°. Le *bignonia*. Ce genre se trouve alors réduit aux caractères suivans, qui le distinguent des précédens; savoir: un calice denté, presque entier; une corolle campanulée; son limbe à cinq lobes inégaux; quatre étamines fertiles; un cinquième filament stérile; un stigmate à deux lames; une capsule en forme de filique, plane, allongée ou ovale, plus courte, à deux valves; la cloison plane, opposée aux valves; les semences membraneuses à leurs bords.

Observations. Le *bignonia sempervirens*, n°. 3, ex'geoit plus que les autres encore d'être retranché de ce genre, n'en ayant point le caractère, & appartenant d'ailleurs à une autre famille; il approche de celle des apocinées. (Voyez GELSEMIUM, Suppl.) Un des embarras qu'offrent les nouveaux genres établis par M. de Jussieu est la difficulté d'y rapporter les espèces de *bignonia* citées par Linné, la fructification d'un grand nombre d'entr'elles n'étant point encore parfaitement bien connue. Nous en avons cité quelques-unes qui peuvent servir de type à ces nouveaux genres. Le *bignonia echinata*, n°. 16, se trouve gravé dans les illustrations, tab. 526, fig. 2.

Les espèces ajoutées à ce genre sont :

* Feuilles simples.

37. *BIGNONE tomenteuse.* *Bignonia tomentosa*. Thunb.

Bignonia foliis simplicibus, cordatis, tomentosis; floribus axillaribus, paniculatis. Thunb. Flor. jap. pag. 252.

Too, vulgè kiri. Kœmpf. Amœn. pag. 859. tab. 860.

Ses tiges sont ligneuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées; les inférieures en cœur, les supérieures ovales, aiguës, à cinq nervures, très-entières, pubescentes ou dessus, tomenteuses en dessous, longues de trois pouces & plus; les supérieures plus petites; les pétioles plus longs que les feuilles. Les fleurs sont disposées en panicules axillaires, d'abord trichotomes, puis dichotomes; les pédoncules, les pédicelles & les calices tomenteux.

Cette plante croît au Japon. h (Thunb.)

38. *BIGNONE à feuilles linéaires.* *Bignonia linearis*.

Bignonia foliis simplicibus, linearibus, acuminatis; floribus terminalibus, subumbellatis; caule erecto. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 290.

Bignonia (linearis), caule fruticoso; foliis spar-

fil. subternis, linearibus, acutissimis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 35. tab. 269. ?

Willdenow pense que cette plante qu'il décrit, est la même que celle qui porte le même nom dans les *Icones* de Cavaillès. Sa tige est droite, ligneuse, haute de quatre pieds, garnie de feuilles linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités, très-étroites, longues de trois pouces, acuminées, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont de couleur rose, terminales, presque disposées en ombelle, inclinées, ordinairement au nombre de quatre. Le calice se divise en deux, trois ou quatre découpures. La corolle est ondulée à son limbe. On distingue entre les deux étamines, plus courtes, le rudiment d'un cinquième filament. Le fruit n'a point été observé.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. *h* (Willd.)

39. BIGNONE à filique grêle. *Bignonia tenuifolia*. Vahl.

Bignonia foliis simplicibus, lanceolatis, glabris, integerrimis; paniculis terminalibus. Vahl, Eglog. 2. pag. 43.

Ses tiges sont grimpantes; ses rameaux grêles, cylindriques, glabres, parsemés de points blancs, garnis de feuilles pétioles, glabres, lancéolées, très-entières, longues de deux ou trois pouces, larges d'un pouce, souvent terminées par une longue pointe, veinées, d'un vert-obscure; les pétioles filiformes, longs d'un pouce & demi. Les fleurs sont disposées en panicule, à l'extrémité des rameaux; les pédoncules filiformes, cylindriques, longs de quatre à cinq pouces; les pédicelles longs d'un pouce & demi; les inférieurs ternés, les supérieurs opposés, une ou deux fois dichotomes; les fleurs solitaires sur chaque pédicelle. Le calice est glabre & caduc; la corolle glabre, longue d'un pouce & demi; les capsules glabres, linéaires, longues d'un pied & demi, à peine larges d'un quart de pouce, striées en dehors.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Vahl.)

40. BIGNONE à filiques larges. *Bignonia latifolia*.

Bignonia foliis subalternis, simplicibus, obovatis, emarginatis, obtusis, subius linearis; filiquis latioribus, compressis; seminibus ad latissimam cinctis. (N.)

Cette plante se rapproche du *Bignonia obtusifolia* par ses feuilles presque alternes; elles sont pétioles, coriaces, en ovale renversé, très-entières, obtuses, échancrées à leur sommet, glabres, longues de deux pouces & demi, veinées

en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, & traversées par des nervures noirâtres, parallèles, presque simples. Je ne connois point les fleurs. Les fruits consistent en une capsule en forme de filique, ovale, élargie, très-comprimée, à deux valves épaisses, presque ligneuses, contenant des semences minces, orbiculaires, pélicellées, entourées d'une large membrane blanchâtre, très-mince, entière.

Cette plante croît à l'île de Cayenne. *h* (V. f. in herb. Desfont.)

** Feuilles conjuguées.

41. BIGNONE à longues fleurs. *Bignonia spectabilis*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, cirsiosif; foliis ovato-oblongis, acuminatis, obtusis; floribus racemosis, glabris; calice integerrimo. Vahl, Symb. 3. pag. 80.

Ses tiges sont ligneuses; ses feuilles conjuguées, ovales, oblongues, acuminées, obtuses; il sort d'entre les feuilles des vrilles simples. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, courte, accompagnée de deux rameaux opposés, longs de deux pouces; les pédicelles inférieurs munis de trois fleurs, les autres uniflores; le calice petit, glabre, campanulé, entier à son bord; la corolle glabre, purpurine, un peu coriace, longue de trois pouces, divisée à son limbe en lobes ovales; les anthères glabres; les filaments allongés.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix. *h* (Vahl.)

42. BIGNONE à feuilles de laurier. *Bignonia laurifolia*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, oblongis, glabris; racemis terminalibus, ramis dichotomis; corollis exilis tomentosis, molissimis. Vahl, Eglog. 2. pag. 44.

Cette espèce paroît avoir beaucoup de rapport avec la précédente; elle en diffère par des caractères qui lui sont particuliers. Ses tiges sont glabres, ligneuses, grimpantes; ses feuilles conjuguées, glabres à leurs deux faces, oblongues, assez semblables à celles du laurier; elles n'ont point offert de vrilles dans les individus qui ont été examinés. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, à ramifications dichotomes. Les corolles sont d'une consistance molle & non coriace, tomenteuses en dehors.

Cette plante croît à Cayenne. *h*

43. BIGNONE à feuilles roides. *Bignonia rigescens*. Jacq.

Bignonia foliis conjugatis, cirsiosif; foliis ellipticis, retusis; floribus racemosis, pedunculis trifloris, calicibus

calicibus dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 194.
— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 44. tab. 210.

Arbrisseau dont les tiges sont grimpantes, munies de vrilles courtes, très-simples, garnies de feuilles conjuguées, ovales, elliptiques, un peu roides, longues d'environ un pouce, obtuses à leur sommet; les fleurs disposées, au nombre de trois sur chaque pédoncule, en grappes axillaires; leur calice campanulé, très-court, à cinq petites dents; la corolle blanche ou légèrement incarnate, jaune en dedans; le tube courbé; le limbe divisé en lobes en cœur.

Cette plante croît dans les environs de Caracas. ♀

44. BIGNONE blanc de lait. *Bignonia latiflora*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, cordato-ovatis, glabris; racemis inferis foliosis; calicibus limbo simplici, integerrimo. Vahl, Symbol. 3. pag. 80. tab. 66.

Ses tiges sont grimpantes; ses rameaux glabres, striés; les feuilles pétioles, conjuguées, longues de deux pouces & plus, glabres, ovales, en cœur, acuminées, très-entières, traversées de veines réticulées; les vrilles trifides seulement aux feuilles inférieures; les grappes terminales, quelquefois geminées; les pédicelles opposés, uniflores; les inférieurs à trois fleurs; une feuille florale, oblongue, pétiolée, de chaque côté de la base des pédicelles; le calice d'un blanc de lait, longue d'un pouce & demi, tomenteuse ou légèrement velue en dehors dans sa jeunesse; les capsules glabres, lancéolées, longues de deux pouces, aiguës à leurs deux extrémités.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix. ♀
(V. f. in herb. Desfont.)

45. BIGNONE alongée. *Bignonia elongata*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, cirrhosis; foliis ovobus, subius tomentosis; racemo longissimo, terminali; pedunculis dichotomis. Vahl, Eglog. 2. p. 45. tab. 16.

Ses tiges, ligneuses & grimpantes, sont garnies de feuilles conjuguées, ovales, membraneuses, longues de trois pouces, glabres en dessus, revêtues en dessous d'un léger duvet jaunâtre, très-entières, légèrement acuminées, obtuses. Le pétiole commun se prolonge en une vrille roide, épaisse. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale très-longue; leur calice oblong, coriace, tronqué, très-entier, long d'un pouce, légèrement tomenteux, ainsi que la corolle, qui est longue d'un pouce & demi; les pédoncules dichotomes.

Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. ♀

46. BIGNONE à corymbes. *Bignonia corymbifera*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, subcordatis, ovatis, acuminatis, utrinque glabris; corymbis axillaribus terminalibusque. Vahl, Eglog. 2. pag. 45. tab. 17.

Arbuste à tiges grimpantes, rameuses, garnies de feuilles pétioles, conjuguées, ovales, presqu'en cœur, glabres à leurs deux faces, acuminées, dépourvues de vrilles; les fleurs disposées en corymbes trichotomes, axillaires à l'extrémité des tiges; le calice tronqué, très-entier; la corolle pubescente, longue d'un pouce.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. ♀

47. BIGNONE à grandes feuilles. *Bignonia grandifolia*. Jacq.

Bignonia foliis conjugatis, cirrhosis; foliis oblongis, utrinque acutis; corymbo trifido, terminali; pedunculis, petiolis ramulisque scabris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 296. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 19. tab. 187.

Cet arbrisseau est remarquable par ses feuilles très-amplées, ovales-oblongues, veinées, glabres à leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités, longues d'environ un pied, munies de vrilles; les pétioles, ainsi que les rameaux, rudes au toucher; les fleurs disposées en corymbes trifides à l'extrémité des rameaux; les pédoncules hérissés de petits points saillants; le calice tubuleux, campanulé, à cinq petites dents obtuses; la corolle jaune, longue de deux pouces.

Cette plante croît aux environs de Caracas. ♀
(V. f.)

48. BIGNONE velue. *Bignonia villosa*. Vahl.

Bignonia foliis conjugatis, cirrhosis; foliis ovatis, subius villosis, mollissimis. Vahl, Eglog. 2. pag. 44.

Cette plante, d'après M. Vahl, a de très-grands rapports avec le *Bignonia pubescens* Linn., dont elle n'est peut-être qu'une variété; elle en diffère par ses feuilles ovales & non en cœur, conjuguées, membraneuses, presque glabres en dessus, excepté sur la principale nervure, parsemées en dessous de petits poils mous & cendrés; acuminées à leur sommet, longues de deux pouces. Le pétiole se prolonge en une vrille filiforme & velue. Le calice est glabre, campanulé, tronqué, très-entier; la corolle glabre, purpurine & non jaunâtre, longue d'environ trois pouces.

Cette plante croît proche Sainte-Marthe, en Amérique. ♀

*** Feuilles ternées.

49. ETGONE molle. *Bignonia mollis*. Vahl.

Bignonia foliis ternatis; foliolis subcordato-oblongis, utrinque pubescentibus; panicula terminali. Vahl, Eglog. 2. pag. 46, & Leon. Plant. Amer. tab. 10.

Bignonia (tomentosa), scandens, trifoliata, rufobifida, foliolis amplis, subcordato-ovatis, utrinque tomentosis; panicula terminali, multiflorâ; floribus parvis. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. t. pag. 111.

Ses rameaux sont garnis de feuilles opposées, ternées; les folioles latérales médiocrement pétiolées, ovales-oblongues, plus étroites à un de leurs bords, veinées, réticulées, un peu ridées, à cinq nervures, très-entières, obtuses, légèrement acuminées, couvertes d'un duvet mou & jaunâtre, longues de cinq pouces; la foliole terminale oblongue, élargie, un peu échancrée en cœur, soutenue par un pétiole long d'un pouce & demi; celui des folioles latérales deux fois plus court. Les fleurs sont petites, nombreuses, disposées en une panicule terminale; le calice campanulé, rouffâtre, pubescent; la corolle longue du six lignes, légèrement pubescente.

Cette plante croît à Cayenne. η

50. BIGNONE colorée. *Bignonia colorata*.

Bignonia foliis ternatis; foliolis ovato-oblongis, acuminatis, subtus pubescentibus; panicula patente, terminali; calicibus coloratis. (N.)

Cette belle espèce a ses tiges divisées en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles amples, ternées; les folioles ovales-lancéolées, coriaces, très-entières, acuminées, longues de huit à dix pouces, glabres & luisantes en dessus, pubescentes, un peu blanchâtres en dessous; il sort très-souvent, des aisselles des feuilles, d'autres feuilles ternées, beaucoup plus petites. Les fleurs sont disposées en une belle panicule étalée, terminale, très-glabre sur toutes ses parties, d'un rouge vineux; les ramifications opposées, ainsi que leurs divisions; chaque fleur pédonculée; le calice campanulé, tronqué, entier, coloré; la corolle glabre, petite, deux fois plus longue que le calice, couleur de lie de vin; le tube élargi vers son orifice; le limbe à quatre ou cinq lobes un peu inégaux.

Cette plante croît à Cayenne, où elle a été recueillie par Joseph Martin. η (V. f. in herb. Desfont.)

*** Feuilles digitées.

51. BIGNONE à fruits orbiculaires. *Bignonia orbiculata*, Jacq.

Bignonia foliis digitatis; foliolis oblongis, acuminatis, integerrimis, glabris; racemis axillaribus. Willden. Spec. Pant. 3. pag. 199. — Jacq. Amer. 184. tab. 180. fig. 79.

Arbuste grimpant, dont les feuilles sont composées de cinq folioles longuement pétiolées, glabres, oblongues, acuminées, très-entières. Dans les feuilles supérieures, le pétiole commun se termine par une vrille qui remplace la dernière foliole. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, inodores, jaunâtres, d'un grandeur médiocre; la corolle d'un jaune très-pâle à son limbe. La capsule est grande, orbiculaire, comprimée, plane, luisante, approchant de celle du *Bignonia carulea*.

Cette plante croît dans les forêts, aux environs de Carthagène. η

52. BIGNONE à fleurs d'or. *Bignonia chrysantha*, Jacq.

Bignonia foliis digitatis; foliolis ovatis, acuminatis, integerrimis, tomentosis; floribus terminalibus, congestis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 350. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 45. tab. 211.

Ses tiges sont droites, arborescentes, hautes de douze pieds; les feuilles composées de cinq folioles longuement pétiolées, ovales, acuminées, longues de cinq pouces, rudes, tomenteuses, très-entières; les fleurs ramassées en paquets terminaux, nombreuses, médiocrement pédicellées; chaque pédicelle supportant une ou deux fleurs; le calice tubuleux, campanulé, à cinq dents; la corolle jaune, longue de deux pouces.

Cette plante croît dans les environs de Caracas. η

53. BIGNONE à feuilles dentées. *Bignonia ferratifolia*, Vahl.

Bignonia foliis subquinato-digitatis; foliolis ovatis, attenuatis, serratis, glabris; pedunculis terminalibus, confertis, submissis. Vahl, Eglog. 2. pag. 46.

Ses rameaux sont garnis de feuilles composées de quatre à cinq folioles pétiolées; la terminale longue de trois à quatre pouces; les latérales beaucoup plus petites, routes ovales, amincies, veinées, glabres à leurs deux faces, inégalement dentées en scie, entières vers leur base; les pétioles très-glabres, comprimés, d'un brun-verdâtre; les pédoncules la plupart unifoires, quelquefois à deux fleurs, tomenteux, presque farineux, aggrégés à l'extrémité des rameaux, longs de six lignes; la corolle jaune, à deux lèvres, longue de trois pouces; un cinquième filament stérile.

Cette plante croît à l'île de la Trinité. η (Vahl.)

***** Feuilles ailées.

54. BIGNONE bijuguée. *Bignonia bijuga*. Vahl.

Bignonia foliis abrupte pinnatis; bijuga; foliolis ellipticis, integerrimis, Vahl, *Symb.* 2. pag. 68.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, comprimés à leur partie supérieure; les feuilles pétiolées, longues d'environ trois pouces; les folioles conjuguées, opposées deux à deux, longues d'un pouce & demi; les intérieures plus petites, elliptiques, médiocrement acuminées, obtuses, veinées, un peu coriaces, luisantes & glabres à leurs deux faces; le pétiole commun canaliculé; les parties longs de trois lignes, bordés par la décurrence des folioles; les fleurs disposées en grappes terminales; le pedoncule articulé, comprimé, élargi à sa partie supérieure; les pédicelles filiformes, longs d'un quart de pouce; le calice campanulé, presque entier à son bord, plus large que le tube de la corolle; celle-ci longue d'un demi-pouce.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. *Th* (Vahl.)

55. BIGNONE variable. *Bignonia variabilis*. Jacq.

Bignonia foliis inferioribus bitermatis, superioribus conjugato-ternatis, cirrhoris; racemo terminali. Willd. *Spec. Plant.* 3. pag. 305. — Jacq. *Hort. Schoenbr.* 2. pag. 45. tab. 212.

Arbrisseau grimpant, à rameaux tétragones; les feuilles inférieures deux fois ternées; les supérieures conjuguées, ternées, munies d'une vrille trifide; les folioles ovales, acuminées, très-entières, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées en une grappe simple, terminale, courte, touffue; le calice campanulé; les dents peu sensibles; la corolle longue de trois pouces; le tube d'un jaune-verdâtre; le limbe d'abord de la même couleur, puis blanchâtre.

Cette plante croît aux environs de Caracas. *Th*

56. BIGNONE fauve. *Bignonia fulva*. Cavan.

Bignonia foliis impari-pinnatis; pinnulis cuneato-ovatis, serratis; floribus racemosis, axillaribus. Cavan. *Icon. Raz.* 6. pag. 58. tab. 580.

Ses tiges sont hautes de cinq à six pieds; les rameaux tétragones, velus dans leur jeunesse; les feuilles éparées, presque opposées, ailées avec une impaire, composées d'environ dix-sept folioles épaisses, sessiles, opposées, ovales-cunéiformes, dentées à leur partie supérieure, tronquées, longues d'environ trois lignes, velues dans leur jeunesse; le pétiole un peu ailé entre les folioles; les fleurs disposées en grappes solitaires & axillaires; les pédicelles courts, unifoires; le calice velu, à cinq dents aiguës; la corolle jaune en dedans, d'un jaune-fauve en dehors, longue d'un pouce & demi

& plus; le limbe à cinq lobes ovales; l'ovaire globuleux & tronqué.

Cette plante croît au Pérou, dans les terrains sablonneux.

57. BIGNONE pandore. *Bignonia pandorana*. Vent.

Bignonia foliis pinnatis, subquadrifidis; foliolis ellipticis, serratis integerrimis; racemis compositis, caule volubili. Vent. *Hort. Malm.* pag. & tab. 43. — Andr. *Repos. bot.* tab. 86.

Ses tiges sont grimpantes, légèrement pileuses à leurs articulations; les rameaux opposés & tétragones; les feuilles ailées avec une impaire, composées de deux ou quatre paires de folioles elliptiques, souvent entières, glabres, luisantes, obtus; les pétioles articulés; les fleurs blanches, rachetées de pourpre à leur intérieur, disposées en grappes axillaires, lâches, rameuses, un peu inclinées; les pédoncules munis à leur base de bractées fort petites, circulaires, aiguës, très-caduques; la corolle tubulée, irrégulière, velue en dedans, longue d'environ un pouce; l'ovaire glabre, ovale; le stigmate à deux lames ovales, comprimées, ciliées; les semences brunes, arrondies, échancrées à leur sommet, entourées d'une membrane diaphane, lrisée & frangée.

Cette plante est originaire de l'île de Norfolk, dans l'Océan pacifique; elle fut découverte par le colonel Patterson en 1793. Il remarqua qu'à l'époque où les nouvelles feuilles commencent à pousser, la plante étoit presque entièrement recouverte d'une espèce d'insecte blanchâtre & cotonneux, du genre *aphis*; que cet insecte se reproduit, en deux ou trois semaines, sur tous les végétaux de l'île, & y occasionnoit des dégâts considérables: d'où lui est venu le nom de *pandora*. *Th* (Vent.)

* Espèces moins connues.

* *Bignonia* (ilicifolia), foliis coriaceis, ovatis, mucronatis, suboppositis, integerrimis, margine revolutis. Persl. *Synopf. Plant.* 2. pag. 170.

Cette plante, recueillie par Commeton à l'île de Madagascar, a des feuilles approchantes de celles de l'yeuse, coriaces, presque opposées, ovales, mucronees, très-entières, roulées à leurs bords; elles sont quelquefois ovales, échancrées; la fructification n'est que médiocrement connue. *Th*

* *Bignonia* (latifolia), scandens, glaberrima, foliis conjugatis; foliolis ovatis, nervosis, membranaceis; spicis lateralibus, calice inflato. Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Paris.* 1. pag. 111.

Ses tiges sont grimpantes, très-glabres; ses

feuilles conjuguées, composées de folioles ovales, membraneuses, glabres, nerveuses; ses fleurs disposées en épis latéraux, ramassées, fort grandes, de couleur jaune; leur calice renflé. Elle croît à l'île de Cayenne. *h*

* *Bignonia* (pyramidata), scandens, glabra, foliis conjugatis; foliolis ovatis, subcoriaceis; paniculâ terminali, subpyramidata, multiflorâ, à corymbis cymosis. Rich. l. c. E Caiennâ. *h*

* *Bignonia* (candicans), scandens, foliis conjugatis; foliolis subrotundo-ovatis, subtus candicante-tomentosis; paniculâ laxissimâ, parvisporâ. Rich. l. c. E Caiennâ. *h*

* *Bignonia* (pilulifera), scandens, foliis ternatis, obovatis, acuminè brevi; paniculâ brachiâtâ, à racemis compoſitis, piluliferis. Richard, l. c. E Caiennâ. *h*

* *Bignonia* (capensis), foliis impari-pinnatis, glabris; pinna ovatis, serratis; corollis curvatis, clavatis. Thunb. Prodr. pag. 105. E Cap. Bonâ-Spei. *h*

Observations. Le *bignonia quercus*, n°. 1, est le *bignonia longissima* de Swartz & d'Aiton. Le *bignonia kerere*, n°. 14, est le *bignonia heterophylla* Willd. Le *bignonia chinensis*, n°. 25, est le *bignonia grandiflora* Thunb. Flor. japon. 253, & Banks, Icon. Koempf. tab. 21. Willdenow fait du *bignonia indica*, var. *β*, n°. 28, une espèce particulière, qu'il nomme *bignonia longifolia*, & du *bignonia carulea*, var. *β*, n°. 35, une autre espèce qu'il appelle *bignonia procera*.

J'ai observé dans l'herbier de M. Desfontaines une espèce que je soupçonne de Madagascar, sous le nom de *bignonia articulata*, avec le nom vulgaire de *uhan*; elle est singulièrement remarquable par ses feuilles plusieurs fois articulées, comme celles du nopal, opposées, rétrécies en pétiole, dures, coriaces, luisantes, très-glabres, sans nervures sensibles, excepté celle du milieu; chaque articulation ovale, entière; la dernière souvent échan-crée. Je n'ai pas vu la justification.

BIGNONES (Les). Famille de plantes à corolle monopétale, insérée sous le puits, qui tire son nom de l'un de ses principaux genres, & qui joint aux caractères précédens, ceux d'avoir un embryon dicotylédon, & des étamines portées sur la corolle, toujours en nombre défini. Elle offre pour caractères secondaires: un calice monophyllé, divisé à son limbe; une corolle ordinairement irrégulière, à quatre ou cinq lobes inégaux; des étamines au nombre de cinq, dont une, quelquefois trois, avorte; l'ovaire surmonté d'un style ou d'un stigmate simple où à deux lobes.

Le fruit est divisé en deux loges polyspermes, tantôt capsulaire, s'ouvrant en deux valves, &

contenant une cloison entière, parallèle ou opposée aux valves, appliquée contre leur milieu ou leurs bords, sans contraster d'adhérence avec elles; tantôt coriace & comme ligneuse, s'ouvrant seulement par le haut, séparée intérieurement par une cloison adhérente aux valves, du milieu de laquelle sort quelquefois un réceptacle en forme d'aile ou de demi-cloison qui sépare chaque loge en deux demi-loges. Le nombre des graines est moindre dans ces fruits coriaces que dans les fruits capsulaires. L'embryon, dans les uns & les autres, est dénué de périsperme.

Cette famille renferme plusieurs arbres ou arbrisseaux, & quelques herbes. Les feuilles sont opposées dans la plupart, alternes dans un petit nombre.

Il suit que la corolle irrégulière, les étamines réduites par avortement à un nombre pair, la cloison du fruit capsulaire, simplement contiguë aux valves, la non-existence du périsperme & la tige ligneuse forment le caractère le plus distinctif des bignones, qui comprend les genres suivans, divisés en trois sections.

I. Fruits capsulaires, bivalves; tige herbacée.

Les galanes.....*Chelone*.
Les sésames.....*Sesamum*.
Les incarvilleas.....*Incarvillea*.

II. Fruits capsulaires, bivalves; tige ligneuse.

Les millingtons.....*Millingtonia*.
Les jacarandes.....*Jacaranda*.
Les catalpas.....*Catalpa*.
Les técomas.....*Tecoma*.
Les bignones.....*Bignonia*.

III. Fruits coriaces, ligneux; tige herbacée.

Les tourreties.....*Tourretia*.
Les cornarets.....*Marrynia*.
Les pédalies.....*Pedaliu*.

Voici les nouvelles observations que M. de Jussieu a présentées sur cette famille. « Les genres, dit-il, qui constituent les vraies bignones sont le *millingtonia*, le jacarande, le catalpa, le técome & la bignone. On leur a joint, dans une section distincte, des herbes qui ont presque le même caractère, & qui diffèrent seulement par leur port & par la cloison centrale du fruit. Cette cloison, dans quelques-unes, n'est qu'un axe filiforme, contre lequel s'appliquent des crêtes intérieures des valves: tels sont le sésame & la galane, dont quelques espèces détachées forment maintenant le genre *pentstemon*. L'*incarvillea*, qui a une véritable cloison membraneuse, tient le milieu entre ce genre & les vraies bignones. Une

troisième section renferme les genres à fruit coriace, qui sont en même tems herbacés, tels que le *tournefortia*, le *murtyria*, le *pedalum*. Lorsqu'on connoitra mieux le *tenacium* de Swartz, le *fulpiglossis* de Ruiz & Pavon, le *tripinna* de Loureiro, qui paroissent appartenir à cette famille, on saura à laquelle de ces sections il convient de les rapporter.

BIGNONIA. (Voyez BIGNONE.)

BIHAI. *Heliconia*, Le n°. 2, *heliconia bihai* Linn., est gravé dans les *Illustrations*, tab. 148. Jacquin réunit aux *heliconia* la plante suivante d'Aublet.

6. BIHAI à tige basse. *Heliconia humilis*, Jacq.

Heliconia foliis basi angustatis, apice acuminatis; spadice erecto, flexuoso radicalibus; spatheis distichis, multifloris; neitarii folio superiore tridentato. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1187. — Jacq. Hott. Schoenb. 1. pag. 23, tab. 48 & 49.

Musa (humilis), vasculis coarctatis, quinque aut sexforis; fructu trigono & violaceo. Aubl. Guian. 2. pag. 931.

Cette plante, qu'Aublet avoit considérée comme un bananier, appartient, d'après Jacquin, aux *heliconia*; elle s'élève peu. Ses tiges sont entourées à leur base par les gaines de feuilles oblongues, très-glabres, rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, très-entières, traversées par des nervures très-simples. La hampe, qui n'est que la continuation de la tige, & qui sort du centre des feuilles, soutient à son sommet un épi de fleurs, dont le spadice est droit, flexueux. Les spatheas, d'un rouge-écarlate, placées sur deux rangs opposés, enveloppent chacune cinq à six fleurs. Le sixième filament, pétaliforme, est terminé par trois dents. Les fruits sont de couleur violette, à trois côtés arrondis.

Cette plante croît aux environs de Caracas & dans la Guiane. ♀

BIHAR : nom arabe de l'*anthemis tinctoria*, qui étoit le *buphtalmum* ou œil de bœuf des Anciens & de Tournefort.

BIHIMITRON. (Voyez BOIS D'ANISSETTE.)

BIJON : nom donné, dans quelques lieux, à la térébenthine commune tirée du pin.

BILAK. *Bilacus*. Dans les Moluques on nomme ainsi, au rapport de Rumphé (*Herb. Amboin.* 1, pag. 197, tab. 81), le *marmelos* ou *marmeleira* des Portugais, que Linné avoit réuni à son genre *craeva*, mais que M. Corrêa en a séparé pour former

son genre *agle*, qu'il place dans la famille des orangiers.

BILIMBI, BILIMBEING, BILIMBEIRA, BILIN, BILLINGHAS, BLIMBING, BLIMBYNEN : noms indiens de diverses espèces de caramboliers. (Voyez ce mot.)

BILLARDIÈRE. *Billardiera*. Genre de plantes établi par Smith, à fleurs complètes, polyépiales, régulières, qui se rapproche des solanées, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, à tige grimpante, à feuilles alternes, à fleurs solitaires, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Cinq pétales alternes avec les folioles du calice ; point d'appendices ; un stigmate simple ; un ovaire libre ; une baie à plusieurs semences.

ES PÈ C E S.

1. BILLARDIÈRE grimpante. *Billardiera scandens*, Smith.

Billardiera pedunculis solitariis, unisporis ; foliis subhirsutis. Smith, Nov. Holl. 1. pag. 1. tab. 1. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1150. Non Vahl.

Arbuste petit & foible, dont la tige est couchée sur la terre, ou relevée & grimpante le long des corps qui peuvent lui servir d'appui, divisée en rameaux légèrement velus. Les feuilles sont alternes, velues, ovales, longues d'un pouce ; les fleurs solitaires, terminales à l'extrémité de chaque rameau, pendantes, pedunculées. Leur calice est divisé en cinq dents subulées ; la corolle blanche, composée de cinq pétales linéaires, alternes avec les dents du calice ; cinq étamines opposées aux divisions du calice, alternes avec les pétales ; un ovaire libre & cylindrique, surmonté d'un style court, termine par un stigmate à deux lobes. Le fruit consiste en une baie en forme d'olive, très-obtuse, presque tronquée à ses deux extrémités, contenant, sous une pulpe épaisse, quatre rangs de graines semblables à des lentilles.

Cet arbruste est originaire de la Nouvelle-Hollande ; il se cultive depuis plusieurs années en Europe, & paroît pouvoir être naturalisé dans les départemens méridionaux de la France. C'est le seul végétal à fruits bons à manger que les voyageurs aient trouvé dans les contrées désertes de la Nouvelle-Hollande. ♀ (V.)

Observations. Le nom de *billardiera* avoit été donné par M. Vahl à un genre de la famille des rubiacées, mentionnée maintenant dans la nouvelle édition du *Species Plantarum* par Willdenow, sous le nom de *fralichia*. (Voyez ce mot, Suppl.) M. Labillardière a découvert deux autres espèces appartenantes à ce genre.

2. BILLARDIÈRE à longues fleurs. *Billardiera longiflora*. Labill.

Billardiera pedunculis solitariis, unifloris; foliis levibus; petalis longissimis, margine introflexis. Labillard. Nov. Holl. 2. pag. 64. tab. 89.

Arbrisseau à tige grimpante, cylindrique, garni de feuilles glabres, alternes, lancéolées, queques-unes opposées; les fleurs solitaires, axillaires, pendantes, un peu plus longues que leur pédoncule; les folioles du calice ovales, aiguës, un peu ciliées, pileuses en dedans; les pétales oblongs, acuminés; les filamens de la longueur des pétales; les anthères ovales, à deux loges, échancrées à leur base. Le fruit est une baie ovale, pulpeuse, violette, à deux loges; les semences réniformes; l'embryon ovale, renfermé dans un péricarpe charnu.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (V. f.)

3. BILLARDIÈRE fusiforme. *Billardiera fusiformis*. Labill.

Billardiera paniculis paucifloris, foliis subhirsutis, antheris connatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 65. tab. 90.

Ses tiges font ordinairement grimpantes; les feuilles oblongues, lancéolées, un peu velues; les fleurs pendantes, terminales, réunies de deux à six en une petite panicule; de très-petites bractées aux divisions du pédoncule; les folioles du calice légèrement ciliées; la corolle bieu, étalée; les pétales ovales, acuminés; les filamens très-courts; les anthères à deux loges, s'ouvrant longitudinalement. L'ovaire est fusiforme, strié, soyeux, à deux loges; le style court; le stigmate presque en tête. Le fruit est une baie sèche, fusiforme, soyeuse, à deux loges; les semences ovales, comprimées, placées deux par deux sur un même rang.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (V. f.)

BILLONS : nom languedocien de la vesce cultivée.

BILULO : arbre des Philippines, qui paroît être une espèce de manguiier. Son fruit à la faveur de la mangue, & même il est plus agréable, suivant Camelli.

BIMAREGALY : nom caraïbe de l'eupatoire, suivant Nicholson.

BINECTARIA : genre de plantes du Levant, que Fokshall avoit établi sous ce nom, & que Vahl a réuni au *mimosa*. (Voyez les observa-

tions à la suite du *MIMOSOPS* KAUKI, vol. IV, pag. 187, & le NATTIER, n°. 1 (*imriscaria*.)

BINKOHUMBA : nom que porte, dans l'île de Ceilan, une espèce de *phyllanth* (*phyllanthus urinaria* Linn.), employé en décoction pour faire couler les urines; ce qui l'avoit fait nommer *urinaria* par Hermann, premier observateur de cette plante. *Binko* veut dire terre dans la langue du pays. Ce mot fait partie du nom de cette plante, parce qu'elle est toujours couchée par terre.

BINTAL. On nomme ainsi le *basella* à l'île de Ceilan.

BINTAMBURU : espèce de liferon de Ceilan, qui est le *convolvulus pes capra* Linn.

BINTANGOR : nom malais d'une espèce de calaba (*calophyllum inophyllum* Linn.). C'est le *vintan* ou *vintago* de Madagasc.

BINTOCO : petit arbre des Manilles, dont parle Camelli, cité dans le grand ouvrage de Ray; il contient une résine ou térébenthine jaunâtre & odorante, que l'on peut employer comme vernis. On peut présumer, non pas que c'est un térébinthe, comme le dit Camelli, mais qu'il appartient au moins à la famille des térébinthacées. (Juss.)

BINUNGA, MINUNGA. Camelli, dans ses plantes des Philippines, désigne sous ces noms un végétal qui paroît être le même que le *ricinus mappa* Linn. (*Léman*.)

BIONDELLA. En Toscane on donne ce nom, suivant Dalechamp, à la petite centaurée, parce qu'elle est propre, dit-il, à rendre les cheveux blancs. On a encore désigné sous le même nom le bois gentil ou sain bois (*daphne genkwa* Linn.), peut-être parce qu'on en tiroit une teinture jaune.

BIPICAA : nom caraïbe du cytis des Indes (*cytisus cajan* Linn.).

BIPPINULA. (Voyez ARÊTHUSE, n°. 5, Suppl.)

BIPIRA : nom caraïbe d'une espèce de glycine des Antilles (*glycine phaeoloides* Swartz), que Plumier avoit rangée parmi les haricots, & qui est remarquable par sa graine rouge, marquée d'une tache noire.

BIPOREIA. (Pet.-Th. Gen. Nov. Madagascar, n°. 46.) C'est le même genre que celui qui a été décrit dans cet ouvrage sous le nom de *niota*. M. du Petit-Thouars le regarde comme très-voisin du *banisteria*, ayant, comme ce dernier,

deux glandes au calice, mais dont il diffère par un seul style, & par une petite écaille à la base de chaque filament; l'ovaire est à quatre lobes; il lui fait cède quatre capsules comprimées, en forme de gousse, à une loge monoéprouée.

BIRANI, VIRANI : noms madagascariens du goudal des Malais, espèce de figuier que Rumphie décrit & figure dans son *Herbar. Amboin.* vol. 5, pag. 145, tab. 93. Les botanistes ne l'ont encore rapportée à aucune espèce connue.

BIRASOUREL : nom languedocien de l'hélianthus à grandes fleurs, vulgairement connu sous celui de *soleil*.

BIRCH-TREE : nom anglais, qui signifie *arbre bouleau*. Il a été donné dans la Jamaïque au gomart (*Bursera gummiifera* Linn.), dont l'écorce ressemble à celle du bouleau.

BIRIBOY : nom caraïbe d'une espèce de lobélie des Antilles (*Lobelia corymbosa* Lam.).

BIRIHDRYS. Dans l'herbier de Surin on trouve sous ce nom caraïbe l'*Epigaea cordifolia* Swartz, plante basse des Antilles, que Richard a nommée *Gaultheria schagvica*. (*Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris*, pag. 109.)

BISAILLE : mélange de pois & de fesse, que l'on sème pour la nourriture des bestiaux.

BISBERY : nom arabe du polypode ordinaire, suivant Dalechamp.

BISCUTELLA. (Voyez LUNETTIÈRE.)

BISERRULA. (Voyez RATEAU.)

BISLINGUA. On trouve sous ce nom, dans quelques anciens auteurs, une espèce de fragon (*Ruscus hypophyllum* Linn.), dont la fleur, portée sur le milieu des feuilles, est recouverte, avant son développement, d'une spathe en forme de languette, qui subsiste encore après la floraison; de sorte que la fleur parait sortir du milieu de deux écailles. On nomme aussi cette plante *bois-faux* dans quelques lieux, au rapport de Jean Bauhin.

BISMALVA. Dans quelques livres anciens on donne ce nom à la guimauve.

BISNAGUE, BISNAGUO : nom provençal de la visnague (*Aucus visnaga* Linn.), qui est l'*AMME*, n°. 2. Elle est sous les noms de *visnaga* & *bisnaga* dans les livres anciens.

BISSUS. (Voyez BYSSIE.)

BISTORTE. Le genre renouée (*Polygonum* Linn.) réunit plusieurs genres de Tournefort, dans le nombre d-iquels est la bistorte, distinguée par ses graines triangulaires, ses fleurs en épis terminaux & sa racine charnue, repliée deux fois sur elle-même, d'où lui venoit son nom. On pourroit ajouter qu'elle a neuf étamines, tandis que les autres renouées en ont moins. La racine de la bistorte est très astringente. Dans une espèce (*Polygonum viviparum* Linn.), la graine germe avant d'être séparée de la plante, & le petit tubercule qui en résulte, pousse ses premières feuilles sans se détacher. (Voyez RENOUÉE.)

BITI : nom malabar d'un grand arbre mentionné par Rheed, *Hort. malabar.* 5, pag. 115, tab. 58, qui parait être celui d'où provient le bois que les Français de l'Inde nomment *bois de bite*, très-estimé à cause de sa dureté, qui le rend susceptible d'un beau poli. La description qu'en donne Rheed est très-incomplète. La figure l'est encore plus; elle ne représente pas les fleurs. On peut cependant y reconnaître que cet arbre appartient à la famille des légumineuses, & peut-être à la partie du genre *sophora*, qui comprend l'*anticholirica* de Rumphie ou *sophora heptaphylla* Linn. (Aubert Petit-Thouars.) (Voy. SOPHORA, n°. 8.)

BITI-MARAM-MARAVARA : nom que les habitants de la côte du Malabar donnent à une plante orchidée, figurée dans l'*Hort. malab.* 12, pag. 5, tab. 2, qui croit sur le tronc des arbres, & spécialement sur le *biti*, comme son nom l'indique. *Maravara* s'applique à toutes les plantes parasites du même genre. Cette plante doit être rapportée aux *epidendrum* de Linné. (Aub. Petit-Thouars.)

BIXA : nom ancien du rocou, & que les botanistes ont adopté. (Voyez ROCOLIER.)

BIZARDA : nom donné par les Italiens à des citrons produits par le mélange de deux espèces.

BLA, BLAD : noms languedociens du blé ou froment.

BLACKBURNIA. Genre de plantes établi par Forster, & qui parait appartenir aux *pitsea*. (Voyez *Pitsea pinnata*, n°. 3.)

BLACOUËL. *Blakwellia*. Deux espèces de ce genre sont figurées dans les *Illustrations*, tab. 4123 savoir : le *blakwellia integrifolia*, fig. 1, & le *blakwellia axillaris*, fig. 2. Le genre que décrit Gærtner, vol. 2, pag. 169, tab. 117, sous le nom de *blakwellia*, est le *pelladia antarctica* Lam. Illustr. tab. 285. M. Ventenat a ajouté à ce genre les espèces suivantes :

4. BLACOUËL glauque. *Blackwellia glauca*. Vent.

*Blackwellia foliis ovato-oblongis, obtusis, glau-
cis; racemis axillaribus, paniculatis*. Vent. Choix
de Plant. Fasc. 10. tab. 55.

Arbrisseau à tige droite; noueuse, à feuilles
alternes, pétiolées, ovales, oblongues, presque
entières, très-obtusées, glabres, veinées, d'un
vert glauque, longues de sept à huit pouces; les
fleurs disposées en grappes axillaires, paniculées,
munies de petites bractées foliaires, pubescentes;
point de corolle, telon Venenar, mais un calice
pubescent, profondément divisé en quatorze dé-
coupures linéaires, très-ouvertes, aiguës, dont
sept alternes plus larges & un peu plus longues,
munies, à leur base interne, d'une glande noirâ-
tre; sept étamines attachées à la base des divisions
les plus étroites du calice; l'ovaire très-velu, ad-
hérent au calice par sa moitié inférieure, à une
seule loge, contenant des ovules nombreux, at-
tachés à ses parois.

Cette plante a été recueillie à l'Île-de-France
par Commerson. b

5. BLACOUËL à feuilles de cerisier. *Blackwellia
cerasifolia*. Vent.

*Blackwellia foliis ellipticis, acuminatis, dentatis;
racemis axillaribus, compoitis, erectis*. Ventenat,
Choix de Plant. Fasc. 10. tab. 56.

Arbuste distingué par la forme de ses feuilles,
& surtout par les glandes, qui n'adhèrent point à
la base, mais au milieu des divisions les plus étroites
du calice, & par son ovaire tout-à-fait libre.
Les feuilles sont glabres, ovales, elliptiques, ré-
trécies à leur sommet en une pointe obtuse, gar-
nies de dents courtes, écartées, glanduleuses à
leur base, accompagnées de stipules pubescentes,
courtes, linéaires, caduques; les grappes axil-
laires, leurs rameaux presque opposés; des brac-
tées lancéolées, très-courtes; le calice à dix dé-
coupures inégales, lancéolées, cinq alternes plus
larges, les autres tenant lieu de corolle; l'ovaire
globuleux, hérissé, à une loge; les stigmates
simples.

Cette plante, originaire de Madagascar, est
cultivée au Jardin de l'Île-de-France. b

6. BLACOUËL tomenteux. *Blackwellia tomentosa*.
Vent.

*Blackwellia foliis cuneiformi-obovatis, dentatis,
sæpius tomentosis; spicis axillaribus terminalibusque,
foliariis, erectis, longissimis*. Vent. Choix de Plant.
Fasc. 10. tab. 57.

La grandeur, la forme de ses feuilles, la dispo-
sition de ses fleurs, distinguent cette espèce de ses

congénères; elle se rapproche du *blackwellia axil-
laris*. Ses rameaux sont parsemés de tubercules
blanchâtres, tomenteux vers leur sommet, garnis
de feuilles à peine pétiolées, larges, presque cu-
néiformes, en ovale renversé, surmontées d'une
pointe caduque, dentées, tomenteuses & de cou-
leur cendrée en dessous, pubescentes en dessus;
les stipules subulées, pubescentes, caduques; les
fleurs petites, sessiles, tomenteuses, disposées en
épées axillaires, foliaires, presque terminaux, sim-
ples, grêles, allongées; munies de bractées ovales,
membraneuses; le calice à dix ou douze décou-
pures inégales; cinq alternes, tenant lieu de co-
rolle, soutenant les étamines, glanduleux à leur
base; l'ovaire globuleux, adhérent par sa moitié
inférieure; trois à cinq styles.

Cette plante croît à l'Île de Java, où elle a été
découverte par M. Lahiye. b

BLADHIA. (Voyez QUAKITE.)

BLAËRIA. (Voyez BLAÏRIE.) Houtton le pre-
mier avoit donné le nom de *Blair*, botaniste an-
glais, à une plante que Linné crut depuis devoir
réunir au genre *vervaine*. S'emparant ensuite du
nom de *blairia*, qu'il changea en celui de *blaria*,
il l'appliqua au genre qui en a conservé la dé-
nomination, quoique plus récemment Thunberg,
dans son *Prodromus Plant. Cap.*, ait essayé de le
détruire en le confondant avec la bruyère. On a
reconnu, depuis Linné, que le genre *vervaine*
contenoit plusieurs espèces qui devoient en être
séparées. La plante de Houtton étoit de ce nom-
bre, & forma le genre *priva* d'Adanson. Scopoli
établit avec d'autres son genre *zapania*. Gærtner
en détacha aussi trois, & voulut rétablir en leur
faveur le nom de *blairia*; mais l'une d'elles appar-
tient au *priva*, & les deux autres ont été repor-
tées au *zapania* par M. de Lamarck, qui a adopté
ce dernier genre dans les *Illustrations*. (Juss.)

BLAÏRIE. *Blaria*. Ce genre a été réuni aux
ericas par Thunberg. Le *blaria articulata*, n^o. 3,
est figuré dans les *Illustrations*, tab. 78. Il faut en
retrancher la plante de Bergius, citée dans la sy-
nonymie, & y rapporter, comme lui appartenant,
l'*ericia ericocephala*, n^o. 73. On a depuis ajouté à
ce genre quelques autres espèces imparfaitement
connues.

* *Blaria* (scabra), *antheris muticis; foliis qua-
ternis, lanceolatis, piloso-hispidis; florum capsulis
erectis, corollis clavatis*. Willden. Spec. Plant. 1.
pag. 619. — Thunb. Prodr. 78. Sub *ericid*.

* *Blaria* (fasciculata), *antheris muticis; foliis
quaternis, lanceolatis, ciliato-fimbriis; capsulis erec-
tis*. Thunb. Prodr. 71. Sub *ericid*.

* *Blaria* (muscosa), *antheris muticis, sobex-
fertiis; calicibus monophyllis, pilosis; corollis cam-
panulatis*,

*panulatis, supernè pilosis; floribus axillaribus, stig-
matibus peltatis.* Ait. Hort. Kew. 1. pag. 150.

Ad erica albens? Thunb. Prodr. 70.

* *Blaria* (elabella), *antheris aristatis; foliis
quaternis, o longis, glabris, margine scabris; flo-
ribus aggregatis, terminalibus.* Thunb. Prodr. 73.
Sub erica.

Blaria purpurea. Berg. Capenf. 34.

*Erica africana, pumila, coris folio; flosculis par-
vis, carnelis; apicibus longis, dispersis prostratis.* Sch.
Thesaur. 1. pag. 30. tab. 20. fig. 2.

Toutes ces plantes sont ligneuses, & croissent
au Cap de Bonne Espérance.

BLAKEA. (Voyez MÉLIER.)

BLAKWELLIA. (Voyez BLACQUEL.)

BLANC DE CHAMPIGNON. Ce terme sert à
désigner une masse de racines filamenteuses dont
les fumiers sont quelquefois chargés, qui n'est
autre chose que les premiers développemens des
semences de champignons, qu'on recueille avec
soin pour garnir les couches que l'on prépare à
l'effet de se procurer un grand nombre de ces
plantes.

BLANC D'EAU : un des noms vulgaires du né-
phthar blanc.

BLANC D'HOLLANDE. C'est une variété du pe-
plier blanc, n°. 1.

BLANCHETTE : nom vulgaire de la mâche
(*valeriana locusta* Linn.). On le donne aussi à l'an-
ferline maritime (*chesopodium maritimum* Linn.),
plus connue cependant sous celui de blanquette.

BLANKARA : nom donné par M. Adanson à
un genre de mouffe nommé *orchotrie* par M. Palis-
sor-Beauvois. (Voyez ce mot, Suppl.)

BLASIA. (Voyez BLASTE, & Il. Gen. tab.
877, qui est le *blasia pusilla*.)

BLASTE de la Cochinchine. *Blasus cochinchin-
ensis* Lour.

Genre de plantes établi par Loureiro, sur un
arbrisseau de la Cochinchine, dont les fleurs, si la
description de Loureiro est exacte, offrent des ca-
ractères qui n'ont jamais été observés dans aucun
autre végétal : c'est d'avoir les ovaires sur le dos
des anthers.

Cet arbrisseau est haut de six pieds, très-ra-
meux. Ses feuilles, lancéolées & opposées, sont
traversées par trois nervures. Les fleurs sont blan-
ches, & disposées plusieurs ensemble sur des pé-
doncules épars sur les rameaux ; elles ont chacune

Botanique. Supplément. Tome I.

un calice à quatre dents ; quatre pétales attachés
au fond du calice ; autant d'étamines, & environ
vingt ovaires, placés, suivant Loureiro, sur le
dos des anthers, qui sont grands & courbés.
Les ovaires, terminés chacun par un style délié &
un stigmate peu apparent, deviennent ensuite de
fruits enveloppés par les scices, qui prennent
de l'accroissement. Ces fruits sont attachés sur les
anthers, qui persistent après la floraison.

Ces caractères n'ont pas été figurés par Lou-
reiro, & sont si extraordinaires, qu'on ne peut les
croire exacts avant de les avoir vérifiés par de
nouvelles observations, & il est plus que probable
que ce que l'on prend pour des étamines appar-
tient exclusivement à l'organe femelle. (Muffe.)

BLATTAIRE. *Blattaria*. (Voyez MOLÈNE.) Le
nom *blattaria* désigne un genre de plantes que
Tournefort distinguoit de la moëne (*verbascum*
Linn.) par sa capsule globuleuse & non ovoïde ;
par ses fleurs en épis plus lâches. Linné n'a pas cru
ce caractère distinctif suffisant ; il a réuni les deux
genres sous le nom de *verbascum*. La blattaire a
été nommée improprement *herbe aux mites*, parce
qu'elle est souvent chargée d'antheres, que l'on
nommoit vulgairement mites.

BLATTI. *Sonneratia acida*. Lam. Ill. tab. 410.
Gærtner a décrit la même plante sous le nom d'*au-
bletia caefcularia*. De Frukt. & Sem. 1. pag. 379. tab.
78. fig. 2.

BLÉ. Quoiqu'il y ait un article général sous ce
nom, nous croyons devoir lui donner plus de dé-
veloppement, & profiter pour cela des excellen-
tes observations présentées par M. Thouin dans le
Diction. des sciences naturelles, vol. 3, pag. 459.

Le mot français *blé* vient du latin *bladum* ; mais
ce mot latin, comme le mot français, est généri-
que ; il exprime toutes sortes de grains propres à
faire du pain. Pour en désigner la qualité, il falloit
ajouter l'espèce : *bladum frumentum* vouloit dire le
froment ; *bladum ab equis*, l'avoine ; *bladum medi-
um*, le méteil ; *bladum hiemale*, le blé d'hiver ;
bladum grossum, minutum, le gros blé, le petit blé.
Quand on dit le commerce des blés ou des grains,
on comprend non-seulement les fromens, mais en-
core le seigle, l'orge & l'avoine. Dans les pays où
l'on ne cultive que du seigle, il porte le nom de
blé. On distingue même celui qui se sème en au-
tanne de celui qui se sème au printemps, par les
noms de *blé d'automne* ou d'*hiver*, de *gros blé*, de
blé de printemps ou de *mars*, de *petit blé*. Le blé de
la Saint-Jean est du seigle qui se sème au mois de
juin. Le blé méteil est le mélange du froment &
du seigle. Le blé d'Inde ou d'Espagne, ou d'Ita-
lie, ou de Turquie, est le maïs. Trois autres plan-
tes sont appelées *blé*, quoiqu'elles n'aient point
de rapport avec les fromentacées : ce sont le blé
noir ou le farrafin (*polygonum fagopyrum* Linn.) ;

M m m m

le blé de vache, espèce de *melampyrum*; le blé d'oiseau, qui est l'alspiste (*phalaris canariensis* Linn.). (Voyez l'article FROMENT.)

BLÉ DE NAGBOUR. « C'est, dit M. Cossigny, le plus beau blé connu, celui qui a le moins de son, qui contient le plus de farine, & qui fait le meilleur pain. Ce blé n'est que quatre mois en terre. Nagbour est une contrée de l'Indostan, voisine du Bengale. C'est de ce dernier pays que l'on peut en obtenir de la semence. » Cette intéressante espèce ne m'est point connue.

BLÉ LOCULAR. C'est le froment épeautre.

BLÉ NOIR ou SARRASIN. C'est le *polygonum fagopyrum* Linn. (Voyez RENOUÉE.)

BLÉ DE TURQUIE, BLÉ D'INDE. (Voy. MAÏS.)

BLÉ DE VACHE. (Voyez MÉLAMPYRE.)

BLECHNUM. (Voyez BLÈGNE.)

BLECHUM. M. de Jussieu, dans les *Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris*, vol. 9, pag. 251, propose d'établir sous ce nom un genre composé de plusieurs espèces de *justicia*, qui en diffèrent particulièrement par leurs fruits. (Voyez CARMANTINE, Suppl.)

BLÈGNE. *Blechnum*. Ce genre contient dans Linné un certain nombre d'espèces, qui ont été réunies par MM. Smith & Swartz dans un genre particulier, sous le nom de *woodwardia*, qui sera mentionné ici par une sous-division. Quelques espèces d'*osmundas* ont été également rappelées dans ce genre.

BLECHNUM. Capsules disposées en lignes foliaires, longitudinales, points interrompues, dans la même direction que la côte principale; enveloppe continue, s'ouvrant en dedans.

1. **BLÈGNE occidentale**, n°. 1. *Blechnum occidentale*. Linn. — Swartz, Filic. pag. 113. — Lam. Ill. Gen. tab. 869.

2. **BLÈGNE à dents de scie.** *Blechnum serrulatum*. Mich.

Blechnum frondibus pinnatis, striatis; pinnis ensiformibus, acutis, argutè rigidisque serrulatis. Swartz, Filic. pag. 113. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 264.

Cette espèce est grande, droite, roide; son feuillage simplement ailé; ses pinnules oblongues, lancéolées, presque en forme d'épée, aiguës à leur sommet, médiocrement élargies à leur base, finement dentées en scie, à dentelures roides, aiguës.

Cette plante croît dans la Floride, le long du fleuve Alfa-Hatcha. (Mich.)

3. **BLÈGNE denticulée.** *Blechnum denticulatum*. Swartz.

Blechnum frondibus linearilanceolatis, pinnatis; pinnis ovato-lanceolatis, striatis, denticulatis, basi sursum obtusangulatis. Swartz, Filic. pag. 113.

Belle espèce, haute de deux pieds, dont la fourche est lisse, cylindrique, anguleuse; le feuillage d'un vert-gai, linéaire-lancéole, simplement ailé; les pinnules alternes, ovales-lancéolées, glabres, striées, sessiles, aiguës, longues d'environ deux pouces; les supérieures plus rapprochées; les nervures serrées, parallèles; les dentelures régulières, cartilagineuses; la base des folioles relevée en angle obtus. La fructification est disposée en lignes foliaires le long de la côte du milieu, rares ou nulles à la base & au sommet des pinnules; les capsules fort petites, très-nombreuses, d'une couleur de rouille-pâle.

Cette plante croît à l'île de Ténéisie. (Swartz.)

4. **BLÈGNE cartilagineuse.** *Blechnum cartilagineum*. Swartz.

Blechnum frondibus pinnatis, subcartilagineis; pinnis alternis, lanceolatis, attenuatis, spinulose-ferrulatis, apice curvatis, basi adnatis, subauriculatis, superioribus coadunatis; stipite muricatum. Sw. Filic. pag. 114.

Elle se distingue par ses pinnules très-rétrécies & recourbées à leur sommet; par les dentelures cartilagineuses & par la roideur de toute la plante; elle s'élève à la hauteur de deux pieds & plus. Sa fourche est cylindrique, profondément cannelée, hérissée de points bruns, saillants, luisants; le feuillage presque cartilagineux, ovale-lancéolé; les pinnules alternes, sessiles, lancéolées, élargies, presque auriculées à leur base; les terminales presque confluentes, celles du milieu adnées, très-rapprochées; les inférieures libres en dehors à leur base; la fructification placée le long de la côte principale, dans toute l'étendue de chaque pinnule, composée de capsules nombreuses, de couleur ferrugineuse.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. (Swartz.)

5. **BLÈGNE australe**, n°. 3. *Blechnum australe*. Linn. — Swartz, Filic. pag. 114. — Pluk. Almsg. tab. 89. fig. 7.

6. **BLÈGNE orientale**, n°. 2. *Blechnum orientale*. Linn. — Swartz, Filic. pag. 114.

7. *Blechnum longifolium*. Cavan. Przl. t801. n°. 631.

Filix malaccensis. Petiv. Mus. n°. 543.

La variété 5 se distingue principalement par la longueur de ses pinnules, qui ont jusqu'à huit

pouces, tandis que dans la première elles sont à peine longues de trois ou quatre pouces.

7. BLÈNE ponctuée. *Blechnum punctulatum*. Sw.

Blechnum frondibus pinnatis; pinnis à basi cordatis linearilanceolatis, subsulcatis, integris, margine punctatis, inferioribus sensim brevioribus. Swartz, Filic. pag. 114.

Cette plante s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses fouches, hautes d'un pied, sont épaisses à leur partie inférieure, puis cylindriques, un peu comprimées, lisses, noires; le feuillage lancéolé, simplement ailé; les pinnules opposées; les inférieures petites, ovales, distantes; les supérieures insensiblement plus longues, égales, enfin décroissantes vers le sommet, toutes sessiles, en cœur, légèrement auriculées, linéaires-lancéolées, aiguës, longues de deux ou trois pouces, un peu courbées en faucille, entières, munies à leurs bords de petits points; les nervures latérales & bifides; les capsules d'un brun-ferrugineux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Swartz.)

8. BLÈNE roide. *Blechnum rigidum*. Swartz.

Blechnum frondibus pinnatis; pinnis cordato-lanceolatis, obtusis, summis confluentibus. Swartz, Fil. pag. 114.

Blechnum (capense), frondibus pinnatis; pinnis fissilibus, cordato-lanceolatis, integerrimis. Burm. Flor. capens. Prodr. pag. 28.

Cette fougère croît en gazon touffu, & s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Ses racines sont noires, filiformes, roides, très-longues, médiocrement rameuses; ses fouches nombreuses, cylindriques à leur base, canaliculées à une de leurs faces, longues de six à sept pouces; le feuillage roide, lancéolé, simplement ailé; les pinnules sessiles, opposées ou alternes, longues d'un pouce, oblongues, lancéolées, obtuses, un peu dilatées à leur base, glabres, légèrement fléchies en dessous, entières ou un peu crénelées; les supérieures souvent confluentes; la fructification dans le disque des pinnules, qu'elle recouvre ensuite en entier; les capsules d'un brun-ferrugineux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Swartz.)

9. BLÈNE à oreillettes. *Blechnum auriculatum*. Cavan.

Blechnum frondibus pinnatis; pinnis acuminatis, basi utrinque auriculatis, subsulcatis; fructiferis angustioribus. Cavan. Przl. 1801. n°. 647. — Swartz, Filic. pag. 114.

Son feuillage est simplement ailé, composé de

pinnules acuminées, auriculées de deux côtés de leur base, presque hâtées; les unes stériles, les autres chargées de fructifications. Ces dernières sont plus étroites.

Cette plante croît à Buenos-Ayres & dans l'isthme de Panama.

10. BLÈNE en queue. *Blechnum caudatum*. Cavan.

Blechnum frondibus pinnatis; pinnis sulcatis, subsulcatis, inferius longioribus, oppositis, summis confluentibus, terminali longissima. Cavan. Przl. 1801. n°. 649.

Cette espèce a son feuillage simplement ailé; les pinnules presque hâtées, courbées en faucille; les inférieures opposées & plus longues; les supérieures confluentes, la terminale très-longue. Elle croît aux îles Philippines & au mont Saint-Antoine, proche Chinborazo.

11. BLÈNE lisse. *Blechnum levigatum*. Cavan.

Blechnum frondibus pinnatis, subdiaphanis; pinnis lanceolatis, subrenatis, ciliatis. Cav. Przl. 1801. n°. 650.

Elle est remarquable par son feuillage presque diaphane, simplement ailé. Les pinnules sont lancéolées, légèrement crénelées & ciliées à leurs bords.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

12. BLÈNE élevée. *Blechnum procera*. Swartz.

Blechnum frondibus pinnatis; pinnis sterilibus, lato-lanceolatis, acuminatis, basi subcordatis, serrulatis; fructiferis linearibus, sterilibus fasci oppositis. Swartz, Filic. pag. 115. — Labill. Nov. Holl. 2. pag. 97. tab. 247.

Osmunda procera. Forst. Prodr. n°. 414.

Onoclea procera. Spteng. Schrad. Journ. 1791. 3. pag. 267.

Cette espèce croît en gazon; elle s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds & plus, couverte, à sa base, de paillettes ou d'écaillés denticulées. Ses racines sont épaisses, composées de racines fibreuses, de couleur noire, tomenteuses ou nues; le feuillage ailé; les pinnules opposées, légèrement pétioles; les stériles lancéolées, acuminées, à peine dentées, larges, très-longues, presque en cœur oblique à leur base; les pinnules fertiles beaucoup plus étroites, linéaires, couvertes, le long de leur côté, par la fructification en lignes non interrompues, composées de capsules nombreuses.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labill.)

Observations. Swartz a fait entrer dans ce genre
M m m m 2

l'osmunda spicane. Linn., qui est l'*acrostichum nemorale*. (Voyez ACROSTIQUE, n°. 12.) On a fait passer successivement cette plante parmi les *osmundas*, les *acrostichum*, les *onocles*, les *asplenium*, les *frutheopteris*, &c. Il faut encore rapporter, d'après Swartz, aux *blechnum*, l'*onoclea polypodioides* Linn. (Voyez ONOCLEE, n°. 1.)

* *Espèces douteuses.*

* *Blechnum* (serrulatum), *pinnis approximatis, linearibus, rectis, rigide serratis*. Rich. Caien. Aë. Soc. Hist. Nat. Paris. t. pag. 114.

* *Blechnum* (indicum), *frondibus pinnatis; pinnis alternis, lanceolatis, serratis, basi auriculatis*. Burm. Ind. pag. 231.

* *Filix non ramosa, femineis pinulis nervo medio pulverulento*. Pluken. Mantiss. tab. 406. fig. 4.

* *Phyllitis juxta nervum frutifera, pinnis brevioribus & latioribus americana*. Amm. Comm. Petrop. X. 297. tab. 20. (Ad *blechnum occidentale* forte spectat.)

* **WOODWARDIA**. Smith & Swartz. *Capitula disposita in points oblongs, distincta, séparés, placés le long de la côte principale; enveloppe en voûte, s'ouvrant en dedans.*

13. **BLÈNE** d'Houttuyn. *Blechnum Houttuyni*.

Blechnum (woodwardia orientalis), *fronde pinnatâ, subcoriacea; pinnis pinnatifidis; lobis dissinatis, ovato-lanceolatis, apice serratis*. Swartz, Fil. pag. 117.

Blechnum radicans. Houttuyn, N. H. 2. tab. 97. fig. 1.

Ses fouches sont nues, cylindriques, un peu anguleuses, canaliculées en dessus; le feuillage long de deux pieds & plus, deux fois ailé; les pinnules pétiolées, opposées, étalées, lancéolées, sinuées, pinnatifides; les folioles ou découpures lancéolées, alternes; les inférieures plus longues, un peu aiguës à leur sommet, roulées & dentées en scie à leurs bords; la terminale plus allongée, aiguë, sinuée; toutes glabres, un peu coriaces, rigides, veinées, réticulées; la fructification disposée le long de la principale nervure des folioles, placée comme dans une fossette; les capsules fort petites, d'un brun-ferrugineux, en forme d'un anneau luisant, & les enveloppes concaves, à demi ovales, entières, en forme de croissant, s'ouvrant du côté de la nervure.

Cette plante croît au Japon, où Thunberg l'a observée. (Swartz.)

14. **BLÈNE** du Japon, n°. 6. *Blechnum japonicum*. Thunb.

Blechnum (woodwardia japonica), *fronde pinnatâ; pinnis basi adnatis, subpinnatifidis; lobis co-*

adunatis, obtusis, serratis; fororum lineolis approximatis. Swartz, Filic. pag. 116.

Blechnum japonicum. Thunb. Flor. jap. pag. 33; tab. 35. — Spreng. Anl. 3. fig. 29.

Très-rapprochée de la précédente, cette plante en diffère par ses fouches, garnies, dans toute leur longueur, d'un feuillage presque deux fois ailé; les pinnules sessiles & non pétiolées, adnées à leur base, presque pinnatifides; les lobes concaves, obtus, incisés, arrondis; la fructification disposée par petites lignes très-fertiles; les enveloppes membraneuses.

Cette plante croît au Japon.

15. **BLÈNE** à dentelures épineuses. *Blechnum spinulosum*.

Blechnum (woodwardia caudata), *fronde pinnatâ; pinnis dentato-spinulosis, brevibus; terminali longissimâ*. Cavan. Præl. 1801. n°. 653. — Hort. Reg. Matrit. 1. Icon.

Son feuillage est ailé, composé de pinnules dont les bords sont garnis de dentelures courtes, terminées en une petite pointe légèrement épineuse; la foliole terminale très-longue, en queue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

16. **BLÈNE** droite. *Blechnum flans*.

Blechnum (woodwardia flans), *fronde pinnatâ, pinnis pinnatifidis; lobis ovato-lanceolatis, acutis serratis, subsulcatis*. Cavan. Hort. Reg. Matrit. 1. Icon.

Ses fouches sont droites, garnies d'un feuillage ailé; les pinnules pinnatifides, divisées en lobes ovales-lancolés, un peu courbés en faucille, dentés en scie à leurs bords; les dentelures aiguës.

Cette plante croît dans l'île de Madère & en Portugal.

17. **BLÈNE** de banistère. *Blechnum banisterianum*.

Blechnum (woodwardia banisteriana), *fronde pinnatâ, pinnis pinnatifidis; lobis obtusis, integris, basi minoribus*. Swartz, Fil. pag. 117. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 263. — Pluken. tab. 179. fig. 2.

Son feuillage est ailé, composé de pinnules pinnatifides, divisées en lobes obtus, très-entiers, ceux de la base beaucoup plus petits; la fructification disposée par petites lignes interrompues, le long de la principale nervure des pinnules & de leurs divisions.

Cette plante croît sur les montagnes de la Caroline.

* *Blechnum* (woodwardia angustifolia), *fronde*

pinnatis; pinnis linearibus, acutis, integerrimis.
Smith. — Swartz, Fil. pag. 116.

Blechnum carolinianum. Walther. Flor. carolin.
pag. 257.

* *Blechnum f. filix floridana*, prolongis & angustis
pinnulis. Pluken. Phyt. tab. 159. fig. 1.

Observations. M. Swartz rapporte au genre
woodwardia le *blechnum virginicum*, n°. 4, & le
blechnum radicans, n°. 5.

BLEPHARIS. (Voyez ACANTHE, Suppl.)

BLÈTE. *Blitum*. (Voyez Illust. Gener. tab. 5,
blitum virgatum, n°. 2.)

BLÉTIE. *Blasia*. Genre établi par Ruiz & Pavon sur quelques plantes herbacées du Pérou, qui paroissent devoir être placées dans la famille des orchidées, à côté du *limodorum*. On ne connoit encore bien que les fleurs de ces plantes, dont le caractère générique a été figuré dans la *Flora du Pérou & du Chili*, tab. 26, & les caractères spécifiques de cinq espèces, sans autre détail, mentionnées par les mêmes auteurs dans leur *Système veget. Flor. per.* pag. 229.

Le calice, semblable à une corolle, placé sur l'ovaire, est composé de six pièces, dont cinq supérieures & une inférieure. Des cinq supérieures, trois extérieures sont ovales-lancéolées, & deux intérieures, égales en longueur aux extérieures, sont une fois plus larges. La division inférieure, plus grande que les autres, & de forme différente, est en gouttière à sa base, & terminée par un grand lobe pendant; à trois découpures inégales. Entre la division inférieure & les supérieures, est placé, sur l'ovaire, un corps étroit, allongé, creusé en gouttière, & formé par la réunion du style & des éperons confondus ensemble. Au sommet, sur la face interne, le pollen est niché dans huit fossettes; L'ovaire devient une capsule à une loge & à trois valves, remplies par un grand nombre de semences très-menues, d'où résulte ce caractère essentiel :

Haut anthères; une corolle (ou calice) inclinée; cinq pétales supérieurs presque égaux; les deux inférieurs plus larges; un pétales inférieur plus grand, canaliculé à sa base; à trois lobes très-étroits.

Les espèces indiquées comme devant appartenir à ce genre sont :

* *Blasia (catenulata)*, bulbis catenulatis, subrotundis; annulis concinatis, connatis; foliis lanceolatis, stratis. Ruiz & Pav. l. c.

* *Blasia (repanda)*, bulbis subrotundis; foliis lanceolatis, nervosis, plicatis; scapo ex apice bulbi racemoso. Ruiz & Pav. l. c.

* *Blasia (ensiformis)*, bulbis aggregatis, subro-

tundis, triphyllis; scapo & foliis ad apicem bulbi; Ruiz & Pav. l. c.

* *Blasia (uniflora)*, bulbis subrotundis, compressifolius; foliis linearibus, serratis; scapis radicalibus, unifloris. Ruiz & Pav. l. c.

* *Blasia (parviflora)*, bulbis ovatis; foliis ensiformibus, cernatis; scapis paniculatis. Ruiz & Pav. l. c.

Ces différentes espèces croissent toutes au Pérou, dans l'automne, sur les montagnes, dans les forêts; elles sont herbacées.

ELITUM. (Voyez BLÈTE.)

BLUET, BLEUET. *Cyanus*. Tournef. C'est le nom vulgaire d'une plante dont Linné a fait une espèce de centauree (voy. CENTAUREE, n°. 30), & Tournefort un genre particulier, sous le nom de *cyanus*, que M. de Jussieu a cru devoir rétablir, & le distinguer des centaurees par les fleurs de la circonférence, beaucoup plus grands & plus longs que ceux du centre, irréguliers, plus ou moins profondément déchiquetés à leur limbe; leur tube en forme d'entonnoir; le calice composé d'écaillés ciliées à leur sommet. Les feuilles sont simples, allongées. Les *centaurea cyanus* — *montana*, &c. présentent ces caractères. On les trouve également dans les jaccées de Tournefort, qui n'en diffèrent que par les fleurs de la circonférence, presque égaux à ceux du centre, & que M. de Jussieu distingue également comme genre.

Cette jolie fleur me paroît appartenir particulièrement aux climats septentrionaux ou tempérés de l'Europe; elle est bien moins commune en Provence que dans les environs de Paris. Je ne l'ai jamais rencontrée dans les moissons qui couvrent les côtes de la Barbarie; elle n'est pas non plus citée dans la *Flora du mont Atlas* de M. Desfontaines, ni dans celle que Forskall nous a donnée de l'Egypte & des environs de Constantinople. Hasselquist n'en fait aucune mention dans son *Voyage du Levant*; ce qui me porteroit à croire qu'elle n'étoit point connue des Arabes, qui n'ont guère parlé que des plantes de leur pays. Le *cyanus* du Plin & le *strachium* de Théophraste se rapportent à d'autres plantes.

BLUET DU CANADA: nom donné dans le Canada, suivant Sarrasin, à une espèce d'airèle, qui paroît être le *vaccinium albidum* Linn.

BLYXA. (Pet.-Thouars, Gen. Nov. Madagaf. n°. 14.) Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des moricées (*hydrocharitides*), remarquable par la singularité de sa fructification, qui consiste en

Un ovaire allongé, prolongé à son sommet, surmonté d'un seul style & d'un stigmate; trois filaments,

foi tenant, à leur face intérieure, une anthère adhérente, à deux lobes; trois autres filaments alternes, stériles & plus longs; le calice composé de trois folioles linéaires; point de corolle; une capsule grêle, oblongue, à une seule loge, à trois valves; les semences encasées, fort petites, disposées sur trois rangs le long des parois intérieures des valves.

Ce genre renferme des plantes herbacées, aquatiques, plongées dans l'eau; les feuilles toutes radicales, transparentes, semblables à celles des graminées, disposées en rosette; les hampe radicales, à deux angles opposés, s'élevant jusqu'à la surface des eaux; les fleurs renfermées dans une spathe allongée. Cette plante porte à Madagascar le nom de *she-thorac*. Sa dénomination générale vient du mot grec *blazo* (*jaïco*), soufre, forgé des eaux.

BOA, BOBOA, BOBOAS, BASBAS : noms divers, donnés dans les Philippines à un arbre très-connu dans la Chine sous celui de *long-yen* ou *longan*. Son fruit est un des plus estimés de ce pays. Il paroît singulier qu'il y porte le nom de *bou*, qui, chez les Malais, entre dans la composition des noms d'un grand nombre de plantes remarquables par leurs fruits, comme si on avoit voulu l'appeler le fruit par excellence. Le *longan* est réuni avec le *litchi*, autre fruit excellent de la Chine, qui appartient au genre *euphoria* de Commen.

BOA KELOOR. Dans quelques lieux de l'Inde on nomme ainsi le *ben* ou *moringa* des botanistes.

BOA MASSI : nom donné, dans l'île de Java, à une espèce de joubert (*ziziphus linarioides*), qui croît aussi à Ceylan, & que Burmann a figuré dans son *Thesaur. zeylan.* tab. 88.

BOABAB. (Voyez BAOBAB)

BOARDSCHIA. Crantz, dans son *Flora austriaca*, pag. 7, tab. 1, fig. 1, a voulu confondre le nom de Boadich, professeur de botanique à Prague, en le donnant à un genre de plantes crucifères, que Jacquin & Linné avoient nommé, avant lui, *pelmaria*, & qu'Arduini & Lamarck ont depuis réuni au genre *elysota* (Voyez ce mot.)

BOBARA, BOBORA, BABORA : noms par lesquels les Portugais de l'Inde, & surtout du Malabar, désignent plusieurs courges ou cucurbitacées.

BOBART. *Bobartia*. Lam. illustr. Gen. tab. 40, figure copiée d'après celle de Plukenet. Ce genre doit être supprimé. Il a paru long-temps douteux, d'autant plus qu'on ne le trouvoit dans aucun herbier, pas plus que dans la nature. Enfin, Schumacher a donné, dans les *Actes de la Société d'histoire*

naturelle de Copenhague, vol. 3, pag. 8, tab. 1, une dissertation dans laquelle il annonce que le *bobartia* est la même plante que l'espèce de morde nommée *moraa fraxacea*. (Voy. MOREE, n°. 10.)

BOBU. Herman, dans son *Mesum zeylanicum*, nomme ainsi un adiant de Ceylan, dont il ne désigne pas l'espèce; il cite également, sous les noms de *bobu* ou plutôt de *bombu*, *bokum* & *to-humba*, c'est-à-dire, exotique dans la langue du pays, un arbre de la même île, dont les fleurs sont disposées en épis courts aux aisselles des feuilles, qui sont dentelées : celles-ci sont employées dans la teinture.

1. BOCCONE frutescente, n°. 1. *Bocconia* (frutescens), *foliis oblongis, sinuatis*. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 840. — Lam. III. Gen. tab. 394.

2. BOCCONZ à feuilles en cœur. *Bocconia cordata*. Willd.

Bocconia foliis cordatis, sublobatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 841.

Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles, qui à la vérité sont gauchies en dessous, mais arrondies, échancrées en cœur, nerveuses, veinées, à lobes peu sensibles, à dentelures obtuses. Les fleurs sont disposées en une panicule longue d'un pied; les rameaux très-simples, sans aucune ramification; le calice blanc, plus grand que dans l'espèce précédente; les étamines au nombre d'environ vingt-quatre; point de style; un stigmate sessile, à deux lobes.

Cette plante est soupçonnée originaire de la Chine. h (Willd.)

3. BOCCONE à feuilles entières. *Bocconia integrifolia*. Humb. & Bonpl.

Bocconia foliis oblongis, crenatis. Humboldt & Bonpl. Plant. equin. pag. 119. tab. 35.

Ses siges sont presque ligneuses, hautes de quinze à dix-huit pieds, très-rameuses; les rameaux alternes, distans, étalés, garnis, vers leur sommet, de feuilles alternes, allongées, lancéolées, longues de cinq pouces, larges d'un pouce & demi, pétioles, glabres, d'un vert-pâle en dessus, veinées, pubescentes & rousses en dessous, crénelées à leurs bords, aiguës à leurs deux extrémités.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, inclinée, de deux à trois fois plus longue que les feuilles; elles sont nombreuses, de couleur verte, pédicellées, accompagnées d'une bractée lancéolée, aiguë; le calice composé de deux folioles opposées, naviculaires; point de corolle; douze à quinze étamines; les anthères oblongues, presque sessiles; deux stigmates. Le fruit est une

capsule ovale, comprimée, ombiliquée par le style persistant, s'ouvrant à sa base en deux valves uniloculaires, monospermes; la femence ovale, bordée, sur un de ses côtés, par le *hilum*, qui s'étend depuis la base jusqu'au sommet. L'embryon est ovale, placé à la base des femences.

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes. *(Bonsl. & Hambl.)*

BOCCONIA. (*Voyez* BOCCONE.)

BOCHTAY : nom caraïbe d'une espèce d'eupatoire de Saint-Domingue, suivant Nicholson.

BOCKSHOORN : nom donné par les Hollandais au *nir-pongelien* des Malabares, qui est une espèce de bignone (*bigonia spathacea*), différente de ses congénères par ses fruits à quatre loges. (*Voyez* BIGNONE, n°. 32.)

BOEBERA. Ce genre a été établi par Willdenow sur une plante découverte par Michaux, & qu'il avoit nommée *tagetes papposa* dans sa *Flora de l'Amérique*. Cette plante diffère des tagètes par l'aigrette pileuse de ses femences, par un double calice; elle a, comme eux, le réceptacle nu. C'est la même plante que le *dyssodia glandulosa* Cavan. Démonstr. botan. pag. 202. (*Voyez* TAGÈTE, n°. 9.)

BOEHMERIA. Ce genre est composé de plusieurs espèces de procris & d'orties. (*Voyez* les observations à l'article PROCRIS. Le genre *varinaria* de Loureiro a de très-grands rapports avec celui-ci, & paroît devoir y être réuni.

BOEMICES. Achar. Nom que porte la septième tribu de la lichénographie d'Achatius. Il y réunit les espèces de lichens de Linné, qui offrent pour caractère essentiel :

Une croûte molle, composée de mamelons inégaux, d'où s'élèvent des tubercules ronds, lisses, l'épave, fongiformes, plus ou moins pédonculés, quelquefois filiformes.

Les principales espèces qui doivent être rapportées à ce genre sont le *lichen ericetorum* — *lyfoides* — *icmadophylla*, & plusieurs autres décrites par Acharius. Cet auteur a depuis réuni dans le même genre les *poridées*, les *pycnocées*, les *phylloctetes*, les *hiopodées*, les *scyphophores*, dont on avoit fait autant de tribus séparées. (*Voyez* LICHEN, Suppl.)

BOENGLO. A Java on nomme ainsi une espèce de bignone (*bigonia indica*), mentionnée dans la *Flora de l'Inde* de Burmann.

BOERHAAVIA. (*Voyez* PATAGONIE.)

BOGOA. (*Voyez* FIGUIER, n°. 4.)

BOIGUE : arbre du Chili, dont parle Feuillée, Observ. 3, pag. 10, tab. 6. Ses rameaux forment une tête arrondie. L'écorce qui recouvre le tronc & les branches a le goût de la canelle, & peut être employée aux mêmes usages; ce qui l'a fait nommer par les Espagnols *arbol de canella*. Ses feuilles sont alternes, semblables à celles du laurier ordinaire. Les fleurs, blanches, ont cinq pétales. Les fruits, disposés en têtes, ont la forme d'olive. Il paroît évident, comme le pense M. de Lamarck, que cet arbre est un *drymis*, dont chaque fleur renferme plusieurs ovaires, qui deviennent ensuite de fruits rapprochés.

BOIN-CARO. Suivant Rheed, *Hort. malabar.* 9, pag. 109, tab. 56, c'est le nom que les Brame donnent à une plante que Linné rapporte à une carantaine (*justicia guayana* Linn.). Boin, dans la langue des Brame, veut dire *petit*.

BOIN-ERANDO : nom brame d'une plante que Rheed a décrite & figurée sous celui de *codi-avanacu*, *Hort. malab.* 2, pag. 63, tab. 34. Linné l'a rapportée à son *tragia chomelae*. Erando est le nom brame du ricin; en sorte que *boia-erando* veut dire *petit ricin*. (*Aub. du Pet.-Th.*)

BOIN-GOLI : nom brame d'une petite plante figurée dans l'*Hort. malab.* 10, pag. 61, tab. 32. Suivant Burmann, c'est l'*oldenlandia repens* Linn. M. Adanson (*Suppl. à l'anc. Encyc.*) la regarde plutôt comme une espèce de pourpier; ce qui s'accorde mieux avec sa description. « C'est, dit Rheed, une petite plante qui a des tiges courtes, couchées, articulées, succulentes & rougeâtres; de ses articulations elle pousse des radicules. Les aisselles sont garnies de poils fins & blanchâtres. Les feuilles sont petites, succulentes; la fleur composée de quatre pétales jaunes, & de plusieurs étamines de même couleur. La décoction de cette plante dans le lait guérit les tumeurs d's pieds; connues sous le nom de *toddavala*. »

Quelqu'imparfaite que soit cette description, on peut y reconnaître une petite espèce de pourpier, qui paroît être le *portulaca mercurialis* Linn. f. Suppl., & qui croît dans presque toutes les cours du port de l'Île-de-France. Il seroit heureux qu'on y trouvât, comme le dit Rheed, le remède aux ulcères malins qui viennent aux pieds des Noirs, & auxquels on donne le nom de *crabe*. (*Aub. du Pet.-Th.*)

BOIS, TIGÉ LIGNEUSE.

Destinées à supporter une cime élevée, exposée à l'impétuosité des vents, les tiges des végétaux ligneux doivent être nécessairement douées d'une force suffisante pour résister aux dangers

auxquels les expofoit leur élévation coloffale. La nature a dirigé vers ce but important leur organisation ; elle a rendu leurs tiges d'une dureté , d'une folidité admirables en accumulant couches fur couches , année par année , en les refferant , les confolidant de plus en plus à mefure que le végétal s'élève & qu'il a befoin de plus de force. Pour concevoir cette admirable opération , il faut fe rappeler que l'on diftingue , dans le tronc des arbres (il s'agit ici principalement des arbres dicorpiés) , l'écorce , l'aubier & le bois proprement dit. L'écorce eft continuée par plufieurs couches minces , concentriques , appliquées les unes fur les autres , que l'on nomme *couches corticales*. On donne aux plus extérieures le nom d'*enveloppe cellulaire* , & aux plus intérieures celui de *liber* : celle qui les recouvre toutes en dehors s'appelle *épidémie*. Les couches extérieures font plus lâches , les intérieures plus ferees. Les unes & les autres font compofées de fibres qui s'étendent de bas en haut , mais qui ne fuivent pas des lignes droites ; elles s'écartent , le rapprochent , fe touchent en différens endroits , & forment une forte de réfeau fort irrégulier , dont les mailles ou efpaces vides s'alongent dans la longueur de la tige. Ces mailles font remplies par les utricules ou *tiffu cellulaire* qui unit les différens réfeaux , & coupe à angles droits les fibres longitudinales ; ce qui fait un entrelacement affez femblable à celui des morceaux de bois dont une claie eft compofée. Les couches corticales fe féparent très-aifément les unes des autres , ou d'elles-mêmes prefque fans effort , ou en les tenant quelque tems plongées dans l'eau : elles fe détachent alors comme par feuilles , & donnent l'idée d'un livre ouvert ; elles portent le nom de *liber*. Le liber finit là où commence l'aubier , c'eft-à-dire , cette portion des tiges ligneufes , très-diftinète de l'écorce , qui n'eft encore qu'un bois imparfait , intermédiaire entre l'écorce & le bois.

L'aubier diffère du bois par fon tiffu , beaucoup plus lâche , par fa légèreté , par fa couleur , ordinairement plus blanche ou moins foncée que celle du bois ; il diffère du liber ou de l'écorce par fon tiffu plus ferré , par fa couleur tirant moins fur le vert , & en ce qu'il ne fe fépare point auffi facilement que lui par feuilles. En un mot , l'aubier eft le paffage du liber à l'état de bois. L'organisation de l'aubier a toujours été regardée comme parfaitement femblable à celle du bois , & cette opinion a été confirmée par l'examen que M. Mirbel en a fait au microfcope.

« L'aubier , dit-il , eft compofé de grands & de petites tubes (fibres ou vaiffeaux) ; & de tiffu cellulaire. Les tubes font fouvent percés d'une multitude de pores ; ils s'étendent dans la longueur des tiges & des branches , & font difpofés en vaiffeaux qui fe réuniffent & fe féparent alternativement , à peu près comme un réfeau , dont les

mailles feroient très-étroites & très-alongées. Ces mailles font remplies par le tiffu cellulaire , qui , d'un côté , pénètre dans le bois , va fe rattacher à la moëlle , & de l'autre traverse le liber , & arrive jufqu'au parenchyme placé fous l'épidémie. »

L'organisation du liber & du bois eft la même que celle que nous venons de décrire , avec cette différence cependant , que , dans le liber , les mailles du réfeau formé par les tubes font beaucoup plus larges , & que le tiffu cellulaire eft plus abondant , tandis que , dans le bois , les vaiffeaux de tubes font plus droits , plus rapprochés , les mailles qu'ils forment beaucoup plus étroites & plus longues , & que le tiffu cellulaire eft en plus petite quantité. Cette reflemblance d'organisation entre le liber , l'aubier & le bois vient de ce que les deux derniers ne font que des couches de liber endurci. En effet , la nutrition du végétal détermine l'alongement des tubes du liber. Les mailles , en prenant plus de longueur , perdent de leur largeur : le tiffu cellulaire qu'elles contiennent , eft comprimé , & refufe en partie à la circonférence , & le liber , devenu plus compacte , forme l'aubier. A fon tour l'aubier , pénétré par les tubes nutritifs , s'alonge , & acquiert enfuite fubilement la folidité & la ténacité du bois , dont il n'eft plus poffible de le diftinguer. Il fuffit d'observer l'organisation des végétaux & le leur développement pour fe convaincre de cette vérité , qu'une expérience faite par M. Mirbel , & que nous allons rapporter , rend encore plus évidente.

« Dans les premiers jours du mois d'août , dit-il , nous avons fait paffer l'une des extrémités d'un fil d'argent entre l'aubier & le liber d'une branche de tilleul en pleine fève , & nous avons introduit l'autre extrémité de ce fil entre l'épidémie & le liber de cette même branche. Nous avons réuni & tordu enfemble les deux bouts du fil d'argent , après nous être bien affurés que le liber feul étoit renfermé dans le nœud. Quelques mois après , ayant diffequé la branche avec foin , nous avons reconnu que la partie la plus intérieure du liber , entourée par le fil d'argent , étoit déjà paffée à l'état d'aubier ; ce qui ne laiffe aucun doute fur la métamorphofe du liber & de l'origine de l'aubier. Cette expérience , faite dans le même tems fur le frêne , a donné un réfultat femblable. »

Quant à l'aubier , nul doute qu'il ne fe convertiffe en bois. Duhamel l'a démontré à peu près par le procédé que nous venons d'indiquer. Coſſavy , conjointement avec Buffon , a fait une très-belle application de cette découverte pour donner plus de valeur au bois que l'on deftine à des ouvrages qui exigent de la folidité ; il a prouvé que , fi on enlève l'écorce d'un arbre que l'on doit abattre une année après , l'aubier , mis à découvert , prend , dans ce court efpace de tems , la dureté , la pefanteur & les autres qualités du

Vrai

véral bois ; en forte qu'il n'est plus nécessaire de le rejeter, comme il faut le faire dans les arres revêtus de leur écorce.

Comme l'aubier ne se forme pas tout à coup, mais par le développement successif & souvent interrompu des feuillets concentriques du liber, il n'est pas également dur dans toutes ses parties, & l'on parvient même à le séparer quelquefois par couches en le laissant macérer dans l'eau ; mais cette défunon s'opère beaucoup plus facilement dans le liber, dont le tissu moins compacte se laisse mieux pénétrer par le dissolvant.

L'aubier se change en bois très-lentement ; il passe par routes les nuances qui l'approchent du dernier terme de perfection où il doit arriver. Les différentes couches de l'aubier ne se ressemblent pas ; elles n'ont pas toutes la même densité. Les plus voisines du bois sont aussi les plus dures, les plus liées-uses. Les vaisseaux, qui offrent une issue libre aux fluides nourriciers de la plante, s'obtiennent : les fluides qui y circulent, s'épaississent : les urticules se remplissent par les dépôts qu'ils reçoivent. La quantité & la qualité des matières contenues dans l'aubier établi ne encore une différence notable entre lui & le bois. La présence spécifique de l'aubier est moins que celle du bois ; il est encore moins résineux ; ce qui prouve que la résine dont le bois se pénetre, change la nature de l'aubier, & que c'est elle, en partie, qui le fait passer à l'état de bois.

L'aubier, sensible dans le plus grand nombre des arbres, surtout dans ceux à bois dur, dans le chêne, l'orme, &c., n'est bien moins dans quelques uns dont le bois est tendre, tels que le bouleau, l'aulne, le tilleul, le peuplier, &c. Il est très-difficile de pouvoir déterminer avec précision le tems convenable pour que l'aubier puisse se convertir en bois ; il doit varier selon la nature des différentes espèces d'arbres, & même dans les arbres de la même espèce, puisque leurs individus n'ont pas dans le même tems le même nombre de couches d'aubier ; que les arbres les plus vigoureux ont leur aubier plus épais que les arbres languissans, quoique le nombre des couches d'aubier observées dans ceux-ci soit plus grand que celui des couches observées dans les autres.

Enfin, MM. Buffon & Duhamel ont remarqué que le nombre & l'épaisseur des couches de l'aubier varient dans les différents côtés de l'arbre, & même dans les différentes parties. En effet, si l'on coupe horizontalement un tronc d'arbre, on remarque que les cerclés ligneux ne sont pas toujours concentriques à l'axe, mais qu'ordinairement ils s'en écartent plus d'un côté que d'un autre. Quelques auteurs ont pensé que c'étoit principalement du côté du nord. Plusieurs autres ont prétendu que c'étoit du côté du midi ; mais les uns & les autres se sont accordés à dire qu'au

Botanique. Supplément. Tome I.

moyen de cette excentricité des couches ligneuses, les voyageurs y trouvoient une boussole naturelle qui les orientoit, & les mettoit en état de rectifier leur route. Ceux qui prétendoient que les couches étoient plus épaisses du côté du nord, apportoient pour raison que le soleil ayant moins d'action de ce côté, il s'y conservoit plus d'humidité ; ce qui devoit produire nécessairement une augmentation d'épaisseur des couches ligneuses. Ceux, au contraire, qui prétendoient avoir observé que les couches sont plus épaisses du côté du midi, disoient que le soleil, comme principal moteur de la sève, la déterminoit à passer plus abondamment de ce côté. Ainsi chacun trouvoit des raisons physiques, favorables à son sentiment. L'observation luit pour détruire ce système.

« Nous avons en effet reconnu, dit M. Duhamel, que les couches se font souvent, & presque toujours, plus épaisses d'un côté que d'un autre ; mais cela arrive indifféremment, soit du côté du nord, soit du côté du midi, de l'est ou de l'ouest. Cette prétendue boussole est donc fautive à bien des variations propres à dérouter le voyageur qui voudroit y mettre la confiance ; mais elle est encore bien autrement fautive à errer, puisque nous avons observé que, dans un même arbre, la plus grande épaisseur des couches varie quelquefois de tout le diamètre de l'arbre ; en sorte que si, auprès des racines, la plus forte épaisseur se trouve du côté du midi, elle s'observe souvent auprès des branches du côté du nord ou vers toute autre partie de la circonférence de l'arbre. »

Il est aisé d'appréhender la raison physique de cette inégalité d'épaisseur des couches ligneuses, puisqu'il est clair qu'elle dépend de l'insertion des racines & de l'éruption des branches. Si l'on trouve du côté du nord une grosse racine, les couches ligneuses du bas de l'arbre seront plus épaisses de ce côté-là, parce que la sève y sera portée avec plus d'abondance. Si au contraire, vers la cime du même arbre, il sort une grosse branche du côté du midi, les couches liées-uses, examinées en cet endroit, seront plus épaisses de ce côté, parce que la sève aura été déterminée à y passer plus abondamment ; de sorte que les variétés sans bornes qu'on observe dans la position des racines & des branches, en produisant d'aussi considérables dans l'épaisseur des couches ligneuses. On a encore remarqué qu'en général les arbres placés sur la lisière des forêts avoient leurs couches plus épaisses dans toute la partie exposée au grand air & au contact immédiat de la lumière.

La nature du terrain ou d'autres circonstances produisent encore ce que l'on nomme *aubier double* ou *faux aubier*. C'est une couche entière de bois imparfait, recouverte par de bon bois. Dans les arbres attaqués par des gelées violentes, la

N u n n

bois parfait se trouve séparé par une couche de bois blanc; en sorte que, sur la coupe du tronc de ces arbres, on voit alternativement une couche d'aubier, puis une de bois parfait, ensuite une seconde couche d'aubier; enfin, un massif de bon bois. Ce delà est plus ou moins grand, plus ou moins commun, selon les différents terrains, les différentes situations. Dans les terres fortes & dans le touffu des forêts, il est plus rare & moins considérable que dans les clarières & dans les terres légères.

D'après ce qui vient d'être dit sur l'aubier, il s'ensuit que le bois est une masse de fibres compactes & très-dures, produite par la continuité du resserrement de l'aubier, c'est-à-dire, par l'oblitération de ses vaisseaux, le dessèchement de ses fibres & leur cohérence proportionnellement croissante à mesure que les nouvelles couches que la nutrition ajoute toujours à l'extérieur, forment une pression plus considérable. Il suit de ce principe, que la densité & la solidité du bois sont toujours en raison directe du tems de son accroissement; que les arbres qui croissent le plus lentement ont toujours le bois le plus dur, & qu'enfin les couches les plus intérieures du bois, étant les plus anciennes, sont aussi plus serrées & plus dures que les autres. C'est par cette même raison que l'aubier, qui est plus extérieur, n'est lui-même qu'un bois nouveau, fort imparfait & encore peu solide.

Dans le centre du bois existe la moëlle, qui est plus ou moins abondante, selon l'arbre dans lequel on l'observe, & selon l'âge de l'individu. Cette partie se dessèche dans la vieillesse du végétal, & disparaît quelquefois entièrement. Le bois qui recouvre ou enveloppe la moëlle est disposé par couches concentriques d'autant plus épaisses qu'elles sont plus extérieures, & quelquefois plus épaisses d'un côté que de l'autre, ainsi que nous l'avons observé ci-dessus pour l'aubier, & cela par une cause relative à l'exposition des arbres ou par quelques autres circonstances locales. Ces couches sont composées de fibres ligneuses, de vaisseaux plus ou moins obitérés, de trachées communément roulées en spirale, & qui paroissent destinées à contenir de l'air; enfin, d'un tissu cellulaire qui est plus abondant ou plus remarquable entre les couches mêmes, & semble de même nature que la moëlle, avec cette différence que celle-ci est composée de vaisseaux & d'utricules beaucoup plus lâches, d'où résulte une substance molle & spongieuse. Cette substance, pressée par les couches ligneuses, dont le nombre s'accroît annuellement, tend à s'échapper, parvient jusqu'à l'écorce, & forme sur l'aire d'une coupe transversale ces lignes droites & divergentes qui, partant du tronc, aboutissent à l'écorce, & auxquelles on a donné les noms de *productions* ou de *prolongemens médullaires*.

On a cru long-tems que le nombre de couches ligneuses qu'on comptoit sur la coupe transversale d'un arbre, étoit celui de ses années; mais M. Duhamel a prouvé que l'on ne pouvoit pas dire qu'un arbre de vingt ans eût la tige composée de vingt couches, tandis qu'un arbre de dix ans auroit seulement dix couches. Il est bien évident de remarquer, pour détruire cette erreur, que ce que l'on appelle *couche sensible* à l'œil est une zone composée de plusieurs couches extrêmement minces, tellement rapprochées & serrées, qu'on ne peut les distinguer, mais dont l'existence n'en est pas moins certaine, puisque l'on peut parvenir à les séparer, au moins en partie, les uns des autres par une longue macération pour quelques espèces de bois.

La formation des différentes couches du bois, les circonstances particulières qui les accompagnent, ont fait l'objet des recherches de plusieurs savans phyficiens, de Duhamel, Daubenton, Sennebert, &c. Nous ne pouvons entrer dans une longue discussion à ce sujet; nous nous bornerons à rapporter quelques observations de Duhamel & de Daubenton, qui fuffiroient pour donner une idée de ces intéressantes recherches.

« On voit, dit Daubenton, au centre de la tige naissante d'un arbre, la moëlle entourée de deux feuillets. L'intérieur est le plus tendre; cependant il deviendra ligneux, & par conséquent le plus dur. Le feuillet extérieur sera, partie de l'écorce; il est déjà revêtu de l'épiderme, & il a une apparence différente de celle du feuillet ligneux. De toutes les parties de cette pousse herbacée, la moëlle & l'épiderme sont les plus avancées dans leur organisation. La substance médullaire ou vésiculaire forme la plus grande partie de cette nouvelle pousse; elle est tendre, succulente, de couleur verte. A mesure que les feuillets se multiplient les uns sur les autres, ils s'endurcissent, & forment une gaine foliée, dans laquelle la moëlle est renfermée: celle-ci est alors moins succulente; elle devient blanchâtre. Dans les tiges de deux ans, cette substance est tout-à-fait blanche; elle paroît desséchée. Ensuite le canal médullaire diminue peu à peu de diamètre, & dans les gros arbres, même dans ceux qui ont eu le plus de moëlle dans leur jeunesse, on ne voit ni canal ni substance médullaire. »

Ces observations prouvent évidemment que la moëlle est l'organe le premier développé dans les nouvelles pousses des arbres: il s'étend de toutes parts à travers les couches ligneuses & corticales qui se forment autour de lui; il se prolonge jusqu'à l'épiderme. Outre ces prolongemens, qui vont en ligne droite & horizontale, il a des *ap-pendices médullaires*, qui se trouvent entre les autres parties de la tige.

Dans la tige naissante, la moëlle est entourée

de deux feuillets, dont l'intérieur sera ligneux, & l'extérieur est revêtu au dehors par l'épiderme, comme nous l'avons dit plus haut : il sera cortical. Le feuillet ligneux est déjà plus dur que le cortical ; il a une apparence différente : aussi n'ont-ils pas la même origine. On a trouvé sous la forme de trachées, dans de jeunes racines & dans des pousses herbacées, les fibres dont les feuillets ligneux sont composés. On n'a pas vu les mêmes trachées en aucun tems dans l'écorce. Il y a donc lieu d'admettre une différence entre les feuillets ligneux & les feuillets corticaux dans leur nature & dans leur origine ; mais ils se ressemblent tous par la disposition de leurs filets, en forme de réseau.

Les mailles de ces réseaux sont de figures irrégulières, & occupées par les prolongemens médullaires, à travers les filets ligneux & corticaux lorsque ces feuillets n'ont que peu de consistance dans les premiers tems de leur formation. La moëlle est composée de vésicules, rangées irrégulièrement dans un ordre qui se rapporte aux mailles d'un réseau.

Lorsque la substance médullaire s'étend latéralement pour former les prolongemens, elle doit s'insinuer entre les fibres des feuillets qui l'entourent, & s'écarte ces fibres pour faire des passages à ses prolongemens, qui sont des filets de ses molécules. Par conséquent, les ouvertures occupées par les prolongemens médullaires doivent se trouver placées dans les feuillets, comme les mailles d'un réseau correspondantes aux vésicules qui forment la circonférence de la moëlle.

A mesure que ces feuillets, l'un cortical, l'autre ligneux, prennent de la consistance, il se produit successivement entre deux d'autres feuillets qui accroîtront l'écorce & le bois de l'arbre tant qu'il vivra. On a donné aux feuillets de l'écorce la dénomination de *couches du liber*, parce qu'étant séparés les uns des autres, ils ressemblent aux feuillets d'un livre. Grew étend ce nom sur toutes les couches corticales. Malpighi n'y comprend que les couches intérieures, & peut-être seulement la dernière. Il suit entre le bois & l'écorce une matière qui y reste ; elle est d'abord si fluide, que l'on n'appercevoit, dit Duhamel, aucune adhérence entre l'écorce & le bois d'un saule qui est en pleine sève. Cette matière devient ensuite glaiseuse ou muqueuse par l'évaporation d'une partie de l'humidité. Dans cette circonstance, qui arrive au déclin de la sève, le bois & le liber restent couverts d'une substance épaisse, que Grew & Duhamel nomment le *cambium*.

Les opinions sont partagées sur la formation des couches corticale & ligneuse, qui contribuent chaque année à l'accroissement du tronc d'un arbre. On ne fait si ces couches sont formées par l'écorce, par le corps ligneux ou par le con-

cours de l'une & de l'autre. Il est certain que le bois, dépouillé de son écorce, produit de l'écorce & du bois, & que l'écorce, séparée du bois par un corps étranger interposé entre deux, produit aussi des couches corticales & ligneuses.

Lorsque l'écorce est unie au bois dans l'état naturel, il se forme chaque année une couche corticale & une couche ligneuse ; savoir : si ces deux couches viennent de l'écorce, ou si elles sont produites par le bois, ou si la couche corticale vient de l'écorce, & la couche ligneuse du bois. Quoique l'on ait vu, dans d'autres circonstances, ces couches produites toutes deux par le bois ou par l'écorce, on a fait beaucoup d'expériences pour résoudre ces questions. Il suffira de rapporter ici les principales.

Pour savoir si l'écorce pouvoit produire des couches ligneuses, Duhamel a enlevé des morceaux de l'écorce d'un arbre ; il a mis sur le bois, dépouillé de son écorce, des lames d'étain battu, telles qu'on en emploie pour l'étain des glaces ; ensuite il appliqua les morceaux d'écorce sur les lames d'étain ; ils se greffèrent avec l'écorce qui n'avoit point été enlevée. Enfin il se forma, entre l'étain & l'écorce, des couches ligneuses aussi épaisses que si l'écorce avoit été appliquée sur le bois.

Pour savoir si le bois écorcé pouvoit produire une nouvelle écorce, Duhamel fit enlever, au tems de la pleine sève, l'écorce d'un gros cerisier, comme on le fait aux jeunes chênes pour avoir du tan, dans toute la longueur de leur tronc. « Sur-le-champ, dit Duhamel, à l'aidé de petits cerceaux, j'enveloppai le tronc de cet arbre de paille longue. Cette enveloppe étoit éloignée de quelques pouces du tronc écorcé. Pour tenir la paille encore plus à l'abri du soleil, j'attachai, du côté du midi, un paillasse que je soutins avec des pieux. L'arbre en cet état fleurit un peu plus tard que les autres, & nous son fruit, quoiqu'il eût perdu une partie de ses feuilles & beaucoup de ses menues branches. L'année suivante il parut encore plus languissant ; mais la troisième année, le voyant bien rétabli, j'étais l'enveloppe de paille, & je trouvais le tronc recouvert d'une nouvelle écorce. »

Cette opération se fait naturellement à la suite d'une gelée ou d'un autre accident qui dépouille la tige d'un arbre de son écorce dans toute sa circonférence. Cette tige produit une nouvelle écorce & des couches ligneuses, comme si elle n'avoit pas été écorcée ; mais il reste une fente entre la couche d'ambur qui a été mise à nu, & la première couche ligneuse qu'il s'y est jointe ; elle s'étend à toute la circonférence des couches annuelles, qu'elle sépare des autres fentes qui n'en occupent qu'une partie. C'est ce que M. Duhamel appelle *roulure totale*.

« Lorsque, dit-il, on fend un tronc d'arbre qui renferme une roulure totale, à l'endroit de cette roulure on est surpris de voir une tige sans écorce, placée au centre du tronc, & qui peut s'en détacher. Cette tige est exactement recouverte par la couche annuelle qui l'enveloppe, de manière que la partie ligneuse des boutons, qui fait un relief sur la tige, est modelée en creux sur la couche annuelle qui recouvre cette tige. La partie herbacée des boutons a été détruite avec l'écorce par l'accident qui a mis le bois à nu dans le cas de produire une nouvelle écorce, & des couches annuelles comme s'il n'avait pas été écorcé. La roulure totale peut le faire sans art toutes les fois que l'aubier d'une tige écorcée conservera assez de fraîcheur & d'humidité pour produire une nouvelle écorce. »

Les avantages que l'homme retire du bois sont incalculables, & aussi variés qu'il y a de sortes de bois. Leur emploi sera indiqué à chacun des articles qui donnera la description des arbres qui le produisent. Nous nous bornerons à rappeler ici le résultat de quelques expériences faites par M. de Buffon pour connoître la force des bois auxquels on fait supporter des fardeaux très-pesants. Suivant ses observations, la force du bois n'est pas proportionnelle à son volume. Une pièce double pour la grosseur, d'une autre d'égale longueur, est beaucoup plus forte que double plus forte. Le bois de même nature, qui, dans le même terrain, a cru le plus vite, est le plus fort; celui qui a cru plus lentement, dont les cercles annuels sont plus minces, est moins fort. La force du bois est proportionnelle à sa pesanteur. De deux pièces de même grosseur & de même longueur, la plus pesante est la plus forte, à peu près dans la même proportion qu'elle est plus pesante. Une pièce de bois chargée simplement des deux riers du poids capable de la faire rompre, ne rompt pas d'abord, mais bien au bout d'un certain tems. Il résulte de ces ingénieuses expériences, que, dans un bâtiment qui doit durer long-tems, il ne faut donner au bois tout au plus que la moitié de la charge qui peut le faire rompre.

Bois. Ce mot est devenu générique pour désigner, dans l'usage de la vie, un grand nombre d'arbres qui n'avoient pas de noms particuliers. Le second nom, emprunté de différentes sources, les distingue les uns des autres. C'est, pour l'ordinaire, une épithète tirée des qualités extérieures ou des usages auxquels on emploie l'objet qu'elle désigne : tels sont les différents bois étrangers qui servent à la teinture & à la marqueterie, & dont la consommation est assez grande pour qu'ils entrent dans les spéculations du commerce. Il n'est pas difficile de connoître l'origine des noms de cette espèce; mais il y en a un bien plus grand nombre qui sont moins répandus, & qui offrent plus de difficultés pour remonter à leur source : ce sont

ceux qu'emploient les habitans de nos colonies d'Amérique & d'Afrique pour désigner le plus grand nombre des arbres qui forment leurs forêts. Ces noms viennent en partie des Noirs, qu'on y a transportés pour la culture. Dans la langue de ces peuples, très-voisine de celle de la nature, le même mot désigne en même tems les arbres, la substance que l'on en tire, l'usage auquel on les consacre, & quelquefois la propriété qu'on leur attribue. C'est ainsi que les habitans de Madagascar, qui ont été les premiers qu'on ait transportés à l'Île-de-France, donnent le nom d'*haka* à presque tous les arbres de leur île; ils le prononcent aussi *cajou*, ce qui est précisément le mot qu'emploient les Malais au même usage. Par le moyen d'une qualification, ils les distinguent les uns des autres. Ils emploient des procédés analogues pour désigner le plus grand nombre des plantes de leur pays. Forcés d'habiter un nouveau sol, ils n'ont pas abandonné cet usage; ils ont reconnu ou cru reconnoître plusieurs des végétaux qui leur étoient familiers.

C'est par-là que le mot de *bois* est devenu commun à presque tous les arbres. Les noms distinctifs ont été pris souvent, comme ceux du commerce, de leurs qualités & de leurs propriétés les plus remarquables, réelles ou imaginaires. Quelquefois on leur a donné celui des personnes qui les ont fait connoître ou employés les premiers. D'autres fois on leur a fait porter, sans altération, les noms mêmes de leur pays. Enfin, le caprice seul a quelquefois préfidé à ces altérations. De ces causes suit cette longue liste bigarrée de bois sous toutes sortes de noms. La même chose a lieu pour les mots *arbres, herbes, lianes, plantes, &c.* Nous nous bornerons à citer les bois les plus intéressans, avec un renvoi à leur genre lorsqu'il sera connu. Nous profiterons pour cela des recherches de M. du Petit-Thouars, de qui nous avons emprunté ce qui précède; nous y joindrons quelques articles de M. de Jussieu. On trouvera des détails plus étendus dans le *Dictionnaire des sciences naturelles*, vol. 5, pag. 47.

BOIS D'ARYNTHÉ, BOIS AMER. Dans l'herbier fait par Commerçon à l'Île Bourbon, on trouve sous ce nom une plante ligneuse qui a quelques rapports avec le *calas* (*carissu* Linn.), & qui est amer comme l'abîsynthe.

BOIS D'ACAJOU. On donne ce nom en Amérique, soit au *cedrela odorata*, qui est l'acajou à planches de la Martinique, soit au *swietenia mahagoni*, nommé aussi *acajou meuble* à Saint-Domingue, & *mahagoni* dans les colonies anglaises. On ne doit confondre ni l'un ni l'autre avec l'acajou proprement dit, *essivium* (*anacardium occidentale* Linn.), dont la graine résineuse & très-dure est portée sur un pédoncule sensible & charnu, ayant la

forme d'une poire. (Voyez ACASOU, CEDREL, MAHOGON.)

BOIS D'ACOSSOIS, BOIS BAPTISTE, BOIS DARTRE, BOIS A LA FIÈVRE, BOIS DE SANG. On connoît à Cayenne, sous ces différens noms, trois espèces de millepertuis en arbre, qui ont, comme l'*androsanum*, la toute-saine, autre espèce du même genre, un fruit en baie, & sont remplies d'un suc résineux, rougeâtre, presque de la couleur de sang. Ce suc est purgatif à petite dose, comme la gomme-gutte, & son application calme les démangeaisons occasionnées par les dartres. La décoction des feuilles est employée intérieurement pour guérir les fièvres intermittentes. Aublet donne la figure & la description de ces arbres, tab. 311-312. (Voyez MILLEPERTUIS.)

BOIS D'ACOUA, BOIS INCORRUPTIBLE. C'est l'acomat à grappes (*homalium racemosum* Jacq.). On nomme encore, à Saint-Domingue, *acomat rouge* ou *petit acomat rouge*, le *bumelia sulcifolia* Linn. (Voyez ACOMAT & BUMELIA.)

BOIS L'AGOUTI. (Voyez BOIS LÉZARD, GATILIER.)

BOIS D'AGRA : bois précieux, très-odorant, dont les Chinois font grand cas. On ne fait à quel arbre il appartient.

BOIS D'AGUILLA. Suivant Bosc, c'est un arbre d'Afrique, dont l'écorce, légèrement aromatisée, étoit autrefois apportée en Europe par les Portugais.

BOIS D'AIGLE, BOIS DALOËS (Voy. ALOËS.)

BOIS D'AINON : arbre de Saint-Domingue, très-grand, & employé pour le charbonnage, suivant Nicholson, qui ne donne pas d'autre renseignement sur ce végétal.

BOIS D'ALOËS. (Voyez ALOËS.)

BOIS AMANDE, PETITE CIQUE. On nomme ainsi à la Martinique, suivant Terrafon, le *marila racemosa* de Swartz, genre de plantes qui tient le milieu entre la famille des guttifères & celle des millepertuis. Dans l'herbier de Surian, fait aux Antilles, on trouve aussi sous le même nom un arbrisseau à feuilles alternes, qui paroît être une espèce de laurier.

BOIS D'AMARANTHE, employé dans la matquerie. Il paroît que c'est le même que le mahogon (*swietenia* Linn.)

BOIS AMER. (Voyez BOIS D'ABSINTHE.)

BOIS D'AMOURITTE : espèce d'aracée des Antilles (*mimosa tenuifolia*). Une autre espèce (*mimosa samariadajolia*) est nommée *petit bois d'amourrette*.

BOIS ANGELIN. (Voyez ANGELIN.) Ce bois très-dur est employé, dans la Guiane, pour construire des maisons & des cases de Nègres, & pour former des palissades. Avec son cœur on fabrique des mortiers, des pilons & différens meubles.

BOIS D'ANIS. Plusieurs arbres portent ce nom, parce qu'ils exhalent l'odeur d'anis de quelques-unes de leurs parties : tels sont le badian (*illium anisatum* Linn.), le limonellier de Madagascar (*limonia madagascariensis* Lam.), l'avocatier (*laurus persea* Linn.).

BOIS D'ANISETTE. Desportes & Nicholson indiquent, sous ce nom & sous celui de *bihimitron*, un arbrisseau de Saint-Domingue, à feui les larges & à l'odeur d'aneth, qu'ils disent être un *saururus* de Plumier, c'est à-dire, une espèce de poivre en arbre, le même que le *jaborandi* des Breiliens. C'est peut-être le *piper aduncum*, que Plumier, dans ses *Plantes d'Amérique*, pag. 39, rapporte également au *jaborandi*.

BOIS ARADA ou TAVERNON. Cet arbre, ainsi nommé à Saint-Domingue, & mentionné par Desportes, pag. 279, est, selon Poiteau, une nouvelle espèce d'icaquies (*chrysolobanus*) ; il est aussi nommé *bois piquant*, suivant Nicholson.

BOIS D'ARGENT. *Protea argentea* Linn. (Voyez PROTEA.)

BOIS AROLE. (Voyez AROLE, Suppl.)

BOIS BACHA. (Voyez BOIS A CALEÇONS.)

BOIS A BAGUETTES : nom que portent à Cayenne deux espèces de rainiers (*coccoloba*). A Saint-Domingue on le donne à un scabellier. Les arbres, dont les rejets sont droits, minces & solides, portent ailleurs tantôt ce nom, tantôt celui de *bois de gaulette*.

BOIS A BALAI. On donne ce nom, en général, à beaucoup d'arbres & d'arbrisseaux dont les rameaux, grêles & flexibles, sont employés à faire des balais.

BOIS BALLE. On nomme ainsi, à Cayenne, la *guarea trichilioides*, dont le fruit a la forme & la grosseur d'une balle.

BOIS DE BANANES. A l'île Bourbon on donne ce nom à une espèce de canang (*avaria*), parce que ses fruits réunis imitent en petit une portion

du régime de banane. A l'île-de-France on donne ce même nom à un bois très-mou. On peut remarquer que Rumphé a traduit un nom malais d'un arbuté du même genre *uvaria* par *junia muraria* ou liane à banane.

BOIS-BAN : nom que l'on donne, à Saint-Domingue, au *cordia allavoca*. Cet arbuté ne sert qu'à faire du bois à brûler.

BOIS BAPTISTE. (Voyez BOIS D'ACCOIS.)

BOIS A BARRAQUES ou BARAG : nom que l'on donne, dans quelques quartiers de Saint-Domingue, au *combretum laxum* Linn., probablement parce que ses rameaux plans & ses feuilles servent à faire & à couvrir de rhétives cases, ou peut-être parce que cet arbrisseau, qui vient très-touffu sur le bord des ruisseaux ou ravines, sert de refuge aux cochons marrons, que l'on nomme aussi *baraga*.

BOIS A BARRIQUES de la Martinique. C'est, suivant Chanvallon, le *bauhinia porreda* Linn., probablement ainsi nommé parce qu'on en fait des barriques.

BOIS-BÉNIT : nom donné quelquefois au buis, parce qu'on le benoit le jour de la fête des rameaux.

BOIS DE BIGAILLON : espèce d'*eugenia* ou jambosier, qui croît à l'île-de-France.

BOIS DE BITTE. Les Français qui habitent l'Inde donnent ce nom à un bois très-recherché pour sa couleur & pour la beauté de son poli, qu'il doit à sa solidité. On l'emploie à faire des meubles précieux. Il paroît qu'il provient de l'arbre décrit & figuré par Rheed, *Hort. malab.* f. pag. 155, tab. 58, sous le nom de *kili*. (Voyez BITE, Suppl.)

BOIS BLANC. Dans nos forêts & en menuiserie, on désigne sous ce nom les arbres à bois tendre & peu coloré, tels que le saule, le peuplier, le tremble, le bouleau, &c.

BOIS BLANC de la Martinique : nom sous lequel Chanvallon désigne le *simarouba* de cette île, qui est fort différent du *simarouba* de Cayenne ; il a les feuilles opposées, ailées, avec ou sans impaire. Son fruit, arrondi, relevé de quatre côtes, renferme quatre semences. Ces caractères suffisent pour le distinguer du vrai *simarouba*, espèce de *quassia*. (Voyez QUASSIER.) Celui de la Martinique a été rapporté au fusain par Barrère & Nicholson, qui paroissent avoir confondu les deux. Il auroit peut-être plus d'affinité avec le *staphileas* : d'où il suit qu'il faut retrancher de notre

article QUASSIER, n°. 2, la synonymie du Barrère, rapportée avec doute.

BOIS-BOCO. (Voyez BOCCO.)

BOIS DE BOUC. On donne ce nom à quelques arbres & arbutés, parce qu'ils ont une odeur forte ; d'autres fois, parce qu'ils sont recherchés par les chèvres ; mais alors ils sont plus connus sous le nom de *bois-cabri*. A l'île-de-France, c'est le *prema* ou andrèrè à feuilles dentées, qui porte plus particulièrement ce nom.

BOIS A BOUTONS : furnon donné au genre *cephalanthus* Linn., à cause de ses fleurs réunies en massifs globuleux, ayant la forme ronde d'un bouton. (Voyez CEPHALANTE.)

BOIS BRACELETS : nom que porte, dans les Antilles, le jacquier (*jacquinia amillaria* Linn.), parce que les Caraïbes formoient, avec les graines enfilées, des bracelets dont ils se paroisent. (Voy. JACQUINIER.)

BOIS-BRAI de la Martinique. C'est le *cordia macrophylla*. (Voyez SEBESTIER.)

BOIS DE BRÛIL. (Voyez BRÛILLET.)

BOIS-CABRI. C'est un arbre de la Martinique, dont les jeunes rameaux sont brouillés avec délices par les cabris ou chèvres, & que Jacquin a nommé pour cette raison *asiphila*. Dans la même île & dans les autres Antilles on nomme, pour la même raison, *bois-cabri* l'éclat le cabrillet (*chresta bearreria*), que les mêmes animaux n'aiment pas. Le catalogue de l'herbier de Vaillant offre encore, sous le nom de *bois-cabri*, un arbrisseau qui paroît être un *laxavier* (*sagara tragodes*). *Tragos*, en grec, signifie bouc.

BOIS CACA de Saint-Domingue, BOIS DE MERDE. On donne ce nom au *capparis ferruginea*, dont les fleurs répandent une odeur désagréable & puante, approchant de celle des excréments humains. C'est à tort que Nicholson attribue ce nom des Antilles au *ferculia*, qui ne s'y trouve pas. Cet arbrisseau n'est d'aucun usage ni d'aucune utilité connue.

BOIS A CAL'CONS. On donne ce nom, dans quelques quartiers de Saint-Domingue, aux différentes espèces de *bauhinia* qui s'y rencontrent, & dont les feuilles, divisées en deux lobes, imitent grossièrement un calcon. Suivant Nicholson, on le nomme aussi *bois bacha*.

BOIS A CALUMET. (Voyez MABIER, mabea. Aublet.)

BOIS DE CAMPÈCHE. C'est l'*hamatortium cam*.

reschianum Linn. (*Pey. CAMP. CIT.*) « Desportes & Nicholson, dit M. Palissot-Beauvois, ont probablement commis une erreur en généralisant trop un nom en usage dans un canton. Selon le premier, le bois de campêche ou brésil est le *comocladia* Linn., connu dans toute la colonie sous le nom vulgaire de *brésil*; & le second le rapproche du *cafalpaia*, en y rapportant cependant la synonymie *pseudobrasiliu*, qui ne convient qu'au *comocladia*. Le *hamatoxylum* est l'arbre connu dans tous les quartiers de Saint-Domingue pour le bois de campêche: c'est celui qui est recueilli & débité sous ce nom dans le commerce. »

BOIS DE CANNELLE. Plusieurs arbres portent ce nom, le *canella alba* entr'autres, à raison de son écorce, qui a l'odeur de la cannelle. A l'Île-de-France on le donne à trois arbres qui n'ont rien de commun entr'eux. La couleur plus ou moins foncée de leur bois les a fait distinguer en blanc, gris & noir. Le bois cannelle blanc est une espèce de laurier (*laurus cupuliformis* Lam.). Le bois cannelle gris est une espèce de ganirre (*clao-carpus*). Le fruit, qui ressemble à une grosse olive, peut se manger quand il est mûr. Le bois cannelle noir paroît être une autre espèce du même genre, mais dont les caractères botaniques ne sont pas encore bien connus.

BOIS CANON. C'est le *ecrophia peltata* Linn. On le nomme aussi *ambaiba*.

BOIS CANON BATARD, BOIS TROMPETTE BATARD. C'est le *panax chrysophyllum* de Vahl. Arbre de la famille des araliacées, dont le bois est mou, creux, & peut servir à faire des conduits d'eau & des gouttières.

BOIS DE CANOT. Plusieurs arbres différens reçoivent ce nom toutes les fois que leurs troncs, creusés & façonnés, sont employés à faire des canots.

BOIS CAPITAINE : nom que porte, à Saint-Domingue, le *malpighia urens*.

BOIS CAPUCIN. (*Voyez* BOIS SIGNOR.)

BOIS CARAÏBE : arbre de Saint-Domingue, qui croît sur les pentes des montagnes; il est employé comme bois de charpente dans l'intérieur des maisons. Nicholson, qui en parle, n'indique aucun caractère qui puisse aider à le rapporter à un genre connu.

BOIS CASSANT : perir arbre grêle de l'Île-de-France, dont les rameaux sont très-fragiles, d'où lui vient son nom, & celui de *sfatura* que lui a donné Commerçon. Sa décoction est estimée dans les maladies vénériennes.

BOIS A CASSAVE. Dans la liste des bois propres à brûler, pourvu qu'on les mette à l'abri du soleil & de la pluie, Desportes comprend une espèce d'arbre qui, selon lui, a le port & les feuilles du lilas, les fleurs en corymbes blancs; pour fruits, de petites baies d'un blanc-pourpre & ombiliquées. C'est un bois mou, poreux & flexible; ce qui lui a fait donner le nom de *bois doux*. Nicholson parle aussi du bois à cassave ou bois doux; mais, comme Desportes, il n'en donne pas une description assez détaillée pour le rapprocher d'une plante connue des botanistes. Néanmoins, M. Palissot-Beauvois présume que c'est l'*Farea arborea* Linn., surnommé *bois nigresce* dans quelques quartiers de Saint-Domingue.

BOIS DE CAVALAM : c'est le *sterculia balanphas* Linn.

BOIS DE CAYAN. On trouve dans quelques auteurs le *simarouba* désigné sous ce nom.

BOIS DE CÈDRE de la Guiane. (*Voyez* ANISE.)

BOIS DE CHAM ou DE CAM. Les Anglais font venir de leurs nouvelles colonies de la côte occidentale d'Afrique, sous le nom de *chamwood*, un bois fort estimé dans la marquerie; il est rouge, marqué de veines noirâtres. Les Portugais le nomment *pau-guban*, du nom de la rivière d'où ils le tirent. Afzelius, qui vient de parcourir ces contrées avec un grand avantage pour la botanique, en a fait un genre sous le nom de *lespesia*, de la famille des légumineuses; il a plusieurs particularités communes avec le *cercis*.

BOIS DE CHAMBRE. Suivant Nicholson, c'est une plante annuelle de Saint-Domingue, dont la tige spongieuse, cannelée, haute de six pieds & grosse comme le doigt, est employée dans la colonie en guise d'amadou. Ses rameaux sont opposés, ainsi que ses feuilles. On ne connoît point sa réelle situation.

BOIS DE CHANDELLE. On donne ce nom à plusieurs arbres qui sont droits & estifs comme des chandelles, tels que différentes espèces d'*agave* ou de *dragoniera*, ou dont le bois contient quelques parties propres à s'enflammer, & à entretenir quelque temps la flamme comme un flambeau. Le *bois de chandelle noir* des Antilles est un balsamier (*omyris elemifera* Linn.). Plumier désigne encore sous le nom *bois de chandelle* l'*erichalis frutesca*, que Surin nomme aussi *bois de rose*, & qu'il dit être le *costouahou* ou *alacouahé* des Caraïbes. La couleur jaunâtre de son bois lui a encore fait donner, dans les Antilles, les noms de *bois de citron*, *bois jaune*, & l'odeur de ses fleurs l'a fait nommer, dans quelques cantons, *bois de jasmin*. Au rapport de Plumier, on fend ces deux

arbres résineux dans leur longueur & en lattes, que l'on emploie ou teints ou plus ou moins enrobés, comme des flambaux pour s'éclairer la nuit.

BOIS DE CHAUVÉ-SOURIS. On donne ce nom, dans l'île de Bourbon, à une espèce de gai, dont les fruits sont recherchés par les chauve-souris.

BOIS DE CHÊNE ou CHÊNE NOIR de Saint-Domingue. C'est le *gignonia longissima*. (Voyez BIGNONE, n°. 2.)

BOIS DE CHIMILLE de l'île-de-France. On nomme ainsi la *volkameria heterophylla*, Venenax, parce que les feuilles sont sujettes à être mangées par la larve d'un sphinx. On a confondu avec lui, sous le nom de *bois de fenil*, un arbruste de la famille des composées, décrit sous le nom de *conyge à feuilles de saule*. Lam.

BOIS DE CHEVAL. (Voyez BOIS MAJOR.)

BOIS DE CLOU DE PARA. C'est le *myrtus caryophyllata*.

BOIS DE CLOUX. A l'île-de-France on donne ce nom à une espèce d'*eugenia*, parce que son bois est solide & liant en même temps, mais d'un volume médiocre, & ne peut servir qu'à faire des chevilles.

BOIS A COCHON : surnom donné au sucrier des montagnes, parce que, dit-on, c'est aux cochons que nous sommes redevables de connoître l'efficacité du baume qui en découle pour la guérison des plaies. On possède cette plante dans les herbiers de l'Europe ; mais on est incertain à quel genre elle appartient. Elle paroît se rapprocher du *bursera*, de l'*amyrin*, de l'*hedwigia* de Swartz, de l'*icica* Juss. M. Palisot-Beauvois, qui l'a observée à Saint-Domingue, pense qu'elle appartient à ce dernier genre. (Voyez GOMART.)

BOIS DE COLOPHANE. A l'île-de-France on désigne deux arbres sous ce nom, à cause de la résine odorante qui découle abondamment de toutes leurs parties. On les distingue par les surnoms de *franc* & de *bâtard*. Justieu & Lamarck les réunissent au *bursera*. Commerson en avoit fait deux genres ; il nommoit le premier *calophonia*, & le second *marignia*, dont Gzintz a figuré le fruit sous le nom de *dammara* ; mais comme il ne l'a reçu qu'en état de dessiccation, il n'a pu en saisir tous les détails. Quoi qu'il en soit, il paroît différer beaucoup des *gomart*. (Voyez ce mot, Suppl.)

BOIS DE CORAIL. C'est le *CONDORI*, n°. 1 (*adenanthera* Linn.). L'*erythrina*, dont les fleurs sont également d'un rouge de corail, porte le

même nom. Tournefort l'avoit nommé, par cette raison, *corallodendron*.

BOIS DE CORNE D'AMBOINE. (Voyez MANGOUSTAN, n°. 3.) C'est le *garcinia* Linn.

BOIS COTELET ou COTILETTES. On nomme ainsi, en Amérique, des arbres dont les tiges sont relevées de côtes saillantes, tels que le *citharexylum*, le *cornutus pyramidata*, &c.

BOIS COULEUVRE ou DE COULEUVRE. Ce nom a été appliqué, suivant les pays, aux différents arbres ou arbrustes réputés comme spécifiques contre la morsure des serpents.

BOIS DE CUIR. C'est le *dirca palustris* Linn.

BOIS-DARD, BOIS A FLÈCHE de Cayenne. C'est le *posiera* d'Aublet, ainsi nommé parce que les naturels du pays arment le bout de leurs flèches avec un morceau de ce bois taillé en pointe. Selon Richard, c'est une espèce de *mouriri* ou *petaluma* ; qui est employé à cet usage, & porte à Cayenne le nom de *bois-fleche*.

BOIS A DARTES. Quelques Créoles nomment ainsi, à l'île de Bourbon, le *daniis* Commerç., parce qu'ils prétendent que la decoction de sa racine guérit les dartres. La même propriété, attribuée dans l'Amérique à des milieux perçus en arbre, leur a fait donner le même nom.

BOIS DENTELLE. C'est le *logetta* Juss. (Voyez LAGET.)

BOIS DUR : nom donné, dans divers pays, aux arbres du lieu, remarquables par la dureté de leur bois, & que l'on nomme aussi quelquefois *bois de fer*.

BOIS DYSSENTÉRIQUE. C'est le *malpighia spirata* Linn. ; il est aussi connu sous les noms de *merisier doré* & *bois san*, parce que son fruit est de couleur jaune-doré, & que son écorce sert probablement à tanner les cuirs. (Voyez MOUREILLER.)

BOIS D'ÉBÈNE. (Voyez ÉBÈNIER & PLAQUEMINIER.)

BOIS A ENIVRER LES POISSONS. On a remarqué que le suc lacteux de certains arbres communique promptement à l'eau une qualité si délétère, que les poissons qui y vivoient, en étoient étourdis & comme enivrés, en sorte qu'on pouvoit les prendre à la main : telle est l'origine de leur nom. De ce nombre sont le *piscidia*, le *galga sericea*, la coque du Levant, quelques euphorbes, &c.

BOIS

BOIS D'ÉPONGE. On donne ce nom à des arbres dont l'écorce est renflée & spongieuse. De ce nombre est le *gossia* de Commerçon, le *cissus mappia* Lam. &c.

BOIS DE FER. Ce nom est donné, selon les pays, à beaucoup d'arbres différens, dont le bois est très-dur, & employé, chez plusieurs hordes sauvages, pour faire des mailles ou des instrumens tranchans.

BOIS DE FERNAMBOUC. (Voyez BRÉSILLET.)

BOIS-FLÉAU. D'après la description que Desportes & Nicholson nous ont donnée de cet arbre, il ne paroît pas douteux que ce ne soit un *fromager*, & probablement le *bombax gossypinum*. La légèreté de son bois le fait employer par les pêcheurs pour soutenir leurs filets sur l'eau; ce qui lui a fait donner le nom de *bois de litge*. Il sert encore pour la construction des pyroques indiennes. Son écorce sert à faire des cordes.

BOIS DE FRÊNE. Suivant Nicholson, on donne ce nom à un arbre de Saint-Domingue, qui a quelques rapports avec le frêne, mais qui en est très-distinct. Son bois est mou, blanc & cassant; il croît dans les marnes. Quelques habitans en ont formé des allées. On pourroit lui trouver quelques rapports avec le *gignonia radicans* si ses fruits étoient pas, d'après Nicholson, des baies disposées en grappes.

BOIS GALEUX, BOIS DE SENTEUR BLEU. (Voy. ASSONIA, Suppl.)

BOIS DE GAROU. (Voyez BOIS GENTIL.)

BOIS DE GAUDELLES. (Voyez BOIS A BAGUETTES.)

BOIS GENTIL, BOIS JOLI. C'est le *daphne mezereum* Linn. (Voyez LAURÉOLE, n°. 1.)

BOIS DE GOYAVE. Une espèce de *prockia* est ainsi nommée dans l'île Bourbon.

BOIS D'INDE. On donne assez souvent ce nom au bois de Campêche (*hamatoxylon* Linn.).

BOIS INCORRUPTIBLE. (Voyez BOIS D'ACOUA.)

BOIS ISABELLE. A la Martinique on nomme ainsi le *laurus borbonia* Linn. A Saint-Domingue il paroît que le même nom est donné au *schefferia*. Le bois isabelle vrai de l'herbier de Surin est le *myrtus grégii*.

BOIS JACOT. On appelle ainsi plusieurs arbres de l'île-de-France, dont les fruits sont recherchés Botanique. Supplément. Tome I.

par les finges appelés *jacots*, & particulièrement une espèce d'*eugenia*.

BOIS DE JASMIN. (Voyez BOIS DE CHAMDELLE.)

BOIS JAUNE. Plusieurs arbres employés dans la teinture ou la marquerie doivent ce nom à la couleur de leur bois; ils sont différens suivant les pays.

BOIS JOLI. (Voyez BOIS GENTIL.)

BOIS DE JOLI CŒUR. On donne ce nom, dans l'île-de-France, à un petit arbre, à cause de son élégance & de la bonne odeur qu'il exhale. Commerçon en avoit fait un genre qu'il avoit consacré, sous le nom de *sanctia*, à la mémoire du médecin Sénac. Adanson l'a rapporté dans ses familles, sous le nom de *bois de merle*, au *celastrus*, opinion adoptée d'abord par Lamarck, qui fit de cet arbre son *celastrus onduil*, n°. 8. Cependant il paroît, d'après l'examen sur le vivant, que le genre de Commerçon doit être conservé; ce qu'a déjà fait Lamarck dans ses *Illustrations*.

BOIS DE LAIT. Ce nom s'applique, dans les colonies de l'Amérique & de l'Inde, à divers arbres de la famille des apocinées & des euphorbes, qui rendent un suc laiteux, ordinairement caustique & dangereux.

BOIS DE LANCE. On donne, selon Plumier, ce nom, dans les Antilles, aux deux espèces de *randia*, parce que leur tronc, droit, haut & grêle, est propre pour faire des lances; il sert encore à faire des doutes, des chaises, des échelles & autres meubles.

BOIS A LARDOIRE. On se sert en France du fusain, à l'île-de-France du *prockia*, pour faire des lardoires; ce qui leur a fait donner ce nom.

BOIS DE LATANIER. Nicholson, qui fait mention de cet arbre, prévient qu'il ne faut pas le confondre avec le latanier; mais il n'en donne pas une description assez exacte pour le rapprocher d'un genre connu. Il a, selon lui, les feuilles opposées, minces, d'un vert-pâle, oblongues & pointues. A ses flurs, qu'il ne décrit pas, succède un fruit allongé, divisé en quatre capsules, contenant autant de graines triangulaires, un peu oblongues, grosses comme une petite fève.

BOIS DE LAURIER. AUX Antilles on nomme ainsi le *croton corylifolium* Linn.

BOIS DE LETTRES. Ce nom est donné à deux arbres de la Guiane, parce que leur bois, très-dur & susceptible d'un beau poli, est agréablement

○○○○

moucheté de taches qui imitent des caractères. L'un est le *Sideroxylum inerme* Linn.; l'autre le *pitrutinera* Aubl. tab. 340.

BOIS LEGER. arbre de l'isthme de Panama, remarquable par la légèreté de son bois; il est de la grosseur d'un orme. Son tronc est droit, & la feuille ressemble à celle du noyer. On en fait, dans le pays, des radeaux pour aller à la pêche & traverser les rivières. Le Recueil des voyages ne donne pas d'autres renseignements sur cet arbre.

BOIS LÉZARD, BOIS D'AGOUTI. Ces deux noms sont synonymes à Saint-Domingue. Suivant Nicholson, ils sont donnés à une espèce de gattilier à feuilles ternées (*virex divaricata* Swartz). Il paroît qu'il est ainsi nommé, parce que les agoutis & les lézards se pratiquent des demeures dans le creux de son tronc.

BOIS DE LIÈGE. On donne ce nom, dans nos différentes colonies, à plusieurs arbres dont le bois est si léger, qu'il sert, au lieu de liège, pour faire flotter les filets. Ils portent aussi ceux de *bois de flot* ou de *fléau*, *bois sifieux* & *mahaut*.

BOIS DE LIÈVRE. Le cytise est, dit-on, ainsi nommé dans les Alpes.

BOIS LONG. C'est le *pao comprido* des Portugais du Pata, ainsi nommé parce qu'il a un tronc droit & simple, très-élevé, terminé, seulement à son sommet, par un feuillage disposé en boule. La description qu'en donne Fresneau dans les *Mémoires de l'Académie des sciences*, année 1751, pag. 326, fait présumer que c'est le même que le caoutchouc ou arbre à la gomme élastique.

BOIS DE LOSTEAU. On donne ce nom, à l'Île-de-France, à un petit arbre dont Commerçon avoit fait son genre *antirrhoea*, qui a été depuis réuni par Lamarck au *malounea* Aubl. Son écorce paise pour un spécifique dans les diarrhées & les dysentériques. Son bois est blanc, & susceptible d'un beau poli.

BOIS DE LUMIÈRE. *Palo de luz* des Espagnols. On raconte que la plante de ce nom s'enflamme, comme la fraxinelle, à l'approche d'une flamme, & donne une lumière assez vive. Il est probable qu'elle est couverte d'une substance. On ne fait à quel genre elle appartient.

BOIS MACAQUE de Cayenne: arbrisseau de la famille des mélalomes, nommé *tococa* par les Galibis, & dont Aublet a fait le genre *tococa*. Son fruit est recherché par les fanges macaques, d'où lui vient son nom.

BOIS MADAME de la Martinique. C'est, suivant Turrillon, le *mathiola siabra* Linn.

BOIS MADRE. Le *gymnanthes lucida* Swartz est sous ce nom dans l'*Heriois* des Antilles de Surinam.

BOIS DE MAHOGONI. « Le nom de bois d'acajou, dit M. Palifot Beauvois, n'a aucun rapport avec l'acajou (*cajuputum* Linn.), désigné dans les Antilles sous les noms d'acajou-pomme ou acajou-noix. Le bois de mahogou est le *swietenia mahogoni*, plus particulièrement désigné sous le nom d'acajou-plan he. On en distingue de deux sortes : 1°. l'acajou franc, dont on fait plus communément les meubles; il est veiné, plus ou moins rouge; 2°. l'acajou bûlard, qui a les feuilles & les fruits plus petits, & dont le bois, agréablement moucheté, est plus cher, et très-recherché pour les meubles. Ces deux arbres parviennent quelquefois à une grosseur prodigieuse. On en a construit des tables d'une seule pièce, qui pouvoient servir à un repas de quinze couverts. »

BOIS DE MAÏS. C'est le *memecylon cordatum* Lam.

BOIS MAJOR. Les habitants de Saint-Domingue donnent ce nom à l'*erythroxylum arborescens*, dont les feuilles sont arrondies au sommet, & un peu en forme de spatule. L'arbre ne s'élève qu'à une petite hauteur, mais il devient assez gros. Son bois est flexible, compact, blanchâtre, très-estimé pour faire des brancards de voiture. Desportes nous apprend que, dans quelques quartiers, on le prend pour une espèce de bois de rose; il fait encore mention d'une autre espèce de bois major, employé aux mêmes usages, dont les feuilles sont plus petites & plus épaisses. Ne seroit-ce pas l'*erythroxylum havanense*?

Nicholson appelle bois major ou bois de cheval une plante différente, que, faute de description suffisante, on ne peut rapporter à son genre. C'est, d'après lui, un arbrisseau qui croît en buisson, dont les tiges sont remplies de beaucoup de moëlle, comme celles du fureau. Ses feuilles sont alongées, pointues, rudes au toucher, d'un vert pâle à leurs deux faces. Les feuilles sont employées en décoction pour panser les plaies des chevaux.

BOIS A MALINGRES: espèce de *tournefortia* des Antilles.

BOIS MANCHE-HOUE. C'est, suivant Richard, une espèce de clavalier (*xanthoxylum* Linn.), dont les Nègres font les manches de leur houe, d'où lui vient son nom vulgaire.

BOIS MANDRON. On donne ce nom à un arbre qui, selon Nicholson, a des feuilles de différentes grandeurs. Desportes n'en fait aucune mention.

BOIS MARBRÉ ou BOIS DE FÉROLES. On donne

ce nom, suivant Nicholson, à un arbre dont le bois est tacheté & veiné comme du marbre ; il a été trouvé pour la première fois à Cayenne, sur l'habitation de M. de Férolles, gouverneur ; d'où lui vient son nom de *strolia*. Aubl.

BOIS MARGUERITE. C'est le *cordia tetraphylla* Aubl. (Voyez SEBESTIER.)

BOIS MARIE : nom qu'on donne quelquefois au *caluba* (*calophyllum* Linn.), qui est le *palo-maria* des Philippiens.

BOIS DE MÈCHE. (Voyez AFRICA, n°. 2.) On donne encore ce nom à l'*agave fœtida*, employé aux mêmes usages.

BOIS MENUISIER. C'est le *portefa*, réuni aux *triehilia* par Swartz & Willdenow. (Voyez TRI-CHILIE.)

BOIS DE MERDE. (Voyez BOIS CACA.)

BOIS DE MERLE. On nomme ainsi, à l'île-de-France, un arbrisseau de la famille des saponniers, qui se couvre de fruits recherchés par les merles. Commerçon en a fait son genre *ornitrophe*. Il est très-différent du bois jolli-cœur, nommé aussi, en quelques lieux, *bois de merle*. (Voyez CÉLASTRE, n°. 8, & *Senecia*, III, & Suppl.)

BOIS DES MOLUQUES. On nomme ainsi l'arbrisseau qui fournit la graine de tili (*croton tili-*
gium), parce qu'il croît dans les Moluques.

BOIS MOUSSÉ. Préfontaine, dans sa *Maison rustique de Cayenne*, parle d'un bois ainsi nommé, qui est mou, très-léger, employé pour faire les chevilles qui attachent les bardeaux ou lattes sur les toits. On en fait aussi des chevrons & des échelles. Il n'indique d'ailleurs aucun caractère qui puisse aider à le faire connoître.

BOIS NAGONE de Cayenne. C'est, suivant Richard, une espèce de mirobolan.

BOIS DE NATTE. (Voyez NATTIER.)

BOIS DE NÈFLE. A l'île Bourbon on donne ce nom à une espèce d'*eugenia* ou jambosier, parce que son fruit, qui est d'une saveur médiocre, a quelque ressemblance avec les nèfles. C'est un petit arbre d'un port extrêmement agréable.

BOIS NÉPHRÉTIQUE : bois jaunâtre, compacte, pesant, d'une saveur amère & un peu âcre, apporté du Mexique ; il a la propriété de teindre l'eau dans laquelle on le fait macérer ; elle paroît jaune si on place le vase entre l'œil & la lumière, & bleue si on tourne le dos au jour. Son infusion

est très-apéritive, & employée dans la néphrétique, d'où lui vient son nom. Linnæus a dit, & beaucoup d'autres ont répété avec lui, que l'arbre qui fournit ce bois est le même que celui qui donne la noix de ben, connu long-tems sous le nom de *gualanina* *muringa* Linn., & que Justell & Lamarck ont séparé sous le nom générique de *moringa* ; cependant le *moringa* croît en Asie & non au Mexique ; & dans les descriptions que Rumphé & Rheed en donnent, il n'est point fait mention du *bois néphrétique*. On peut donc encore suspendre son jugement sur l'identité de ce bois avec celui qui donne le ben. Bernadé de Justell soupçonnoit quelque affinité de ce bois avec celui du frêne, qui donne une teinture presque pareille ; mais il ne croyoit pas cependant ce motif suffisant pour établir son opinion. En Europe on donne quelquefois le nom de *bois néphrétique* au bouleau, parce qu'il a quelques propriétés analogues. (Just.)

BOIS NOIR : nom que l'on donne à différents arbres, à un *diospyros*, à cause de la couleur de son bois ; au *mimosa laëvis*, parce que son feuillage, en vieillissant, acquiert un vert-noirâtre & sombre. Suivant Nicholson, le bois noir de Saint-Domingue est un arbre à feuilles opposées, d'un vert tirant sur le noir ; il n'en dit rien de plus. L'*aspalathus* des Antilles y porte le même nom.

BOIS D'OLIVE. A l'île Bourbon on donne ce nom à un olivier qui ressemble beaucoup à l'olivier cultivé, recherché pour les ouvrages de tour. A l'île-de-France on le donne à l'olivier (*olea-*
dendrum), que Commerçon nommoit *rubentia*, bois rouge.

BOIS D'OR. C'est le charme de Virginie.

BOIS D'OREILLE. On lit dans la *Matière médicale* de Desbois, que l'écorce du garou étoit employée dans le pays d'Aunis pour percer les oreilles des enfans, afin de les préserver, par l'écoulement qu'elle occasionne, des accidents de l'enfance, surtout de ceux de la dentition ; ce qui lui avoit fait donner le nom de *bois d'oreille*.

BOIS D'ORME. On donne ce nom, dans les colonies, à deux espèces d'arbres bien différens : 1°. au *MICOCOULIER*, n°. 6 (*telis mi-ranthe* Lam.) ; 2°. au *GUAZAMA* Lam. (*theobroma gua-*
zama Linn.). (Voyez ces mots.)

BOIS D'ORTIE, BOIS DE FRÉDOCHE, BOIS PELÉ. Desportes indique deux espèces de bois d'ortie, dont les feuilles, lancéolées, frêles & ciliées, ressemblent à celles du mirte. « C'est, dit-il, un arbre assez élevé, dont le bois dur & solide est propre à bâtir. » Nicholson en parle dans les mêmes termes. « Son bois, dit-il, est recherché par les charpentiers ; il dure long-tems, pourvu qu'on

le mette à l'abri du soleil & de la pluie. » Faute d'autres détails, on ne peut indiquer le genre auquel il appartient. Poiteau croit que c'est le *chtharexylum melanocardium* Swartz, qui, ayant les fleurs en corymbes & le fruit rempli d'un noyau à quatre loges monoospermes, appartient mieux au genre *prema*, suivant Jussieu; il le nomme *prema reticulata*. (Voyez ANDARÈSE, Suppl.)

BOIS DE PALIXANDRE ou BOIS VIOLET : bois de couleur violette, très-estimé pour la marqueterie, & que les Hollandais apportent de leurs colonies de l'Amérique méridionale. On en fait des meubles recherchés & des archers de violon. On ne connoît pas encore l'arbre qui le fournit.

BOIS PALMISTE. C'est le *geoffroya spinosa*. Il ne faut pas le confondre avec le palmiste ou chou-palmiste, qui est un arbre de la famille des palmiers.

BOIS PERDRIX. A la Martinique on donne ce nom, suivant Jacquin, à l'*Aristia*, parce que son fruit est recherché par une espèce de pigeon, nommée *perdrix* dans cette île.

BOIS PELÉ. (Voyez BOIS D'ORTIE.)

BOIS DE PERPIGNAN. C'est le *celtis australis* Linn. (Voyez MICOCOULIER.)

BOIS FERROQUET : arbre de l'île Bourbon, dont le fruit est recherché par les perruches. Commerçon en a fait le genre *fissilia*, placé par Jussieu dans la famille des orang-ers; « mais son caractère, mi-ux observé, fait présumer, dit M. du Petit-Thonars, qu'il doit être rangé à côté de l'*olux* dans les plaqueminiens ou plutôt dans la nouvelle famille formée par Ventenat, sous le nom d'*ophiosperme* » (Voyez FISSILIA, Ill. & Suppl.)

BOIS DE PIEUX : arbre des îles Moluques, que sa solidité fait employer pour des pieux. C'est la traduction de son nom malais, *ejo-belo*, que Rumphé a rendu par *arbor palarum*. Forster en a fait un genre sous le nom de *poecilia*. M. de Jussieu présume que c'est une espèce d'*euphorbia* ou de *melicocca*. (Voyez LITCHE, Suppl.)

BOIS PIGEON. C'est un *prockia*, ainsi nommé à l'île-de-France, parce que les pigeons recherchent ses fruits, qui cependant communiquent une mauvaise qualité à leur chair.

BOIS PIN de la Martinique. Suivant Terrasson, on nomme ainsi, dans cette île, le *salauma* ou *magvalia* de Plumier, dont le fruit a quelque ressemblance avec une pomme de pin. (Voyez TALAUMA.)

BOIS DE PINTADE : espèce d'*ardisia*, dont le

bois est veiné de noir, comme le plumage de la pintade. D'autres prétendent qu'il est ainsi nommé, parce que cet oiseau est friand de ses fruits. On donne le même nom à l'*ixora*, parce que les feuilles de ses jeunes pousses sont agréablement marbrées de rouge, de jaune & de vert.

BOIS PISSENLIT. C'est le *bignonia flans* Linn., ainsi nommé, peut-être parce que sa racine est employée comme diurétique, au rapport de Surian, dans le catalogue duquel on le retrouve sous le nom d'*ichicouliba*.

BOIS PLIANT. C'est un des noms du rouvet (*osyris alba* Linn.), cultivé dans les jardins d'Italie, comme il l'étoit du tems de Virgile, à cause de la bonne odeur de ses fleurs & de la flexibilité de ses rameaux.

BOIS DE POIVRIER. (Voyez FAGARIER, n°. 5.) Il a une odeur aromatique, approchant de celle du poivre.

BOIS DE POMME. On nomme ainsi, à l'île-de-France, plusieurs espèces d'*eugenia* ou jambosiers, distingués en blancs & en rouges, dont on fait des planches estimées pour la menuiserie.

BOIS PUANT. Ce nom a été donné à l'*anagyris*, à cause de l'odeur de ses feuilles; mais, dans nos colonies, il est des arbres dont le bois abattu devient d'une fétidité extrême, au point qu'on ne peut les travailler que long-tems après leur chute : de là les noms de *bois caca*, *bois de merde*. On a cru qu'ils désignoient le sterculier; mais dans cet arbre il n'y a que la fleur qui ait une odeur, à la vérité, des plus fétides. À l'île-de-France, plusieurs arbres sont dans le même cas : tel est le bois canelle ou laurier cupulaire, Lam.; mais celui qui a mérité, avec le plus de fondement, le nom de *bois puant*, est le féridier (*feridia*) : c'est un des plus beaux arbres qui existent dans les îles. Quand son bois abattu est resté un certain tems exposé à l'air, il perd son odeur. Il seroit fort recherché à cause de sa solidité & de son liant; mais sa grande pesanteur spécifique en rend l'emploi incommode.

BOIS PUNAIS. C'est le cornouiller sanguin.

BOIS DE QUASSIE. (Voyez QUASSIE.)

BOIS DE QUINQUIN ou de TEZÉ. C'est le bois dur ou *securinga* de Commerçon. (Voyez TEZÉ.)

BOIS QUINQUINA. Les colons de Cayenne ont donné ce nom, sans motif, à un *malpighia* (mou-reiller), qui n'a aucun rapport avec le quinquina. Il est employé, comme le *sumaraba*, dans la dysenterie. C'est le *xoumouy* des Galibis.

BOIS DE QUIVI. (Voyez QUIVISTA.)

BOIS RAMIER. On donne ce nom, dans les Antilles, à plusieurs espèces d'arbres & arbrusles, parce que les pigeons ramiers sont très-friands de leurs fruits.

BOIS DE RAPE. Ce nom est donné, dans les pays chauds, à plusieurs arbres dont les feuilles sont fermes & tellement garnies d'aspérités, qu'elles peuvent servir, comme la prêle, à polir les bois & même les métaux.

BOIS DE RAT. (Voyez MYONIME.)

BOIS DE REINETTE. Il suffit de froisser une feuille du *dadonea augustifolia* pour découvrir la raison qui lui a fait donner ce nom : il s'en exhale une odeur de pomme de reinette très-prononcée.

BOIS DE RHODES. C'est le même que le bois de rose, espèce de liseron. On donne cependant ce nom, dans les Antilles, à une espèce de balsamier (*amyris balsamifera* Linn.).

BOIS DE RIVIÈRE. A la Martinique on nomme ainsi le *chimarrhis*, plante rubiacée, dont le nom, tiré du grec, signifie torrent. Chanvallon indique dans la même île, sous le nom de bois de rivière, un arbre légumineux, à fleurs purpurines, à gousses plates, qu'il dit être un *inga*. L'*Herbier des Antilles* par Surian, offre encore sous ce nom une espèce de *casaria* ou anavigne.

BOIS DE RÔLE. A la Martinique on nomme ainsi une espèce de jambosier (*eugenia*), & dans la même île, on appelle bois de rôle bâtard le cabrillet (*chretia beureria*).

BOIS DE RONCE, BOIS DE FRED DE POULE. A l'île-de-France on nomme ainsi le *soudali* (Hort. Malab. 5, tab. 41), *rododala* Juss., qui est un arbrisseau chargé d'aiguillons crochus comme la ronce, formant un buisson très-épineux. Commerçon l'a voit désigné sous le nom de *vepsis*.

BOIS DE RONCLE, DE RONDE ou D'ARONDE. On donne ce nom, dans l'île-de-France, à l'*erythroxylum laurifolium*. Peut-être a-t-il été nommé bois de ronde, parce que son bois, qui est très-résineux, brûle seul, & forme des flambaux qui sont employés dans les rondes que l'on fait sur les habitations, pendant la nuit, pour s'affluer que tout y est dans l'ordre.

BOIS DE ROSE, BOIS DE RHODES, BOIS DE CHYPRE. Rien de plus connu que cette substance dont on se sert beaucoup pour faire des meubles. La couleur & l'odeur de ce bois, qui rappellent la fleur dont ils portent le nom, & le beau poli

dont il est susceptible, concourent également à le faire rechercher : aussi est-il apporté depuis longtemps par le commerce en assez grande quantité pour subvenir aux demandes. On a été longtemps dans une ignorance absolue sur le pays d'où il étoit tiré, & fut le végétal qui le fournissait, comme pour tant d'autres objets de spéculation. On a cru que le bois de rose provenoit d'un arbre qui croissoit à Rhodes. Le nom de *Rhodon*, qui en grec signifie également cette île & le rosier, a peut-être induit en erreur ; cependant des auteurs graves assurent avoir possédé des troncs d'arbre provenant de cette île, remarquables par leur belle couleur rose & leur odeur. D'autres assurent la même chose de l'île de Chypre. On peut consulter à ce sujet l'*Histoire des Plantes de Ray*, pag. 1809. Cet auteur, à son ordinaire, a recueilli tout ce que les précédents ont écrit de remarquable à ce sujet. On y verra qu'on étoit encore très-incertain sur le végétal qui produisoit ce bois.

M. du Petit-Thouars ajoute à ce qui précède, que François Masson a trouvé aux Canaries la source d'où le bois de rose étoit exporté ; qu'il l'a reconnu dans un liseron que Linné fils a depuis nommé *convolvulus scoparius*, arbruste qui a l'aspect d'un genêt, que les habitants de l'île nomment *lena-roel*, & dont le bois rape à l'odeur de la rose ; mais comme, au rapport du même voyageur, ce bois est blanc, ce ne peut pas encore être celui de la marquetie.

En attendant, il paroît certain que, sans parler des arbres de l'Amérique, auxquels on a donné le nom de bois de rose, le Levant en leurtout dont l'origine est encore inconnue. Suivant L'inscor, on trouve à Téticère & dans les autres îles Agètes, des bois très-précieux. L'un, entre autres, est nommé *sanguino*, de sa couleur rouge & sanguine ; un autre, très-estimé, porte le nom de *seixo*.

Les autres bois de rose de divers pays sont, dans les Antilles, l'*erthala frutesca*, appelé aussi bois citron & bois chandelle ; à la Jamaïque, l'*amyris balsamifera* ; à Cayenne, le *sciaris guyanensis* d'Aublet ; à la Chine, le *iss-tau*, dont on ne connoît pas le genre, & dont le bois, rouge-noirâtre, rayé de belles veines noires, est connu à la cour de l'empereur sous le nom de bois de rose, suivant les voyageurs.

BOIS ROUGE. Comme cette dénomination provient d'une qualité qui s'est trouvée commune à un grand nombre d'arbres, on l'a appliquée, suivant les pays & même les cantons, à des végétaux bien différents.

BOIS SAGAIE. Les peuples qui font usage de lances ou sagaies choisissent des rejets minces,

qui, sous un petit volume, présentent une grande solidité. On a trouvé cette quarte dans quelques arbres & arbutus : de là ils ont porté, par excellence, les noms de *bois de lance* ou de *fagale*. A l'île-de-France, ce sont les mêmes qu'on nomme aussi *bois de gaulées*.

BOIS SAINT ou SAINT BOIS. C'est le *daphne gnidium* Linn. (Voyez LAURÉOLE.)

BOIS SAINT ou BOIS DE SANTÉ. C'est le gaiac (*gajacum sandum* Linn.), ainsi nommé à cause des grandes propriétés qu'on lui attribue.

BOIS DE SAINT-JEAN, plus communément ARBRE DE SAINT-JEAN. On nomme ainsi à Cayenne, suivant Aublet, le *panax morotoni*. (Voyez GINSENG.)

BOIS DE SAINTE-LUCIE. La couleur & l'odeur de ce bois le rendent égale ment précieux. On pourroit présumer qu'on le fait venir de loin, & de l'île dont il porte le nom. On en apporte, à la vérité, d's pays éloignés, & à grands frais, qui ne réunissent pas autant de qualités que celui que fournit un arbre qui croit naturellement dans plusieurs contrées de la France, & qui est cultivé dans les bosquets d'agrément : c'est le *malaheb*, espèce de cerisier, que Linné rapporte au prunier, sous le nom de *prunus malaheb*. Les habitants du village de Sainte-Lucie en Lorraine, autour duquel ce arbre croit abondamment, & d'où il a pris son nom, lui font subir une préparation qui consiste à l'enfouir en terre. Par là ils développent ses qualités ; ensuite ils en fabriquent sur le tour une multitude de petits ouvrages, des étuis, entr'autres, qui sont exportés au loin.

BOIS SANS ÉCORCE. Il existe, dans les pays chauds, plusieurs arbres dont l'écorce ne se détache pas du *libre*, ou plutôt, se desléchant à mesure qu'il se forme, elle se sépare en lanières ou plaques minces : de là on les a nommés *bois pelés* ou *bois sans écorce*. A l'île-de-France ce sont les *prochia*, plusieurs *eugenia*, le *lania* de Commerçon, dont l'écorce est mince, très-adhérente au bois.

BOIS DE SAPAN. On connoit depuis long-tems un bois de teinture qui croit dans les grandes Indes. Lincor, un des premiers qui en ait parlé, le nomme *japou*. Linné l'a rapporté au genre *caesalpinia*, qui comprend le bois de Brésil. On cultive le bois de sapan à l'île-de-France ; mais jusqu'à présent on n'en a tiré d'autres services que d'en faire des haies, au rapport de M. du Petit-Thouars ; elles sont très-belles, mais peu garnies par les bas.

BOIS SARMENTEUX. C'est le *cordia flavescens* Aubl. (Voyez SIBLÉTIER.)

BOIS DE SASSAPARA. (Voyez LAURIER-SASSAPARA.)

BOIS SATINÉ. Ce bois, que l'on trouve aux Antilles, est employé avec succès dans la marquerie. Lorsqu'il est poli, il présente à peu près le reflet du satin, d'où lui vient son nom. Il paroît que c'est le *ferolia* d'Aublét (Voyez FEROLIS.) On donne aussi quelquefois le nom de *bois satiné* d'Europe au prunier, dont le bois, quand il est préparé, imite un peu celui d'Amérique.

BOIS DE SAUGE. On connoit dans les Antilles, sous ce nom, deux espèces de camira (*lantana* Linn.), l'une à grandes, & l'autre à petites feuilles.

BOIS DE SAVANNE de Cayenne. C'est l'arbre connu dans cette colonie sous le nom de *poirier*, & qu'Aublét a mentionné sous le nom de *couma*. (Voyez COUMIER.)

BOIS DE SAVANNE de Saint-Domingue. Desportes distingue trois sortes de bois de savanne : 1°. le bois de savanne propre pour teindre en jaune ; c'est le *cornelia pyramidata* (voy. AGNANTIE) ; 2°. le bois de savanne franc, dont le bois est dur, propre à bâtir, espèce de gartillier (*vieux* Linn.), & feuilles digitées ; 3°. enfin, le bois de savanne bâtar, qui s'élève à une hauteur médiocre, dont le bois est mou, propre à bâtir, pourvu qu'il soit à l'abri du soleil & de la pluie. Le genre de ce dernier bois n'est pas connu.

BOIS DE SAVONNETTE BATARD. Suivant Sorin, on donne ce nom, dans les Antilles, à une espèce de *pseudo-acacia* de Plumier, qui n'est point un *robinia*, mais qui paroît plutôt appartenir au genre d'*albergia*.

BOIS SAVONNEUX ou DE SAVONNETTE. C'est le nom que porte, dans les Antilles, le *savonnier* (*sapineus japonaria* Linn.).

BOIS DE SENTIL. A l'île-de-France on donne ce nom à un arbutus de la famille des corymbifères, décrit par M. de Lamarck sous le nom de *conyze* à *feuilles de saule*, qui paroît, selon M. du Petit-Thouars, devoir former un genre particulier. Ce nom semble une altération de celui de *bois de chenilles*, donné à un arbutus très différent, mais auquel celui-ci ressemble extérieurement.

BOIS DE SENTE ou BOIS SENTI. A l'île-de-France on désigne sous ce nom une espèce de nerprun (*rhamnus circumscissus* Linn.). On prétend qu'il est ainsi nommé parce qu'il se fait sentir vivement par les épines dont il est armé.

BOIS DE SENTEUR BLANC. (Voyez RUIZIA.) C'est le *konigia* de Commerçon.

BOIS DE SENTEUR BLEU ou BOIS GALEUX.
(Voyez ASSONIA.)

BOIS DE SERINGUE. C'est la traduction du nom portugais *pao da seringa*, qu'on donne dans la Guiane au caouchou, qui porte la gomme élastique, dont on fait des vessies employées aux mêmes usages que les seringues.

BOIS SIFFLEUX. (Voyez BOIS FLÉAU.)

BOIS SIGNOR ou BOIS CAPUCIN. Préfontaine, dans sa *Maison rustique de Cayenne*, désigne sous ces noms un grand arbre à bâtir, qu'il croit être une espèce de *balata*, &c qui est peu connu dans la colonie, quoiqu'il soit assez abondant dans quelques parties de son territoire.

BOIS DE SOIE, ARBRE DE SOIE. On donne ce nom, dans les colonies, au *muntingia calabura*, dont les feuilles sont chargées d'un duct fin & doux comme de la soie. Ses feuilles étant un peu tournées obliquement sur leur pétiole, & plus larges d'un côté, l'ont fait confondre, dans quelques quartiers, avec le bois d'orme (*celus micanthus*). Dans d'autres quartiers on le surnomme *bois ramier*, parce que les pigeons ramiers viennent s'y reposer par troupes, dans le tems que les fruits sont mûrs, pour s'en nourrir. Ce bois ne présente d'autre utilité que pour faire des douves de barriques; mais elles sont peu estimées, parce qu'elles durent peu. Les Nègres emploient son écorce à faire des nattes grossières.

BOIS DE SOURCE. On donne ce nom, dans l'île Bourbon, à l'*aquilicia*, parce qu'il croit dans les endroits ombragés, près des sources.

BOIS TABAC. Les créoles de la Guiane nomment ainsi le *manaba villosa* Aubl., dont les feuilles ressemblent à celles du tabac. Ce genre a été depuis réuni à l'*agiphila*.

BOIS DE TACAMAQUE. On donne ce nom, soit au *caluba* (*calophyllum caluba*), soit au peuplier baumier (*populus balsamifera* Linn.).

BOIS TAMBOR ou TAMBOUL. Sonnerat a décrit & figuré, sous le nom de *tambourifia*, un arbre de l'île-de-France, que Commerçon nommoit *mitridatea*. Son tronc creux sert à faire des tambours. (Voyez TAMBOUL.)

BOIS-TAN. (Voyez BOIS DYSSENTÉRIQUE.)

BOIS-TAPIRÉ : grand arbre de Cayenne, dont le bois, employé pour faire de beaux meubles, est agréablement veiné de différentes couleurs; ce que désigne son nom, emprunté de la langue des Galibis. C'est ainsi que l'on donne le nom de ta-

piré à des perroquets que ces peuples ont l'art de marquer, par des procédés particuliers, de couleurs étrangères à leur nature.

BOIS DE TEK. (Voyez TECK.)

BOIS TENDRE A CAILLOU : nom donné, dans les Antilles, au *mimosa arborea*, à cause de la douceur de son bois, d'autant plus recherché, qu'il est incorruptible; il est communément employé pour les poteaux & les grosses charpentes sur lesquelles reposent les édifices, &c qui en font la solidité. Nicholson en désigne une seconde espèce sous le nom de *tendre à caillou bâtarde*, qui, selon lui, n'a d'autre différence que d'avoir les feuilles plus grandes & les siliques plus longues. « Il sert, dit-il, aux mêmes usages; mais son bois est moins estimé. »

BOIS TÊTE DE JACOT. (Voy. BOIS DE NATTE.)

BOIS DE TEZÉ. (Voyez BOIS DE QUINQUIN.)

BOIS TROMPETTE. Les habitants des Antilles donnent ce nom à l'*imbaiba* (*ecropia peltata*), dont le bois est creux, & sert à faire des conduits d'eau.

BOIS TROMPETTE BATARD. C'est le BOIS CANON.

BOIS VERDOYANT. On désigne ainsi aux Antilles le *laurus chloroxylon*, que l'on nomme plus communément *bois jaune*; il présente des nuances qui tirent sur le vert.

BOIS VERT. C'est le même arbre que l'on connoît plus communément sous le nom d'*ibira verte* ou *ibira des Antilles*. Ceste couleur, & le beau poli dont il est susceptible, le font rechercher. C'est le *bignonia leucoxylon*.

BOIS VIOLET. (Voyez BOIS DE PALIXANDRE.)

BOIS VIOLON. A l'île-de-France on donne ce nom à un petit arbre des forêts de l'intérieur. Son tronc fournit un bois très-léger, qui ne pèse que trente livres le pied cube; il sert à faire des planches, qu'on emploie à des ouvrages peu recherchés, qui ne demandent pas beaucoup de solidité. Ses feuilles sont très-grandes & ombiliquées, comme celles de l'*hernandia*; les fleurs petites & dioïques. M. du Petit-Thouars en a formé un genre particulier, sous le nom de *macaranga* (voyez ce mot, Suppl.); il y a réuni trois arbres qu'il a observés à Madagascar.

BOISIVRANT. *Piscidia*. (Voyez Illust. Gener. tab. 605. *Piscidia erythrina*, n°. 1.) M. Cavanilles a décrit deux plantes qui se rapportent aux *pisci-*

dia, quoiqu'il ait désigné l'une des deux sous le nom d'*eschinomene*.

3. BOISVRANT écarlate. *Pifidia punicea*. Cavan.

Pifidia foliis abruptè pinnatis; foliolis oblongis, obtusis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 920.

Pifidia fruticosa, foliis pinnatis, pinnulis ovatis, leguminibus pendulis. Cav. Ic. Rar. 4. pag. 8. tab. 316.

Eschinomene miniata. Orteg. Decad. 3. pag. 18.

Arbrisseau dont les tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds, divisé en rameaux glabres & alternes, garnis de feuilles alternes, ailées, composées d'environ quatorze paires de folioles sans impaire, ovales, oblongues, glauques en dessous; deux stipules subulées; les fleurs disposées en grappes axillaires & pendantes; le calice coloré, campanulé, à cinq dents, accompagné de deux bractées caduques, opposées; la corolle d'un rouge-écarlate; l'étendard écharcé, orbiculaire, de la longueur des ailes; les gousses oblongues, articulées, comprimées, aiguës, munies de quatre ailes; environ dix semences ovales, luisantes, cendrées.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (Cavan.)

4. BOISVRANT à longues feuilles. *Pifidia longifolia*.

Pifidia foliis abruptè pinnatis; foliolis lanceolatis, acutis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 920.

Eschinomene (longifolia), caule fruticoso, foliis pinnatis, pinnulis lanceolatis, catis limbo inflexo. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 8. tab. 315.

Quoique le fruit de cette espèce ne soit pas cornu, & que son genre paroisse douteux, néanmoins les grands rapports avec l'espèce précédente donnent lieu de croire qu'elle appartient au même genre; elle en diffère par ses folioles lancéolées, & aiguës; par ses fleurs jaunes, plus petites. Ses tiges sont glabres, cylindriques, peu rameuses; ses feuilles longues d'un pied; les fleurs disposées en grappes penlantes, axillaires.

Cette plante croît à la Nouvelle Espagne. *h*

BOLAX. Juss. (Voy. AZORELLE, n°. 2, Suppl.)

Ce nom, qui en grec signifie *motte*, avoir été donné par Connerion au gommier des îles Malouines, plante très-buffe, rassemblée en mottes épaisses, qui tapissent la terre. Cætnet a réuni cette plante avec l'*azorelle* Lam. Dans des desins faits par Jos. de Jussieu au Pérou, on trouve le *bolax* sous le nom d'*azorelle*; ce qui prouve que cette plante exille au Pérou.

BOLBONACH ou BULBONAC: noms vulgaires de la lunaria.

BOLDU. Outre la plante de Feuillée, dont il a été fait mention, Ruiz & Pavon, dans leur *Flora du Pérou*, parlent d'un autre *boldu*, qu'ils ont jugé d'être important par son organisation pour mériter de former un nouveau genre que Pavon a nommé *ruizia*. (Il existe un autre *ruizia* de Cavanilles. Voyez Ruiz.) Cet arbre est dioïque. Les fleurs, tant mâles que femelles, sont munies d'un calice d'une seule pièce, en godet, à cinq divisions aiguës; les pétales très-ovales, au nombre de cinq, attachés au calice. Dans les mâles on trouve plus de quarante étamines, dont les anthères courtes sont appliquées contre le sommet des filaments, qui ont, dans le milieu de leur longueur, deux renflements glanduleux. Les femelles ont cinq écailles attachées au calice, entourant plusieurs ovaires, terminés par des stigmata aigus, & qui deviennent autant de brous, de forme ovoïde, remplis par une noix monosperme. Plusieurs de ces fruits avortent, & il n'en subsiste ordinairement que trois à cinq. Ce caractère paroît rapprocher ce genre de quelques rosacées; mais pour en déterminer plus certainement l'analogie, il faudroit que cet arbre fût mieux connu.

BOLET. *Boletus*. Linn. *Agaricus*. Lam. (Voyez AGARIC.) J'ai exposé à l'article AGARIC, Suppl., les raisons qui m'avoient déterminé à conserver, pour ces deux genres, la dénomination de Linné.

Le caractère essentiel des *bolets* est d'avoir :

Un chapeau de forme variable, sessile ou pédonculé, garni ordinairement, à sa surface inférieure seulement, de tubes ou de pores presque toujours adhérens entr'eux, quelquefois libres & non soudés ensemble, mais qu'on ne peut séparer de la chair du chapeau.

Ces caractères ont donné lieu à des sous-divisions très-utiles pour la distinction des espèces, dans un genre où elles sont très-nombreuses. Parmi elles se trouvent les *filices*, que j'ai présentés, vol. VII, comme genre, ayant des tubes faciles à séparer du chapeau. (Voyez SUILE.)

ESPÈCES.

5. I. FISTULINA. Bull. Tubes libres & non soudés entr'eux.

1. BOLET hépatique. *Boletus hepaticus*.

Boletus carnosus, sanguineus, dimidiatus, tubulis liberis, lutescentibus. Pers. Synopf. Fung. pag. 549. — Schæff. Fung. tab. 116 & 120. — Sowerb. tab. 58.

Boletus buglossum. Retz. Scand. edit. 2. pag. 317. — Flor. dan. tab. 1039.

Fistulina

Phidula hugeloides. Bull. Champ. pag. 314. tab. 497, & tab. 74. 464. — Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 19.

Ce bolet est d'une consistance molle, charnue, d'un rouge-brun, presque sessile ou attaché latéralement par un pédicule très-court; sa chair légèrement zonée. Dans la jeunesse, la face supérieure est parsemée de petites aspérités qui, vues à la loupe, se présentent sous la forme de petites rosettes pédicellées; elles disparaissent avec l'âge, & la surface devient lisse. La face inférieure est occupée par des tubes libres entr'eux, grêles, inégaux, d'abord blancs, puis jaunâtres ou rouffâtres.

Cette plante croît sur de vieilles souches, préférant à fleur de terre; elle passe pour bonne à manger.

§. II. *PORIA*. Pers. Tubes adhérens entr'eux, placés à la surface inférieure & sur plusieurs autres parties de la plante; chapeau irrégulier.

2. BOLET rameux. *Boletus romosus*. Bull.

Boletus coriaceo-fragilis, luteo-fulvus, in romos subcylindricos uniaque tubulosos expansus, carne subalbescens, tubis brevibus. Bull. Champ. p. 349. tab. 4. 8. — Pers. Synopf. Fung. pag. 549.

Il est d'un jaune-fauve, d'une substance coriace, fragile, très-fragile dans son état de sécheresse, divisé, des fa base, en rameaux presque cylindriques, simples ou branchus, un peu renflés à leur partie supérieure; garni en dessous de tubes courts, assez réguliers; sa chair blanche. Il croît dans les carrières, les fourreaux, & sur les bois à demi pourris.

3. BOLET des fourreaux. *Boletus cryptarum*. Bull.

Boletus coriaceo-spongiosus, sessilis (effuso-reflexus), subfulgineo-ferrugineus, tenuis, superà parte labrâ, hians; tubis longissimis. Bull. Champ. pag. 350. tab. 478. — Pers. Synopf. Fung. pag. 542.

Il est mince, sessile, coriace, variable dans sa forme & ses dimensions, d'une consistance molle, spongieuse, couleur de bistre tirant sur celle de rouille, creusé à fa partie supérieure en forme de deux lèvres, garni en dessous de tubes allongés. Il croît en larges plaques étalées, dans les fourreaux & les caves.

4. BOLET gnépier. *Boletus favus*. Bull.

Boletus effusus, subresupinatus, coriaceo-suberofus, subcrenato-fetucatus, zonatus, fulgineo-fuscifrons, tubis elongatis, latissimis, subfulgineis, apicem favum imitantibus. Bull. Champ. pag. 363. tab. 421. — Pers. Synopf. Fung. pag. 541.

Botanique, Supplément. Tome I.

Ce bolet est d'une consistance subéreuse & coriace, sessile. Sa face supérieure est ordinairement zonée, d'un brun-ensumé, hérissée de peluchettes épaisses, un peu soies; la face inférieure garnie de tubes allongés, d'un bistre-clair, semblables aux alvéoles d'un guépier. Il croît aux lieux humides, sur les arbres morts ou altérés.

Observations. Il est très-doux que le *boletus favus* de Linné, qui croît en Chine, soit la même plante. (Voyez AGARIC, n°. 1.)

5. BOLET destructeur. *Boletus destructor*. Pers.

Boletus albidus, effusus, pileo inaequali, undato, rugoso; poris subrotundis, obusis. Pers. Synopf. Fung. pag. 543. — Schrad. Spicil. 166.

p. Boletus (stibaceus), undulatus, latè expansus, albidospadicibus. Leyff. Flor. hilenf. n°. 1250.

Sa substance est fibreuse, friable dans l'état de sécheresse; son odeur forte, mais point rebutannte; son chapeau étalé, de forme irrégulière, ondulé ou ridé à ses bords, de couleur blanche; les pores arrondis, entiers ou quelquefois laciniés. Dans la variété *p*, la couleur est d'un jaune de paille clair. Il croît dans les maisons, aux lieux humides & renfermés, sur les bois, qu'il détruit rapidement.

6. BOLET couché. *Boletus resupinatus*.

Boletus (salicinus), resupinatus, suberosus, latè effusus, undulato-rugosus, cinnameus. Gmel. Syst. Nat. 2. pag. 1437. — Pers. Synopf. Fung. p. 543.

Il est de couleur de rouille ou d'un jaune-cannelle, ridé, ondulé, étendu par larges plaques, souvent de la longueur d'un pied dans les cavités du tronc des saules. Sa substance est tubéreuse; ses pores obliques, dispersés çà & là.

7. BOLET spongieux. *Boletus spongiosus*. Bolt.

Boletus resupinatus, coriaceo-spongiosus, fissilis, ferrugineus, tubis longissimis, erectis; poris minutis, rotundis. Bolt. Fung. pag. 165. tab. 165.

D'après Bolton, ce bolet croît tantôt en une sorte de gazon touffu, tantôt en plaques minces, coriaces, spongieuses, très-variables à leur surface, de couleur de rouille. Les tubes sont droits, très-allongés; les pores petits & arrondis. Il se trouve en Angleterre.

8. BOLET ferrugineux. *Boletus ferruginosus*.

Boletus crassus, inaequalis, subinterruptus, spadicens, poris subobliquis, variis. Pers. Synopf. Fung. pag. 544. — Schrad. Spicil. pag. 172.

Sa consistance est sèche, coriace, épaisse d'environ un pouce; sa forme irrégulière; sa couleur d'un brun-ferrugineux ou d'un jaune-clair; les tubes inégaux, un peu saillans, obliques, varia-

P p p

bles. Ce champignon croît ordinairement sur le tronc pourri des arbres.

9. BOLET contigu. *Boletus contiguus*. Pers.

Boletus longitudinaliter effusus, creffus, glaber, ferrugineus, poris majusculis, aequalibus. Persoon, Synopf. Fung. pag. 544.

Il s'étend en plaques longues d'environ trois pouces, sur un pouce de large & un demi-pouce d'épaisseur; il est glabre, de couleur ferrugineuse, muni de pores assez grands, égaux, plus grands vers la circonférence. Il croît solitaire sur les pieux & les porries des jardins.

10. BOLET mie de pain. *Boletus medulla panis*.

Boletus albus, durus, effusus, planus, crustaceus, superius perforatus, tubulis obliquis rectisque. Humb. Spec. Flor. frieb. pag. 98. — Jacq. Miscell. 1. pag. 141. tab. 21. — Bolt. Fung. tab. 166. fig. 4.

h. *Idem, longissimus, subterraneus*. Pers. Synopf. Fung. pag. 545.

Sa couleur est blanche; sa consistance ferme; sa forme pâle, crustacée. Il est glabre & perforé à sa face supérieure. Ses tubes sont droits ou obliques. Dans la variété h, les tubes sont très-longes, la consistance plus molle. Il croît sur les bois de construction & dans les forêts, sur les troncs desséchés.

11. BOLET vitreux. *Boletus vitreus*. Pers.

Boletus (poria vitrea), inaequaliter latiusque effusus, aquoso-albidus, durus, effusus, undulatus, subinterruptus, poris obliquis. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 15, & Synopf. Fung. pag. 545.

Ce bolet occupe en automne, sur le tronc des arbres, un espace de quatre à sept pouces; il se développe en plaques inégales, blanchâtres, transparentes, ondulées, médiocrement interrompues, munies de pores obliques.

12. BOLET tuberculé. *Boletus tuberculatus*. Pers.

Boletus (poria rub-rufolosa), albidus, subserotinus, margine inciso, subgynous. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 14, & Synopf. Fung. pag. 545.

Beaucoup plus épaisse que la précédente, cette espèce est parsemée, à sa face supérieure, de gros tubercules de forme irrégulière; elle s'étend en plaques de quatre à huit pouces, médiocrement frisées, incisées à leurs bords, de couleur blanche. Elle croît dans les fosses des mines.

13. BOLET moisi. *Boletus mucidus*. Pers.

Boletus (poria mucida) latitans, dilatata, candida, mollis, margine hyssina, poris congestis. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 87, & Synopf. Fung. pag. 546.

Il croît dans les fentes des troncs d'arbres putréfiés. Sa consistance est toujours molle, humide, charnue, un peu subéreuse; sa couleur blanchâtre; ses pores de formes variables, serrés, arrondis, anguleux, quelquefois laciniés. Il occupe un espace de cinq à six pouces.

14. BOLET frangé. *Boletus fimbriatus*. Pers.

Boletus (poria fimbriata), tenuis, membranaceus, latè effusus, albidus, margine fibrilloso; poris subobsoletis, nonnullis dissimulatis. Pers. Diss. Meth. Fung. pag. 29, & Synopf. Fung. pag. 546.

Il se présente sous la forme d'une membrane blanche, sèche, divisée, à ses bords, en découpures fibreuses, arrondies, obuses. Dans sa vieillissement il devient d'un blanc-fale ou bistré. Sa surface est garnie de pores peu marqués, ditsans & presque libres sur les bords. Il croît sur les troncs des arbres desséchés; il n'est pas commun.

15. BOLET des serres chaudes. *Boletus vaporaria*. Pers.

Boletus (poria vaporaria), tenuis, pallidescens-albidus, poris magnis, inaequalibus, lateris. Pers. Diss. Suppl. pag. 70, & Synopf. Fung. pag. 546. — Annal. bot. Falc. 2. pag. 30.

On le rencontre dans les serres chaudes, sur les bois cariés, dont il remplit les fentes. Il est mince, tendre, d'un blanc-pâle. Ses pores sont grands, inégaux, laciniés.

16. BOLET incarnat. *Boletus incarnatus*. Pers.

Boletus (poria incarnata), latè effusus, incarnatus, levis, poris minutis, inaequalibus, subobsoletis. Pers. Diss. Fung. pag. 70, & Synopf. Fung. pag. 546.

Ce bolet est glabre, médiocrement coriace, étendu en plaques larges de trois pouces, sur les troncs des arbres, de couleur incarnate, garnies de pores fort serrés, inégaux, un peu obliques.

17. BOLET luisant. *Boletus nitidus*. Pers.

Boletus (poria nitida), incarnato-florescens, nitidus, margine glabra, sublobato. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 15. tab. 4. fig. 1, & Synopf. Fung. pag. 547.

Il est long, étroit, d'une consistance mince, coriace, d'un jaune incarnat, luisant, glabre, divisé en lobes à ses bords. Il croît sur les troncs des arbres & sur les branches fêchées.

18. BOLET rape. *Boletus radula*. Pers.

Boletus (poria radula), pallidescens-albus, sub-tomentosus, poris acutis, inaequaliter prominulis, asper. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 14, & Synopf. Fung. pag. 547.

Sa couleur est d'un blanc-pâle. Il est médiocrement tomenteux, d'une consistance sèche, hérissé de pores aigus, faillans, inégaux, imitant une rape. On le trouve sur les branches sèches.

19. BOLET mollusque. *Boletus molluscus* Perf.

Boletus late effusus, albidus, pallescens, tenuis, mollis, marginé byssus, albicans; poris rotatis, inaequalibus, subulceris. Perfoon, Synopf. Fung. pag. 547.

? *Poria (epiphylla), tenuissima, alba, membranacea, margine lato-sterili; poris inaequalibus, acutis.* Perf. Observ. Mycol. 2. pag. 15.

Il s'étend sur le bois des pins desséchés en plaques larges, minces, molles au toucher, longues de deux à quatre pouces, blanchâtres, & semblables à un byssus vers ses bords. Ses pores sont grêles, inégaux, légèrement lacinies. La plante paraît être une simple variété de celle-ci; elle est beaucoup plus mince, membraneuse, dépourvue de pores à sa circonférence, très-fugace. Elle croît sur les feuilles tombées, ramassées en tas.

20. BOLET byssioïde. *Boletus byssinus* Perf.

Boletus explanatus, membranaceus, niveus, margine fimbriato; poris subrotatis, obtusis. Perfoon, Synopf. Fung. pag. 548. — Schrad. Spic. pag. 172. tab. 3. fig. 1.

Il se rapproche beaucoup du *Boletus fimbriatus*; il se présente sous la forme d'une membrane très-mince, d'un blanc de neige, frangée à ses bords. Ses pores sont arrondis, obtus, peu contigus. Il croît sur les troncs putréfiés.

21. BOLET grêle. *Boletus subtilis* Perf.

Boletus explanatus, membranaceus, niveus, poris tenuissimis, horizontalibus, obliquis. Perf. Synopf. Fung. pag. 548. — Schrad. Spicil. 173. tab. 3. fig. 2.

Il est lisse, fragile, glabre, presque luisant, membraneux, d'un blanc de neige, garni de pores très-fins, un peu obliques ou horizontaux. Il croît par plaques sur l'écorce des arbres putréfiés.

22. BOLET réticulé. *Boletus reticulatus* Perf.

Boletus (poria reticulata), tenuissimus, byssinus, fugax, albidus. Perf. Synopf. Fung. pag. 548.

Macilago reticulata. Hoffm. Flor. germ. Crypt. tab. 12.

Il ressemble presque à un byssus; il est très-mince, fugace, d'une grande blancheur, presque réticulé. Ses pores ont presque la forme d'une cupule, lisses, un peu pulvéreux. Il croît sur les troncs putréfiés.

23. BOLET à pores obliques. *Boletus obliquus* Perf.

Boletus durissimus, spadicus, tubulis horizontalibus, superficie spiralem prominulis. Perf. Synopf. Fung. pag. 548. — *Atharius.*

Sa consistance est très-dure, ligneuse, d'un jaune-paillet, tout entier composé de pores ou de tubes obliques. Il n'a qu'une ligne & demi d'épaisseur. Il croît en Suède.

5. III. BOLETUS. Perf. *Tubes adhérens entr'eux, qu'on ne peut séparer de la char du chapeau.*

* Chapeau sessile.

24. BOLET sulfuré. *Boletus sulfureus* Bull.

Boletus mollis, glaber, supra flavo-auratus, rubescens, subulis sulfureis, tubis vix conspicuis; pulvere seminanti copioso, albo. Bull. Champ. pag. 347. tab. 329.

Boletus (citrinus), imbricatus, dimidiatus, carnosus, glaber, citrinus. ? Perfoon, Synopf. Fung. pag. 524.

Boletus caudicinus. Schreff. Fung. tab. 131 & 132.

Ce bolet est glabre, sessile, attaché par le côté, d'un jaune-ore, tirant un peu sur le rouge en dessus, d'un jaune de saute en dessous; il prend, dans sa jeunesse, une teinte chamois. Sa consistance est molle, charnue; sa chair jaune, rouge sur les bords quand elle est froissée; les rubes très-courts, à peine sensibles; sa poussière féminale blanche & abondante. Il croît dans les fentes des vieux chênes.

25. BOLET safrané. *Boletus croceus* Perf.

Boletus pileo dimidiato, crasso, carnosio suberoso, submentoso, difformi, lutescente; poris croceis, subnudis. Perf. Observ. Mycol. 1. pag. 87, & Synopf. Fung. pag. 525.

Il se rencontre sur les bois de chêne desséchés; il s'insinue d'abord dans les fentes, s'étale ensuite en dehors, & devient horizontal. Son chapeau est épais, charnu, subéreux, médiocrement tomenteux, jaunâtre, de forme irrégulière, large de quatre à cinq pouces; ses pores d'un jaune de safran.

26. BOLET éclatant. *Boletus rutilans* Perf.

Boletus subimbricatus, dimidiatus, pileo carnosio, molli, glabro, cinnamomeo-rufo; poris aequalibus, ferrugineis, nitidis. Perf. Icon. & Descrip. Fung. pag. 18. tab. 6. fig. 4, & Synopf. Fung. pag. 525.

Son chapeau est glabre, mou, charnu, d'un roux-vif, tirant sur le jaune-cannelle, étalé à sa

basse, obtus à ses bords, fragile, imbriqué; les pores égaux, couleur de rouille. Il croît sur le tronc des chênes.

27. BOLET stipitique. *Boletus stipiticus*. Pers.

Boletus espositus, dimidiatus, pileo carnoso, subrepando, glabro, albidio, marginis rufescentis, poris albidis. Pers. Synops. Fung. pag. 525.

Il croît par groupes sur les troncs renversés. Son chapeau, renflé à sa base, est long de quatre pouces, épais d'environ un pouce, glabre, charnu, blanchâtre, un peu sinué & rouffé à ses bords, d'une saveur stipitique, rebutante, d'une odeur désagréable. Les pores sont blancs.

28. BOLET bleuâtre. *Boletus caesus*. Pers.

Boletus subparvus, mollis, pileo carnoso, glabro, striato-rugoso, albidio-rufes, poris albis. Pers. Synops. Fung. pag. 526. — Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 167.

Boletus albidus. Sowerb. Engl. Fung. tab. 226.

On le trouve fréquemment dans les bois, sur le tronc des pins, où il croît solitaire. Il est peris, ayant à peine un pouce de long. Sa consistance est molle, charnue; sa couleur d'un blanc-bleuâtre, d'un bleu-vif dès qu'on le touche; sa surface ridée, striée; les pores blancs & petits.

29. BOLET mou. *Boletus mollis*.

Boletus dimidiatus, cespitosus, pileo molli, rugoso, carnoso, incarnato-pallido; poris subflexuosis, albidioribus. Pers. Observ. Mycol. t. pag. 22, & Synops. Fung. pag. 526.

Il croît par groupes sur le tronc des pins. Son chapeau est mou, charnu, ridé, presque toujours humide, d'une couleur pâle-incarnate; il durcit en vieillissant. Ses pores sont blancs, légèrement flexueux.

30. BOLET hispide. *Boletus hispidus*. Bull.

Boletus aculeatus, ferrugineus, pileo crasso, villosissimo, subtus pallido. Bull. Champ. pag. 351. tab. 210 & tab. 493. — Persoon, Synops. Fung. pag. 526.

Boletus (villosus), aculeatus, convexus, villosus, fuscus, poris angulatis, flavescens. Hudf. Angl. pag. 626.

Idem, luteus. Bull. var. 1. tab. 493.

Idem, ruber. Bull. var. 2. tab. 210.

Il est mou, très-humide, mais d'une consistance coriace, charnue, assez épais, hérissé, à sa face supérieure, de poils rudes, long de trois à quatre pouces, large d'environ six pouces, garni en dessous de tubes allongés, anguleux, ciliés à leur

ouverture. Dans la variété 1., sa couleur est d'un jaune-orangé, puis d'un rouge de brique en dessus, jaune en dessous. La variété 2. est d'abord d'un rouge de sang, puis fauve en dessous. Ces deux variétés noircissent en vieillissant; elles croissent sur le tronc des chênes, des pommiers, des noyers.

31. BOLET brun. *Boletus fuscus*. Pers.

Boletus pileo carnoso, subrepando, submentoso, fusco seu badio, subrepando; poris albidio-pallidioribus. Pers. Dispos. Fung. pag. 25, & Synops. Fung. pag. 527.

Boletus (resinosus), pileo convexo, rugoso, resinoso; poris teretibus, obtusis, albidis. Schrad. Spic. pag. 171.

Boletus subraginifolius. Schrad. l. c. pag. 168. ?

Boletus (velutinus), supra villosus, fuscus, subtus griseus, poris minutissimis, carne fulvente. Vahl, in Flor. dan. tab. 1138. ?

Son chapeau est charnu, subéreux, légèrement tomenteux, brun ou jaunâtre, presque résineux, surtout dans sa jeunesse, assez grand, large d'environ trois pouces; les pores peris, d'un blanc-pâle. Il croît sur les troncs des hêtres & des pins.

32. BOLET hétéroclite. *Boletus heteroclitus*. Bolton.

Boletus sessilis, lobato-multiformis, supernè villosus, aurantiacus, tubis brevibus, multiformibus. Bolton, Fung. pag. & tab. 164. — Pers. Synops. Fung. pag. 528.

Ce bolet, qui croît sur la terre, est muni d'une racine dure & coriace, blanche en dedans, divisée en plusieurs lobes. Son chapeau est sessile, imbriqué, large de deux pouces & demi, velu en dessous, d'un jaune-orangé, garni de pores courts, de forme variée. Il croît en Angleterre.

33. BOLET à trois côtés. *Boletus triquetus*. Pers.

Boletus imbricatus, pileo frigio-tomentoso, ferrugineo, triquetus; poris griseo-ferrugineis, subnitidis. Pers. Observ. Mycol. 1, pag. 86, & Synops. Fung. pag. 528.

Son chapeau est remarquable par sa forme presqu'étrangulaire, rétréci en pédicule à sa base, charnu, subéreux, convexe, plane en dessous, médiocrement zoné, couvert de poils roides; la couleur ferrugineuse, plus claire en dessous; les pores griffés, un peu luisants. Il croît sur les troncs des chênes.

34. BOLET mince. *Boletus cuticularis*. Bull.

Boletus nigro-rufescens, subcarnosus, seaber, 700

natus, margine sinuato, tubis pileo conscoloribus. Bull. Champ. pag. 340. tab. 462.

Boletus (alneus), gregatus, subimbricatus, pileo inaequali, subtomentoso, ferrugineo; poris cerninis, nitidis, demum cinnamomeis. Pers. Synopf. Fung. pag. 326. ?

Boletus radiatus. Sowerb. Fung. tab. 196. ?

Ce bolet est sessile, mais un peu rétréci à sa base, coriace, arrondi, finueux à ses bords, médiocrement charnu ; il est, dans sa jeunesse, d'un jaune tirant sur le roux, puis enfumé & noirâtre. Sa surface, d'abord douce au toucher, se divise, en vieillissant, en zones rudes ; ses tubes de la même couleur que le chapeau. Il croît sur le tronc des arbres morts.

35. BOLET du charme. *Boletus carpineus.* Sow.

Boletus espositus, pileo globoso, flavescente, marginato, subhis cinereo. Pers. Synopf. Fung. pag. 329. — Sowerb. Fung. tab. 231.

Pileus (carnosus), tuberculatus, repandus, ultra unciam latus, subgibbosus, laetescens. ? Lightf. Color. b. Q. Icon.

Il croît en Angleterre, par groupes, sur le tronc des chênes. Son chapeau est sessile, glabre, jaunâtre, dense à ses bords, de couleur cendrée en dessous.

36. BOLET brûlé. *Boletus adustus.* Pers.

Boletus dimidiatus, imbricatus, subtenuis, pileo subcarnoso, rugoso, pallido; margine striato, nigrescente; poris minutis, aequalibus, cinereis. Pers. Obs. Mycol. 2. pag. 3. — Willden. Berol. pag. 638. — Batich. Elem. Fung. fig. 127.

? *Boletus (crispus), minor, pileo imbricato, fulgineo-cinereo, rugoso; margine undulato, crispo, nigrescente; poris majusculis, inaequalibus, argenteo-cinereis.* Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 3 & 9.

On le distingue aisément à sa couleur pâle, à sa face supérieure, noirâtre vers les bords, cendrée en dessous. Son chapeau est sessile, légèrement tomenteux, attaché par le côté, mince, médiocrement charnu, ridé, rude à ses bords ; les pores égaux, fort petits. La plante se paroît être une espèce distincte ; elle est plus petite ; le chapeau cendré, cunéiforme, ondulé ou crépu à ses bords ; les pores plus grands, inégaux, d'un cendré-clair, presque argenté. Tous deux croissent sur le tronc des arbres, dans le printemps & en automne.

37. BOLET enfumé. *Boletus fumosus.* Pers.

Boletus imbricatus, carnosus, sordidè fulgineo-pallidus, pileo globoso, undulato, basi crustulculo; poris conscoloribus. Pers. Synopf. Fung. pag. 330.

Il croît en automne, sur les vieux saules, par groupes sessiles, larges à peine de trois à quatre pouces, composés de lobes ou de chapeaux confus, glabres, ondulés, plus épais à leur base, d'un bistré presque luisant, ainsi que les tubes ; il s'en exhale une odeur forte, point désagréable.

38. BOLET du saule. *Boletus solitarius.* Bull.

Boletus submolliis, sessilis, glaber, subfinuosus, albidus, tonis desitutus, tubis albis, demum rufis. Bull. Champ. pag. 340. tab. 443. fig. 1.

Boletus suaeolens, var. p. Pers. Synopf. Fung. pag. 330.

p. *Boletus (suaveolens), odoratus, crispus, subsuberosus, pileo submentofo, albo; poris majusculis, fuscescentibus, nonnullis superficie inaequali, prominulis, acutis, var. n.* Persoon. Synopf. Fung. pag. 330.

Boletus suaveolens. Linn. — Enslin. Dissert. de Bol. suaveol. cum Icon.

Agaricus odoratus. Lam. Dict. n°. 7.

Boletus suberosus. Bolt. Fung. pag. 8. tab. 162.

Ce bolet, ordinairement solitaire sur les vieux troncs des saules, se fait remarquer par son odeur assez agréable ; il est médiocrement rétréci à sa base, mou, coriace, mince, glabre, arrondi, très-lisse, un peu finueux à ses bords, blanchâtre, dépourvu de zones. Ses tubes sont courts, d'abord blancs, puis roussâtres. La plante se, qui paroît presque une espèce distincte, est d'une consistance plus épaisse, presque subéreuse ; le chapeau blanc, légèrement tomenteux ; les pores plus grands, roussâtres ; quelques-uns inégaux, un peu saillans, aigus. Ces deux plantes ne doivent pas être confondues avec le bolet odorant mentionné plus bas.

39. BOLET imbriqué. *Boletus imbricatus.* Bull.

Boletus coriaceo-fragilis, luteo-fulvus, sessilis, imbricatus, carne subalbescens; tubis subfulvo-ferrugineis, brevibus. Bull. Champ. pag. 349. tab. 366.

Boletus amariconis. Pers. Synopf. Fung. pag. 331.

Cette espèce croît sur les arbres morts ou languissans, par groupes composés de chapeaux plus ou moins nombreux, imbriqués, confus, adhérens les uns aux autres, larges, minces, un peu finueux, coriaces, fragiles ; d'un jaune-jaune plus clair & presque blanchâtre vers les bords ; les tubes courts, roussâtres ou couleur de rouille ; la chair blanche, ayant l'odeur & l'amertume de la gentiane.

40. BOLET d'umélèze. *Boletus larici.* Bull.

Boletus coriaceo-mollis, sessilis, dimidiatus, glaber, carne nived, crustulima; tubis brevissimis, vix

respiculus. Bull. Champ. pag. 333. — Jacq. Miscell. tab. 19. 10. 21. — Michel. tab. 61. fig. 1.

Boletus pargans. Pers. Synopf. fung. 330.

Boletus officinalis. Vill. Dauph. 4. pag. 1041.

Boletus agaricum. Allioni, Pedem. n.º. 2748.

Agaricus laricis. Lam. Dict. 1. pag. 30. (*Voyez AGARIC*, n.º. 8.)

41. BOLET odorant. *Boletus suaveolens*. Bull.

Boletus coriaceo-suberosus, ex nivo-subfulvus, glaber, carne stramineo fuliginis; tubis longissimis, setulosius. Bull. Champ. pag. 342. tab. 310. — Lam. Ill. Gen. tab. 834. fig. 2. *Sub agarico*.

Dadalea suaviscentis. Pers. Synopf. Fung. p. 302.

Il est d'une consistance compacte, subéreuse; glabre, fessile, blanc dans sa jeunesse, puis roussâtre; sa chair d'un blanc de neige, puis d'une teinte bistre & zonée; les rubes irréguliers, très-allongés, de couleur roussâtre dans leur entier développement; il s'en exhale une odeur d'anis pénétrante, très-agréable. On le rencontre sur le tronc des vieux saules.

42. BOLET parfumé. *Boletus odoratus*. Jacq.

Boletus dimidiatus, odoratus, subdifformis, pileo rugoso, zonato seu fasciato, basi umbrino-nigrescente, margine fornicato, subiusque cinnamomeo, opaco. Pers. Comm. pag. 42. & Synopf. pag. 332. — Wulf. in Jacq. Collect. Ault. 2. pag. 150. — Schœff. Fung. pag. 106.

a. *Boletus* (ceratophora), pulvinatus, ramulosus, corniculatus, fuscus. Hoffm. Comm. Gott. vol. 12. pag. 33. tab. 6. — Veget. Cryptog. in Herc. subterr. pag. 1. tab. 1 & 3.

Ceratophora fribergensis, pag. 112. tab. 1.

Boletus odoratus, var. β , *ceratophorus*. Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 170 & 171.

β . *Boletus* (polymorphus), aculeus, expansus, pulvinatus, gibberosus, tomentosus, flavescens-fuscus, poris lateris, perpendicularibus. Hoffm. l. c. pag. 3.

La forme de ce bolet varie, principalement dans sa jeunesse. Il est d'abord presque tubéreux, & sans pores apparens; il devient ensuite d'une consistance dure & sèche. Le chapeau est tîde, zone, d'un bistre-noirâtre à sa base, courbé en voûte à ses bords, d'un jaune-cannelé foncé en dessous, long de deux ou trois pouces, large d'un pouce & demi, d'une odeur agréable; ses pores d'une couleur ferrugineuse. Selon Schradler, la plante β n'est qu'une sorte de monstruosité de la même espèce. Son chapeau est en bosse, tomenteux, d'un brun jaunâtre; ses pores perpendiculaires & déchiqués.

tés. Ces plantes croissent sur les poutres & les vieux bois, dans les forêts souterraines.

43. BOLET marginé. *Boletus marginatus*. Pers.

Boletus simplex aut *subimbricatus*, pileo crasso, duro, tuberculoso, rubescens-rufus; margine strillante-albido; poris pallidis, aculeis citrinis. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 6 & 7. — Schœff. Fung. tab. 137.

Son chapeau est dur, pesant, souvent solitaire, épais, tuberculeux, d'un rouge un peu brun, d'où découlent, en certain tems, quelques gouttes d'une liqueur acide & blanchâtre; les pores d'abord blancs, puis pâles, enfin d'un jaune très-clair. Il croit en automne, sur le tronc des poiriers & des hêtres.

44. BOLET du frêne. *Boletus fraxineus*. Bull.

Boletus coriaceo-suberosus, sessilis, glaber, carne crassa, subrutilo-straminea; tubis brevibus, subferrugineis. Bull. Champ. pag. 341. tab. 433. fig. 1. — Pers. Synopf. Fung. pag. 335.

Il est glabre, fessile, coriace, épais, subéreuse; sa face supérieure blanche, puis jaunâtre & marbrée; les bords constamment blancs, un peu zonés; les tubes courts, étroits, d'un rouge de ran ou de rouille dans leur longueur, blanchâtres à leur orifice. Il croît sur le tronc des vieux frênes; il acquiert, en vieillissant, la dureté du bois.

45. BOLET labyrinthe. *Boletus labyrinthiformis*. Bull.

Boletus coriaceo-ligneus, scabroso-zonatus, latericio-fuscus, similitudo labyrinthiformibus, cinereis. Bull. Champ. pag. 337. tab. 491. fig. 1.

Dadalea confragosa. Pers. Synopf. Fung. p. 301.

Boletus confragosus. Bolt. Fung. tab. 160.

Cette espèce est remarquable & caractérisée par les tubes grisâtres, fort larges, formant des sinuosités très-variées; elle est dure, coriace, presque ligneuse; la surface du chapeau raboteuse, ordinairement zonée, d'un rouge de brique tirant sur le brun; sa chair d'une couleur tannée très-foncée. Cette plante croît sur l'alifir.

46. BOLET amadouvier. *Boletus igniarius*. Bull.

Boletus dimidiatus, obtusus, suberosus, nigro-ferrugineus, levissimus aut vix sulcatus, tubis angustis, pileo concoloribus. Bull. Champ. pag. 361. tab. 434, & tab. 81. (*Exclusif. synon.*)

Boletus fomentarius, var. β , obtusus. Persoon. Synopf. Fung. pag. 338, & Observ. Mycol. 2. pag. 4.

Son chapeau est coriace, demi-orbiculaire, obtus; sa chair d'une couleur tannée, d'abord de-

la consistance du liège, puis aussi dure que du bois; les tubes courts, étroits, réguliers, de la même couleur que la chair. Il croît sur différentes espèces d'arbres; il vit plusieurs années, & chaque année il se forme une nouvelle couche de tubes. En coupant le champignon verticalement, on retrouve ces couches superposées, qui indiquent l'âge de l'individu; les poussees des diverses années sont séparées par des filons, comme dans l'espèce suivante. Il sert aux paysans pour conserver & transporter du feu. Ils le nomment *boula* ou *agarit* de chêne.

47. BOLET sabot de cheval. *Boletus angulatus*. Bull.

Boletus anguliformis, nigro-ferrugineus, sulcatus, primum mollis, filamentosus, dein ligneus, tubis angustis, concoloribus. Bull. Champ. pag. 357. tab. 401, & tab. 491. fig. 2.

Boletus fomentarius, var. δ , *angulatus*. Pers. Synopf. Fung. pag. 537, & Oëserv. Mycol. 1. pag. 4.

Boletus igniarius. Sowerb. Fung. tab. 131.

Boletus hippocrepis. Schrank, Bavar. n°. 1731-34.

Agaricus igniarius. Lam. Dict. t. n°. 4.

Ce n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente, remarquable par sa forme, semblable à un sabot de cheval. Sa chair est d'abord molle & filandreuse, puis ligneuse. Si l'on frotte la première écorce, on en trouve dessous une seconde, dure & d'un noir luisant. Les poussees de chaque année sont séparées par un filon annulaire, profond, facile à distinguer des zones brunes, qui le sont quelquefois distinguer à la surface. Il porte aussi le nom de *boula*, d'*agarit* de chêne, *agaric femelle*. On en fait de l'amadou. Il croît sur le tronc des arbres.

48. BOLET faux amadouvier. *Boletus pseudo-igniarius*. Bull.

Boletus subcoriaceus, rubro-ferrugineus vel subgriseus, tenuis f. præ d. striatus, tubis elongatissimis. Bull. Champ. pag. 356. tab. 458.

Boletus fomentarius, var. γ , d'*hyodes*. Personn. Obs. Mycol. pag. 3, & Synopf. Fung. pag. 537. ?

Ce bolet est très-voisin des deux précédents; il en diffère en ce qu'il ne vit qu'un ou deux ans, & qu'on n'y trouve jamais plusieurs couches de tubes superposés. Son chapeau est glabre, coriace, mais aqueux & mou, d'un rouge-ferrugineux; grisâtre dans toutes les parties, dépourvu de zones en dessus. Ses tubes sont très-alongés, & souvent séparés par des crevasses. Il existe souvent des gouttes d'eau lin pèle sur ses bords. Il croît sur le tronc des arbres.

49. BOLET à mèches. *Boletus fomentarius*. Pers.

Boletus dimidiatus, durus, pileo subtriangulo, obsoleto fasciato, cinereo-fuliginoso; poris primò olivaceis, demùm subferrugineis. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 1, & Synopf. Fung. pag. 536. — Sowerb. Fung. tab. 133. — Lam. Dict. 1. n°. 2. — Butarra, pag. 71. tab. 37. fig. E.

β . *Boletus* (applanatus), dilatatus, utrinque planiusculus, pileo t. obconico, rugoso, rufescente-cinereo; poris minutissimis, primò albis, dein pileo concoloribus. Pers. Obs. Mycol. 1. pag. 2, & Synopf. l. c.

Boletus liffensis. Batsch. Fung. fig. 130. ?

C'est encore une espèce très-voisine des précédentes, ainsi que de la suivante. Son chapeau est presque trigone, d'une couleur cendrée, enfumée, à zones peu sensibles. Ses pores sont d'abord d'un blanc un peu glauque, puis légèrement ferrugineux. Il croît sur le tronc des hêtres languissants. On s'en sert pour faire de l'amadou & des mèches. Lorsqu'on veut le multiplier, il faut fréquemment mouiller les troncs sur lesquels il croît.

Dans la variété β , le chapeau est moins épais, dilaté, presque plane à ses deux faces, ridé, tuberculeux, d'un roux cendré; ses pores très-petits, d'abord blanchâtres, puis de la couleur du chapeau. Il croît ordinairement solitaire sur le tronc des hêtres. Dans sa maturité il est long de six à sept pouces, épais d'un demi-pouce, souvent couvert d'une poussière couleur obscure de canelle.

50. BOLET du pommier. *Boletus pomaceus*. Pers.

Boletus dimidiatus, parvus, pileo perpendiculari; margine acuto, cinereo-fufescente, fasciato; poris manifestis, planis, ferrugineis. Pers. Synopf. Fung. pag. 538.

β . *Boletus* (prunastri), pileo subrefusinato, crasso, levi, truncato. Pers. l. c.

Il se rapproche du *Boletus igniarius* par ses principaux caractères; mais il est beaucoup plus petit, bien moins ligneux, blanchâtre à l'extérieur. Son chapeau est perpendiculaire, zonné, d'un brun-cendré, aminci à ses bords, d'un pouce & demi tant en épaisseur qu'en largeur. Les pores sont très-sensibles, plans, ferrugineux. Dans la variété β , le chapeau est plus épais, très-lisse, tronqué, un peu incliné. On trouve ces bolets sur les pommiers & autres arbres des vergers.

51. BOLET subéreux. *Boletus suberosus*. Bull.

Boletus primò subaqueosus, dein coriaceus, glaber, rufescent, formâ mutabilis, superne rugosus vel notus, tubi. latius, lacunis interjectis. Bull. Champ. pag. 354. tab. 481.

a. *Idem, fulvus*. Bull. var. 1. fig. A. B.

β. *Idem, rutilus*. Bull. var. 2. fig. C. D. E. G.

γ. *Idem, albus*. Bull. var. 3. fig. F.

Ce bolet est peu épais, de forme variable, médiocrement rétréci à sa base, d'abord aqueux & mou, puis coriace, glabre, de même couleur à ses deux faces, d'un fauve-rouillé dans la variété α, d'un roux-faive dans la variété β, ou blanchâtre dans la variété γ. Sa face supérieure est quelquefois ridée ou zonnée, munie en dessous de tubes irréguliers, élargis, souvent séparés par des crevasses. Il croît sur le tronc des arbres.

52. BOLET imberbe. *Boletus imberbis*. Bull.

Boletus coriaceus, subrotundus, flavo-albidus, zonatus sulcatus, tubis sinuatis, flavo-pallidescens. Bull. Champ. pag. 339. tab. 445. fig. 1.

Il est coriace, arrondi, glabre, sessile, fort mince, d'une couleur blanche ou jaunâtre en dessous, marqué de sillons, disposés par zones; il devient verdâtre dans la vieillesse, parce qu'il est attaqué par une petite espèce d'algue encore mal connue. Ses tubes sont très-courts, finaux, irréguliers, d'abord blancs, puis d'un jaune pâle.

Cette plante croît sur le tronc des arbres morts.

53. BOLET en coquille. *Boletus conchatus*. Pers.

Boletus parvulus, spadiceus, durus, pileo basi subeffuso, conchiformi, subtenui, fasciis imbricatis transversim striato. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 24, & Synops. Fung. pag. 538.

Cette espèce est fort petite, ayant à peine un pouce & demi de long sur deux ou trois lignes d'épaisseur; son chapeau étalé à sa base, dur, concave, presque en forme de coquille en dessous, marqué de zones imbriquées en forme de stries, d'un jaune très-pâle, un peu plus foncé en dessus. Il croît sur le tronc des saules & des hêtres.

54. BOLET velouté. *Boletus velutinus*. Pers.

Boletus suberosus, simplex, pileo convexo, tenui, hirsuto, albo; poris minutis, sordide albis. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 70, & Synops. Fung. pag. 539.

Sa consistance est tubéreuse; son chapeau velu, mince, convexe, blanchâtre, large d'un pouce & demi, ferme, à zones peu marquées; les pores fort petits, d'un blanc-faïe. Il croît aux lieux montagneux, sur les troncs des arbres.

55. BOLET jaunâtre. *Boletus lutescens*. Pers.

Boletus subcespitosus, suberosus, pileo depresso, tenui, tomentoso, pallido; fasciis hirsutis, lutescentibus. Pers. Synops. Fung. pag. 539. — Annal. bot. Fa.c. 2. pag. 29. — Schœff. Fung. tab. 136. 2

Il se rapproche beaucoup du précédent; mais il est plus large, mince, aplati à ses deux faces, d'un jaune-pâle, tomenteux; sa face supérieure marquée de bandes jaunâtres, velues; les pores d'un blanc-faïe. Il croît sur le tronc des arbres.

56. BOLET ochracé. *Boletus ochraceus*. Pers.

Boletus imbricatus, suberosus, pileo subtomentoso, toto ochraceo-fulvo, basi tuberculoso; poris albicantibus. Pers. Synops. Fung. pag. 539.

Il diffère du *Boletus versicolor* par son épaisseur plus considérable, par sa couleur d'un jaune d'ocre; il est large d'un pouce & demi, subérose, presque charnu, imbriqué; son chapeau légèrement tomenteux, tuberculeux à sa base; les pores blanchâtres. Il croît sur les rameaux desséchés du tremble.

57. BOLET bigarré. *Boletus versicolor*. Linn.

Boletus cespitosus, coriaceus, pileo tenui, zonato, multicolore, caruleo; poris albis. Persoon, Synops. Fung. pag. 540.

Agaricus versicolor. Lam. Dict. 1. n°. 6.

58. BOLET à peau poreuse. *Boletus pelloporus*. Bull.

Boletus subreniformis, coriaceus, fissilis, subrotundus, supra griseo-cinereus, infra subniger, tubis brevissimis, poriformibus. Bull. Champ. pag. 365. tab. 501. fig. 2.

Ce bolet est mince, coriace, arrondi ou en forme de rein, glabre ou médiocrement tomenteux, d'un gris-cendré ou roussâtre en dessus, d'un brun-grisâtre ou presque noir en dessous. Ses tubes sont si courts, qu'ils semblent seulement des pores pratiqués dans la pellicule inférieure. Il croît sur les troncs & les branches mortes.

59. BOLET uni. *Boletus unicolor*. Bull.

Boletus imbricatus, suberosus, zonatus, supra fuliginoso-cinereus, pileo dimidiato, hirsuto, subrotundus. Bull. Champ. pag. 365. tab. 408, & tab. 501. fig. 3. — Lam. Ill. Gen. tab. 884. fig. 1. Sub agarico.

Sistotrema cinereum. Pers. Synops. Fung. p. 551.

Il paraît que ce bolet a d'abord été confondu avec le *Boletus versicolor*. Il est, comme lui, mince, coriace, sessile; il en diffère par la couleur grise de toutes ses parties, même à l'intérieur. Sa face supérieure est munie de zones légèrement concaves, tomenteuses; le dessous garni de tubes irréguliers, finaux, allongés, souvent prolongés comme les pointes des hydium. On le rencontre par groupes sur les vieilles fûches.

60. BOLET écarlate. *Boletus coccineus*. Bull.

Boletus

Boletus gregarius, unicolor, cinnabarinus, pileo cressifusculo, ruguloso, obsolete zonato, subtomentoso. Bull. Champ. pag. 364. tab. 501. fig. 1.

Boletus cinnabarinus. Perf. Synopf. Fung. p. 540. — Jacq. Flor. austr. 4. tab. 364.

Ce bolet, remarquable par sa couleur écarlate, que quelquefois mêlé en dessus d'une teinte jaune, est glabre, fuffile, d'une consistance coriace, épaisse, tubéreuse. Sa chair est rouscâtre; ses tubes irréguliers, très-apparens, finissent à leur orifice. Il croît sur les branches abattues du méristier.

61. BOLET sanguin. *Boletus sanguineus*. Linn.

Boletus miniatus, compressus, subreniformis, glaber, poris minutissimis. Perf. Synopf. Fung. p. 541. — Swartz, Observ. bot. pag. 408. tab. 11. fig. 4. A. B.

Agaricus ruber. Lam. Dict. 1. pag. 50.

Il diffère du précédent en ce qu'il est beaucoup plus mince, comoriné, glabre, réniforme, muni de pores très-petits, peu sensés, d'un rouge de sang à ses deux faces. (Voyez AGARIC, n°. 5.)

62. BOLET du sapin. *Boletus abietinus*. Dickf.

Boletus conopseus, imbricatus, pileo basi f. fusco, tenui, tomentoso, cinereo-albido; poris acutis, fusco purpureis. Perf. Synopf. Fung. pag. 541. — Dickf. Crypt. brit. 3. tab. 9. fig. 9.

Boletus purpureus. Perf. Observ. Mycol. 1. pag. 24.

Il croît par groupes sur les troncs morts des pins & des sapins. Son chapeau est mince, étalé à sa base, ridé, tomenteux, blanc hâtre, garni en dessous de pores aigus, anguleux, de couleur purpurine; quelques-uns comme dentés ou déchiquetés.

** Chapeau pédonculé; pédicule latéral ou encen-trique.

63. BOLET chicoté. *Boletus frondosus*. Perf.

Boletus ramossissimus, pilis numerosis, dimidiatis, griseo-fulgineis. Perf. Synopf. Fung. pag. 520. & Comment. pag. 49 & 50. — Schœff. Fung. tab. 229. — Flor. dan. tab. 952.

Boletus inrybaceus. Baumg. Lipsf. pag. 631.

Ce bolet a presque un pied de large. Son pédoncule, épais, poreux, d'un blanc de neige, réunit un grand nombre de chapeaux, assez semblables à des feuilles de chicorée, comprimés, ridés, tuberculeux, de couleur grise, enfumée. On le soupçonne bon à manger. Il croît au pied des chênes.

64. BOLET feuille d'acanthé. *Boletus acanthoides*. Bull.

Botanique. Supplément. Tome I.

Boletus maximus, cespitosus, mollis & fragilis, lateritio-rubiginosus, stipite basi cylindrico, supra latrescente; pileo immixto, undulato, supra zonato, subhis reticulato. Bull. Champ. pag. 337. tab. 486.

Boletus giganteus. Perf. Synopf. Fung. pag. 521.

Il forme, sur les vieilles fouches, des touffes quelquefois très-étendues, & parvient souvent à une grandeur extraordinaire; il est d'une consistance fragile & mollesse, d'un rouge de brique tirant sur la couleur de rouille. Son pédoncule, cylindrique à sa base, s'élève d'un côté en un demi-chapeau sinué, ondulé, irrégulier, zone en dessus, réticulé en dessous, aminci vers les bords. Les tubes sont courts, & se prolongent jusque sur le pédoncule.

65. BOLET du noyer. *Boletus juglandis*. Bull.

Boletus magnus, pileo carnoso, suberoso, ochraceo; disco squamisque umbrinis, nigrescentibus; poris magnis, flexuosis; stipite crasso, laterali. Bulliard, Champ. pag. 344. tab. 19 & 114. — Schœff. Fung. tab. 101 & 102.

Boletus platyporus. Perf. Synopf. Fung. p. 521.

Boletus squamosus. Hudf. Bolt. Fung. tab. 77. — Flor. dan. 1096.

Boletus cellulosus. Lightf. Scot. pag. 1032.

Son pédoncule est épais, très-court, ordinairement latéral, souvent crevasse près de sa base, noisâtre ou roussiâtre; son chapeau convexe, d'un jaune-roux ou sauve-bistré, souvent écailléux ou crevasse; sa chair blanche; ses tubes courts, larges, blancs ou de la couleur du chapeau. Il varie dans sa forme, ses dimensions & sa couleur; il croît sur différents arbres, particulièrement sur le noyer.

66. BOLET à crêtes. *Boletus cristatus*. Perf.

Boletus cespitosus, pileo carnoso, d. summi, subinvoluta, virescente; poris niveis, dein ochroleucis; stipite laterali, niveo. Perf. Synopf. Fung. p. 522. & Comment. pag. 125. — Schœff. Fung. tab. 316 & 317.

p. *Boletus floriformis*. Schœff. Fung. tab. 113.

Cette espèce est rare & belle; elle croît par groupes sur les hêtres, dans les lieux ombragés. Son chapeau est chatnu, très-irrégulier, roulé avec celui qui l'avoiisine, légèrement tomenteux, large de trois pouces, verdâtre; les pores d'un blanc de neige, puis d'un jaune-pâle, enfin déchiquetés & verdâtres; le pédoncule latéral, d'un beau blanc.

67. BOLET oblique. *Boletus obliquatus*. Bull.

Boletus pileo coriáceo, costaeo, nitido, concentricè sulcato; poris minutis, albis; stipite laterali, nitido, fusco. Bull. Champ. pag. 335. tab. 7 & 459.

Q 999

Boletus lucidus. Pers. Synopf. Fung. pag. 522.
— Curtis, Lond. tab. 224. — Sowerb. tab. 134.
— Schrad. Spicil. pag. 163 & 166.

Agaricus pseudo-boletus. Jacq. Flor. austr. tab. 41.
Agaricus nitens. Bittsch. Fung. 3. tab. 41. fig. 215.

Boletus vernicatus. Berger, Phytogr. tab. 99.

Il est d'une consistance sèche, coriace, tabéreuse. Sa surface est luisante & comme vernissée; son pédicule cylindrique, lisse, brunâtre, un peu bosselé, souvent simple, quelquefois un peu rameux à sa base, tantôt très-court, quelquefois long de trois à quatre pouces; le chapeau horizontal, arrondi, épais, un peu sinueux, blanc ou jaunâtre, puis rougâtre ou marron, pourvu, en dessus & à ses bords, de zones parallèles & les tubes blancs, peu couleur de rouille. On le trouve sur les vieilles fouches.

68. BOLET sabot. *Boletus calceolus*. Bull.

Boletus coriaceus, pileo dimidiato, tenui, sublaevissimis, nigro, sessili aut breviter pedicellato; tubis brevibus. Bull. Champ. pag. 338. tab. 445. fig. 2, & tab. 360 & 46.

Boletus bodius. Pers. Synopf. Fung. pag. 523.

Boletus perennis. Bittsch. Elem. Fung. pag. 131. fig. 129.

Boletus durus. Timm. Flot. megap. pag. 271.

Son pédicule est latéral ou excentrique, long d'un à trois pouces, quelquefois presque nul; il soutient un chapeau coriace, mince, plane ou concave, ondulé ou sinueux, d'un jaune de paille ou d'un brun marron, souvent tacheté de points ou de lignes brunes, garni de tubes courts. Il croît sur les arbres morts.

69. BOLET variable. *Boletus varius*. Pers.

Boletus subfoliarius, pileo tenace, ochraceo, dimidiato aut integro; stipite sublaterali, elongato, ad dimidium deorsum nigro. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 85, & Synopf. Fung. pag. 524.

Boletus lateralis. Bolt. Fung. tab. 83.

Son chapeau est dur, large d'environ deux pouces, jaunâtre à ses deux faces, presque entier ou à demi tronqué, soutenu par un pédicule latéral ou excentrique, noirâtre en dehors jusque vers son milieu. Il croît sur le tronc des hêtres & des pins.

70. BOLET blanc. *Boletus albus*. Pers.

Boletus subparvus, albus, pileo carnoso, molliusculo, convexo; stipite brevi, laterali. Pers. Synopf. Fung. pag. 524.

Ce bolet est petit, de couleur blanche; son

chapeau charnu, un peu mou, convexe, épais de trois ou quatre lignes, soutenu par un pédicule latéral, long d'un demi-pouce & plus, épais de trois ou quatre lignes; les pores convexe, égaux. Il croît dans les lieux humides, sur les branches & les rameaux en décomposition.

*** Chapeau soutenu par un pédicule central.

71. BOLET de Carinthie. *Boletus carinthiacus*. Jacq.

Boletus stipitatus, niveus, pilei pulverulenti, cuticulâ cœcetrinâ, aequali subsessile, inque squamulis descendente; poris exiguis, difformibus, oblongo-flexuosis. Jacq. Collect. Austr. 1. pag. 342 & 44.

Son pédicule est légèrement bulbueux à sa base, oblong, cylindrique, un peu épais, plein, blanchâtre, quelquefois tectivé à son sommet; le chapeau d'un blanc de neige, inégal, lobé, sinué, prenant, en vieillissant, la forme d'un entonnoir recouvert d'une peau très-fine, d'un jaune-vert, qui se déchire ensuite en petites écailles; les pores très-blancs, petits, irréguliers. Il croît dans l'Autriche; il est admis partout comme comestible.

72. BOLET truffe de terre. *Boletus tuberafer*. Jacq.

Boletus magnus, pileo subsinfundibuliformi, repando, frutescente; poris decurrentibus, stipite pallidifcente. Jacq. Collect. Austr. Suppl. tab. 8 & 9.

Tuberafer seu fungarius lapis, vulgo pietra fungifera appellatur. Bat. Fung. Arm. pag. 59 & 61. tab. 24. A. — Boccon. Mus. tab. 300.

« La matrice, dit Jacquin, de ce célèbre champignon, apporté à Vienne par Jacquin fils, est un humus compacte, adhérent, deux fois gros comme la tête; lisse, pénétrée en son entier d'une matière blanchâtre, fongiforme, pesante, mais sans mélange d'aucune pierre. Placée, pendant l'hiver, dans une terre rempée, elle produisit, à l'aide de quelques arrosements, plusieurs bolets de l'espèce de celui dont il est ici question. Il est fort grand, pédiculé, jaunâtre, presque en entonnoir; son pédicule d'un jaune plus pâle; les pores decurrents. Il croît naturellement en Italie. »

73. BOLET canelle. *Boletus cinnamomeus*. Jacq.

Boletus cinnamomeus, fragilis, pileo concavo, villosio, in centro infundibuliformi sulco; poris annulatis. Jacq. Collect. 1. pag. 116. tab. 2. — Pers. Synopf. Fung. pag. 515.

Sa couleur est d'un jaune-cannelle; sa consistance fragile & non coriace, en quoi il diffère principalement du *boletus perennis* Linn.; son chapeau concave, velu, d'un jaune plus foncé & infundibuliforme dans son centre, muni en dessous de pores en anneau. Il croît dans l'Autriche.

74. BOLET blanc & noir. *Boletus leucomelas*. Persf.

Boletus pileo carnoso, stipiteque nigrescentibus; poris candidis. Persf. Synopf. Fung. pag. 515.

Son pédicule est noirâtre, central, long d'un pouce & demi; son chapeau presque plane, charnu, large d'environ trois pouces, de la couleur du pédicule; les pores blancs, tous égaux, d'une grandeur médiocre. Il est rare. On le trouve en Allemagne.

75. BOLET blanchâtre. *Boletus albidus*. Persf.

Boletus gregarius, albidus, pileo glabro, carnoso, fragili; poris minutis, demum citrinis; stipite breviusculo, inaequali. Persf. Obsl. Mycol. 1. pag. 84, & Synopf. Fung. pag. 515.

Boletus ovinus. Schœff. Fung. tab. 121.

Boletus confriatus. Bolt. Fung.

Il croît par groupes dans les bois de pins, sur les hauteurs. Son chapeau est large d'environ trois pouces, convexe, un peu sinueux, presque hémisphérique, glabre, blanchâtre, roide, fragile, charnu; le pédicule très-court; les pores fort petits, d'abord blanchâtres, puis d'un jaune-citron.

76. BOLET poreux. *Boletus polyporus*. Bull.

Boletus subcoriaceo-mollis, stipite centrali; pileo subfuligineo-cinerecente, cupulari; carne nuda, tenuissimâ. Bull. Champ. pag. 331. tab. 469.

Boletus fuliginosus. Persf. Synopf. Fung. pag. 516.

Ce bolet croît sur la terre. Son pédicule est long d'environ deux pouces, d'un jaune d'argile, on peu rougeâtre à sa base; il soutient un chapeau mince, coriace, un peu mou, blanc, orbiculaire, concave, en forme de coupe à bords renversés, d'abord blanc, puis un peu cendré en dessous, criblé de pores étroits, distans, peu profonds.

77. BOLET en entonnoir. *Boletus infundibuliformis*. Persf.

Boletus pileo carnoso, infundibuliformi, ex albidofulginofo; poris albidis; stipite deorsum incrassato, nigrescente. Persf. Dispo. Fung. pag. 70, & Synopf. Fung. pag. 516.

1. *Boletus (menalopus), pileo umbilicato, depressi, tenui, obscurâ fuliginis; poris pallidulentibus; stipite tenui, toto nigro*. Persf. Dispo. Fung. l. c.

Son pédicule est noirâtre, long d'un pouce & demi, épais de trois à quatre lignes; il soutient un chapeau charnu, infundibuliforme, d'un blanc-ensumé, large de deux ou trois pouces, épais de deux, garni en dessous de pores blanchâtres. Il croît dans les forêts, sur les hêtres. La variété 1 est beaucoup plus petite; son chapeau orbiculaire,

embiliqué, comptimé; son pédicule grêle, tout-à-fait noir.

78. BOLET d'hiver. *Boletus brumalis*. Persf.

Boletus pileo convexo, subumbilicato, subumbrino, laescente; margine ciliato; poris oblongis, candidis. Persf. Synopf. Fung. pag. 517, & Dispo. Fung. pag. 27.

Boletus laevis. Batfch. Elem. Fung. pag. 103. tab. 10 & 42.

α. *Boletus (vernus), rufescente-pallidis, disco glabro, margine subvillosa*. Persf. l. c.

β. *Boletus (fasciculatus), pileo fusco, fasciculato piloso; poris flaviscentibus; stipite levi, rufescente*. Schrad. Spicil. pag. 154.

Ce bolet, d'après M. Persoon, se rencontre sur les troncs pourris vers la fin de l'automne, où alors il se présente avec une couleur foncée, presque noirâtre, muni de pores courts, presque linéaires. Dans le printemps, où il existe encore, sa couleur est presque jaune; il est glabre, pâle en dessous, tellement que la variété α pourrait être regardée au premier aspect comme une espèce particulière. Le chapeau est convexe, presque ombiliqué, large d'environ un pouce & demi, cilié à ses bords; les pores blancs & oblongs, jaunâtres dans la variété β, qui de plus est parsemée de poils ténuis par paquets.

79. BOLET vivace. *Boletus perennis*. Linn.

Boletus coriaceus, tenax, cinnameus, pileo tenui, zonato, velutato, ut plurimum canato. Persf. Synopf. Fung. pag. 518.

Agaricus coriaceus. Lam. Dict. 1. pag. 51. (Fry. AGARIC, n°. 11.)

80. BOLET frangé. *Boletus fimbriatus*. Bull.

Boletus gregarius vel solitarius, umbrinus, stipite cylindrico, subtenui; pileo sericeo vel glabro, zonato; margine fimbriato, infundibuliformi; tubis brevibus, irregularibus. Bull. Champ. pag. 332. tab. 254.

Boletus subtomentosus. Bolt. Fung. 1. tab. 87.

D'après M. Persoon, cette espèce n'est qu'une variété de la précédente; mais elle est annuelle, tandis que l'autre est vivace. Elle croît sur la terre, ordinairement solitaire, quelquefois par touffes, dont les pédicules, en se greffant, forment une souche rameuse. Il arrive aussi que plusieurs individus sont soudés ensemble par le chapeau. Son pédicule est glabre, cylindrique, assez grêle, long d'environ deux pouces; il soutient un chapeau coriace, mince, glabre ou soyeux, zonné & frangé sur ses bords, creusé en entonnoir, de couleur tanée, garni en dessous de pores courts, irréguliers.

81. BOLET à bourtelets. *Boletus areolaris*. Pers.

Boletus pileo flavofescente, margine deflexo, hispido; poris magnis, rhombicis, albis; stipite fuscescente. Pers. Synops. Fung. pag. 518. — Basich. Elem. Fung. pag. 97. — Michel, Nov. Gen. Plant. pag. 130.

Boletus enasperatus. Schrad. Spicil. pag. 155. tab. 70. fig. 5.

Son pédicule est brunâtre, cylindrique, long d'un pouce & demi; il soutient un chapeau jaunâtre, subéveux, large d'un demi-pouce, rabattu & un peu hérissé à ses bords. Les pores sont grands, blanchâtres, rhomboïdaux. Il croît sur le tronc des arbres, en Italie & en Allemagne.

82. BOLET en écu. *Boletus nummularius*. Bull.

Boletus toms glaber, parvus, pileo duro, convexo, plano, ex olivido-pallidofescente; stipite subexcentrico, deorsum nigro. Bull. Champ. pag. 335. tab. 124. — Pers. Synops. Fung. pag. 519. — Dickf. Plant. CRYPTOG. 1. pag. 18.

Ce bolet est d'une consistance dure, coriace; son pédicule grêle, long d'un pouce, jamais parfaitement central, noir à sa base; jaunâtre à sa partie supérieure; le chapeau mince, comprimé, atroûti, un peu creusé en forme de coupe, de couleur jaunâtre ou blanchâtre; les tubes sont courts & jaunâtres. Il croît sur les branches des chênes, couchées par terre.

83. BOLET à tête mince. *Boletus leptcephalus*. Jacq.

Boletus pi'eo plano, tenui, supra cervino, subius albo; stipite excentrico, brevi, pallido. Jacq. Austr. 1. pag. 142. tab. 12. — Persoon, Synops. Fung. pag. 519.

Il a de très-grands rapports avec l'espèce précédente. Son pédicule est court, pâle ou un peu brun, presque jamais parfaitement central; il soutient un chapeau mince, plane, un peu sinueux, d'un jaune-pâle en dessus, blanc en dessous. Il croît sur les branches pourries.

84. BOLET ombellé. *Boletus umbellatus*. Schæff.

Boletus romosissimus, pileo infundibuliformi, fuliginoso-pallido, subius albo. Schæff. Fung. tab. 111. — Pers. Synops. Fung. pag. 519.

Boletus romosus. Vahl, in Flot. dan. tab. 1197. ?
Fungus cespitosus, romosus, umbellatus, major, pollidè luteus. Battel. Icon. 1269.

D'une souche courte, épaisse, s'élève un grand nombre de pédicules poreux, charnus, au nombre de trente environ, qui soutiennent autant de

chapeaux larges d'environ un pouce & plus, en forme d'entonnoir, pâles ou billrés en dessus, blancs en dessous, presque ramassés en ombelles. Ce bolet croît en Allemagne, dans les forêts montagneuses.

* *Boletus (polyccephalus), romosissimus, pileis numerosis, convexis, fuscescentibus*. Pers. Synops. Fung. pag. 520.

Boletus romosissimus. Jacq. Flor. austr. 2. tab. 172. — Murr. Syll. veget. 978. — Schæff. Fung. tab. 265 & 266.

Très-voisine de la précédente, dont elle n'est peut-être qu'une variété, cette plante en diffère par ses chapeaux plus ramassés, moins grands, convexes, presque ombellés, de couleur brune. Les pores sont blancs. Ce bolet croît dans les contrées méridionales de l'Allemagne.

BOLETUS. (Voyez BOLET.)

BOLHIDA ou BOLHINDA : herbe parasite de Ceilan, qui croît sur les vieux arbres & les bois pourris. C'est le *troscantio cristata*, que Linné nommoit auparavant *commelina cristata*, & que Burmann, *Flor. Ind.* 18, tab. 7, fig. 4, a figurée sous ce dernier nom.

BOLIMBA. (Voyez BALIMBA.)

BOLONTAS. A Java on nomme ainsi, suivant Burmann, le *bocharis indica* Linn.

BOLTONE. *Boltonia*. Ce genre a été établi sur une espèce de matriçaire qu'on a reconnue s'écarter de ses congénères par des caractères particuliers, & qui consistent en un calice convexe, imbriqué; les demi-fleurs de la circonférence nombreuses; les semences surmontées de plusieurs petites dents setées, dont deux plus grandes, en forme d'arc; le réceptacle hémisphérique, alvéolé.

Ce genre se compose, jusqu'à présent, des deux espèces suivantes :

1. BOLTONE astéroïde. *Boltonia ateroides*. Lhér.

Boltonia foliis integerrimis. Lhér. Sert. Angl. 17. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 197.

Boltonia floribus longè pedunculatis; seminibus ovalibus, globosis, submuticis. Mich. Flor. borcal. Amer. 2. pag. 132.

Muticaria ateroides. Lam. Dict. 3. pag. 719.

Cette espèce a été décrite parmi les matriçaires, n°. 6. Ses fleurs sont longuement pédonculées; les semences glabres, ovales, point membraneuses, à peine dentées.

2. BOLTONE à feuilles glauques. *Boltonia glauifolia*. Lhér.

Boltonia foliis inferioribus serratis. L'hérit. Sect. Angl. 27. — Art. Hort. K. w. 3. pag. 197.

Boltonia (platifolia), floribus breviter pedunculatis; seminibus obcordatis, confusis alatis, puberulis; arboris papyi duabus isoforum longitudine. Mich. Flor. borcal. Amer. 2. pag. 132.

Cette espèce a le port de la précédente, & lui ressemble beaucoup par la disposition des feuilles & la couleur des fleurs; mais les tiges sont moins ramifiées, presque simples, munies seulement de quelques rameaux à leur partie supérieure; les feuilles inférieures dentées en scie; les pédoncules des fleurs beaucoup plus courts; les semences en cœur, un peu pubescentes, légèrement ailées & membracées à leurs bords; les deux artères de la longueur des semences.

Cette plante croit dans l'Amérique septentrionale. ♀ (V. f.)

BOMAREA. Genre de plantes de la famille des narcissifères, établi par M. Mirbel sur trois espèces d'*Asfroeomeria*, dont la tige est grimpante; les divisions extérieures de la corolle (du calice) droites, de même que les étamines; la capsule arrondie & aplatie de haut en bas: tel est le caractère de *Asfroeomeria fassilla* — *multiflora*. Les autres espèces ont les divisions extérieures de la corolle renversées, les étamines courbées en arc, & la capsule alongée. Ces caractères conviennent mieux à une sous-division qu'à l'établissement d'un genre.

BOMBAX. (Voyez FROMAGER.)

BOMBEENEN : nom donné par les Hollandais au *Cratogeomys religiosa* par la côte de Malabar. C'est le même arbre que les Malabares nomment *nirviala*, & les Bames *ranabelou*.

BOMBU. (Voyez BOBU.)

BOMI : espèce de liseron de l'île de Ceilan, à feuilles trilobées & velues, suivant Hermann.

BOMPORROETANG. A Java on nomme ainsi, au rapport de Burmann (*Flor. Ind.*), deux plantes, dont l'une est son *corchorus javanicus*, & l'autre son *melochia erecta*. Elles n'ont été mentionnées ni par Linné ni par Lamarck.

BON : nom égyptien de la graine du café (*Coffea arabica* Linn.), suivant Prosper Alpin. La boisson qu'on en prépare, est nommée *caoua*.

BONA : arbre assez élevé des Philippines, selon M. de Jussieu; il croît sur les montagnes. Ses tiges sont coudeuses, composées de deux grandes folioles longues & charnues, portées sur un pétiole ailé.

BONAMIE de Madagascar. *Bonamia madagascariensis*. Pet. Th. Végét. d'Afrique. Fasc. 1. pag. 17. tab. 5.

Bonamia foliis undulatis, scarfis, subvillosis; panicula terminali. (N.)

Genre établi par M. du Petit-Thouars, à fleurs complètes, régulières, monopétales, qui se rapproche des borraginées & a quelque ressemblance avec les *cordia*; il ne comprend jusqu'alors qu'un seul arbriste exotique à l'Europe, à feuilles alternes, à fleurs paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle campanulée, à cinq lobes; cinq étamines insérées vers le milieu du tube; le style bifide; une capsule à deux loges, remplies chacune de deux semences ailées.

C'est un arbriste d'un port élégant, qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds sur une tige droite, rameuse. Les rameaux sont foibles, cylindriques, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, alternes, épaisses, fermes, ovales, acuminées, ondulées à leur contour, un peu velues dans leur jeunesse, glabres dans leur entier développement. Les fleurs sont terminales, réunies en une panicule courte & serrée, de couleur blanche; le calice velu, à cinq découpures profondes; la corolle monopétale, évasée en cloche; le limbe à cinq lobes ovales, aigus, alternes avec les étamines; les anthères attachées par le dos, s'ouvrant à leur côté intérieur; l'ovaire libre, conique; le style profondément bifide, plus long que la corolle; les stigmates en tête.

Le fruit consiste en une capsule à deux loges, contenant chacune deux semences, dont une avorte très-souvent; elles sont ovales, acuminées, attachées au fond de la capsule, recouvertes par un arille pulpeux, coloré en rouge-obscure; l'embryon dépourvu de périsperme; la radicule inférieure; les cotylédons foliacés, pliés ensemble & repliés vers le bas.

Cet arbriste croît à l'île de Madagascar, dans les environs de Foul-Pointe. ♀

Observations. Ce genre est consacré à la mémoire de Bonami, médecin & professeur de botanique à Nantes, qui a publié, en 1782, un Prodrome de la Flore des environs de cette ville, & y a indiqué plusieurs plantes qu'on ne connoissoit pas encore en France. « Il semble au premier coup d'œil, dit M. du Petit-Thouars, que ce genre fait partie de la famille des borraginées & de la division des sébelliers (*cordia*); mais son calice & la forme de son embryon paroissent beaucoup le rapprocher des lisérons. D'un autre côté, le sébellier, par cette même structure d'embryon, s'écarte beaucoup des *sourmefforia* & autres borraginées à fruits en baie.

BONAPARTEA. Ce genre de plantes, établi par Ruiz & Pavon dans leur *Flora du Pérou*, me parait devoir être réuni au *tillandsia*, dont il ne diffère que par un calice à deux folioles au lieu de trois; par les pétales roulés sur eux-mêmes; par les divisions, qui ne s'élèvent que jusque vers le milieu des valvcs. (Voyez *TILLANDEA*, Suppl.)

BONATE à grandes fleurs. *Bonatea speciosa*. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 43.

Orchis speciosa. Linn. Suppl. 401. — Swartz, Aq. Holm. 1800. pag. 206. — Lam. Dict. 4. pag. 595. n°. 37.

Orchis (speciosa), *labellum tripartito, laciniis flexuosis, foliis ovatis*. Thunb. Prodr. 4.

Cette belle plante, mentionnée déjà à l'article *ORCHIS*, n°. 27, a été considérée par Willdenow comme devant former un genre particulier, d'après la forme de sa corolle. Il lui donne pour caractère essentiel :

Une corolle à cinq pétales ou divisions profondes; le pétale supérieur croisé en voûte; un sixième pétale, pendant, inférieur, muni à sa base d'un éperon; le style nû; les loges de l'anthère sur les bords de l'aile du style.

Ses racines sont fasciculées; ses tiges garnies de feuilles ovales, amplexicaules; les fleurs disposées en un long épi; les pétales verdâtres en dehors; l'inférieur à cinq lobes; les deux latéraux blancs & plus courts; les trois intermédiaires linéaires, flexueux, de couleur verte; l'éperon plus court que l'ovaire; le style élargi à ses deux côtés en une aile blanche deltoïde, sur le bord supérieur de laquelle est placée la loge élastique & pédicellée de l'anthère. Willdenow ajoute à cette description, qu'il conviendrait peut être de rapporter au même genre l'*orchis secundæ* de Thunberg & les autres espèces du Cap de Bonne-Espérance.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

BONDA-CALO : nom brama du *katagauri*, *Hort. malab.* 2. pag. 71, tab. 38. C'est l'*hispifolius aselmofchus* Linn. (Voyez *KETMIE*.)

BONDA-GARÇON : nom caraïbe de la liane à bouillons, selon Nicholson.

BONDUC *Guilandina*. (Voyez *ILLUSTR. GENER.* tab. 356, *guilandina bonduc*, n°. 1.)

BONGA. Ce mot, souvent changé en *pouga*, veut dire, dans les langues malaise & madécasse, fleur. Dans la seconde langue, il est plus souvent prononcé *young*. Sous ces différents noms il entre dans la composition de plusieurs noms de plantes

de ces pays, de celles surtout de la famille des orchidées. (Pai.-Th.)

BONGA-MANOR : nom malais du sambac ou mogori (*mogorium sambac*).

BONGA-PENJATON : nom donné, dans l'île de Java, à l'*ovieda mitis* des botanistes, qui est la même plante que le *syphonanthus indica*.

BONGA-TANJONG-LAUT : nom malais du *mimosa elengi*.

BON-HENRI : nom vulgaire d'une espèce d'anémone (*anemone bonus henricus* Linn.).

BON-HOMME : nom vulgaire de la molène ou bouillon blanc (*verbasicum thapsus*).

BONIANA : nom caraïbe de l'ananas, selon Nicholson.

BONIFACIA. (Voyez *BISLINGUA*, Suppl.)

BONKOM ou **BOCKÈME**. On nomme ainsi, dans l'Arabie, une espèce de morelle à tige ligneuse, dont les feuilles sont très-épineuses. C'est le *solanum armatum* de Forskall.

BONNE-DAME. C'est l'*atriplex hortensis*. (Voy. *ARROCHE*.)

BONNET DE PRÊTRE : nom vulgaire donné au fusain (*evonymus*), probablement à cause de la forme carrée de son fruit. Le même mot a fait donner ce nom à quelques courges.

BONNETIA. Vahl & Swartz. C'est le même genre qu'Aublet avait nommé *mahure*. (Voyez *MAHURI*, Suppl.)

BONNET CARRÉ : nom que porte dans les Indes, au rapport de Sonnerat, le *butanic*.

BONPLANDE à fleurs axillaires. *Bonplandia gemmiflora*. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 21. tab. 532.

Bonplandia caule herbaceo; foliis alternis, lanceolatis, serratis; floribus axillaribus, geminis. Cavan. Ann. Hist. Nat. 2. pag. 132.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des pulmonaires, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, pétiolées; les fleurs axillaires, souvent geminées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents; une corolle tubulée, divisée par le haut en cinq découpures alongées; deux supérieures, droites & rapprochées; trois infé-

rieures, raboissées & écartées; cinq étamines, insérées au tube de la corolle; un ovaire libre; un style simple; trois stigmates; une capsule triangulaire, à trois loges monospermes, à trois valves; chaque valve portant, sur son milieu, une cloison appliquée contre un réceptacle central.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes d'un pied & plus, velues, cylindriques; les rameaux alternes, garnis de feuilles glabres, alternes, lancoles, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, dentées en scie; les fleurs pédonculées, axillaires, geminées; le calice velvé, à cinq dents courtes; la corolle longue d'environ un pouce, violette, un peu rougeâtre; les découpures presque linéaires, rétrécies à leur base; les filaments rougeâtres; les anthères petites & jaunes; la capsule glabre, de la grosseur d'un grain de poivre, placée au fond du calice.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O (P. v.)

BONTI, un des noms indiens de la racine de quina, suivant Celsus.

BONTIA. (Voyez DAPHNOT.)

BOUTOU: arbre de l'Inde, dont la racine teint en jaune, au rapport de M. Roehon; il croît sur le bord de l'eau. Ses feuilles sont épaisses & opposées. On présume que c'est une espèce d'ambura.

BONVARO: nom brame de l'arbre que les Malabares nomment *cumbula*. (Voyez et mot.)

BOOM-UPAS. (Voyez UPAS, Suppl.)

BOOPIS. *Boopis*. Genre de plantes dicotylédones, établi par M. de Jussieu, à fleurs composées, toutes fasciculées, très-voisin de la famille des cinarocéphales, qui a beaucoup d'affinité avec les *echinops*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, pinnatifides, à fleurs solitaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice monophylle, à huit ou neuf divisions, contenant des filements nombreux, à cinq découpures; cinq diamines styligènes; un stigmate élargi; l'ovaire couronné par quatre ou cinq écailles persistantes sur chaque semence; le réceptacle garni d'écailles aiguës, plus longues que les semences qu'elles entourent.

Observations. Les affinités de cette plante, dit M. de Jussieu, sont faciles à saisir. Elle doit se rapprocher des flustes cinarocéphales, & surtout de l'*echinops*, qui a de même des calices partiels, uniflores, portés sur un réceptacle commun, séparés

l'un de l'autre par des paillettes, & réunis en une tête entourée d'un calice commun. Son rapport est plus marqué avec le *calycera* de Cavanilles, qui, presque semblable à l'*echinops*, en diffère par des calices partiels, simples & très-écailleux; par leurs divisions subsistantes sur la graine. Ces divisions, conformées en longues épines dans le *calycera*, ne sont que de simples écailles, courtes dans cette nouvelle plante. Celle-ci a le calice commun monophylle; il est de plusieurs pièces dans celle de Cavanilles. La forme des calices partiels rend donc ce genre facile à distinguer. La plante décrite dans la Flore du Pérou sous le nom de *scabiosa sympaganthera* appartient évidemment à ce genre. Son nom de *boopis* est composé de deux mots grecs, *boos* (bœuf), *oph* (œil), ses têtes de fleurs représentant assez bien la forme d'un œil de bœuf.

ESPÈCES.

1. **BOOPIS à fleurs de camomille**. *Boopis anthemoides*. Juss.

Boopis caule vix oligopollicari, foliis linearis-pinnatis. Juss. Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. vol. 2. pag. 56. fig. 2.

Il pousse, d'une même racine, plusieurs tiges herbacées, rameuses, peu élevées, garnies de feuilles pétioles, alternes, pinnatifides, à divisions fines, linéaires, assez semblables à celles de la camomille. Les fleurs sont solitaires, terminales; elles présentent, par leur ensemble, un grand nombre de filements nombreux, disposés en une sorte de cotynthe hémisphérique. Leur calice est d'une seule pièce, divisé en huit ou neuf découpures aiguës; il renferme un grand nombre de filements allongés, filiformes, évasés par le haut, divisés en cinq lobes, contenant cinq anthères réunies en une gaine, traversées par un style terminé par un stigmate élargi. Les ovaires sont couronnés par quatre ou cinq écailles qui paraissent être les divisions d'un calice propre. Chaque ovaire se convertit en une semence surmontée par les écailles persistantes. Le réceptacle est couvert d'écailles aiguës, qui environnent les semences & les débordent.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Buenos-Ayres. (Juss.)

2. **BOOPIS à feuilles de balfamine**. *Boopis balsamifolia*. Juss.

Boopis caule bipedali, foliis spatulato-fusatis. Juss. l. c. pag. 350.

Scabiosa sympaganthera Ruiz & Pav. Flor. per. vol. 1. pag. 49. tab. 76. fig. A.

C'est une plante herbacée, que ses feuilles alternes, ses anthères réunies & les calices partiels simples éloignent du genre des scabieuses, & la

rapprochent de celui dont il est ici question. Ses racines sont fibreuses ; elles produisent plusieurs tiges droites, hautes de deux pieds, cylindriques, striées, légèrement piluleuses, divisées en rampeaux effilés, garnies de feuilles alternes ; les inférieures presque fasciculées, spatulées, cunéiformes ; les supérieures alternes, distantes, lancéolées, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure, lacinées à leur contour, velues & ciliées à leurs bords.

Ses fleurs sont réunies en têtes épaisses, convexes, à l'extrémité de longs pédoncules qui reviennent les rameaux. Leur calice commun est d'une seule pièce, à plusieurs découpures lancéolées, entières ou lacinées, inégales, étalées. Chaque fleur a un calice propre, membraneux, à cinq lobes arrondis. La corolle est composée de fleurs grêles, verdâtres, tubulées ; leur limbe blanc, divisé en cinq découpures droites, égales ; les anthères au nombre de cinq, réunies en cylindre. L'ovaire persiste dans le calice, surmonté d'un style que termine un stigmate oblong. Les semences sont oblongues, couronnées par les lobes du calice. Le réceptacle est garni de paillottes roides, tubulées, piquantes.

Cette plante croît au Chili, dans les terrains sablonneux.

BOR, BORI : noms indiens d'un jujubier de l'Inde (*ziziphus jujuba*).

BORRAGO. (Voyez BOURRACHE.)

BORASSUS. (Voyez RONDIER.)

BORBONE. *Borbonia*. (Voyez III. Gen. tab. 619, fig. 1, *borbonia cordifolia*, n°. 5, & fig. 2, *borbonia barbata*, n°. 4.) Thunberg cite du Cap de Bonne-Espérance plusieurs autres espèces de *borbonia* & de *liparia*, mais sans description. Nous nous bornerons à les mentionner d'après lui.

* *Borbonia* (*perfoliata*). *foliis amplexicaulibus, integerrimis, reticulatis*. Thunb. Prodr. 122.

* *Borbonia* (*undulata*), *foliis amplexicaulibus, undulatis ; mucrone reflexo*. Thunb. l. c.

* *Borbonia* (*liparia capitata*), *foliis capitatis, capitulo crebro ; foliis lanceolatis, glabris, levibus*. Thunb. Prodr. 124.

* *Borbonia* (*liparia tomentosa*), *foliis capitatis ; foliis lanceolatis, tomentosis*. Thunb. l. c.

* *Borbonia* (*liparia vestita*), *foliis capitatis ; foliis ovatis, concavis, subius lanatis*. Thunb. l. c.

* *Borbonia* (*liparia myrtifolia*), *foliis terminalibus ; foliis oblongis, glabris*. Thunb. Prodr. 123.

* *Borbonia* (*liparia umbellifera*), *foliis subumbellatis ; foliis lanceolatis, villosis, ramis umbellatis*. Thunb. Prodr. 124.

* *Borbonia* (*liparia tores*), *foliis racemosis, hirsutis ; foliis obovato-oblongis, caule ceteri glabris*. Thunb. Prodr. 124.

* *Borbonia* (*liparia hirsuta*), *foliis racemosis ; foliis obovato-oblongis, hirsutis ; caule hirsuto*. Thunb. Prodr. 124.

* *Borbonia* (*liparia testis*), *foliis exiliteribus, pedunculatis ; foliis ovatis, concavis, patulis, tomentosis*. Thunb. Prodr. 124.

BORBONIA. (Voyez BORBONE.) On donne encore ce nom à une espèce de laurier d'Amérique. (Voyez LAURIER, n°. 12.)

BORITI : nom brachmane du *toddalia*, arbrisseau épineux de la côte de Malabar. (Voyez TODDALI.)

BORKHANSENIA. Roth. (Voyez TEEDIA, Suppl.)

BORONIA. (Voyez VÉRONI.)

BORTUM ou BORTOME : petit arbrisseau d'Arabie, que For khall nomme *acolypha fruticosa*, & qui est l'*acalypha fruticosa* Vahl, Symb. 1, pag. 77. L'eau dans laquelle on a fait macérer ses feuilles est employée, suivant For khall, pour laver les enfans qui ont des pustules.

BORYA. Labill. (Voyez VINCÉTOLE.) Willdenow a mentionné sous la même dénomination un autre genre, l'*Oedelia* de Michaux, qui sera décrits à l'article FORESTIERA, Suppl. (Voyez ADÈLE, Suppl.)

BOSAYA : nom brame d'une espèce de fougère de la côte du Malabar, figurée dans l'*Hort. malab.* 12, tab. 15, dont le feuillage, deux fois aisé, se couvre en dessous de poussières disposées en lignes obliques, qui sont les vraies graines de la plante, puisque, jetées sur la terre ou sur l'écorce des arbres, elles y germent & produisent de nouveaux pieds de la même plante. Il parait qu'elle doit être rapprochée du genre de la *doradille*. (Juss.)

BOSCIA du Sénégal. *Boscia senegalensis*. Lam.

Boscia foliis alternis, ellipticis, integris ; foliis terminalibus, corymbosis. (N.) Lam. Illustr. Gen. tab. 395.

Podoria senegalensis. Persoon, Synopf. Plant. 2. pag. 5.

Arbuste d'après lequel M. de Lamarck a établi un genre particulier de la famille des capriers, qui

a des rapports avec les *crataeva*, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à quatre folioles ; point de corolle ; douze étamines ; un style très-court ; persistant ; une baie pédonculée, comestible, monosperme.

Ses riges se divisent en rameaux cylindriques, légèrement pubescens, garnis de feuilles alternes, pétiolées, coriaces, ovales-oblongues, elliptiques, très-entières, longs d'environ deux pouces, obtus à leurs deux extrémités, quelquefois un peu échancrés & mucronés à leur sommet, traversés par quelques nervures fines, alternes, latérales, presque simples ; les pétioles très-courts. Les fleurs sont petites, disposées en un cyme terminal, médiocrement étalé, à ramifications alternes ; les pédicelles pubescens, inégaux, uniflores. Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles ovales, concaves, obtuses, légèrement pubescentes.

2°. Une corolle nulle ou peut-être très-caducue.

3°. Douze étamines libres ; les filamens filiformes, terminés par des anathères en cœur, échancrées à leur base.

4°. Un ovaire libre, ovale, tomenteux, longuement pédonculé, de la longueur des étamines, surmonté d'un style très-court, & d'un stigmate simple, persistant.

Le fruit consiste en une coque ou une petite baie globuleuse, pédonculée, pubescente, à une seule loge, ne renfermant qu'une seule semence arrondie.

Cette plante croît au Sénégal. *Th* (*V. f. in herb. Lam.*)

Observations. Ce genre a été dédié à M. Bosc, membre de l'Institut national, naturaliste très-distingué par ses longs travaux, ses découvertes & ses voyages. (*Voy. Bosc.* à l'article VOYAGES.) Cette plante, observée sur le sec, ne m'a point offert de corolle. Ses fruits m'ont paru être plutôt une baie qu'une capsule. L'on conçoit que ce genre exige d'être mieux observé sur les individus vivans, surtout à cause de la petitesse de ses fleurs.

Thunberg, dans son *Prodrome des plantes du Cap de Bonne-Espérance*, a présenté un autre genre sous le nom de *bosica*, sur lequel il ne nous donne que très-peu de détails, & qu'il a supprimé depuis. C'est un arbrisseau (*bosica undulata*) dont les fleurs ont un calice à quatre dents ; quatre pétales ; quatre étamines ; trois styles ; une capsule à quatre loges. Les feuilles sont opposées, lancéolées, ondulées. Trois styles & quatre loges dans le fruit est un fait jusqu' alors inconnu, & l'on a soupçonné une erreur dans la description de Thunberg.

Botanique, Supplément, Tome I.

BOSEA. (*Voyez Bosé*, & III. Gen. tab. 182.) Lourteiro, dans la *Flore de la Cochinchine*, ajoute à ce genre une nouvelle espèce, sous le nom de *bosca canabina*. C'est un arbrisseau plus élevé, à petites feuilles lancéolées, à fleurs blanches, disposées en grappes courtes, placées deux ensemble dans l'aisselle des feuilles. On réduit l'écorce de cet arbrisseau en fils, dont la renécure est très-considérable, & on en fait des nattes.

BOSIA : nom que porroit d'abord le *bosca*.

BOSSAC : nom que les habitans de Madagascar donnent à une espèce de lobellie rampante, au rapport de M. du Petit-Thouars ; elle a des tiges triangulaires, & croît communément sur les pelouses. Les oies domestiques, qu'on nomme *guiches* dans la langue du pays, la recherchent avec avidité.

BOSIEE hétérophylle. *Bossia heterophylla*. Vent.

Bossia foliis inferioribus ellipticis, superioribus lanceolatis ; floribus axillaribus, solitariis. (*N.*) Vent. Hort. Cels. pag. & tab. 7.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, irrégulières, de la famille des légumineuses, établi par Ventenar sur un arbrisseau originaire de la Nouvelle-Hollande, qui a des rapports avec les *crataeva* & les *platylobium* ; il diffère des premiers par ses gouffes comprimées ; des seconds, par son calice, par les deux callosités de l'étendard, par ses gouffes point ailées sur le dos, par les feuilles alternes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubuleux, à deux lèvres ; la supérieure en cœur, tronquée à ses côtés ; l'inférieure à trois dents ; deux glandes à la base de l'étendard ; les ailes composées de deux pétales auriculés ; une gousse pédicellée, oblongue, comprimée ; plusieurs semences.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'environ deux pieds ; les rameaux alternes, rapprochés, anguleux sur leurs bords, glabres, striés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, glabres ; les inférieures elliptiques, obtus à leurs deux extrémités, parsemées de quelques taches blanchâtres ; les supérieures oblongues, plus étroites, aiguës, plus longues, d'un vert-foncé ; les pétioles courts, munis, à leur base, de stipules courtes, ovales, aiguës. Les fleurs sont solitaires, naissantes, pédonculées, un peu penchées après leur développement, accompagnées de bractées d'un jaune-doré & d'un pourpre foncé. Leur calice est glabre en dehors, pubescent intérieurement ; la corolle papilionacée, les pétales unguiculés ; l'étendard arrondi, réfléchi, échancré au sommet ; deux glandes à sa base ; les ailes oblongues, obtuses, beaucoup plus courtes que l'étendard, qu-

R r r

nies, à un des côtés de leur base, d'un appendice obtus; la carène obtuse, d'un pourpre-foncé; à deux pétales plus longs que les ailes, gibbeux au dessus de leur appendice; les étamines monadelphes; les anthères linéaires, vacillantes; l'ovaire glabre, auquel succède une gouffe à une loge, à deux valves, contenant plusieurs semences réniformes.

Cette plante croît à Botany-Bay; elle porte le nom de *Boissia* Lamartinière, l'un des savans qui accompagnèrent Lapeyrouse dans son voyage autour du Monde. *h*

BOSSIA. (*Voyez* BOSSIE.)

BOTOR. Adans. (*Voyez* DOLIC, n°. 11, & Suppl.)

BOTRIA. (*Voyez* BOTRIE.)

BOTRIE d'Afrique. *Botria africana*. Lour.

Botria foliis lobatis, racemis lateralibus. Lour. Flor. cochin. t. pag. 190.

Genre établi par Loureiro, à fleurs complètes, poly pétalées, régulières, qui se rapproche beaucoup du *cissampelos*, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice campanulé, à cinq dents courtes; une corolle à cinq pétales recourbés; une baie non adhérente, monosperme.

Ce genre ne renferme jusqu' alors qu'une seule espèce. C'est un arbrisseau de médiocre grandeur, rumeux, grimpant, pourvu d'une racine longue, cylindrique, jaunâtre. Les feuilles sont épaisses, longuement pétiolées, en cœur, à trois ou cinq lobes obtus, crénelés, tomenteux. Les fleurs sont petites, rougeâtres, disposées en grappes latérales, courtes, presque simples, soutenues par un long pédoncule, terminé par une vrille bifiée. Le fruit est une baie noire, aqueuse, douce, bonne à manger.

Cette plante croît sur la côte de Zanguebar en Afrique. *h* (*Descript. ex* Lour.)

Observations. Les Portugais donnent à cette plante le nom de *pareira brava*, nom que Linné a employé pour une autre plante du Brésil, le *cissampelos pareira*, mais dont celle-ci diffère par le caractère de ses fleurs, d'après Loureiro. Il lui a donné le nom de *botria*, qui en grec signifie grappe, à cause de la disposition de ses fleurs.

BOTRYCHIUM. Genre de plantes cryptogames, de la famille des fougères, établi par Swartz, le même que le *botrypus* de Richard, qui n'est guère qu'un démembrement des *osmunds* Linn., & qui en diffère par des capsules fissiles, bivalves,

disposées sur deux rangs, le long des ramifications d'un des rameaux, roulé en crosse à sa naissance. Ce dernier caractère le distingue des ophioglosses.

Il faut rapporter à ce genre les espèces d'osmonde suivantes; savoir : *osmunda lunaria*. Linn. — *virginiana*. Linn. — *cicuriaria*. Lam. — *biterinata*. Lam., la même que le *botrypus lunarioides*. Michx. — *ternata*. Thunb. — *erylanica*. Linn. &c. (*Voyez* OSMONDE.)

BOTRYPUS. Mich. (*Voyez* BOTRYCHIUM, Suppl.)

BOTRYS. Deux plantes très-différentes ont porté ce nom, qui leur a été conservé pour leur désignation spécifique. L'une appartient aux anémone; c'est le *chenopodium botrys* Linn.; l'autre est une germandrée (*teucrium botrys* Linn.).

BOTRYTIS. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, établi par Persoon sur plusieurs espèces de moisissures de Bulliard (*murcor* Linn.), & qui sont caractérisées par

Des capsules nues, réunies en stries ou en grappes, non agglutinées les unes au sommet des autres, fissiles à l'extrémité de pédoncules filiformes, redressés, rameux, souvent dichotomes.

Ces plantes ont une existence très-courte : elles se trouvent, sous forme de moisissure, sur toutes les substances en putréfaction, principalement sur les bois à demi pourris, sur les fruits gâtés, &c.; elles ont été décrites à l'article MOISSISURES. Ceux qui, livrés plus particulièrement à l'étude des plantes cryptogames, croiront devoir admettre comme génériques les caractères ci-dessus exposés, réunissent dans ce genre les moisissures mentionnées aux n°. 3, 4, 6, 7, 8, 9.

BOU : nom languedocien d'un figuier (*ficus communis, caprificus*).

BOUCAGE. *Pimpinella*.

On regrette la savante érudition employée presque en pure perte par les vieux botanistes pour déterminer quelles espèces de boucage ont été mentionnées par les Anciens, sous les noms de *tragos* & de *pimpinella*, si toutefois elles appartiennent à ce genre. Je crois inutile de la chercher dans Théophraste. Dioscoride donne le nom de *tragos* à deux plantes différentes : à la première (indigène dans l'île de Crète), parce que son suc lacteux est employé pour guérir les chèvres blessées par des fleches; à la seconde, parce que de ses feuilles émane, en automne, une odeur fétide, approchant de celle du bouc. Celle-ci seule se rapproche un peu de notre boucage, & paroît avoir quelques rapports avec le *pimpinella tragum* de Villars ou avec le *pimpinella saxifraga* Linn.

D'autres l'ont appelé *pimpinella bipinnella* (à deux ailes), parce que ses folioles sont disposées sur deux rangs, caractère qui convient à quelques centaines d'autres plantes. On l'a encore nommé *tragoctinum* (peril de bouc), nom conservé par Tournefort. Enfin, elle a été appelée *saxifraga*, soit parce qu'elle croît dans les lieux pierreux ou parce qu'on la croyoit propre à dissoudre la pierre dans la vessie; peut-être même cette dernière idée s'en est-elle produite par la première, tant on a travaillé sur les propriétés des plantes. Une découverte qui auroit plus d'intérêt, est celle de l'existence d'une sorte de kermès sur les racines, qui fournit une belle liqueur rouge. On a prétendu qu'il se trouvoit sur le *pimpinella magna* Linn.; je ne l'y ai jamais rencontré. Enfin, le nom de *pimpinella* (*puerium* Linn.) est encore celui de notre pimprenelle commune, employée comme assaisonnement dans les salades. On fait qu'elle appartient à un genre très-différent.

Quant à l'anis (*pimpinella anisum* Linn.), Plin. & Dioscoride en ont parlé d'une manière à ne laisser aucun doute sur l'identité de leur plante avec la nôtre, quoiqu'ils ne l'aient mentionnée que d'après ses propriétés & son lieu natal, l'île de Crète & l'Égypte. D'ailleurs, son nom s'est conservé, & nous est parvenu intact; avantage précieux, & qui nous prouve combien le changement de noms a jeté de confusion dans la science.

Les espèces renfermées dans ce genre sont la plupart difficiles à bien déterminer, d'autant plus que les feuilles sont très-variables, & ne peuvent, dans les espèces rapprochées, servir de caractère spécifique. Il suit de là que plusieurs auteurs ont réuni, comme variétés, des plantes que d'autres ont distinguées un peu trop légèrement comme espèces. On s'en convaincra par les observations suivantes.

1. BOUAGE à feuilles de pimprenelle, n°. 1. *Pimpinella saxifraga* Linn. — Lam. Illustr. Gener. tab. 203. fig. 1. — Engl. Bot. tab. 407. — Flor. dan. tab. 669.

2. *Pimpinella* (nigra), caule striato, pubescente; foliis pinnatis, pubescentibus; radicalibus foliolis subcordatis, incis, ovatis, denticatis; caulinis bipinnatis, linearibus. Willden. Spec. Plant. t. pag. 1471. — Roth, Germ. 1. pag. 129, & vol. 2. pag. 342.

Saxifraga hircina, minor, foliis sanguisorbis. J. Bauh. Hist. 3. pag. 111. Icon. 2.

La variété 2 diffère de la première par ses feuilles d'un vert plus foncé, un peu pubescentes, ainsi que les tiges. Quant à la forme des folioles, elle n'offre qu'un très-foible caractère. Cette légère variété se retrouve dans quelques individus de la première, dont les tiges & les feuilles sont

glabres. On ajoute que ses racines répandent, lorsqu'on les coupe, un suc laiteux, bléâtre. Je n'ai point vérifié cette observation.

2. BOUAGE à fruits velus, n°. 2. *Pimpinella tragium* Vill.

3. *Pimpinella* (hirsuta), caule foliisque pinnatis, subpubescentibus; foliolis inferioribus subrotundis, incis, denticatis; superioribus linearibus; umbellâ 15-20 fidâ; fructibus hirsutis. Loisel. Journ. bot. 2. pag. 271. — Vill. Dauph. 2. pag. 666. — Column. Phyt. tab. 17.

4. *Pimpinella* (canescens), caule foliisque pinnatis, pubescentibus; foliolis cuneiformibus, lobatis, apice denticatis; umbellâ 4-7 fidâ; fructibus hirsutis, canescentibus. Loisel. Journ. bot. 2. pag. 271. tab. 10. (Exclusis synonymis.)

Pimpinella petraea? Marsh. Flor. taur.

Cette espèce est remarquable & facile à distinguer par ses semences, petites, blanchâtres & velues, ovales, un peu comprimées, à trois fides peu saillantes. Les tiges sont striées, grêles, hautes de huit à neuf poices, légèrement pubescentes, un peu glauques, ainsi que les feuilles, plus ou moins rameuses; les feuilles simplement ailées; les folioles irrégulières, cuneiformes à leur base, arrondies, denticées ou incisées à leur sommet, quelquefois à un ou deux lobes; les folioles des feuilles supérieures étroites, lineaires, aiguës; les terminales trifides à leur sommet. La base des rameaux supérieurs est accompagnée d'une gaine étroite, lancéolée, à bordure blanchâtre; quelques-uns trifides à leur sommet. Les fleurs sont blanches.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France. (V. f.)

La plante 3 offre les mêmes caractères dans ses semences, mais elle diffère par son port; elle est plus petite dans toutes ses parties; les rayons des ombelles bien moins nombreux. Ses folioles sont plus étroites, cuneiformes, ordinairement à trois lobes profonds, incisées à leur sommet. Elle est, dit M. Desfontchamp, chargée de poils courts, plus ou moins serrés, qui, lorsqu'ils sont abondants, lui donnent le même aspect que si elle étoit couverte d'une poussière glauque & même blanchâtre. J'ai observé des passages entre ces deux variétés, qui ne permettent pas de les séparer comme espèces.

Cette plante a été recueillie à Saint-Remy & au pied du mont Ventoux par M. de Suffren.

La plante que Marshal a nommée *pimpinella petraea* me paroît être la même que la variété 3. Ses feuilles radicales se rapprochent davantage de celles de la première espèce. Malgré la différence que ces plantes offrent dans leur port lorsqu'on

R r r r 2

les examine avec attention, il est difficile de ne pas y reconnaître un ensemble de caractères qui les réunit; elles sont maigres, petites, moins développées dans les terrains arides & calcaires, plus vigoureuses dans les terres fortes. Celle de Marshal croît sur le Caucase, dans les terres calcaires. (V. f. in herb. Desfont.)

10. BOUCAGE à fruits tomenteux. *Pimpinella villosa*. Schousb.

Pimpinella foliis radicalibus bipinnatis; foliolis erenatis, basi cuneatis; petalis seminibusque villosis. Schousb. Maroc. pag. 125.

Ses racines sont blanchâtres & tubéreuses; les tiges droites, fortes, dures, hautes d'environ deux pieds, glauques, striées, souvent noueuses, un peu pubescentes, anguleuses, très-rameuses; les rameaux roides, diffus; les feuilles radicales amples, à peine pubescentes, deux fois plées; les folioles irrégulières, ovales, cuneiformes, quelquefois lobées, arrondies & crénelées à leur sommet, à nervures fines, réticulées; les pétioles un peu pubescents, striés à la base des rameaux accompagnée d'une gaine courte, un peu charnue, ovale, oblongue, obtuse, quelquefois trifide à son sommet, à bordure blanche; les ombellules nombreuses; les fleurs blanches; les pétales un peu épais, cotonneux; les fruits ovales, assez gros, tomenteux, surmontés de deux styles persistans & prolongés.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

11. BOUCAGE à feuilles de bubon. *Pimpinella bubonoides*. Brot.

Pimpinella foliis radicalibus bi-tripinnatis; caulibus mediis alternis, compositis; petiolo latissimo, duplo brevioribus; umbellis numerosissimis, seminibus villosis. Brot. Phytogr. Fasc. 1.

Cette espèce, qui ne m'est connue que d'après la description qu'en donne Brotier, me paroît avoir de très-grands rapports avec la précédente. Ses tiges sont droites, cannelées, striées, très-rameuses; les feuilles radicales fort amples, deux & trois fois ailées; les folioles assez grandes, cuneiformes. Les feuilles caulinaires moyennes sont pourvues d'un pétiole en forme de gaine très-large, terminée par une feuille composée, deux fois plus courte; les ombelles très-nombreuses, dépourvues de collerette; les fleurs blanches; les fruits velus.

Cette plante croît dans le Portugal, sur les montagnes calcaires. x?

12. BOUCAGE anis, n°. 6. *Pimpinella anisum*.

Linn. — *Anisum vulgare*. Gærtn. de Fruët. & Sem. 1. pag. 102. tab. 23. fig. 1.

Ses fruits sont pubescens, principalement dans leur jeunesse.

13. BOUCAGE de Crète. *Pimpinella cretica*.

Pimpinella pumila, foliis radicalibus rotundatis, subtrilobis, dentatis superioribus minimis, trifidis; laciniis subuliformibus; fructibus glabris. (N.)

Apium creticum, minimum, anisi facie. Tournef. Coroll. 21.

Cette plante paroît être, en miniature, la même que la précédente; elle en diffère par ses semences glabres. Ses racines sont simples, très-grêles; les tiges menues, filiformes, hautes de quatre à cinq pouces, simples, à peine rameuses à leur sommet; les feuilles radicales glabres, fort petites, longuement pétiolées, arrondies, simples, entières ou à trois lobes, dentées à leur contour; les caulinaires situées à la base des ramifications, à longues gaines étroites, terminées par une petite feuille à plusieurs découpures courtes, filiformes; les ramifications presque capillaires, étalées, nues, terminées par une ombelle universelle, étalée, à rayons capillaires, dépourvue d'involucre; les ombellules fort petites; les fleurs blanches; les fruits glabres, ovales, plus courts que les deux styles qui les couronnent.

Cette plante croît dans l'île de Crète. (V. f. in herb. Desfont.)

14. BOUCAGE à tiges nombreuses. *Pimpinella multicaulis*.

Pimpinella caule ramossimo, foliis supra decompositis, foliolis filiformibus; umbellis numerosissimis, paniculatis. (N.)

Ses tiges sont glabres, anguleuses, elles se divisent, presque dès leur base, en rameaux courts, nombreux, diffus. Les feuilles sont plusieurs fois composées, glabres, assez semblables à celles du fenouil; les folioles filiformes, étalées; les ramifications étalées; les deux inférieures sortant de deux gaines de feuilles presque opposées; les autres alternes & insensiblement plus courtes. Toutes ces ramifications sont munies, tant à leur sommet que dans leur longueur, d'ombelles nombreuses, très-rapprochées, formant, par leur ensemble, une panicule touffue. Les fleurs sont blanches, fort petites; les fruits glabres.

Cette plante croît dans la Sibérie. (V. f. in herb. Desfont.)

15. BOUCAGE laciniée. *Pimpinella diffusa*. Reiz.

Pimpinella foliis omnibus pinnatis, pinnis multi-

paritit; *segmentis subfalcatis, acutis*. Retz. Obf. 3. pag. 30. tab. 2. — Roth, Germ. 1. pag. 130, & 2. pag. 344. — Lam. Ill. Gen. tab. 203. fig. 2.

Pimpinella pratensis. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 154.

Pimpinella genevensis? Vill. Dauph. 2. pag. 604.

Pimpinella hircina? Roth, Germ. 2. pag. 130, & 2. pag. 344.

Pimpinella saxifraga, major, degener. Motif. Umbell. tab. 5.

Tragopogon foliis duplicato-pinnatis, pinnulis profundissimè lobatis. Hallet, Helv. n°. 787.

3. *Pimpinella laciniata*. Thor. Chlot. Land. 108. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 282.

Cette espèce de des rapports avec le *pimpinella magna*, n°. 3. Ses tiges sont rameuses, filices, hautes de deux ou trois pieds; toutes les feuilles ailées, les inférieures composées de folioles découpées en lobes profonds, aigus, divergens, presque ailés, un peu courbés en faucille; les lobes des feuilles supérieures linéaires-lancolés, très-aigus. Leur variété paroît avoir donné lieu à l'établissement de quelques autres espèces, telles que le *pimpinella hircina* de Roth, le *pimpinella genevensis* de Villars, &c. Les fleurs sont blanches, petites; les semences glabres, ovales. On remarque quelquefois une petite foliole sétacée à la base de l'ombelle universelle.

Cette plante croît dans les lieux arides & sablonneux. On la trouve aux environs de Paris. (V. v.)

16. BOUÇAGE à fleurs jaunes. *Pimpinella lutea*. Desfont.

Pimpinella foliis pinnatis, pubescentibus; foliolis cordatis, dentatis, anticè excisis; pedunculis piliformibus, paniculatis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 265. tab. 76.

Tragopogon africanum, altissimum. Tournef. Inst. R. Herb. 309.

Pimpinella saxifraga, maxima, africana. Magn. Bot. Append.

Elle a le port & presque les feuilles du *pimpinella magna*; mais elle répand une odeur aromatique très-agréable. Ses feuilles radicales sont ailées, pubescentes, pectinées; les folioles en cœur, souvent inégales à un des côtés de leur base, presque incisées, à dentelures irrégulières, obtuses; la foliole terminale souvent à trois lobes. Ses tiges sont lisses, glabres, hautes de trois à quatre pieds, rameuses, feuillées seulement vers leur base; les rameaux dichotomes, sous-divisés en ramifications filiformes, paniculées; la base des rameaux munie de gaines entières, membraneuses, caduques; les

pédoncules inclinés; les ombelles petites, à trois ou cinq rayons capillaires; point d'involucure; la corolle petite & jaune; les semences très-glabres, à peine striées.

J'ai trouvé cette plante au mont Atlas, où elle a été également observée par M. Desfontaines. (V. v.)

* *Pimpinella (leptophylla), foliis multifido-fectis; caule elongato, subachotomo; umbellâ trifidâ*. Persl. Synopl. Plant. 1. pag. 324.

Cette plante croît à Saint-Domingue. Ses tiges sont grêles, alongées, presque dichotomes; ses feuilles très-ménues, à plusieurs découpures sétacées; les ombelles triindes.

* *Pimpinella (capensis), foliis suprà decompositis, laciniis acutis, caule striato*. Thunb. Prodrum. pag. 51. E. Cap. B. Sp.

Observations. Les *pimpinella* ne sont que médiocrement distingués des *feseli*, en ne considérant que les parties de la fructification. La différence la plus essentielle consiste en ce que les ombelles & les ombellules des *pimpinella* n'ont point d'involucure, tandis que les *feseli* en ont un à une ou plusieurs petites folioles à leurs ombellules. Le port des espèces de ces deux genres offre des différences plus tranchées. Dans le premier, les folioles sont plus ou moins grandes, ovales ou en cœur; les fleurs des ombellules planes, étalées, tandis que, dans le second, les feuilles sont à découpures très-étroites, filiformes, approchant de celles du fenouil; les ombellules globuleuses. Cependant comme il est convenu, d'une manière trop générale peut-être, que la considération des parties de la fructification doit avoir la préférence, on trouve parmi les *pimpinella* des espèces à feuilles menues, & auxquelles il ne manque qu'un involucure pour être placées parmi les *feseli*; elles deviennent alors des espèces intermédiaires entre ces deux genres pour ceux qui ne veulent point transgresser des principes de convention. D'autres feroient cette observation pour en faire des genres nouveaux.

Le *pimpinella glauca* Lam. laisse encore bien des doutes. Thuillier le rapporte à une variété à tige plus élevée du *pimpinella dioica*, qui croît à Fontainebleau. M. de Lamarck soupçonne que le *pimpinella orientalis* Gouan est la même plante que le *pimpinella glauca* Linn. Hoffmann a nommé la première *pimpinella media*. Quant au *pimpinella glauca*, les auteurs des *Plantes rares de la Hongrie* disent qu'elle ressemble au *pimpinella saxifraga*, mais que ses tiges sont deux & trois fois plus hautes & ses feuilles trois & quatre fois ailées; les rameaux plus nombreux, opposés, & que les fleurs se montrent plus tard.

BOVISTA. (Voyez VESSE-LOUP.)

BOUILLON. Ce nom, joint à un adjectif, est donné à plusieurs plantes. On nomme *bouillon blanc* la molène (*verbascum* Linn.); *bouillon blanc* ou *herbe aux micas* les espèces de molène, auparavant séparées dans un genre distinct, sous le nom de *blattaria* (Linn.); *bouillon sauvage*, une espèce de phlomis (*phlomis frutescens* Linn.), qui a le feuillage de la molène.

BOUIS: surnom que portent dans les Antilles, suivant Jacquin, deux espèces de cimitier (*chrysophyllum*). On appelle *gos bouis* le *chrysophyllum caruleum*, & *bouis* le *chrysophyllum argenteum*, que l'on surnomme aussi quelquefois *cocimite-maroon*.

BOUKA-KELY: nom malabare sous lequel Rheed a décrit & figuré (*Hort. malab.* vol. 12, pag. 45, tab. 33) une plante qui doit se rapporter à la famille des orchidées, & y former un genre nouveau, suivant M. du Petit-Thouars, dont plusieurs espèces ont été confondues par M. de Lamarck, sous le nom d'*angrec filicle*; elles sont remarquables par leurs feuilles solitaires ou binées, renflées en bulbe à la base. Quand elles se trouvent dans des positions qui leur conviennent, elles fleurissent tous les ans, & à des époques à peu près très-précises.

BOULATABOI: nom caraïbe d'une espèce d'eupatoire (*eupatorium pandatum*).

BOULE DE NEIGE: nom vulgaire de la variété de la viorne-obier (*viburnum opulus*), dont les fleurs blanches & toutes fécondes sont rassemblées en boule. (*Войлж* VIORNE.)

BOULEAU. *Betula*. Les bouleaux & les aunes forment d'abord deux genres distincts dans Tournefort, & même dans les premiers ouvrages de Linné; mais depuis, ce dernier & quelques autres avec lui les ont réunis. M. de Lamarck a été de cette opinion, ainsi que M. de Jussieu. Ceux qui sont d'un avis contraire se fondent sur ce que les aunes croissent dans les sols humides & marécageux, tandis que les bouleaux se plaisent de préférence dans les terrains secs & arides. Dans ces derniers, les chatons femelles sont cylindriques, solitaires sur des pédoncules simples; les femences munies de chaque côté d'une membrane en forme d'aile. Dans les aunes, les chatons femelles sont courts, ovales, portés sur un pédoncule rameux; leurs femences dépourvues de membranes. Ces deux genres, séparés ici par une simple division, ont été enrichis de plusieurs belles espèces que nous allons faire connoître.

Observations. On trouve dans les *Illustr. Gener.* tab. 760, trois espèces figurées avec les caractères de leur fructification; savoir: fig. 1, *Betula alba*, n°. 1; fig. 2, *Betula nigra*, n°. 2; fig. 3, *Betula glutinosa*, n°. 6.

Au milieu des arbres de nos forêts, dont l'écorce tembrunie offre à nos regards les rides de la vieillesse, le bouleau s'annonce au loin paré d'un épiderme lisse, satiné, d'une blancheur éclatante. Son tronc, bien nourri, ne le cède presque point en élévation à celui de nos grands arbres: il est droit, cylindrique, sans difformités & sans nœuds; il ne pousse de branches que vers son sommet; elles se divisent en rameaux souples, pendans, effilés: tel est l'aspect agréable sous lequel se présente notre bouleau commun; mais, né parmi nous, sans celle sous nos yeux, il ne les frappe que médiocrement. Outre ces agréments extérieurs, il a des attributs qui lui sont particuliers. Peu délicat sur le sol, le bouleau végète passablement dans les craies & dans les terrains arides & pierreux; il porte la fertilité & la vie dans ces contrées qui, par la nature de leur territoire, sembloient devoir être frappées d'une éternelle stérilité. Il est peu de végétaux moins susceptibles des impressions de l'air & de la rigueur du froid. On le retrouve dans les Alpes, au dessus de ces régions où aucun autre arbre ne peut plus exister. Il s'avance jusque vers les glaces du pôle arctique; il est le seul, le dernier que produise le Groenland; mais sur les montagnes glacées, son élévation est bien inférieure à celle à laquelle il parvient dans les climats plus tempérés: ce n'est plus qu'un arbrisseau bas, tortueux, rabougri, de quelques pieds de haut. A la vérité, il acquiert en dureté ce qu'il perd en hauteur, & son bois n'en est que plus propre à être employé à divers utensiles de ménage: il s'y forme des nœuds d'une substance rougeâtre, marbrée, très-recherchée des tourneurs, qui en fabriquent plusieurs petits meubles agréables. Son écorce presque incorruptible présente des faits bien étonnans. Souvent elle subsiste seule & conserve encore à l'arbre la figure, tandis que, depuis long-tems, le bois est mort & détruit de vétusté. Il est sorti des mines de Dworetzkoï en Sibérie, un morceau extrêmement curieux de bois de bouleau ferrugineux, que j'ai vu dans le cabinet de M. Faujas de Saint-Fond. Toute la substance ligneuse est entièrement convertie en un fer limoneux, jaunâtre, tandis que l'épiderme, d'un blanc-satiné & luisant, existe encore par plaques en plusieurs endroits, parfaitement bien conservé, & sans être coloré par le fer. Il seroit difficile de trouver une preuve plus évidente de la longue & surprenante conservation de cette pellicule si légère, si délicate en apparence, & que les Anciens ont employée si avantageusement pour l'écriture avant l'invention du papier. Il est à présumer qu'elle doit son incorruptibilité à la substance résineuse & aromatique dont elle est pénétrée.

D'après ce court exposé des principaux phénomènes que présente le bouleau, d'après l'emploi intéressant que l'on peut faire des différentes par-

ries de cet arbre, quelles idées peut inspirer & développer l'aspect d'un seul arbre ! Mais heureux l'homme pour qui les rameaux flexibles & pendans de cet arbre ne rappellent pas qu'ils ont été autrefois les instrumens de ces punitions stérifiantes, dont on ne souille que trop souvent, par de féroces préjugés, les premiers beaux jours de l'enfance ! Quand donc ne verrons-nous plus des mairies ou des parens assez ignorans & assez barbares pour croire former la jeunesse à la vertu & aux sciences par les mêmes moyens que l'on emploie à punir le crime ? La verge qui tombe sur les épaules du scélérat doit-elle servir également à punir les étousseries d'une jeunesse folâtre ? Le même préjugé existoit du tems de Pline & bien avant. Cet auteur, en parlant du bouleau (mentionné également dans Théophraste, qui le nomme en grec *samyda* ou plutôt *semide*), dit (liv. 16, chap. 18) : « Cet arbre des Gaules se fait admettre par la finesse & par la blancheur de son écorce ; il épouvante par les verges qu'il fournit aux magiciens. »

* LES BOULEAUX.

6 bis. BOULEAU pubescent. *Betula pubescens*. Willd.

Betula ramulis pubescentibus ; foliis ovatis, acutis, duplicato-ferratis, pubescentibus ; strobilis cylindricis, pedunculo brevioribus. Ait. Hort. Kew. 3, pag. 337. — Willd. Arb. 4, tab. 2, fig. 2.

Betula foliis deltoidibus, acutis, subcordatis, duplicato-ferratis, subtus ramulisque pubescentibus ; strobilorum squamis lobis lateralibus, rotundatis. Willd. Spec. Plant. 4, pag. 462.

Betula pumila, brocemburgensis. Thal. Hercyn. 10. — C. Bauhin, Pin. 427. — Dutoi, Herb. 1, pag. 92.

Betula alba, var. β . Linn. Spec. Plant. 2, pag. 1393.

Cet arbre, qui pourroit bien n'être qu'une simple variété du *Betula alba*, lui ressemble par son port, par la disposition de ses rameaux, par la blancheur de son épiderme ; il en diffère par ses rameaux velus, particulièrement dans leur jeunesse ; par ses feuilles pubescentes, même lorsqu'elles sont parvenues à leur entier développement, ovales, à peine aiguës à leur sommet, un peu échancrées en cœur à leur base, à double dentelure à leur contour. Les chatons sont cylindriques, pédonculés ; les lobes des écailles calicinales inégaux, arrondis.

Cet arbre croît dans les marais des montagnes du Jura, & dans quelques autres contrées du Nord. η (V. f.)

7 bis. BOULEAU élevé. *Betula excelsa*. Willd.

Betula foliis ovatis, acutis, ferratis ; strobilorum squamis lobis lateralibus, rotundatis ; petiolis pubescentibus, pedunculo brevioribus. Ait. Hort. Kew. 3, pag. 337. — Willd. Arb. 4, tab. 2, fig. 2.

Cet arbre a encore de bien grands rapports avec le *Betula alba* ; il paroît que c'est une des plus grandes espèces que l'on connoisse, & qu'il parvienne au moins à la hauteur de la première. Ses rameaux sont grêles, souples, étalés, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, aiguës, presque acuminées, d'un vert-tendre, plus pâles en dessous, arrondies ou presque tronquées à leur base, glabres à leurs deux faces, inégalement dentées en scie à leur contour ; les dentelures presque alternativement plus courtes, aiguës ; les pétioles grêles, pubescens, au moins de moitié plus courts que les feuilles.

Les chatons mâles sont pédonculés, allongés, grêles, cylindriques, pendans ; les pédoncules plus longs que les pétioles ; les chatons femelles foliaires, médiocrement pédonculés, courts, épais, obtus, quelquefois munis de deux ou trois petites folioles sur leur pédoncule ; les écailles divisées en trois lobes ; les deux latéraux arrondis, celui du milieu aigu ; les semences petites, garnies de chaque côté d'une petite aile très-mince, large, membraneuse, entière, arrondie.

Cet arbre croît dans l'Amérique septentrionale. η

8. BOULEAU à feuilles de peuplier. *Betula populifolia*. Ait.

Betula foliis deltoidibus, longè acuminatis, inaequaliter ferratis, glaberrimis ; strobilorum squamis lobis lateralibus, subrotundis ; petiolis glabris. (N.)

Betula (populifolia), *foliis deltoidibus, longè acuminatis, inaequaliter ferratis, glaberrimis*. Ait. Hort. Kew. 3, pag. 336.

Cet arbre doit être rangé parmi les grandes espèces de ce genre ; il est remarquable par ses feuilles, beaucoup plus amples que dans les autres. Ses rameaux sont cylindriques, plans, allongés, glabres, d'un brun-rougâtre, parsemés de petits points blancs, garnis de feuilles pétioles, alternes, un peu fermes, membraneuses, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes en dessus, beaucoup plus pâles en dessous, ovales, deltées, un peu échancrées en cœur à leur base, rétrécies vers leur sommet, en une longue pointe acuminée, inégalement dentées en scie à leurs bords, les pétioles parfaitement glabres ; les fleurs disposées en chatons cylindriques ; les écailles divisées en trois lobes ; les deux latéraux arrondis.

Cet arbre est originaire de l'Amérique septentrionale. On le cultive en Angleterre, en France, aux pépinières impériales de Versailles. η (V. v.)

9. BOULEAU de Sibérie. *Betula dasurica*.

Betula foliis ovatis, basi angustatis, integerrimis, inaequaliter dentatis, glabris; strobilorum squamis marginibus ciliatis; lobis lateralibus rotundatis. Willd. Arb. 39. tab. 2. fig. 3 & 4.

Betula (dasurica), foliis ovatis, acuminatis, ferratis, nervo pilosis. Pallas, Flor. ross. vol. 1. pag. 60. tab. 39.

Betula (exceles canadensis), foliis subuneiformibus, glabris, tenuissimis & argute ferratis; amentis cylindricis. Wangerh. Amer. 86.

β. *Betula foliis duplò minoribus, subtus glaberrimis.* Willd. l. c.

Ce bouleau, observé par Pallas, a beaucoup de rapport avec le bouleau blanc; il s'en distingue par ses feuilles ovales, rétrécies & entières à leur base, plus petites, médiocrement pétiolées, fermes, glabres, pileuses sur leurs nervures, acuminées, inégalement dentées, accompagnées de stipules lanceolées, légèrement pubescentes, caduques. Le tronc varie dans sa hauteur. Son écorce est d'un blanc-grisâtre. Les chatons mâles sont réunis deux ou trois à l'extrémité des rameaux de l'année précédente, grêles, pendans, plus longs que dans le bouleau blanc; les chatons femelles plus courts, plus épais, situés latéralement sur les mêmes rameaux. Les écailles calicinales sont grandes, ciliées à leurs bords, arrondies; les semences petites, entourées d'une membrane courte, à trois lobes; les deux latéraux arrondis.

Cet arbre croît au milieu des forêts, dans quelques contrées de la Sibérie. β

fo. BOULEAU papyracé. *Betula papyracea*. Ait.

Betula foliis ovatis, acuminatis, duplicato-ferratis; vasis subulis hirsutis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 337. — Willd. Arb. 40. tab. 2. fig. 1.

Betula (papyrifera), foliis ovalibus, acuminatis, subaequaliter ferratis; petiolo glabro, amento femineo cylindrico, squamis intus minutissimè puberulis; lobis lateralibus, multis brevioribus, suborbiculatis, non divergentibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 180.

On a long-tems confondu cet arbre, dans plusieurs jardins, avec le bouleau noir; il en diffère évidemment par ses feuilles en cœur & velues, bien plus épaisses & plus sombres. C'est un grand arbre, dont les branches se divisent en rameaux droits, cylindriques, revêtus d'un duvet grisâtre, cendré, garni de feuilles alternes, pétiolées, ovales, acuminées, échancrées en cœur à leur base, d'un vert foncé, très-inégalement dentées en scie à leurs bords, velues à leurs deux faces dans leur jeunesse, nues à leur face supérieure dans leur entier développement, couvertes en dessous d'un

duvet grisâtre, particulièrement sur leurs nervures, quelquefois entièrement glabres; les pétioles courts, recourbés & velus; les bourgeons courts, ovales, à peine aigus. Les chatons femelles sont courts, cylindriques, chargés d'écailles légèrement pubescentes en dedans, divisés en trois lobes; les deux latéraux beaucoup plus courts, presque orbiculaires, point divergens. Michaux dit que les pétioles sont glabres. Je les ai toujours vus pubesces ou velus. Il est possible que le duvet disparaisse avec l'âge, comme cela arrive dans la plupart des bouleaux.

Cet arbre croît dans l'Amérique septentrionale; il est cultivé en France, dans plusieurs grands jardins. β (V. v.)

Observations. M. Bosc m'a communiqué un exemplaire d'un bouleau qu'il a recueilli dans la Caroline, qu'il nomme *Betula sassa*; il a beaucoup de rapport avec l'espèce que je viens de décrire. Ses feuilles sont plus petites, moins velues; ses rameaux chargés d'un duvet court & brun. Il se rapproche un peu du *Betula nigra* d'Aiton.

11. BOULEAU lanugineux. *Betula lanulosa*. Mich.

Betula foliis ovatis, obtusis, glabris, inaequaliter ferratis; amento femineo subovato; lobis squamarum pubescentibus, linearibus, oblongis. (N.)

Betula (lanulosa), foliis deltoideo ovalibus, non acuminatis, duplicato-ferratis; petiolo brevi, amento femineo subovatoideo, squamis extus densè lanulosis; lobis subaequalibus, oblongis, divergentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 181.

Il paraît que ce bouleau doit former une espèce particulière, & qu'il n'est point, comme le soupçonnoit Michaux, le *Betula nigra* de Linné. Ses rameaux sont glabres, plans, cylindriques, fort grêles; ses feuilles alternes, pétiolées, ovales, un peu déformées à leur base, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, excepté dans leur jeunesse; d'un vert foncé en dessus, pâles en dessous, inégalement dentées en scie; les dents courtes, fines, aigues; les pétioles glabres, filiformes, de deux tiers plus courts que les feuilles. Je ne connois pas les fleurs mâles. Les chatons femelles sont axillaires, foliaires, pédonculés, ovales, oblongs; les écailles oblongues, laineuses en dehors, divisées à leur sommet en trois lobes un peu divergens, presque droits, égaux, linéaires, obtus; les semences comprimées, lenticulaires, arrondies, accompagnées de chaque côté d'une petite aile arrondie, entière, membraneuse; deux styles courts, persistans, divergens.

Cet arbre croît dans l'Amérique septentrionale. M. Bosc m'en a communiqué un exemplaire, qu'il a recueilli dans la Caroline. β (V. f.)

12. BOULEAU

12. BOULEAU à feuilles ovales. *Betula ovata*. Willd.

Betula foliis ovatis, duplicato-ferratis, glabris; pedunculis femineis ramosis; ovulorum squamis lobis aquilatis, truncatis, nervosis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 465. n°. 10.

Betula (ovata), foliis ovatis, biferratis; dentibus acutis, ramis angulosis, amentorum pedunculis ramosis. Schrank, Salzbr. n°. 159. — Ejuld. Bavar. 1. pag. 419.

Betula alnobetula. Ehrh. Beytr. vol. 2. pag. 72.

Cet arbruste tient le milieu entre les bouleaux & les aunes : il a, comme dans ces derniers, les pédoncules de ses chatons femelles rameux ; il offre même le port de *l'aulus incana* jeune ; mais il appartient aux bouleaux par les parties de sa fructification, par le nombre de ses étamines. Ses tiges ne s'élèvent guère qu'à la hauteur de cinq à six pieds ; elles se divisent en rameaux glabres, anguleux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, glabres à leurs deux faces, munies à leur contour d'une double dentelure, les dents étant aiguës, presque alternativement plus longues & plus courtes. Les fleurs sont axillaires, disposées en chatons ; ceux des fleurs femelles rameux ; les écailles calicinales divisées en lobes égaux, nerveux, tronqués à leur sommet.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Hongrie, de la Stirie, de la Carinthie, & en Allemagne, dans les environs de Salzbourg. h

13. BOULEAU glanduleux. *Betula glandulosa*. Michx.

Betula foliis subrotunda-obovatis, amentis squamis semiridis, femineis cyathoides, ramis glanduloso-punctatis. (N.)

Betula (glandulosa), pumila, ramis glanduloso-punctatis, glabris; foliis subrotundo-obovatis, amentis squamis semiridis; capsulis orbiculatis, anguste marginatis. Michx. Flot. boreal. Amer. 2. pag. 180.

Ce bouleau se rapproche beaucoup du *betula fratica* par son port & par les points glanduleux, épars sur les rameaux ; il en diffère par les feuilles, entières & cuneiformes à leur base ; par les chatons femelles, une fois plus longs & beaucoup plus grêles. Ses tiges s'élèvent peu. Ses rameaux sont glabres, garnis de feuilles un peu arrondies, en ovale renversé, obtuses à leur sommet, dentées en scie à leur contour, glabres à leurs deux faces. Les écailles du calice font divisées, jusque vers leur moitié, en trois découpures presque égales ; les capsules orbiculaires, munies d'un rebord très-étroit.

Cette espèce a été découverte par Michaux à la baie d'Hudson, sur le bord des lacs. h

Botanique. Supplément. Tome 1.

14. BOULEAU arbruste. *Betula fruticosa*.

Betula foliis subrotundo ovatis, saepequaliter serratis, glabris; amentis femineis oblongis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 466. n°. 15.

Betula (fruticosa), foliis rhomboides-ovatis, aequaliter serratis, glabris. Pallis, Flor. ross. vol. 1. pag. 62. tab. 40. — Willd. Arb. 42.

Betula (humilis), foliis utriusque glabris, simpliciter serratis, serratis grossius, pedunculis simplicibus, squamis calicinis levibus. Schrank, Bavar. 1. n°. 305.

Cet arbruste, rapproché des deux précédents, en diffère par ses feuilles glabres, par les rameaux non glanduleux, par ses chatons femelles plus alongés. Ses tiges sont peu élevées ; les rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, un peu arrondies, glabres à leurs deux faces, un peu rhomboidales à leur base, dentées en scie à leur contour ; les dentelures égales, larges, presque obtuses. Les fleurs sont disposées en chatons monoïques, axillaires ; les chatons femelles oblongs, cylindriques, pédonculés ; les pédoncules simples ; les écailles calicinales lisses.

Cet arbruste croît dans la Sibérie & dans la Russie. h

15. BOULEAU des monts Carpates. *Betula carpatica*. Willd.

Betula foliis rhombeis, duplicato-ferratis, glabris, basi integerrimis; strobilorum squamis ciliatis; lobis oblongis, oblique truncatis; petalis glabris, pedunculo longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 464. n°. 8.

Betula carpatica. Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Ce bouleau est peu connu. Ses feuilles sont pétiolées, rhomboidales, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, entières à leur base ; les dentelures alternativement plus longues & plus courtes ; les pédoncules plus courts que les périoles ; les chatons oblongs, garnis d'écailles ciliées à leurs bords, & divisées en lobes alongés, tronqués obliquement. Il croît dans la Hongrie. h

Observations. Forster a recueilli à la terre de Feu une autre espèce de bouleau, qu'il a nommée *betula antarctica*, assez semblable au bouleau nain, de la même grandeur, mais dont les feuilles sont plutôt elliptiques qu'arrondies, roides, épaisses, très-luissantes en dessus, un peu en dessous, à peine veinées ; la nervure du milieu très-saillante ; les rameaux divisés en d'autres plus petits, nombreux, fasciculés, de couleur brune.

Thunberg cite un bouleau du Japon (*betula japonica*), voisin des deux précédents, dont les feuilles sont ovales, un peu tréscées à leurs deux

extrémités, dentées en scie à leur contour, pubescentes à leur face inférieure; mais comme il nous manque des détails sur les parties de la fructification, il est difficile de décider si cette plante appartient aux bouleaux ou aux aunes.

** LES AUNES.

« Les Anciens ont parlé de l'aune commun, dit M. Desfontaines, & plusieurs des usages auxquels il sert de nos jours ne leur étoient pas inconnus. Du tems de Théophraste, l'écorce étoit employée à teindre les cuirs. Plin. dit que les pilotes d'aune font d'une éternelle durée; qu'ils peuvent supporter des poids énormes. Virgile en parle à peu près dans les mêmes termes. On l'employoit aussi, comme aujourd'hui, pour faire des conduits d'eau souterrains: on le plantoit le long des rivières pour les contenir dans leur lit. » (Plin., liv. 16, chap. 37, 40, 41.)

La division qui comprend les aunes a été bien moins enrichie que celle des bouleaux. L'*alnus oblongata* d'Aiton, connu vulgairement sous le nom de *bouleau de Constantinople*, qui croît dans le midi de l'Europe, ne diffère de l'aune commun (*alnus glutinosa*) que par la forme un peu variée de ses feuilles, plus allongées, oblongues ou elliptiques, privées d'ailleurs de duvet cotonneux aux angles de leurs nervures. Les deux espèces suivantes ont des caractères plus tranchés.

16. BOULEAU crépu. *Betula crispa*. Ait.

Betula (alnus crispa), foliis ovalibus, subacutis, duplicato-ferratis, subundulatis; nervorum axillis subnudis; stipulis latè ovalibus, obtusis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 181. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 339.

Alnus undulata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 336.

Ses feuilles sont ovales-oblongues, médiocrement aiguës, arrondies à quelquefois légèrement échancrées en cœur à leur base, crépues & presque ondulées à leurs bords, à double dentelure à leur contour, pileuses sur les pétioles & en dessous sur leurs veines, presque nues ou sans duvet aux aisselles des nervures; les stipules larges, ovales, un peu allongées, obtuses à leur sommet.

Cette plante croît au Canada & à la baie d'Hudson. h

17. BOULEAU denticulé. *Betula ferrulata*. Ait.

Betula (alnus ferrulata), stipulis ovalibus, obtusis; foliis lato-ovalibus, acutis; amentis feminis oblongis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 181. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 338. — Abbot. Infect. 2. pag. 183. tab. 92.

Betula racosa. Ehrh. Beytr. 3. pag. 21. — Duroi,

Harbk. 1. pag. 176. — Wagh. Amér. 86. tab. 19. fig. 60.

Alnus ferrulata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 336.

Arbrisseau peu élevé, dont les tiges se divisent en rameaux souples, d'un brun foncé, garnis de feuilles alernes, pétioles, ovales, finement dentées en scie à leur contour, glabres en dessus, légèrement pubescentes en dessous, principalement sur leurs nervures, rétrécies en pointe à leur base, élargies & un peu acuminées à leur sommet; les stipules ovales, obtuses. Les charons femelles sont courts, mais plus cylindriques qu'ovales, à pédoncules rameux.

Cette plante croît dans la Caroline & la Pensilvanie. h (V. f.)

BOULEOLA: nom caraïbe d'un aristolochia des Antilles (*aristolochia trilobata* Linn.).

BOULÉSIE. *Bowlesia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des ombellifères, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuill. des palmées ou lobées; les fleurs disposées en ombelles simples.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des ombelles sans involucre, à trois fleurs fécondes; les pétales égaux; un fruit tétragone, presque pyramidal; les semences creusées d'un sillon sur le dos.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, à cinq dents courtes, adhérent à l'ovaire; l'involucre nul ou composé de petites folioles presque sétacées.

2°. Une corolle régulière, composée de cinq pétales égaux.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont courts, terminés par des anthères ovales arrondies.

4°. Un ovaire adhérent avec le calice, surmonté de deux styles sétacés & de deux stigmates zigus.

Le fruit est un peu pyramidal, hérissé de poils rudes, très courts, divisé en deux semences creusées d'un sillon sur le dos.

Observations. Ce genre a été établi par MM. Ruiz & Pavon pour quelques plantes du Pérou; ils l'ont dédié à G. Bowles, savant espagnol, auteur d'une introduction à l'histoire naturelle de l'Espagne & à sa géographie physique.

ESPÈCES.

1. BOULÉSIE palmée. *Bowlesia palmata*. Ruiz & Pavon.

Bouffea foliis palmatis, multipartitis; lobis laciniatis, lateralibus bipartitis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 251. fig. A.

Plante herbacée, hispide, haute de deux pieds, dont les racines sont grêles & fibreuses; les tiges couchées, filiformes, fistuleuses, striées, anguleuses, dichotomes à leur sommet; les feuilles alternes; les supérieures opposées, longuement pétiolées, palmées, parsemées de petits poils en étoile; les lobes très-profonds, laciniés; les fleurs disposées en une ombelle simple, à l'extrémité d'un pédoncule axillaire, terminé par deux ou trois fleurs pédicellées, sans involucre. La corolle est blanche, petite; les pétales égaux; le fruit petit, pyramidal, hérissé de poils en étoile, se partageant en deux semences pâles.

Cette plante croît sur les collines, au Pérou. (Ruiz & Pavon.)

2. BOULÉSIE lobée. *Bouffea lobata.* Ruiz & Pavon.

Bouffea foliis lobatis, longè petiolatis. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 251. fig. B.

Ses tiges sont grêles, couchées, nombreuses, rameuses, légèrement striées, hérissées, ainsi que toute la plante, de poils courts; les feuilles opposées, larges, en cœur, à cinq ou sept lobes ovales, traversées de cinq à sept nervures; les pétioles très-longs, adhérens par leur base, munis de petites stipules linéaires, tubulées, blanchâtres, scarieuses. Les pédoncules sont axillaires, filiformes, beaucoup plus courts que les pétioles, soutenant une petite ombelle simple, à trois ou cinq fleurs presque sessiles, d'un blanc-jaunâtre, enroulées d'un involucre assez semblable aux stipules; les semences ovales.

Cette plante croît sur les hautes montagnes du Pérou. (Ruiz & Pav.)

3. BOULÉSIE blanchâtre. *Bouffea incana.* Ruiz & Pavon.

Bouffea foliis reniformibus, crenato-lobatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 28. tab. 268. fig. A.

Plusieurs tiges couchées, étalées, divergentes, chargées de poils blanchâtres, se divisent en quelques rameaux très-courts; elles supportent de petites feuilles opposées, reniformes, à cinq ou sept lobes épais, crénelés; les pétioles un peu plus longs que les feuilles; les stipules scarieuses, petites, tubulées; les pédoncules axillaires, foliaires, très-courts; les ombelles simples, à trois fleurs; leur involucre semblable aux stipules; les pétales petits, blanchâtres; les semences ovales.

Cette plante croît au Pérou, sur les collines. (Ruiz & Pav.)

BOULET DE CANON. On nomme ainsi, à Cayenne, le couroupité, parce que son fruit a la forme & le volume d'un boulet. (Voyez COUROUPITÉ.)

BOULETS: noms dérivés du latin *boletus*, sous lequel les Provençaux & les Languedociens désignent le champignon ordinaire ou champignon des couchés.

BOULETTE: nom donné par quelques auteurs à l'*echinops*, parce que ses fleurs sont disposées en tête. On l'a donné aussi, pour la même raison, à la globulaire & au *spharanthus*.

BOULIGOULOU. Les paysans de la Provence donnent ce nom à la chanterelle (*cantarellus*), espèce de champignon bon à manger.

BOULOU, BULU. « Ce mot, chez les habitants des îles malaises, dit le savant M. du Petit-Thouars, signifie *poils, cheveux, plumes*; il se trouve aussi dans la langue de Madagascar, mais plus ordinairement changé en *voulou*. Chez ces deux peuples il signifie du plus les *bambous*, qui sont semblables à des panaches. A Madagascar, ces singuliers végétaux couvrent presque exclusivement une surface considérable de terrain, occupé par les montagnes secondaires qui se trouvent entre les bords de la mer & les grandes élévations du centre. Cette bande de pays est la plus propre à la culture.

« Les Madécasses, comme les peuples de l'Inde, tirent grand parti des bambous, dont ils ont plusieurs espèces distinctes. La plus utile est aussi la plus commune; elle acquiert un diamètre considérable, de la grosseur de la cuisse, à peu près. Ses parois sont très-minces; en sorte qu'en faisant sauter les cloisons, on a à peu de frais des vases très-légers. Il paroît que c'est l'espèce décrite par Rumphé sous le nom d'*arundo vasaria*. Les habitants en forment un instrument de musique des plus simples. A cet effet ils prennent un de ses entrenœuds, longs d'un pied à peu près; ils détachent dans toute la longueur quatre lanières minces, qui restent attachées à chaque bout: ce sont des espèces de cordes qu'ils a. cordent, en plaçant sous chacune un petit morceau de bois en forme de chevalier: c'est une espèce de guitare. Si une corde casse, on découpe à côté une autre lanière, & ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la surface soit employée. »

BOUQUETINE. (Voyez BOUCAGE. *Pimpinella*.)

BOURASAH. *Burafia* (Per.-Th. Gen. nov. Madag. n° 62): nom que les habitants de Madagascar donnent à un arbuste grimpaux de leur pays.

« Il doit, dir M. du Petit-Thouars, former un genre nouveau, dont voici les caractères :

« Les fleurs sont dioïques, composées, dans les deux sexes, d'un calice à six folioles, d'une corolle à six pétales; dix étamines dans les fleurs mâles, réunies à leur base; les anthères adnées aux filamens; dix étamines stériles dans les fleurs femelles; trois ovaires, auxquels succèdent autant de boies ovales, monospermes, contenant chacune une semence hérissée de papilles singulières, entre lesquelles réside une humeur visqueuse très abondante; ce qui la rend très-difficile à manier; elle est marquée, sur le côté intérieur, d'un sillon profond, remplie par un périsperme charnu, à la base duquel se trouve un embryon, dont les cotylédons sont larges, écartés l'un de l'autre, & séparés par une membrane très-mince. »

Jusqu'à présent on ne connoît qu'une espèce qui appartienne à ce genre: c'est un arbruste foible, s'appuyant sur les végétaux voisins. Ses feuilles sont alternes & un peu écartées; elles sont pétioolées & composées de trois folioles ovales, longues de trois pouces, larges de deux, d'un vert-foncé & lisse. Les fleurs sont petites, verdâtres, & naissent aux aisselles des feuilles supérieures, en grappe composée.

Cet arbruste, d'après ces caractères, vient se ranger, dans l'ordre naturel, près des anones. On pourroit présumer qu'il doit faire partie de l'ordre des ménispermés; mais la forme de son embryon & de son périsperme le distinguent formellement du genre *caesepia* ou *cissampsis* & du *menispermum*, dans lesquels ces parties sont différemment conformées. Comme M. du Petit-Thouars se propose de publier ce genre & d'en éclaircir ces difficultés d'après ses propres observations, il faut lui en abandonner le soin, & attendre la suite qu'il doit donner à l'ouvrage commencé sur les plantes de Madagascar.

BOURDAINE ou BOURGÈNE: nom vulgaire du *frangula*, dont les anciens botanistes formoient un genre distinct du nerprun (*rhamnus* Linn.). Tournefort, n'appercevant pas dans celui-ci les pétales, qui sont très-petits, prenoit son calice pour une corolle, & la disoit monopétale, en ajoutant que la baie contenoit quatre graines. Dans le *frangula*, au contraire, il admettoit une fleur rosacée, composée de plusieurs pétales, parce qu'ils étoient plus apparens; & ce qu'il prenoit ailleurs pour corolle, redevient ici calice: de plus, il ne voyoit que deux semences dans le fruit du *frangula*. Linné, trouvant une organisation à peu près conforme dans les deux genres, ainsi que dans l'alaterne, le jububier & le patriure, les avoit tous rapportés au nerprun, en indiquant les pétales sous le nom d'écaillés, & le calice sous

celui de corolle. Depuis on a détaché les deux derniers genres, suffisamment distincts; mais la bourdaïne est restée confondue avec le nerprun, dont elle diffère seulement par le nombre des pétales & des éramines, porte à cinq au lieu de quatre. (Voyez NERPRUN.)

BOURDON DE SAINT-JACQUES ou ROSE PREMIÈRE. C'est l'*alcea* de Linné. (Voyez ALCEA.)

BOURGONI: nom galibi d'une espèce d'acacie de la Guiane (*mimosa bourgoni*), décrite & figurée par Aublet, pag. 941, tab. 338, dont les fleurs sont en épis & les feuilles simplement ailées, comme celles du *mimosa jugifolia*, avec lequel cette plante a beaucoup de rapport.

BOURGUÉPINE: nom donné par le traducteur de Dalechamp à deux plantes d'un genre & d'une famille différens. L'une est le nerprun (*rhamnus*); l'autre est le *phyllirea*, que Dalechamp nomme *apharca* ou *bourguépine* de Montpelier, ou *épine de Bourgogne*. Dalechamp lui-même est en doute de savoir si la plante qu'il désigne sous le nom de *bourguépine* de Montpelier est l'*apharca* ou le *phyllirea* de Théophraste. Il paroit pencher pour cette dernière opinion, avec d'autant plus de raison, que la figure qu'il en donne, est celle du *phyllirea lausifolia* Linn.

BOURRACHE. *Borago*. (Voyez les *Illustrations des Genres*, tab. 94, fig. 2, *borago officinalis* Linn., & fig. 2, *borago indica* Linn. Il existe tant de rapports entre plusieurs boraginées, tel est que la bourrache, la buglosse, &c., qu'il est difficile de décider si la plante que les Anciens, comme Plin, Dioscoride, appeloient *buglosse*, est réellement notre bourrache; & ce qui est assez probable. Au reste, l'erreur sur ces deux plantes n'a pas grand inconvénient dans les usages économiques, ayant toutes deux les mêmes propriétés, & pouvant être substituées l'une à l'autre. Le nom de *bourrache* n'étoit point connu au temps des Anciens. On prétend qu'on le doit aux habitans de la Lucanie dans le royaume de Naples, qui appélèrent cette plante *carrago*, & par changement du *c* en *b*, *borrago*, parce que son infusion dans du vin réjouit & fortifie le cœur, propriétés que Dioscoride attribue à la buglosse. La bourrache s'est acclimatée en Europe depuis quelques siècles; elle est originaire du Levant. Je l'ai trouvée en Barbarie, ainsi que l'espèce suivante, qui n'avoit pas encore été découverte.

6. **BOURRACHE** à longues feuilles. *Borago longifolia*. Poit.

Borago foliis linearis-lanceolatis, sessilibus, alternis; caulisque basi hirsutissimis. Poiet, Voyage en

Barb. vol. 2. pag. 119, & Edit. germ. vol. 2. pag. 157. fig. 2. — Lam. illustr. Gener. 1. pag. 410. n°. 1847.

Borago (longifolia), caule erecto, piloso; foliis frastis, sessilibus, lanceolatis; calicibus hirsutis, floribus paniculatis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 162. tab. 44.

Semblable, par sa corolle, à la bourrache officinale, cette espèce en diffère surtout par ses feuilles sessiles, linéaires-lancéolées, aiguës, très-entières, longues de six à neuf pouces, larges d'environ un pouce, parsemées en dessus de poils courts, hérissées en dessous sur les nervures longitudinales. Les racines sont dures, tortueuses, presque ligneuses, ramifiées; les fleurs disposées en une panicule terminale; les pédicelles inclinés; les calices très-pileux à leur base, à cinq découpures étroites, lancéolées, de la longueur de la corolle; cinq écailles obtuses, échancrées à l'orifice du tube; les filaments très courts, point arqués; quatre semences lisses, oblongues, obtuses.

J'ai trouvé cette plante en Barbarie, aux environs de Lacalle, sur le bord des ruisseaux; elle a été également observée aux environs d'Alger par M. Desfontaines. Elle fleurit au commencement du printemps. (V. v.)

7. BOURRACHE de Crète. *Borago cretica*. Willd.

Borago hirsuta, foliis ovatis; corollarum laciniis reflexis, linearibus. Desfont. Coroll. pag. 26. tab. 17. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 778.

Borago cretica, flore reflexo, elegantissimo, suave rubente. Tourn. Coroll. 6, & Vélins du Mus.

Cette espèce se distingue par ses feuilles ovales, à peine aiguës, entières, légèrement ondulées, d'un vert-pale, pileuses; les inférieures pétioolées, les supérieures presque sessiles; les fleurs disposées en une grappe lâche, à l'extrémité de chaque rameau; les calices très-courts; les divisions droites, ovales, aiguës; la corolle d'un rose-pale, à cinq divisions profondes, étroites, linéaires, creusées en gouttière & réfléchies; le tube court, cylindrique; les anthères petites & bleuâtres; un style grêle; deux stigmates fort petits.

Cette plante a été découverte par Tournefort sur le mont Ida.

8. BOURRACHE à fleurs lâches. *Borago laxiflora*.

Borago foliis ovatis, obtusis; floribus subsiliatis, longe pedunculatis. (N.)

Ses tiges sont grêles, rameuses, herbacées; les feuilles rudes, ovales, entières, les inférieures

pétioolées, les supérieures presque sessiles; les fleurs axillaires vers l'extrémité des rameaux, presque solitaires, lâches; les pédoncules unifoires, simples, filiformes, plus longs que les feuilles, rudes, ainsi que les autres parties de la plante; le calice à cinq découpures presque subulées; la corolle petite, d'un bleu-vif, un peu plus longue que le calice, à cinq divisions médiocrement étalées, ovales, aiguës; les anthères presque sessiles, longues, sagittées; le stigmate obtus.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal ne m'est point connu. (V. v.)

9. BOURRACHE à feuilles épaisses. *Borago crispifolia*. Vent.

Borago glauca, caule levi, foliis decurrentibus, segri flaverrimis; corolla laciniis linearilanceolatis, potentissimis, inaequalibus. Vent. Hort. Cels. pag. & tab. 100.

Cette plante se distingue facilement de toutes les autres espèces de ce genre par ses tiges glauques & lisses, par ses feuilles charnues, sessiles, lancéolées, aiguës, glabres à leur surface inférieure, excepté sur leur principale nervure; parsemées, en dessus & à leurs bords, de tubercules avec un aiguillon crochu; les pédoncules solitaires, axillaires, plus courts que les feuilles, à une seule, rarement à plusieurs fleurs; le calice ventru, pentagone, à cinq découpures lancéolées, aiguës, hérissées sur leurs angles; la corolle couleur de chair, à cinq divisions linéaires, obtuses, inégales; les étamines inégales; les anthères jaunes, sagittées, inégales, creusées de quatre sillons; le fruit pendan, orbiculaire; quatre semences noirâtres, ovales, aiguës, comprimées. Le nombre des parties, dans la fructification, varie quelquefois de quatre à cinq. Plusieurs des ovaires avortent souvent, & ne produisent que deux ou trois semences.

Cette plante a été trouvée en Perse par MM. Bruguière & Olivier.

BOURRA-COURRA. Dans la Guiane hollandaise on nomme ainsi, au rapport de Stedman, l'arbre appelé bois de lettres dans la Guiane française, décrit par Aublet sous le nom de *piratinera*. (Voyez *PIRATINIER*.)

BOURREAU DES ARBRES: nom donné au *celastrus scandens*, dont la tige grimpante embrasse le tronc des arbres, & les serre tellement qu'elle les étouffe & les fait périr. (Voyez *CELASTRE*.)

BOURSE A BERGER, BOURSETTE, TA-BOURET: noms vulgaires du *thalassip bursa posoria*, dont la petite filique, de forme triangulaire & semblable à une bourse, la distingue de toutes

ses congénères. Césalpin la nommoit *capilla*, & l'on pourroit rigoureusement en faire un genre séparé. Cette plante varie beaucoup dans la forme & la grandeur de ses feuilles. (Voyez TABOURET.)

BOURTOULAIGA : nom languedocien du pourpier. On le donne aussi à l'espèce d'arroche qui lui ressemble (*Urtica portulacoides* Linn.).

BOUTEILLAOU : nom languedocien de l'olivier.

BOUTON D'OR : espèce de renoncule (*Ranunculus acris* Linn.), dont la fleur jaune se double aisément par la culture, & qui devient alors un des ornemens de nos parterres. Une autre espèce (*Ranunculus platanifolius* Linn.), à fleurs blanches doubles, également cultivée, porte le nom de bouton d'argent.

BOUTON ROUGE. On nomme ainsi, dans le Canada, l'espèce de gaillet qui y est indigène (*Cercis canadensis* Linn.).

BOWLESIA. (Voyez BOULISIE, Suppl.)

BOYAU DE CHAT. On donne ce nom à une espèce d'ulve (*Alva intestinalis*), qui est tubulée en forme d'intestins.

BOYAUX DU DIABLE : nom donné, dans les Antilles, à quelques espèces de falf-paraville (*Smilax* Linn.).

BRABEJUM. (Voyez BRABET, & Illustr. Gen. tab. 847.)

BRACELETS. On donne ce nom dans les Antilles, suivant Plumier, aux gouffes d'une espèce d'acacie (*Mimosa unguis cati* Linn.), qui sont contournées en forme de bracelets. Dans les mêmes îles on nomme le jacquier bois bracelets.

BRACHIOBOLE. *Brachibolus*. Allioni nomme ainsi les espèces de silymbre de Linné, à siliques courtes, qui conduisent la racine de Haller, le *roripa* de Scopoli.

BRACHIOGLOTTIS. (Voyez BRACHIOGLE, & Ill. Gen. tab. 677.)

BRACHYSTEMUM : genre établi par Michaux, qui a de grands rapports avec son genre *pycnanthemum*, & dans lequel il a fait entrer quelques espèces de thym; il a été mentionné à la suite des thymus. (Voyez ce mot.)

BRADLÉE. *Bradleya* : nom sous lequel Gærtner a désigné un genre de plantes nommé auparavant

glochidion par Forster, & dont le caractère générique a été présenté par M. de Lamarck à l'article GLOCHIDION; mais comme depuis ce même savant a adopté, dans les *Illustrations des Genres*, le nom de Gærtner, je mentionnerai ici les espèces, renvoyant, pour l'exposé du caractère générique, au mot GLOCHIDION.

ESPÈCES.

1. BRADLÉE de Chine. *Bradleya sinica*. Gærtner.

Bradleya pedunculis foliatis, axillaribus; foliis lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 591. — Gærtner. de Fruct. & Sem. 2. pag. 127. tab. 109. fig. 1. — Lam. Illustr. Gen. tab. 772. fig. 1.

Arbuscula sinica, anona dulcis folio non splendente; fructu ex foliorum alis compresso, parvo, orbiculati, striato, duro. Pluk. Amalth. 35. tab. 368. fig. 1.

Arbuste dont les rameaux sont glabres, alternes, clancés, presque cylindriques, garnis de feuilles sessiles, alternes, linéolées, glabres, entières, un peu sinuées à leurs bords, aiguës, à nervures fines, ramifiées. Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, beaucoup plus courts que les feuilles; elles produisent pour fruit une capsule dure, petite, globuleuse, comprimée, ombiliquée à ses deux faces, à six ou huit côtes, composée d'autant de coques; chaque coque à deux valves, contenant deux semences placées l'une sur l'autre, d'un rouge-écarlate, anguleuses, arrondies.

Cette plante croît en Chine. 7

2. BRADLÉE glochidion. *Bradleya glochidion*. Gærtner. de Fruct. & Sem. 2. pag. 128. tab. 109. — Lam. Illustr. tab. 772. fig. 3. — Forst. Nov. Gen. (Voy. GLOCHIDION ramifère, vol. 2. pag. 733.)

3. BRADLÉE de Ceilan. *Bradleya ceylanica*. Gærtner. l. c. — Lam. Ill. tab. 772. fig. 2.

Cette espèce n'est encore connue que par ses fruits. Son calice est, non à cinq folioles, mais d'une seule pièce, à cinq découpures persistantes; les capsules légèrement pédicelées sur un pédoncule commun, globuleuses, un peu comprimées, striées & non toruleuses, glabres, à six coques; chaque coque bivaive, contenant deux semences arrondies, convexes d'un côté, planes de l'autre.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. 7

4. BRADLÉE des Philippines. *Bradleya philippica*. Cavan.

Bradleya caule arboroso; foliis lanceolatis, glabris; floribus axillaribus, numerosis. Cavan. Icon. Rat. 4. pag. 48. tab. 371.

Bradleya (philippenfis), *pedunculis axillaribus*, aggregatis; *foliis lanceolatis*. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 591.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de douze pieds, divisées en rameaux nombreux, tomenteux dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, lancéolées, très-entières; les fleurs font petites, nombreuses, axillaires, pédicellées; le calice divisé en six folioles ovales, blanchâtres, persistantes. Les étamines n'ont point été observées. Les fleurs femelles ont un ovaire globuleux, plus grand que le calice; un style court, un stigmate à six rayons: il leur succède une capsule orbiculaire, très-comprimée à ses deux faces, à six côtes, divisée en six loges, contenant des semences lenticulaires, rougeâtres & luisantes, deux dans chaque loge.

Cette plante croît aux îles Philippines. *B. (Descript. ex Cavan.)*

BRAGANTIE à grappes. *Bragantia racemosa*. Lour.

Bragantia foliis lanceolatis, integerrimis; racemis axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 645.

Genre de plantes à fleurs incomplètes, de la famille des aristoloches, établi par Loureiro pour un arbrisseau de la Cochinchine, qui offre pour caractère essentiel :

Un calice nul; une corolle monopétale; le tube globuleux, filonné; le limbe à trois découpures égales; une capsule oblongue, tétragone, à quatre loges, à quatre valves; des semences nombreuses.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur d'environ cinq pieds; il porte, dans le pays, le nom de *hou-dan-mouc*. Ses rameaux sont garnis de feuilles assez grandes, alternes, lancéolées, très-entières. Les fleurs sont rouges, disposées en petites grappes; elles n'ont point de calice (ou plutôt de corolle, selon Justieu). Cette corolle, adhérente à l'ovaire par son tube, est monopétale; son tube glanduleux, filonné, terminé par un limbe partagé en trois découpures égales. L'ovaire est oblong, surmonté d'un style épais, terminé par un stigmate concave, portant à ses bords six anthères sessiles: il lui succède une capsule allongée, adhérente avec le calice, à quatre angles, à quatre valves, à quatre loges, remplies de semences triangulaires, disposées sur un seul rang.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Cochinchine. *b*

BRAGANTIA. (Voyez BRAGANTIE.)

BRAGANTIE. Vandell, dans un fascicule de plantes publié en 1771, a décrit une plante du Brésil, dont le fruit est encore inconnu, ainsi que

sa place, dans la distribution naturelle des végétaux. C'est, d'après cet auteur, une plante à tige ligneuse, à feuilles opposées & velues. Les fleurs sont disposées en tête à l'extrémité des tiges, environnées de huit feuilles en verticilles, velues, très-aiguës, en forme d'involucre. On distingue en dessous, un peu plus bas, cinq autres feuilles, & puis quatre extérieures de même forme, & disposées de la même manière. Chaque fleur est composée d'un calice propre, profondément divisé en sept parties, deux plus extérieures. La corolle est d'une seule pièce, cylindrique, entière à son limbe; elle renferme quatre ou cinq étamines filantes; un ovaire libre, surmonté d'un style court, terminé par deux stigmates.

BRAIETAS : nom languedocien de l'oreille d'ours. En Picardie on nomme aussi *braiette* la primevère.

BRAINVILLIÈRE. Ce nom, qui rappelle celui de la Brainvilliers, condamnée, dans le dix-septième siècle, pour cause d'empoisonnement, a été donné pour cette raison, dans les Antilles, à *Spigelia*, plante regardée comme malfaisante. On lui attribue cependant la propriété de tuer les vers; & ce qui l'a fait nommer *Spigelia anthelmia*. C'est encore l'*Tarapabea* du Brésil, nom qui avoit été adopté par Plumier. (Voyez SPIGELIE, n°. 1.)

BRAMIA. (Voyez BRAMIE.) M. de Lamarck, ayant d'abord formé un genre particulier de cette plante, ne l'a considéré ensuite que comme une variété du *gratiola monniera*. (Voyez GRATIOLA portulacée, n°. 6.) Celle-ci avoit été nommée *monniera* par Bernard de Jussieu, nom employé par Aublet pour une autre plante, & qui a été conservé. M. de Lamarck penche d'ailleurs pour l'opinion de Brown & de Jussieu, qui pensent que le *gratiola monniera* Linn. doit former un genre particulier, en y réunissant les autres espèces de gratiolas qui ont quatre étamines, parmi lesquelles se trouveroit l'*Ambulia*. Loureiro, du même avis, a établi ce genre sous le nom de *spigas*; mais il a déjà été adopté pour un autre genre.

BRANC-URSINE ou **BRANCHE-URSINE** : noms donnés par les Anciens à plusieurs plantes très-différentes entr'elles : 1°. à l'acanthus vulgaire (*acanthus mollis* Linn.), qui est la branc-ursine ordinaire de Matthioli; 2°. au *enurus oleraceus* Linn. ou chardon des prés de Tragus, qui est la branc-ursine sauvage; 3°. au *carduus tuberosus* Linn., autre branc-ursine sauvage de Dalechamp; 4°. à l'*acanthus spinosus* Linn., qui est la branc-ursine piquante de Lobel. Enfin, la berce (*heracleum* Linn.) porte le nom de *fausse branc-ursine*.

BRANCHIELLE : nom que Bridel a donné à

un genre de mouffe, dont les espèces font des *hypnum* de Linne.

BRASENIA. Nous ne connoissons ce genre de plantes que par la description qu'en donne Schreber dans son édition du *Genera Plantarum*; il le rapporte à la polyandrie déca-gynie de Linne, & lui assigne pour caractères :

Un calice d'une seule pièce, coloré & persistant, à six divisions profondes, dont les trois alternes intérieures sont plus longues & plus étroites; dix-huit à vingt-cinq étamines attachées au réceptacle, & plus courtes que le calice; cinq à dix ovaires comprimés, surmontés chacun d'un style & d'un stigmate, qui se convertissent en autant de capsules un peu charnues, oblongues, aiguës, comprimées, qui ne s'ouvrent pas, & contiennent dans une seule loge deux ou trois semences.

Schreber ajoute que cette plante a de l'affinité avec son *acridis*, qui est le *cabomba* d'Aublet. Cette indication & l'ensemble des caractères font présumer que le *brasia* est une plante aquatique, & qu'elle doit, dans l'ordre naturel, se rapprocher de l'*alisma* & du *butomus*. (Juss.)

BRASILUM. Gmel.-Synf. Nat. 417. C'est le même genre que celui qui a été nommé par M. de Lamarck *brasilifolium*. (Voyez BRÉSILOT & TARRI.)

BRASSICA. (Voyez CHOU.)

BRATHYS. (Voy. BRATIS & MILLEPERTUIS, n°. 21.)

BRUNEA: genre établi par Willdenow pour une espèce de *menispermum*, qui a été décrite sous le nom de *menispermum radiatum* Lam.; elle diffère des autres espèces par son calice à trois folioles, par la corolle à trois pétales, tant dans les fleurs mâles que dans les femelles. Les premières sont de plus munies d'un appendice composé de six écailles & six étamines. Dans les femelles, point d'appendice & trois styles; une baie à trois coques. C'est le *menispermum glabrum* Kœhlig, le *brunia menispermoides* Willd. Spec. Plant. 4, pag. 797. (Voyez MENISPERME, n°. 18.)

BREDEMEYERA à fleurs nombreuses. *Bredemeyera floribunda*. Willd.

Bredemeyera sulcis oblongo-lanceolatis, integris; floribus densè paniculatis (N.) Willd. Spec. Plant. 3, pag. 898, & Nov. Act. Soc. Nat. Berol. 3, pag. 412, tab. 6.

Genre de plantes établi par Willdenow, de la famille des légumineuses, dont le caractère essentiel consiste dans :

Un calice à trois folioles; une corolle papilionacée;

Pétendard de deux pièces; une noix à deux loges, recouverte d'un brou.

Arbrisseau de cinq à huit pieds de haut, dont les rameaux sont garnis de feuilles presque alternes, médiocrement pétiolées, lisses, oblongues-lanceolées, très-entières, veinées, longues de deux à trois pouces. Les fleurs sont jaunes, pérites, nombreux, disposées en une panicule terminale très-rameuse, munies chacune d'une petite bractée linéaire à la base de chaque pédicelle. Le calice est glabre, à trois divisions très-profondes; la corolle petite, papilionacée; son étendard composé de deux pétales; dix étamines diadelphes; un ovaire qui se convertit en un drupe, contenant une noix à deux loges.

Cette plante croît aux environs de Caracas, dans l'Amérique méridionale. h

BREDES ou **BRETTE.** Ce mot est le portugais *bredos*, qui lui-même est une altération du grec *bliton* & du latin *blitum*. Ce nom seroit, chez les Anciens, à désigner une plante fade, en usage dans leur cuisine; aussi les botanistes modernes l'ont-ils appliqué successivement à un grand nombre de plantes qui toutes, à raison de leur saveur fade, peuvent être mangées, moyennant un assaisonnement, telles que plusieurs arroches (*atriplex*), des allérides (*chenopodium*), des amarantes (*amaranthus*), &c. Linné a enfin bûné le *blitum* aux plantes connues sous le nom vulgaire d'épinard-fraise. M. du Petit-Thouars a fait à l'île-de-France, sur l'emploi du nom *brette* ou *brides*, des recherches fort curieuses & intéressantes, dont nous allons présenter l'extrait.

« Le plus grand nombre des Européens, dit-il, qui arrivent pour la première fois à l'île-de-France ou dans l'Inde, regardent comme une chose extraordinaire l'habitude où l'on est d'y manger beaucoup de plantes herbacées, cuites sans beaucoup d'appât, comprises sous le nom collectif de *brides*. Cet usage est pourtant de tous les pays & de tous les temps; mais il paroît encore plus répandu dans les Indes, principalement chez toutes les nations dont le riz fait la base de la nourriture. Tous ces peuples tirent des végétaux la plus grande partie de leurs aliments. Pour en corriger la fadeur naturelle & donner du ton à l'estomac, ils y mêlent plusieurs épiceries qui croissent pour ainsi dire sous leurs mains, & presque sans culture; telles sont les différentes espèces de *capsicum*, le *carcuma*, le gingembre, le poivre, &c. »

Ces mets simples étoient pareillement très-communs chez les Grecs & chez les Romains: c'est ce que ces derniers nommoient *olas*, mot que nous traduisons par *légume*, en lui donnant beaucoup plus d'extension. On pourroit donner une très-longue liste de plantes qui portent le nom de *brides* à l'île-de-France, parce que les Noirs mangent

mangent souvent, presque sans choix, un grand nombre d'herbes, pourvu qu'elles soient tendres. Voici les plus essentielles :

Brèdes du Bengale. C'est une espèce de *chenopodium* qui a été apporté depuis peu, & qu'on appelle aussi épinards de Chine.

Brèdes-chevette. On donne ce nom à l'*ilteubrum fistile* Linn., l'*alternanthera* de Forskall. Les Malais le nomment *fajon-aran*, que Rumphie a traduit par *olus squillarum*.

Brèdes-chou caribée. Ce sont les jeunes feuilles de l'*arum colocasia* Linn. (*caladium* Vent.). Quand elles sont très-jeunes, elles n'ont pas encore l'aigrette des arôles, & sont très-bonnes. On les accommode quelquefois en frire ; mais il faut les avoir chûifir, autrement elles occasionnent des inflammations à la gorge.

Brèdes-chou de Chine. C'est effectivement une espèce de chou que l'on cultive, & dont on mange les feuilles tendres ; c'est un des meilleurs légumes de ce genre ; mais il réunit difficilement dans certains cantons, parce qu'il est rongé par la larve d'une petite phalène qui se multiplie extraordinairement.

Brèdes-creffon. C'est le creffon commun (*ffymbrum necturium* Linn.). Transporté depuis longtemps dans nos îles d'Afrique, il s'y est très-bien naturalisé, & dans quelques recoins des rivières, il acquiert une taille prodigieuse. On donne aussi quelquefois le même nom au *ffilanthus acmella* Linn., qu'on connoît plus ordinairement sous le nom de brèdes malgache ou brèdes piquante.

Brèdes de France. Les Noirs désignent sous ce nom l'épinard vulgaire.

Brèdes-gandole. C'est le *basella rubra* Linn., dont le nom malais, conservé par Rumphie, est *gandole*. Beaucoup de personnes le nomment *brèdes d'Ango'e*, se persuadant qu'il a été apporté de la côte d'Afrique, d'Angola.

Brèdes-graumon. Ce sont les jeunes pousses des citrouilles, qui forment un mets très-agréable. Quelquefois cependant elles ont une odeur de mûle qui répugne à certains estomacs.

Brèdes glaciale. On cultive depuis long-tems la ficole glaciale (*mesembryanthemum crystallinum* Linn.) à l'île Bourbon pour l'usage de ses feuilles. C'est un des meilleurs légumes de ce genre.

Brèdes malabare. On confond sous ce nom plusieurs espèces de plantes : d'abord les amarantus (*amaranthus spinosus*), qui croissent sans culture, & quelques autres, comme l'*amaranthus cruentus*, que l'on cultive dans quelques jardins ; de plus, le *corchorus olitorius*, la coréette. Il paroît qu'on ne fait pas grand cas de ce dernier, car on n'en trouve plus que quelques pieds épars.

Botanique. Supplément. Tome I.

Brèdes malgache. C'est le *ffilanthus acmella* Linn. ou plutôt une espèce voisine. Quand on est accoutumé à sa faveur âcre & piquante, on le mange avec plaisir. On le nomme aussi brèdes-creffon.

Brèdes-martin. ainsi nommée parce qu'elle est semée par les excréments de l'oiseau appelé *martin*, qui en fait sa nourriture. C'est la même que la suivante.

Brèdes-morelle. C'est la brèdes par excellence, qui fait la base de la nourriture du plus grand nombre des Créoles, depuis le dernier Noir jusqu'au plus somptueux habitant. Les Européens nouvellement débarqués voient cet aliment avec répugnance, surtout ceux qui ont quelques connoissances de botanique, en apprenant que c'est une espèce de *solanum*, au moins très-voisine du *solanum nigrum* Linn., qui passe en France pour un poison ; mais on s'y fait très-promptement. Alors on partage le goût général, & ce mets devient un de ceux dont on se lasse le moins. Son apprêt est très-simple, ainsi que celui de toutes les espèces de brèdes. Pour les Noirs il suffit de les faire bouillir, d'y mettre un peu de sel, plus ou moins de baies de piment. Les habitants y ajoutent un peu de sain-doux, qui tient lieu de beurre dans la cuisine du pays. Quelques-uns y mettent du gingembre. Dans cet état la brèdes-morelle paroît au déjeuner, dont elle fait la base, avec un morceau de viande salée ou du poisson ; elle reparoît au dîner, où elle se mêle au *carris* ; enfin, avec un poisson frit, elle forme le souper du plus grand nombre des habitants. Dans tous ces repas on la mange avec le riz cuit à l'eau. On peut juger, d'après cela, de la consommation journalière de ce légume : aussi est-il la denrée la plus commune du *bozaz* ou marché. A l'île-de-France cependant on ne fait usage que de celle qui croît naturellement sur les habitations ; mais à l'île Bourbon l'on est plus indifférent. On la sème dans les jardins, on la repique en planches, & on la soigne comme tous les autres légumes : elle y prend un accroissement qui la rend méconnoissable. Sa saveur est beaucoup plus douce ; ce qui n'est pas regardé comme une qualité par plusieurs Créoles, qui aiment mieux faire ramasser celle qui croît sur les habitations, quoique beaucoup plus amère : celle-ci porte plus ordinairement le nom de brèdes-martin. Il est à remarquer que plus les lieux où elle croît sont élevés, plus elle a d'amertume. On peut expliquer par-là comment la même plante seroit dangereuse sous la zone tempérée, & ne le seroit pas sous les tropiques, où la chaleur seroit évaporer le principe vireux : Il paroît que la morelle noire n'est pas aussi dangereuse en France, qu'on le pense communément ; car beaucoup de Créoles venus ici, l'appétant dans leurs promenades, en ont voulu manger, malgré les représentations qu'on leur a faites, & n'en ont éprouvé aucun accident. Mal-

T t t t

gré cela, elle a une odeur vireuse que n'a point celle des îles, & il est prudent de jeter la première eau dans laquelle elle a bouilli. Ce mets n'est point particulier à l'île-de-France; il est usité dans l'Inde, où il a sûrement un nom particulier. Dans les îles malaises il porte celui de *fojor*; à Madagascar, celui d'*anghivie*, & dans nos colonies américaines il se nomme *laman*.

Brèdes-morongues. Ce sont les jeunes pousses du ben (*moringa*, *guilandina moringa* Linn.); elles sont très-estimées. La racine rapée a le goût du cran (*cochlearia armoracia*); elle est employée dans toute l'Inde.

Brèdes-moutarde. Ce sont les pousses d'un sinapi, qui paroit être le *sinapis indica*.

Brèdes-piment. Ce sont les pousses d'un piment (*capsicum*); elles n'ont rien de l'âcreté du fruit de cet arbriste.

Brèdes puante. C'est le *cleome pentaphylla* Linn. Son odeur, des plus agréables, qui lui a fait donner aussi le nom de *brèdes pisset de chat*, sembleroit l'exclure du nombre des aliments; mais elle la perd par l'ébullition, & devient alors très-bonne. (Pet.-Th.)

BRÉSILLET. *Cajupitia*. Ce genre a été réuni par Willdenow aux *poiciacina*. Nous avons déjà fait remarquer l'affinité de ces deux genres. (Voyez les *Illustrations des Genres*, tab. 335, fig. 1, *cajupitia japonica*, & fig. 2, *cajupitia mimajoides*.)

BRÉSILLET DE SAINT-DOMINGUE. On donne le nom de *brésillet*, dans cette colonie, à des végétaux d'un genre différent. On appelle *brésillet*, sans autre épithète, les deux espèces de *comocladia*; mais ce nom est plus généralement attribué au *comocladia épineux*, qui est plus commun, dont le bois est plus rouge & plus dur. Ce bois est pesant, & pourroit servir à bâtir; mais il ne s'élève pas ordinairement à une grande hauteur.

Un autre arbriste, connu sous le nom vulgaire de *brésillet bâlard*, est le *trichilia frondosa*, connu aussi, dans certains quartiers, sous le nom de *raisin des perroquets*, soit parce que ces oiseaux sont friands de ses graines de cet arbriste, soit parce que ses graines, d'un beau rouge-vermillon, tranchant fortement avec la couleur verte des valves qui les enveloppent, imitent les deux couleurs, dont est chargé le plumage de quelques espèces de perroquets. Nicholson dit qu'on retire du bois de cet arbriste une couleur plus brune que rouge, & attribue à son écorce une vertu astringente. Il est à remarquer que les auteurs ne sont pas d'accord sur la plante que l'on nomme *brésillet bâlard*. Celle à laquelle Nicholson rapporte ce nom, & qu'il nomme *frondosa*, paroit être incontestablement le *trichilia frondosa*; mais d'après la description de Desportes (vol. 3, pag. 46), nous ne pouvons

douter qu'il n'ait eu en vue une espèce de *comocladia*, ayant trois étamines & un fruit mou, de la figure d'une olive, sigrlet, contenant un noyau oblong qui renferme une amande. Ces caractères ne peuvent pas convenir au *trichilia*, & sont plus conformes à l'organisation du *comocladia*. (Pal.-Beauv.)

BRÉSILLOT. M. de Lamarck désigne sous ce nom deux arbristaux d'Amérique, dont le premier doit se rapporter au genre *comocladia* (voyez *COMOCLADE*, Suppl.), & le second est évidemment le même que le *picramnia antididemia* de Swartz, d'après des échantillons de celui-ci, envoyés par Vahl & observés par M. de Jussieu. (Voyez *PICRAMNIE*, Suppl.)

BREXIA. (Pet.-Th. Gen. Madagaf. n°. 69.) C'est le même genre que le *venana*. Linn. Illustr. vol. 2, pag. 59, tab. 131, & Dict. vol. 8. M. du Petit-Thouars nous a fourni quelques détails particuliers sur cette plante. Les filaments sont tenus par leur base en un anneau frangé dans les intervalles. Les anthères s'ouvrent en dedans. L'ovaire est conique. Le fruit consiste en une baie oblongue, revêtue d'une écorce ferme, ligneuse, à cinq angles, divisée en cinq loges; les semences nombreuses, attachées sur un réceptacle central, disposées sur trois rangs. L'embryon est droit; les cotylédons hémisphériques, renfermés dans un périsperme charnu.

Il paroit que l'espèce à laquelle M. du Petit-Thouars applique cette description, est un peu différente de celle citée dans les *Illustrations*. C'est un arbriste à feuilles alternes, les plus jeunes alongées, dentées, épineuses; les anciennes fermes, ovales-oblongues, légèrement dentées; les fleurs, au nombre de sept à huit, disposées en ombelles axillaires; le pédoncule commun compimé.

BREYNIA. Forster, Caract. Gener. pag. 145. tab. 75. — Lam. Ill. Gen. tab. 800.

Breynia disticha. Gmel. Syst. Nat. 1. pag. 430.

Cette plante n'est encore connue que d'après la description que Forster a donnée de son caractère générique. D'après Linné, les fleurs sont polygynes. Dans les fleurs *herma-broides*, le calice est d'une seule pièce, turbiné, laciné, irrégulier, à six découpures obtuses, ferrées, conniventes, s'agrandissant considérablement avec le fruit, les découpures devenant presque orbiculaires, presque égales. Il n'y a point de corolle; les anthères au nombre de cinq, sessiles, linéaires, rapprochées, adnées longitudinalement avec le style. L'ovaire est fort petit; le style cylindrique, de la longueur du calice; le stigmate obtus; une capsule globuleuse, à trois loges; deux semences dans chaque loge.

Les fleurs mâles offrent :

1°. Un calice à cinq folioles concaves, arrondies, presque égales.

2°. Point de corolle ; cinq glandes pédicellées, alternes avec les étamines.

3°. Cinq étamines ; les filaments très-courts ; les anthères arrondies, de la longueur du calice.

Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice comme dans les mâles ; point de corolle.

2°. Un ovaire globuleux ; point de style ; cinq stigmates en cœur, en forme de pétale.

3°. Une capsule à cinq loges ; des semences foliaires, trigones.

BRIEDELIA. Willdenow a donné ce nom à un genre que Roxburg avoit auparavant désigné sous la dénomination de *claytia*. (Voyez CLUYTIE, Suppl.)

BRIGNOLE : espèce de prunes desséchées, qui ont pris le nom de la ville de Brignoles en Provence, où on les prépare.

BRIGNOLIER. Desportes & Nicholson parlent de deux espèces de brignolier, le jaune & le violet, noms qui leur ont été donnés d'après la couleur de leurs fruits. « Ce font, disent-ils, des arbres qui ont des feuilles semblables à celles des poiriers, mais plus aiguës & plus longues. Les fleurs sont blanches, & le fruit en forme de corne. » D'après une telle description, il est impossible de rapporter le brignolier à aucun genre connu.

BRIGOULA : nom languedocien de l'artichaut.

BRIN D'AMOUR. C'est un des noms vulgaires donnés au *malpighia urens* Linn., dont les fruits, suivant Nicholson, excitent à l'amour. Ce nom pourroit aussi lui avoir été donné, parce que ses feuilles sont couvertes en dessous d'aiguillons dont la piqure est douloureuse, & excite une démangeaison qui dure plusieurs heures.

BRINDONIA. (Voyez BRINDONIER.)

BRINDONIER. *Brindonia*, (*Brindera*.) M. du Petit-Thouars a établi sous ce nom un genre dont les caractères avoient été déjà désignés par Loureiro, dans sa *Flora de la Cochinchine*, pour une seule espèce. M. du Petit-Thouars y rapporte deux autres espèces : 1°. le *brindonia indica*, *brindonia* de J. Bauh. Hist. 1. pag. 89 ; 2°. le *garcinia celebica* Linn., qui est le MANGOSTAN, n°. 2. Il en fera fait mention dans le Supplément, au genre OXYCARPUS. (Voyez OXYCARPE, Suppl.)

BRINGARASI : nom brame d'une plante à fleurs radiées, décrite & figurée par Rheed, *Hort. Malab.* 10, pag. 81, tab. 42, sous le nom de *percajoni*. On l'a rapportée au *verbena calendulacea*.

BRISE-PIERRE des Anglais. *Saxifraga Anglorum*. Dalech. Nom que le traducteur de Dalechamp donne au *peucedanum silans* Linn. Les Anglais ont nommé cette plante *brise-pierre*, parce qu'elle a une efficacité singulière, dit le même traducteur, pour briser la pierre de la vessie. Au reste, il ne faut pas la confondre avec la perce-pierre du même auteur (*aphanes arvensis* Linn.), autre plante d'une famille différente, à laquelle Dalechamp attribue une vertu diurétique, & dont les femmes, dit-il, font communément usage en Angleterre.

BRIZA. (Voyez BRIZE.) Ce genre, réduit aux espèces décrites par Linné, n'en contient qu'un petit nombre, qu'on trouve presque toutes en Europe & même en France ; il devient alors un genre assez naturel, en renvoyant aux *pea* le *briza eragrostis*, & n'y réunissant point les *uniola*. Ce sont ces considérations qui nous ont déterminés à l'en séparer, quoique M. de Lamarck ait cru devoir n'en faire qu'un seul genre, n'étant en effet que peu distingués des *briza* par leurs caractères généraux, mais bien différens par leur port. (Voy. UNIOLE.)

On trouve dans les *Illust. Gen.* tab. 45, fig. 1, le *briza media* Linn. ; fig. 2, le *briza maxima* Linn. Il faut ajouter à ces espèces :

6°. **BRIZE rouge.** *Briza rubens*. Lam.

Briza paniculata subspicilis ; spiculis cordato-ovalibus, erectis, novemfloris ; glumis margine rubris. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 187. n°. 1014.

Briza maxima, var. γ. Lam. Dict. n°. 5.

Cette espèce a de si grands rapports avec le *briza maxima*, que M. de Lamarck l'avoit d'abord prise pour une simple variété de cette plante ; elle a aussi quelques rapports avec les *uniola*. Son lieu natal & quelques autres caractères particuliers ont déterminé M. de Lamarck, dans ses *Illustrations*, à la regarder comme une espèce. Elle diffère du *briza maxima* par ses panicules moins simples, quoique peu ramifiées, par ses épillets plus nombreux, presque droits, & non penchés, composés d'environ neuf fleurs. Les balles sont d'une couleur ferrugineuse, rouge à leurs bords ; celles de la corolle un peu velues à leur partie supérieure.

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat dans les Indes. (V. f. in herb. Lam.)

7°. **BRIZE droite.** *Briza erecta*. Lam.

Briza paniculata subsessilis ; spiculis ovatis, erectis, subnovemfloris ; corollis acutiusculis, levibus. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 187. n°. 1015.

T E T 2

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, garnies de feuilles canaliculées. Ses fleurs sont disposées en une panicule terminale, droite, point étalée, presque resserrée en épi, composées d'épillets pollicellés, ovales, point penchés, contenant environ neuf fleurs. Les balles sont blanchâtres; celles de la corolle un peu aiguës, très-lisses.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à Monte-Video. (*V. f. in herb. Lam.*)

8.* BRIZE presque aïlée. *Briza subaristata*, Lam.

Briza paniculata cordatâ; spiculis ovatis, erectis, peristylis; corollis mucronatis, subaristatis. Lam. Ill. Gén. t. pag. 187. n°. 1016.

Cette espèce a des tiges droites, feuillées, terminées par une panicule resserrée, peu ramifiée, composée d'épillets pédicellés, ovales, redressés, de couleur verte, contenant environ sept fleurs; les valves de la corolle mucronées ou surmontées par une pointe toide, très aiguë, presque en forme d'arête.

Cette plante croît à Monte-Video, où elle a été découverte par Commerfon. (*V. f. in herb. Lam.*)

9.* BRIZE du Canada. *Briza canadensis*. Michx.

Briza erecta, longifolia, paniculâ laxâ; spiculis erectis, 4-10 floris; glumâ communi parvâ; florum valvâ exteriori ovali, acutâ. Michx. Flor. boreal. Amer. t. pag. 71.

Ses tiges sont droites, garnies de longues feuilles; ses panicules lâches, terminales, médiocrement ramifiées, composées d'épillets redressés, contenant de quatre à dix fleurs; les valves calicinales petites, ventrues; la valve extérieure de la corolle ovale, aiguë.

Cette plante a été découverte par Michaux au Canada.

* *Briza (geniculata), spiculis ovatis, calice florum breviori, culmo geniculato*. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. pag. 21.

BROCOLI : une des variétés du chou cultivé.

BRODLEA. (*Войок* BRODIE, *Suppl.*)

BRODIE. *Brodiaea*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des narcissées, voisin du genre de ce nom, renfermant des herbes exotiques à l'Europe, ayant pour caractère essentiel :

Une corolle tubulée; le limbe à six découpures régulières, muni, à son orifice, d'une couronne à trois folioles ;

trois; trois étamines; une capsule libre, à trois loges polyspermes.

ESPÈCES.

1. BRODIE à grandes fleurs. *Brodiaea grandiflora*. Smith.

Brodiaea corona foliolis indivisis. Smith, A&S. Soc. Linn. Lond. vol. 10. pag. 2.

Hookera coronaria. Salisb. Par. tab. 98.

D'une bulbe globuleuse & pleine sortent deux feuilles radicales, linéaires-lancéolées, aiguës, glabres, presque longues d'un pied; elles embrassent, par leur partie inférieure, une hampe solitaire, cylindrique, un peu tortueuse, munie d'environ six fleurs pédicellées, disposées en ombelle, accompagnées à leur base de bractées scarieuses, lancéolées. La corolle est d'un beau bleu, assez grande; le tube pâle, partagé, jusque vers son milieu, en six découpures élargies, lancéolées, recourbées; l'orifice muni d'une couronne à trois folioles oblongues, droites, très-entières, d'un jaune-clair, alternes avec les trois étamines; les filaments très-courts; les anthères oblongues, à deux lobes; l'ovaire pédicellé, elliptique, trigone, à trois lobes; le style cylindrique, presque de la longueur des étamines; le stigmate à trois lobes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, à la Nouvelle-Géorgie. (*Smith.*)

2. BRODIE agglomérée. *Brodiaea congesta*. Smith.

Brodiaea corona foliolis bifidis. Smith, A&S. Soc. Linn. Lond. vol. 10. pag. 3. tab. 1.

Elle ressemble à la précédente par ses racines, par ses feuilles & ses hampes; mais ses fleurs sont moins étalées, réunies en une petite ombelle terminale, munie de grandes bractées élargies, plus longues que les pédicelles. La corolle est d'un bleu-vif, plus clair sur la couronne, qui n'est jamais jaune, & dont les folioles sont à deux lobes aigus, beaucoup plus longs que les anthères; les filaments inférieurs entre les folioles de la couronne.

Cette plante a été recueillie, ainsi que la précédente, à la Nouvelle-Géorgie par M. Menzies, en 1792. (*Smith.*)

Observations. Ce genre avoit été déjà établi, avant M. Smith, par Salisbury, qui l'avoit nommé *hookera*. Nous ignorons pour quelle raison M. Smith lui a donné un autre nom.

BROME. *Bromus*. Ce genre, intermédiaire entre les avoines & les fétuques, contient plusieurs espèces, qui pourroient être placées indifféremment l'une parmi les fétuques. La distinction des espèces entr'elles offre d'autres difficultés, tellement embarrassantes à cause des variétés, que l'on voit souvent les mêmes auteurs varier dans

leur opinion, reconnoître comme espèces ce qu'ils avoient d'abord regardé comme variétés. D'autres forment de quelques-unes de ces variétés des espèces nouvelles, il en est résulté un grand embarras dans l'accord de la synonymie, ainsi qu'on peut le voir dans les observations suivantes, que nous bornerons à ce qui nous paroît le moins embrouillé. Le *bromus* de Théophraste & de Pline appartient à l'avoine, & non à ce genre.

M. de Lamarck a rétabli, dans ses *Illustrations*, le *bromus mollis* comme espèce, qu'il a figure, tab. 46, fig. 1. — Leers, Herb. pag. 36, tab. 11, fig. 1. — Weig. Obs. 7, tab. 1, fig. 4. — Curtis, Lond. Icon. — Haller, Helv. n°. 1504.

β. *Bromus* (nanus), *spiculis paucis, subpedunculatis, erectis, compressis, deltoideo-ovatis; glumis subimbricatis, subpedunculatis, apice acutis; aristis capillaribus, brevioribus, rectis*. Weig. Obs. pag. 3, tab. 1, fig. 9. Variété du *bromus mollis*.

Quoiqu'il ait l'apparence du *bromus scabellatus*, le *bromus mollis* s'en distingue par ses tiges moins hautes, par un duvet mou & un peu blanchâtre, répandu sur ses feuilles, sur leur gaine, sur les épillets & les nœuds de la tige. Ses feuilles sont molles; la panicule droite dans sa jeunesse, moins étalée; les pédicelles plus courts; & les fleurs plus rapprochées dans les épillets. J'ai rencontré des individus à peine hauts de six pouces, très-grêles, n'ayant qu'un ou deux, au plus trois épillets plus étroits, presque féchiles. Il y a quelques autres variétés, qui se sont mentionnées parmi les espèces douteuses.

Il faut retrancher du *bromus scabellatus*, n°. 1, la synonymie de la variété α (qui est le *bromus prostratus* Desf. & Suppl. n°. 2), y rapporter celle de la variété β, & illustr. tab. 46, fig. 1. — Kœl. Gram. 225. (Exclus. synonym. J. Bauh.) — *Bromus virens*, Weig. Obs. pag. 4, tab. 1, fig. 2.

Les tiges sont glabres à leurs articulations, ainsi que les feuilles & leurs gaines, excepté quelques poils rares; la panicule étalée, un peu penchée, peu garnie; les pédicelles réunis trois ou quatre en verticilles incomplets, soutenant des épillets glabres, ovales-oblongs, composés de six à huit fleurs presque cylindriques. L'aré & manque quelquefois.

Au *bromus prostratus*, n°. 2, ajoutez *gramen avenaceum, locustis emporibus, condicantibus, glabris & aristatis*. Tourn. Inst. R. Herb. 225, & Herbar.

Bromus purgans, n°. 3. (Exclus. synonym. Fewell) (Vid. *bromus catharticus*, Suppl.)

Le *bromus distachyum* Lam., n°. 5, a reçu plusieurs noms différents, qui se rapportent tous à la même espèce, quoique la plupart de leurs auteurs aient cru désigner presque autant d'espèces parti-

culières. C'est bien certainement le *bromus asper* Linn., & non son *bromus arvensis*; c'est le *bromus ramosus* Murr. Syst. veg. pag. 100. — *Bromus nemoralis* Hudf. Aug. pag. 51. — *Bromus nemorosus* Villars, Dauph. 2, pag. 117. — *Bromus montanus* Pollich, Palat. n°. 116. — Roth, Germ. 1, p. 49, & 2, pag. 141. — *Bromus hispidus* Curtis, Lond. Icon.

Le *bromus giganteus* Weig. Obs. pag. 11, tab. 1, fig. 5. — Linn. & Lam. n°. 9, est le *bromus triglophus* Lam. Ill. n°. 1063. — *Folium giganteum* Villars, Dauph. 2, pag. 110.

Le *bromus pratensis* Lam. Dict. n°. 10 (non Linn.), est le *bromus erectus* Smith, Flor. brit. 1, pag. 131, & Transact. Linn. 4, pag. 281. — Kœl. Gram. pag. 240. — *Bromus angustifolius* Schrank, Bavar. 1, p. 36. — *Bromus angustifolius* All. Pedem. n°. 2214. — *Bromus perennis* Villars, Dauph. 2, pag. 122. — *Bromus arvensis* Pollich, Pal. n°. 118.

M. de Lamarck soupçonne que le *bromus racemosus* Linn. appartient à cette espèce. Comme Linné ne cite aucune figure de cette espèce, il est difficile de prononcer sur l'identité de cette espèce avec celle dont il est ici question, qui paroît cependant s'y rapporter assez bien. Comme il y a un *bromus pratensis* de plusieurs autres auteurs, & que M. de Lamarck le nomme *bromus pratensis* dans un ouvrage, & *bromus arvensis* dans un autre, pour éviter toute confusion, celui-ci doit conserver en latin le nom que M. de Lamarck lui a donné en français, *bromus erectus* Smith (brome à épillets droits, n°. 10).

22. BROME des champs. *Bromus arvensis*, Linn.

Bromus paniculatus caete, *pedunculatis ramosis; spiculis lanceolatis, glaberrimis; aristis rectis, fuscato brevioribus; foliis glaberrimis*. Decand. Synop. Plant. pag. 131. — Linn. Spec. 113. Non Lam. — Kœl. Gram. 220. — Flor. dan. tab. 293. — Scheuch. Gram. 262. tab. 5, fig. 15. — Leers, Herb. n°. 84. tab. 11, fig. 3. — Weig. Observ. pag. 6, tab. 1, fig. 3.

Bromus (verficolor), *paniculatus patens; spiculis angustis, linearibus, aristis longioribus*. Pollich, Palat. n°. 109.

Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, glabres, à cinq ou six articulations purpurines; les feuilles rudes, parsemées de quelques poils à leur face supérieure; les gaines striées, munies à leur orifice d'une membrane déchiquetée; la panicule droite, un peu unilatérale, étalée; les pédicelles hérissés, simples ou rameux, à demi verticilles, soutenant des épillets ovales-lancolés, étroits, aigus, un peu comprimés, rudes, verdâtres, composés de cinq à sept fleurs; les valves du calice inégales, un peu obtuses; la valve extérieure de la corolle un peu échancrée à son sommet,

munie d'une arête droite, de deux tiers plus courte que la corolle.

Cette plante croît dans les prés & les champs. (V. v.)

23. BROME des prés. *Bromus pratensis*. Ehrh.

Bromus paniculatus erecto-patente, pedunculis subsimplicibus; spiculis ovato-lanceolatis, compressis; aristis fuscis, longitudine; vaginis inferioribus mollioribus comenosis. Decand. Synops. Plant. pag. 113. — Ehrh. Gram. 116. — Kocl. Gram. 239. — Hufm. Germ. 3. pag. 53.

Bromus (arvensis), panicula ramosa, subcorymbosa; glumis levibus, sexfloris, longius aristatis; folio villosis. Lam. Ill. Gen. 1. n°. 1064.

Bromus giganteus. Leers, Herb. n°. 86. tab. 10. fig. 1.

Ce brome se rapproche des deux espèces précédentes; il diffère de la première par sa panicule étalée, par ses épillets plus élargis, par ses feuilles; de la seconde, par ses arêtes beaucoup plus longues, par les feuilles pileuses, par leurs gaines pubescentes, surtout les inférieures. Les panicules sont droites, étalées; les pédoncules un peu rudes, alongés, capillaires, simples ou un peu rameux; les épillets glabres, ovales-lanceolés, comprimés, contenant cinq à huit fleurs aiguës; les arêtes de la longueur des valves; celles-ci d'un vert tirant quelquefois sur le violet, un peu scarieuses à leurs bords; la valve extérieure de la corolle entière à son sommet.

Cette plante croît dans les champs & dans les prés. (V. v.)

Le *bromus sterilis* Linn. & Lam. n°. 7, est le *bromus distichus*. Moench. Method. 192. — *Bromus grandiflorus*. Weig. Obs. pag. 9. La variété à Lam., *bromus testatorum* Linn., est une espèce distincte.

Le *bromus inaequalis* Lam. n°. 16, est bien certainement la même plante que le *bromus filipoides* Linn. M. Desfontaines, dans sa Flore du mont Atlas, a rangé cette plante parmi les *fesuca*. Je l'ai recueillie en Barbarie, sur les bords de la mer, ainsi que le *bromus rubens* Linn.

Le *bromus dilatatus* Lam. n°. 13, est le *bromus madritensis* Linn. — Vahl, Symb. 2. pag. 23. — *Bromus villosus*. Forsk. Fl. ægypt. arab. pag. 29. — *Bromus muralis*. Huds. Angl. pag. 50. — *Fesuca madritensis*. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 91. — On peut regarder comme une simple variété la plante suivante :

Bromus (rigidus), spica multiflora, lato-lanceolata, rigidis; floribus diandris, panicula corymbosa. Roth, Catal. bot. 1. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 437.

Bromus (diandrus), spiculis lanceolatis, nervosis, diandris. Smith, Flor. brit. 1. pag. 135.

Cette plante diffère du *bromus madritensis*, var. «, par ses tiges plus basses, par les feuilles plus étroites, filiformes; par les panicules resserrées en épi, bien plus étroites & un peu unilatérales. Je l'ai trouvée sur les côtes de Barbarie. On n'y a observé que deux étamines; ce que je n'ai point vérifié.

Le *bromus gynandrus* Roth, Catal. 2. pag. 15, se rapproche beaucoup du *bromus diandrus* du même; il est plus petit dans toutes les parties. Sa panicule est plus touffue, étalée; les pédoncules roides, plus courts, ainsi que les épillets. Quant à l'insertion des deux étamines sur l'ovaire, &c non sur le réceptacle, cette position est trop singulière, trop éloignée des caractères d'une famille aussi naturelle que celle des graminées, pour qu'elle puisse être admise sans un examen très-scrupuleux. Cette plante croît en Espagne, &c n'est probablement qu'une variété du *bromus diandrus*.

BROME rougeâtre, n°. 11. *Bromus rubens*. Linn. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 34. tab. 45. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 94.

Gramen avenaceum, spica simplici, breviori & cressiori; locustis densissimis, longius aristatis. Tourn. Inst. R. Herb. 524, & Herbar.

BROME rameux, n°. 17. *Bromus ramosus*. Linn. — Vahl, Symb. 2. pag. 22. C'est la même plante que le *fesuca phaniceoides* Linn., & Ill. n°. 1042. — *Bromus Plukenetii*. All. Pedem. n°. 2233. — *Triticum phaniceoides*. Decand. Flor. franç. 3. pag. 85. (Voyez FETUQUE, n°. 16.)

Les bromes, plutôt en épis que paniculés, à épillets sessiles, & dont les arêtes sont terminales, tels que le *bromus pinnatus* — silvaticus, &c., ont été regardés par les uns comme des *fesuca*, & par d'autres comme appartenant au *triticum*.

Le *bromus ovatus* Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 591, fig. 2, est le *trisetum ovatum* Pers. (Voyez TRISTETAIRE, Did., & AVOINE, Suppl.)

24. BROME multi flore. *Bromus multiflorus*. Weig.

Bromus paniculatus patente; spiculis pubescentibus, lanceolatis, compressis; glumis nudis, marginatis, imbricatis; aristis capillaribus, aequalibus, rectis. Weig. Observ. bot. pag. 2. tab. 1. fig. 1. — Roth, Germ. 1. pag. 47, & 2. pag. 134. — Kocl. Gram. pag. 232.

Bromus (hordeaceus), panicula cæssa, coccata. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 77. — Flor. suec. n°. 87.

Bromus ficalinus. Leers, Herb. n°. 81. tab. 11. fig. 2.

Festuca graminea, glumis hirsutis. C. Bauh. Pin. 9. & Theatr. 143. — Scheuch. Gram. 250. tab. 5. fig. 9.

Cette plante, que plusieurs botanistes ont distinguée comme espèce, a de si grands rapports avec les *bromus mollis* & *secalinus*, que je ne la crois qu'une variété de ces deux plantes, qu'on a peine à reconnoître elles-mêmes comme espèces, tant elles se confondent quand on les suit dans leurs différents états. Quoi qu'il en soit, celle dont il s'agit ici en diffère par ses tiges glabres, munies de deux ou trois nœuds pubescents, de couleur purpurine; par ses feuilles glabres à leurs bords. Leurs gaines sont garnies d'un duvet court, ferré, blanchâtre; la panicule médiocrement étalée, composée d'épillets lancéolés, plus allongés, plus étroits, plus ferrés, contenant de huit à douze fleurs; les balles pubescentes, blanches & scarieuses à leurs bords; les arêtes droites, égales, capillaires.

Cette plante croît sur les collines & dans les champs. ○ (V. v.)

15. BROME épais. *Bromus grossus*. Desfont.

Bromus paniculatus laxus, nautante; spiculis compressis, oblongis, glabris; caulis foliisque subglabris; vaginis hirsutis. (N.) Desfont. l. c.

Bromus secalinus, var. α. Lam. Dict.

Gramen gros montbelgardensium. J. Bauh. Hist. 2. pag. 431. Icon. — Magn. Bot. 121. — Vaill. Paris. 94. n°. 84, & Herb. — Barrel. tab. 24. fig. 1.

Quelques auteurs ont confondu ce brome avec le *bromus secalinus*. D'autres, qui ont écrit sur les plantes des environs de Paris, ont pris cette plante pour le *bromus squarrosus* Linn., qui ne se trouve que dans nos départements méridionaux, bien différent d'ailleurs de cette espèce. Celle-ci a des tiges glabres, sim, les, hautes d'un à deux pieds, munies de quelques nœuds glabres & renflés. Les feuilles sont courtes, un peu roides, d'une médiocre largeur, rudes au toucher, droites, presque glabres; les gaines revêtues d'un duvet mou & blanchâtre; la panicule lâche, inclinée; les péduncules étacés, réfléchis, soutenant un épillet glabre, oblong, comprimé, d'un pouce & plus de long, sur quatre à six lignes de large; les valves du calice inégales, obtuses, striées, contenant de six à quinze fleurs; celles de la corolle un peu renflées, puis roulées autour de la semence; la supérieure terminée par une arête droite, longue, un peu contournée; les semences longues, étroites, adhérentes à la corolle.

Cette plante croît dans les moissons, aux environs de Paris, &c. ○ ?

16. BROME à gros épis. *Bromus macrostachys*. Desfont.

Bromus culmo basi geniculato; spiculis maximis, teretibus; aristis rigidis, patentibus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 96. tab. 19. fig. 2.

Ses tiges sont grêles, droites, très-glabres, cylindriques, hautes d'un ou deux pieds, geniculées à leur partie inférieure; les feuilles étroites, rudes, piluleuses, particulièrement sur leur gaine; la panicule presque unilatérale, composée de gros épillets presque cylindriques, glabres, aigus, longs d'un pouce & plus, soutenus par des pélicelles courtes, solitaires ou réunis deux ou trois; les valves calicinales inégales, aigues, contenant quinze ou seize fleurs; la valve extérieure de la corolle plus grande que l'intérieure, convexe, scarieuse à ses bords, bifide à son sommet, pourvue d'une arête roide, horizontalement divergente; la valve intérieure obtuse, linéaire, ciliée, membraneuse; les semences lisses, oblongues, obtuses.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans le mont Atlas, aux environs de Tlemcen. ○

17. BROME queue de renard. *Bromus alopecuroides*. Poir.

Bromus paniculatus compressus, erectus; spiculis oblongis, pubescentibus, quindecimfloris, subsessilibus; aristis inferis spiraliter contortis. Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 100.

Bromus (contortus), foliis villosis; panicula coarctata, erecta; spiculis quindecimfloris, subsessilibus, pubescentibus; aristis basi contortis. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 95. tab. 25.

Ses tiges sont droites, presque glabres, velues à leurs articulations, hautes d'environ deux pieds & demi; les feuilles un peu molles, ciliées, velues, particulièrement sur leur gaine; la panicule droite, roide, allongée, toulée, ferrée; les épillets sessiles ou médiocrement pédicellés, comprimés ou légèrement cylindriques, longs d'un pouce & plus, lancéolés, un peu pileux, composés de douze à quinze fleurs; les valves calicinales aigues, rugées; celles de la corolle ciliées; l'extérieure fourmée de deux pointes, munie d'une arête contournée, roide, arquée à sa base, puis droite.

J'ai découvert cette espèce en Barbarie, dans les prés, aux environs de Lacalle. ○ (V. v.)

18. BROME lanugineux. *Bromus lanuginosus*.

Bromus paniculatus subcoarctatus, erectus; spiculis lanceolatis, subcompressis, lanuginosis, subquindecimfloris; aristis vix contortis, divaricatis. (N.)

Bromus divaricatus, var. A. Loisel. Journ. bot. 2. pag. 214.

β. *Bromus (divaricatus), panicula erecta, sub-*

contrasté; *spiculis linearilanceolatis*, 10-15 *floris*, *pubescentibus*; *glumâ corollâ exteriori bifidâ, acutâ*; *aristis basi constrictis, demum divaricatis*. Var. *n.* Loisel. l. c.

Cette espèce a des rapports avec le *bromus macrostachys*, dont elle diffère par ses épillets lanugineux, moins serrés entr'eux. Ses tiges sont droites, feuillées, cylindriques; les panicules droites, composées d'épillets pédonculés, lancéolés, un peu comprimés, longs d'environ un pouce & plus, assez larges, contenant douze à quinze fleurs; les valves calicinales concaves, oblongues, striées, velues, à peine aiguës; la valve extérieure de la corolle blanchâtre, lancéolée, très-velue, bifide, aiguë à son sommet; les arêtes brunes, roides, recourbées, très-ouvertes; à peine courbées à leur base; les semences brunes, oblongues, obtuses, enveloppées par la baïe de la corolle. Dans la variété *n.*, les épillets ne font point lanugineux, mais seulement pubescents.

Cette plante croît en Provence, aux environs de Toulon & aux îles d'Hyères. (*V. f. in herb. Desfont.*)

29. BROME du Japon. *Bromus japonicus*. Thunb.

Bromus paniculâ patente, ramosa; spiculis oblongis, glabris; aristis divaricatis. Thunb. Flor. jap. pag. 52. tab. 11.

Ce brome diffère du *bromus arvensis* par ses épillets oblongs & par ses arêtes étalées; du *bromus scitulus* par les valves imbriquées, non distantes; du *bromus squarrosus* par ses épillets glabres, une fois plus étroits, & par les panicules rameuses. Les tiges sont hautes de huit à dix pouces, géniculées & un peu couchées à leur base; les feuilles velues, principalement sur leur gainé, plus courtes que les tiges; les panicules étalées, un peu inclinées; les pédoncules & les pédicelles glabres, flexueux, capillaires; les épillets glabres, composés de cinq à sept fleurs; les valves imbriquées, un peu membraneuses à leurs bords; l'arête un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît au Japon. (*Thunb.*)

30. BROME brizolée. *Bromus brizoides*. Lam.

Bromus paniculâ erectâ; spiculis ovatis, glabris, aristatis; corollâ superne dilatato-auriculatâ, membranaceâ. Lam. ill. 1. pag. 193. n°. 1060.

Cette plante pourroit être considérée comme le type d'un genre nouveau, n'ayant ni le port ni les caractères complets des *bromus*. Ses tiges sont droites, un peu grêles, cylindriques; les feuilles glabres, striées; les panicules droites, étalées, composées d'épillets pédonculés, glabres, ovales, petits, assez semblables à ceux des *briza*; soutenus, comme eux, par des pédicelles presque capillaires, alongés; les valves du calice comprimées en

carène, lancéolées, égales, très-aiguës, scarieuses à leurs bords, contenant six à huit fleurs imbriquées, très-serrées; la valve extérieure de la corolle un peu épaisse, striée, presque lancéolée, aiguë, bordée à son contour par une petite membrane diaphane, élargie vers le sommet en deux lobes obtus; l'arête droite, terminale, point couronnée.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Video. (*V. f. in herb. Lam.*)

31. BROME des sables. *Bromus arenarius*. Labill.

Bromus villosus, paniculâ secundâ; patulâ; spiculis oblongis, quinquefloris. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 23. tab. 28.

Ses tiges sont velues, cylindriques, garnies, dans toute leur longueur, de feuilles nerveuses, également velues; les gaines munies à leur orifice d'une membrane dentée. Les fleurs sont disposées en une panicule étalée, unilatérale; les valves du calice aiguës, un peu pileuses, à trois ou cinq nervures; la valve extérieure plus courte; la valve extérieure de la corolle un peu pileuse, bifide à son sommet, munie en dessous d'une arête droite, rude; la valve intérieure plus courte, ovale-oblongue, ciliée; les anthères presque globuleuses, à deux loges; les semences grêles, oblongues.

Cette plante croît à la terre de Van-Leuwin. (*Labill.*)

32. BROME lancéolé. *Bromus lanceolatus*. Roth.

Bromus paniculâ erectâ, patente; spiculis lanceolatis, glabris, subcompressis; aristis floralibus rectis, feminalibus refractis. Roth, Catal. bot. 1. pag. 18.

Gramen hordeaceum, erectum, minimum. Burb. Centur. 5. Append. 42. tab. 19.

Cette espèce a quelques rapports avec le *bromus pratensis*. Ses tiges sont droites, roides, feuillées; les feuilles striées, un peu pileuses; les gaines velues; la panicule droite, médiocrement étalée; les pédoncules inégaux, verticillés, soutenant des épillets glabres, étroits, lancéolés, aigus, verdâtres, longs de six à huit lignes, composés de huit à dix fleurs un peu comprimés; les valves calicinales inégales, un peu orbiculées; l'extérieure beaucoup plus grande & plus large, ainsi que celle de la corolle, qui est orbiculée & bifide à son sommet, munie d'une arête fine, droite, divergente après la fécondation.

Cette plante croît aux îles Canaries & sur les bords de la mer Caspienne, aux lieux secs & stériles. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (*V. v.*)

33. BROME bifide. *Bromus bifidus*. Thunb.

Bromus paniculâ erectâ, ramosa; spiculis ovatis, subtrifloris;

subtrifloris; glumis bifido-fetaceis, aristâ divaricatâ.
Thunb. Flor. jap. pag. 53.

Cette plante ressemble plutôt à une avoine qu'à un *bromus*. Ses tiges sont droites, simples, striées, hautes de deux pieds; les feuilles linéaires, pubescentes, courtes, striées; les panicules ramoules, peu étalées; les épillets alternes, à deux, trois & quatre fleurs ovales, à peine longues d'une ligne; les valves étalées; le calice à deux valves inégales, glabres, aiguës, marquées de trois lignes saillantes; la valve extérieure de la corolle bifide à son sommet, à deux pointes sétacées, munie d'une arête géniculée, étalée horizontalement, recourbée à son sommet, plus longue que les épillets.

Cette plante croît au Japon, aux environs de la ville de Nagasaki. (Thunb.)

34. *BROMUS* guilino. *Bromus catharticus*, Vahl.

Bromus paniculâ patente, erectâ, subsimpliciâ; spiculis lato-lanceolatis, striatis, scabris; aristis brevibus, rectis. Vahl, Symbol. 2. pag. 22.

Gramen bromoides, catharticum, vulgò guilino. Feuill. Peruv. pag. 705. tab. 1.

Elle se rapproche du *bromus purgans*, dont elle diffère par les gaines non ciliées, par les épillets plus larges, plus aigus; par ses racines épaisses, rameuses, charnues, légèrement écaillées, d'un vert-jaunâtre en dedans, d'une saveur piquante, munies de fibres filiformes, longues d'un pied. Les tiges sont hautes & droites, garnies de larges feuilles très-longues, glabres, vertes, striées; la panicule droite, étalée, presque simple; les pédoncules longs, filiformes, soutenant un, rarement deux épillets pédicellés, larges, lancéolés, striés, tudes au toucher, composés au moins de quinze fleurs, surmontées d'une arête courte & droite.

Cette plante croît au Chili & dans les environs de Lima, aux lieux humides. « C'est, dit Feuillée, un des meilleurs purgatifs & un des plus en usage chez les habitants du Chili. On met infuser, pendant une nuit, une quantité de la racine proportionnée à l'âge du malade, auquel on fait boire un grand verre de cette infusion le plus abondamment possible. Cette boisson n'a rien de dégoûtant. »

35. *BROMUS* sans arêtes, n°. 4. *Bromus inermis*. Linn.

Gramen pratense, elatius, locustis longis, squamosis, non aristatis. Buxb. Cent. f. p. 21. tab. 40. fig. 2.

Festuca (speciosa), paniculâ diffusâ; spiculis teretibus, subulatis, muticis aristisque. Schreb. Spic. pag. 59.

Festuca posoides. Thuill. Paris, édit. 2. pag. 51. Botanique, Supplément. Tome I.

Cette espèce, qui se présente d'abord sous l'apparence d'un *festuca*, appartient réellement au *bromus*, quoique la plupart de ses fleurs soient privées d'arêtes; mais celles qui en sont pourvues, ont cette arête placée un peu au dessous du sommet des valves. Les tiges sont droites, glabres, hautes de deux ou trois pieds; les feuilles planes & glabres; les inférieures un peu velues; la panicule très-longue, étalée; les valves calicinales aiguës, inégales, contenant sept à quinze fleurs; la valve extérieure de la corolle oblongue, à peine obtuse; l'arête droite, dorsale ou terminale, à peine longue d'une ligne, souvent nulle.

36. *BROMUS* à grands épillets. *Bromus maximus*. Desfont.

Bromus foliis villosis, paniculâ patulo-erectâ; aristis longis, rectis; rachis pubescentis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 95. tab. 26.

Bromus matricensis. Cavan. Ic. Rar. 6. pag. 67.

Gramen avenaceum, paniculatum, locustis fradiceo-albidis. Tourn. Coroll. 19. — Vail. Herb.

Bromus sterilis, var. Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 99.

Quelques auteurs ont cru reconnaître une telle affinité entre cette plante & le *bromus matricensis*, qu'ils l'ont presque considérée comme la même espèce. C'est sans doute fautive de la connaître. Ses rapports sont bien plus nombreux avec le *bromus sterilis*; elle lui ressemble tellement, que je ne l'avois d'abord considérée & mentionnée que comme une variété à plus grands épillets. M. Desfontaines en a fait une espèce.

Ses tiges sont très-hautes, droites, cylindriques, striées; les feuilles planes, larges, velues, particulièrement sur leur gaine; la panicule droite & non inclinée, médiocre. On n'étale, presque ou latérale; les épillets sessiles ou pédicellés sur un pédoncule commun, longs d'un pouce & demi; le rachis & les pédoncules rudes, pubescents; les valves calicinales subulées, presque égales, presque de la longueur des épillets; la valve extérieure de la corolle allongée, siève, membraneuse à ses bords, bifide à son sommet; l'arête droite, très-rude, longue de deux ou trois pouces.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de la Barbarie, aux environs du bastion de France. O (V. v.)

37. *BROMUS* du Canada. *Bromus canadensis*. Michx.

Bromus paniculâ laxâ, capillari, pendulâ; spiculis subtrifloris, compressis; floribus valvâ exteriori breviter aristatâ, versis marginem villosâ. Michaux, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 65.

Ses tiges sont droites, cylindriques, médiocres.

VVV

ment velues à leurs articulations, garnies de feuilles parsemées de poils rares; la panicule lâche, terminale, penfante, capillaire; les valves du calice inégales, contenant environ fix fleurs comprimées; la valve extérieure de la corolle velue vers ses bords, pourvue d'une arête courte.

Cette plante a été découverte par Michaux au Canada.

38. BROME des toits. *Bromus tectorum*.

Bromus hirsutus, paniculâ nutante, pauciflorâ; locustis quinquefloris, hirsutis; glumis acutè lanceolatis. Haller, Helv. n°. 1508.

Bromus paniculâ nutante, spiculis linearibus. Linn. — Leers, Herborn. n°. 85. tab. 10. fig. 2.

Gramen murorum, spicis pendulis, angustioribus. Tournef. Parif. 91.

Festuca avenacea, sterilis, pedicellis brevioribus & spicis erectis. Rai, Angl. 3. pag. 413. — Pluk. Almag. 174. tab. 299. fig. 2.

Festuca avenacea, sterilis, pedicellis brevioribus & spicis erectis. Morif. Hist. 3. pag. 212. §. 8. tab. 7. fig. 13.

Cette espèce a un port qui la distingue au premier coup-d'œil du brome stérile, quoique plusieurs auteurs ne l'aient regardée que comme une variété. Ses tiges sont plus courtes & plus grêles; ses feuilles couvertes de poils mous, quelquefois glabres; la panicule très-velue, inclinée d'un même côté, bien moins garnie; ses épillets plus courts, linéaires, ne contenant au plus que cinq fleurs; les arêtes moins longues.

Cette plante croît dans les lieux stériles, sur la terre, sur les vieux murs. ☉ (F. v.)

39. BROME roseau. *Bromus arundinaceus*. Roth.

Bromus paniculâ erectâ, contrahâ; spiculis oblongis, scabris, subaristatis, paucifloris. Roth, Germ. 2. pag. 141. — Weig. Obf. bot. pag. 12. Animadv. — Schreb. Spicif. Flor. lipf. pag. 37. — Kœler, Gram. 217. Sub festuca.

Bromus (littoreus). *paniculâ erectiusculâ, scabrâ; spiculis oblongis, subquadrifloris, glabris, mucosis*. Retz. Scand. edit. 2. n°. 140. — Willden. Spec. Plant. 1. pag. 433.

Gramen arundinaceum, locustis viridi-spadicis, foliaceis, brevibus aristatis. Scheuch. Gram. 266. tab. 5. fig. 18.

Bromus paniculâ laxâ; locustis quadrifloris, brevissimè aristatis. Haller, Helv. n°. 1511.

Poa paniculâ nutante, laxâ; spiculis oblongis, multifloris, sæpè aristatis. Gmel. Sibir. 1. pag. 110. tab. 21. ?

Ce brome, un des plus communs de ce genre, paroît se rapprocher des *bromus dumetorum* & *giganteus*. Peut-être n'est il qu'une variété intermédiaire entre ces deux espèces; ce que je n'ose affirmer, ne le connoissant que d'après les descriptions; il se rapproche aussi des festuques. Ses racines sont rampantes; ses tiges droites, hautes de quatre à six pieds; ses feuilles planes, glabres, rudes, lisses, se roulant à mesure qu'elles se dessèchent, longues d'un ou de deux pieds; la panicule droite, serrée, longue d'un pied & plus, lâche, étalée en vieillissant, un peu inclinée, unilatérale; les pédoncules rudes, geminés, comprimés, flexueux, ainsi que les pédicelles; les épillets droits, cylindriques, oblongs, un peu obois, puis légèrement comprimés; les valves calicinales un peu rudes, très-aiguës, inégales, contenant de quatre à six fleurs; la valve extérieure de la corolle rude, glabre, bifide, très-aiguë, surmontée d'une arête droite, roide, courte, longue d'environ une ligne; la valve intérieure au moins aussi longue que l'extérieure, bifide, obois, lancéolée, rude & verte à ses bords.

Cette plante croît en Suisse, en Allemagne & dans la Suède. x

40. BROME verticillé. *Bromus verticillatus*. Cavan.

Bromus paniculâ aperiâ; pedunculis horizontalibus, verticillatis, elongatis, simplicibus ramposisque. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 66. tab. 590.

Ses tiges sont hautes de trois pieds & plus, glabres, articulées, d'un rouge-pâle aux nœuds; les feuilles linéaires, plus courtes que les gaines; la panicule éralée; les pédoncules verticillés; chacun d'eux divisé en cinq ou huit pédicelles inégaux, capillaires, terminés par un épillet glabre, long d'un pouce, composé d'environ douze fleurs; les valves du calice concaves, aiguës; celle de la corolle terminée par une arête courte & droite.

Cette plante croît en Espagne, au royaume d'Aragon. (Description, ex Cavan.)

41. BROME pâle. *Bromus pallens*. Cavan.

Bromus paniculâ erectâ, subcontrahâ; pedunculis inæqualibus, spiculis quinquefloris; aristis capillaribus, longissimis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 66. tab. 591. fig. 1.

Ses tiges, hautes de deux ou trois pieds, sont glabres, d'un brun-violet à leurs nœuds; les feuilles glabres, linéaires, longues de trois ou quatre pouces; les panicules droites, un peu serrées, alongées, d'un vert-pâle; les pédoncules verticillés, terminés la plupart par deux épillets pédicellés, comprimés, composés d'environ cinq fleurs; la valve extérieure du calice tubuleuse, plus courte; l'intérieure concave; les valves de la co-

rolle plus longues que le calice; l'extérieure plus grande, concave, aiguë & bifide à son sommet, munie d'une arête capillaire, longue d'un pouce & plus.

Cette plante croît aux îles Manilles. (Cavan.)

41. BROME hordéiforme. *Bromus hordeiformis*. Lam.

Bromus paniculatus spicatus; spiculis subsessilibus, erectis, striatis, glabris, subquadrifloris; glauculo ultimo sterili. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 195. n°. 1076.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *bromus rigens*; elle a un peu le port de l'*hordeum marinum*; elle est glabre, mais rude au toucher sur toutes les parties. Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'environ deux pieds; les feuilles planes, larges, très-aiguës, striées, ouvertes horizontalement; les panicules simples, serrées en épi, droites, longues d'environ un demi-pied, composées d'épillets sessiles, alternes, serrés contre l'axe; les valves calicinales inégales, très-aiguës, striées, prolongées en arête à leur sommet; elles contiennent au moins quatre fleurs; les valves de la corolle oblongues, égales; l'extérieure aiguë, surmontée d'une arête presque terminale, droite, longue, un peu torse; la valve intérieure obtuse.

Cette plante croît en Italie. ○? (V. v.)

42. BROME grêle. *Bromus gracilis*. Weig.

Bromus spica terminali, debili; spiculis alternis, remotis, teretibus, subulatis, glabris, aristis longioribus. Weig. Obf. pag. 15. tab. 1. fig. 11. — Leyff. Hal. n°. 116. — Roth, Germ. 1. pag. 42, & 2. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 438.

Bromus silvaticus. Smith, Flor. brit. 1. pag. 136.

Cette plante se distingue du *bromus pinnatus* & *silvaticus* par son port, par ses épillets glabres, point recourbés; par la délicatesse de ses tiges & de ses panicules; par la longueur des arêtes. Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, lisses, grêles, fistonneuses, velues à leurs articulations; les feuilles planes, assez larges, très-aiguës, d'un vert glauque, rudes en dessus, pileuses vers leur base, mais principalement sur leur gaine. L'épi est fort grêle, terminal, un peu incliné, très simple, composé d'épillets droits, alternes, sessiles, dits, au nombre de huit à dix, étroits, cylindriques, tubulés, rapprochés de l'axe; les valves calicinales acuminées, contenant huit à dix fleurs; la valve extérieure de la corolle glabre, lancéolée, terminée par une arête droite, capillaire, presque une fois plus longue que la corolle; la valve intérieure courte & tronquée.

Cette plante croît dans les forêts de l'Europe, aux lieux ombragés. ✕ (V. v.)

44. BROME touffu. *Bromus cespitosus*.

Bromus (flexuosa caespitosa), culmo filiformi; foliis capillaribus, convolutis; spiculis elongatis, compressis, subaristatis. Desf. Flot. atlant. 1. p. 91. tab. 24. fig. 1.

Bromus pinnatus. Linn. var. β. — Smith, Herb. Linn.

Gramen loliaceum, corniculatum, veluti frutescens, foliis angustissimis. Tourn. Inf. R. Herb. 517, & Herb.

Gramen loliaceum, minus, spica brevi prolonga, capillato folio. Tourn. Inf. R. Herb. 517, & Vaill. Herb.

Confondue par Linné avec le *bromus pinnatus*, cette plante en diffère par des caractères assez saillants. Ses tiges sont droites, filiformes, hautes de deux pieds & plus, souvent rameuses à leur base, munies à leur partie inférieure, de feuilles glauques, nombreuses, en touffes racemeuses, capillaires, roulées à leurs bords, glabres, striées; la panicule composée d'épillets alongés, comprimés, ordinairement pédicellés, droits, glabres, solitaires, rarement geminés, contenant de neuf à quinze fleurs imbriquées sur deux rangs; les valves calicinales inégales, concaves, aiguës; celles de la corolle oblongues, striées, membraneuses à leurs bords; les intérieures plus courtes, obtuses, linéaires; les extérieures pourvues, seulement aux fleurs supérieures, d'une arête courte, droite, terminale. Quoique la figure donnée par M. Desfontaines représente les épillets sessiles, j'ai vu, dans son herbier, des individus de cette plante dont les épillets étoient pourvus de pédicelles filiformes, longs d'environ six pouces.

Cette plante a été découverte en Barbarie, sur les bords de la mer, par M. Desfontaines. ✕ (V. f.)

45. BROME à longues feuilles. *Bromus longifolius*. Schoub.

Bromus culmo basi ramoso, foliis involuto subulatis, culmum aequantibus; spiculis teretibus, recurvatis. Schoub. Maroc. edit. germ. pag. 31.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *bromus ramosus*, dont elle n'est guère distinguée que par son port & par ses feuilles beaucoup plus longues. Ses tiges sont très-rameuses à leur base, lisses, hautes d'un pied & demi; les feuilles roulées, subulées, rudes, pubescentes, au moins de la longueur des chaumes. La panicule est en forme de grappe, composée de dix à douze épillets alternes, sessiles, cylindriques, tubulés, rapprochés du rachis à leur base, puis recourbés, à six ou sept fleurs; les valves du calice glabres, inégales, striées; celles de la corolle inégales; l'extérieure plus grande,

V v v v

un peu aristée; l'intérieure tronquée, ciliée à ses bords.

Cette plante croît dans les plaines maritimes de Tanger. (Schoub.)

* *Espèces douteuses ou moins connues.*

* *Bromus* (avenaceus), paniculâ coarctatâ, subsimplici; spiculis erectis, glabris, sive seu quadrifloris, aristatis. Lam. Ill. 1. pag. 194. n°. 1071.

Cette plante a le port de l'*avena pratensis*; mais les arêtes sont presque terminales, droites, non dorsales, comme dans les avoines. Sa panicule est restreinte, presque simple; ses épillets droits, glabres, contenant trois ou quatre fleurs. Son lieu natal n'est pas connu.

* *Bromus* (leptostachys), caespitosus, paniculâ strictâ, pedunculis subsimplicibus; spiculis ovato-lanceolatis, glaberrimis, subquinguefloris; glumis nervosis, aristisque purpurascens; vaginis foliisque pilosis. Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 95.

An *bromus pratensis*? Ehrh.

Cette espèce, qui se trouve dans les forêts & les prairies, n'est peut-être qu'une variété du *bromus mollis*. Ses tiges croissent en touffes gazonneuses. Ses feuilles sont pileuses, ainsi que les gaines; les panicules roides; les pédoncules presque simples; les épillets très-glabres, ovales linéaires, contenant environ cinq fleurs; les valves calicinales, nerveuses, purpurines, ainsi que les arêtes.

* *Bromus* (conglomeratus), caespitosus, spiculis ovatis, ciliatis, in capitulum conglomeratis, vaginisque tomentosis. Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 95.

Cette plante, quoique différente par son port, doit peut-être rentrer également parmi les variétés du *bromus mollis*. Ses tiges, hautes d'un pied, naissent en touffes gazonneuses. Les feuilles ont leur gaine romescente. Les épillets sont agglomérés en tête, velus, composés de huit fleurs; les valves calicinales moins larges que dans la précédente. Elle a été recueillie aux environs de Montpellier par M. Thibaud.

* *Bromus* (pechinatus), paniculâ patente; spiculis ovatis, glabris; corolla valvulâ interiore ciliatâ, muticâ. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp.

* *Bromus* (simplex), paniculâ simplici; spiculis sessilibus, 8-10 floris, glabris; aristis subdorsalibus, divaricatis; vaginis villosis. Pers. Synopf. Plant. 1. pag. 96. Habitat....

La crainte de mentionner plusieurs autres espèces peut-être déjà décrites sous d'autres noms, & qu'on ne connaît, m'ont déterminé à ne point en parler: tels sont le *bromus lanceolatus*, Roth, Catal. 2. pag. 18; le *bromus ligustricus*, Jacq. Fragm. &c.

BROMELIA. (Voyez ANANAS.)

BROMELIACÉES (Les) ou les ANANAS, famille de plantes monocotylédones, dépourvues de corolle, ayant les étamines attachées au calice. Celui-ci (la corolle, selon Linné) est ramifié adhérent à l'ovaire, tantôt libre; il est partagé en six découpures plus ou moins profondes, dont trois quelquefois plus longues; six étamines insérées au sommet du calice lorsqu'il adhère avec l'ovaire, placées plus bas lorsqu'il est libre; un ovaire simple, surmonté d'un seul style, divisé à son sommet en trois filigines. Le fruit est libre ou adhérent, toujours à trois loges, à une ou à plusieurs semences. C'est, ou une baie qui ne s'ouvre pas, ou une capsule divisée en trois valves, munies d'une cloison dans leur milieu.

Les feuilles sont simples, alternes, ordinairement presque toutes radicales, engainées à leur base. Les fleurs sont toujours accompagnées de bractées; elles sont disposées en épi, en panicule, quelquefois en corymbe. Cette famille se divise en deux sections, d'après la disposition respective de l'ovaire & du calice.

§. 1^{re}. Ovaire libre ou supérieur.

Les burmanes..... *Burmansia*.
Les tillandes..... *Tillandsia*.

§. II. Ovaire adhérent ou inférieur.

Les xérophytes..... *Xerophyta*.
Les ananas..... *Bromelia*.
Les agavés..... *Agave*.

BROMUS. (Voyez BROM.)

BROOM. Ce nom, qui signifie balai en anglais, est donné, dans quelques colonies de l'Amérique, au *dodonaea viscosa* Linn., selon Plukenet, qui l'a figure, tab. 141, fig. 1.

BROQUIN: nom péruvien, suivant Ruiz & Pavon, de l'*acana argentea*, qui se retrouve dans le voyage de Feuillée au Chili, sous le nom de *proquin*.

1. BROSIME comestible. *Brosimum alicastrum*. Tussac.

Brosimum foliis alternis, ovato-lanceolatis, integris; amensis breviter pedunculatis, axillaribus, foliariis, rariis geminis. Tuss. Flor. des Antill., & Journ. botan. 1. pag. 202. tab. 8. fig. 1 & 2. — Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 17. tab. 1. fig. 1.

Brosimum. Brown, Jam.

Genre de plantes à fleurs incomplètes, dioïques, de la famille des orties, qui a des rapports

avec les *arborescens* & les *trophis*, établi pour un arbre de l'Amérique, qui a pour caractéristique essentiel :

Des fleurs dioïques ; les mâles réunies en un chaton globuleux, composé d'écaillés pelées ; une étamine ; point de corolle & les fleurs femelles formant un chaton ovale ; les écaillés obliques ; un style bifide ; une capsule crustacée, uniloculaire, monosperme ; une semence à deux lobes.

Cet arbre, assez élevé & lactescent, est chargé de rameaux nombreux, revêtus d'une écorce griseâtre. Son feuillage est très-touffu ; ses feuilles pétiolées, alternes, ovales-lancéolées, très-entières, glabres, acuminées ; des stipules imbriquées en forme de cône à l'extrémité des rameaux, renfermant les jeunes feuilles, puis caduques ou persistant peu à la base des pétioles. Les fleurs sont dioïques ; les fleurs mâles disposées en un chaton globuleux, solitaire, axillaire, pédonculé, rarement gemme, composé d'écaillés pelées, de l'assise desquelles sort une étamine, dont l'anthère s'ouvre horizontalement. La partie supérieure s'élève, portée sur un pivot, au milieu duquel on remarque un petit bourrelet qui est le réceptacle du pollen. Quelques-uns de ces chatons mâles sont surmontés, comme dans les chatons femelles, d'un style bifide qui s'oblitére. Les fleurs femelles consistent en un chaton plus allongé, moins gros que celui des mâles, couvert d'écaillés plus petites, surmonté d'un seul style, dont le sommet se divise en deux stigmates recourbés. Il en provient un fruit sphérique, une sorte de capsule crustacée, de la grosseur d'une petite châtaigne, à une seule loge, contenant pour semence une amande à deux lobes. La racine, très-prolongée en dehors, se recourbe sur ces mêmes lobes, & en cache la séparation ; point de périsperme autour de l'embryon.

Cette plante croît dans le nord de la Jamaïque. h

Cet arbre, dit M. de Tussac, avoit été connu de Brown ; mais il n'en avoit pas assez senti ni fait connaître la grande importance. Il le désigne sous le nom générique de *brœsum*, mot dérivé du grec, qui signifie bon à manger. Les Anglais de la Jamaïque le nomment *bread-nut*, qui signifie noix-pain, parce que ce fruit sert de nourriture aux pauvres Blancs lorsque le pain est cher ; il sert aussi de nourriture aux Nègres quand les vivres sont rares. Il se fait très-bon, soit grillé, soit bouilli. On ne peut mieux les comparer qu'aux châtaignes d'Europe. Leur substance est farineuse & d'un goût très-favoreux ; elle n'a pas l'inconvénient de surcharger l'estomac & d'occasionner des flatuosités. Ce qu'il y a de bien important dans cet arbre, c'est qu'après que la récolte des fruits est faite, on coupe les sommets des branches, qui font très-garnies de feuilles, pour servir de nourriture aux bœufs, aux chevaux, aux mulets, aux

moutons, &c même aux cochons, sans que cela nuise à la récolte des fruits pour l'année suivante. Ce fourrage est d'autant plus précieux, que cet arbre croît dans des cantons arides, où les sèches, qui durent plusieurs mois, font périr toute autre espèce de fourrage. Ce précieux végétal, dont l'écorce est pleine d'un suc lacteux, semble pousser avec d'autant plus de vigueur, qu'il fait plus sec & plus chaud. Cet arbre peut le multiplier ou par boutures, qu'il faudra faire au commencement du printemps, ou par marcottes, que l'on fera sur l'arbre même. On peut former des plantations de brosim, soit en bouquets, soit en avenues, qui réuniraient l'utile à l'agréable, cet arbre ayant un feuillage très-touffu, qui ne peut être pénétré par les rayons du soleil. (De Tussac.)

2. BROSIME bâtarde. *Brosum spurium*. Swartz.

Brosum foliis lanceolato-ovatis, acuminatis ; amentis subsessilibus, ovatis, geminis ; fructu molli. Swartz, Flor. Ind. occid. t. pag. 19.

Cet arbre s'élève à la hauteur de cinquante pieds, revêtu d'une écorce lisse, d'un blanc cendré. Les rameaux sont garnis de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, ovales, acuminées, glabres, très-entières ; les pétioles très-courts ; les fleurs mâles inconnues ; les fleurs femelles axillaires, presque sessiles, geminées & non opposées, formant un chaton oblong, imbriqué, de la grosseur d'un grain de poivre ; l'ovaire ovale, renfermé dans les écaillés ; le style bifide ; les stigmates simples, redressés. Le fruit est une baie molle, glabre, oblongue, monosperme ; son noyau partagé en deux lobes.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Jamaïque. h (Descript. ex Swartz.)

BROSSEA. (Voyez BROSSÉ, & Illustr. Gener. tab. 111.) Ce genre est borné à une seule espèce, qui n'est connue que par la description & la figure de Plumier. Elle n'a pas été, depuis lui, examinée, ni sur le vivant ni sur des individus secs ; ce qui a fait naître des doutes sur son existence. Quelques botanistes la regardent comme la même que l'*epigaea coriifolia* de Swartz ou le *gautheria sphagnicola* de Richard.

BROTÈRE. *Brotera*. Cavanilles avoit établi ce genre particulier de malvacées, qu'il distinguoit par le fruit uniloculaire, à plusieurs loges, auquel il réunissoit le *dombeya phanicea*. (Voyez notre article PENTAPÈTE.) Il ne s'écouloit alors que le *brotera ovata* Cavan. tab. 413, plante à tiges herbacées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, dentées en scie, couvertes d'un duvet blanchâtre. Les fleurs sont petites, pédonculées, au nombre de deux ou trois, situées dans l'aisselle des feuilles ; elles n'ont que cinq étamines fertiles. Elle croît à la Nouvelle-Espagne. Nous pensons que

cette plante doit être rapprochée du *dombea* Cavan., du *pentapetes phœnicea* n°. 12, & Suppl.

Willdenow a rétabli d'après Gærtner, comme genre particulier, le *pentapetes phœnicea* Linn.; il applique ailleurs le nom de *brotera* pour un nouveau genre de plantes composées, de la famille des emarocées, hales, formé d'après le *carthamus corymbosus* Linn., connu par les anciens botanistes sous le nom de *chamaelon*, qu'on auroit pu lui restituer. Il a, comme l'*echinops*, des calices particuliers, uniflores & caules, mais seulement au nombre de six ou huit sur la même tige ou dans le même calice commun. (Voyez CARTHAME, n°. 9.) M. de Jussieu en a fait le genre *cardopuntum*, Mus. Nat. Paris. 6. pag. 325. (Voyez ce mot, Suppl.)

Sprengel, dans le *Journal botanique* de Schrader, 1800, vol. 2, pag. 186, tab. 5, 2, de son côté, employé le nom de *brotera* pour un autre genre à fleurs composées, adopté par Petfoyn (*Synops. Plant.* 2, pag. 498), que Willdenow a mentionné sous le nom de *navenburgia*. Nous en parlerons sous ce nom. Le même botaniste Sprengel s'étoit servi ailleurs du nom de *brotera* pour désigner une plante labiée, *orotera persica*, Act. Soc. Linn. Lond. vol. 6, pag. 151, tab. 125 elle doit être placée parmi les *hyssus*, Suppl.

BROU. Ce nom, donné primitivement à l'enveloppe demi-charnue qui recouvre le fruit du noyer, a été depuis employé par quelques botanistes pour exprimer les enveloppes charnues ou pulpeuses qui entourent un noyau foliaire & osseux, comme dans l'amandier, le pêcher, l'abricotier, le prunier, le cerisier, &c. Cette enveloppe porte en latin le nom de *drupe*, qu'on traduit souvent en français par celui de *drupe*, & qui est plus généralement adopté que celui de *brou*, dont il est synonyme.

BROWALLIA. (Voyez BROUALLE, & les Illustrations des Genres, tab. 535, *browallia demissa*, n°. 1. — Gærtn. tab. 53.) Le *browallia alienata*, n°. 3, est la même plante que le *ruellia paniculata* Linn. n°. 21, & le *erowallia hamifolia* est un *buchnera glauca* Vahl, Symb. 3, pag. 81.

BROUSSONETIA. L'héritier a ainsi nommé le mûrier de la Chine (*morus papyrifera* Linn.), décrit dans cet ouvrage sous celui de *papyrus*. (Voyez PAPIERER.)

BROWNEA. (Voyez BROUNE, & les Illustrations des Genres, tab. 575, fig. 1, *brownea coccinea* Linn.) Il faut ajouter à ce genre les deux espèces suivantes :

2. **BROWNE pubescente.** *Brownea grandiceps*, Jacq.

Brownea fluminibus longitudine corolla; floribus capitato-ficatis, ramis pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 716. — Jacq. Coll. B. 3, pag. 187, tab. 22, fig. A. 1. — Lam. Ill. tab. 575, fig. 2.

Plusieurs caractères distinguent cette espèce du *brownea coccinea*. Ses rameaux sont pubescents; les feuilles veinées, réticulées, pubescentes sur leur côté & sur leur principale nervure. Les fleurs, de concert & arlie, sont réunies en une tête un peu prolongée en épi. Les étamines, souvent au nombre d'onze, sont, comme dans la précédente, de la longueur de la corolle; mais le style est subulé, & le stimate aigu, les divisions du calice inférieur presque spatulés, oval, s-oblongues, très-obtusés & non lancéolés, aigües.

Cette plante croît sur les hauteurs, dans les forêts, aux environs de Caracas. f)

3. **BROWNE rose.** *Brownea rosa* de monte. Berg.

Brownea fluminibus corollâ duplo longioribus, floribus capitatis. Willd. Spec. Plant. 3, pag. 716. — Lam. Pl. Gen. tab. 575, fig. 3.

Brownea (rosa de monte), floribus aggregato-capitatis, sessilibus; fluminibus longissimis. Berg. in Act. Arg. 1775, pag. 171, tab. 8 & 9.

Hermestas, vulgò rosa de monte. L'œff. Itin. 278.

Cette espèce est facile à distinguer par la longueur de ses étamines, au moins une fois plus longues que la corolle. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, acuminées, un peu obtuses, finement veinées; les fleurs réunies en une tête touffue, de la grosseur du poing, d'un rose-écarlate, sessiles, accompagnées à leur base de bractées nombreuses, de la même forme, mais beaucoup plus petites que les feuilles; les pétales courts, étroits, linéaires-lancéolés, aigus; onze étamines; les antères vacillantes.

Cette plante croît sur les montagnes, à Porto-Bello. f)

Observations. Le *brownea paniciflora* Willd. est le *palavea guianensis* Aubl. & Dict. 4, pag. 716, & le *ginnania* Schreb. Gen. Plant. n°. 691. — Le *brownea coccinea*, n°. 1, est ainsi caractérisé :

Brownea fluminibus longitudine corollâ, pedunculis subaggregatis, ramis glabris. Willden. Spec. Plant. 3, pag. 715.

BRUC. nom languedocien d'une bruyère (*erica scoparia* Linn.).

BRUCEA. (Voyez BRUCH, & Musc. Gener. tab. 810.) — *Brucea ferruginea* L'hérit. Stirp. Nov. Fasc. 1, pag. 19, tab. 10. M. de Jussieu soupçonne que les genres *tetralium* & *gonus*, établis par Loureiro dans sa Flore de la Cochinchine, sont très-

voisins des *br. cer.* (Voy. *Diâ.* vol. VII, pag. 603, & *Gonus*, Suppl.)

BRUGNON, variété du pêcher, que l'on nomme aussi *brignon* par corruption, & qui est reñu au genre *amandier*.

BRUGUIERA. (Voyez **PALÉSTUVIER & BRUGUIÈRE**, Suppl.)

BRUGUIÈRE, *Bruguiera*. (Aub. du Pet.-Th.) M. du Petit-Thouars a établi sous ce nom un genre qui n'est point celui de M. de Lamarck, & qui a chingé à cause du nom français *paléstuvier*, qui fait oublier celui de *bruguiera*. Tant que l'on le permettra, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre (& on n'en manquera jamais), de changer le nom des genres, l'étude aimable des plantes sera étouffée sous les épines de la synonymie, & j'invite M. du Petit-Thouars, au nom de la science qu'il cultive avec tant d'avantages, à renoncer à cet esprit d'innovation & de prétendue réforme, si nuisible au véritable but de la botanique, qui sera bien mieux rempli par de bonnes observations que par un chargement perpétuel de nomenclature. Quoi qu'il en soit, voici, d'après M. du Petit-Thouars, le caractère de son nouveau genre : il consiste en un calice tubuleux, un peu comprimé, à cinq dents obtuses, muni de deux écailles vers son milieu ; cinq pétales oblongs, lancéolés, ouverts, insérés sur le calice ; dix étamines de la longueur de la corolle, insérés au fond du calice ; un ovaire adhérent au calice, surmonté d'un style aigu, contenant quatre ovules pendans. Le fruit est inconnu.

Ce genre, de la famille des onagres, est voisin des *combretum*, dont il diffère par la forme du calice, non rétréci au dessous de son limbe, & par ses feuilles alternes ; il ne contient qu'une seule espèce. C'est un petit arbre de Madagascar, à feuilles lisses, ovales, succulentes, entières, rétrécies en pétiole à leur base, longues de trois à quatre pouces, larges de deux. Les fleurs sont blanches, petites, disposées en grappes axillaires. Il est très-probable que c'est le *kara-bandel* de Rheed, quoique la description annonce quatre pétales avec cinq étamines, anomalie dont on ne conçoit pas d'exemple.

BRUNELLA. Lam. *Prunella*, Linn. (Voyez **BRUNELLE**.)

La brunelle, réunie, par ses propriétés, à ces plantes nombreuses auxquelles on attribue la faculté de consoler promptement les blessées & les plaies, se trouve probablement confondue, chez les Anciens, parmi quelques-uns de ces végétaux auxquels ils donnoient le nom de *confouda* (*symplynum*), en supposant toutefois qu'ils l'eussent connue : elle jouissoit, il y a un siècle ou

deux, d'une certaine réputation ; elle est peu employée aujourd'hui. C. Bauhin soupçonne que son nom lui vient du mot allemand *braune*, qui signifie certaines maladies de la gorge, contre lesquelles on employoit la brunelle.

On a ajouté plusieurs espèces à ce genre, qui, la plupart, me paroissent rentrer dans les nombreuses variétés du *prunella vulgaris* Lam. Illustr. tab. 516, fig. 1, & du *prunella laciniata*, fig. 2. Ces deux espèces, qui ne paroissent d'abord que comme variétés, puisque la première offre également des feuilles laciniées, ont néanmoins dans leur calice un caractère qui les distingue. Dans la première, la levre supérieure du calice paroît comme rionquée, & laisse à peine l'apparence de trois arêtes imperceptibles. Dans la seconde, cette même levre est large, à trois lobes courts, arrondis, surmontés d'une petite pointe.

La première varie, dans ses fleurs blanches ou rougeâtres, dans ses feuilles presque glabres, quelquefois plus ou moins velues ou parsemées de poils toides, dans que les tiges & les calices ; les feuilles supérieures entières, démemées ou laciniées. Point d'ara dit en avoir observé une variété au mont Sileve, à fleurs jaunâtres. Toutes ces variétés tiennent aux localités.

La seconde espèce offre dans ses fleurs la même variété de couleurs ; elle tient le milieu entre la brunelle commune & celle à grandes fleurs ; elle ressemble à cette dernière par son calice, à l'aure par son port. Ses feuilles, surtout les supérieures, sont constamment découpées, un peu blanchâtres & pubescentes en dessous.

La brunelle à grandes fleurs (*prunella vulgaris*, var. 3) paroît devoir former une espèce distincte par ses fleurs, au moins une fois plus grandes que dans les espèces précédentes ; par sa corolle renflée au dessous de la levre-inférieure ; par la levre supérieure, coudée vers le milieu au lieu d'être droite, & qui devient alors parallèle à la levre inférieure. La levre supérieure du calice est à trois lobes mucronés ; les feuilles peu ou point découpées, quelquefois munies d'oreillettes à leur base, légèrement pileuses.

5. **BRUNELLE à petites fleurs**, *Brunel'a parviflora*. Poir.

Brunella foliis ovato-lanceolatis, glabris, subdentatis ; fricâ sessili, floribus vix bracteis superantibus. Poir. Voyag. en Barb. 2. pag. 183.

Si les plantes dont nous venons de parler doivent être distinguées comme espèces, celle-ci doit avoir le même privilège ; elle se rapproche de la suivante par ses feuilles, de la brunelle laciniée par ses calices, de la brunelle commune par son port. Ses tiges sont peu rameuses, légèrement pileuses vers leur sommet, garnies de feuilles pétio-

lées, ovales-lancéolées, à peine dentées, glabres à leurs deux faces, longues d'environ trois poudres, sur un pouce & plus de large; les pétioles réfléchis, longs d'un pouce, à peine pileux. L'épi est cylindrique, obtus, accompagné à sa base de deux longues feuilles scissiles, lancéolées; les bractées colorées, élargies, ciliées, mucronées; les calices pileux; la lèvre supérieure à trois lobes courts, à trois petites pointes. La corolle est petite, purpurine, à peine plus longue que les bractées.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de Barbarie; elle a été trouvée, suivant M. Decandolle, à Montmorency par M. Lérédier. (P. v.)

6. BRUNELLE ovale. *Brunella ovata*. Hort. Par.

Brunella caule ramiflora; foliis ovato-lanceolatis, dentatis, obtusis; spicis ovato-oblongis. (N.)

Cette espèce est fort grande; ses tiges perennantes, profondément cannelées; les rameaux nombreux, étalés; les feuilles pétiolées, larges, ovales-lancéolées, un peu obtuses, lâchement dentées, glabres, vertes, plus pâles en dessous; les épis courts, ovales-oblongs, obtus, plus élargis à leur partie inférieure; les fleurs, ainsi que les bractées & les calices, d'un pourpre-foncé; la lèvre supérieure à trois lobes courts, mucronés; la corolle à peine une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

* Espèces douteuses ou variétés. (N.)

* *Prunella* (pensilvanica), *foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, basi dentatis; calicis lobis aquilobis; superiore truncato, triaristato; caule adscendente.* Willd. Hort. Berol. n°. 9.

* *Prunella* (hastifolia), *foliis subhastato-oblongis, serratis, obtusis, pubescentibus; caule ascendente, basi repente; calicis lobis inferiore profusato trilobis.* Brot. Luth. pag. 181.

* *Prunella* (bidentata), *parvula, foliis sessilibus, linearibus, medio utrinque undulatis.* Pers. Synop. Plant. 2. pag. 137. (Lemon. in uliginosis.)

* *Prunella* (pinnatifida), *caule ramoso, divaricato, glabro; foliis pinnatifidis, glabris, infimis brevi ovatis.* Pers. Synop. Plant. 2. pag. 137.

An prunella (media), foliis inferioribus sinuato-dentatis, superioribus dentatis; calicibus summis coloratis. Link. Annal. 1. — Roth, Germ. 2. pag. 45. — *An prunella vulgaris*, var ?

* *Prunella* (intermedia), *foliis integris sinuatis, dentatis, rugosis, hirsutis; calicis lobis superiore truncato, leviter tridentato.* Brot. Luth. 1. pag. 181.

BRUNIA. (Voyez BRUNIS, & Illustr. Gener. tab. 126, *brunia nodiflora* Linn.) Thunberg, dans son *Prodrome des plantes du Cap de Bonne-Espérance*, a mentionné plusieurs espèces nouvelles qui manquent de description suffisante, & que nous ne ferons qu'indiquer.

* *Brunia* (densa), *foliis trigonis, glabris, apice nigris; capitulis terminalibus.* Thunb. Prodr. App. pag. 187.

* *Brunia* (microphylla), *foliis ovato-trigonis, carnosissimis, glabris; capitulis terminalibus, ramis divaricatis.* Thunb. Prodr. 187.

* *Brunia* (laxa), *foliis trigonis, floribusque spicatis, glabris.* Thunb. Prodr. pag. 187.

* *Brunia* (alopecurioides), *foliis trigonis, acutis, glabris; capitulis lateralibus, globosis, glabris.* Thunb. Prodr. pag. 187.

* *Brunia* (levis), *foliis linearibus, convexis, incurvis; capitulis terminalibus.* Thunb. Prodr. pag. 187.

* *Brunia* (luperba), *foliis triquetris, filiformibus, callosis-mucronatis, patulis, ciliatis-villosis.* Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1143. — Donn. Ind. Hort. Cantab. pag. 25.

* *Brunia* (fragarioides), *foliis triquetris, adpressis, margine ciliatis.* Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1143.

Observations. Quelques auteurs ont admis le genre *stauvia* pour deux espèces de *brunia*. (Voy. STAAVIA, vol. VII.)

BRUNELLIE. *Brunellia*. Genre de plantes dicotyledones, à fleurs incomplètes, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, mais qui paroit devoir être placée entre les térébinthacées & les nerpruns, & avoir des rapports avec les *cestis*; il comprend des arbres ou arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux & les feuilles sont opposés ou ternés; les dernières simples ou ailées; les fleurs axillaires, paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice de quatre à sept divisions; autant d'ovaires, entourés d'un disque épais; point de corolle; huit à quatorze étamines; des capsules divergentes, à une loge, à une ou deux semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en quatre, cinq ou sept découpures ovales, aiguës, redressées, persistantes.

2°. Une corolle nulle.

3°. Des

3°. Des étamines en nombre double des divisions du calice, insérées sur le disque épais qui entoure les ovaires; les filaments velus à leur base; les anthères redressées, à deux loges.

4°. Quatre, cinq ou sept ovaires libres, surmontés d'autant de styles subules; les stigmates aigus.

Le fruit consiste en autant de capsules que d'ovaires, divergentes, placées sur un réceptacle commun, à une seule loge, s'ouvrant en dedans par une suture longitudinale, contenant une ou deux semences ovales ou oblongues; l'embryon enveloppé d'un péricarpe épais & charnu.

Observations. Ce genre a d'abord été établi par les auteurs de la Flore du Pérou; il a été présenté avec quelques modifications par MM. Humboldt & Bonpland, avec l'exposition de plusieurs espèces nouvelles. Ils placent ce genre près des *Cnestis*, avec lesquels il a de grands rapports. Ces deux genres indiquent l'existence d'une nouvelle famille, qui fait le passage des tétrabiathacées aux nerpruns. Cette famille diffère essentiellement de la première par la présence du péricarpe, qui manque dans toutes les tétrabiathacées, & de la seconde par le nombre des étamines, qui est toujours double de celui des divisions du calice. Dans les nerpruns elles sont en nombre égal avec les divisions du calice.

ES P È C E S.

1. BRUNELLIE à feuilles de comoclade. *Brunellia comocladifolia*. Humb. & Bonpl.

Brunellia foliis impari-pinnatis; foliolis multijugis, oblongis, spinoso-ferratis, subulis tomentosis. Humb. & Bonpl. Plant. zéquin. vol. 1. pag. 211. tab. 49.

Arbre très-rameux, haut d'environ dix-huit pieds; les rameaux cylindriques, opposés, comprimés vers les nœuds, chargés d'un duvet tomenteux & roussâtre, garnis de feuilles opposées, pétioles, ailées avec impaire, composées d'environ sept à onze paires de folioles oblongues, sessiles, légèrement échancrées à leur base, aiguës, tomenteuses & roussâtres en dessous, munies à leurs bords de dents distantes, presque épineuses. Les fleurs sont petites, disposées en panicules axillaires, plusieurs fois ramifiées presque par dichotomie; le calice pubescent, à quatre découpures ovales; quatre capsules en étoile, ovales, élastiques, couvertes de poils roussâtres, à une seule semence noire, luisante, ovale, comprimée.

Cette plante croît dans les Andes, au Pérou. *Humb. & Bonpl.*

2. BRUNELLIE tomenteuse. *Brunellia tomentosa*. Humb. & Bonpl.

Botanique. Supplément. Tome 1.

Brunellia foliis ternis, ovali oblongis, ferratis, utrinque acutis, subulis reticulato-venosis, tomentosis. Humb. & Bonpl. Plant. zéquin. 1. pag. 214. tab. 60.

Grand arbre, haut de soixante pieds, dont le bois est blanc, peu compacte; les rameaux glabres, les supérieurs anguleux, tuberculés, couverts, ainsi que la face supérieure des feuilles, d'un duvet tomenteux & roussâtre; les feuilles verticillées trois par trois, ovales, oblongues, dentées, médiocrement pétioles. Les fleurs, presque sessiles, sont disposées en grappes axillaires; le calice tomenteux, à quatre ou sept découpures ovales, aiguës, persistantes. De quatre à sept ovaires, il n'en résulte souvent que deux capsules ovales, aiguës, tomenteuses, contenant deux graines oblongues, un peu ridées.

Cette plante croît près la ville d'Almaguet, dans les lieux froids. *H.*

3. BRUNELLIE à feuilles ovales. *Brunellia ovalifolia*. Humb. & Bonpl.

Brunellia foliis ternis, subrotundo-ovalibus, ferratis, subulis minutissimis pubescentibus; capitulis axillaribus, pedunculatis. Humb. & Bonpl. Plant. zéquin. 1. pag. 216. tab. 61.

Arbre de vingt-quatre à trente pieds, peu rameux, d'un aspect peu agréable; les rameaux glabres, cylindriques; les feuilles coriaces, verticillées trois par trois, ovales-ar rondies, pubescentes en dessous, dentées à leurs bords, médiocrement pétioles; les fleurs ramassées en tête, à l'extrémité des rameaux d'une panicule courte. Le calice est partagé en cinq découpures lancéolées, glabres, aiguës; dix étamines situées autour d'un disque charnu, légèrement pubescent; cinq ovaires; quatre à cinq capsules pubescentes, ovales, acuminées, divergentes à leur partie supérieure, renfermant chacune deux semences oblongues.

Cette plante croît près la ville de Loja, au Pérou. *H. (Humb. & Bonpl.)*

4. BRUNELLIE anguleuse. *Brunellia acutangula*. Humb. & Bonpl.

Brunellia foliis ternis, ovali lanceolatis, leviter ferratis, subulis pulverulentis pubescentibus; ramis acutis triquetris. Humb. & Bonpl. Plant. zéquin. 1. p. 218. tab. 62.

Cet arbre s'élève fort haut; il est muni de rameaux cylindriques à leur partie inférieure, marqués, dans leur partie supérieure, de trois angles très-prononcés, pubescents, pulvérulents, de couleur fauve. Les feuilles sont verticillées trois par trois, médiocrement pétioles, coriaces, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, glabres, dentées en scie, couvertes en dessous d'un duvet

X x x

pulvérulents; la nervure du milieu saillante en angles; les fleurs pédicellées, disposées en panicules axillaires, opposées; chaque pédicelle accompagné d'une petite bractée; le calice à quatre ou cinq découpures profondes, pulvérulentes; huit ou dix étamines; quatre ou cinq ovaires pileux; autant de capsules ovales, aiguës, pubescentes, à une seule loge, contenant deux semences ovales.

Cette plante croît dans le royaume de Santa-Fé de Bogota. *H (Humb. & Bonpl.)*

* *Brunellia* (inermis), *foliis impari-pinnatis, ternis simplicibusque; foliolis serratis*. Ruiz & Pav. Syll. veget. Flor. peruv. pag. 127.

C'est un très-grand arbre, dont les rameaux sont garnis de feuilles ailées avec une impaire, quelquefois simples ou ternées; les folioles dentées en scie. Les capsules sont glabres & obtuses. Il croît au Pérou, dans les grandes forêts; il est en fleurs aux mois d'août & de septembre. *H*

* *Brunellia* (aculeata), *foliis abrupte pinnatis; foliolis integerrimis*. Ruiz & Pav. Syll. veg. Flor. peruv. pag. 127.

Bien moins élevé que le précédent, ses tiges ne parviennent qu'à la hauteur de seize à dix-huit pieds. Ses feuilles sont ailées sans impaire; les folioles entières; les fruits hérissés de poils rudes. Il croît dans les forêts du Pérou, & fleurit dans les mois de juin & de juillet. *H*

BRUNGA. C'est ainsi que l'on nomme, à Ceylan, le *luiswiga oppositifolia* Linn.

BRUNNICHIA grimpant. *Brunnichia cirrhosa*. Gærtn.

Brunnichia glabra, scandens, foliis oblongo-cordatis, acuminatis; racemis multifloris, floribus secundis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 271. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 1. tab. 45. — Desfont. Arbr. t. pag. 77.

Fallopia. Adanf. Fam. Nat. 2. pag. 277.

Genre de plantes de la famille des polygonées, établi par Gærtner pour un arbrisseau de l'Amérique, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; point de corolle; une capsule monosperme, renfermée dans le calice persistant, agrandi, supportée par un pédoncule membraneux, élargi.

C'est un arbrisseau rampant & grimpant, dont les tiges, grêles, striées, s'élèvent jusqu'au sommet des arbres d'une médiocre grandeur, à l'aide des vrilles qui terminent les rameaux. Les feuilles sont glabres, alternes, pétiolées, ovales-oblongues, en cœur, très-entières, acuminées, minces, persistantes, d'un vert-agréable; les fleurs

verdâtres, petites, disposées en grappe, & toutes tournées du même côté. Le calice est vertru, à cinq découpures. Les étamines valent de huit à dix. L'ovaire est surmonté de trois styles : il lui succède une capsule un peu triangulaire, sans valve, à une seule semence, soutenue par un pédoncule muni latéralement d'une membrane enflée.

Cette plante est originaire de l'Amérique septentrionale; elle nous est venue d'abord de l'île de Bahama. M. Bosc l'a recueillie dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes. *H (V. f. Comm. Bosc.)*

Cet arbrisseau, cultivé en pleine terre, & qu'on multiplie facilement de drageons, de marcottes & de boutures, peut se naturaliser dans la France, & servir à couvrir, comme les autres plantes grimpantes, les tonnelles & les berceaux, à masquer les murs, & à procurer, par ses feuilles nombreuses & touffues, une agréable verdure.

BRUNSELSIA. (*Voyez* BRUNSEFEL, & Illust. Gen. tab. 148.)

1. *Brunsefsia* (americana), *foliis obovatis, acuminatis, petiolo longioribus; corolla tubo recto, limbo integro*. Swartz, Observ. botan. pag. 90. tab. 4. fig. 2.

Il faut ajouter à cette première espèce :

2. BRUNSEFEL ondulé. *Brunsefsia undulata*. Sw.

Brunsefsia foliis ovato-lanceolatis, utrinque attenuatis; corolla tubo curvo, limbo undulato. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 135. — Andr. Repof. bot. tab. 167.

Arbuste d'environ vingt pieds de haut. Le tronc est foible; les rameaux rabattus; les feuilles éparfes, pétiolées, lancéolées, ovales ou oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, très-entières, un peu ondulées, glabres, longues de six pouces; les fleurs blanches, médiocrement pédonculées, terminales, au nombre de deux ou trois; le calice à cinq petites dents obtuses; le tube de la corolle long de quatre pouces, cylindrique, un peu recourbé, légèrement pubescent; le limbe à cinq lobes arrondis, ondulés, inégalement & profondément crénelés. Le fruit est une baie globuleuse, de la grosseur d'une petite pomme, à une loge, revêtu d'une écorce cendrée.

Cette plante croît à la Jamaïque. *H (Swartz.)*

BRUNSVIGIA, vulgairement *girandole*. C'est une espèce d'*amarillis*. Dict. n°. 11.

BRUSC. C'est le nom que portoit autrefois le fragon (*rufus* Linn.), qui est le *rasbo* des Italiens. On le donne encore en Provence, suivant

Garid. 1, à une espèce de bruyère (brûle des Languedociens, *erica scoparia* Linn.), dont on fait des balais appelés *scoubon de brûle*, &c, suivant Bomare, à l'ajonc ou genêt épineux (*ulex* Linn.). Le traducteur de Dalechamp donne ce nom au *rufus aculeatus* Linn., que de son tems on appeloit aussi *brûle*, d'où sans doute est venu aussi le nom de *brûle*. Les Arabes nomment cette plante *cabbes*, &c les Italiens *pungilipi* ou *pique-souris*, parce que, dit Dalechamp, ce peuple en enveloppe la chair fâlée, de peur que les rats n'en approchent. Plin. & les auteurs anciens attribuoient à cette plante beaucoup de vertus, ce l'ent' d'autres d'être très-diurétique, &c bonne pour la maladie de la pierre. Suivant le même traducteur, les Anciens se servoient des branches souples du brûle pour lier les vignes. Il tire son autorité d'un passage de Virgile, qu'il traduit ainsi en un vers français :

Du brûle l'osier piquant faut cueillir dans les bois.

Virgile avoit dit :

*Nec non cerni spera rufi
Vimina per silvam, & ripis fluvialis arundo
Cedunt.*

BRUXANELLI : nom sous lequel Rheed a décrit & figuré, dans son *Hort. malab.* 5, pag. 83, tab. 41, une plante qui, si l'on lui, forme un arbre de la taille d'un pommier. Son écorce est astringente & a une odeur forte, ainsi que les feuilles, qui sont ovales, acuminées & opposées. Les fleurs sont petites, purpurines, odorantes, disposées en épis grêles & terminaux, composées d'un calice adhérent, de quatre pétales & de quatre étamines. Le fruit est une baie à deux ou trois coques monospermes, couronnées par les divisions du calice. Une partie de cette description indiqueroit assez bien que cet arbre appartient à la famille des rubiacées, & qu'il se rapprocheroit des *cfriérés*; mais on ne peut l'y rapporter s'il a réellement quatre pétales, ce dont on peut douter, parce qu'à l'époque où Rheed écrivoit, les botanistes confondoient souvent les divisions de la corolle avec les pétales.

Cet arbre croît sur les montagnes & dans les endroits sauvages de la côte de Malabar. On recommande son suc, mêlé avec du beurre, comme un liniment contre les furoncles. Son écorce passe pour diurétique, & ses racines sont employées avec succès dans les douleurs de la goutte.

BRUYÈRE. *Erica*. Le nom latin de la bruyère est connu depuis long-tems. C'est l'*erica* de Théophraste, que Plin. a rendu par *erica*, ainsi que Dioscoride. Doit-on le regarder comme devant être appliqué à des plantes congénères de notre bruyère? C'est lui qu'on n'eût point parfaitement d'accord. En admettant l'affirmative, que

je crois être l'opinion la plus probable, je dois aussi ajouter que l'*erica* des Anciens appartient à l'*erica arborea* ou bien à l'*erica multiflora* ou *vagans* de Linné, plutôt qu'à notre *erica vulgaris*, celle-ci étant bien plus commune dans les contrées septentrionales que dans les pays chauds, tandis que les autres y sont très-abondantes. J'ai trouvé partout en Barbarie l'*erica arborea*, & je n'y ai jamais rencontré l'*erica vulgaris*. Plin. & Dioscoride assurent que le miel recueilli par les abeilles sur les fleurs de la bruyère est d'une qualité très-médicore, tandis que, chez nous, ces fleurs lui donnent beaucoup de délicatesse & de parfum, propriétés que peut-être n'offre point l'*erica arborea*.

A force d'observations & de recherches, on est parvenu à distinguer au plus une douzaine d'espèces de bruyères indigènes de l'Europe, arbuscules élégans, la plupart habitant les lieux incultes & arides des forêts, destinées à couvrir, par leur verdure persistante, la nudité des collines, & à fertiliser, par leurs débris, un sol ingrat, peu favorable pour la végétation des autres plantes. Les unes (c'est le plus grand nombre) se plaisent de préférence dans les terrains secs & pierreux. C'est sur les collines crétacées des environs de Marseille que j'ai trouvé en plus grande abondance l'*erica multiflora*; mais d'autres, telle que l'*erica tetralix*, ne se rencontrent que dans les lieux marécageux; elles couvrent de vastes plaines dans les contrées incultes de la Bretagne, ainsi que l'*erica ciliaris*, qui préfère les lieux des landes moins humides.

Qui auroit pu croire, lorsque l'admiration étoit bornée à ces jolies espèces européennes, qu'un seul coin du Globe en nourrissoit à lui seul plus de deux cent soixante, dont on n'avoit encore aucune connoissance il n'y a pas un demi-siècle. Herman, Bergius, & plus récemment Thunberg, Wendland, André, Solisbury, &c. nous ont transportés au Cap de Bonne-Espérance, dans ce riche jardin de la nature, qui paroît être en particulier la patrie des bruyères. Si ces nouvelles espèces, par leur variété, par la grandeur & les riches couleurs de leur corolle, sont perdues aux nôtres une partie de leur éclat, l'expérience nous en console en nous donnant l'espoir de les acclimater en pleine terre: déjà les Anglais en élèvent un grand nombre dans leurs jardins, où elles paroissent mieux réussir qu'en France, quoique déjà le Jardin des Plantes de Paris en renferme beaucoup dans ses serres.

Il est bon de prévenir que les Anciens se sont servis du nom de *bruyère* (*erica*) pour plusieurs plantes qui n'appartiennent point à ce genre. Ainsi l'*erica prima* de Clusius est l'*empetrum nigrum* de Linné; l'*erica buccifera* de Matthioli, l'*empetrum album* Linn. D'autres ont donné le nom d'*erica* à quelques espèces de *vacinium*, au *cissus coridifolia*

X x x x

Linn., &c. On soupçonne que le mot *erica* vient d'une expression grecque qui signifie briser, parce que les Anciens attribuoient aux bruyères la propriété de briser ou de dissoudre les calculs de la vessie.

Depuis que ce genre est devenu si nombreux en espèces, on a jusqu' alors cherché assez inutilement à le diviser en plusieurs autres genres affixés naturels, affixés étendus pour éviter la confusion des espèces. Il faut en excepter deux ou trois espèces, qui font devenues la base du genre *erica*, dans lequel se trouve compris l'*erica Daubertii* Linn. (Voyez ce genre, Suppl.) Salisbury a considéré l'*erica vulgaris* comme pouvant devenir le type d'un genre particulier, avant les fleurs munies d'un double calice, & les cloisons de la capsule adhérentes au réceptacle & opposées, non au milieu des valves, mais à l'intervalle des deux valves; il l'a nommé *calluna*. Lui-même a senti, comme il l'avoue, combien il étoit inconvenable d'enlever son nom à une espèce qui l'avoit donné à toutes les autres, & que plusieurs sèches avoient en quelque sorte consacré. L'inconvenant eût été moindre, en supposant toutefois la validité de ce nouveau genre, de supprimer la dénomination d'*erica* aux nouvelles espèces qui étoient venues l'usurper. Sans prononcer sur la validité de ce genre, nous ne faisons ici que l'indiquer, pour ne point déranger l'ordre des espèces établi dans cet ouvrage, qu'autrement il faudroit reprendre en entier. Nous nous bornerons même, pour les additions, à mentionner les espèces les plus faillantes & les mieux connues, renvoyant, pour les autres, aux auteurs qui en ont traité, & dont nous ne citerons que la phrase spécifique.

Avant de présenter les espèces ajoutées à ce genre, nous ferons quelques observations sur celles qui ont été décrites. Les suivantes sont figurées dans les *Illustrations*, tab. 187, fig. 1, *erica vulgaris*, n.° 1; — fig. 2, *erica ramentacea*, n.° 191; — fig. 3, *erica lutea*, n.° 2; — fig. 4, *erica lycopodium*, n.° 125; — fig. 5, *erica galicoides*, n.° 124; — Tab. 188, fig. 1, *erica retorta*, n.° 39; — fig. 2, *erica haliacabba*, n.° 33; — fig. 3, *erica Petiveri*, n.° 61.

Il faut ajouter pour synonymie à l'*erica lutea*, n.° 2, Wendl. *Eric.* pag. 13, tab. 41; — Andr. *Eric.* Icon. 3; à l'*erica haliacabba*, Icon. Hort. Kew. tab. 21; à l'*erica muscosa*, n.° 6, Andr. *Eric.* Ic. & Ic. Hort. Kew. tab. 15; — Thunb. *Differt.* n.° 76; à l'*erica pentaphylla*, n.° 11, *erica ureolaris*, Icon. Hort. Kew. tab. 16; on soupçonne que l'*erica castra* Linn. est la même espèce; à l'*erica plausifolia*, n.° 11, *erica thymifolia*, Wendl. *Obs.* pag. 48; à l'*erica montaniana*, n.° 17, Ic. Hort. Kew. tab. 21; — Thunb. *Differt.* n.° 12, tab. 1, fig. 2; à l'*erica tetragona*, n.° 18, Thunb. *Differt.* n.° 1, tab. 4; fig. 2; à l'*erica ramentacea*, n.° 19, Wendl. *Eric.*

pag. 17, tab. 6; à l'*erica persulcata*, n.° 20, an *erica strigosa*? Willd. pag. 161; & Wendl. *Eric.* *Falc.* 1, pag. 11, Icon. non Aiton; à l'*erica tetralix*, n.° 21, Flor. dan. tab. 81; *erica bouboliformis*, Salisb. *Act. Soc. Linn. Lond.* 6, pag. 369; à l'*erica pubescens*, n.° 22, Salisb. L. c. — Andr. *Eric.* n.° 60, Icon.; *erica hirtiflora*, Curtis, *Magaz.* n.° 481, Ic. *erica pubescens*, var. *hispida*; Thunb. *Differt.* n.° 61; à l'*erica abietina*, n.° 23, *erica coccinea*, Wendl. *Eric.* 3, pag. 9, Icon.; — Salisb. L. c. vol. 6, pag. 364; à l'*erica scissiflora*, n.° 26, *erica spicata*, Willd. n.° 39; — Thunb. *Differt.* n.° 71, tab. 4, fig. 3; — Andr. *Eric.* Icon. 3; — Wendl. *Eric.* 2, pag. 27, Icon.; à l'*erica baccaea*, n.° 28, Thunb. *Differt.* n.° 88; — Andr. *Eric.* Icon.; à l'*erica gnaphalodes*, n.° 29, Thunb. *Differt.* n.° 71, *erica pulchella*, Heutuyun, 3, pag. 417, tab. 24, fig. 1; à l'*erica articularis*, n.° 31, Thunb. *Differt.* n.° 18, *erica pulchella*, Andr. *Eric.* Icon. n.° 11; à l'*erica bracteolata*, n.° 32, an *erica bracteolata*? Thunb. *Differt.* n.° 31; à l'*erica calcinea*, n.° 33, Andr. *Eric.* Icon. 1; — Thunb. *Differt.* n.° 78; à l'*erica cinerea*, n.° 14, Bull. *Herb.* n.° 437; — Flor. dan. tab. 48; — Curtis, *Lond. Falc.* 1, tab. 21, *erica humilis*, Neck. *Gallob.* 183; *erica mutabilis*, Salisb. *Act. Soc. Linn. Lond.* 6, pag. 369; à l'*erica australis*, n.° 36, Thunb. *Differt.* n.° 86; — Wendl. *Eric.* *Falc.* 2, pag. 13, Icon.; à l'*erica physodes*, n.° 37, Thunb. *Differt.* 89; — Andr. *Eric.* 44, Icon.; à l'*erica retorta*, n.° 39, Andr. *Eric.* n.° 15; — Thunb. *Differt.* n.° 91; à l'*erica albens*, n.° 42, Curtis, *Magaz.* n.° 440, Icon.; à l'*erica capitata*, n.° 44, Wendl. *Eric.* Icon. 3; — Andr. *Eric.* 34, Icon.; à l'*erica melanthera*, n.° 45, *erica lychnidiflora*, Salisb. *Act. Soc. Linn. Lond.* 6, par. 332; à l'*erica ciliaris*, n.° 46, Curtis, *Magaz.* n.° 484; — Thunb. *Differt.* n.° 19; à l'*erica curvispora*, n.° 49, *erica simpliciflora*, Donn. *Catal. Hort. Cantab.* 47 (non *erica curvispora*, Wendl. 1, *Eric.* 3, pag. 7, Icon. & Andr. *Eric.* n.° 40, Icon.; — Seb. *Mus.* 2, tab. 19, fig. 1); à l'*erica cerinthoides*, n.° 51, Andr. *Eric.* n.° 25, Icon.; à l'*erica viscaria*, n.° 52, Icon. Hort. Kew. tab. 1; — Thunb. *Differt.* n.° 43; à l'*erica comosa*, n.° 57, Icon. Hort. Kew. tab. 18; — Thunb. *Differt.* n.° 18; — Curtis, *Magaz.* 106, Icon. 1; — Thunb. *Differt.* n.° 35, tab. 3, fig. 2; — Andr. *Eric.* n.° 9, Icon.; à l'*erica Plukenetii*, n.° 60, Icon. Hort. Kew. tab. 9; — Thunb. *Differt.* n.° 22; Wendland cite plusieurs variétés remarquables de cette espèce (O. *serv. botan.* pag. 41, 46); à l'*erica nudiflora*, n.° 62, Smith, *Ac. ined.* 1, pag. 6 & tab. 17; à l'*erica bruniades*, n.° 64, Andr. *Eric.* Ic., *erica capitata*, Thunb. *Differt.* n.° 15; à l'*erica purpurascens*, n.° 69; Salisbury réunit cette plante, comme variétés, avec l'*erica vagans*, sous le nom d'*erica saxatilis*; à l'*erica medieterranea*, n.° 72, Curtis, *Bot. Magaz.* n.° 471, Icon.; à l'*erica droseroides*, n.° 74, *erica glutinosa*, Icon. Hort. Kew. tab. 17.

L'erica eriocephala, n°. 71, est le *bleria arctowata*, figuré dans les *Illustrations*, tab. 78. (Voyez BLAIRE, Suppl.) *L'erica Dawsonii* appartient au genre *mezaspiza*, établi par Smith. (Voyez le Supplément.)

6. 1°. Anthères à deux arêtes.

* Feuilles ternées.

77. BRUYÈRE pourpre-verte. *Erica discolor*. Andr.

Erica antheris aristata, inclusis; stylo exserto; corollis tubuloso-clavatis, calice duplici; floribus terminalibus, ternis; foliis ternis, glabris. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 319. — Andr. Eric. n°. 3. Ic. Misa.

Les fleurs sont d'un pourpre-pâle, verdâtres à leur sommet, pédoncules, ordinairement au nombre de trois à l'extrémité des rameaux; la corolle longuement tubulée, en massue; le style saillant; les étamines plus courtes que la corolle; les anthères aristées; le calice double, à découpures linéolées; les feuilles ternées, courtes, glabres, étalées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

78. BRUYÈRE à feuilles denses. *Erica densifolia*. Willd.

Erica antheris aristata, inclusis; stylo exserto; corollis tubuloso-clavatis, pubescentibus; floribus axillaribus; foliis ternis, oblongis, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 319.

Les fleurs sont grandes, axillaires, purpurines; la corolle pubescente; les feuilles pétiolées, courtes, ternées, linéaires-oblongues, rudes à leurs bords, nombreuses, presque imbriquées, marquées d'un sillon longitudinal. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

79. BRUYÈRE ensanglantée. *Erica cruenta*. Ait.

Erica antheris aristata, inclusis; stylo exserto; corollis tubulosis, incurvis; calice simplici, glanduloso-dentato; floribus axillaribus, verticillatis; foliis ternis, margine scabris. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 119. — Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 16, & Icon. t. 13. — Andr. Eric. Icon.

Les rameaux sont pubescents; les feuilles pétiolées, ternées, glabres, linéaires, subulées; les fleurs axillaires; la corolle glabre, un peu recourbée, d'un rouge-vif; le limbe à quatre découpures larges, un peu aiguës; les pédoncules accompagnés de trois bractées; les feuilles pétiolées, linéaires-subulées, glabres, étalées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

80. BRUYÈRE à feuilles de phylicia. *Erica phyllifolia*.

Erica antheris aristata, inclusis; stylo inclusis; corollis campanulatis, calice parum longioribus; floribus axillaribus, nudicibus; foliis ternis, squarriam imbricatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 361.

Voisine de *Erica saxifolia* Willd. n°. 78, elle en diffère par les anthères aristées, non saillantes. Ses feuilles sont glabres, linéaires, trigones, ternées, imbriquées sur six rangs; les fleurs pendantes, axillaires vers le sommet des rameaux; les pédoncules solitaires ou géminés; le calice coloré, presque de la longueur de la corolle; trois bractées vers le milieu du pédoncule. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

81. BRUYÈRE à feuilles de marum. *Erica marifolia*. Ait.

Erica antheris aristata, corollis ovato-conicis, stylo medio; foliis ternis ovatis, pubescentibus, subius albidis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 15, & Icon. tab. 14. — Thunb. Prod. 71.

Les fleurs sont disposées en ombelle à l'extrémité des rameaux; les corolles ovales, coniques; les anthères aristées; les feuilles ovales, un peu arrondies, ternées, pubescentes, blanchâtres en dessous; les rameaux pileux. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

82. BRUYÈRE hérissée. *Erica hirta*. Thunb.

Erica aristata, foliis ternis, linearibus, hispida; floribus umbellatis; calice scabro, ruo. Thunb. Diff. n°. 56, tab. 1. fig. 3.

Ses feuilles sont ternées, linéaires, hispides; ses fleurs réunies en ombelles, longuement pédonculées; le calice rude; la corolle globuleuse, légèrement velue. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

83. BRUYÈRE deux couleurs. *Erica bicolor*. Thunb.

Erica aristata, foliis ternis, ovatis, scabris; floribus ternis, cernuis, scabris; calice villosis, colorato. Thunb. Diff. n°. 57.

Ses feuilles sont rudes, ovales, obtuses, un peu velues, trois à trois; les fleurs glabres, inclinées, souvent réunies trois à trois à l'extrémité des rameaux; le calice velu & coloré; la corolle campanulée; les anthères un peu saillantes. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

** Feuilles quaternées.

84. BRUYÈRE grêle. *Erica gracilis*. Wendl.

Erica antheris aristata, stylo exserto, corollis campanulatis, calice colorato; lacinii linearibus, glabris; floribus terminalibus, umbellatis; foliis quaternis, linearibus, glabris, adpressis; caule gla-

errimo. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 361. — Wendl. Observ. 67. Non Salisb.

Ses tiges sont glabres ; ses feuilles glabres , linéaires , courtes , luisantes , appliquées contre les tiges ; les fleurs disposées en ombelles terminales ; la corolle blanche , campanulée ; le calice coloré ; les découpures glabres , linéaires. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

81. BRUYÈRE rude. *Erica frigosa*. Air.

Erica antheris aristatis ; corollis campanulatis , glabris ; stylo exserto ; foliis quaternis , pubescentibus , ciliatis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 17. — An Willd. n°. 23 ?

Ses rameaux sont légèrement velus ; les feuilles pétiolées , quaternées , un peu velues , linéaires , aiguës , un peu étalées , munies à leurs bords de longs poils rares , glanduleux à leur sommet. Les fleurs sont disposées en ombelles terminales , inclinées ; les folioles du calice linéaires , ciliées ; trois bractées fort petites , caduques ; la corolle campanulée , d'un rouge pâle ; le tube un peu ventru. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

86. BRUYÈRE verticillée. *Erica verticillata*. Andr.

Erica antheris aristatis , stylo incluso ; corollis cylindricis , supra basin confistis ; floribus pendulis , verticillatis ; foliis quaternis , patentibus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 370. — Andr. Eric. Icon.

Cette espèce est remarquable par ses corolles cylindriques , d'un beau rouge-écarlate ; le tube renflé un peu au dessus de la base ; les fleurs pendantes , verticillées ; les feuilles étalées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

87. BRUYÈRE de Patterson. *Erica Pattersonii*. Wendl.

Erica antheris aristatis , stylo exserto , corollâ tubuloso-clavata ; floribus horizontalibus , terminalibus ; foliis quaternis quinifve , linearibus , glabris ; junioribus confertissimis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 370. — Andr. Eric. Ic. — Wendl. Eric. Fasc. 1. pag. 15. tab. 5.

Ses rameaux sont glabres ; ses feuilles très-nombreuses , entassées , glabres , linéaires , mucronées , réunies au nombre de quatre ou cinq ; les fleurs solitaires ou gémées au sommet des rameaux ; quatre bractées linéaires , subulées ; le calice divisé en quatre folioles glabres , lancéolées , subulées ; la corolle jeune , tubulée , presque en massue ; les découpures du limbe ovales , obtuses , étalées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

88. BRUYÈRE ventruë. *Erica inflata*. Thunb.

Erica aristata , foliis quaternis , linearibus , gla-

bris ; floribus umbellatis , ventricosis ; calice falcato , glabro. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 369. — Thunb. Diff. n°. 67. tab. 2. fig. 2.

Cette plante se distingue par ses corolles d'un rouge-pâle , dont le tube ventru se rétrécit insensiblement en une pointe obtuse. Le calice est glabre & subulé ; les fleurs inclinées , disposées en ombelle ; les pédoncules velus ; les feuilles glabres , linéaires. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h} (*V. f. in herb. Desfont.*)

89. BRUYÈRE jaune-fale. *Erica gilva*. Wendl.

Erica antheris aristatis , stylo incluso , corollis cylindricis , calicinis foliolis membranaceis ; floribus axillariis , verticillatis ; foliis quaternis , linearibus , glabris , cartilagineo mucronatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 369. — Wendl. Obs. 48.

Ses feuilles sont glabres , linéaires , quaternées , très-ferrées , cartilagineuses , mucronées ; les folioles du calice membraneuses ; les fleurs axillaires , verticillées ; les corolles cylindriques , renflées , grandes , d'un jaune-fale , verdâtres & reniées vers leur sommet ; les découpures du limbe très-courtes , arrondies , obtuses. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

90. BRUYÈRE de Corse. *Erica corfica*. Decand.

Erica antheris aristatis ; corollis ovoides , stylo aequalibus ; foliis quaternis quinifve ; floribus capitato-congestis ; ramulis coarctatis , fulgauris. Decand. Flor. franç. 3. pag. 677. & Synopf. pag. 149.

Cette espèce ne peut être confondue avec la bruyère en arbre , dont elle se rapproche. Ses rameaux sont blanchâtres , alternes ou opposés , point hérissés , mais un peu pubescens ; les feuilles glabres , linéaires , quatre ou cinq ensemble ; les fleurs réunies en une tête ferrée , arrondie ; les pédicelles pubescens , accompagnés de deux petites bractées ; la corolle d'un pourpre-vif , un peu ovale , à quatre dents roulées en dehors ; l'ovaire velu.

Cette plante a été découverte en Corse par M. de Labillardière. \bar{h} (*V. f.*)

*** Feuilles au nombre de huit ou de quatre.

91. BRUYÈRE en couronne. *Erica coronata*. Andr.

Erica (fascicularis) , antheris aristatis , stylo exserto ; corollis cylindricis , clavatis ; floribus numerosis , verticillatis , horizontalibus ; foliis odonitis , linearibus , glanduloso-denticulatis. Willd. n. Spec. Plant. 2. pag. 373. — Andr. Eric. Icon. & Icon. Hort. Kew. tab. 6.

Cette espèce se distingue de l'*Erica fascicularis* Linn. par ses corolles d'un rouge de sang , verdâ-

tres à leur sommet; elles sont au nombre de quinze à vingt-quatre, disposées en verticilles vers le sommet des rameaux. Les folioles du calice sont glabres, vertes, lancéolées; les feuilles linéaires, très-rapprochées, glabres, longuement pétioles, denticulées, glanduleuses à leurs bords. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

92. BRUYÈRE fleurie. *Erica florida* Thunb.

Erica antheris aristatis, stylo incluso, corollis globosis; calice villosa, reflexo; floribus terminalibus, umbellatis; foliis quaternis, linearibus, pilosis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 367. — Thunb. Diff. n° 64. tab. 6. fig. 1.

Ses feuilles sont linéaires-lancéolées, quatre à quatre, pileuses; les fleurs disposées en ombelles terminales. Leur calice est velu & réfléchi en dehors; la corolle globuleuse; le style non saillant. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

§. II. Étamines à crêtes.

* Feuilles éparées.

93. BRUYÈRE à feuilles obliques. *Erica obliqua*.

Erica antheris cristatis, stylo incluso; corollis ovatis, viscosis; floribus terminalibus, umbellatis; foliis subsoppositis, sparsis, linearibus, arcuatis, revolutis. Willen. Spec. Plant. 2. pag. 374. — Thunb. Diff. n° 72. tab. 1. fig. 3, & Icon. Hort. Kew. tab. 1.

Les tiges sont glabres, rudes vers leur sommet; les rameaux presque fistigés; les feuilles éparées ou opposées, ou quaternées, glabres, linéaires, rétrécies en pétiole, courbées, tronquées; les fleurs en ombelles terminales; les corolles purpurines, ovales, visqueuses; les pédoncules trois fois plus longs que les fleurs. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

* * Feuilles ternées.

94. Bruyère élégante. *Erica formosa*.

Erica cristata, foliis ternis, ovatis, integris, glabris; floribus umbellatis, sulcatis; calice patenti, integro. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 377. — Thunb. Diff. n° 82. tab. 3. fig. 1.

Ses rameaux sont filiformes, cendrés & velus; les feuilles petites, glabres, ovales-oblongues, entières, obtuses, étalées; les fleurs inclinées, deux ou trois à l'extrémité des petits rameaux; la corolle blanchâtre, striée, globuleuse; le calice ouvert & entier. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

95. BRUYÈRE rouge de sang. *Erica rubens*. Thunb.

Erica cristata, foliis ternis, linearibus, integris,

glabris; floribus umbellatis, globosis; calice lanceolato, brevi; ramis glabris. Thunb. Diff. n° 81.

Ses rameaux sont glabres, garnis de feuilles linéaires-lancéolées, glabres, entières, très-courtes, marquées d'un filon d'un vert-pourpre; la corolle d'un rouge de sang, globuleuse, de la grosseur d'un grain de poivre; le calice court & lancéolé. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

96. BRUYÈRE incarnate. *Erica incarnata*. Thunb.

Erica cristata, foliis ternis, ovatis, integris, glabris; floribus umbellatis, ovatis; calice integro, ramis villosis. Thunb. Diff. n° 84.

Ses rameaux sont velus; ses feuilles glabres, ovales-lancéolées, entières. La corolle est oblongue, campanulée, d'un blanc de chait, longue d'environ trois lignes; les folioles du calice entières, glabres, lancéolées, purpurines, beaucoup plus courtes que la corolle. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* * * Feuilles quaternées.

97. BRUYÈRE perlée. *Erica margaritacea*. Ait.

Erica cristata, foliis quaternis, arigonis, integris; floribus umbellatis, campanulatis; calice arigono, subaquante. Thunb. Prodr. 74. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 20.

Les feuilles sont redressées, entières, glabres, trigones; les fleurs, au nombre de quatre à huit, terminales & axillaires; les pédoncules plus courts que les feuilles, accompagnés de trois bractées linéaires; les folioles du calice subulées, élargies à leur base, en carène; la corolle blanche, globuleuse, campanulée; les filaments plus courts que le tube. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

98. BRUYÈRE pendante. *Erica pendula*. Wendl.

Erica antheris cristatis, stylo incluso, corollis ovatis; umbellis multifloris, terminalibus; foliis quaternis quinque, glabris, oblongis, margine revolutis; ramis pendulis. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 381. — Wendl. Observ. 48.

Ses rameaux sont glabres & pendans; ses feuilles linéaires-oblongues, pétioles, glabres, obtuses, roulées à leurs bords; les fleurs inclinées, disposées en ombelle au sommet des rameaux; les pédoncules colorés, légèrement pubescents, accompagnés de deux bractées; les folioles du calice obuses, verdâtres; la corolle ovale. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. η

§. III. Anthères mutiques.

* Feuilles ternées.

99. BRUYÈRE à fût pans. *Erica sexfaria*. Ait.

Erica antheris muticis, exsertis; styla exserto; corollis campanulatis, calice colorato, imbricato, brevioribus; floribus ternis, terminalibus; foliis ternis, linearis-trigonis, glabris, sessilibus imbricatis. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 388. — Icon. Hort. K.w. tab. 11.

Toute la plante est glabre; les feuilles ternées, disposées sur six rangs, un peu épaisses, linéaires, trigones; les fleurs blanches, réunies trois par trois à l'extrémité des rameaux; les folioles du calice concaves, arrondies, un peu aiguës, plus grandes que la corolle campanulée; quatre bractées sur les pédoncules. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

100. BRUYÈRE à feuilles d'if. *Erica taxifolia*. Wendl.

Erica antheris muticis, inclusis; corollâ ovata, calice colorato terâ; floribus umbellatis-corymboseis; foliis linearis-trigonis, margine cartilagineis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 389. — Ic. Hort. K.w. tab. 19. — Wendl. Obi. tab. 44.

Ses feuilles sont trigones, linéaires, alongées, mucronées, cartilagineuses à leurs bords; les fleurs nombreuses à l'extrémité des rameaux, en corymbes ombellés; les pédoncules colorés, légèrement ciliés, munis de deux bractées; les folioles du calice purpurines, ciliées, ovales, arrondies; la corolle ovale, de la longueur du calice; le tube couleur de chair; les découpures du limbe purpurines, ovales, aiguës. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

101. BRUYÈRE de Banks. *Erica Banksii*. Andr.

Erica antheris muticis, exsertis; corollâ cylindricâ, limbo revoluto; calicinis foliolis coloratis, oblongis, obtusis, bracteatis; floribus sessilibus, geminis, terminalibus; foliis ternis, linearibus, glabris, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 395. — Andr. Eric. Icon.

Ses tiges sont rameuses & tombantes; ses feuilles entières, droites, redressées, linéaires, trigones, aiguës; les fleurs sessiles, solitaires ou geminées à l'extrémité des rameaux; les folioles du calice d'un vert jaunâtre, oblongues, obtuses, accompagnées de bractées de même couleur; la corolle cylindrique, d'un vert jaunâtre, une fois plus longue que le calice, un peu ventrue à sa base & ses découpures réfléchies en dehors. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

102. BRUYÈRE de Séba. *Erica sebana*. Air.

Erica antheris muticis, exsertis; corollâ clavata, incurvata; calicinis foliolis scariosis, oblongis, obtusis, bracteatis; floribus ternis, terminalibus; foliis ternis, linearibus, squarrosopatentibus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 395. — Dunn. Ind. Hort. Cant.

45. — Icon. Hort. Kew. tab. 10. — Séba, Mus. 1. pag. 32. tab. 21. fig. 4.

La description que Bergius a donnée de cette plante convient très-bien, d'après Willdenow, à cette espèce, mais non la synonymie & le nom d'*Erica Plukenetii* Linn., à laquelle il la rapporte: ce n'est pas non plus l'*Erica Pectenii*. Elle se distingue par les corolles purpurines, courbées en forme de massue; les découpures du limbe droites, obtuses; les découpures du calice scarieuses, oblongues, obtuses, en carène, accompagnées de bractées; les feuilles linéaires, étalées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

103. BRUYÈRE monadelph. *Erica monadelphæ*.

Erica antheris muticis, exsertis; corollâ cylindrico-ovata; calicinis foliolis coloratis, oblongis, obtusis, bracteatis; floribus ternis, terminalibus; foliolis ternis, obtusis, adpressis-erectis. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 396. — Andr. Eric. Icon.

On la distingue à la forme de sa corolle ovale-cylindrique, à ses calices d'un rouge de sang, leurs folioles oblongues, obtuses, accompagnées de bractées. Les filaments sont élargis, médiocrement adhérens par leurs bords; les fleurs terminales, au nombre de trois; les feuilles redressées, linéaires, obtuses, trois à trois. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

104. BRUYÈRE panachée. *Erica variegata*. Andr.

Erica antheris muticis, subexsertis; corollis clavato-tubulosis, glabris; floribus pedunculatis, terminalibus; foliis ternis, linearibus, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 397. — Andr. Eric. Icon.

Ses feuilles sont ternées, linéaires, ciliées à leurs bords; les fleurs terminales, pédonculées; la corolle presque cylindrique, panachée; le tube en massue; les étamines médiocrement saillantes. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

105. BRUYÈRE transparente. *Erica perspicua*. Wendl.

Erica antheris muticis, inclusis; corollis tubulosis, villosis; floribus sessilibus, terminalibus, solitariis; foliis ternis, linearibus, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 397. — Wendl. Eric. pag. 7 tab. 1.

Les rameaux sont très-courts & nombreux; les feuilles trois à trois, linéaires & ciliées; les fleurs sessiles, solitaires à l'extrémité de chaque rameau; le calice très-court; la corolle velue, blanchâtre, rubuleuse & transparente. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

106. BRUYÈRE d'Aiton. *Erica aitonii*. Andr.

Erica antheris muticis, inclusis; corollâ hypocrateriformi, floribus umbellatis; foliis ternis, linearibus, patentibus.

parviflora. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 398. — Andr. Eric. Icon.

Cette espèce est remarquable par ses fleurs presque semblables à celles du jais. Le tube est visqueux, strié, d'un rouge de sang; le limbe blanc, à quatre découpures planes, grandes, ovales, de couleur blanche, aigues & un peu recourbées à leur sommet; les feuilles courtes, linéaires, médiocrement redressées. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

107. BRUYÈRE à fleurs axillaires. *Erica axillaris*. Thunb.

Erica mutica, foliis ternis, trigonis, glabris; floribus racemosis, globosis; ramis tomentosis. Thunb. Diff. 10. 10.

Ses tiges sont garnies de rameaux tomenteux & de feuilles glabres, trigones; les fleurs pédonculées, disposées en grappes ou plutôt foliaires dans l'aisselle des feuilles; la corolle petite & globuleuse; les anthères & le style non saillans. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

* * Feuilles quatre par quatre & plus.

108. BRUYÈRE élégante. *Erica pulchella*. Thunb.

Erica antheris mutica, inclusis; stylo exserto, corollis tubuloso-campandatis, calicibus glabris; floribus axillaribus, verticillatis; foliis ternis, linearibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 398. — Thunb. Diff. n°. 24. tab. 4. fig. 1.

Ses feuilles sont linéaires, lancéolées, disposées six par six; les fleurs axillaires, verticillées; les calices glabres; la corolle purpurine, légèrement pubescente, tubulée; le limbe campanulé. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

109. BRUYÈRE à longues feuilles. *Erica longifolia*. Willd.

Erica antheris mutica, inclusis; stylo inclusis; corollis pubescentibus, tubuloso-clavatis; floribus axillaribus, verticillatis; foliis subsessilibus, linearibus, marginis cartilagineis, scabris. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 399. — Donn. Ind. Hort. Cantab. pag. 42. — Icon. Hort. Kew. tab. 4.

Erica pinea. Wendl. Eric. pag. 11. tab. 3.

h. *Erica (vestita alba), foliis ternis tremulantibus, linearibus, confertis, attenuatis in petiolum capillares; floribus clavatis, albidis*. Andr. Eric. 1c.

g. *Erica (vestita purpurea), floribus axillaribus, clavatis, purpureis*. Andr. Eric. Icon.

Ces deux plantes ont été réunies, comme variétés, par Salisbury. Les fleurs sont axillaires, verticillées; la corolle droite, pubescente, tubulée, en masse, blanche ou purpurine; les feuilles

Botanique. Supplément. Tome I.

linéaires, rudes, cartilagineuses à leurs bords, remplies huit à dix dans la variété a. Finéiques, redressées à leur base en un pétiole capillaire, au nombre de six dans les variétés g & h. Elles croissent au Cap de Bonne-Espérance. h

110. BRUYÈRE à feuilles de pin. *Erica pinea*. Thunb.

Erica antheris mutica, inclusis; stylo inclusis; corollis glabris; clavato-curvatis; floribus axillaribus, verticillatis; foliis ternis, linearibus, lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 399. — Thunb. Diff. n°. 26.

Les feuilles, d'environ six lignes de long, sont linéaires-lancéolées, fixées à six; les fleurs verticillées, axillaires; les folioles du calice d'argées à leur base, puis linéaires-fimbriées, glabres, trois fois plus courtes que la corolle. Celle-ci est glabre, blanche, en masse, obtuse, courbée, longue d'un pouce. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

111. BRUYÈRE purpurine. *Erica purpurea*. Andr.

Erica antheris mutica, exsertis; stylo exserto; corollis tubulosis, glabris; floribus axillaribus, verticillatis; foliis ternis, linearibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 400. — Andr. Eric. Icon.

On la distingue à ses corolles glabres, courbées, purpurines, tubulées, médiocrement élargies vers leur sommet, ayant leur limbe plane. Le calice est glabre, accompagné à sa base de deux bractées; les fleurs verticillées; les feuilles écartées six par six. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

112. BRUYÈRE mignonne. *Erica coninna*. Ait.

Erica antheris mutica, inclusis; corollis exsertis, basi attenuatis; floribus terminalibus, umbellatis; foliis subsessilibus, glabris. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 23.

Les rameaux sont glabres; les feuilles glabres, en épingle, longues de quatre lignes, médiocrement pétioles, fixées à six sur les branches, quatre à quatre sur les petits rameaux; les fleurs au nombre de trois à six, disposées en ombelles terminales; les folioles du calice ciliées, tubulées, élargies à leur base & accompagnées de trois bractées; la corolle couleur de chair, velue en dehors, grêle, cylindrique, étendue à sa base. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. h

113. BRUYÈRE cylindrique. *Erica cylindrica*. Thunb.

Erica mutica, foliis quaternis, trigonis, glabris; floribus terminalibus, cylindricis, glabris. Thunb. Diff. n°. 29.

Yyy

Erica sffaltiflora. Salisb. Aft. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 383.

Ses feuilles sont imbriquées, rapprochées quatre par quatre ; les fleurs terminales, presque solitaires sur les derniers rameaux ; les folioles du calice glabres, tubulées, trois fois plus courtes que la corolle. Celle-ci est blanche, glabre, cylindrique, longue d'un demi-pouce.

114. BRUYÈRE élevée. *Erica procer*. Wendl.

Erica antheris mutica, inclusis ; stylo exserto ; corollis tubulosis, basi ventricosis ; floribus subsolitariis, terminalibus ; foliis quaternis, linearis-trigonis, pubescentibus, erectis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 403. — Wendl. Obf. 45.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Erica rubiflora*, dont elle diffère par ses feuilles redressées, non étalées, bien moins pileuses, tritomes, linéaires ; par les calices, accompagnés de folioles bien moins nombreuses ; par les découpures de la corolle, très-obtuses ; par les tiges plus élevées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

115. BRUYÈRE à longue corolle. *Erica conspiciua*. Ait.

Erica antheris mutica, subinclusis ; corollis cylindricis, curvis, longifloris, pilosis ; limbo revolutis, stylo exserto ; foliis quaternis, glabris. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 22. & Icon. tab. 12.

Ses tiges sont rameuses & pubescentes ; les feuilles quatre à quatre, glabres, triangulaires, linéaires, un peu aiguës ; les fleurs à peine pédonculées, solitaires ou ternées à l'extrémité des rameaux ; les folioles du calice ovales, obtuses ; la corolle jaune, pubescente, longuement tubulée, courbée ; les découpures réfléchies, très obtuses. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

116. BRUYÈRE glanduleuse. *Erica glandulosa*. Thunb.

Erica mutica, foliis quaternis, linearibus, glanduloso-pilosis ; floribus elevatis, glabris ; calicibus hispatis. Thunb. Diss. n°. 32.

Espèce remarquable par les poils glanduleux & visqueux dont sont couverts ses calices & ses feuilles. La corolle est glabre, cylindrique, en massue, d'un rouge de sang, longue d'un pouce ; les folioles du calice ovales, très-courtes ; les feuilles quatre à quatre, linéaires, obtuses, planes en dessus, marquées en dessous d'un sillon profond. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

117. BRUYÈRE diaphane. *Erica transparent*. Thunb.

Erica mutica, foliis quaternis, trigonis, ciliatis ; floribus terminali-subsolitariis. Thunb. Prodr. 71.

Erica cerinthoides, var. γ. Thunb. Diss. n°. 33.

On la distingue de l'*Erica cerinthoides* à ses fleurs terminales, presque solitaires ; à ses corolles glabres, blanches, d'aphanes. Ses feuilles sont trigones, quatre à quatre, ciliées à leurs bords. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

118. BRUYÈRE ventruë. *Erica ventricosa*. Thunb.

Erica antheris mutica, inclusis ; stylo inclusis, corollis oblongo-ovatis ; floribus terminalibus, umbellatis ; foliis quaternis, linearibus, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 406. — Thunb. Diss. n°. 36. tab. 1. fig. 1. — Curtis, Magaz. 330. Icon. — Andr. Eric. Icon.

Ses feuilles sont réunies quatre à quatre, linéaires, ciliées à leurs bords ; les fleurs terminales, disposées en ombelles ; les corolles glabres, purpurines, ovales-oblongues, ventruës à leurs extrémités, ainsi que le style, renfermées dans la corolle. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

119. BRUYÈRE ampoule. *Erica ampallacea*. Curtis.

Erica antheris mutica, inclusis ; stylo exserto ; corollis striatis, basi globoso-ovatis, superne cylindricis ; floribus terminalibus, umbellatis ; foliis quaternis, linearibus, ciliatis, reflexis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 406. — Curtis, Magaz. 303. Icon.

Elle diffère de la précédente par ses feuilles, une fois plus courtes & réfléchies ; par les calices colorés, ainsi que les bractées très-courtes, situées à la base des pédoncules ; par les corolles d'un pourpre-clair, traversées par des lignes plus foncées ; le tube ovale & globuleux à sa base, puis rétréci, cylindrique, très-allongé à sa partie supérieure. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

120. BRUYÈRE à feuilles recourbées. *Erica incurva*. Wendl.

Erica antheris mutica, exsertis ; stylo exserto ; corollis campanulatis ; floribus terminalibus, capitatis ; foliis quaternis, linearibus, ciliatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 407. — Wendl. Obf. 47.

Cette espèce, d'après Willd. erow, quoique très-rapprochée par son port de l'*Erica empetrifolia*, en diffère par ses feuilles linéaires, recourbées, disposées quatre à quatre, garnies de longs cils ; par les fleurs ramassées en têtes épaisses ; par les anthères multiples. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

121. BRUYÈRE muscari. *Erica muscari*. Andr.

Erica antheris mutica, inclusis ; stylo inclusis ; corollis ovatis, subtragonis ; calicibus foliolis lanceolatis, integerrimis ; floribus terminalibus, sessilibus ; foliis quaternis, linearis-trigonis, glabris.

Willden. Spec. Plant. 2. pag. 409. — Andr. Eric. Icon.

Ses feuilles sont glabres, linéaires, trigones; les fleurs sessiles, terminales; les folioles du calice très-entiers, lanceolés; la corolle ovale-oblongue, presque tétragonue, d'un jaune-pâle, le limbe réfléchi. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

122. BRUYÈRE pyramidale. *Erica pyramidalis*. Aiton.

Erica ontheris mutica, inefsa; stylo exserto; corollis hispida, campanulato-infunibuliformibus; floribus umbellatis; foliis quaternis, lineari-triquetris, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 410. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 491. — Curtis, Magaz. 366. Icon.

Ses rameaux sont pubescents; ses feuilles minces, linéaires, triangulaires, pubescentes, quatre à quatre; les feuilles droites, pédonculées, rougeâtres; la plupart trois à trois à l'extrémité des rameaux; les folioles du calice courtes, lanceolées, colorées, vertâtres à leur sommet; la corolle campanulée, infundibuliforme, munie de poils très-courts; les découpures du limbe droites, ovales, alongées, aiguës. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

123. BRUYÈRE à grappes. *Erica racemosa*.

Erica mutica, foliis quaternis, lanceolatis, villosis; floribus racemosis, globosis; calicibus tomentosis. Thurb. Diss. n°. 47. tab. 5. fig. 1.

Ses tiges sont garnies de rameaux verticillés, velus, & de feuilles lanceolées, obovées, quatre à quatre, étalées, longues d'une ligne, hispides en dessous; les fleurs incarnates, disposées sur les rameaux en grappes un peu pendantes, alongées; les pédoncules capillaires & velus; les folioles du calice blanchâtres, tomenteuses, ovales, obtuses, très-courtes; la corolle presque globuleuse; l'orifice étalé, obtus. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

* Je place ici les deux espèces suivantes, figurées dans les *Illustrations*, n'ayant pu m'assurer du caractère de leurs étamines.

124. BRUYÈRE à feuilles de gaillet. *Erica galioides*.

Erica antheris inclusis, stylo exserto; foliis brevibus, quaternis, glabris; floribus sessilibus, so utatis, funtaminibus; corollis ovato-campanulatis. (N.) Lam. Ill. Gen. tab. 287. fig. 5.

Ses tiges sont glabres; ses rameaux grêles, alternes; les plus jeunes courts, filiformes, garnis de feuilles un peu distantes, courtes, glabres, obtuses, linéaires, quatre à quatre; les fleurs situées vers l'extrémité des rameaux, un peu inclinées;

solitaires, presque sessiles; le calice glabre, petit; ses dents ovales, un peu obtuses; la corolle blanchâtre ou légèrement purpurine, à peine une fois aussi longue que le calice, ovale, un peu campanulée; le style saillant.

Cette plante a été découverte à l'île-de-France par Commerçon. *h* (*V. f. in herb. Desfont.*)

125. BRUYÈRE à feuilles de lycopode. *Erica lycopodiifera*.

Erica genitalibus inclusis; foliis brevibus, imbricatis, glabris; ramis fasciculato-creatis; floribus subsessilibus, terminalibus, solitariis. (N.) Lam. Ill. tab. 287. fig. 4.

Arbuste fort élégant, remarquable par ses feuilles, qui prennent très-souvent une couleur bleue très-prononcée; elles sont petites, linéaires, glabres, concaves, obtuses, fortement imbriquées; les tiges noires; les rameaux droits, alternes, presque fasciculés; les fleurs presque terminales, solitaires, à peine pédonculées, glabres, petites; la corolle courte, ovale, médiocrement campanulée; le calice scarieux, les découpures ovales, un peu aiguës; les étamines & le pistil non saillants.

Cette plante croît dans l'Afrique. *h* (*V. f. in herb. Desfont.*)

* Les espèces suivantes ne me sont point connues.

* *Erica (crateræxfolia), ovale angulato, pubescente; tubo angustè obovato; antheris foraminosis.* Salisb. A&T. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 372. — *Erica pubescens*, var. *p.* Thurb. Diss. n°. 61.

* *Erica (tardiflora), calice odpresso, ovato, cuneato; corollis lineari-pubescente; limbo brevissimo, recurvo; capsula hirsuta.* Salisb. l. c. pag. 373. — *Erica pubescens.* Curtis, Magaz. n°. 480.

* *Erica (striata), antheris aristatis, stylo inclusis, corollis ovatis; floribus terminalibus, umbellatis; foliis quaternis, linearibus, glabris, horizontalibus.* Willd. Spec. Plant. 2. pag. 366. — Donn. Catal. Hort. Cant. pag. 45.

Les rameaux & les feuilles sont glabres; ces dernières planes, obovées, horizontales; quatre ou cinq fleurs pédonculées, situées au sommet des rameaux; les pédoncules glabres, colorés, accompagnés de deux ou trois bractées linéaires. Le calice est glabre, vert, à découpures ovales-oblongues, obtuses; la corolle rouge, ovale; les lobes ovales & réfléchis; les étamines une fois plus courtes que la corolle; le style non saillant. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. Jony prétend l'avoir trouvée également dans l'île de Corse. *h*

* *Erica (exigua), calice adpresso, ovato, cuneato; corollis lineari-pubescente, tubo ovali, limbo brevif-*

Yyy 2

fimo, corollis linearibus attenuatis, pericarpio glabro. Si: ov. Act. Soc. Linn. Lond. l. c. — *Erica pubescens*, var. *parviflora*. Thunb. Diff. n.º 61.

* *Erica* (amensis), antheris aristatis, stylo inclusis, corollis campanulatis; calice colorato, villosis; floribus axillaribus, verticillatis; foliis quaternis, linearibus, villosis, imbricatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 368. — Wendl. Obf. 43.

* *Erica* (molleis), calice quadrifido; corollâ linearis, levi; tubo corollari & limbo recurvo, patentissimo; caliculis bifidis. Salisb. Act. Soc. Linn. Lond. 6. pag. 170. — *Erica empetrifolia*. Schneew. n.º 17. Icon.

* *Erica* (pyrolæformis), foliorum laminis cuneatis, calice ovato-cuneato, corollâ bilineari; tubo truncato, sinuato; calicibus late auriculatis. Salisb. Act. Soc. Linn. Lond. 6. pag. 151. — *Erica triflora*. Willd. n.º 47. (Exclusis synonymis.)

* *Erica* (quadriflora), antheris cristatis, stylo inclusis, corollis globosis, calice reflexo, ciliatis; umbellis terminalibus, subsquadrifloris; foliis quaternis, linearibus, ciliatis; caule piloso. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 379.

Elle se rapproche beaucoup de *Erica bergiana*, n.º 7. — Thunb. n.º 81. — Wendl. Eric. Fasc. 2. pag. 19. Icon.

* *Erica* (lateralis), antheris cristatis, corollis globoso-campanulatis; calicibus adpressis, ciliatis; floribus terminalibus & axillaribus, secundis; foliis quaternis, glabris, horizontalibus. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 380. — *Erica rufens*, var. *humilis*. Wendl. Eric. Fasc. 3. pag. 13. Icon.

* *Erica* (laxa), cristata, foliis quaternis, linearibus; flori uni-umbellatis, glabris; calice ovato, ciliato. Thunb. Prodr. Suppl. pag. 189.

* *Erica* (lanceolata), cristata, foliis capitatis, cernuis; foliis quaternis, lanceolatis, erectis, glabris. Persoon. Synopt. — *Erica cernua*, var. *lanceolata*. Wendl. d. Eric. Fasc. 8. pag. 13. Icon.

* *Erica* (caliculata), antheris muticis, exsertis; corollâ subrotundâ, brevi, glabrâ; floribus racemosis terminalibus, umbellatis; foliis ternis, acuminatis, ciliatis, subulatis, imbricatis. Wendl. d. Eric. Fasc. 4. pag. 5. Icon.

* *Erica* (tenuissima), antheris aristatis, inclusis; corollâ minutâ & ovata, obtusâ, glabrâ; stylo inclusis; floribus racemosis terminalibus, umbellatis, erectis & cernuis; foliis tri-quaternis, linearis-filiformibus, glabris, subimbricatis. Wendl. d. Eric. Fasc. 6. pag. 9. Icon.

* *Erica* (torta), mutica, foliis ternis, oblongis, hispatis; floribus ternis, calicibus ciliatis. Thunb. Diff. n.º 17.

* *Erica* (pilifera), antheris muticis; foliis ter-

nis, glabris, mucronato-piliferis; floribus terminalibus, aggregatis. Thunb. Prodr. Suppl. pag. 188.

* *Erica* (scariosa), antheris muticis; foliis ternis, lineariis, glabris; floribus racemosis, campanulatis; bracteis remotis. Thunb. Prodr. 188.

* *Erica* (cephalotes), antheris muticis, inclusis; stylo exserto, corollis tubuloso-clavatis, calicibus pubescentibus; floribus capitis verticillatis; foliis ternis, linearibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 358. — Thunb. Diff. n.º 23.

* *Erica* (leuca), antheris muticis, inclusis; stylo exserto; corollis glabris, tubuloso-clavatis, subtrilocatis; floribus axillaribus, verticillatis; foliis ternis, repais. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 400. — Andr. Eric. Icon.

* *Erica* (lanata), antheris muticis, inclusis; stylo exserto; corollis tubuloso-clavatis, pubescentibus; floribus terminalibus, subsolitariis; foliis quaternis, linearibus, villosis, imbricatis, erectis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 473. — Wendl. Obf. 45. — *Valde affinis Erica tubiflora*.

* *Erica* (spuria), calice ovato, cuneato; corollâ 7-8 linearis, pubescente; tubo cylindrico, auriculati; limbo revoluta, pericarpio obpyramidalis. Andr. Eric. n.º 46. Icon. — *Erica cultiflora*. Salisb. Act. Soc. Linn. Lond. pag. 557. Affinis *praecedens*.

* *Erica* (ignescens), antheris muticis, subexsertis; corollâ cylindricâ, glabrâ, apice hirsutâ; stylo exserto, floribus racemosis pyramidalibus; foliis quaternis, linearibus, villosis, patentibus. Wendl. Eric. Fasc. 8. pag. 3. Icon.

* *Erica* (splendens), antheris muticis, exsertis; corollâ tubulosâ, elovatâ, pubescente; stylo exserto; floribus terminalibus, racemosis; foliis quinis plurimisve, linearibus, glabris, obtusis. Wendl. d. Eric. Fasc. 8. pag. 5. Icon.

* *Erica* (peñinifolia), foliis laminis angustato-cuneatis, pectinatis; calice rhombeo, sinuato; corollâ 5-7 linearis, intus lanata. Salisb. Act. Soc. Linn. Lond. pag. 367. — *Erica retinoides*. Thunb. Diff. n.º 33.

* *Erica* (inflexa), antheris muticis, foliis quinis, trigonis, incurvis; glabris; floribus racemosis, ovatis; calice viridi. Pers. Synopt. l. pag. 428. — *Erica incurva*. Thunb. Prodr. 188.

* *Erica* (globosa), antheris muticis, inclusis; stylo exserto, corollis campanulatis, calicibus imbricatis; floribus terminalibus, globosis capitatis; foliis quaternis, linearibus, cartilagineo-dentatis, apice callosis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 408.

* *Erica* (fucata), mutica, foliis ternis, lanceolatis, glabris; floribus racemosis, secundis, globosis; ramis glabris. Thunb. Diff. n.º 9.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Erica scoparia* Linn. & Rudolp. Bot. Journ. pag. 232.

* *Erica (crissifolia)*, antheris muticis; foliis ternis, trigonis, glabris; floribus umbellatis, calicibus tetraphyllis; limbo tubo triplo longiore, basi integro; capsula levi. Salisb. l. c. pag. 332. — *Erica melanthea*. Thunb. Diss. n.º 12. Non Linn.

Les espèces ci-jointes, presque toutes du Cap de Bonne-Espérance, sont mentionnées par Salisbury, mais sans description. Quelques-unes sont cultivées en Angleterre. Comme elles ne nous sont encore que très imparfaitement connues, je me bornerai à les présenter ici par une simple phrase spécifique.

* *Erica (spiculifolia)*, pedunculis bracteatis, calice breviter quadrifido; corollâ uniflorâ, levi; tubo cyathiformi, quadrangulo; filamentis muticis. Salisb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 6. pag. 326.

* *Erica (asperifolia)*, foliorum laminis linearibus, corollâ lineariviscidâ, tubo sphaerico, filamentis sapidis coloratis; pericarpio lanato. Salisb. l. c. — *Erica fetacea*. Andr.

* *Erica (oxyccifolia)*, caule decumbente, filiformi; foliorum laminis ovatis; corollâ linearicampanulata, hirsutâ; filamentis muticis. Salisb. l. c. pag. 325.

* *Erica (siczifolia)*, foliorum laminis mucronatis; corollâ linearibus, extus hirsutâ; tubo cyathiformi, calcaribus linearibus attenuatis, pericarpio glabro. Salisb. l. c.

* *Erica (lausta)*, foliorum laminis setosis; corollâ 2-3 linearibus, extus pubescente; tubo urceolari; calcaribus aurito-attenuatis, valde serratis. Salisb. l. c. pag. 326.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Erica hirta* Thunb., dont elle diffère par ses feuilles plus élargies à leur base, par ses anthers linéaires, & non intentionnellement recuées vers leur sommet.

* *Erica (tomentosa)*, foliorum laminis angustifoliaribus, calice planiusculo; corollâ linearibus, utrinque tomentosa; calcaribus longis, recurvis. Salisb. l. c. pag. 327.

* *Erica (auricularis)*, foliorum laminis linearilanceolatis; corollâ bilineari, extus pubescente; tubo ovato; calcaribus minutis, auricularibus. Salisb. l. c.

* *Erica (heliathanthemifolia)*, foliis binis; laminis obovatis, planiusculis; corollâ linearibus, utrinque pubescente; calcaribus longis. Salisb. l. c. pag. 328.

* *Erica (polytichifolia)*, caule tomentoso, bracteis remotis, calice basi semim angustato; corollâ linearibus, calcaribus cuneatis. Salisb. pag. 329.

On la distingue de l'*Erica scoparia* par ses fleurs louches, par la corolle émarginée; le tube en forme de pot; le stigmate pointu; & la capsule pyriforme.

* *Erica (tenuis)*, caule divaricato, foliorum laminis linearibus; corollâ linearibus, campanulata, levi; filamentis brevissimis, calcaribus linearibus attenuatis. Salisb. l. c. pag. 329.

* *Erica (glomeriflora)*, foliorum laminis angustiusculis, calice bracteis imbricatis; corollâ bilineari, viscidâ; tubo sphaerico, calcaribus villosissimis. Salisb. l. c. pag. 330.

* *Erica (cardiifolia)*, foliorum laminis setosis, pedunculis longis; corollâ bilineari, levi; tubo globooso, filamentis muticis, pericarpio longe stipitato. Salisb. l. c.

* *Erica (tubercularis)*, corollâ linearibus, calcaribus asperis; tubo globooso, filamentis muticis, pericarpio longe stipitato. Salisb. l. c.

* *Erica (campanularis)*, caule glabro, foliorum laminis angustis; corollâ bilineari, campanulata, levi; filamentis brevissimis, muticis. Salisb. l. c.

Sa corolle est jaune; elle ressemble à celle du convallaria maialis. C'est l'*Erica tenuifolia* des jardiniers.

* *Erica (blanda)*, floribus glomeratis, corollâ linearibus, limbo tubo dimidia longiore, laciniis semiorbicularibus, stigmate lato. Salisb. l. c. pag. 331.

* *Erica (seriphifolia)*, foliis minutè ciliatis, corollâ linearibus, limbo basi integro, obtuso; filamentis muticis. Salisb. l. c. — *Erica cubica*. Thunb. Diss. n.º 46.

* *Erica (lavandulæfolia)*, caule incano, bracteis juxta calicem, corollâ bilineari, tubo setangulo, limbo incurvo, filamentis inferius latissimis. Salisb. l. c.

* *Erica (humifusa)*, foliis binis, laminis ovalibus, corollâ linearibus, limbo amplo, stylo longe exserto. Salisb. l. c. pag. 332.

* *Erica (corydalifolia)*, foliorum laminis lanceolato-cuneatis, corollâ bilineari, limbo basi integro, antheris dorso alatis. Salisb. l. c. pag. 334.

* *Erica (azulexifolia)*, foliorum laminis lanceolatis; corollâ linearibus; antheris exsertis, pentocotis foraminosis. Salisb. l. c.

* *Erica (vesicularis)*, foliis vesiculis nigris, adspersis; corollâ linearibus, viscidâ; pubescente; calcaribus parallelis, cuneatis; pericarpio sericeo. Salisb. l. c. pag. 33. — *Erica conica*. Hortul.

* *Erica (verricifolia)*, foliis viscidis, corollâ bilineari, limbo recurvo; calcaribus aurito-cuneatis, hirtis; pericarpio levi. Salisb. l. c.

* *Erica* (lathraeifolia), foliorum laminis ovatis, pubescentibus; corollâ bilineari, limbo recurvo; calcaribus longis, angustis cuneatis. Salisb. l. c. pag. 335.

* *Erica* (lytzigera), foliis lucidis, corollâ lineari, limbo recurvo; calcaribus serratis, antheris lyraformibus; pericarpio tomentoso. Salisb. l. c. pag. 336.

* *Erica* (salax), foliis lividis, calice adpresso, corollâ lineari, filamentis brevissimis, pericarpio leviter, stigmate lato. Salisb. l. c.

* *Erica* (cumuliflora), fasciculis 7-12 floris, calice incano, corollâ bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio hirsuto, stigmate angusto. Salisb. l. c. pag. 336.

* *Erica* (goniophylla), fasciculis trifloris, calice viscido, corollâ bilineari, limbo inferne ciliato, pericarpio leviter, stigmate lato. Salisb. l. c. pag. 337.

* *Erica* (periplocifolia), foliorum laminis lanceolato-cuneatis, pedunculis longis; calice brevi, orbiculari; corollâ 1-2 lineari, stigmate angusto. Salisb. l. c.

* *Erica* (lucida), calice minuscule ciliato, lacido; corollâ lineari; calcaribus articulatis, infero-serratis; stigmate angusto, inciso. Salisb. l. c.

* *Erica* (munda), bracteis calicibusque integerrimis, corollâ lineari; calcaribus articulatis, ciliatis; pericarpio hirsuto. Salisb. l. c.

* *Erica* (fabellis), foliis dense imbricatis; corollâ lineari, calice vix longiore; calcaribus integerrimis; antheris minutis, penè didymis. Salisb. l. c. pag. 338.

* *Erica* (dianthifolia), foliis binis, longis; calice ovato-cuneato, corollâ trilobata, calcaribus serratis, pericarpio glabro. Salisb. l. c.

* *Erica* (brevifolia), foliorum laminis ovatis, corollâ lineari, calice longiore; calcaribus lineari-attenuatis, seminibus striatis. Salisb. l. c.

* *Erica* (chlamydistora), foliorum laminis lineari-bus, hirsutis; corollâ bilineari, calice vix longiore; calcaribus articulatis, seminibus ovatis. Salisb. l. c.

* *Erica* (selaginifolia), caule tomentoso; corollâ Enari, leviter tubo globoso; calcaribus latissimis, orbicularibus. Salisb. l. c.

* *Erica* (pinnatis), foliorum laminis parùm replicatis; corollâ lineari, lanatâ; filamentis breviter calcaratis, stylo exserto. Salisb. l. c. pag. 339.

* *Erica* (elliciflora), foliis ternis, minutis; calice pilosissimo, bracteis distinctis; corollâ lineari, hirsutâ, tetrandrâ; filamentis muticis. Salisb. l. c.

Les anthers sont très-velues, presque didynames; elles sont au nombre de quatre, caractère

qui parait devoir faire ranger cette espèce & les cinq suivantes parmi le *hexandra*, pour ceux qui admettent ce dernier genre, si peu distingué des *erica*.

* *Erica* (xeranthemifolia), foliis ternis, laminis vix imbricatis; calice lineari, imbricato; corollâ lineari, lanatâ, tetrandrâ. Salisb. l. c.

* *Erica* (modiolina), foliis ternis; calice infundibuliformi, villosissimo; corollâ lineari, hirsutâ, tetrandrâ; antheris breviter foraminosis. Salisb. l. c. pag. 340.

* *Erica* (bifurcata), calice fimbriato, corollâ lineari; tubo angustissimo, superne repente, dilatato, tetrandrâ; filamentis angustissimis. Salisb. l. c.

* *Erica* (cutilis), foliis quaternis; calice infundibuliformi, glabro, corollâ lineari, glabra, tetrandrâ; filamentis muticis. Salisb. l. c. — *Erica* *fiabra*, Thunb. Prodr. pag. 71.

* *Erica* (labialis), foliis ternis, laminis glabris; calice bilabiato, fimbriato; corollâ lineari, bilabiata, 4-5 andrâ. Salisb. l. c.

* *Erica* (harpigera), calice bracteis imbricato, profunde quadrifido, barbato; corollâ bilineari, glabra, 4-5 andrâ; filamentis muticis, stylo angustissimo. Salisb. l. c. pag. 341.

* *Erica* (brunzeifolia), foliis longis; bracteis juxta calicem, exsertore longissimo; corollâ lineari, hexandrâ; filamentis calcaratis. Salisb. l. c.

* *Erica* (tormalis), pedunculis brevissimis; calice minuto, adpresso; corollâ bilineari, 4-5 andrâ; filamentis muticis, antheris latis. Salisb. l. c. pag. 342.

* *Erica* (equisetifolia), foliis ternis, fasciculis 3-5 floris; pedunculis longis, glabris; corollâ lineari, 4-5 andrâ; filamentis muticis. Salisb. l. c. — *Erica* *articulata*, Hortul.

* *Erica* (diotrypha), calice late cuneato, corollâ lineari, tubo amphoraeformi, antheris parùm exsertis, pericarpio pubescente. Salisb. l. c. pag. 352.

* *Erica* (manipuliflora), caule incano, floribus in axillis interruptis, corollâ lineari, tubo cyathiformi, antheris in seriem erectis. Salisb. l. c. pag. 344. — *Erica* *veritellata*, Forst. Prodr. pag. 210.

* *Erica* (padibunda), foliis tri-quaternis; corollâ bilineari, viscidâ; tubo ovato; antheris latis, exsertis, hirsutis; pericarpio turbato, hirsuto. Salisb. l. c. — *Erica* *mutans*, Wendl. Eric. Faic. 3, pag. 5. lc.

* *Erica* (hiiformis), bracteis juxta calicem; corollâ lineari, glabra; limbo recurvo, antheris longè foraminosis, stigmate angusto, foliis ternis. Salisb. l. c. pag. 345.

* *Erica* (turgida), pedunculis brevissimis; corollâ lineari, hirsutâ; tubo modicali, calcaribus cuneatis, antheris brevissimis. Salisb. l. c. pag. 345.

* *Erica* (v. fl. flua), foliorum laminis incurvato-patentibus, junioribus pilosis; floribus solitariis, corollâ 7-9 lineari, tubo cylindraceo. Salisb. l. c. pag. 346.

* *Erica* (focciiflora), foliorum laminis recurvato-patentibus, corollâ 4-6 lineari; tubo ovato, pyramidalis; pericarpio ovato. Salisb. l. c. — *Erica jobana*, var. β , viridat. Andr. Eric. n^o. 59. Icon. — *Erica Petiverii*. Hortul.

* *Erica* (follicularis), foliorum laminis patentibus, floribus solitariis; corollâ 7-7 lineari, basi infusa; nectario phitiformi. Salisb. l. c. — *Erica petiviana*. Andr. Eric. n^o. 25. Icon. var. β . — *Erica melampoma*. Andr. Eric. n^o. 43.

* *Erica* (penicilliflora), corollâ bilineari, calice obduso; tubo sphaerico, antheris in penicillum convergentibus. Salisb. l. c. — *Erica Petiverii* vera. Hortul.

* *Erica* (placentiflora), foliis obtusifloris, corollâ calice obduso, tubo rufiformi, filamentis sensim dilatatis, squamâ unguis. Salisb. l. c.

* *Erica* (figmentiflora), bracteis supra medium pedunculi sparsulis; corollâ lineari, calice breviora; antheris acuminatis, pericarpio late ovato. Salisb. l. c. pag. 349.

* *Erica* (caesia), calice bracteis imbricato; corollâ lineari, calice breviora; antheris oblongis, stipa lato, pericarpio ovato. Salisb. l. c.

* *Erica* (flexuosa), bracteis supra medium pedunculi sparsulis; corollâ lineari, calice longiore; antheris oblongis, stipa angusto, nectario grandi. Salisb. l. c. pag. 349. — Andr. Eric. n^o. 33. Icon.

* *Erica* (lasciva), calice bracteis imbricato; corollâ lineari, calice parum breviora; antheris à basi foraminifera, stigmate petalo. Salisb. l. c. — *Erica imbricata*. Thunb. Diff. n^o. 11.

* *Erica* (stylosa), pedunculis longis, bracteis juxta calicem sparsulis; corollâ lineari, calice parum longiore; antheris acuminatis, pericarpio ovali. Salisb. l. c.

* *Erica* (dioxypholia), foliis lividis, corollâ bilineari, laciniis imbricatis, filamentis angustissimis; calcaribus exquisitis attenuatis, serrulatis. Salisb. l. c.

* *Erica* (pallidiflora), caule angulato, foliorum laminis lanceolato-cuneatis; corollâ lineari, calice parum longiore; calcaribus auricularibus, glabris. Salisb. l. c. pag. 351.

* *Erica* (regulifolia), foliorum laminis ovalibus, pubescentibus; corollâ lineari; tubo parum quadrangulo, turbinato; calcaribus grandibus, orbicularibus. Salisb. l. c. pag. 351.

* *Erica* (modesta), foliis parvis, dense imbrica-

tis; corollâ trilineari, tomentosa; tubo late ovato, limbo recurvo, calcaribus linearibus attenuatis. Salisb. l. c. pag. 352.

* *Erica* (holosericea), foliorum laminis argente duplicatis; corollâ trilineari, holosericea; tubo ovato, antheris hirsutis. Salisb. l. c.

* *Erica* (plauca), foliis ternis, glaucis, succulentis; corollâ trilineari, exitu rotunda; calcaribus suborbicularibus. Salisb. l. c. pag. 353. — Andr. Eric. n^o. 47. Icon.

* *Erica* (decora), calice plano, marginibus crassius; corollâ 8-10 lineari, viscido-pubescente; tubo clavata; calcaribus longis, pubescentibus. Salisb. l. c. — *Erica Eweri*. Hortul.

* *Erica* (nana), caule hamifuso, foliis obtusis; corollâ 9-11 lineari, exitu torulenta; tubo clavato, compresso; calcaribus longis. Salisb. l. c. — *Erica depressa*. Hortul.

* *Erica* (lacciflora), calice late ovato, acuminato; corollâ 6-8 lineari, glabra; tubo cylindraceo, calcaribus longis; antheris linearibus, valde papulosis. Salisb. l. c.

* *Erica* (cylindriflora), foliis ciliatis, setis decompositis, calice recurvo; corollâ 9 lineari, glabra; tubo cylindraceo, calcaribus brevibus. Salisb. l. c. — *Erica ferratifolia*. Andr. Eric. n^o. 36. Ic.

* *Erica* (cyrtilliflora), caule tenui; corollâ 2-3 lineari, pubescente; tubo angustis campanula, a limbo brevi, filamentis muticis. Salisb. l. c. pag. 357.

* *Erica* (velitaris), corollâ 2-3 lineari, pubescente; tubo obovato; limbo recurvo, patente; calcaribus longis, argute cuneatis, parum serratis. Salisb. l. c.

* *Erica* (cuspidigera), pedunculis glabris; calice ovato, cuspidato; corollâ 11-12 lineari, pubescente; limbi interstitiis basi lanceolatis, antheris hirsutis. Salisb. l. c. pag. 358.

* *Erica* (bixar, flammea), calicis foliolis imbricatis, inaequalibus; corollâ 8 lineari, pubescente; tubo valde clavato, laciniis basi imbricatis. Salisb. l. c. — *Erica curviflora*. Thunb. Diff. n^o. 30. — *Erica flammea*. Hortul.

* *Erica* (bucciniformis), pedunculis pubescentibus; corollâ 9-10 lineari, pubescente; limbo recurvo, patente; filamentis pubescentibus. Salisb. l. c. p. 359. — *Erica tubiflora*. Thunb. Diff. n^o. 31.

* *Erica* (stagnalis), foliorum laminis hirsutis, pedunculis glabris; corollâ 10-11 lineari, hirsuta; antheris rectis, papulosis. Salisb. l. c.

* *Erica* (longiflora), pedunculis glabris; calice recurvo, patente, basi exitu convexo; corollâ 18-20 lineari, pubescente; limbo obtuso. Salisb. l. c. p. 359. — *Erica elsa*. Hortul.

* *Erica* (fruticosa), ramis furcis, lanatis; floribus saepius subsistens; calice adpresso, basi excavato; corollâ 12 lineari, rari lanatâ. Andr. Eric. n^o. 56. Icon. — *Erica laniflora*. Wend. Eric. 2. pag. 23. Icon. — Salisb. l. c. pag. 360.

* *Erica* (exurgens), foliorum laminis recurvis, acutis; corollâ 3-15 lineari, viscidâ; tubo infundibuliformi, lacinia ovato-cuneatis. Andr. Eric. n^o. 13. Icon. — *Erica phaeotragalis*. Salisb. l. c. pag. 361.

* *Erica* (curviflora), corollâ 5-6 lineari, pubescentiâ; tubo angusto, urceolari; limbo patente, filamentis minutè calcaratis. Salisb. l. c. pag. 362. — *Erica inaperta*. Hortul.

* *Erica* (camiformis), calice adpresso; corollâ 9-10 lineari, glabrâ; tubo cylindrico, urceolari; limbo recurvo; pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. — *Erica radiata*. Andr. Eric. n^o. 53. Icon.

* *Erica* (pulviniformis), foliorum laminis obtusatis, serrulato-ciliatis; floribus in racemosis ramulorum longissimis; corollâ 7-9 lineari, viscidâ; tubo cylindrico, urceolari. Salisb. l. c. pag. 364.

* *Erica* (septiformis), caule strigilo, pedunculis brevissimis, calice calloso; foliis longè spatulatis, incisè serratis; corollâ 7-10 lineari, torulensâ. Salisb. l. c. pag. 365.

* *Erica* (claviflora), pedunculis brevissimis; calice foliis orbiculato-spatulatis, integerrimis; corollâ 10-12 lineari, torulensâ. Salisb. l. c.

* *Erica* (alveiflora), pedunculis glabris; corollâ 7-9 lineari, torulensâ; tubo cylindrico, urceolari, infernè quinquangulo. Salisb. l. c. pag. 366. — *Erica gelida*. Hortul.

* *Erica* (brachialis), corollâ 6-8 lineari, utrinquè hirsutâ; tubo curvo, pyramidali; antheris inclusis, longissimis. Salisb. l. c. pag. 367.

* *Erica* (doliiformis), foliis hirsutis, bracteis juxta calicem; corollâ 4-5 lineari, viscidâ; tubo urceolari; calcaribus brevibus, concavis. Salisb. l. c. pag. 368. — *Erica mammosa*. Thunb. Diss. n^o. 60. Icon.

* *Erica* (tyridiflora), calice quadrifido; corollâ bilineari, levi; tubo obovato, limbo incurvo-patente; pericarpio hemisphaerico, glabro. Salisb. l. c. p. 371. — *Erica emporides*. Hortul.

* *Erica* (noveboracensis), calice tetraphyllo; corollâ bilineari, levi; tubo calathiformi; limbo recurvo, patente; flagellato incusso. Salisb. l. c. pag. 371.

* *Erica* (flava), caule vix angulato, foliis quaternis, corollâ bilineari, viscidâ; tubo angusto, urceolari; filamentis mutuis. Salisb. l. c.

* *Erica* (villax), corollâ bilineari, viscidâ; tubo urceolari, parum viscato; filamentis longitudine tubi, calcaratis; pericarpio ovato. Salisb. l. c.

* *Erica* (parilis), corollâ trilineari, viscidâ; tubo urceolari, parum cohaerente, filamentis vix longioribus tubi, minutè calcaratis. Salisb. l. c.

* *Erica* (pubigera), calice patente, ovato, arminato; corollâ lineari, pubescente; limbo longiusculo, recurvo; pericarpio hirsuto. Salisb. l. c. pag. 374.

* *Erica* (pusilla), calice adpresso, levi ovato, cuneato; corollâ lineari-pubescente, tubo calathiformi, limbo longitudine tubi, pericarpio glabro. Salisb. l. c.

* *Erica* (tragilifera), calice imbricato, corollâ bilineari, tubo urceolari, limbo recurvo, calcaribus hirsutis; antheris longissimis, foraminosis, hirsutis. Salisb. l. c.

* *Erica* (curviflora), foliorum laminis linearibus, calice adpresso, corollâ lineari, tubo sphaerico, calcaribus pubescentibus, stylo saepe curvo. Salisb. l. c. pag. 375. — *Erica declinata*. Hortul.

Les fleurs répandent une odeur très-forte, résistante.

* *Erica* (imbicilla), calice minuto, corollâ lineari, tubo ovato, limbo recurvo; calcaribus linearibus concavis, hirsutis. Hortul. — *Erica gracilis*. Salisb. l. c. Non Walt.

* *Erica* (intervallaris), caule acaule, foliorum verticillis remotis, corollâ 1-2 lineari; tubo ovato, cylindrico; pericarpio hirsuto. Salisb. l. c.

* *Erica* (quadriflora), caule glabro, corollâ lineari, tubo poculiformi, limbo erecto; calcaribus lanceolato-cuneatis, integerrimis. Salisb. l. c.

* *Erica* (turrigera), foliis angustis; calice recurvo, horizontali; corollâ bilineari, tubo hemisphaerico, lacinia basi imbricata. Salisb. l. c. pag. 377. — *Erica cupressina*. Hortul.

* *Erica* (turbiniiflora), caule glabro; corollâ lineari, levi; tubo turbinato, angulato; limbo incurvo; calcaribus auricularibus, glabris. Salisb. l. c.

* *Erica* (blemma), foliorum laminis ovato-cuneatis; corollâ 4-5 lineari, viscidâ; tubo urceolari, lacinia basi imbricata, filamentis longissimis. Salisb. l. c. pag. 379.

* *Erica* (veterunda), foliis quaternis, flosculis cordatis; corollâ bilineari, levi; tubo ampheiformi, limbo crenulato. Salisb. l. c. — *Erica cernua*. Andr. Eric. n^o. 48. Icon.

* *Erica* (pulchella), corollâ bilineari, glabrâ; tubo urceolari, parum trigono; calcaribus cuneatis, hirsutis; antheris hirsutis. Salisb. l. c.

* *Erica* (embothisifolia), foliorum laminis linearibus-lanceolatis, spicis coactatis, corollâ quadrilincari, tubo superne admodum ventricoso, antheris exsertis. Salisb. l. c. pag. 379.

* *Erica*

* *Erica (curvisolia)*, foliis ternis, lominis recurvis, spicis corollatis; corollâ quadrilinerari, viscidâ; tubo ovato, pyramidalis; calcaribus linearibus attenuatis. Salisb. l. c. pag. 380.

* *Erica (quarrefolia)*, corollâ 5-6 linearis, viscidâ; tubo ovato-pyramidalis, limbo obtusa, calcaribus marginalibus, antheris levibus. Salisb. l. c.

* *Erica (capax)*, foliorum laminis ovato-cuneatis; corollâ 9-11 linearis, viscidâ; tubo latè ampuliformi, limbo reflexo. Salisb. l. c. pag. 381.

* *Erica (lageniformis)*, foliis ternis; corollâ 12-14 linearis, viscidâ; tubo ovato, apice ventricoso; limbo tubo quadruplò brevior, ovato. Salisb. l. c. pag. 382. — Vent. Malm. tab. 33. — *Erica jossiniifolia*. Andr. Eric. n.º. 49. l. c.

* *Erica (pyretroflora)*, pedunculis brevissimis, corollâ 9-10 linearis, limbo intèr furcatis, filamentis juxta apicem anthera calcaratis. Salisb. l. c.

* *Erica (nidiflora)*, caule pubescente; calice obconicato, serrato; corollâ trilineari, limbo tubo dimidio brevior; calcaribus minutissimis, auricularibus. Salisb. l. c.

* *Erica (walkeria)*, caule glabro; calice angustè lanceolato, serrato; corollâ 4-5 linearis, limbo duplò brevior; antheris breviter foraminosis. Andr. Eric. n.º. 25. l. c. — *Erica pulchra*. Salisb. l. c. p. 384.

* *Erica (daphniflora)*, caule ovato, cuspidato, vix serrato; corollâ trilineari; limbo tubo duplò brevior, recurvo, deflexo; filamentis mucicis. Salisb. l. c. pag. 384.

* *Erica (pellucida)*, caule gracili; calice spathulato, serrato; corollâ 5-6 linearis, limbo tubo triplò brevior, filamentis mucicis. Salisb. l. c.

* *Erica (borboniflora)*, foliis binis; calice trilineari, latè ovali, ocumulato; corollâ trilineari, tubo ovato, pericarpio obovato. Salisb. l. c. pag. 386.

* *Erica (hyssopifolia)*, foliorum laminis pubescentibus; corollâ bilineari, versùs apicem hirtâ; lacinis crispis, reflexis. Salisb. l. c. pag. 387.

BRY. *Bryum.* Ce genre a été établi par Linné avant qu'il ne fût connu sur le port des espèces, que d'après leur fructification : il en faut dire autant de *manium* & des *hypnum*. Les observations d'Herwig, de Swartz, de Bridel, de Dickson, de Palissot-Beauvois & de plusieurs autres savans, sur la fructification des mousses, ont nécessairement amené de grandes réformes dans ces trois genres, ainsi que l'établissement de plusieurs autres, fondés sur des caractères moins généraux; mais ces savans, peu d'accord entr'eux sur les parties constitutives de la fructification, ne le sont pas davantage sur les limites & la dénomination de leurs genres. Ainsi Herwig, en conservant le nom de *bryum*, auquel il réunit un très-grand nombre de

Botanica. Supplément. Tome I.

manium, lui donne pour caractère un *perisperm* double. Ce genre est plus circonscrit dans M. Palissot-Beauvois, qui n'y admet que les espèces à *perisperm* simple. Comme les trois genres de Linné ont été exposés très au long dans cet ouvrage, & qu'ils nous paraissent suffisans pour faire connoître la famille des mousses à ceux qui ne se proposent pas d'en faire une étude particulière, nous n'entreprendrons pas de les résoudre pour y substituer les genres établis depuis, & qui peuvent être étudiés avec plus d'avantages dans les auteurs cités plus haut : cependant on trouvera chacun de ces genres mentionnés dans cet ouvrage avec l'exposition de leurs caractères & les principales espèces qu'il faut y rapporter. (*Voyez* AMALYODE, BARBULE, MEXIE, OATHOTRIC, TORDULL, WERNERE, &c.)

Les espèces de ce genre, figurées dans les *Illustrations des Genres*, tab. 873, sont : fig. 1, *bryum extindarium*; fig. 2, *bryum murale*; fig. 3, *bryum subulotum*; fig. 4, *bryum viridolam*.

BRYONE ou BRYOINE. *Bryonia.* Il est presque hors de doute que l'*ampeloteute* de Dioscoride (*vitis alba*) est notre bryoine, quoique cet auteur, dans la notice qu'il en donne, ne parle point de ses racines, si remarquables par leur grosseur. On reconnoît, dans le nom qu'il lui donne de *vigne blanche*, la méthode des Anciens, qui, sans idées sur les principes de la science, ne considéroient, pour le nom des plantes, que les rapports qu'elles offroient à la première vue avec d'autres plantes plus connues; ils appeloient *vigne blanche* la bryoine, à cause de ses vrilles, de ses tiges grimpantes, de la ressemblance de ses feuilles avec celles de la vigne, & de ses baies disposées en grappes. D'autres auteurs, même du tems de Dioscoride, l'ont nommée *bryaine*, d'un mot grec qui signifie pousser abondamment, parce que ses racines fournissent des tiges qui se répandent au loin sur les arbrisseaux & les buissons, qui deviennent leur appui. Il en est qui soupçonnent que la bryoine est le *meloethron* de Théophraste; mais comme cet auteur n'en donne d'autre notion que celle d'avoir les fruits du *smilax*, qu'il range d'ailleurs parmi les arbrutes, cette opinion est pour le moins très-hazardée, quoique Plin, en citant les noms donnés par les Grecs au *vitis alba*, qui est certainement notre bryoine, y réunisse celui de *meloethron*.

Ce genre a été presque double par les découvertes des voyageurs, principalement par les espèces que Thunberg a recueillies au Cap de Bonne-Espérance, mais qu'il n'a encore mentionnées que par une seule phrase spécifique, que je citerai à la suite de quelques autres espèces mieux connues.

1.º **BRYONE dioïque.** *Bryonia dioica.* Jacq.

Bryonia foliis cordatis, palmatis, quinquelobis,
Z z z

dentatis, calloso-punctatis; floribus racemosis, dioicis (baccis rubris). Willden. Spec. Plant. 4. pag. 621. — Jacq. Aultr. tab. 199. — Lam. Ill. Gener. tab. 756. fig. 1. — Blackw. tab. 37.

Bryonia alba, var. *n.* Lam. Dict. t. pag. 496. — Bull. Herb. tab. 55. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 360. — Pauli, Dan. tab. 18.

Bryonia ruderalis. Salisb. Prodr. 158. — Miller, Icon. tab. 71.

Long-tems cette plante a été confondue en France avec le *bryonia alba*, où elle ne croit pas, & qui d'ailleurs a les fleurs monoïques & les fruits noirs, tandis que la nôtre est constamment dioïque, à fruits rouges; elle doit être, sans aucun doute, considérée comme une espèce distincte, & non comme une simple variété.

Observations. Le *bryonia laciniosa* est figuré, quant à ses fruits, dans les *Illustrations*, tab. 796, fig. 2, ainsi que le *bryonia africana*, fig. 3, d'après Gærtner, tab. 88.

15. *BRYONE* acuminée. *Bryonia rostrata*. Willd.

Bryonia foliis cordatis, obtusis, denticulatis; pedunculis axillaribus foliatis; baccis angulatis, acuminatis. Rottler, Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4. pag. 212. — Willden. Spec. Plant. 4. pag. 616.

Cette plante, d'après Willdenow, a des tiges filiformes & cannelées, garnies de feuilles alternes, en cœur, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, obovées, lâchement denticulées, glabres à leurs deux faces, quelquefois rudes ou pubescentes en dessous sur les nervures. Les pédoncules sont solitaires, axillaires, à une seule fleur, à laquelle succède une baie ovale, anguleuse, de la grosseur d'un pois, surmontée d'une pointe courbée en crochet. Les individus cultivés sont parfaitement glabres.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ☉

16. *BRYONE* de la Cochinchine. *Bryonia cochinchinensis*. Lour.

Bryonia foliis quinqueangulatis, asperis; baccis trilobatis, decagonis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 732.

Cette espèce n'appartient qu'imparfaitement à ce genre. Ses tiges sont grimpantes, herbacées, rameuses, à quatre cannelures; les feuilles pétiolées, alternes, en cœur, à cinq angles, rudes, denticulées; les fleurs blanches, monoïques, solitaires, grandes, axillaires, portées sur de longs pédoncules. Le calice, cylindrique à sa base, se dilate en un limbe à cinq découpures linéaires; la corolle en rouge, à cinq découpures ovales, oblongues. Les trois étamens se réunissent à leur sommet, & ne portent

qu'une seule anthère. L'ovaire, dans les fleurs femelles, est ovale, oblong; le style filiforme, plus court que le tube; le stigmate triangulaire, trifide à son sommet. Le fruit est une baie rouge, ovale, un peu aiguë à ses deux extrémités, à dix angles, à trois loges, contenant plusieurs semences lisses, ovales-oblongues, comprimées.

Cette plante croît à la Cochinchine, le long des haies. (*Descript. ex Lour.*)

17. *BRYONE* à ombelles. *Bryonia umbellata*. Willd.

Bryonia foliis oblongo-cordatis, basi subangulatis, utrinque glabris, supra punctatis, remote denticulatis, basi subangulatis, summis hastato-trilobatis; pedunculis axillaribus, umbellatis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 618. — Klein. in Litt.

Bryonia secundata. Roxb.

Bryonia (hastata), foliis hastatis, denticulatis, glabris; pedunculis polyforis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 731.?

Karivi-valli. Rheed, Hort. malab. 8. pag. 51. tab. 26.?

Ses tiges sont glabres, anguleuses, grimpantes, munies de vrilles simples & de feuilles alternes, glabres à leurs deux faces, ponctuées en dessous; les inférieures longues de trois pouces & plus, oblongues, en cœur & anguleuses à leur base, acuminées à leur sommet, à dentelures lâches; les supérieures longues d'un pouce & demi à deux pouces, hastées, à trois lobes à leur base, acuminées, mucronées à leur sommet; les pédoncules axillaires, plus courts que les pétioles, disposés en ombelle, à plusieurs fleurs. La figure de Rheed représente parfaitement les feuilles inférieures; mais les pédoncules ne sont point en ombelle.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ☿ (*Descript. ex Willd.*)

18. *BRYONE* du Japon. *Bryonia japonica*. Thunb.

Bryonia foliis cordatis, indivisis angulatisque, denticatis, inermi-hispidis. Thunb. Flor. japon. pag. 325.

Ses tiges sont garnies de feuilles en cœur, entières ou anguleuses, à trois lobes, aiguës, dentées, vertes en dessus, hérissées en dessous de poils très-courts; ponctuées, écaillues, longues d'un pouce.

Cette plante croît au Japon. (*Thunb.*)

19. *BRYONE* épigée. *Bryonia epigaea*. Rottl.

Bryonia foliis trilobis, asperis, dentatis; lobis lateralibus angulato-fusiformibus; floribus axillaribus,

fabumbellata. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 619. — Rottler, in Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 4. pag. 213.

Cette espèce a des tiges glabres & cannelées, des vrilles simples, des feuilles longues d'un demi-pouce, un peu charnues, en cœur, à trois lobes; les deux latéraux dilatés, presque à deux lobes, dentés, anguleux, rudés, couverts de très-petits poils blancs & couchés. Les fleurs mâles, au nombre de cinq, sont petites, réunies presque en ombelle à l'extrémité d'un pédoncule commun, long d'environ un pouce & demi; les fleurs femelles solitaires, pédonculées, situées dans les mêmes aisselles avec les mâles. Le fruit est une baie ovale, acuminée.

Cette plante croît dans les Indes orientales. \times (Descript. ex Willd.)

20. BRYONE stipulacée. *Bryonia stipulacea*. Lour.

Bryonia foliis cordatis, trilobis, dentatis, glabris; stipulis subrotundis, pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 620. — Lour. Flot. cochin. 2. pag. 731.

Plante à tige grimpante, ligneuse, cannelée, munie de vrilles trides & de feuilles en cœur, à trois lobes, à cinq nervures, lisses à leurs deux faces, dentées, sinuées à leurs bords, accompagnées de stipules arrondies, concaves, dentées en scie. Les fleurs sont blanches, monoïques, axillaires; les pédoncules solitaires, uniflores. Le fruit consiste en une baie glabre, ovale, jaunâtre, un peu aiguë, longue d'un pouce & demi, à cinq loges; plusieurs semences.

Cette plante croît à la Cochinchine. \times (Descript. ex Lour.)

21. BRYONE à feuilles aiguës. *Bryonia acuta*. Desfont.

Bryonia foliis subseptemlobis; lobis lanceolatis, acutissimis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 360.

Ses tiges sont grêles & grimpantes; les feuilles pétiolées, à cinq ou neuf lobes; les lobes lancéolés, très-aigus, entiers ou dentés, parsemés de poils très-courts; les dentelures rares, inégales; les vrilles simples & latérales. Les pédoncules sont axillaires, & supportent plusieurs fleurs pédicellées. Dans les fleurs mâles le calice est à cinq découpures étroites, aiguës; la corolle jaune, une fois plus grande que dans le *bryonia alba*, étalée, campanulée, veinée, réticulée, divisée, jusqu'à sa moitié, en cinq découpures ovales. Les fleurs femelles n'ont point été observées.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les environs de Tunis, parmi les buissons. \times (Descript. ex Desfont.) Cette plante ne seroit-elle pas le *bryonia africana*, glabra, foliis

in profundas laciniis divisis; flore luteo, Tournef. Infl. 102, qui est le *bryonia africana*, var. β , Dict. n°. 9.2

22. BRYONE à grappes. *Bryonia racemosa*. Swartz.

Bryonia foliis inferioribus subpalmatis, superioribus trilobis indivisisque; laciniis ovatis, floribus racemosis; baccis ovalibus. Swartz, Prodr. t. 16, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 1148. — Mill. Dict.

Bryonia racemosa, foliis fuscis. Plam. Amet. 83, & Icon. tab. 97.

Ses racines sont longues & charnues; les tiges grimpantes, glabres, divisées par dichotomies; les feuilles alternes, pétiolées, à trois nervures; les inférieures palmées; le lobe du milieu beaucoup plus grand; les supérieures à trois lobes, oblongs ou ovales, à pointe très-courte; les angles obtus, à peine denticulés, calleux, ponctés, un peu hispides en dessus, veinés, pubescents en dessous; les vrilles presque axillaires, roides, bifides, très-longues; les fleurs monoïques, pédicellées, en grappes terminales & alternes; celles des fleurs mâles inférieures & plus courtes; les femelles ordinairement terminales, quelquefois mélangées avec les mâles, d'un jaune-verdâtre. Les baies sont oblongues, pendantes, très-glabres, molles & rougeâtres, contenant quelques semences oblongues, comprimées.

Cette plante croît dans les haies, à la Jamaïque. \times (Swartz.)

23. BRYONE à feuilles d'alcée. *Bryonia alecta-folia*. Willd.

Bryonia foliis quinquepartitis-palmatis; lobis linearilanceolatis, tripartitis; pedunculis axillaribus, unifloris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 614.

Ses feuilles sont alternes, presque palmées, divisées, jusqu'à leur base, en cinq découpures ou lobes, glabres à leurs deux faces, rudés à leurs bords; les lobes linéaires-lancolés, mucronés, à trois divisions; les vrilles simples; les pédoncules axillaires, à une seule fleur.

Cette plante croît dans les Indes orientales. \times (Willd.)

24. BRYONE pubescente. *Bryonia pubescens*. Hort. Paris.

Bryonia foliis cordatis, subquinguelobis, acutis, dentato-spinosis; floribus umbellatis, caule hirsuto. (N.)

Ses tiges sont grimpantes, pileuses, herbacées; les feuilles alternes, pétiolées, presque glabres, échancrées en cœur à leur base; la plupart divisées en cinq lobes principaux, aigus à leur sommet, dentés & un peu épineux à leurs bords; les

pétioles velus, ainsi que les principales nervures ; les vrilles longues, très-rameuses ; les ramifications très-fines. Les fleurs sont petites, blanchâtres, pubescentes, réunies en une petite ombelle à l'extrémité d'un pédoncule commun, axillaire, velu, plus court que les pétioles.

Cette plante est originaire du Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

* *Espèces moins connues.*

* *Bryonia (scabra), foliis cordatis, angulatis, dentatis, supra callosè punctatis, infra pilosis, utrinque scabris ; floribus umbellatis.* Linn. Suppl. 423. Thunb. Prodr. 13. — Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 385. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (verrucosa), foliis cordatis, angulatis, supra venisque subtilius calloso-scabris ; caulis remotis, cirrhis simplicibus, bacis globosis.* Ait. Hort. Kew. 3. pag. 385. É Canariis. 2.

* *Bryonia (punctata), foliis cordatis, angulatis, supra callosis, subtilius pilosis ; pedunculis unifloris.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (cordata), foliis cordatis, scabris, denticulatis ; floribus axillaribus, geminis.* Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blatt. pag. 5.

* *Bryonia (angulata), foliis quinqueangulatis, utrinque scabris ; floribus subumbellatis.* Thunberg. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (acutangula), foliis angulatis, integris, levibus, glabris.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (latebrosa), foliis subtrilobis, pilosis, basi attenuatis.* Ait. Hort. Kew. 3. pag. 384.

Elle est remarquable par ses feuilles, point en cœur à leur base, mais presque décurrentes sur le pétiole ; elle croît aux îles Canaries. 2.

* *Bryonia (triloba), foliis trilobis, supra levibus, subtilius scabris.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (quinqueloba), foliis quinquelobis, denticulatis, supra scabris ; pedunculis unifloris.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (levis), foliis cordatis, palmatis, serratis, levibus ; floribus axillaribus, subumbellatis.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

* *Bryonia (digitata), foliis digitatis ; laciniis linearibus, bilobis, scabris ; floribus umbellatis.* Thunb. Prodr. 13. É Cap. B. Sp. 2.

Observations. Le *bryonia diffusa* Thunb. est la même plante que le *bryonia africana* Linn. & Dict. n°. 9. Thunberg a donné le nom de *bryonia africana* à une espèce qu'il regarde comme différente

de celle de Linné, & à laquelle il rapporte la figure d'Herman, *Paradis*. pag. 107. tab. 108. Willdenow pense que le *ficus Garcini*, Linn. & Dict. n°. 4, est une bryone, ayant observé que Burman avoit pris pour le fruit une stipule réniforme, à longs cils.

BRYONIA. (Voyez BRYONE.)

BRYOPSIS. Genre de la famille des algues ; établi par M. Lamouroux, qui le rapproche beaucoup des *fucus* & des *alva*, & dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un feuillage fistuleux, d'une substance diaphane ; la fructification constituée par des capsules globuleuses, d'une couleur verte, remplies & colorant les feuilles.

« Les plantes de ce genre, dit M. Lamouroux, sont peu connues, une seule espèce exceptée : elles diffèrent des autres algues par leur feuillage fistuleux, sans articulations ni cloisons, & par la fructification ; elles ont presque l'apparence de petites mousses, & le nom du genre est composé du mot grec *bryon*, mousse, & *opsis*, apparence. » Les espèces qu'indique M. Lamouroux, & qu'il se propose de faire connoître plus amplement dans un ouvrage sur les algues, sont :

1. BRYOPSIS ailée. *Bryopsis pennata*. Lamour.

Bryopsis fronde compressa, pennata ; pinna indivisa, oppositis alternisq. Lamour. Journ. botan. 2. pag. 134. tab. 3. fig. 1. A. B.

Cette espèce est fort petite : il s'élève de ses racines, des pétioles simples, capillaires, nus à leur partie inférieure, divisés, à leur partie supérieure, en pinnules ou folioles entières, fort petites, opposées ou alternes, glabres, un peu courbées, aiguës à leurs deux extrémités. Elle croît aux Antilles. (*Descript. & fig. 1.*)

2. BRYOPSIS arbuscule. *Bryopsis arbuscula*. Lam.

Bryopsis fronde compressa, ramosa ; ramis pennatis ; pinnaulis longiusculis, laxis, sparsis. Lamour. Journ. bot. 2. pag. 134. tab. 1. fig. 1.

Cette plante a été décrite parmi les varecs sous le nom de *fucus arbuscula*, n°. 103. « Elle paroît, dit M. Lamouroux, avoir été confondue avec les trois suivantes, quoiqu'elle en diffère par la forme, le port & l'habitation. »

3. BRYOPSIS hypnoïde. *Bryopsis hypnoides*. Lamour.

Bryopsis fronde tereti, ramosa ; ramis ramulifuge elongatis, sparsis. Lamour. Journ. bot. 2. pag. 135. tab. 1. fig. 2. A. B.

Ses pédicelles ou pétioles sont ramifiés, cylin-

driques, filiformes, rancus; les rameaux alternes, chargés de feuilles presque sétacées, éparies, allongées, la plupart un peu rétrécies à leur partie inférieure. Elle croît dans la Méditerranée, aux environs de Cette. (*Descript. à figur.*)

4. *BRYOPSIS* petit cyprès. *Bryopsis cupressina*. Lamour.

Bryopsis fronde tereti, ramosa; ramis ramulifera capitatis, brevibus, subimbricatis. Lamour. Journ. bot. 2. pag. 135. tab. 1. fig. 3. A. B.

Cette espèce, extrêmement petite, pousse des mêmes racines plusieurs pédicelles courts, capillaires, cylindriques, simples à leur base, se terminant par une touffe de petites feuilles très-courtes, presque imbriquées, à plusieurs divisions. Elle croît dans la Méditerranée, sur les côtes de Barbarie. (*Descript. à figur.*)

5. *BRYOPSIS* moussueuse. *Bryopsis muscosa*. Lam.

Bryopsis fronde tereti, ramosa; ramulis setaceis, brevibus, superat numerosissimis, inferis raris. Lam. Journ. bot. 2. pag. 135. tab. 1. fig. 4. A. B.

Ses pédicelles sont courts, cylindriques, nus à leur partie inférieure ou munis seulement de quelques petites feuilles raris & chargés, à leur partie supérieure, de feuilles très-nombreuses, fort courtes, touffues, sétacées, obtuses, cylindriques, moins épaisses à leur partie inférieure. Elle croît dans la Méditerranée, aux environs de Marseille. (*Descript. à figur.*)

BRYUM. (*Voyez* BRY.)

BUBON. M. de Lamarck a figuré dans les *Illustrations des Genres*, tab. 194, le *bubon macdonicum*. Plusieurs probabilités se réunissent pour nous porter à croire que cette plante est la même que le *petroselinum* mentionné dans Plin. & Dioscoride, que les propriétés avoient mis en grande réputation dans les îles de la Grèce & dans l'Orient, où il étoit devenu un objet de commerce assez important, mais souvent falsifié, vu le grand débit qu'on en faisoit, & la préférence que l'on donnoit à celui de Macédoine : d'où il résulteroit qu'on vendroit sous ce nom plusieurs autres plantes qui avoient avec celle-ci quelque ressemblance. M. Desfontaines & Aiton ont ajouté à ce genre les deux espèces suivantes.

1. *BUBON* tortueux. *Bubon tortuosum*. Desfont.

Bubon caule fruticoso, nodoso; ramis tortuosis, divaricatis; involucri minimo; seminibus globosis; striatis, hirsutis. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 257. tab. 73.

Cette plante exhale une odeur aromatique; elle croît en gazon touffu. Ses tiges sont glau-

ques, un peu ligneuses, glabres, légèrement striées, noueuses, dépourvues de feuilles, divisées en rameaux diffus, roides, tortueux, munis à leur base d'une petite membrane scarieuse. Les fleurs sont disposées en petites ombelles planes, composées de quatre à huit rayons filiformes, inégaux, terminés par des ombellules très-rapprochées; les involucre, tant universels que partiels, caducs, fort petits, à plusieurs folioles. La corolle est blanche; les anthères presque rondes, à deux loges; les styles persillans, ouverts, réfléchis; les semences courtes, petites, ovales, striées, hérissées de quelques poils courts.

Cette plante a été découverte dans le royaume de Tunis, aux environs de Kerouan, par M. Desfontaines. (*V. f. in herb. Desfont.*)

6. *BUBON* à fruits lisses. *Bubon levigatum*. Ait.

Bubon foliolis lanceolatis, obtusissimis obsoleteque crenatis; seminibus glabris, caule frutescente. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 352.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, rameuses, cylindriques, très-lisses, striées; les feuilles pétiolées, ailées; celles des rameaux sessiles ou ayant les pétioles munis d'une membrane foliacée, amplexicaule; les folioles opposées, lancéolées, à peine obtuses; les supérieures confluentes, dentées, incisées à leur contour, glabres à leurs deux faces; la collerette universelle, à plusieurs folioles quelquefois un peu incisées ou dentées vers leur sommet, lancéolées, aiguës; les semences glabres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f.*)

BUBON UPAS, par corruption pour *bokon-upas*. (*Voyez* UPAS, *Suppl.*)

BUBROMA : nom que Willdenow a substitué à celui de *guzuma*. (*Voyez* ce mot.)

BUCANOPHORON : nom grec qui signifie *porte-trompette*, donné par Plukenet au *sarracenia*, dont les feuilles tubuleuses ont la forme d'une trompette.

BUCEPHALON. (*Voyez* TROPHIS.)

BUCERAS. Brown avoit donné le premier ce nom à un arbre de la Jamaïque, que Linne a ensuite nommé *buteia* : c'est le grignon des Antilles françaises. Haller, dans ses plantes de la Suisse, a donné aussi le nom de *buceras* au fennec (*trigonella* Linn.), en quoi il a été suivi seulement par Allioni.

BUCHALE : nom arabe de la fève des marais (*faba*), suivant Dalechamp.

BUCHNERA. (Voyez BUCHNERS.) Ce genre est si peu distingué des *erinas* & des *manules*, qu'il est difficile d'y rapporter des espèces qui n'ont point été observées sur le vivant. Quoique j'aie vu & que je possède en herbier plusieurs plantes qui m'ont été communiquées sous le nom de *buchnera*, & dont elles ont en effet l'apparence, je me bornerai à faire connoître celles qui ont été observées vivantes dans leur lieu natal ou dans les jardins. Ce sont les suivantes :

7. BUCHNÈRE à feuilles d'euphrase. *Buchnera euphrasifolia*, Vahl.

Buchnera foliis linearibus, integerrimis, pilosifolbris; lacinii corolla linearibus, obtusis, Vahl, *Symb.* 3, pag. 81.

Cette plante, au premier aspect, a le port de l'*euphrasia longiflora*. Ses tiges sont terrageones, à angles tranchans; les rameaux opposés, plus longs que les riges, garnis de feuilles courtes, linéaires, très-entières, rudes & pileuses; les inférieures opposées & distantes; les supérieures alternes, serrées, presque imbriquées sur la tige. Les fleurs sont sessiles, axillaires; le calice presque de la longueur des feuilles; le tube de la corolle velu; les découpures du limbe linéaires, obtusés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Vahl.*)

8. BUCHNÈRE gesnéride. *Buchnera gesnerioides*, Willd.

Buchnera foliis oblongis, ciliatis, adpressis, squamiformibus; corolla tubo incurvo. Willd. *Spec. Plant.* 3, pag. 338.

Lathraea gesnerioides, Koenig.

Ses riges sont hautes d'un demi-pied, rameuses à leur base; les rameaux simples, tétragones, plus longs que les tiges, munis de très-petites feuilles fort distantes, en forme d'écailles oblongues, appliquées contre les riges, ciliées à leurs bords; les fleurs sessiles; les inférieures alternes & distantes; les supérieures opposées, très-serrées; trois petites folioles sous le calice, dont une plus courte; les cinq divisions du calice lancéolées, ciliées; le tube de la corolle glabre, recourbé; les découpures du limbe oblongues; les capsules oblongues, obtusés, à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 7. (*Descript. ex Willd.*)

9. BUCHNÈRE des rochers. *Buchnera rupestris*, Swartz.

Buchnera foliis quadrifariis, subulatis, conalculatis; floribus axillaribus, subsibus. Swartz, *Flor. Ind. occid.* 2, pag. 1063.

Hedyotis (americana), foliis linearibus; floribus axillaribus, foliatis. Jacq. *Amst.* pag. 20.

Thymela maritima, erica folio, fuculis imidis & tomentosis. Sloan. *Jam.* 163. *Hist.* 2, pag. 94. tab. 202. fig. 1.

Elle diffère des *buchnera* par sa corolle à quatre lobes, par le style bifide. Ses riges sont ligneuses, hautes d'un à deux pieds; les rameaux nombreux; les terminaux ramifiés, chargés de gaines membraneuses, velues à leurs bords; les feuilles disposées sur quatre rangs, tubulées, canaliculées, glabres, luisantes, à peine pétiolées; les fleurs solitaires, sessiles, axillaires; le calice petit, rouge, à quatre découpures velues, persistantes, lancéolées, aiguës; deux folioles linéaires à la base du calice; la corolle rubulée, de la longueur des feuilles; le limbe à quatre lobes inégaux, un peu épais, velus, foyeux & blanchâtres en dehors; une capsule petite, ovale, comprimée, acuminée, bivalve, à deux loges; les valves à deux divisions; les semences brunes, petites, arrondies.

Cette plante croît à l'île de Cuba, sur les rochers calcaires des bords de la mer. 7. (*Swartz.*)

Observations. Ce genre n'a point été figuré dans les *Illustrations*; il a de tels rapports avec les *manules*, que Thunberg a fait passer dans ce dernier genre les *buchnera aethiopica* — *capensis*. Swartz regarde comme une espèce de *buchnera* (*buchnera elongata*) le *peripeta palustris* d'Aublet. (Voyez *PARTIE.*) Le *buchnera canadensis* a été mentionné parmi les verveines, n°. 7. Le *browallia humifusa* de Forskhal est un *buchnera*, selon M. Vahl.

* Espèces moins connues.

* *Buchnera* (bilabaria), *foliis linearibus, calicibusque piloso-scabris; caule simpliciter*. Thunb. *Prodr.* pag. 100. *É. Cop. B. Sp.*

* *Buchnera* (viscosa), *foliis lineari-lanceolatis, laxè dentatis, subglutinosis; floribus pedunculatis, caule fruticoso*. Ait. *Hort. Kew.* 2, pag. 337. *É. Cop. B. Sp.* 7.

BUCHORMARIEN : nom arabe que l'on trouve dans Dalechamp, rapporté au *cielamen* ou pain de pourceau. Cette plante, suivant le même auteur, se nomme aussi *buthermarien* ou *buthormarie*.

BUCHOZIA. Lhéritier a donné ce nom à un genre de plantes que M. de Jussieu, avant lui, avait nommé *serissa*, d'après Comerson. Il valoit bien mieux lui conserver ce dernier nom, qui restera sans doute, que d'avoir cherché à diffamer un savant estimable, dont les nombreux écrits n'ont pas été sans utilité pour la science.

EUCIDA. (Voyez GRIGNON.)

BUDAMANI. Linné, dans sa *Flore de Ceilan*, rapporte ce nom de pays à une variété du *dolichos caratoides*.

BUDLEIA. (Voyez BULÈS.)

BUDUGHAS, BOGHAS: arbre de Ceilan, respecté par les infulaires, parce que leur prophète Budu les rassemblait sous son ombre pour les instruire. Depuis ce temps ils en plantent toujours autour de leurs autels, & le nom qu'ils lui donnent, rappelle l'homme dont ils révérent la mémoire. Il paroît que cet arbre est une espèce de figuier (*Ficus religiosa* Linn.).

BUENA. Cavanilles, dans les *Icon. Rar.* vol. 5, pag. 50, tab. 571, a formé ce genre de plantes sur un arbrisseau d'Amérique, dont tous les caractères sont les mêmes que ceux du *gonzaguina* de la *Flore du Pérou*, & dont il sera fait mention à l'article GONZALE, Suppl.

BUFONIA. (Voyez BUFONE.) M. de Lamarck a fait dans ses *Illustrations* deux espèces des variétés a & b du *bufonia tenuifolia* : la première sous le nom de *bufonia annua*, III. tab. 87, fig. 1 ; la seconde, *bufonia perennis*, fig. 2, pag. 349.

BUGINVILLEA. III. Gen. tab. 294. (Voyez TRICYCLA.)

BUGLE. *Ajuga*. On peut appliquer à ce genre la plupart des observations que nous avons présentées en traitant de la brunelle, Suppl. Quelques anciens botanistes l'ont également nommée *consoude*. On peut juger de l'efficacité que l'on supposoit autrefois à cette plante, ainsi qu'à la faricelle, pour la guérison des plaies, par ces deux vers français :

Avec la bugle & la sanique
On fait au chirurgien la nique.

S. Heber, dans ses *Unitabata*, a réuni à ce genre quelques espèces de *teurium*, les *chamapitys* de Tournefort, telles que le *teurium chamapitys* — *iva* — *salicifolium*. Thunberg a fait connoître une nouvelle espèce d'*ajuga* du Japon, qui est sa

5. BUGLE couchée. *Ajuga decumbens*. Thunb.

Ajuga decumbens, villosa, foliis ovatis, dentatis. Thunb. Flor. jap. pag. 243.

Ses tiges sont nombreuses, herbacées, simples ou un peu rameuses, couchées, relevées à leur partie supérieure, longues d'environ trois pouces, velues, ainsi que toute la plante, garnies de feuilles pétiolées, ovales, dentées, longues de six lignes ; les racines nombreuses & plus grandes ;

les fleurs petites, verticillées ; la corolle bleue, relevée.

Cette plante croît au Japon, le long des murs & sur le bord des chemins. (Descript. ex Thunb.)

L'*ajuga reptans*, n°. 1, est gravée dans les *Illustrations*, tab. 501, fig. 2. La figure 1 offre les détails de la fructification du genre, d'après Tournefort.

BUGLOSSE. *Anchusa*. Ce genre a éprouvé quelques réformes & augmentations. Le nom de *buglosse* (*buglossum*), conservé par Tournefort, auquel Linné a substitué celui d'*anchusa*, est dû à la forme des feuilles de la principale espèce, à laquelle les Anciens trouvoient la figure d'une langue de bœuf ; il a été souvent indistinctement appliqué, par les anciens botanistes, à la buglosse, à la bourrache & au *lycopsis*. Celui d'*anchusa* n'est pas moins ancien : il paroît devoir se rapporter davantage à l'*anchusa tinctoria*. Son étymologie indique, dit-on, une plante propre à suffoquer par la décoction de sa racine.

1. BUGLOSSE d'Italie. *Anchusa italica*. Retz.

Anchusa foliis lucidis, trigonis ; racemis bipartitis, diphyllis ; floribus subaequalibus, saepe barbatis. Retz. Observ. bot. 1. pag. 12. — Trew. Dec. 2. pag. 14. tab. 15. — Vogel. tab. 18.

Anchusa officinalis. Lam. n°. 1. Non Linn. — III. Gen. tab. 92. — Gouan, Hort. monsp. 81. — Dalib. Paris. 59.

Buglossum foliis linguiformibus, asperis ; spicis supremis, gemellis. Hall. Helv. n°. 599. (*Exclusis synonymis*.)

On a long-tems confondu cette espèce, très-commune par toute la France, avec l'*anchusa officinalis* de Linné, qui ne se trouve guère que dans le nord de l'Europe. Elle s'en distingue par ses calices à cinq divisions profondes, étroites, linéaires ; par ses corolles un peu irrégulières, par le limbe à cinq lobes arrondis, par l'orifice du tube, garni de cinq écailles très-barbues, semblables à de petits pinceaux. La buglosse officinale diffère par les caractères suivans :

1.* BUGLOSSE officinale. *Anchusa officinalis*. Linn.

Anchusa foliis lanceolatis, strigosis ; floribus aequalibus, saepe tomentosis ; calicibus quinquelobatis. (N.) Linn. Non Lam. — Ait. Hort. Kew. 1. pag. 178.

Buglossum germanicum. Fusch. 139. Icon.

Buglossum silvestre majus, nigrum. C. Bauh. Pin. 256. — Segu. Veton. 1. pag. 214. — Tourn. Inst. R. Herb. 134.

Cette espèce a ses fleurs beaucoup plus régulières, plus imbriquées ; la corolle infundibuliforme,

divisée à son limbe en cinq lobes ovales, égaux; l'orifice garni d'écaillés un peu courbées en capuchon, & simplement coromculées; les divisions du calice plus larges & plus courtes.

13. BUGLOSSE à grandes feuilles. *Anchusa macrophylla*. Lam.

Anchusa foliis radicalibus maximis, caule debili, calice subpentaphyllo; bracteis linearibus, minutis. Lam. Ill. Gen. 1. pag. 452. n°. 1816.

Lycopsis macrophylla. Lam. Dict. 3. n°. 7.

Anchusa (paniculata), foliis lanceolatis, strigosis, integerrimis; panicula dichotoma, divaricata; floribus pedunculatis, calicibus quinquepartitis, laciniis subulatis. ? Ait. Hort. Kew. 1. pag. 177.

Cette plante, décrite d'abord parmi les *lycopsis* par M. de Lamarck, lui a paru ensuite appartenir davantage aux *anchusa*. Le même auteur soupçonne qu'elle pourroit bien être la même plante que l'*anchusa paniculata* d'Aiton.

14. BUGLOSSE à fleurs lâches. *Anchusa laxiflora*. Decand.

Anchusa racemo laxo; pedicellis nudis, divaricatis; foliis oblongis, acutis, subinnatis, hispatis, ciliatis. Decand. Synopf. pag. 240, & Flor. franç. 3. pag. 631.

Cette espèce se distingue à son port, grêle & alangé; aux poils roides qui hérissent les feuilles, le haut de la tige, les pédicelles & les calices. Ses feuilles sont oblongues, à demi amplexicaules, aiguës, un peu sinuées, ondulées, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont rougeâtres, écartées les unes des autres, presque toutes déjetées du même côté, portées sur des pédicelles grêles, nus, lâches, étalés, accompagnés à leur base de feuilles extrêmement petites; les cinq découpures du calice profondes, longues, presque linéaires, aiguës, de la longueur du tube de la corolle; les lobes de la corolle allongés & pointus; les semences ovales, ridées, tronquées à la base, par laquelle elles adhèrent au fond du calice.

Cette plante a été découverte à l'île de Corse par M. de Labillardière. (Decand. ex herb. Desf.)

15. BUGLOSSE de Barrolier. *Anchusa Barrolieri*. Allioni.

Anchusa foliis oblongis, subintegris, utrinque attenuatis, caule simpliciter hispida; pedunculis tribracteis, calicibus quinquepartitis. Decand. Synopf. pag. 240, & Flor. franç. 3. pag. 633. — Allioni, Pedem. n°. 164. — Barrolier. Icon. Rar. 333.

Cette espèce se distingue à ses fleurs assez petites, d'un bleu d'azur, disposées en panicule plus tôt qu'en épi. Ses tiges sont droites, simples,

longues d'environ un pied & demi, garnies de feuilles oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, entières ou légèrement sinuées, hérissées de poils roides, ainsi que les tiges. Les fleurs sont axillaires; les pédoncules trichotomes; le calice à cinq découpures profondes; le tube de la corolle très-court, évasé à son sommet; l'orifice garni de cinq écaillés ovales, médiocrement hérissées, un peu crochues à leur sommet.

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ? (P. v.)

16. BUGLOSSE rude. *Anchusa strigosa*. Labill.

Anchusa foliis ovato-lanceolatis, denticulatis, aculeatis; seminibus calicis longitudine, racemis subsuccandis. Labill. Syr. Falc. 3. pag. 7. tab. 8.

Buglossum syriacum, bullatis foliis, floribus albicantibus. ? Moris. Hist. 3. §. 11. tab. 28. fig. 2.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes d'un pied & demi & plus, couvertes, ainsi que toute la plante, de petits aiguillons & de tubercules très-blancs; garnies de feuilles entières; les inférieures pétioles, ovales-lancéolées, aiguës; les supérieures sessiles, lancéolées, plus étroites, aiguës, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont bleuâtres, disposées en grappes allongées, presque simples ou dichotomes, un peu latérales; les pédicelles courts; les découpures du calice profondes, linéaires, obtuses; le tube de la corolle de la longueur du calice, fermé à son orifice par cinq écaillés presque orbiculaires, pubescentes; les lobes du limbe ovales, arrondis; les semences presque aussi longues que le calice, ovales-oblongues, réticulées, aiguës, striées, un peu dilatées & perforées à leur base.

Cette plante a été découverte par M. de Labillardière aux environs de Tripoli de Syrie. ?

17. BUGLOSSE hispide. *Anchusa hispida*. Forsk.

Anchusa pedunculis axillaribus, diphyllis; foliis lanceolatis, repando-dentatis, hispida. Vahl, Symb. 2. pag. 33. — Forsk. Ægypt. pag. 40.

Ses tiges sont rameuses, difuses, hispides, ainsi que toute la plante; les feuilles lancéolées; les inférieures pétioles; les supérieures sessiles, rapprochées, lancéolées, un peu épaissies, longues d'un pouce, obtuses à leur sommet, sinuées, dentées à leur contour; les dentelures obtuses; les fleurs axillaires; les pédoncules courts, geminés; les calices très-hispides, accompagnés à leur base de deux bractées lancéolées; la corolle violette, en entonnoir, à peine plus longue que le calice; les lobes du limbe ovales, obtus; cinq écaillés à l'orifice du tube; les semences glabres, oblongues, un peu ridées.

Cette

Cette plante croît dans les plaines désertes de l'Égypte.

18. BUGLOSSE à petites fleurs. *Anchusa parviflora*. Willd.

Anchusa foliis linearibus, cauleque ramifissimo hispida; racemis paucifloris, confertis. Willd. Spec. Plant. t. pag. 759.

Buglossum orientale, angustifolium, flore parvo, caeruleo. Tournef. Coroll. 6.

Ses tiges sont très-rameuses, hérissées, ainsi que les feuilles, de longs poils roides; les feuilles petites, linéaires, un peu obtuses, ciliées & entières à leur contour; les fleurs petites, peu nombreuses, disposées en grappes agrégées; les calices profondément divisés en cinq découpures linéaires, presque sèches; hérissés de poils blancs, roides, très-nombreux; la corolle d'un bleu-violet.

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été découverte par Tournefort.

19. BUGLOSSE des rochers. *Anchusa saxatilis*. Pallas.

Anchusa pilosissima, foliis lineari-lanceolatis; floribus sparsis, axillaribus, subsessilibus, longe tubulosis. Pallas, itin. 3. tab. F. fig. 1. — Lam. Ill. Gen. 1. n°. 1822.

Cette plante est extrêmement piluleuse, tant sur ses feuilles que sur ses tiges & ses calices; elle se distingue parfaitement par ses fleurs éparées, presque sessiles, axillaires. La corolle est d'un pourpre-bleuâtre, munie d'un tube très-long. Les feuilles sont étroites, linéaires-lancéolées, entières.

✓ Cette plante croît dans la Sibérie. (Pallas.)

* *Anchusa (capensis), foliis lanceolatis, callosis, villosis; racemis trichotomis*. Thuib. Prodr. 34. É Cap. B. Sp.

* *Anchusa (amœna), seminibus ovato-oblongis, reticatis, rugoso-reticulatis*. Gærtm. de Fruct. & Sem. tab. 62.

Observations. M. de Lamarck cite, sous le nom d'*Anchusa spicata*, une buglosse à feuilles entières, à épis geminés, presque nus, figurée dans Zanoni, Hist. pag. 57, tab. 39, qu'il soupçonne être l'*Anchusa angustifolia* Linn.; il fait, de celle qu'il a décrite sous ce nom dans le Dictionnaire, une variété de son *Anchusa officinalis*. Plusieurs espèces d'*Anchusa* de différents auteurs ont été placées dans d'autres genres. L'*Anchusa orientalis* de Linné & Miller est le *Lithospermum orientale*, la même plante que l'*Anchusa tuberculata* de Forskhal, selon Vahl; & d'après le même auteur, l'*Anchusa spinocarpus* Botanique, Supplément. Tome 1.

Forsk. est un *myofotis*. L'*Anchusa lutea* Cavan. l. c. 1, tab. 69, fig. 1, est présenté dans Willdenow comme une variété du *myofotis arvensis*.

BUGRANE. *Ononis*. On a conservé à ce genre le nom que les Anciens avoient donné à l'une des espèces qui le composent. Théophraste l'appelle *ononis*, & Dioscoride *ananis*. La description qu'il en a donnée ne laisse aucun doute qu'elle n'appartienne à une des espèces les plus communes de ce genre. Il n'est pas aussi facile de déterminer à laquelle de ces espèces. Au reste, le doute ne peut guère se porter que sur deux, l'*Ononis Asquiorum* & l'*Ononis arvensis*, qui d'ailleurs diffèrent peu l'une de l'autre, & qui peuvent avoir été facilement confondues par les Anciens; ils la considèrent comme une plante nuisible aux travaux de l'agriculture par sa multiplication dans les terres labourables, par les fatigues que ses tiges dures & ses racines tenaces donnoient aux bœufs, qui pouvoient aussi être offensés par les longues épines, d'où lui est venu son nom vulgaire d'*arrête-bœuf*. Les observations & les voyages ont donné lieu à la découverte de beaucoup d'espèces de bugrane, dont plusieurs néanmoins ne sont encore qu'imparfaitement connues, faute de descriptions suffisantes. M. de Lamarck avoit renvoyé aux genres *Cystif* & *Scier* les espèces du Cap de Bonne-Espérance. Comme elles n'y ont point été mentionnées, & que d'ailleurs la plupart ont peu connus, je me bornerai à les citer à la fin de ce genre.

25. BUGRANE hispide. *Ononis hispida*. Desfont.

Ononis foliis ternis, obovatis, serratis; floribus foliariis, subsessilibus, racemosis; calicibus pilosis; laciniis calicinis lanceolatis, corollam aequantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 146. tab. 189.

Ses tiges sont droites, rameuses, herbacées, pileuses; les feuilles pétiolées, ternées; les folioles ovales ou elliptiques, arrondies à leur sommet, dentées en scie, légèrement velues; les stipules petites, ovales, denticulées, bifides, aiguës; les fleurs presque sessiles, disposées en une grappe simple, foliaire; le calice couvert de longs poils étalés; ses découpures étroites, lancéolées, aiguës, liriées; la corolle d'un rouge de rose, de la longueur du calice; les gouffes comprimées, lisses, ovales, une fois plus courtes que le calice.

Cette plante a été découverte dans les campagnes de la Barbarie par M. Desfontaines. (V. f.)

26. BUGRANE à feuilles molles. *Ononis mollis*. Savi.

Ononis pubescens, caule herbaceo, foliis superioribus simplicibus; foliis inferioribus, apice dentatis; pedunculis foliariis, mucosis, unifloris; leguminibus cernuis. Savi. Mem. Soc. ital. vol. 9. pag. 351. tab. 8. — L'oyel, Journ. bot. 2. pag. 361.

A 222

Ononis trifolia, pallidis nuntantibus suffultis, maritima. Barrol, Icon. Rat. 761.?

Ses tiges sont droites, herbacées, pubescentes, ainsi que toutes les autres parties de cette plante, garnie de feuilles alternes, pétiolées, ternes; les feuilles supérieures simpls; les folioles cunéiformes, dentées vers leur sommet. Les fleurs sont solitaires, axillaires, pédunculées; les pédoncules mutiques, uniflores; la corolle jaune, un peu pâle; les gouffes réfléchies.

Cette plante croît en Toscane, sur les collines, aux bords de la mer, où elle a été observée par M. Savi; elle fleurit en juin.

27. BUGRANE dentée. *Ononis serrata*. Vahl.

Ononis floribus suffultis, foliariis; foliis inferioribus serrato-dentatis, cuneiformibus, apice subtrilatis. Vahl, Symbol. 1. pag. 52. — Foisikh. Flor. ægypt-arab. pag. 130.

Toute cette plante est visqueuse & pubescente; ses tiges herbacées, couchées, presque dichotomes; les rameaux grêles, presque nus à leur partie supérieure; les feuilles pétiolées; les inférieures tournées; les supérieures simpls; les folioles cunéiformes, linéaires, longues de trois lignes; les latérales plus petites, dentées en scie, environ trois dents au sommet, quelquefois cinq; les stipules ovales lancéolées, striées, denticulées, de moitié plus courtes que les pétiolées; les fleurs solitaires, axillaires, presque sessiles; les inférieures plus dilantées; les supérieures munies d'une bractée à leur base; le calice strié, à cinq découpures lancéolées, linéaires, de la longueur de la corolle; les gouffes velues, oblongues, de la longueur du calice, à quatre semences.

Cette plante croît en Égypte. (V. f. in herb. Desfont.)

28. BUGRANE à fleurs en tête. *Ononis capitata*. Cavan.

Ononis caulis prostratis, ramosis, filiformibus; foliis ternatis, floribus capitatis. Cavan. Icon. Rat. 2. pag. 45. tab. 159. fig. 2.

Ononis floribus suffultis, lateralibus, subcapitatis; foliis ternatis, oblongis; stipulis lanceolatis, calicibus corollâ brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 993.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'*Ononis minutissima* Linn.; elle en diffère par ses folioles plus allongées, par ses fleurs terminales, ramifiées en tête, presque sessiles; par la corolle, une fois plus grande que le calice. Les tiges sont couchées, rameuses, filiformes; les stipules lancéolées, subulées; les fleurs jaunes, axillaires.

Cette plante croît en Espagne, sur les montagnes, aux environs de Valence. *

29. BUGRANE très-velue. *Ononis villosissima*. Desfont.

Ononis villosissima, viscosa, foliis ternatis; floribus racemosis, confertis, sessilibus; corollâ legitimis calice brevioribus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 147. tab. 192.

Cette plante est visqueuse, très-velue; les tiges diffuses, rameuses, herbacées, longues d'environ un pied; les feuilles pétiolées, ternées; les folioles ovales, un peu arrondies, denticulées; les stipules petites, dentées, arrondies; les fleurs axillaires, presque sessiles, solitaires, rapprochées en grappes; le calice à cinq divisions lancéolées; la corolle rose, petite, plus courte que le calice; les gouffes ovales, obtuses, comprimées, velues, couvertes par le calice, renfermant deux semences.

Cette plante croît dans les campagnes, aux environs d'Alger; elle a été découverte par M. Desfontaines. (V. f. in herb. Desfont.)

30. BUGRANE à feuilles simpls. *Ononis monophylla*. Desfont.

Ononis foliis simplicibus, ellipticis; stipulis serratis, maximis; floribus sessilibus, racemosis; corollâ calicem æquantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 145. tab. 188.

Elle se rapproche beaucoup de l'*Ononis alopecuroides*; elle en diffère par son port. Ses tiges sont droites, rameuses, velues, striées; les rameaux paniculés; les feuilles simpls, elliptiques, glabres ou à peine velues, finement dentées en scie; les stipules grandes, dentées, obtuses & presque tronquées; les fleurs presque sessiles, rapprochées en grappes courtes, touffues, terminales; le calice grand, velu, jaunâtre, plus long que les bractées; les découpures lancéolées; la corolle pubescente, de la longueur du calice. Le fruit n'a pas été observé.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les champs, sur les côtes de Barbarie. (V. f.)

31. BUGRANE à feuilles d'euphrase. *Ononis euphrasifolia*. Desfont.

Ononis caule erecto, villosa; foliis simplicibus, linearis lanceolatis; stipulis acuminatis; bracteis ovatis, acutis; floribus racemosis, subsessilibus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 141. tab. 184.

Ses racines sont grêles, annuelles, produisant deux à quatre tiges presque filiformes, droites, simpls ou à peine rameuses, velues, hautes de six à huit pouces; les feuilles simpls, linéaires-lancéolées, glabres, dentées en scie, nerveuses; les inférieures obtuses; les supérieures aiguës, longues d'environ un demi-pouce; les pétiolées courtes;

les stipules ovales-oblongues, bifides, dentées, acuminées, plus longues que les pétioles; les fleurs presque sessiles, axillaires, en grappe lâche; les bractées ovales, concaves, aiguës, striées, denticulées. Le calice est campanulé, à cinq découpures subégales, ciliées, presque égales; la corolle jaune, une fois plus longue que le calice; les gouffes lisses, oblongues, renflées, un peu plus longues que le calice, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît dans le sable, aux environs de Mascara en Barbarie, où M. Desfontaines l'a découverte. O (*V. f.*)

32. BUGRANE à fleurs blanches. *Ononis alba*. Poit.

Ononis caule erecto, subvillosa; foliis simplicibus, oblongis, serrulatis, glabris; floribus racemosis, solitariis; calicibus pubescentibus, corollam subaequantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 145.

Ononis floribus sessilibus, racemosis; foliis simplicibus. Poit. Itin. 2. pag. 20.

Cette espèce a de grands rapports avec l'*Ononis monophylla* & *aloeuroides*. Ses tiges sont herbacées, fistuleuses, cylindriques, presque glabres, hautes d'un pied & plus; les rameaux alternes; les feuilles glabres ou à peine pubescentes; les inférieures ovales-elliptiques, obtuses; les supérieures ovales-lancéolées, un peu aiguës, finement dentées en scie; les stipules grandes, tronquées, denticulées, décurrentes sur les pétioles & de la même longueur; les fleurs presque sessiles, foliaires, terminales, rapprochées en une grappe courte; le calice cendré, pubescent, à cinq découpures étroites, linéaires, aiguës; la corolle blanche, quelquefois d'un rose-pâle, à peine plus longue que le calice; les bractées opposées, petites, pubescentes, lancéolées.

J'ai trouvé cette plante sur les côtes de Barbarie, aux environs de Bonne. (*V. v.*)

33. BUGRANE à fleurs lâches. *Ononis laxiflora*. Desfont.

Ononis foliis ternatis, pedicellis folio longioribus; calicibus corollam aequantibus; leguminibus elongatis, exsertis, nutantibus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 146. tab. 190.

Ses tiges sont velues, droites, rameuses; les feuilles pétioles, ternées, à peine pubescentes; les folioles ovales, denticulées, aiguës à leur base; les stipules presque orbiculaires, petites, dentées, plus courtes que le pétiole; les fleurs foliaires, distantes, axillaires, soutenues par des pédoncules filiformes, pubescents, plus longs que les feuilles; le calice à cinq découpures profondes, lancéolées, tubulées, ciliées; la corolle

bleuâtre, de la longueur du calice; les gouffes pendantes, alongées, velues, enfilées, linéaires, renfermant plusieurs semences.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines sur les collines incultes d'Alger. O (*Desfont. ex Desfont.*)

34. BUGRANE à gouffes pendantes. *Ononis pendula*. Desfont.

Ononis foliolis ternis, obovatis, apice rotundatis; floribus racemosis, cernuis; pedicellis striatis; leguminibus villosis, calice longioribus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 147. tab. 191.

Les tiges sont velues; les folioles glabres, en ovale renversé, arrondies & denticulées à leur sommet; les stipules petites, ovales, obtuses, denticulées; les pédoncules soies, mutiques, réfléchis à leur sommet, axillaires, uniflores, rapprochés en une grappe terminale; les bractées simples, oblongues, foissées, dentées à leur sommet; les divisions du calice velues, lancéolées, tubulées; la corolle d'un bleu-pâle, un peu plus longue que le calice; les gouffes pendantes, oblongues, linéaires, velues, renflées, acuminées, un peu plus longues que le calice, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît en Barbarie, aux environs de Mascara, où elle a été découverte par M. Desfontaines. O (*V. f. in herb. Desfont.*)

35. BUGRANE à gâches. *Ononis vaginalis*. Vahl.

Ononis pedunculis unifloris, aristatis; foliis sessilibus, ternatis, stipulisque vaginalibus, dentatis. Vahl, Symb. 1. pag. 53.

Ononis Cherleri. For. khal, Flor. ægypt.-arab. pag. 130.

Plante visqueuse & velue, à tiges ligneuses. Ses feuilles sont ternées, les folioles cœuriformes, striées, dentées vers leur sommet; les deux latérales plus petites, les stipules vaginales, concaves, striées, couvrant presque toute la tige, bifides à leur sommet; les pédoncules alternes, foliaires, uniflores, munis, un peu au dessous du calice, d'une bractée linéaire, en forme d'arc; les découpures calicinales lancéolées; la corolle jaune, plus longue que le calice; l'étendard pourpre; les gouffes réfléchies. Cette bugrane varie, selon les saisons, au point d'être méconnaissable. Quelquefois les rameaux sont très-courts, rapprochés, dépourvus de feuilles; les stipules plus petites, imbriquées.

Cette plante croît en Égypte. H (*V. f. in herb. Desfont.*)

36. BUGRANE à deux fleurs. *Ononis biflora*. Desfont.

A a a a a

Ononis foliis ternatis ; foliis oblongis , serratis , pubescentibus ; pedicellis bifloris , aurantiis , aristatis , petiolo longioribus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 143.

Ses tiges sont rameuses , pubescentes , ainsi que toute la plante ; les folioles ovales-oblongues , tronquées ; les stipules grandes , aiguës , décurrentes sur le pétiole ; les fleurs axillaires ; les pédoncules plus longs que les pétioles , terminés par deux fleurs , moins d'une arête ; la corolle jaune , rayée ; les calices à cinq découpures presque sétacées , velues ; les gouffes inclinées , pubescentes , renflées. Elle paroît se rapprocher beaucoup de l'*ononis geminata* d'Aiton ; mais ses pédoncules sont pourvus d'une arête.

Cette plante a été découverte en Barbarie par M. Desfontaines. (*V. f. in herb. Desfont.*)

37. BUGRANE à rameaux nombreux. *Ononis ramossissima.* Desfont.

Ononis pubescens , foliis ternis , lineari-obovatis ; pedicellis aristatis , folio longioribus , persicatis ; floribus cernuis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 142. tab. 186.

Ononis non spinosa , flore luteo , variegato , angustifolia , maritima. Tournef. Inst. R. Herb. 409, & Herb.

Toute la plante est visqueuse & pubescente ; les tiges droites , presque ligneuses , très-rameuses , hautes d'un pied ; les feuilles petiolées , à trois folioles un peu roides , linéaires , en ovale renversé , dentées en scie ; les stipules ovales , petites , aiguës ; les pédoncules filiformes , axillaires , persistans , deux & trois fois plus longs que les feuilles , munis d'une arête ; les fleurs inclinées ; les découpures du calice subulés ; la corolle jaune , une fois plus petite que celle de l'*ononis natrix* , plus longue que le calice ; l'étendard traverse par des veines purpurines ; les gouffes grêles , renflées , linéaires , pendantes , pubescentes , acuminées , trois fois plus longues que le calice , à plusieurs semences.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines en Barbarie , dans les sables , sur le bord de la mer. (*V. f. in herb. Desfont.*)

38. BUGRANE panachée. *Ononis picta.* Desfont.

Ononis villosa-viscosa , foliis ternis , oblongis ; pedicellis aristatis , folio longioribus ; leguminibus villosis , exsertis ; calicibus corollam subaequantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 144. tab. 187.

Elle se rapproche beaucoup de l'*ononis natrix* , dont elle diffère par sa corolle une fois plus petite , & à peine plus longue que le calice. Toute la plante est velue , glutineuse ; les tiges rameuses ;

les folioles oblongues , elliptiques , denticulées ; les stipules lancéolées , rigides ; les fleurs distantes , axillaires ; les pédoncules pourvus d'une arête ; les divisions du calice filuleuses ; la corolle jaune ; l'étendard panaché de veines purpurines ; les gouffes inclinées , linéaires , velues , plus longues que le calice.

Cette plante croît aux environs de Mascat en Barbarie , où elle a été découverte par M. Desfontaines. (*V. f. in herb. Desfont.*)

39. BUGRANE aiguë. *Ononis cuspidata.* Desfont.

Ononis villosa , foliis inferioribus ternis , summis simplicibus ; foliis oblongis , serratis ; pedicellis trifloris , aristis superne latioribus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 144.

Elle se distingue de l'*ononis natrix* par ses feuilles non visqueuses ; par les arêtes , élargies à leur partie supérieure ; par la corolle , au moins une fois plus petite ; par les poils , beaucoup plus longs. Ses tiges se divisent en rameaux étalés , paniculés. Les feuilles sont légèrement velues ; les inférieures ternées ; les supérieures simples ; les folioles ovales-elliptiques , nerveuses ; les stipules grandes , à deux lobes ovales-lancéolés , aiguës , entières ou à peine dentées ; les pédoncules filiformes , velus , à une ou deux fleurs ; le calice pileux , à cinq découpures linéaires-anacolées , aiguës ; la corolle jaune , plus longue que le calice ; les gouffes réfléchies.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les campagnes , aux environs d'Alger. (*V. f. in herb. Desfont.*)

40. BUGRANE arborescente. *Ononis arborescens.* Desfont.

Ononis ramis tuberculosis ; foliis ternis , obovatis , villosis ; floribus racemosis , sessilibus ; leguminibus calicem aequantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 149. tab. 193.

Ses tiges sont hautes d'environ deux à trois pieds , rameuses , chargées de tubercules ; les jeunes rameaux pubescens ; les feuilles petiolées , à trois folioles glabres , en ovale renversé , dentées , plus longues que les pétioles ; les stipules ovales , bidentées , denticulées ; les fleurs solitaires , alternes , en grappe , munies de bractées petites , ovales , à peine denticulées , de la longueur des pédoncules ; le calice velu , à cinq découpures lancéolées , aiguës ; la corolle rose , de la grandeur de celle de l'*ononis arvensis* ; les gouffes courtes , ovales , renflées , velues , un peu comprimées , de la longueur du calice.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les montagnes incultes de l'Atlas , aux environs d'Arzeu. (*V. f. in herb. Desfont.*)

41. BUGRANE à feuilles caduques. *Ononis caduca*. Vill.

Ononis floribus ternis, racemosis; foliis inferioribus ternatis, oblongis, serratis, ramisque diffusis, spinosis, villosis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 991.

Ononis (caduca), spinosa, foliis subrotundis, caducis; floribus ternatis. Vill. Dauph. 3. pag. 428.

Cette espèce a de grands rapports avec l'*Ononis spinosa*; elle en diffère par ses fleurs en grappes; par les pédoncules, munis de trois fleurs beaucoup plus petites; par les feuilles florales, simples, lancéolées, à peine dentées, insérées sur les deux stipules adhérentes, mais sans être traversées par un pétiole. Les tiges se divisent en rameaux diffus, velus, glutineux; les feuilles inférieures ternées, à trois folioles oblongues, quelquefois arrondies, pubescentes, dentées en hie.

Cette plante croît sur les montagnes du Dauphine. ♀ (Willd.)

42. BUGRANE hérissée. *Ononis hirta*. Hort. Paris.

Ononis totus hirtus, floribus spicato-racemosis, terminalibus; foliis ternatis, obovatis, argutè denticulatis; corollâ parvâ, carulé; caule herbaceo, ramossissimo. (N.)

Cette plante est hérissée de poils fins & blanchâtres. Ses tiges sont herbacées, très-rameuses; les feuilles pétiolées; les inférieures simples; celles des rameaux à trois folioles inégales, petites, en ovale renversé, finement denticulées; les stipules courtes, un peu élargies, crénelées; les fleurs pédicellées, axillaires, disposées en une grappe droite, terminale. Les feuilles florales prennent aux fleurs supérieures la forme d'une petite bractée pédicellée, crénelée à son sommet; le calice divise en cinq dents tubulées; la corolle bleue, à peine plus longue que le calice; les gouffes un peu velues, plus courtes que le calice, renflées, ovales, obtuses à leurs deux extrémités, ne contenant que deux ou trois semences brunes, presque globuleuses.

Cette plante croît dans l'Orient. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

* *Espèces, la plupart du Cap de Bonne-Espérance, moins connues ou se rapprochant des lotus ou des cytisus.*

* *Ononis (spicata), foliis simplicibus, stipulatis, ovatis, serratis; caule erecto, floribus spicatis.* Thunb. Prodr. pag. 129.

* *Ononis (fasciculata), foliis fasciculatis, lanceolatis, crenatis; floribus spicatis, caule erecto.* Thunb. Prodr. pag. 130.

* *Ononis (perfica), pedunculis muticis, bifloris,*

racemosis; foliis ternatis, linearibus, truncatis, serratis; stipulis integerrimis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 997. — Barm. Ind. pag. 157. tab. 49. fig. 1.

* *Ononis (micrantha), foliis ternatis; foliolis oblongis, obtusis; foribus umbellatis terminalibus; caule decumbente.* Thunb. Prodr. 130.

* *Ononis (parviflora), foliis ternatis, villosis; umbellis lateralibus; caule herbaceo, villoso.* Thunb. Prodr. 129. Non Lam. (An anhyllis quinqueflora? Willd.)

* *Ononis (umbellata), foliis ternatis, villosis; foliolis oblongis, obtusis; floribus umbellatis, caule decumbente.* Thunb. Prodr. 130. — Mantif. 166.

* *Ononis (secunda), foliis ternatis, glabris; foliolis oblongis, acutis; umbellis terminalibus; caule decumbente, herbaceo.* Thunb. Prodr. 130.

* *Ononis (globra), foliis ternatis, glabris; foliolis ovatis, obtusis; floribus umbellatis, caule decumbente.* Thunb. Prodr. 130.

* *Ononis (filiformis), pedunculis muticis, subtrifloris; foliis ternatis, subsessilibus; foliolis ovatis, mucronatis.* Linn. Mant. 266. — *Lotus exstipulatus.* Berg. Plant. Cap. pag. 127.

* *Ononis (capensis), racemis pedunculatis, longis; foliis ternatis, suborbiculatis.* Linn. Amoen. Acad. 6. Afr. 41.

* *Ononis (excisa), foliis ternatis, glabris pubescentibus; floribus binis, terminalibus; caule decumbente.* Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (geminata), foliis ternatis, obovatis; pedunculis lateralibus, bifloris.* Ait. Hort. Kew. 3. pag. 23. *Affinis præcedenti.*

* *Ononis (prostrata), pedunculis muticis, unifloris, longissimis; foliis ternatis, acutis; stipulis subulatis, caulibus prostratis.* Linn. Mant. 266.

Lotus prostratus. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 1090.

Ses tiges sont nombreuses, grêles, hautes de six à sept pouces, couchées, herbacées; les feuilles pétiolées, à trois folioles glabres, lancéolées, pubescentes en dessous, aiguës à leurs deux extrémités; les stipules très-petites, acuminées; les pédoncules très-longs, filiformes, à une seule fleur, géniculés vers leur sommet; le calice aussi grand que les feuilles; les gouffes légèrement tomenteuses, horizontales, une fois plus longues que le calice. (Linn.)

* *Ononis (elongata), foliis ternatis, hirsutis; foliolis ovatis, acutis; pedunculis lateralibus, unifloris; caule decumbente.* Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (capillaris), foliis ternatis, linearibus, glabris; pedunculis axillaribus, unifloris; caule erecto inflexo.* Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (villosa)*, foliis ternatis, lanceolatis; pedunculis lateralibus, unifloris; caule decumbente. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (heterophylla)*, foliis ternatis; foliolis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis; floribus solitariis, pedunculatis. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (strigosa)*, foliis ternatis, subius villosis; foliolis ovatis, obtusis; umbellis terminalibus; caule decumbente, frutescente. Thunb. Prodr. 130.

* *Ononis (bipulvata)*, foliis ternatis, villosis; floribus spicatis, caule frutescente. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (microphylla)*, foliis ternatis, scabris; floribus axillaribus, ramis ramuliferae spinosis. Thunb. Prodr. 129. — Linn. Suppl. 314.

Arbuste au très-rameux, étalé, muni de fortes épines. Les feuilles sont pétiolées, à trois folioles oblongues, fort petites, lisses, très-entières, un peu obtuses; les grandes pétiolées, lisses, linéaires, aiguës, noueuses, recourbées, contenant cinq à six semences. (Linn.)

* *Ononis (hirsuta)*, foliis simplicibus, lanceolatis, hirsutis; caule decumbente. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (decumbens)*, foliis ternatis, pubescentibus; foliolis acutis; floribus solitariis, lateralibus; caule decumbente. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (sericea)*, foliis ternatis; foliolis oblongis, subius villosis; floribus spicatis secundis, trifloris. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (racemosa)*, foliis ternatis, subius pubescentibus; foliolis oblongis, floribus racemosis, caule decumbente. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (hypogaea)*, foliis ternatis, lanceolatis, villosis; spica solifera, caule erecto. Thunb. Prodr. 129.

* *Ononis (quinata)*, foliis quinatis; foliolis lanceolatis, convolutis; floribus terminalibus, ovatis decumbente. Thunb. Prodr. 130.

L'*Ononis cernua* Linn. a été mentionné parmi les légers. (Voyez LOTIER, t.^e 24; & pour *Ononis involucreata* Linn. & Berg., voyez LOTIER, n.^o 16 & 12.)

Observations. L'*Ononis altissima* Lam. n.^o 4, est l'*Ononis hircina* Jacq. Hort. 1, pag. 40, tab. 93; l'*Ononis fastosa* Allion. Pedem. n.^o 1164, tab. 41, fig. 1; l'*Ononis spinosa*, var. n.^o, Linn.; l'*Ononis arvensis* Re x. Obs. 1. pag. 21.

L'*Ononis foxatilis* Lam. n.^o 19, est la même plante que l'*Ononis minutissima* Linn. & *Ononis barbata* Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 42, tab. 143.

L'*Ononis variegata* Linn. est bien certainement la même espèce que l'*Ononis aphylla* Lam. n.^o 18.

M. de Lamarck n'avoir observé cette plante que sur des individus secs qui avoient perdu leurs feuilles, & qui n'avoient conservé que leurs tiges pulv. J'ai rapporté cette plante des côtes de Barbarie; elle croît aussi en France, en Provence & aux îles d'Hyères.

L'*Ononis calcinea* Lam. n.^o 7, est sans aucun doute l'*Ononis pubescens* Linn. M. Desfontaines, dans la Flore du mont Atlas, y rapporte comme synonymes l'*Ononis viscosa*, *spinosa cernua*, *lutea*, *laevifolia*, *onnia*, *Tounef. Infl. 409*, qu'il faut retrancher de l'*Ononis viscosa*, n.^o 16.

L'*Ononis parviflora* Lam. n.^o 21, est l'*Ononis columnna* Allion. Pedem. 1. n.^o 1166, tab. 20, fig. 2. — *Ononis subcaerulea* Vill. Dauph. 3. pag. 429. — *Ononis minutissima* Jacq. Austr. 3. pag. 240.

L'*Ononis rotundifolia* Linn. est gravé dans les Illustrations, tab. 616, fig. 1.

BUIS. *Buxus*. (Voyez Illustr. tab. 761, fig. 1 & 2, *Buxus sempervirens* Linn., qui est le *Buxus suffruticosa* Lam. n.^o 3.)

Les Anciens connoissoient le buis, & l'ont mentionné dans leurs ouvrages comme un arbrisseau intéressant par la dureté de son bois, par sa longue durée & par ses usages: ils en faisoient, comme nous, des ouvrages de tour; ils le plantoient dans les jardins, & lui donnoient différentes formes. Le buis ne s'élève jamais beaucoup; mais son tronc parvient quelquefois à une grosseur assez considérable. Halier dit qu'il existoit auprès de Genève un buis dont le tronc avoit environ six pieds de circonférence: il croît avec lenteur & dure un très-grand nombre d'années; il se conserve pendant des siècles sans s'altérer. (Voyez Destont. Arb. & Arbr. vol. 2. pag. 399.)

On donne le nom vulgaire de buis, dans divers pays, à des végétaux qui ont quelques rapports extérieurs avec le buis ordinaire. Ainsi le fragon (*ruscus* Linn.) est nommé buis pignon, parce que les feuilles, qui ont la forme & la dureté de celles du buis, sont de plus terminées par une pointe acérée & piquante. Le buis de la Chine est le *murraya*, genre de plante de la famille des oranges. On donne, à l'île de France, le nom de faux buis au *serenia* de Commerçon, qui est une rubiacée. Le buis de Saint-Domingue est le *polygala persea*. Dans les Antilles, au rapport de Jacquin, on nomme buis ou bouis un camitrier (*chrysophyllum caruleum*), & gros buis le *chrysophyllum argenteum*. Le buis d'abord de la Martinique, selon Chanvallon, est une espèce de *randia*. (Juss.)

BUISSON ARDENT. On donne, en Europe, ce nom à un néflier (*opisilus pyracantha* Linn.), dont les fruits, d'un rouge-vert écarlate, rassemblés en gros bouquets au milieu d'un feuillage d'un

vert-foncé, font paroître l'arbrisseau tout en feu. Le buisson ardent du Malabar est une espèce d'ixore (*Ixora coccinea*, n°. 1), où à ses fleurs également d'un rouge-vif, & offrent le même aspect.

BUISSON A BAIES DE NEIGE. C'est le *chiodacta racemosa* Linn., dont les baies, rassemblées en grappes axillaires, sont très blanches; il croît à la Jamaïque, où on le cultive comme un chèvrefeuille, & dans plusieurs autres îles des Antilles.

BUL-TOLASSI. Le basilic (*ocimum*) est nommé *tolassi* ou *tolassi* par les Brames, *tirtava* par les Malabares, & *bulassi* dans l'île de Java. Les différentes espèces de ce genre font distinguées par des noms à l'indien, tels que *perim-tolassi*, *cana-tolassi* & *bul-tolassi*. L'espèce désignée sous ce dernier nom, la même que le *foladi-tirtava* (Hort. malabar, 10, pag. 173, tab. 87), n'est pas nommée par les botanistes.

BUJAN-AN-VALLI: nom brame d'une plante figuree & décrite par Rheed sous celui de *kigap-nelli* (Hort. malab. 10, pag. 29, fig. 15). On l'a rapportée au *phyllanthus niruri*. Il a de l'affinité avec l'*amvalia* des Malabares (*cicca disticha* Linn.), connu sous le nom vulgaire de *cheramaler*, & encore plus avec l'*amvali* des Brames, l'*emblique* (*emblica* de Gærtner), auparavant réuni par Linné au même genre *phyllanthus*. (Pest. Th.)

BUKU ou BOCHO. Les Hottentots saupoudrent leurs cheveux avec la poudre de feuilles desséchées de cette plante, qui est d'un jaun doré & très-odorante. C'est une espèce de diosme (*diosma hirsuta* Juss.).

BUKERA: nom que porte à Ceilan une plante dont le fruit est décrit par Gærtner, 2, pag. 472, tab. 178, sous la dénomination de *heptapleurum stellatum*. (Voyez Suppl.)

BULA: nom malabar sous lequel Rheed a décrit & figuré (Hort. malabar, 10, pag. 59) une plante herbacée, qui paroît n'avoir que des rapports éloignés avec le *sclero-bula* des Malabares (*echyranthes limata*), que M. de Jussieu rapporte au genre *amoeba* de Forskhal. Le *bula* en diffère par sa fleur à quatre divisions. Ses étamines sont au nombre de deux, & sa capsule est à deux loges, contenant chacune deux graines. (Pest. Th.)

BULANGAN: racine envoyée par les Malais, sous ce nom, à Goa, où elle est employée en médecine. On ne fait à quelle plante elle appartient, à moins qu'une certaine conformité de nom ne fasse présumer qu'elle provient de l'espèce de *sterculier*, qui est nommée, dans l'île de Ceilan, *bulanghas* ou *bolanga*. (Voy. STERCULIER, n°. 1.)

BULATWOLA. On donne ce nom, dans l'île de Ceilan, au betel (*piper betle* Linn.).

BULA-VANGA: nom brame que Rheed applique à deux plantes différentes; l'une est celle qu'il a décrite & figurée (Hort. malab. 2, p. 8, tab. 46) sous le nom de *nir-schullu*, & qui paroît avoir quelques rapports avec le *selam* ou le *sel-dia*; l'autre est décrite par le même (pag. 95, tab. 49) sous le nom malabar de *carambu*. C'est le *jussiaea coryphylla* Lam. n°. 8.

BULBINE. On trouve sous ce nom, dans Plin & dans d'autres anciens auteurs, des plantes bulbeuses, rapportées par Tournefort à son genre *muscari*, & que Linné a depuis réunies à la jacinthe (*hyacinthus*). Ce sont des espèces communes dans les champs, telles que le *hyacinthus conopsea* — *ancemfus*, &c. Linné s'étoit emparé de ce nom, depuis longtemps abandonné, pour désigner deux plantes dont il vouloit faire un genre particulier, qu'il a ensuite dérivé lui-même en les réunissant au genre *anthericum*. Gærtner a voulu faire revivre le même nom en l'appliquant à une autre plante bulbeuse, dont l'ovaire fait corps avec le calice, connue antérieurement sous celui de *crinum asiaticum*, qu'il séparoit avec raison du genre *crinum*, établi primitivement par Linné sur une espèce dont l'ovaire n'est point adhérent avec le calice (*crinum africanum*); mais le bulbine de Gærtner est le même genre que le *cyrtanthus* d'Aiton, qui a prévalu. Quelques auteurs mêmes continuent à nommer *crinum* les espèces à ovaire engagé dans le calice, & ils désignent l'espèce primitive, à ovaire libre, sous le nom d'*agapanthus*.

BULBOCASTANUM. C'est le nom que porte, dans Tournefort, le genre auquel Linné a donné le nom de *banium*. Dalechamp & son traducteur ont distingué trois sortes de *bulbocastanum*, que Linné semble avoir réunies en une seule, sous le nom de *banium bulbocastanum*. Ces trois plantes sont le *bulbocastanum* mâle de Trallian, qui a une racine formée d'un seul tubercule avec de grands nœuds; le *bulbocastanum* femelle de Dalechamp, dont la racine est composée de plusieurs tubercules ronds plus ou moins allongés, & le *bulbocastanum* grand, le *banium* de Dioscoride, plus élevé que les deux autres & à racine tuberculeuse, hile & beaucoup plus grosse. Il paroît que ce ne sont que de simples variétés de la même espèce, connue en français sous le nom de *terre-noir*. (Pal.-Beauv.)

BULBOCODIUM. (Voyez BULBOCRODUS, & III. Gen. tab. 250. — Retr. Obs. 1. tab. 1. *Abandonum*. Adans.)

BULEF, BHULLES: noms arabes du saule, suivant Dalechamp. Le même auteur ajoute qu'on

le nomme aussi, dans l'Arabie, *sefaf* ou *chafif*. Ce dernier nom ressemble beaucoup à celui de *chafif*, qu'on donne à l'*elagnus* ou olivier de Bohême, qui a les feuilles & un peu le port du saule.

BULÉE. *Buddleia*. M. de Lamarck a figuré dans les *Illustrations*, tab. 69, les trois espèces suivantes : fig. 1, *Buddleia occidentalis* (& Flor. peruv. 1, tab. 82), quant à la fleur, au calice, à la corolle : les autres parties de la fructification appartiennent au *Buddleia americana* (Flor. peruv. 1, tab. 82) ; fig. 2, *Buddleia globosa* (Flor. peruv. 1, tab. 83 ; — Jacq. Icon. Rar. 2, tab. 367) ; fig. 3, *Buddleia mazarinensis*. Il faut ajouter à ce genre les espèces suivantes :

7. **BULÉE** à feuilles de saule. *Buddleia salicifolia*. Vahl.

Buddleia foliis lanceolatis, extrorsum serratis, subtus tomentosis ; racemis terminalibus, pedicellis multifloris, floribus nutantibus. Vahl, Symbol. 3. pag. 14.

Ses rameaux sont articulés, à peine tétragones, blanchâtres & légèrement tomenteux à leur partie supérieure ; les feuilles sessiles, opposées, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, entières, un peu dentées vers leur sommet, glabres en dessus, tomenteuses en dessous ; les feuilles florales très-entières, beaucoup plus petites. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, longues de six à sept pouces, feuillées à leur partie inférieure ; les pédoncules opposés, à plusieurs fleurs pédicellées, presque en ombelles ; les bractées linéaires, tomenteuses, ainsi que les pédoncules & les calices ; ceux-ci à quatre découpures lancéolées, un peu obtuses ; la corolle une fois plus longue que le calice, à quatre lobes arrondis ; le style de la longueur de la corolle ; le stigmate tronqué, en forme de cœur.

Cette plante croît à Buenos-Ayres. ? h (Vahl.)

8. **BULÉE** à feuilles oblongues. *Buddleia salicina*. Lam.

Buddleia foliis oblongo-lanceolatis, subdentatis, petiolatis, fusis albo-tomentosis ; spicis gracilibus, terminalibus. Lam. Ill. 1. pag. 191. n°. 1491.

Abrisseau dont les tiges se divisent en rameaux élancés, revêtus d'un duvet blanchâtre & tomenteux, garnis de feuilles médiocrement pétioles, oblongues, lancéolées, à peine denticulées, nervées, blanches & tomenteuses en dessous ; les pétioles réunis par leur base, & embrassant la tige. Les panicules sont terminales, composées d'épis grêles, opposés, pubescents ; les fleurs presque sessiles, pendantes. Les fruits consistent en petites capsules glabres, un peu globuleuses.

Cette plante a été recueillie dans l'Inde par M. Poivre. h (V. f. in herb. Juss.)

9. **BULÉE** à feuilles de bétoune. *Buddleia betonicaefolia*. Lam.

Buddleia foliis ovato-oblongis, crenulatis, rugosifomis ; spicis interruptis, paniculatis. Lam. Ill. 1. pag. 191. n°. 1488.

Ses tiges, hérissées de tubercules, sont obscurément tétragones, garnies de feuilles pétioles, très-rigides, épaisses, ovales-oblongues, obtuses, rudes & chagrinées en dessus, tomenteuses en dessous, finement crénelées. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, dont les ramifications opposées sont chargées de paquets verticillés, sessiles, agglomérés, pubescents, lornant, par leur ensemble, des épis droits, interrompus.

Cette plante a été découverte au Pérou par M. Jof. de Julieu. h (V. f. in herb. J. f.)

10. **BULÉE** en thyrs. *Buddleia thyrsoides*. Lam.

Buddleia foliis lanceolato-linearibus, serratis, sessilibus ; racemo spicato-terminali. Lam. Ill. 1. pag. 191. n°. 1489.

Espèce très-élégante, dont les tiges sont divisées en rameaux glabres, presque cylindriques, jaunâtres, pubescents & cendrés vers leur sommet, garnis de feuilles longues, étroites, linéaires-lancéolées, sessiles & rétrécies à leur base, cunneuses en dessous, glabres, presque luisantes en dessus, dentées en scie à leur contour, acuminées, longues au moins de quatre à cinq pouces. Les fleurs sont disposées en une grappe touffue, très-droite, tomenteuse & blanchâtre. Le calice est court, urcéolé, à quatre divisions ; la corolle à quatre lobes égaux ; le tube court ; quatre anthères sessiles ; le stigmate bifide ; les capsules ovales, tomenteuses, pédicellées.

Cette plante a été découverte par Commerson à Monte-Video. h (V. f. in herb. Juss.)

11. **BULÉE** effilée. *Buddleia virgata*. Lam.

Buddleia foliis linearibus, obtusis, obscure dentatis ; ramis virgatis, erectis ; racemis terminalibus. Lam. Ill. 1. pag. 191. n°. 1490.

Abrisseau dont les tiges sont glabres, cylindriques ; les rameaux effilés, droits, pubescents, garnis de feuilles petites, sessiles, elliptiques, assez semblables à celles de la lavande, obovées à leurs deux extrémités, insensiblement plus petites, presque glabres, entières ou à peine denticulées. Les fleurs sont disposées en grappes terminales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h (V. f. in herb. Juss.)

12. **BULÉE**

12. BULÈRE à tige grimpante. *Buddleia volubilis*. Lam.

Buddleia foliis linearibus, acutis, integerrimis; caule volubili; cymis axillaribus, tomentoso-ferrugineis. Lam. III. 1. pag. 291. n°. 1492.

Cette espèce est remarquable par ses tiges grimpantes, rameuses, garnies de feuilles linéaires, très-entières à leurs bords, aiguës, les fleurs disposées en cimes axillaires, tomenteuses, de couleur ferrugineuse. La corolle est courte, à quatre divisions profondes; le tube très-court.

Cette plante croît à l'île Bourbon. \bar{h}

13. BULÈRE blanchâtre. *Buddleia incana*. Ruiz & Pavon.

Buddleia foliis oblongis lanceolatisque, crenulatis; stipulis marginalibus, pedunculis ternatis divisis, floribus capitatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 52. tab. 80. fig. B.

Arbre de trente six à quarante pieds. Ses rameaux sont étalés, tomenteux dans leur jeunesse; les feuilles lanceolées, oblongues, pétioles, un peu crenelées, tomenteuses en dessous, blanchâtres, glabres, ridées en dessus; les stipules à demi circulaires; les grappes terminales, presque paniculées, tomenteuses; les pédoncules trichotomes; les bractées linéaires, aiguës; les fleurs rassemblées en tête; la corolle jaunâtre.

Cette plante croît au Pérou. \bar{h}

14. BULÈRE à feuilles adhérentes. *Buddleia connata*. Ruiz & Pavon.

Buddleia foliis lanceolatis, connatis, crenatis; stipulis reniformibus; pedunculis solitariis, capitatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 52. tab. 81. fig. B.

Ses tiges sont ligneuses, droites, nombreuses, médiocrement rameuses; les rameaux anguleux, striés, coriennux; les feuilles opposées, réunies par leur base, lancéolées, aiguës, crenelées, tudes en dessus, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les stipules réniformes; les fleurs sessiles, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule commun, simple ou bifide; les bractées linéaires, subulées; la corolle d'un jaune de safran, velue à son orifice; les calices & les capsules tomenteux; le style plus court que la corolle.

Cette plante croît au Pérou. \bar{h}

15. BULÈRE diffuse. *Buddleia diffusa*. Ruiz & Pav.

Buddleia subscandens, foliis ovatis subcordatisque, acutis; stipulis reniformibus, reflexis; pedunculis axillaribus, floribus capitatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 53. tab. 80. fig. A.

Ses tiges sont presque grimpantes, diffuses, très-rameuses, jaunâtres, lanugineuses, cylindriques.

Botanique. Supplément. Tome I.

ques; les feuilles médiocrement pétioles, rabarues, ovales, presque en cœur ou ovales-lancéolées, aiguës, très-entières, quelquefois munies d'une ou de deux dents, pubescentes en dessus, décurrentes sur le pétiole; les stipules réniformes, réfléchies à leurs bords; les fleurs réunies en tête, sessiles; les pédoncules communs, solitaires, gemmés ou ternés; la corolle jaune, velue à son orifice; son limbe réfléchi.

Cette plante croît au Pérou, dans les champs. \bar{h}

16. BULÈRE à épis. *Buddleia spicata*. Ruiz & Pav.

Buddleia foliis ovatis, utrinque acutis, serratis; spicis longissimis, simplicibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 53. tab. 81. fig. A.

Cette plante a des tiges droites, tomenteuses, blanchâtres, longues de dix à douze pieds, à rameaux étalés, garnis de feuilles pétioles, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, dentées; des stipules à peine sessiles; les fleurs verticillées, en épis simples, très-longs; les bractées subulées; la corolle jaune, tomenteuse en dehors, hérissée à son orifice.

Cette plante croît au Pérou. \bar{h}

17. BULÈRE à feuilles acuminées. *Buddleia acuminata*.

Buddleia foliis ovato-acuminatis, laxè dentatis, subis pubescentibus; ramis terminalibus, brevissimis, tomentosis. (N.)

Ses rameaux sont obscurément tétragones, pubescents; les feuilles médiocrement pétioles, ovales, acuminées; les inférieures élargies à leur base, glabres en dessus, pubescentes en dessous, quelquefois entières, plus souvent à denselures courtes, distantes. Les fleurs sont réunies en une grappe paniculée, courte, terminale, chargée d'un duvet coriennux, un peu rouffâtre; la corolle pubescente, infundibuliforme; le tube alongé, cylindrique; le limbe à quatre lobes courts; les capsules petites, ovales, tomenteuses.

Cette plante croît dans l'Inde. \bar{h} (V. f. in herb. Juss.)

18. BULÈRE d'Afrique. *Buddleia africana*. Lour.

Buddleia foliis lanceolato-linearibus, rugosis, glabris; spicis plenis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 90.

Ses tiges sont presque ligneuses, hautes de trois pieds; les rameaux ascendants; les feuilles glabres, opposées, lancéolées, linéaires, ridées, légèrement dentées en scie; les fleurs blanches, disposées en épis terminaux, alongés, point interrompus; le calice persistant, à quatre découpures droites, subulées; la corolle campanulée, à quatre lobes arrondis; quatre filaments très courts, insérés à l'orifice du tube; les anthères oblongues;

B b b b

le style de la longueur des étamines; le stigmate bifide, oblong; les capslules allongées, à deux loges, à deux valves, renfermant plusieurs semences oblongues.

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.)

19. BULBES à feuilles ternées. *Budlea ternata*. Lour.

Budlea foliis ternatis, acuminatis; pedunculis axillaris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 91.

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes de deux pieds, un peu ligneuses, garnies de feuilles ternées, lancéolées, acuminées, dentées en scie. Les fleurs sont blanches, solitaires, axillaires, pédonculées; le calice à quatre découpures conniventes; les lobes du limbe de la corolle ovales; les stigmates obtus, bifides; la capsule ovale, à deux loges polyformes.

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.)

* *Budlea (diversifolia), foliis ovalibus glabris, integerrimis subrepandis; corymbis axillaribus, subquinqsfloris*. Vahl, Symbol. 3. pag. 15.

Budlea indica. Lam.

Cette espèce varie dans ses feuilles; elles sont quelquefois munies, vers leur sommet, d'une ou de deux dents obtuses, dilatables ou brisées à leurs bords, velues dans leur jeunesse, glabres à la partie inférieure des rameaux; les unes arrondies, un peu obtuses; d'autres plus ou moins aiguës. Cette plante, selon M. Vahl, est la même que le *budlea indica* Lam.

BULLARIA. (Voyez URÉDO, p. 151, n°. 140)

BULLIARDA. (Voyez TILLÉE, n°. 2.)

BUMALDA. (Voyez BUMALDE.)

BUMELIA. (Voyez SAPOTILLIER, n°. 5 & suivans.)

BUMUM. *Bunca*. Espèce de haricot de Ceylan (*Phaseolus max*), qui est le *mungo* des Perses, le *musc* des Turcs, & le *mux* des Espagnols.

BUNA. Clusius (Exot. pag. 136) décrit sous ce nom le fruit du caféier, qui étoit peu connu de son tems (en 1605), & dont il ne savoit l'usage que d'après des rapports vagues; il ajoute que Rauwolf le nommoit *o-null*, & le regardoit comme le même que le *bancho* cité par Avicenne, & le *bunca* dont parle Rhazès. (Juss.)

BUNA-PALLA: nom donné, dans les Moluques, au macis de la muscade. L'arbre y est appelé *pala* ou *palla*. (Voyez MUSCADIER.)

BUNCÆ. (Voyez BUMUM.)

BUNDURH ou AGILEUZ: noms arabes, attribués par Dalechamp au noisetier ou coudrier.

BUNGALON des Philippines. Selon Camelli, c'est une espèce de manglier remplie d'un suc lacteux, dont le tronc est formé d'un bois solide. Les feuilles sont d'un vert foncé en dessus, & blanchâtres en dessous. Les fleurs, connues sous le nom de *piapi*, *apiapi*, sont vertes, charnues, en forme de cœur & bonnes à manger. « Les fruits sont longs, dit l'auteur, comme de petites chandelles, & ressemblent en ce point à ceux du manglier ou du palétuvier. » (Juss.)

BUNGÔ: nom malais d'une espèce de cernantine (*jaſſica*) mentionnée dans Rumphé (Herb. Amb. 6, pag. 52, tab. 12, fig. 2).

BUNIAS. Linn. M. de Lamarck a réuni ce genre aux camelines (voyez ce mot) (*myagrum* Linn.) mais Gærtner, qui l'a conservé, l'a réduit à un plus petit nombre d'espèces, en réunissant, sous le nom de *calite*, celles à dont les filiques sont articulées, & sous le genre *pugionium* celles dont les filiques sont tantôt réellement ovales, par conséquent plus larges que longues, terminées par une sorte de corne aiguë à leurs deux extrémités.

En conservant le genre *bunias* d'après ces réflexions, il aura pour caractère:

Une filique courte, non articulée, un peu siliquique ou à quatre faces, à deux ou à quatre loges, renversée, tuberculée ou armée d'environ quatre pointes sur ses angles, à une seule valve. (Voyez CAMELINE.)

BUNIAM, BUNION (Voyez TERRE NOIX.) Le nom de *buniam* a été donné anciennement à différentes plantes, par Dalechamp à une espèce d'érhuse (*erhuse bunias* Linn.); par C. mercurius à l'*erysimum barbareum* Lion., & par Dodonée au *bunium bulbocastanum*. Linné l'a conservé pour nom générique à cette dernière plante. Dioscoride & Lobel nommoient *bunium* & *bunius* le navet commun, qui est le *brassica napus* Linn.

BUNIUS. Rumphé, dans l'Herb. Amb. 3, pag. 204, tab. 131, désigne sous ce nom un arbre des Moluques, qui est le *bunerus* des Macassars, & le *buni* ou *wuni* de Java, l'ayune de quelques cantons d'Amboine. Linné en avoit fait un genre sous le nom de *silepe bunius*; mais Smith alléguant que cet arbre est une simple espèce du genre *antidesma*.

BU-PARITI Rhoad. C'est l'*hibiscus populneus* Linn. (Voyez KERATE, n°. 16.) Le nom de *pariti* sert, au Malabar, à désigner plusieurs malvacées remarquables par leurs grandes fleurs.

BUPHTHALME. *Buphtalmum*. Tournefort a divisé les espèces qui composent ce genre en deux autres genres, réunissant dans le premier, sous le nom d'*asteroides*, celles dont les folioles entières,

res du calice ne dépassent pas les intérieures, & sous celui d'*affertus* celles dont les folioles extérieures du calice, beaucoup plus longues que les autres, forment une sorte d'involucre foliacé. Quelques autres espèces exotiques se trouvent des *corona folia* dans Tournefort. Il est à remarquer que le *bupthalamum* de Dioscoride & de plusieurs botanistes plus modernes parait appartenir au *chrysanthemum*, & non à ce genre, qui fournit à nos parterres plusieurs belles plantes d'ornement. Les suivantes ont été découvertes récemment.

14. BUPHTHALME florifolium. *Bupthalamum florifolium*. Vent.

Bupthalamum calitibus obtusis foliosis, pedunculatis; foliis alternis, spatulatis, tomentosis; floribus florifolius. Vent. Hort. Cels. pag. & tab. 35.

Cette plante a beaucoup d'affinité avec les *athanasia* & les *anthesis*; mais elle diffère des premiers par ses semences non aigrettées, & des seconds par les écailles du calice, qui ne sont ni linéaires ni égales; elle se distingue des autres espèces de ce genre par toutes les fleurs florifolieuses. Ses tiges sont droites, ligneuses; ses rameaux velus; ses feuilles alternes, sessiles, spatulées, dentées à leur sommet, tomenteuses, un peu concaves, à demi amplexicaules; les fleurs pédonculées, solitaires, terminales & latérales, d'un jaune doré; les folioles extérieures du calice semblables aux feuilles; les intérieures oblongues, aiguës, membraneuses & recourbées à leur sommet; les semences tétragones, un peu pileuses, surmontées d'un rebord très-court, presque entier; le réceptacle garni de paillettes; celles de la circonférence tronquées; les intérieures aiguës.

Cette plante a été découverte par MM. Olivier & Bruenier dans la Méopotamie; elle est cultivée chez M. Cels. (V. f.)

15. BUPHTHALME odorant. *Bupthalamum odoratum*. S. houb.

Bupthalamum foliis alternis, linearilanceolatis, integerrimis, sessilibus; floribus alaribus, subsessilibus; caule suffruticoso, trichotomo. Willden. Spec. Plant. 3. p. 223. — Schoub. Maioc. 199. tab. 7.

Ses tiges sont ligneuses, presque trichotomes, divisées en rameaux diffus, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires-lanceolées, très-entières, à p. fine aiguë, glabres à leurs deux faces. Les fleurs ont presque sessiles, solitaires, les unes terminales, les autres dans la bifurcation des rameaux; les folioles extérieures du calice un peu plus longues que les flurs, aiguës, lanceolées; les semences surmontées d'une petite couronne à dents aiguës; les paillettes concaves & tronquées.

Cette plante croit aux environs de Mogador, dans le royaume de Maroc. (V.)

16. BUPHTHALME à feuilles de chrysanthème. *Bupthalamum chrysanthemoides*.

Bupthalamum foliis sparsis, petiolatis, ovato-spatulatis, spinoso-dentatis; floribus solitariis, terminalibus; caule suffruticoso. (N.)

Bel arbrisseau à tige dure, striée, rameuse; les rameaux alternes; les feuilles éparées, pétiolées, ovales, spatulées, longues d'environ deux pouces, décurrentes sur le pétiole, glabres, un peu rudes, armées à leur contour de petits dents épineuses. Les fleurs sont grosses, d'un beau jaune, solitaires, terminales, presque sessiles; les folioles calicinales plus courtes que les flurs, linéaires, oblongues, obtuses, quelquefois étiées à leurs bords; les demi-flurons obtus, à trois petites dents; les paillettes tronquées à leur sommet; les semences surmontées d'une petite membrane à plusieurs lobes très-courts, arrondis.

Cette plante croît aux Canaries, où elle a été découverte par M. Broussonet. (V. f. in herb. Desfont.)

17. BUPHTHALME à feuilles de mélisse. *Bupthalamum melissoides*.

Bupthalamum caule herbaceo folisque asperis, oppositis, petiolatis, cordato-ovatis, obtusis crenatis; pedunculo longissimo, unisifero. (N.)

Ses tiges sont grêles, rudes, herbacées, cannelées; les feuilles opposées, longuement pétiolées, ovales, en cœur, obtuses, acuminées, rudes & nerveuses à leurs deux faces, à crénélures courtes, obtuses; les pétioles filiformes, presque de la longueur des feuilles. Les fleurs sont jaunes, solitaires, portées sur un long pédoncule terminal; les folioles calicinales courtes, élargies, ovales, hipides.

J'ignore le lieu natal de cette plante. (V. f. in herb. Desfont.)

18. BUPHTHALME fétide. *Bupthalamum graveolens*. Vahl.

Bupthalamum calitibus acutis foliosis; foliis alternis, pinnatifidis. Vahl, Synb. 1. pag. 74. tab. 19. — Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 151.

Ses tiges sont droites, épaisses, blanchâtres, herbacées, prolifères; les feuilles alternes, amplexicaules, pinnatifides, lanceolées, aiguës, longues de deux pouces, velues, dentées, sinuées ou lobées; les lobes oblongs, très-entières, obtus; les fleurs solitaires, pédonculées; les folioles extérieures du calice lanceolées, aiguës, une fois plus longues que les flurs; les intérieures linéaires-lanceolées, égales, velues à leur sommet; les semences couronnées par une membrane à huit découpures linéaires, égales.

Cette plante croît en Égypte. (V. f. in herb. Desfont.)

B b b b b

19. BUPHTHALME des prés. *Buphthalmum pratense*. Vahl.

Buphthalmum calicibus acutè foliosis; foliis alternis, cuneiformibus, hirtis. Vahl, Symb. 1. pag. 75.

Cervana. Fotskh. Flor. xgypt-arab. pag. 153.

Cette plante a des tiges ligneuses, diffuses; les rameaux prolifères, pileux, ainsi que les tiges & les feuilles. Celles-ci sont alternes, cuneiformes, lobées seulement à leur sommet ou quelquefois à deux découpures lancéolées, obtuses, très-entières; les fleurs presque sessiles, solitaires à l'extrémité des rameaux, de la grosseur d'un pois; environ cinq folioles sous la fleur, linéaires, obtuses, entières, plus longues que le calice; les folioles inférieures du calice oblongues, obtuses, placées sur un seul rang.

Cette plante croît en Égypte. ○

20. BUPHTHALME uniflore. *Buphthalmum uniflorum*. Forst.

Buphthalmum foliis oppositis, ovato-lanceolatis, serratis, triplinerviis, frigidis, subtus cano-hirtis; pedunculo terminali, unifloro, elongato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1236. — Forst. Prodr. n°. 541.

Cette espèce, d'après Willdenow, a une tige simple, haute de six à sept pouces, roide, tétragone; les feuilles pétiolées, opposées, ovales, longues d'un pouce & demi, rétrécies à leurs deux extrémités, lâchement dentées en scie, à trois nervures, tudes, pileuses en dessus, blanches & très-pileuses en dessous. La fleur est petite, soutenue par un pédoncule terminal, long de deux pouces.

Cette plante croît dans l'île de Norfolk. (Willd.)

21. BUPHTHALME rameux. *Buphthalmum ramosum*. Vahl.

Buphthalmum foliis oppositis, lanceolatis, scabris, nervosis, denticulatis, subsiliatis; calicibus foliosis, caule hispido. Vahl, Symb. 2. pag. 92. — Forskh. Flor. xgypt-arab. pag. 151.

Ses tiges sont herbacées, hispides, rameuses, garnies de feuilles sessiles, opposées, lancéolées, sans nervures sensibles, hérissées de points très-petits, lâchement denticulées, un peu ciliées. Les fleurs sont solitaires, terminales, pédonculées; les pédoncules hispides, longs d'un pouce; le calice accompagné de folioles extérieures allongées, obtuses.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. (Vahl.)

22. BUPHTHALME à feuilles en cœur. *Buphthalmum cordifolium*. Waldl.

Buphthalmum foliis alternis, inferioribus petiolatis, cordatis, duplicato-serratis; superioribus sessilibus, ovatis, serratis, caulibus heracosis. Waldl. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 2. pag. 117. tab. 113.

Buphthalmum (speciosum), calicibus foliosis; foliis alternis, ovatis, duplicato-serratis, scabris; caule herbaceo. Scrib. Dec. pag. 11. tab. 6.

Les auteurs des *Plantes rares de Hongrie* confondent cette plante comme très-différente du *buphthalmum speciosissimum*; ils y rapportent le synonyme de Tournefort, *asferoides orientalis*, &c. Cor. 51, tab. 487. Les feuilles sont de deux sortes: les inférieures, pétiolées, en cœur, à doubles dentelures; les supérieures, sessiles, ovales, dentées en scie, rudés au toucher; les fleurs grandes & solitaires.

Cette plante croît dans les forêts de la Croatie, dans la Cappadoce, &c. x

23. BUPHTHALME potagère. *Buphthalmum oleraceum*. Lour.

Buphthalmum foliis oppositis, lineari-lanceolatis, inaequaliter dentatis, recurvis; calicinis squamis acutis, membranula laterali connatis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 618.

Cette espèce paraît avoir des rapports avec le *buphthalmum graveolens*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses tiges sont droites, blanchâtres, lisses, hautes de deux pieds; les feuilles opposées, linéaires-lancéolées, un peu charnues, glabres, cendrées, recourbées, inégalement dentées. Les fleurs sont grandes & solitaires; le calice hémisphérique; ses folioles aiguës, adhérentes latéralement par une petite membrane; les fleurons jaunes, tubuleux; les demi-fleurons blancs; les paillettes fort petites; les semences couronnées par une bordure.

Cette plante est cultivée dans les jardins à la Chine & à la Cochinchine; elle est odorante. Les naturels emploient ses feuilles comme herbe potagère. (Lour.)

24. BUPHTHALME de Buenos-Ayres. *Buphthalmum bonariense*.

Buphthalmum foliis spatulatis, dentatis, petiolatis; caule ramosissimo. Pers. Synopf. Plant. 2. pag. 474.

Ses tiges sont très-rameuses; ses feuilles pétiolées, spatulées, en ovale renversé, dentées à leur contour; les fleurs grandes & solitaires. Elle croît à Buenos-Ayres.

Observations. Dans les *Illustrations des Genres* on trouve, tab. 682, fig. 5, *buphthalmum maritimum*; fig. 3, *buphthalmum salicifolium*; fig. 4, *buphthalmum aquaticum*; ces deux dernières espèces d'après

Gärtners. La fig. 1 est l'*asteroides orientalis*, &c. de Tournefort; la fig. 2, le genre *asteriscus* du même auteur.

Willdenow a donné le nom de *bupththalmum tinctorum* au *bupththalmum peruvianum* Lam., n°. 2. Michaux soupçonne que le *bupththalmum helianthoides*, n°. 8, pourroit bien être la même plante que le *radicchia oppositifolia* Linn., & Willdenow croit que le *bupththalmum scabrum* Cavan. ne diffère point de l'*anthemis bupththalmoides* Linn. (Voyez ACHELLE, n°. 4, Suppl.) Quelques auteurs, en particulier M. Gouan, regardent le *bupththalmum foliosifolium* & *grandiflorum* comme deux variétés : la première à feuilles & à tiges velues; la seconde presque glabre : ils le deviennent tout-à-fait dans les jardins. On y distingue cependant quelques autres caractères, qui ne permettent guère de les confondre. (Voyez les espèces n°. 9 & 10.) La plante qui, dans le catalogue du Jardin des Plantes de Paris, porte le nom de *bupththalmum procumbens*, est bien certainement celle décrite, n°. 8, sous le nom de *bupththalmum helianthoides*; mais cette même plante, comme le soupçonne M. de Lamarck, ne peut pas être la plante de Linné, d'après les synonymes que ce dernier auteur y rapporte, & la phrase descriptive.

BUPHTHALMUM. (Voyez BUPHTHALME.)

BUPLÈVRE. *Bupleurum*. Le nom de ce genre est ancien; il est composé de deux mots grecs qui signifient *causé de bas*, probablement à cause de la roideur des feuilles de la plupart des espèces; cependant il est fort douteux que cette dénomination des Anciens puisse s'appliquer aujourd'hui à aucune des espèces renfermées dans ce genre. Le *bupleurum* de Théophraste, de Pline, &c. ne nous est pas connu. Aux espèces déjà décrites, ajoutez :

18. **BUPLÈVRE** à feuilles de gramin. *Bupleurum graminifolium*. Vahl.

Bupleurum involucrellis heptaphyllis, universali fustriphylo; foliis radicalibus linearibus, scapis monophyllis. Vahl, Symb. 3. pag. 48.

Bupleurum petraum. Lam. n°. 3, & Ill. tab. 189. fig. 2. Non Linn.

Bupleurum petraum. Jacq. Collect. 1. pag. 209. & Icon. Par. 1. tab. 56. — Villars, Dauph. 2. pag. 576. tab. 14. — Allioni, Austr. pag. 24. — Haller, Helv. n°. 773.

Bupleurum alpinum, foliis angustis, gramineis, fistulosis; caule seré nudo. Segur, Veron. vol. 2, pag. 15. & vol. 3, pag. 211.

Cette plante a été confondue avec le *bupleurum petraum* de Linné; elle en diffère essentiellement par les folioles de la collerette partielle, distinctes & non soudées ensemble. Ainsi la description

de M. de Lamarck doit être rapportée à cette plante, & non à l'espèce de Linné.

Le *bupleurum petraum* Linn. a des feuilles linéaires & sessiles; les supérieures en cœur, lancéolées, amplexicaules. La collerette universelle est composée de cinq folioles assez larges, toutes égales. Les collerettes partielles ont leurs cinq folioles adhérentes entr'elles jusqu'à vers le milieu de leur longueur.

19. **BUPLÈVRE** à feuilles de carex. *Bupleurum caricifolium*. Willd.

Bupleurum involucrellis pentaphyllis, caespitatis, universali monophyllo, lanceolato; foliis linearibus, basi attenuatis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1373.

Bupleurum (gramineum), foliis gramineis, supremis lanceolatis; caule summo, ramofo, paucifloro. Vill. Dauph. 2. pag. 575.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *bupleurum rannunculoides*. On l'en distingue par les feuilles radicales, linéaires, rétrécies à leurs deux extrémités; par la collerette universelle, à une seule, très-rarement à deux folioles. Les racines sont presque simples, tortueuses, divisées à leur sommet en trois ou quatre petites souches; les tiges courtes, presque simples, garnies de quelques feuillets sessiles, linéaires, amplexicaules; l'ombelle générale divisée en trois ou cinq rayons; les ombelles partielles accompagnées d'une collerette à cinq folioles ovales, lancéolées, mucronées.

Cette plante croît dans les Alpes & sur les montagnes du Dauphiné. (V. f.)

20. **BUPLÈVRE** couché. *Bupleurum procumbens*. Desfont.

Bupleurum caule procumbente, foliis linearibus, ramulis paniculatis; involucrellis subovatis, acutis, brevissimis; semine rugoso. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 210. tab. 56.

Il se rapproche beaucoup du *bupleurum tenuissimum*, dont il diffère par les tiges couchées; par les involucreux beaucoup plus petits, ovales, point subulés, plus courts que les ombelles. Les rameaux sont nombreux, bifurques, pinnulés; les feuilles roides; les inférieures étroites, lancéolées; les supérieures subulées, très-courtes, à demi amplexicaules. L'ombelle universelle est petite, de deux à cinq rayons presque capillaires, inégaux, anguleux; l'involucre ou collerette universelle à trois ou cinq folioles aiguës; cinq aux ombelles partielles; la corolle blanche, petite; les femences courtes, ovales, brunes, ridées.

Cette plante a été découverte aux environs de Tunis par M. Desfontaines. (V. f.)

21. BUPLÈVRE élevé. *Bupleurum exaltatum*. Marfch.

Bupleurum involucri utroque pentaphyllo, minimo; foliis omnibus linearibus, inferioribus elongatis; caule erecto, paniculato. Marfch. Tabl. de la mer Casp. n°. 8.

β. *Bupleurum divaricatum, ramis divaricatis, radiis paniculatis.* (N.)

Ses racines, dures, presque ligneuses, produisent plusieurs tiges droites, élevées, glabres, rameuses; les rameaux paniculés, toides, redressés. Les feuilles sont étroites, sessiles, glabres, linéaires, striées, aiguës, très-entières; les inférieures beaucoup plus longues; les supérieures subulées; les supérieures, blanchâtres; les ombelles universelles de cinq à huit rayons iniformes; toutes les collerettes composées de cinq petites folioles aiguës, caduques; les fruits oblongs, obius, glabres, légèrement anguleux.

Cette plante croît sur les collines arides du mont Taurus. α (V. f. in herb. Desfont.)

Dans la plante β, les ramifications sont beaucoup plus étalées, plus ouvertes; les ombelles & les ombelles moins garnies. D'ailleurs, je n'y ai point trouvé d'autres différences avec la précédente; ce qui me fait soupçonner que ce n'est qu'une variété. Elle a été recueillie par M. Broussonet dans le royaume de Maroc. (V. f.)

22. BUPLÈVRE du mont Baldo. *Bupleurum baldense*. Willd.

Bupleurum caule erecto, ramofo; foliis linearibus; involucri subteraphyllis, inaequalibus, umbellâ brevioribus; involucris pentaphyllis. Willd. Turr. Giorn. pag. 47. tab. 1, & Spec. Plant. 1. p. 1375.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, cylindriques, garnies de feuilles sessiles, linéaires; les radicules plus larges à leur base. L'ombelle est accompagnée d'une collerette composée d'environ trois ou quatre folioles inégales, plus courtes que les rayons; celles des ombellules sont au nombre de cinq, dont deux plus grandes.

Cette plante croît sur le mont Baldo & sur les montagnes sous-alpines de la Croatie & de la Carniole. α

23. BUPLÈVRE à feuilles de plantain. *Bupleurum plantaginifolium*. Desfont.

Bupleurum fruticosum, foliis perennantibus, lanceolatis, nervosis, mucronatis; ramis floriferis ramosis, striatis; involucri subulatis, adpressis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 233. tab. 57.

A bristau de cinq pieds & plus, dont les tiges sont garnies de feuilles coriaces, lancéolées, persistantes, nervueuses, très-entières, mucronees,

rétrécies à leurs deux extrémités, élargies à leur base en un pétiole court, amplexicaule; les rameaux fleuris allongés, glauques, striés, roides, ramifiés; les ombelles à quatre ou dix rayons grêles, anguleux, inégaux; l'involucre universel composé de cinq ou sept folioles serrées, subulées; celles des involucries partiels semblables, mais plus petites, plus courtes que les ombellules; la corolle petite, d'un jaune-pâle; les semences glabres, striées, à demi cylindriques.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans le mont Atlas, aux environs de Bougie. β (V. f.)

24. BUPLÈVRE blanchâtre. *Bupleurum canescens*. Schousb.

Bupleurum frutescens, foliis ovali-lanceolatis, obtusis, nervosis, subsessilibus. Schousb. Maroc. pag. 127.

β. *Bupleurum ramosissimum, ramis divaricatis, striatis; radiis numerosioribus.* (N.)

Ses tiges sont droites, ligneuses, divisées, vers leur extrémité, en quelques rameaux grêles, striés. Les feuilles sont ovales-lancéolées ou elliptiques, très-obtusif, entières, longues d'un pouce & plus, larges de quatre lignes, coriaces, nerveuses, un peu rétrécies à leur base, puis élargies en un pétiole amplexicaule; les supérieures plus étroites, quelquefois un peu mucronees; la collerette universelle composée de cinq folioles lancéolées, aiguës, nerveuses, persistantes; celles des collerettes partielles, quelquefois au nombre de six, de la longueur des pédoncules; les semences oblongues, striées.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, aux environs de Mogador. β (V. f. in herb. Desfont.)

La plante β offre, dans toutes ses parties essentielles, les mêmes caractères que la précédente; mais ses tiges, beaucoup plus élevées, sont plus ramifiées. Les rameaux sont roides, étalés; les rayons de l'ombelle universelle beaucoup plus nombreux. Je n'ai point vu les feuilles des tiges; mais celles des rameaux sont les mêmes que dans la précédente. Elle a été recueillie aux environs de Maroc par M. Broussonet. (V. f.)

25. BUPLÈVRE nain. *Bupleurum nanum*.

Bupleurum subcaule, ramis brevissimis, foliis linearisubulatis; umbellis sessilibus, capitatis; involucris trinerviis, ovalis, mucronatis. (N.)

Bupleurum maritimum. Delille, Catal.

Cette petite espèce a une racine simple, grêle, filiforme. Sa tige est longue à peine de deux ou trois lignes, divisée en plusieurs petits rameaux

simples, filiformes, glabres, longe d'environ un pouce. Les feuilles sont roides, ni formes, subulées, terminées par une petite pointe épineuse; les fleurs denses, ramifiées en une tête globuleuse, finies dans l'aisselle d'une feuille florale. Les corollettes, tant universelles que partielles, sont composées de plusieurs petites folioles dures, ovales, à trois nervures mucronées, plus longues que les rayons peu nombreux de l'ombelle universelle. Les ombellules, extrêmement petites, ainsi que les fleurs, sont renfermées dans les folioles de leur corollette. La corolle est un peu herbacée. Je n'ai point vu les semences.

Cette plante m'a été communiquée par M. Dupuis; il l'avait reçue de l'Égypte. Je l'ai retrouvée dans les plantes d'Égypte de M. Delille, qui l'a recueillie aux environs du lac Maréotis. (V. f.)

* *Espèces moins connues.*

* *Buplevrum (nudum)*, caule ram. fo. aplyllo; foliis radicalibus decompositis, planis, incis; involucri involucribus lanceolatis oblongis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 331. E. Cap. B. Sp. 2.

* *Buplevrum (arborescens)*, frutescens, foliis oblongis, integerrimis, petiolatis. Willden. Spec. Plant. t. pag. 1376. — Thunb. Prodr. 50.

Cette espèce diffère du *buplevrum fruticosum* par ses feuilles et étalées, un peu aiguës & mucronées à leur sommet, & non pas obtuses, mucronées. Les ombelles sont une fois plus petites, médiocrement pédonculées, finies à l'extrémité des tiges & des rameaux. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. (V. Willd.)

Observations. Le *buplevrum rotundifolium* est figure *fig. 1*, tab. 189. fig. 1.

Le *buplevrum Gerardii*, Murr. Syst. pag. 274, & Jacq. Austr. 3, tab. 256, est la même plante que le *buplevrum junceum*, L. 12, var. 2, espèce en effet bien distincte de la variété 3, comme M. de Lamarck l'a déjà fait observer.

Il faut ajouter pour synonymes au *buplevrum gibbaticum*, L. 16, le *buplevrum coriaceum* Lher. Stirp. Nov. 1, pag. 159, tab. 673. — Ait. Hort. Kew. pag. 331; *buplevrum arborescens* Jacq. Icon. Rar. 2, tab. 351, & Collect. 2, pag. 543; *buplevrum obliquum* Vahl, Symb. 1, pag. 24.

Le *buplevrum frutescens* Linn. est figuré dans Cavanilles, Icon. Rar. 2, pag. 3, tab. 106. — Plusieurs autres espèces de buplevre ont été placées parmi les hermas. (Voyez ce mot.)

BUPLEVRUM. (Voyez BURLÈVRE.)

BURAK : nom égyptien de l'*Asphodelus fistulosus* Linn., au rapport de Forskhal. Dalechamp dit que les Arabes le nomment *birouch* & *bunthes*.

BURAM-CHADALI. C'est ainsi, selon Linné fils, que l'on nomme au Bengale le saintoïn ou il-lant (*hedyotum pyrami*), dont les feuilles ternées ont les deux folioles latérales, qui, pendant tout le jour, s'abaissent & se relèvent alternativement par un mouvement oscillatoire insensible, sans être déterminé par le contact d'aucun corps étranger.

BURANG. Dans l'île de Bandj, une des Moluques, on nomme ainsi un figuier que Rumphé décrit & figure dans son *Herour, amboin*, vol. 3, pag. 115, tab. 93, qui est le *goudal* des Malais & le *birani* des Macassaves. Cette espèce n'est pas déterminée.

BURASIA. (Voyez BOURASANA.)

BURCARDIA. Scopoli & Schreber ont substitué ce nom à celui de *piriquita*, sous lequel Aulter désigne un genre de plantes de Cayenne, qui a beaucoup d'affinité avec la violette. Quelques auteurs plus modernes l'ont depuis réuni aux *turnera*. Duhamel l'a employé pour le *colliarpa americanus*. Nous pensons que le genre d'Aublet doit être conservé. (Voyez TURNÈRE & les observations.)

BURGSDORFIA. C'est un genre établi par Mench, adopté dans la *Flore de Portugal* de MM. Hoffmannsegg & Link, qui a pour type le *sideritis romana* Linn. (crapaudine), & auquel on donne pour caractère essentiel :

Un calice fermé par des poils après la floraison; la fleur supérieure entière, large, ovale; l'inférieure à quatre dents; point de bractées; les fleurs axillaires.

Ce genre diffère par son calice & le manque de bractées des *sideritis*, ceux-ci ayant les divisions du calice toutes égales, son orifice nu pendant la maturation; les verticilles entourés de bractées. (Voyez CRAPAUDINE, Suppl.)

BURMANNIA. (Voyez BURMANE, & Illustr. Gen. tab. 215, *burmannia aitcha*, n°. 1.)

BURSAIRE épineuse. *Bursaria spinosa*. Cavan.

Bursaria caule fruticoso, spinoso; foliis emarginatis, floribus racemosis. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 309, tab. 350.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, établi par Cavanilles, & dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée. Il offre pour caractère essentiel :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales insérés sur un réceptacle conique; capsule comprimée, divisée en deux coques; chaque coque à deux ou trois valves; plusieurs semences réniformes.

Petit arbrisseau armé d'épines, garni de petites feuilles alternes, retrécies en forme de cornes à

leur base, entières, échancrées à leur sommet; les épines feuillées, folitaires, situées dans les aisselles des feuilles. Les fleurs sont disposées en grappes au sommet des rameaux. Leur calice est fort petit, inséré, à cinq découpures aiguës; la corolle composée de cinq pétales linéaires, insérés sur un réceptacle conique qui s'élève du fond du calice; cinq filaments subulés, de la longueur des pétales, alternes avec eux, insérés sur le même réceptacle; les anthères pendantes, ovales, en cœur; un ovaire libre, ovale, placé sur le réceptacle; un style court, subulé, terminé par un stigmate simple. Le fruit consiste en une capsule fort petite, comprimée, ovale, en cœur, assez semblable, pour la forme & la grandeur, à celle du *Chaspi bursa pastoris*, se divisant, dans son milieu, en deux lobes ou deux coques distinctes; chaque coque partagée en deux ou trois valves, renfermant chacune trois ou quatre semences comprimées, réniformes, résineuses.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, auprès du port Jackson. *H* (Cavan.)

BURSARIA. (Voyez BURSAIRE, Suppl.)

BURSERIA. (Voyez GOMART.)

BUSSEROLE ou BOUSSEROLE. On donne ce nom, dans les Alpes, à une espèce d'arbrusier à tige rampante & traçante: c'est l'*Arbutus uva ursi* Linn.

BUTEA. Roxb. Corom. (Voy. RUDOLPHE.)

BUTOMUS. (Voyez BUTOME, & Illustr. Gen. tab. 590. — Flor. dan. tab. 604. — Curtis, Lood. Ic. — English. Bot. tab. 651.) En donnant à cette plante, l'une des plus belles de celles qui embellissent le bord de nos rivières, le nom de *butomus*, on a employé une explication dont Théophraste s'étoit servi le premier, mais qui très-probablement n'est pas appliquée à la même plante. Le *butomus* de Dioscoride & de plusieurs autres qui ont écrit après lui, paroît appartenir plutôt à notre *Sperganium*.

BUTONICA. (Voyez BUTONIC, vulgairement *bonnet carré*. Lam. Ill. Gen. tab. 590.)

BUTTON-TREE: nom anglais, signifiant *arbre bouton*, donne par les colons de la Jamaïque au *Conocarpus tetralix* Linn.

BUTNERIA. Voyez BUTNÈRE, & les Illustrations, tab. 140, fig. 1, *butneria ovata*, n° 2; fig. 2, *butneria verticillata*, n° 4, auxquels il faut ajouter les espèces suivantes:

6. BUTNÈRE cannelée. *Butneria falcata*. Flor. peruv.

Butneria foliis cordato-ovatis, serratis; costâ peristomique aculeatis; pedunculis geminis, 3-5 floris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10.

Arbrisseau à tige anguleuse, à cinq cannelures, munie d'aiguillons recourbés, de feuilles épaisses, pétioles, ovales, en cœur, pubescentes, dentées en scie, terminées par une pointe oblique; des stipules opposées, caduques, subulés; les pédoncules latéraux, à trois ou cinq fleurs, pourvus de bractées; le calice pourpre en dedans, pentagone avant la floraison, à cinq découpures ovales, aiguës, réfléchies; les pétales linéaires, verts à leur base, d'un pourpre-lioncé au sommet; les anthères presque sessiles; les semences ovales.

Cette plante croît au Pérou, & fleurit en juin & en juillet. *H*

7. BUTNÈRE hérissée. *Butneria hirsuta*. Flor. peruv.

Butneria foliis cordatis, acutis, crenatis; costâ peristomique aculeatis; pedunculis congestis, compustis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 10.

Ses tiges sont ligneuses, très rameuses, garnies d'aiguillons sur leurs angles, de feuilles alternes, pétioles, en forme de cœur, crénelées, molles, velues en dessous; les pédoncules latéraux, chargés de plusieurs fleurs presque en ombelles, enveloppées de petites folioles caduques, en forme de collerette; les pétales jaunâtres à leur base, pourpres à leur sommet.

Cette plante croît au Pérou, sur les montagnes des Andes. *H*

8. BUTNÈRE herbacée. *Butneria herbacea*. Roxb.

Butneria foliis cordatis, acuminatis, dentatis, glandulosis; caule inermi, herbaceo. Willd. Spéc. Plant. 1. pag. 119. — Roxb. Corom. 1. pag. 18. tab. 29.

Ses tiges sont droites, herbacées, tétragones, sans épines, garnies de feuilles alternes, pétioles, ovales, en cœur, acuminés, dentés, dépourvus de glandes, longues de trois à quatre pouces, sur deux ou trois de large, munies de petites stipules réfléchies; les pédoncules en forme de petits rameaux axillaires, plus courts que les feuilles, terminés par trois fleurs en ombelles; d'autres plus petites, axillaires; le calice réfléchi; la corolle petite; le fruit un peu hispide, presque globuleux, à cinq côtes; autant de loges monospermes.

Cette plante croît sur les montagnes, au Comandé.

9. BUTNÈRE à feuilles de catalpa. *Butneria catalpifolia*. Jacq.

Butneria

Butneria foliis cordatis, integerrimis; caule scan-
dente, inerit. Jacq. Schoenbr. 1. pag. 21. tab. 46.

Arbrisseau grimpant, sans épines, pourvu de feuilles grandes, en cœur, entières, acuminées; les pédoncules rameux, axillaires, presque paniculés, un peu plus longs que les pétioles; le calice à cinq découpures lancéolées, colorées; les pétales un peu plus longs que le calice; l'ovaire arrondi, hérissé; le stigmate en tête, à cinq lobes.

Cette plante croît dans les environs de Caracas. *h*

BUTUA. Ce nom est donné aux mêmes plantes qui portent celui de *pareira brava*. Suivant Aublet, le *pareira* de Cayenne est son *abuta rufescens*, tab. 250. (*Voyez MENISPERME*, n°. 19.) Le *pareira*, plus généralement connu dans l'usage médical, est le *cissampelos pareira*. (*Voy. PAREIRA.*) Ces deux plantes appartiennent à la famille des ménispermées. Il ne faut pas les confondre avec l'*abutu* que décrit Loureiro dans la *Flore de la Cochinchine*, genre voisin des orties. (*Voyez ABUTUA*, Suppl.)

BUTUMBO: nom brame du *per-tumba* des Malabares (Rheed. *Hort. malab.* 9, p. 87, tab. 45): c'est une espèce de carmantine (*Justicia echinoides* Linn.).

BUXBAUMIA. (*Voy. BUXBAUME*, & Illustr. Gen. tab. 872, fig. 1, *buxbaumia aphylla*, — Hedw. Fund. tab. 9, fig. 52, tab. 3, fig. 10, auquel il faut ajouter.)

1. **BUXBAUME** feuillée. *Buxbaumia foliosa*. Linn.

Buxbaumia acanthis, corollâ subsessili, foliis cinctis. Linn. jun. Dissert. Musc. pag. 33. tab. 1. fig. 4. — Hedw. Fund. tab. 9. fig. 51. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 301. — Lam. Ill. tab. 872. fig. 2. — Dillen. tab. 32. fig. 13.

Buxbaumia sessilis. Smied. Diss. pag. 26. fig. 1.

Bryum hallerianum, Neck. Meth. 233. — *Bryum phascoloides*, Jacq. Collect. 2. pag. 220.

Phascum hallerianum. Pollich, Pal. n°. 974. — *Phascum maximum*. Lighf. Scot. 2. pag. 693. — *Phascum montanum*. Hudf. Angl. 2. pag. 466. — Hall. Helv. n°. 1725. tab. 46. fig. 3.

Ses racines produisent une petite touffe de feuilles, dont les inférieures sont linéaires, obtuses; les supérieures lancéolées, diaphanes à leurs bords, traversées par une nervure prolongée en une pointe aiguë. Ces feuilles forment le pétioler. La capsule est sessile, ovale, un peu ventrue, presque droite, légèrement oblique à son sommet; les dents du périgone très-caducues.

Botanique. Supplément. Tome I.

Cette plante croît le long des chemins ombragés, dans les bois. (*V. v.*)

M. Palisot de Beauvois propose de substituer le nom de *saccophore* à celui de *buxbaume*; mais il n'en a pas encore donné la raison.

BUZ: nom égyptien du roseau. La grande espèce ordinaire (*arundo donax* Linn.) est nommée *buq-haghi*, suivant Forskhal.

BUZA: boisson faite dans l'Arabie avec l'orge, au rapport de Forskhal.

BUZEIDEN, BUZIDAN, BUZEIS ou BUZIS. Dalechamp attribue ce mot arabe à l'*orchis palmata* Linn., aussi nommé *palma Christi* par Matthioli, & *satyrium boslicum* par Dodonée.

BYBO: nom donné aux Indes, suivant Clusius, à l'acajou des colonies (*casavium* Linn.), qui est l'acajou du Brésil.

BYSSE, BYSSUS. Les Anciens ont donné le nom de *byssus* à différentes substances du règne végétal, qui servoient à fabriquer des étoffes recherchées par leur finesse, par leur couleur, & par la rareté de la matière dont elles étoient tissées. Il seroit très-difficile aujourd'hui de désigner les végétaux qu'ils employoient pour cet objet, ne nous en ayant donné aucune description. Le byssus de l'Elide & celui de Judée étoient particulièrement en réputation. Ce dernier avoit, selon les historiens qui en parlent, la couleur & l'éclat de l'or. Les Modernes ont appliqué le nom de *byssus* à des filaments dont se servent les animaux de plusieurs coquilles bivalves pour se fixer aux rivages.

BYSSUS. Les caractères de ce genre ne sont encore qu'imparfaitement déterminés, & les espèces qui doivent rigoureusement le composer, sont la plupart incertaines. Les unes sont pulvérulentes, les autres filamenteuses; ce qui peut faire déjà soupçonner qu'elles devraient être séparées, & placées dans des genres différents: aussi M. Persoon a déjà essayé d'établir, pour les *byssus* connus & plusieurs autres, les genres *dematium*, *racodium*, *himantia*, *mesenterica*, &c. (*Voyez ces mots, Suppl.*) Jusqu'alors il n'a pas encore été possible d'y distinguer aucun organe analogue à ceux de la reproduction des autres plantes. Il est très-probable, selon moi, qu'il n'en existe pas, & que ces plantes ont un mode particulier pour se reproduire, une sorte de prolifération, comme on le remarque même dans les plantes plus parfaites, & qui produisent des semences; elles ne se montrent que par l'humidité, durent plus ou moins long-temps, se dessèchent dès qu'elles sont frappées par le soleil, & ne laissent après elles que des taches noires, surtout celles qui croissent sur les pierres. Il est

C c c c c

beaucoup de champignons qui ont à leur naissance l'appétit d'un byssus, & qu'il est facile de confondre lorsqu'on n'en suit pas le développement.

M. de Lamarck a fait graver dans les *Illustrations des Genres*, tab. 881, fig. 1, le *byssus velutina*, n°. 5. On en a fait depuis le *vaucheria terrestris*. (Voyez VAUCHERIE.) Fig. 2, *byssus physophora*, n°. 4; fig. 3, *byssus septica*, n°. 13; fig. 4, *byssus aurea*, n°. 6. On peut ajouter au byssus filamenteux les espèces suivantes :

18. BYSSUS des murailles. *Byssus parietina*.

Byssus flavescens aut alba, tenera, parietibus adpressa; filamentis à centro radiantibus, in ramis tenuissimos, innumeros divisis. Decand. Synopf. 13, & Flor. franç. 2. pag. 66.

p. *Byssus parietina*, var. *argentea*. Decand. l. c.

Mesenteria argentea. Persl. Synopf. Fung. 606.

Corallifungus argenteus, omentiformis. Vaillant, Bot. Paris, fig. 41, tab. 8, fig. 1.

Ce byssus se présente sous forme de pliques arrondies, d'un ou de deux pieds & plus de diamètre, appliquées sur les murailles & les plafonds des maisons humides. Leur couleur est d'un jaunepâle. Les filaments partent souvent d'un centre commun, & s'étendent en rayons divergens; ils sont très-ramifiés, très-ferres, & forment une membrane papyracée. La variété p est d'un blanc-argenté.

19. BYSSUS blanc. *Byssus candida*. Hudf.

Byssus candida, tenera, apice subplumoso, dilatato. Hudf. Angl. pag. 601. — Dill. Musc. tab. 1. fig. 15. A.

Himantia candida. Persl. Synopf. Fung. pag. 704.

Il se trouve sur les feuilles mortes ou sur les bois tombés à terre; il est d'un beau blanc & d'un aspect soyeux. Ses filaments sont branchus, très-ramifiés à leur sommet, quelquefois formant une membrane très-mince, papyracée, ou bien réunis en faisceaux semblables à des nerfures.

20. BYSSUS jaunâtre. *Byssus flavescens*. Decand.

Byssus flavescens, tenera, adpressa, ramis pelluculam tenuem ferè constitutis. Decand. Synopf. 13, & Flor. franç. 2. pag. 67.

Cette espèce croît sur les vieux troncs humides & sur les feuilles tombées à terre dans les forêts; elle est d'un jaune-pâle. Ses filaments, qu'on n'aperçoit bien que sur les bords de la croûte, sont cylindriques, très-menus, appliqués sur le tronc, soudés les uns avec les autres, tantôt sous forme de nerfures rameuses ou proéminentes, tantôt sous la forme d'une membrane mince & diversement lobée ou déchirée. (Decand.)

21. BYSSUS alongé. *Byssus elongata*. Decand.

Byssus alba, filamentis tenuissimis, in fasciculos subcylindricos, ramosos contextis. Decand. Synopf. 13, & Flor. franç. 2. pag. 67.

« Cette plante, dit M. Decandolle, est de couleur blanche; elle offre des filaments très-menus, entre-croisés & réunis en faisceaux alongés, arrondis, rameux, longs de deux ou trois pieds & plus. Ces faisceaux de filaments ont, pendant la vie de la plante, l'apparence de la crêpe fourrée. Après leur dessiccation ils prennent un aspect cotonneux. Elle a été découverte par M. Lheritier dans les caves de l'Observatoire. »

22. BYSSUS géant. *Byssus gigantea*. Todd.

Byssus albidula, filamentis tenuissimis, in immensum pannum fomitos amulum contextis. Decand. Synopf. 13. — *Xylostroma giganteum*. Todd. Meckl. l. pag. 16. tab. 6, fig. 51.

Racodium xylostroma. Persl. Synopf. Fung. p. 702.

Ce byssus est blanchâtre. Ses filaments entre-croisés forment une espèce de feutre ou d'amadou serré & coriace, qui croît dans l'intérieur des arbres, s'insinue entre leurs fentes, & y occupe un espace très-étendu. S'il est vrai qu'on y ait découvert des semences sous la forme de globules épais, cette plante doit être placée dans un autre genre. Je ne les y ai jamais vus. (V. v.)

23. BYSSUS des pins. *Byssus pinastri*. Schleich.

Byssus nigrescens, filamentis intertextis, lanam flosculum referentibus. Decand. Synopf. 13.

On le trouve sur les branches de sapins, qui sont restées long tems couvertes par la neige; il prend une couleur noirâtre. Sa substance est composée de filaments rameux, entre-croisés, représentant un flocon de laine.

24. BYSSUS des rochers. *Byssus rupestris*. Dec.

Byssus nigrescens, filamentis subgelatinosis, intertextis, pannum referentibus. Decand. Synopf. 13.

Sa couleur est noirâtre; il ressemble à un morceau d'étoffe composée de filaments ferrés, entre-croisés, gélatineux. Il croît à l'ombre, sur les rochers humides.

25. BYSSUS entre-mêlé. *Byssus intertexta*. Dec.

Byssus rubiginosa, filamentis intricatis, hinc indutuberculis rotundatis interspersis. Decand. Synopf. 13.

Dematium fluposum. ? Patison, Synopf. Fung. pag. 696.

Il est d'un fauve-jaunâtre, couleur de rouille; il croît dans les souterrains de l'Observatoire de Paris, en touffes de diverses formes. Ses filaments

Tout menus, cylindriques, entre-mêlés : vus au microscope, ils offrent des tubercules arrondis. (Decand.)

26. *Byssus* rouge. *Byssus rubra*. Decand.

Byssus cinnabarina, *filamentis laxis*. Decand. Synops. 13, & Flor. franc. 2. pag. 68.

Dematium cinnabarinum. ? Pers. Synops. Fung. pag. 697.

Cette espèce croît sur les bois à demi pourris ; elle est d'un rouge de laque. Ses filaments sont longs, déliés, très-distincts, même à la simple vue, & paroissent un peu entre-croisés. Elle diffère du *byssus purpurea* & *phosphorea* en ce qu'elle ne forme pas une croûte poudreuse. On la trouve sur les bois à demi pourris. (Decand.)

BYSTROPOGON. Genre de plantes de la famille des labiées, établi par Lhéritier, & adopté par la plupart des botanistes qui ont écrit après lui ; il est composé en partie d'espèces enlevées à quelques autres genres, aux *nepeia*, aux *mencha*, aux *melissa*, &c. Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice barbu à son orifice, terminé par cinq dents subulées ; la lèvre inférieure de la corolle à deux lobes, la supérieure à trois ; les étamines écartées aux bords.

Les principales espèces à rapporter à ce genre sont :

1°. *Bytropogon plumosum*. Lhérit. (*mentha plumosa*, n°. 20.) Le *bytropogon origanifolium* de Lhéritier ne diffère de cette espèce que par ses

feuilles très-entières, d'un blanc de neige en dessous.

2°. *Bytropogon canariense* Lhérit., qui est le *mentha canariensis*, n°. 19.

3°. *Bytropogon (punctatum)*, *pedunculis dichotomis*, *floribus capitis* ; *foliis ovatis*, *dentatis*, *glabris*, *punctulatis*. Lhérit. Sert. Angl. pag. 20. n°. 7. Ses feuilles sont légèrement ponctuées, ovales, dentées ; les pédoncules fourchus ; les fleurs en tête ; les découpures du calice point subulées. Elle croît à l'île de Madère.

4°. *Bytropogon (sidaefolium)*, *paniculis laxissimis* ; *pedunculis verticillatis*, *filiformibus* ; *foliis cordatis*. Lhérit. Sert. Angl. pag. 19. n°. 1. Elle croît au Pérou. Ses feuilles sont en cœur ; les panicules très-lâches ; les pédoncules verticillés, filiformes.

5°. *Bytropogon (dentatum)*, *foliis ovatis*, *hirsutis*, *seratis* ; *verticillis florum hispidis*. (N.) Espèce nouvelle du Pérou, que j'ai observée dans l'herbier de M. de Jussieu. Ses feuilles sont ovales, velues, dentées en scie ; les dentelures courtes, très-aiguës ; les fleurs réunies en verticilles velus, très-fermés.

Cavanilles fait du *melissa cretica* Linn., & D'Al. n°. 5, le *nepeia marifolia*. Cette espèce paroît devoir être placée parmi les *bytropogon*, ayant ses calices pileux à leur orifice.

Plusieurs autres espèces, rapportées d'abord aux *bytropogon*, en ont été exclues pour être placées parmi les *hyptis*. (Voyez ce genre, Suppl.)

BYTTNERIA. (Voyez BUTTNER.)

ADDITIONS.

Nota. L'impression de ce volume se terminoit lorsque nous avons reçu un nouvel ouvrage de Robert Brown, imprimé à Londres, sous le titre de *Prodromus Flora Nova Hollandia*, etc. vol. I. Nous avons cru devoir mentionner ici les nouveaux genres qui s'y trouvent sous les lettres A et B, et rappeler en même tems quelques articles qui nous étoient échappés.

ABELICEA. Chuf. Hist. 2. pag. 302. — *Pseudofantalum creticum*. C. Bauh. Pin. 393. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 490. — Smith, Transf. Linn. Lond. vol. 9.

Cet arbre, mentionné par Lécuse, & qui croît naturellement sur les hautes montagnes de l'île de Crète, ne nous est encore connu que par la description que Bellus en a donnée dans une lettre adressée à Lécuse. « C'est, dit-il, un grand arbre, d'un très-bel aspect, à tige droite, chargée d'un grand nombre de rameaux, dont les feuilles ressemblent à celles de l'Alatern, mais plus arrondies, plus profondément dentées en scie. Son fruit est de la grosseur d'un grain de poivre, d'une forme presque ronde, d'un vert-noirâtre. Son bois est dur, un peu odorant; on en fait des solives & des poutres. Il paroît avoir été inconnu aux Anciens, à moins que ce ne soit l'*ulmus montana* de Théophraste; mais celui-ci a les feuilles beaucoup plus grandes & bien moins profondément dentées. » Il paroît que M. Smirh est porté à soupçonner que l'*obelica* a de grands rapports avec l'*ulmus polygama* (plumera Mich.). Tournesfort a donné la description d'un micocoulier (*celtis*), qui me paroît convenir davantage à l'*abelica*. Tournesfort l'a observé sur les hautes montagnes crétaïques, dans le Levant. Cet arbre a été mentionné dans ce Dictionnaire parmi les *celtis*. (Voyez MICOCOULIER de Tournesfort, n°. 4.) La forme des feuilles paroît bien être la même que celle indiquée par Bellus; les fruits également arrondis, & à peu près de la même grosseur. A la vérité, ils sont jaunes, & brunissent en mûrissant dans le *celtis* de Tournesfort; mais il ajoute que le noyau est vert. Bellus dit que les fruits de son *abelica* sont d'un vert-noirâtre; d'un autre côté, l'arbre de Tournesfort ne s'élève pas plus haut qu'un prunier, mais plus touffu. Ces légères différences n'affoiblissent que médiocrement mes conjectures.

ABILDGAARDIA. Vahl, Enum. & Brown, Nov. Holl. (Voyez SOUCHET, Suppl.) Ce genre a été établi par M. Vahl pour quelques espèces de *cyperus* Linn.

ABRUS PRECATORIVS. Illustr. tab. 608. fig. 1. La figure 2 est une espèce de Cayenne, communiquée par M. Richard à M. de Lamarck. Elle me paroît être le *glycine phaeoloides* de Swartz, le

dolichos pyramidalis de ce Dictionnaire, n°. 14. Ses semences, semblables à celles de l'*abrus*, sont plus ovales, un peu comprimées; la tache noire plus grande, ainsi que la cicatrice, qui de plus est munie d'une petite bosse en saillie à son sommet. (Voyez DOLICH pyramidal.)

ACIANTHE. *Acianthus*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des orchidées, établi par Brown, qui a des rapports avec les *epipactis* de Swartz, qui comprend des herbes de la Nouvelle-Hollande, dont les racines sont garnies de bulbes; les tiges simples, à une feuille en cœur; les fleurs disposées en grappes ou quelquefois solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle à six pétales; les trois extérieurs aristés, les deux intérieurs plus petits; l'inférieur en levre, plus court que les autres, très-entier, sans appendice à son disque; deux callosités à sa base; une colonne demi-cylindrique à sa partie inférieure, sans oreillette au sommet; une anthère à deux loges; le pollen divisé en quatre paquets dans chaque loge.

1. *Acianthus (fornicatus), floribus racemosis, aristis perianthio quadruplo brevioribus, foliis interioribus erectiusculis, labello longitudinaliter papuloso, columnâ inclusâ.* Brown, Nov. Holl. p. 321.

2. *Acianthus (exsertus), floribus racemosis, aristis perianthio quadruplo brevioribus, foliis interioribus horizontaliter reflexis, labello apice papuloso, columnâ exsertâ.* Brown, l. c.

3. *Acianthus (caudatus), scapo uni fere bifloro, aristis longissimis, foliis marginibus undulatis.* Brown, l. c.

Selon Brown, l'*epipactis reflexa* de Labillardière, Nov. Holl. 2, pag. 60, tab. 211, fig. 1, a de grands rapports avec ce genre.

ACIANTHUS. (Voyez ACTANTHE.)

ACROTICHE. Brown, Nov. Holl. pag. 547. Ce genre se rapproche tellement des *syphelia*, que j'ai cru devoir l'y renvoyer pour former une des divisions de ce genre avec quelques autres genres nouveaux, établis par Brown. (Voy. SYPHYLIE, vol. VII, & Suppl.)

ACTINOCARPUS. Brown, Nov. Holl. p. 342. Ce genre est le même que le *damafonium* de Justieu, qui est une division du genre *alisma* de Linne. (Voyez FLUTEAU, Suppl.)

ADENOSMA à fleurs bleues. *Adenosma carulea*. Brown.

Adenosma pubescens, glandulosa, spicis foliatis. (N.) Brown, Nov. Holl. pag. 442.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monopérales, irrégulières, de la famille des acanthes, qui a des rapports avec les acanthes, établi par Brown pour une plante de la Nouvelle-Hollande, qui a pour caractère essentiel :

Un calice à cinq découpures ; une corolle à deux lèvres ; la supérieure entière ; l'inférieure à trois lobes égaux ; quatre étamines didynames ; les anthères conniventes ; un stigmate élargi ; une capsule ovale, prolongée en bec, s'ouvrant en deux parties.

C'est une plante herbacée, pubescente, couverte de glandes, & répandant une odeur de menthe. Ses fleurs sont, ou axillaires, ou disposées en un épi feuillé. Le calice est hérissé de poils articulés, à cinq découpures ; la supérieure plus grande, accompagnée de deux bractées ; la corolle bleue, à deux lèvres, la supérieure entière ; l'inférieure à trois lobes égaux. La capsule s'ouvre en deux parties, & porte les semences à ses sutures internes.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. (Brown.)

ÆGIALITIS. Brown, Nov. Holl. pag. 426. (Voyez ÆGIALITE.)

ÆGOPOGON. Willd. (Voyez ÈGOPOGON, Suppl.)

AGASTACHYS. Transf. Linn. Lond. vol. 10. pag. 158, & Brown, Nov. Holl. pag. 371. (Voyez les PROTEES, Suppl.)

AGATHIS LORANTHIFOLIA. Transf. Linn. Lond. vol. 8. — *Pinus dammara*. Lamb. (Voyez PIN, Suppl.)

AGROSTIS LAXIFLORA, pag. 253. Suppl. n°. 62. D'après l'inspection de l'herbier de Michaux, j'ai acquis la certitude que cette plante étoit la même que son *trichodium laxiflorum*. (Voyez TRICHODE.)

ALEPYRUM. Brown, Nov. Holl. pag. 253. (Voyez VAROQUIER, Suppl. *Centropus* Labill.)

ALLANTODIA. Brown, Nov. Holl. (Voyez POLYODE, Suppl.)

ALSOPHILA. Brown, Nov. Holl. (Voy. POLYODE, Suppl.)

ALYXIA. Brown, Nov. Holl. pag. 469. (Voy. GYNOPOGON, Suppl.)

AMPHIPOGON. Brown, Nov. Holl. (Voyez AMPHIPOGONE.)

AMPHIPOGONE. *Amphipogon*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *stipa*, & qui comprend des herbes exoriques à l'Europe, disposées en gazon, à tiges fasciculées ; les feuilles seracées ; les fleurs en épi allongé ou en tête.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice unilobre, à deux valves ; l'extérieure triside ; l'inférieure bispide ; les divisions terminées par une arête seracée ; la corolle à deux valves presques égales ; trois étamines ; deux styles.

ES P È C E S.

* *Èpis en tête ; les fleurs extérieures stériles, verticillées, en forme d'involucure ; les valves du calice hérissées.*

1. *Amphipogon (laguroides)*, capitulo globoso, glumis hispidis, pilis basi dilatatis, valvula exteriori acumine suo duplo longiore. Brown, Nov. Holl. pag. 175.

2. *Amphipogon (turbatus)*, capitulo obovato, glumis villosis, villis basi simplicibus, valvula exteriori acumine suo vix longiore. Brown, l. c.

* * *Èpis oblongs ; valves du calice glabres.*

3. *Amphipogon (strictus)*, glumis ciliatis, integris, perianthio glabro brevioribus ; aristis solisque striatis. Brown, l. c.

4. *Amphipogon (debilis)*, glumis trifidis, perianthio glabro brevioribus ; aristis striatis, foliis laxiusculis. Brown, l. c.

5. *Amphipogon (avenaceus)*, glumis acuminatis, integris, perianthio sericeo longioribus ; aristis patentibus. Brown, l. c.

Toutes ces plantes sont originaires des côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande. Celle n°. 3 croît au port Jackson.

ANADENIA. Transf. Linn. Lond. vol. 10. pag. 166, & Brown, Nov. Holl. pag. 374. (Voyez les PROTEES, Suppl.)

ANARTVIA. Brown, Nov. Holl. (Voyez VIRAGINE, Suppl.)

ANDERSONIA. (Voyez ANDERSONE.)

ANDERSONE. *Andersonia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des bruyères (Juss.), des épacridées (Brown), qui a des rapports avec les *poiretia* Cavan., *Sprengelia* Smith; il comprend des arborescents de la Nouvelle-Hollande, à feuilles à demi vaginales, en capuchon à leur base; les fleurs terminales, en épi ou solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à cinq divisions, accompagné à sa base de deux ou de plusieurs bractées imbriquées; une corolle monopétale, de la longueur du calice, à cinq divisions barbues à leur base; cinq étamines attachées au réceptacle, ainsi que cinq écailles quelquefois conniventes; un style; une capsule contenant plusieurs semences adhérentes à des placentas courtes & centrales.

Observations. Ce genre diffère des *poiretia* ou *Sprengelia* en ce que, dans ce dernier, la corolle est en roue, très-glabre, divisée, presque jusqu'à sa base, en cinq pétales; que le réceptacle n'a point d'écailles intérieures.

ESPÈCES.

* Fleurs en épi; calices accompagnés de deux bractées.

1. *Andersonia* (*Sprengelioides*), *foliis patulis, acuminato-plano*. Brown, Nov. Holl. pag. 554.

2. *Andersonia* (*parvifolia*), *foliis adpressis, acuminato-triquetro*. Brown, l. c.

** Calices accompagnés de plusieurs bractées; les fleurs situées à l'extrémité de rameaux courts.

3. *Andersonia* (*cœrulea*), *foliis modicè patentibus, novellis calicibusque extris pubescentibus*. Brown, l. c.

4. *Andersonia* (*iquattroia*), *foliis squarrosis, divaricatis recurvisque, glabris, margine nudis; calicibus stylisque glabris, caule erecto*. Brown, l. c.

5. *Andersonia* (*depressa*), *foliis squarrosis, divaricatis recurvisque, pubescentibus, margine ciliatis; calicibus glabris, stylis medio pilosis, caule depressa*. Brown, l. c.

6. *Andersonia* (*micrantha*), *foliis adpressis, stylis infra medium pubescentibus*. Brown, l. c.

ANEILEMA. Brown, Nov. Holl. pag. 270. (Voyez COMMELINE, Suppl.)

ANGUILLARIA. Brown, Nov. Holl. pag. 273. (Voyez MELANTHIUM, Suppl.)

ANISACANTHA. Brown, Nov. Holl. p. 420.

Ce genre est si rapproché de celui des *Sclerolana* du même auteur, que je ne crois pas qu'on puisse l'en séparer, quoique son calice n'ait que quatre divisions au lieu de cinq, & que les étamines varient de trois à quatre. Les épines dorsales du calice peuvent-elles être admises comme caractère générique? (Voyez SCLEROLANA, Suppl.)

ANISOMÈLE. *Anisomeles*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées, qui a de grands rapports avec les *ajuga* & les *seuerium*, dont elles diffèrent principalement par la levre supérieure de la corolle, fort petite, très-entière. Ce genre comprend des herbes pubescentes de la Nouvelle-Hollande, dont les feuilles sont crénelées, les fleurs verticillées, accompagnées de petites bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, glanduleux, à six ftries, à cinq dents; une corolle à deux lèvres; la supérieure petite, très-entière; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu échancré; quatre étamines adynamas, saillantes, ascendantes; les anthères des deux plus courtes à deux lobes; celles des plus longues moitié plus petites; les semences lisses.

ESPÈCES.

1. *Anisomeles* (*moschata*), *foliis ellipticis cauleque cinereo-pubescentibus; verticillis paucifloris, calicibus cinereo-viridibus, glandulis manifestis*. Brown, Nov. Holl. pag. 503.

2. *Anisomeles* (*inodora*), *foliis ellipticis, glabrisculis, subius punctatis; verticillis remotis, calicibus viridibus, glandulis manifestis*. Brown, l. c.

3. *Anisomeles* (*salvifolia*), *incano-tomentosa, foliis lanceolatis, supra mollioribus, levibus, fectis rugosis; verticillis multifloris, calicibus glandulis tomentose-pulvis*. Brown, l. c.

ANISOMELES. (Voyez ANISOMÈLE.)

ANISOPOGON. (Voyez ANISOPOGONE.)

ANISOPOGONE avénacée. *Anisopogon avenaceus*. Brown, Nov. Holl. pag. 176.

Anisopogon foliis involutis, panicula effusa, calicibus simplicibus. (N.)

Cette plante, dont Brown a fait un genre particulier, a le port d'une avoine, & me parait se rapprocher de ces espèces dont Persoon a formé le genre *trisetum*. (Voyez ce mot, & AVOINE, Suppl.)

Ses tiges sont très-simples, hautes de trois pieds, garnies de feuilles alternes, roulées sur elles-mêmes à leurs bords; l'orifice de leur gaine

muni d'une membrane ciliée. Les fleurs sont disposées en une panicule très-étalée. Chacune d'elles offre :

Un calice pétaicellé, uniflore, à deux valves ; la valve extérieure un peu foyeuse, roulée en cylindre, terminée par deux pointes latérales, sétacées ; une arête corse, dorsale, légèrement articulée ; la valve intérieure plus longue, muetue ; la corolle membraneuse, composée de deux valves lâches, égales ; trois étamines ; deux styles.

Cette plante croît au port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande. (Brown.)

ANTHOBOLUS. Brown, Nov. Holl. pag. 357. Ce genre ne me paroît pas devoir être séparé de celui des *cyris*. (Voyez ROUVET, Suppl.)

ANTHOTIE naïne. *Anthotium glabrum*. Brown.

Anthotium subaeale, foliis teretibus, basi dilatatis ; scapis indivisis ; floribus fasciculatis, bracteatis. (N.) Brown, Nov. Holl. pag. 582.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des campanulacées (Juss.), des goodénoïdiées (Brown), qui a des rapports avec les *velletia*, établi par Brown pour une herbe de la Nouvelle-Hollande, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle irrégulière ; le tube fendu longitudinalement ; la lèvre supérieure du limbe auriculée à son bord intérieur ; cinq anthères adhérentes ; un ovaire adhérent avec le calice, à deux loges polyspermes ; un stigmate en godée ; une capsule....

Plante basse, très-glabre, pourvue d'une tige très-courte ; les feuilles toutes radicales, presque cylindriques, un peu élargies à leur base ; il s'élève plusieurs hampes ou pedoncules très-simples, érales, soutenant des fleurs ramassées en faisceau, accompagnées de bractées foliacées. Le calice est adhérent avec l'ovaire, partagé en cinq découpures à son limbe ; la corolle un peu violette, irrégulière, à cinq découpures inégales ; les anthères fortement adhérentes ; le stigmate muni d'un godet glabre, en forme d'enveloppe. On distingue une variété de cette plante, une fois plus grande sans toutes ses parties.

Cette plante croît sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande. (Brown.)

ANTHOTIUM. (Voyez ANTHOTIE.)

APHELIA. Brown, Nov. Holl. pag. 211. (Voyez VAROQUIER, Suppl. *Cestrospiza* Labill.)

ARTHROPODIUM. Ce genre, établi par Brown, Nov. Holl. pag. 276, appartient aux an-

thericum, & doit y être réuni ; il n'en diffère que par les anthères, insérées dans les filaments par une base échancrée. (Voyez PHALANGÈRE, Suppl.)

ARTHROSTYLIS. Brown, Nov. Holl. (Voyez SOUCHET, Suppl.)

ASTELIA. (Voyez ASTILIE.)

ASTILIE des hautes montagnes. *Astelia alpina*. Brown.

Astelia foliis stricis, utrinque sericeis ; racema infra diviso, racemulis paucifloris ; baccis ovalibus, unilocularibus ; perianthiis separatis. Brown, Nov. Holl. pag. 291.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, polygames, diques, établi par Brown, qui se rapproche de la famille des juncs, & a quelques rapports avec les *ailandias* ; il a pour caractère essentiel des fleurs hermaphrodites, & d'autres mâles ou femelles.

Une corolle persistante, divisée en six jusqu'à sa moitié ; six étamines, stériles dans les fleurs femelles ; trois stigmates ; point de style ; une baie à une ou à trois loges polyspermes.

Cette plante a le port d'un *ailandia* ; elle est parasite, & croît sur le tronc des arbres. Ses racines sont fibreuses ; les feuilles radicales, roides, imbriquées sur trois rangs, linéaires-lancéolées ou ensiformes, saillantes en carène sur le dos, parsemées à leurs deux faces de poils couchés, laineux & foyeuses à leur base ; les feuilles caulinaires presque nulles ; les tiges très-courtes ; les fleurs petites, foyeuses en dehors, disposées en grappes paniculées, quelquefois solitaires, pédicellées, munies d'une bractée à leur base. Les baies sont ovales, à une seule loge, contenant plusieurs semences disposées sur trois placenta, le long des parois internes de la baie.

Cette plante croît dans l'île Van-Diemen. (Brown.)

Le *melanthium pumilum* de Forster, Gœrt. 9, pag. 30, tab. 6, paroît devoir être rapporté à ce genre, d'après les observations de Brown. Ses tiges sont très-courtes, ramassées en gazon ; ses feuilles roides, lancéolées, barbuées à leur base d'une à trois ou quatre fleurs blanches ; leurs découpures lancéolées, réfléchies & en capuchon à leur sommet ; point de style, trois, quelquefois six stigmates. Cette plante croît à la terre de Feu. x

ASTROLOMA. Brown, Nov. Holl. pag. 538. Ce genre doit être réuni aux *syphelia*, ainsi que les *ventenaria* de Cavanilles. (Voyez STYPHELIE, vol. VII, & Suppl.)

ATHEROSPERMA. C'est par erreur que ce

genre a été nommé *antherosperma* à l'article XY-PHALLER.

BALFOUR à feuilles de faule. *Balfouria fuliginea*, Brown.

Balfouria foliis lanceolato-linearibus, sulcatis; cymis triphidis. (N.) Brown, Nov. Holl. pag. 467.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des apocynées, qui a quelques rapports avec les nerium, établi par Brown pour un arbre de la Nouvelle-Hollande, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Une corolle en entonnoir; son orifice couronné par un tube crenelé; les découpures du limbe droites, équidistantes; les anthères sagittées, mucronées, rapprochées contre le stigmate; un style dilaté à son sommet; le stigmate anguleux; dix petites écailles à la base interne du calice.

C'est un arbre d'environ quinze à dix-huit pieds de haut, glabre sur toutes les parties, dont les rameaux sont garnis de feuilles opposées, linéaires-lancéolées, courbées en faucille; de petites glandes en forme de dents à la base interne des pétioles. Les fleurs sont opposées en cimes trifides, latérales & terminales. Chacune d'elles offre un calice à cinq découpures; une corolle infundibuliforme; son orifice couronné par un petit tube crenelé; les découpures du limbe droites, ayant leurs côtés égaux; cinq étamines insérées à l'orifice du tube; les anthères sagittées, mucronées, réunies autour du stigmate; un ovaire libre, à deux loges, surmonté d'un style filiforme, élargi à son sommet; le stigmate anguleux; dix petites écailles à la base interne du calice, au dehors de la corolle. Le fruit n'a point été observé.

Cette plante croît sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. h (Brown.)

BALFOURIA. (Voyez BALFOUR.)

BELIS. Transf. Linn. Lond. vol. 8. (Voyez CHLANE, Suppl.)

BELLENDENA. Transf. Linn. Lond. vol. 10. pag. 166, & Brown, Nov. Holl. pag. 374. (Voyez les PROTÉES, Suppl.)

BÆOMYCES. Ach. & Pers. (Voyez LICHEN, Suppl.)

BOLDEA. M. de Jussieu (*Annales du Muséum de Paris*, vol. 14) propose de substituer ce nom à celui de *ruizia* pour un genre du Pérou, qui avoit déjà été indiqué par Feuillée sous le nom de *boida*.

BREWERIA. (Voyez BRÉWÉRIE.)

BRÉWÉRIE. *Breweria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des liférones, qui diffère bien peu du *bonania* de Petit-Thouars, si ce n'est par le port, par les semences non arillées; il a également des rapports avec le *porana*. Il comprend des herbes de la Nouvelle-Hollande, à tige diffuse, à feuilles entières; les fleurs axillaires, presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; une corolle en entonnoir, plissée; cinq étamines; un style profondément bifide, soutenant deux stigmates en tête; une capsule à deux loges, environnées par le calice non agrandi; aux semences dans chaque loge.

ESPÈCES.

1. *Breweria (linearis), villosa, foliis lanceolato-linearibus, complicatis; stylis aequalibus, basi coarctatis.* Brown, Nov. Holl. pag. 488.

2. *Breweria (media), villosifuscula, foliis lanceolatis, basi obtusis, subcordatis; stylis inaequalibus, ad medium connatis.* Brown, l. c.

3. *Breweria (pannosa), tomentosa, foliis ovatis, subcordatis, pannoso-tomentosis; calicibus inaequalibus; foliolis exterioribus ovatis, subacuminatis; stylis inaequalibus, infra connatis.* Brown, l. c.

BRUNONIA. (Voyez BRUNONIE.)

BRUNONIE. *Brunonia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monopétales, infundibuliformes, dont la famille n'est pas encore bien déterminée, qui comprend des herbes de la Nouvelle-Hollande, à tige très-courte; les feuilles entières, sparsées; les fleurs réunies en une tête hémisphérique.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures, environné de quatre bractées; une corolle infundibuliforme, à cinq découpures; les deux supérieures plus profondes; cinq étamines, placées sur la réceptacle; les anthères conniventes; un ovaire monosperme; le stigmate entouré d'une membrane bifide; un urticule renfermé dans le tube agrandi & auré d'un calice, dont le limbe est partagé en découpures plumbeuses, étalées.

Observations. Le caractère singulier de la fructification de ce genre donne beaucoup d'incertitude sur la place qu'il doit occuper dans l'ordre naturel. Comme il ne m'est point connu, je vais présenter les observations que Brown a développées dans son intéressant ouvrage des plantes de la Nouvelle-Hollande.

Il paroît devoir être placé entre les corymbifères & les goodénovacées (Brown); il convient à ces dernières par l'enveloppe particulière de son stigmate,

stigmat, par la structure des étamines, par leur insertion sur le réceptacle, par l'ovule & l'embryon redressé; mais il en diffère par son inflorescence, par son péricarpe utriculaire, par le manque de périsperme, par la radicule de l'embryon, très-courte.

Il se rapproche des corymbifères par son inflorescence, par les divisions de sa corolle, par la connivence & l'insertion des anthères, par le manque de périsperme, par les proportions des parties de l'embryon redressé; il en diffère par le calice non adhérent, par les filaments non insérés sur la corolle, par l'enveloppe du stigmat.

Son inflorescence, l'insertion, la structure des étamines, l'adhérence des anthères entr'elles, le rapprochement de quelques campanulacées; mais il s'en éloigne par son ovaire libre, monosperme; par l'enveloppe du stigmat, par les semences sans périsperme.

Il a des rapports avec les dipacées par son port, par son inflorescence, par ses quatre bractées séparées, qui semblent correspondantes au calice extérieur, monophylle & toujours inférieur des dipacées; enfin, par un seul ovule; il en diffère par son calice libre, par le développement de la corolle, par l'insertion des étamines, par l'adhérence des anthères, par l'enveloppe du stigmat, par l'ovule redressé & le manque de périsperme.

Il a de l'affinité avec les globulaires par son inflorescence & par son port, par son calice libre & persistant, presque de la même manière, autour d'un péricarpe monosperme; par les divisions de la corolle: il en diffère par les bractées verticillées autour du calice, par la structure & l'insertion des étamines, par l'enveloppe du stigmat, par l'ovule redressé.

Les espèces qui composent ce genre ont, en général, le port des scabieuses, des jasiones ou des globulaires: ce sont des herbes presque sans tige, couvertes de poils simples, non glanduleux. Les feuilles font routes radicales, très-entières, spatulées; les pédoncules simples, soutenant une tête de fleurs divisée en lobes; chacun lobe soutenu par une bractée foliacée; quatre bractées membraneuses, verticillées sous chaque fleur, qui de plus est séparée par une foliole semblable aux bractées; le tube du calice très-court; la corolle d'un bleu d'azur; le tube fendu longitudinalement après la floraison; les filaments des étamines persistans, hypogynes, insérés sur le pé-

dicelle très-court de l'ovaire, & qui ne s'appert-çoit qu'après la fécondation; les anthères renfermées dans le tube de la corolle; le stigmat charnu, obus, entouré d'une membrane bide, nue à son orifice.

E S P È C E S.

1. *Brunonia* (sericea), foliis undique scopisque longitudinaliter sericis; villis adpressis; calicis laciniis; apiculo incrassato, colorato, nudo. Brown, Nov. Holl. pag. 190. — Smith, Trausact. Linn. Lond. vol. 10. Icon.

2. *Brunonia* (australis), foliis undique scopisque infra villosis; pilis parvis, calicis laciniis longitudinaliter plumosis, apice acutiusculo. Brown, l. c. — Smith, Trans. Linn. l. c.

BURCHARDIA. (Voyez BURCHARDE.)

BURCHARDE ombellée. *Burchardia umbellata*. Brown.

Burchardia foliis linearibus, floribus umbellatis. (N.) Brown, Nov. Holl. pag. 172.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des juncs (Juss.), de celle des colchicacées (Decand.), établi par Brown pour des herbes de la Nouvelle-Hollande, & qui ne comprend jusqu'alors qu'une seule espèce, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Une corolle caduque, à six pétales; une fossette nourrière à la base de chaque pétale; six étamines; un style trifide; une capsule à trois valves polyspermes.

Cette plante est glabre sur toutes ses parties, ses racines composées de fibres épaisses, fasciculées; les tiges simples, garnies de feuilles linéaires, vaginales à leur base; leur gaine entière. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle simple, manie à sa base d'une bractée; la corolle blanche, divisée en six pétales égaux, ouverts en étoile, caducs, chacun d'eux portant sur son onglet une fossette remplie d'une liqueur mielleuse; six étamines insérées à la base des pétales; les anthères peltées, de couleur purpurine; un ovaire libre, trigone, surmonté d'un style à trois divisions; les stigmates aigus. Le fruit est une capsule qui se divise en trois valves naviculaires, s'ouvrant en dedans, contenant des semences disposées sur deux rangs.

Cette plante croît au port Jackson, à la Nouvelle-Hollande. (L. Brown.)

Fin du tome premier.





